



AGRICULTURAL RESEARCH INSTITUTE
PUSA



AGRICULTURAL RESEARCH INSTITUTE

PUSA

COMPTES RENDUS
HEBDOMADAIRES
DES SÉANCES
DE L'ACADÉMIE DES SCIENCES.

— —
IMPRIMERIE DE BACHÉLIER
rue du Jardinet, 11

COMPTES RENDUS
HEBDOMADAIRES
DES SÉANCES
DE L'ACADÉMIE DES SCIENCES,

TOUTS

CONFORMEMENT A UNE DECISION DE L'ACADEMIE

Le 24 et le 28 Juillet 18

PAR MM. LES SECRETAIRES PERPÉTUELS.

TOME DIX-HUITIEME

JANVIER — JUIN 1844



PARIS,
BACHELIER, IMPRIMEUR-LIBRAIRE.

QUAI DES AUGUSTINS, n° 55

1844

COMPTE RENDU

DES SÉANCES

DE L'ACADÉMIE DES SCIENCES.

SÉANCE DU MARDI 2 JANVIER 1844.

PRÉSIDENCE DE M. DUPIN

RENOUVELLEMENT ANNUEL DU BUREAU ET DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE

L'Académie procède, par voie de scrutin, à la nomination d'un vice-président pour l'année 1844

Au premier tour de scrutin, le nombre des votants étant de 45,

M. Élie de Beaumont obtient.	23 suffrages
M. Beudant.	16
M. Roux	4
M. Thenard.	1
M. Cordier.	1

M. ÉLIE DE BEAUMONT, ayant réuni la majorité absolue des suffrages, est proclamé vice-président pour l'année 1844.

M DUPIN, vice-président pendant l'année 1843, passe aux fonctions de président.

Conformément au règlement, M. DUMAS, avant de quitter le fauteuil de président, rend compte de ce qui s'est fait pendant l'année 1843 relativement à l'impression des *Mémoires de l'Académie* et des *Mémoires des Savants étrangers*.

L'Académie procède ensuite, également par la voie du scrutin, à la nomination de deux membres de la *Commission administrative*

Les membres sortants, MM Poinso et Beudant, peuvent être réélus

Sur un nombre de 45 votants, MM POINSO et BEUDANT obtiennent chacun 41 suffrages

MEMOIRES LUS

GEOGRAPHIE — *Aperçu topographique sur les terres et sur les glaces australes*,
par M. HOMBRON (Extrait par l'auteur)

(Commissionnaires MM Beauteemps-Beaupre Dupeirey)

En 1842 dans une Note qui fait partie du second volume du *Voyage de l'Asiatique et de la Zélée* j'ai cherché à démontrer par un rapide exposé de la topographie des pôles sud et du pôle nord que les glaces antarctiques sont aussi invariables dans leur position que les glaces du Nord sont mobiles

Cette mobilité dépend de l'élévation de la température dont sont susceptibles les continents qui environnent la mer Glaciale arctique ils acquièrent une chaleur qui n'est point toujours la même pour chaque année mais leur voisinage modifie toujours le climat glacial des régions polaires

Cette tendance des glaces du Nord à se disperser provient aussi du grand nombre de fleuves européens, asiatiques, américains qui apportent à la mer polaire les tributs de leurs immenses cours et entretiennent des courants qui ne peuvent s'échapper qu'à travers les débouchements relativement rétrécis représentés par la mer du Nord le détroit de Barrow et de Lancaster enfin par le détroit de Behm, la force de ces courants, et par conséquent la continuation de leurs directions est la conséquence du resserrement qu'ils subissent en s'échappant du vaste bassin de la mer boréale le plus fécond des affluents de notre globe leur fixité assure une périodicité immuable dans la débâcle annuelle des glaces toutes les fois que la chaleur de l'année disjoint la masse des banquises et des glaciers

L'isolement des terres antarctiques leur position au milieu d'un océan sans bornes les constituent dans un état d'invariabilité météorologique qui l'on ne saurait mieux se figurer qu'en se rappelant ces profondes crevasses des cimes alpines où le soleil ne saurait pénétrer et où la glace et la neige s'éternisent en se faisant une atmosphère propre Ces terres, exclusivement limitées au cercle antarctique, ne sauraient avoir de fleuves de quelque importance, l'invariable glace en tarit toutes les sources, et l'étroite enceinte où la nature a

relégué ces terres ne permet de nous figurer que des torrents, en supposant contre toute vraisemblance, qu'une fonte extraordinaire permit quelquefois la formation de quelques cours d'eau. Mais, lors même que nous admettions que ce continent, ou mieux cet archipel insular, donnât naissance à des fleuves aussi puissants que ceux qui descendent des monts Oural, Altaï, Stanovoy, aussi importants que la rivière Makensie, trop plein d'une foule de lacs de l'Amérique septentrionale, que pourraient leurs courants réunis contre des glaciers incessamment soudés par leurs bases et par leurs cimes? que pourraient-ils même contre de simples banquises compactes, remparts avancés de ces terres?

Les régions extrêmes du nord ont au moins, sinon un été direct au moins un été réfléchi, au contraire, les terres antarctiques sont étrangères à toute influence même indirecte. Il en résulte nécessairement des hivers moins rigoureux que ceux du pôle nord, mais aussi des étés moins chauds et fort peu différents des hivers. Ces derniers, dans les régions polaires septentrionales, empruntent une partie de leur extrême rigueur au refroidissement des grands continents qui les pressent de toutes parts. Quel que soit le vent régissant, il leur apporte toujours un air refroidi par le parcours de plusieurs centaines de lieues couvertes de frimas, de neige ou de glace.

Partant de ces remarques sur la topographie des deux pôles, je crois pouvoir conclure que l'invariabilité des glaces australes ne permet d'atteindre les plus hautes latitudes que sur les points de la circonférence du pôle ou les terres se refoulent fortement vers le sud, et j'appuie cette dernière assertion sur l'exposé comparatif de toutes les navigations importantes exécutées dans les parages du cercle polaire antarctique. Les derniers travaux des Anglais, exécutés sous la direction de M. le capitaine Ross, sont venus confirmer l'opinion que j'avais précédemment émise relativement à l'invariabilité des glaces de l'extrême sud, et à la configuration des terres polaires à leur limite nord.

Il résulte des travaux de Cook, Bellinghausen, Biscoe, Powell, Palmer, Bransfield, d'Urville, Wilkes et Ross, que la circonférence du pôle antarctique est figurée par deux angles rentrants vers le sud, et deux angles saillants vers le nord, les banquises subissent la délinéation que leur impose l'inégal tracé des terres, aussi s'avancent-elles d'une part jusqu'au 58° degré de latitude sud, sur le méridien de 29 degrés de longitude ouest, et jusqu'au 64° 30' seulement sur le méridien de 133 degrés de longitude est. Dans une des rentrées on n'est encore parvenu qu'à 68 ou 70 degrés, dans l'autre, M. Ross vient d'atteindre 80 degrés de latitude sud.

« Ainsi, ce fut toujours sur les espaces circonscrits par les vastes retraites de la terre vers le sud que les tentatives pour s'élever vers le pôle eurent le plus de succès, mais, ce qui n'est pas moins remarquable, c'est la ressemblance des résultats obtenus partout où les navigateurs abordèrent les mêmes parages. Aucun ne parvint à pénétrer jusqu'aux plus hautes latitudes, en attaquant les glaces compactes qui se prolongent longuement au nord. Ces débris des glaciers supposent constamment des terres très-rapprochées du point où on les rencontre. Là tout est devenu glace, toute issue est obstruée, et tout progrès interdit »

CORRESPONDANCE

M. le MINISTRE DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE transmet une ampliation de l'ordonnance royale qui confirme la nomination de M. *Morin* à la place vacante, dans la Section de Mécanique, par suite du décès de M. *Coriolis*.

Sur l'invitation de M. le Président, M. *MORIN* prend place parmi ses confrères

M. *JOMARD*, en qualité de président de la Commission centrale administrative, annonce que la Commission a procédé, dans sa séance du 22 décembre 1843, au dépouillement du scrutin ouvert dans les différentes Académies, pour la nomination d'un bibliothécaire, en remplacement de feu M. *Feuillet*; et qu'il résulte de ce dépouillement que M. *LANDRESSE* a obtenu 156 voix sur 164 votants.

M. *DE HALDAT* annonce la mort de M. *Mathieu*, de Dombasle, correspondant de l'Académie pour la Section d'Économie rurale

M. *LABUS*, secrétaire de l'Institut impérial et royal du royaume Lombardo-Vénitien, transmet, au nom de cet Institut, la collection de ses Mémoires (voir au *Bulletin bibliographique*).

MINÉRALOGIE. — *Sur une obsidienne de l'Inde qui a éclaté avec détonation, au moment où on la sciait*; Note de M. A. *DAMOUR*, communiquée par M. *Dufrénoy*.

« Cette pierre, à peu près sphéroïdale avant d'être sciée, et du diamètre

de 0^m,06 environ, m'avait été cédée par le sieur Bévalet, naturaliste à Paris sous le nom d'obsidienne de l'Inde. Désirant connaître sa structure intérieure, je chargeai un ouvrier lapidaire, le sieur Puech, de la scier en deux parties aussi égales que possible. Ce travail était déjà assez avancé et l'échantillon coupé circulairement jusqu'aux deux tiers à peu près de son diamètre, lorsqu'il fit entendre une espèce de sifflement bientôt suivi d'une forte détonation. La moitié de la pierre, scellée dans du mastic, resta intacte, l'autre moitié, restée libre, se divisa par l'explosion en nombreux fragments qui furent lancés de tous côtés avec violence. J'ai cru devoir joindre ici le rapport dressé par l'ouvrier lui-même, attendu qu'il donne des détails intéressants sur le venement et sur la structure de l'obsidienne.

Les principaux fragments qui ont été réunis permettent d'observer que leur cassure est vitreuse et un peu rayonnée. Structure analogue, suivant l'expression du sieur Puech, à celle des modules de pyrite blanche.

Cette obsidienne, assez compacte dans sa masse, montre, vers la partie centrale seulement, plusieurs cavités sphéroïdales de la grosseur d'un pois. Il est probable que la portion qui n'a pas éclaté renferme encore quelques vides semblables.

Au premier aspect, cette matière a beaucoup de rapport avec le verre des bouteilles, sa surface extérieure est comme piquetée de petites cavités bulleuses. Vue en masse, elle est noire, mais les fragments de peu d'épaisseur sont transparents et de couleur vert-olive foncé. Sa poussière est d'un blanc grisâtre. Les parties voisines de la surface sont très-dures, elles rayent fortement le verre et je suis même parvenu à leur faire rayeur du quartz cristallisé.

» J'ai trouvé la pesanteur spécifique de cette obsidienne égale à 2,47 à la température de 8 degrés centigrades. Celle d'un échantillon de verre à bouteilles que j'ai voulu lui comparer était de 2,72.

A la flamme du chalumeau, elle fond lentement sans se boursoufler et sans changer de couleur, en un verre transparent. Chauffée à la simple flamme d'une lampe à alcool, elle s'émousse sur les bords sans se fondre complètement. Le verre des bouteilles placé dans les mêmes conditions se ramollit et s'arrondit en globules avec une facilité extrême.

Chauffée fortement avec du borax, elle se dissout très-lentement si l'on ajoute un peu de nitre, elle donne la réaction du fer et du manganèse.

Chauffée fortement dans un creuset de platine, elle ne perd pas de son poids.

» Les acides, même concentrés et bouillants, m'ont paru sans action sur cette matière

» L'analyse que j'en ai faite, en l'attaquant avec du carbonate de baryte, à une température élevée et séparant ses divers composants, par les méthodes généralement en usage, m'a donné pour résultats :

		Oxygène
Silice	0,7034	0,3654
Alumine.	0,0863	0,0403
Chaux.	0,0456	0,0128
Oxyde ferreux	0,1052	0,0239
Oxyde manganoux.	0,0032	0,0007
Soude	0,0334	0,0085
Magnésie	0,0167	0,0064
	<u>0,9938</u>	

» La composition de cette matière me paraît avoir beaucoup d'analogie avec celle des obsidiennes et des verres volcaniques. La quantité d'alumine et d'oxyde de fer, d'une part, de l'autre, la faible proportion de soude qu'elle renferme, et son peu de fusibilité comparée à celle du verre, éloignent la pensée qu'elle aurait été formée par des procédés artificiels.

» Ses caractères physiques et surtout sa forme sphéroïdale me semblent justifier l'opinion qu'elle s'est modelée dans un milieu élastique. Ne pourrions-nous pas supposer qu'après avoir été lancée, étant à l'état de fusion, à une grande hauteur par suite d'une explosion volcanique, elle est retombée sur le sol lorsqu'elle avait déjà pris de la solidité ? Sa surface extérieure a évidemment subi une forte trempe, et tandis que cette surface était solide et froide, le centre devait conserver encore une grande partie de la chaleur qui entretenait sa fluidité. Lorsque, par suite du refroidissement progressif, la matière contenue à l'intérieur est passée de l'état fluide à l'état solide, il est possible que la partie fluide se soit contractée sans pouvoir ramener sur elle la surface extérieure déjà solidifiée, et dans ce cas elle aura laissé un vide, le phénomène d'explosion serait alors analogue à celui que présentent les petites masses de verre connues sous le nom de *larmes bataviques*.

» Je ne propose, du reste, cette explication qu'avec une juste réserve, et je me sou mets d'avance à celle que me donneraient les personnes plus compétentes que moi en pareille matière. »

Rapport de M PUECH

1° Le morceau fut chauffé à un assez fort degré, afin de pouvoir y fixer une ardoise avec du ciment de fontaine,

2° Il fut trace au tour avec de l'emery, pour marquer le passage du fil de fer

3 Il fut chauffé derechef pour le sceller sur un autre outil mais avec le même ciment

4° Le sciage marcha très-bien à l'extérieur, mais arriva à environ 0.020 de la conférence à l'intérieur il sortit du morceau une espèce de sifflement qui fut suivi d'une détonation comme pourrait le faire une mine à feu miné ou faiblement chargée. Les deux talons se sont séparés celui qui était scellé est resté intact mais l'autre, étant isolé, partit en éclats tellement divisés que je n'ai pu retrouver que les plus gros et je fus bien surpris en remarquant que les fissures n'étaient pas comme elles sont ordinairement dans l'obsidienne. Au loin de file en ligne droite, elles sont toutes en tirant sur le centre comme les mamelons de fer sulfuré, et ce centre avait trois fortes cavités ce qui sans doute était la cause que le morceau s'est cassé

CHEMIE ORGANIQUE — *De l'action du chlore sur les éthers* (Extrait d'une lettre de M MALAGUTI à M Dumas)

Le travail dont je m'occupe relativement à l'action du chlore sur les éthers soit libres soit combinés se divise en deux parties

1° La comparaison de l'éther perchloruré avec l'éther sulfurique

2° La comparaison des éthers composés chlorurés avec les éthers composés non chlorurés

La première partie est pour ainsi dire terminée, et je puis vous dire qu'il est prouvé pour moi que l'éther perchlorure de M Regnault n'est pas de l'éther sulfurique modifié par substitution

L'éther perchlorure de M Regnault est un corps comparable en tout point au sesquichlorure de carbone C^2Cl^4 , et il arrive pour l'éther sulfurique ce qui arrive pour l'éther chlorhydrique lorsqu'il est soumis à l'action du chlore, il tombe comme on sait dans la série de l'hydrogène carboné. Et pourquoi en serait-il autrement?

L'analogie incontestable entre l'éther perchlorure et le sesquichlorure de carbone autorise déjà à admettre que les éthers composés perchlorurés ne renferment pas l'éther perchlorure de M Regnault, et, pour la même raison,

on est autorisé à admettre que les éthers composés ordinaires ne renferment point d'éther sulfurique, car si ces corps en renfermaient, pourquoi ne changeraient-ils pas de type par la chloruration?

Mais c'est la seconde partie de mon travail qui doit fournir les preuves matérielles de cette manière de voir »

M GUEIN adresse des remarques sur l'emploi de la myotomie, comme moyen de traitement, dans des cas d'amaurose et de myopie

Cette Note est renvoyée à l'examen de M Roux, qui jugera si elle peut être l'objet d'un Rapport

M HUGON adresse des *duplicata* de deux Mémoires qu'il avait précédemment présentés et sur lesquels il n'a pas encore été fait de Rapport L'un de ces Mémoires a pour titre *Nouveau système économique pour la construction des culees des ponts suspendus*, l'autre *Nouveau système de chemin ou pont, en fer ou en bois, ou en fer et bois, pour franchir de grands espaces d'eau même dans les plus grandes tempêtes*

(Renvoi à la Commission précédemment nommé, dans laquelle M Morin remplacera M Coriolis)

M FAULCON, à l'occasion d'une Note récente de M Scguier sur un moyen destiné à diminuer les dangers des chemins de fer, écrit qu'il a lui-même proposé, dans le même but, l'emploi de roues horizontales pour les locomotives

M GOUTY adresse une Note imprimée sur les moyens qu'il a imaginés pour diminuer les dangers des chemins de fer, et demande que sa Note soit renvoyée comme pièce à consulter à la Commission chargée de s'occuper de cette question

M^{re} veuve GAMBARD demande l'autorisation de reprendre un Mémoire sur des questions de mécanique, soumis autrefois par son mari au jugement de l'Académie, et sur lequel il a été fait un Rapport Le Mémoire se trouvant par hasard en *duplicata* dans les archives de l'Académie, un des deux manuscrits sera rendu à la veuve de l'auteur

M RICHARD adresse quelques détails sur la disposition des *Tables* qu'il vient de publier pour la *reduction des distances lunaires*, et dont il a offert à l'Académie un exemplaire dans la précédente séance

MM CHEVALIER et MOLENAARS adressent un paquet cacheté

A 4 heures l'Académie se forme en comité secret

COMITE SECRET

M FRANCOEUR au nom de la Commission chargée de juger les pièces adressées au concours pour le prix de Statistique année 1842 fait un Rapport dont la conclusion est qu'il n'y a pas lieu à décerner de prix pour cette année

La séance est levée à 5 heures et quart

P

ERRATA

(Séance du 18 décembre 1843)

Page 1340 ligne 27 *ajoutez* La Lettre de M Pierquin est renvoyée à la Commission chargée de faire un Rapport sur les caillottes de sureté de MM Nèvre et Bloffe

(Séance du 26 décembre)

Page 1364 ligne 31 *au lieu de* (Commission précédemment nommée) *lisez* Cette Lettre ainsi que celle de M Deshayes et le Mémoire de M Al d'Orbigny sur la station normale des mollusques sont renvoyés à l'examen d'une Commission composée de MM Élie de Beaumont Milne Edwards Dufrenoy

Page 1370 lignes 8 11 et 16 *au lieu de* Chuart *lisez* Chuard

BULLETIN BIBLIOGRAPHIQUE

L'Académie a reçu, dans cette séance les ouvrages dont voici les titres

- Comptes rendus hebdomadaires des séances de l'Académie royale des Sciences*
2^e semestre 1843, n° 26, in-4°
- Bulletin de l'Académie royale de Médecine*, t IX, n° 6, in-8°
- Considérations générales sur la tribu des Podagracees et fondation du nou-*
vel genre *Gytophagmum* appartenant à cette tribu par M C MONTAGNE
(Extrait des *Annales des Sciences naturelles*) Broch in 8
- Biographie chimique* BERNARD PALISSY par M P-A LAP, broch in-8°
- Pratitout un peu de tout — Souvenirs poétiques* par M JACOUR 1 vol in 8
- Reflexions sur la nécessité d'une Instruction spéciale à l'Agriculture* par
M J GIRARDIN $\frac{1}{2}$ feuille in-8° (Extrait de la *Revue de Rouen et de la Nor-*
mandie) in-8
- Chemins de fer — Moyens pratiques d'éviter les accidents et les incendies*
connus à l'Académie des Sciences par M GOUTT, broch in-8
- Des propriétés électives des vaisseaux absorbants chez l'Homme et les Ani-*
maux, par M BARTHEZ broch in-8°
- Encyclopédie médicale* décembre 1843 in 8°
- Le Technologiste*, janvier 1844, in 8°
- Journal des Connaissances médicales pratiques et de Pharmacologie* décembre
1843 in-8°
- Annales de Thérapeutique médicale et chirurgicale et de Toxicologie*, n° 10
janvier 1844 in-8°
- Bibliothèque universelle de Genève*, décembre 1843, in 8°
- Supplément à la Bibliothèque universelle de Genève — Archives de l'Electri-*
cité, n° 11 et 12, in-8°
- Mémoires de la Société de Physique et d'Histoire naturelle de Genève*, t X
1^{re} partie, in-4°
- Observations astronomiques faites à l'Observatoire de Genève dans l'année 1842*,
par M E PIAZAMOUR, 2^e partie, in 4°
- Faits chimiques, toxicologiques, et considérations médico-légales relatives à*
empoisonnement par l'acide prussique; par M BONJEAN Chambéry, 1843,
broch in 8°

Recherches chimiques, physiologiques et médicales sur les Eaux de Challes en Savoie, par le même, broch in-8°

Memorie dell . *Memours de l'Institut impérial et royal du royaume Lombardo-Vénitien*, vol I^{er}, années 1812 et 1813, Milan, 1819, vol II année 1814 et 1815, Milan, 1821 vol III, années 1816 et 1817, Milan, 1824 vol IV, Milan, 1833, vol V, Milan, 1838 5 vol in-4

Memorie — *Mémoires de l'impérial et royal Institut lombard des Sciences Lettres et Arts* vol I^{er}, Milan, 1843 in 4°

Descrizione *Description et anatomie des Animaux sans vertèbres de la Sicile intérieure observés vivants dans les années 1822 à 1830 par M DELIL CHIAJE* Naples, 1841, 5 vol de texte grand in-4° et 1 vol *idem* composés de 173 planches

Gazette médicale de Paris, t IX, n° 52

Gazette des Hôpitaux, t V, n° 152 et 153

L'Echo du Monde savant, 10^e année, n° 51 et 52 in-4°

L'Expérience, n° 339 in-8°



COMPTE RENDU

DES SÉANCES

DE L'ACADÉMIE DES SCIENCES.

SÉANCL DU JUNDI 8 JANVILR 1844

PRÉSIDENTE DE M DUPIN

MEMOIRES ET COMMUNICATIONS

DES MEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE L'ACADÉMIE

M CAUCHY présente à l'Académie un Mémoire sur la convergence de la série qui exprime la fonction perturbatrice développée suivant les sinus et cosinus des multiples des longitudes moyennes des planetes que l'on considère

MEMOIRE LUS

ZOOLOGIE — *Mémoire sur les Phleboterres, ordre nouveau de la classe des gastéropodes, établi d'après l'examen anatomique et physiologique des genres Zephyrine, Actéon, Actéonie, Amphorine, Pavois, Chalide, par M A DE QUATREFAGES*

(Commission précédemment nommée)

Dans un Mémoire précédent, j'ai fait connaître un gastéropode chez lequel les principaux caracteres, généralement regardés comme essentiels non-seulement à la classe, mais encore à tout lebranchement des mollusques, avaient disparu en tout ou en partie Je viens compléter aujourd'hui

ce travail en montrant qu'il existe dans cette classe des gastéropodes un groupe tout entier qui s'écarte du type primitif par une dégradation progressive et qui, sous ce rapport, est aux gastéropodes ce que les entomostracés sont aux crustacés.

Les espèces que j'ai étudiées sont au nombre de huit. Deux d'entre elles appartiennent au genre *Actéon* d'Oken. Les autres doivent former cinq genres nouveaux. Dans le Mémoire, dont la Note que je présente ici est un court résumé, j'ai examiné chacun de ces genres dans le plus grand détail. Voici quelques uns des principaux résultats de ces recherches.

Le tube alimentaire de tous ces mollusques présente en avant une masse buccale composée de divers plans musculaires. Elle est armée, chez plusieurs, tantôt de fortes dents cornées latérales qui rappellent les mandibules des insectes ou les dents de certaines annélides (genre *Zephyrine*) tantôt d'une langue cartilagineuse (genres *Actéon*, *Amphorine*) ou d'une espèce de charpente de même nature (genre *Chalide*). A cette masse buccale succède d'ordinaire un œsophage plus ou moins long conduisant dans une poche stomacale. Mais quelquefois l'estomac minuscule (*Chalide*) et l'œsophage aboutit directement à l'intestin. D'autres fois l'œsophage lui-même disparaît comme dans les *Amphorines*.

La portion intestinale du tube alimentaire se présente sous deux formes bien distinctes. Dans les *Zephyrines*, les *Actéons*, les *Actéonies* et les *Amphorines*, elle se compose essentiellement de deux troncs latéraux simples ou ramifiés, dou partent des cœcums qui pénètrent dans des appendices extérieurs. Ces dispositions anatomiques rappellent ce que nous avons vu exister chez l'*Éolidine*. Dans les *Pavos* et les *Chalides*, l'intestin ne forme plus qu'une grande poche simple ou divisée en deux par une profonde scissure. Il n'existe plus alors d'appendices extérieurs.

Chez les *Actéons* et les *Actéonies*, j'ai reconnu l'existence d'un anus placé sur la ligne médiane vers le milieu du dos. Je suis porté à croire que cet orifice se trouve également chez les *Zephyrines*, mais il a été impossible d'en découvrir la moindre trace chez les *Amphorines*, les *Pavos* et les *Chalides*. De plus, la disposition anatomique des parties rendrait vraiment difficile à comprendre le point où pourraient être placés un rectum et une ouverture anale. Je crois pouvoir assurer que ni l'un ni l'autre n'existe chez ces mollusques. Toutefois, comme il pourrait encore rester quelque doute à cet égard, je n'ai nullement tenu compte de cette circonstance dans les conclusions que j'ai tirées de l'examen attentif de mes mollusques. Ces conclusions acquièrent par là un plus grand degré de certitude.

» Dans l'Éolidine l'appareil circulatoire était réduit à un cœur et à des artères je suis presque certain que ni l'un ni l'autre n'existe chez les Zéphyrines et les Actéons, mais il ne me reste aucun doute à ce sujet pour les Amphoïnes, les Actéonies, les Pavois et les Chalides. Leur transparence plus complète m'a permis de m'assurer que dans ces genres toute trace de l'appareil circulatoire avait entièrement disparu.

Dans l'Éolidine, le cerveau se compose de quatre ganglions réunis par paires latérales à l'aide d'une courte et mince bandelette supérieure. Une bandelette inférieure complète le collier œsophagique, et il existe en outre, un petit ganglion buccal qui est également sous-œsophagique. Neuf paires de nerfs partent de ce cerveau. Une disposition toute semblable se retrouve chez les Zéphyrines et les Actéons, mais déjà le ganglion buccal a disparu. Dans les autres genres la simplification augmente rapidement : les deux masses ganglionnaires de chaque côté se fondent en une seule, et ceci principalement aux dépens de la masse externe. Le nombre des troncs nerveux diminue. Enfin, la bandelette sous-œsophagienne disparaît, et il ne reste plus dans les Chalides que deux masses sus-œsophagiennes d'où partent seulement six troncs nerveux.

Ces mollusques simplifiés n'en conservent pas moins des organes sensitifs parfaitement reconnaissables. Tous ont des yeux, composés d'une capsule enveloppante qui entoure un pigment coloré, d'un cristallin sphérique, d'une humeur vitrée et d'une rétine. De plus, j'ai trouvé chez tous un organe auditif semblable à celui que Sieboldt a décrit chez les gastéropodes ordinaires. Dans plusieurs cas, j'ai pu suivre très-distinctement les nerfs sensitifs, depuis le cerveau jusqu'au point où ils s'épanouissent à la base des organes qui doivent leur transmettre des impressions extérieures.

Tous les organes que nous avons mentionnés jusqu'ici sont disposés symétriquement des deux côtés du corps. L'appareil de la reproduction échappe seul à cette loi générale. Il se compose, chez tous ces animaux, d'un sac testiculaire assez court, et d'un très-long cordon ovarien dans lequel les œufs se développent d'espace en espace. L'orifice genital est d'ordinaire percé à droite sur les côtés, et un peu en arrière de la tête. L'Actéonie seule me présente cet orifice à gauche.

» Dans les animaux inférieurs, de petite taille, les recherches histologiques se confondent presque avec celles qui n'ont pour but que l'anatomie organique. Il faut avoir recours au microscope pour reconnaître que les parois du corps de tous ces mollusques se composent de plusieurs couches distinctes, dont la plus externe est entièrement couverte de cils vibra-

tiles, excepté sous les pieds. C'est aussi le seul moyen de s'assurer que les perles de diverses couleurs qu'on rencontre sur la peau de ces mollusques sont de petits cyptes muqueux, composés d'une vésicule qui verse le produit de sa sécrétion par un goulot quelquefois très-allongé. On reconnaît en même temps, à l'aide du même instrument, que l'élément muscliculaire présente ici de nombreuses variations de forme et de structure, et que dans les corps des Chalcides en particulier il est réduit à de simples filaments diaphanes, homogènes, isolés au milieu d'une gangue granuleuse et transparente.

Dans l'olidine, l'appareil circulatoire se réduit à un cœur et des artères; les veines disparaissent, et avec elles les organes respiratoires proprement dits. Ils sont suppléés par le tube intestinal, qui n'est plus chargé seulement d'extraire des aliments *unusquisque* le propre à vivre le sang appauvri mais qui doit en outre faire subir au produit de la digestion un degré de plus de préparation, et le soumettre immédiatement au contact de l'air. Les organes de la digestion sont donc chargés en partie des fonctions respiratoires. Dans la Zephyrion, les Actéons et l'Actéon le cœur, qui ne remplissait déjà plus que le rôle d'un agent de mélange le cœur, disons nous, disparaît et entraîne avec lui le reste de l'appareil circulatoire. Le tube digestif se ramifie encore plus que dans l'olidine et il présente des mouvements qui appellent la systole et la diastole du cœur. En même temps, les fonctions de respiration semblent lui être entièrement dévolues, mais il est pourtant probable que déjà la peau en général acquiert sous ce rapport, une certaine importance, et que la respiration n'est pas localisée uniquement dans les cuticules branchiales. Dans l'Amphion, nous voyons les ramifications intestinales diminuer de nombre en augmentant de volume, disposition qui nécessite une plus grande participation de la peau aux actes respiratoires. Mais il existe encore des appendices extérieurs dans lesquels pénètre l'intestin et, quel que soit le rôle que jouent les téguments dans la respiration, cette fonction ne leur appartient pas encore en entier. Enfin, dans les Pavois et les Chalcides, tout appendice extérieur disparaît. L'intestin semble se concentrer en une ou deux grandes poches. Il en revient probablement à un usage que d'une façon très-secondaire dans la respiration, et la peau seule selon toute apparence, est chargée de cette dernière fonction.

Malgré la brièveté de cette exposition, on peut en conclure que le fait qui domine dans les modifications éprouvées par le type des gastéropodes, pour donner naissance aux mollusques dont il s'agit, consiste dans le transport des fonctions respiratoires aux organes d'alimentation et aux téguments. En

d'autres termes, une fonction qui, chez les gastéropodes ordinaires, s'exécute à l'aide d'appareils spéciaux, s'ajoute ici aux fonctions dont sont déjà chargés d'autres organes.

« Ces considérations nous permettent d'apparier avec justesse les affinités zoologiques de nos mollusques. Rappelons d'abord deux principes développés surtout par M. Milne Edwards et dont l'importance nous semble n'avoir pas été suffisamment sentie jusqu'ici. On peut, je crois, les formuler de la manière suivante : 1° Tout animal est d'autant plus élevé dans l'échelle des êtres, que chez lui la division du travail fonctionnel est portée plus loin ; 2° toutes les fois qu'un animal se modifie de telle sorte que les fonctions demeurant les mêmes, le nombre des appareils destinés à leur accomplissement diminue, cet animal *se dégrade*, il devient *animal inférieur* relativement aux autres êtres qui dérivent du même type.

Où, tous les mollusques voisins de ceux que je viens de décrire ont si bien des mollusques gastéropodes par leurs formes extérieures, qu'un naturaliste jusqu'ici n'a hésité à les réunir à ce groupe. Il en eût été de même sans nul doute des espèces nouvelles qui font l'objet de ce travail. Et cependant les caractères anatomiques de ces animaux les excluent non-seulement de la classe des gastéropodes, mais encore de l'embranchement des mollusques, tels que ces groupes sont définis par les auteurs.

Mais nous venons de voir que ces caractères nouveaux résultaient de la disparition des appareils circulatoire et respiratoire, de la diffusion du liquide nourricier dans la cavité générale du corps, du transport des fonctions de respiration aux organes digestifs et cutanés. Nous devons donc voir dans ces mollusques d'après ce qui précède, non pas des animaux d'une classe ou d'un embranchement nouveau, mais seulement des *gastéropodes dégradés*, des *gastéropodes inférieurs*. Bien entendu que par le fait même de cette dégradation, il s'établit de nouveaux rapports zoologiques dans le détail desquels nous ne pouvons entrer ici. Je passerai également sous silence plusieurs considérations générales qui m'ont été suggérées par l'examen détaillé de ces animaux.

Plusieurs genres déjà connus de mollusques devront rentrer dans l'ordre nouveau que je propose d'établir dans la classe des gastéropodes, des coupes secondaires devront être pratiquées dans ce groupe. Le tableau ci-joint présente le résumé de ce que les faits connus permettent déjà d'établir à cet égard.

Ordre	Familles	Tribes	Genres
Mollusques gastéropodes à circulation imparfaite ou nulle, privés d'organes respiratoires proprement dits (GASTÉROPODES PRÉLÉMENTAIRES)	Intestin ramifié, se prolongeant dans des appendices extérieurs ENTÉROBRANCHES	Appendices isolés, plus ou moins nombreux et compliqués ENTÉROBRANCHES PROPREMENT DITS	Eolide Eolidine Zephyrine Amphorine Calliopee Cavoline ? Glaucus ? Tergipes ?
		Appendices réunis en forme de ramées ENTÉROBRANCHES AÉROBRANCHES	Acteon Acteonie Placobranche ?
	Intestin très-simple en forme de poches peu nombreuses, point d'appendices extérieurs DÉMOBRANCHES		Pavoi Chalcide

PHYSIQUE DU GLOBE — *Recherches sur le climat de la France, par*
M FUSTEA 1^{re} Mémoire (Extrait par l'auteur)

(Commissaires, MM Gaudichaud, de Gasparin, Payen)

Ces recherches comprennent trois parties 1^{re} l'exposé des faits touchant les modifications de ce climat 2^o la discussion de ces faits pour en déduire les caractères des modifications climatologiques, 3^o l'examen des circonstances qu'on peut regarder comme les causes de ces modifications Il ne s'agit, dans ce premier Mémoire, que de la partie purement historique

Cette histoire commence à la conquête de la Gaule par Jules César, cinquante ans avant l'ère actuelle Elle embrasse ainsi dix-neuf cents ans La Gaule, sous Jules César, avait un climat très-rigoureux, ses hivers étaient très-froids, très-précoces et très-long Le froid gelait toutes les rivières navigables, y compris le Rhône, et la glace était si forte, qu'elle portait des armées en toute sûreté avec leur train et leur bagage Ses hivers commençaient au mois d'octobre et se prolongeaient jusqu'au mois d'avril

D'abondantes pluies inondaient alors la Gaule, il s'y joignait des tempêtes si terribles, qu'elles pourrivaient les indigènes même jusque dans l'épaisseur des forêts. Il est certain que ce climat repoussait la culture de la

vigne et du figuier, et ce qui prouve que c'était bien sa rigueur qui s'opposait à leur culture, c'est que la vigne peut y croître spontanément

» La culture du sol de la Gaule ne répondait pas à sa fécondité. Des forêts immenses et impenétrables l'enveloppaient de tous côtés. L'auteur a essayé, en se servant des monuments de l'époque et des traces respectées par les âges, de reconstruire les antiques forêts de la Gaule. Il en a suivi ainsi la direction dans le nord, dans le centre et dans le midi. Quant à l'étendue de ces forêts, l'ensemble des données le conduit à penser que la Gaule primitive, du Rhin aux Pyrénées, ne contenait pas moins de 46 millions d'hectares de forêts. tel était le climat de la Gaule cinquante ans avant notre ère

» Ce climat s'améliora rapidement. Tous les écrivains du 1^{er} siècle déposent de cette amélioration. Il perdit de son aridité sans cesser d'être encore très rigoureux. Indépendamment des preuves tirées des caractères atmosphériques, l'auteur cite, comme résumé de ses progrès, la marche ascensionnelle de la culture de la vigne dans le 1^{er} siècle.

» Arrêtée avant Strabon au pied des Cévennes, elle commence alors à franchir cette barrière, Columelle la rencontre plus tard chez les Allobroges (Dauphiné), et Plinius la voit naître spontanément dans le Vivarais, se reproduire dans la Viennoise, parvenir en Auvergne et atteindre même la Sequanaise ou Franche Comté. Enfin, lorsque, l'an 69 de notre ère, Domitien fit arracher les vignes de la Gaule, on n'avait pu en pousser la culture au delà des environs d'Autun et du territoire des Bituriges (Beary).

» Des modifications topographiques accompagneront ces modifications météorologiques. M. Fuster suit ces modifications dans l'état des forêts, de l'agriculture et de la civilisation. Ce premier ordre de changements remonte à Auguste et s'étend jusqu'à Domitien.

» Le climat de la France continua à gagner dans les siècles suivants. Quand l'empereur Probus permit aux Gaulois de replanter la vigne, sa culture, arrêtée en 96, sous le quarante-septième degré de latitude, put s'étendre du côté du nord, le long de la Seine. Le figuier, plus sensible au froid, et retenu au commencement de notre ère, en deçà des Cévennes, suivit rapidement la marche ascensionnelle de la vigne. Julien, qui se trouvait dans la petite ville de Lutece, au milieu du 4^e siècle, trace un tableau charmant de cette région. Il vante l'extrême douceur de sa température, l'excellence de ses vignes et la rapide multiplication de ses figuiers. Il nous apprend aussi, par une de ses lettres, que les blés étaient déjà mûrs au solstice d'été dans le nord de la Gaule.

Le Midi s'était amélioré comme le Nord. Ausone de Bordeaux et Sidoine Apollinaire ne permettent pas d'en douter. Les forêts diminuaient toujours en même temps que l'agriculture et la civilisation faisaient des progrès.

Lorsque, dans le ^{vi}^e siècle, les Francs devinrent maîtres de la Gaule, son climat était encore plus doux que du temps de Julien, il consistait en pluies suivies d'inondations, et en chaleurs intenses, précoces et prolongées. Ce qui procurait presque chaque année, à cette région, deux récoltes et deux fructifications, la vigne atteignant dès ce moment les points les plus septentrionaux du royaume. Elle couvrait la Normandie, la Bretagne et la Picardie, toutes ces vignes rendaient de très belles récoltes de vin, et plusieurs d'entre elles fournissaient un vin très-bon. La vendange se faisait au mois de septembre ordinairement, et quelquefois même au mois d'août. La moisson avait lieu aussi, dans ces contrées septentrionales, dans la seconde quinzaine du mois de juillet, les chartes, diplômes, contrats de vente, etc., conservés par les anciennes chroniques, justifient ces assertions.

Le ^{ix}^e siècle marque les limites des progrès du climat de la France. Toutefois ce climat ne perdit rien avant le ^{xii}^e siècle, il parut rester stationnaire pendant deux cents ans. Ses hivers consistaient également en pluies et en tempêtes, les vignes en couvraient toute la partie septentrionale. La moisson continuait à se faire, dans le Nord, à la fin du mois de juillet, et les vendanges à la fin de mois de septembre.

Le nord-est de la France avait encore des vignes et des vendanges dans le ^{xiii}^e siècle. Il y en avait à Dieppe en 1200, dans le diocèse de Beauvais en 1228 et 1239, et quelques-uns de ces vins devaient être très-potables, comme le remarque M. Arago, puisque, d'après le tableau d'un trouvère normand du temps de Philippe Auguste, le vin de Beauvais entra en lice avec les vins les plus renommés du royaume. Cependant la vigne s'était déjà retirée depuis longtemps des points les plus septentrionaux de ces provinces, il n'y en avait plus aucun vestige à Cherbourg vers 1212. Les actes du diocèse d'Amiens, qui comprennent ceux du Ponthieu et du Boulonnais, ne mentionnent plus ni vin ni vignes depuis 1105, et Guillaume le Breton écrivait, au commencement du ^{xiii}^e siècle, que les gens du pays d'Auge (territoire d'Eu) boivent le cidre mousseux, que le pays d'Eu se réjouit de ses pommes, dont les Neustriens (entre la Seine et la Loire) ont coutume de se faire une agréable boisson. Quinze intempéries violentes éclatant coup sur coup au commencement du ^{xiii}^e siècle, précipitèrent la disparition. C'est alors qu'on fut obligé d'abandonner définitivement sa culture dans le nord-ouest, et d'y remplacer l'usage ordinaire du vin par celui du cidre. On avait commencé à

y planter des pommiers à cidre dès que la vigne était devenue difficile à cultiver, et c'est au moins vers la dernière moitié du ^{xiii}e siècle, mais ces plantations s'y multiplièrent, du ^{xii}e au ^{xiv}e siècle, à proportion du dépérissement de ses vendanges. Quelques vignobles, sous des conditions locales particulières, survécurent seulement en Normandie, en Bretagne et en Picardie sans ces exceptions, qui allèrent toujours en diminuant jusqu'à la fin du dernier siècle les vignes productives disparurent du ^{xii}e au ^{xiv}e siècle de la Flandre de l'Aïtois, de la Normandie, de la Bretagne, et de la Picardie, sans qu'on ait jamais pu depuis, malgré diverses tentatives, en rétablir la culture.

L'altération du climat de la France se renferma d'abord entre ces provinces, elle ne gagna le sud est que de proche en proche et beaucoup plus tard. Les vignes plantées à Coucy, près de Laon, à la fin du ^{xv}e siècle, passaient pour fournir le meilleur des vins. Tous les naturalistes du ^{xvi}e siècle vantaient encore la bonté et la force des vins des environs de Paris, ceux surtout d'Argenteuil, de Marly, de Meudon, de Ruelle et de Montmarte il était récolté au mois de septembre. Les latitudes inférieures conservèrent à plus forte raison le caractère méridional de leurs produits. M. Arago en a cité des preuves pour le Maconnais et pour le Vivarais. Nous ajouterons qu'à la même époque les oranges, les limoniers et les citronniers se voyaient en pleine terre dans plusieurs parties du Languedoc et dans presque toute l'étendue de la Provence, que la canne à sucre était acclimatée dans cette dernière région, au dire d'Olivier de Serres.

Notre climat continua à se détériorer du nord au sud pendant les ^{xvii}e et ^{xviii}e siècles. La Picardie perdit le reste de ses vignobles, ainsi que la Normandie et la Bretagne. Les vins des environs de Paris tombèrent dans le discrédit, dans le Midi, l'oranger, le citronnier et le limonier ne réussirent plus en pleine terre au climat du Languedoc, la canne à sucre ne réussit plus en Provence qu'à l'abri des serres, l'olivier enfin, qui tendait à remonter, rétrograda vers la mer. Malgré leurs pertes, les cultures du Nord et du Midi retinrent encore au ^{xvii}e siècle une forte teinte méridionale, outre les bons vins d'Argence, près de Caen, les vignobles d'Évreux et des rives de la Seine en Normandie, certains endroits de la province du Maine, l'Anjou et la Touraine, continuèrent à fournir en très-grande quantité un des meilleurs vins du royaume. Les vins d'Orléans surtout jouissaient de la plus haute célébrité, Olivier de Serres les qualifie de très excellents. Ils attiraient de tous côtés les marchands de la France et de l'étranger. L'olivier se rencontrait à Carcassonne, et en grande quantité du côté de l'est, près du bourg Saint-Andéol. La Provence produisant des palmiers dont les fruits, au rapport du géographe

Davit, étaient aussi bons que ceux d'Afrique, ce cosmographe ajoute et repète que toute la plaine de cette contrée, entre Orgon, Aix et Marseille, pres Saint Chamaz, Miramas, Sénas et Malemort, portait force orangers, citronniers et palmiers aussi bien que le pays entre Marseille, Hyères, Fréjus, etc. Le dictionnaire géographique de Corneille a confirmé à cet égard les assertions de Davity Perpignan en Roussillon offrait à la même époque deux longues lignes d'orangers séculaires plantés en plein vent dans une large rue.

Le XVIII^e siècle a dépouillé notre climat de tous ces avantages il a été témoin des dernières vendanges de la Normandie et de la Bretagne, il a apauvri le vignoble du Maine, relégué parmi les produits médiocres les vins de l'Anjou, d'Orléans et de Sens, refoulé l'olivier au-dessous de Carcassonne, restreint sa culture du côté de l'est, réduit les palmiers de Provence à ne porter aucun fruit, repoussé les orangers du Roussillon dans les seires ou sous des abris, confiné ceux de la Province au delà de Toulon, sur le territoire d'Hyères, de Vence de Conzié et de Nice.

Un trait caractéristique suivant Arthur Young, des pays de France où la vigne ne réussissait plus lors de son célèbre voyage en 1787 et 1789, c'était la grande quantité de fruits, principalement de prunes, de pêches de cerises, de raisins et de melons en outre, sa ligne de culture de nos oliviers commence à Carcassonne et s'arrête à Montélimart. Eh bien, ces conditions agricoles ont déjà notablement changé. Aujourd'hui le raisin ne mûrit même plus sans difficultés à l'air libre en Bretagne, en Normandie et en Picardie, les arbres fruitiers, ceux à noyau surtout, si productifs de son temps, dans ces pays n'y viennent bien qu'en espalier, l'olivier, enfin, a reculé de tous côtés, il ne croit pas à Carcassonne son retrait en Provence est un fait généralement avoué, on ne le cultive plus sur la rive gauche du Rhône au delà de Donzère, à quatre ou cinq lieues au sud de Montélimart. M. A. de Candolle, en 1835, fixait l'étendue de sa retrogradation dans le département de l'Aude à cinq myriamètres depuis 1789. Il paraît en outre, si l'on en croit Malte-Brun, que la matière du froment rendrait aujourd'hui près d'un quart de moins que le froment de 1788.

Tel est le mouvement du climat de la France depuis la conquête de César, cinquante ans avant notre ère, jusqu'à nos jours, ou pendant dix-neuf cents ans les circonstances topographiques, l'état de ses cultures, de son sol, de ses forêts ont subi dans ce long intervalle des modifications en rapport avec ses changements. Dans le second Mémoire, nous essayerons de déterminer le caractère de ces changements.

CHIRURGIE — *De la trachéotomie dans la période extrême du croup,*
par M SCOUTETTEN (Extrait)

(Commissaires, MM Serres, Roux, Breschet)

La marche rapide du croup et les dangers inhérents à cette redoutable maladie ont fait naître depuis longtemps la pensée d'ouvrir la trachée-artère du malade menacé de suffocation. Je ne rappellerai point les travaux publiés sur ce sujet, ni les succès obtenus par cette opération, je veux seulement présenter un exemple de guérison qui a précédé presque tous ceux qui ont été publiés, et dire publiquement et avec exactitude les faits qui se rattachent à un événement qui m'est personnel.

C'est sur ma fille, âgée alors de six semaines, que j'ai dû, par une nécessité cruelle, porter l'instrument pour chercher à la soustraire à une mort imminente.

L'opération fut faite et suivie de succès, elle eut un grand retentissement, et chacun me jugea d'après ses sentiments, c'est-à-dire de manières fort diverses. Des ouvrages publièrent l'observation sans la connaître, et l'un d'eux me prête un discours ridicule sur la vie et la mort en présence du cadavre de ma fille.

Jusqu'à ce moment je me suis abstenu de parler, mais je crois nécessaire de livrer à la publicité un fait unique dans la science, car il est le seul exemple connu d'une opération de trachéotomie faite, à l'occasion du croup, sur un enfant de six semaines, c'est aussi le seul qui ait présenté une série d'accidents aussi redoutables et aussi prolongés.

Cette observation servira probablement à encourager les hommes timides et à montrer les étonnantes ressources de la nature dans le jeune âge.

Sophie Scoutetten, née le 10 décembre 1839, était un enfant fort et très bien constitué. Trois semaines après sa naissance il fut pris de quelques symptômes d'irritation vers le larynx, qui se dissipèrent rapidement sous l'influence de quelques moyens adoucissants.

Le 22 janvier 1840, l'enfant venait d'être lavé dans une chambre chaude, lorsque, étant nu, il fut exposé à un courant d'air froid. Dans la nuit suivante, vers trois heures du matin, il s'éveille, s'agite et présente tous les signes d'une irritation vive des voies aériennes. Ces accidents, qui paraissent d'abord peu graves, furent combattus par des moyens très-simples. Ils paraurent céder, mais ils revinrent bientôt en s'aggravant.

Les mêmes alternatives de mal et de mieux se représentèrent dans la jour-

née du 24 Dans la nuit on vit revenir la gêne de la respiration ; l'air faisait entendre un petit sifflement en passant à travers le larynx, les paupières étaient fermées, l'enfant buvait avec peine, et chaque ingurgitation était suivie d'un état de spasme et de suffocation

Vers deux heures du matin, les accès de suffocation se répétèrent coup sur coup on chercha à faire vomir la petite malade en provoquant le chatouillement de la gorge avec les barbes d'une plume, puis avec le doigt, enfin avec l'émétique On ne réussit que très-imparfaitement

Des ce moment, la mort parut imminente la face et les lèvres étaient toutement décolorées, les muscles relâchés, la respiration très-faible, les extrémités froides En présence de ce danger, j'appliquai ma bouche contre celle de l'enfant, et j'insufflé avec force un peu d'air dans ses poumons Après quelques secondes, la vie se ranima, le pouls reparut, l'enfant entrouvrit les paupières Cet heureux changement fut de courte durée, les accidents reparurent avec la cessation des insufflations Le premier moyen étant insuffisant, je me décidai à introduire dans le larynx une sonde de gomme élastique, elle amena d'abord l'effet désiré, mais elle ne tarda pas à provoquer la toux, le vomissement et des spasmes il fallut y renoncer Des médecins, appelés en consultation, décidèrent que le mal était au-dessus des ressources de la science, et que l'opération serait complètement inutile Je ne partageai pas cet avis, et je répondis Si la mort est certaine, l'opération ne peut pas aggraver le mal, si, au contraire, il n'y a qu'asphyxie, sans désordre profond dans les organes qui peut prévoir les résultats de l'introduction de l'air dans les poumons ? J'insistai donc pour que l'opération fût faite immédiatement Mes confrères, malheureusement, n'ayant pas l'habitude de l'instrument, me déclarèrent avec regret qu'ils ne pouvaient pas se rendre à mes désirs

Dans cette douloureuse position, l'hésitation devenait mortelle, il fallait agir ou perdre tout espoir, je me résignai, et ma main arma du bistouri !

La position déplorable de la petite malade exigea plusieurs fois que l'opération fût suspendue, pour pouvoir insuffler de l'air dans les poumons Enfin la trachée-artère fut ouverte, et, après une série d'accidents redoutables, dont nous supprimons la description, une sonde de gomme élastique, du n° 6, fut introduite dans la trachée artère Dans la journée cette sonde fut remplacée par une canule en argent Des accidents très-compiqués survinrent, enfin, le dixième jour après l'opération, l'instrument fut enlevé définitivement, et la plaie marcha rapidement vers la cicatrisation

• Depuis cette époque, l'enfant a joui d'une bonne santé, le timbre de sa

voix n'est point altéré, et il ne reste de tant de souffrances et d'accidents si redoutables qu'une cicatrice à la partie moyenne et antérieure du cou

MEMOIRES PRESENTES

PHYSIQUE APPLIQUEE — *Note sur l'appareil catadioptrique exécuté par M. FRANÇOIS jeune, pour le phare écossais de Scherivore*

(Commissaires, MM. Arago, Mathieu, Babinet)

Les appareils lenticulaires imaginés par Augustin Fresnel comprennent, indépendamment du *tambour dioptrique fixe ou mobile*, une partie accessoire destinée à recueillir et diriger vers l'horizon les rayons lumineux qui, émanés du foyer central, passent au-dessus et au dessous des lentilles.

Cette partie accessoire est, dans la plupart des cas, formée d'un système fixe de miroirs concaves étages en zones horizontales, tant au dessus qu'au dessous du tambour lenticulaire.

Aux deux phares de Cordouan et de Marseille le tambour dioptrique tournant est surmonté d'un système également mobile composé de huit anneaux lenticulaires disposés en pyramide tronquée, et d'autant de miroirs plans pour envoyer à l'horizon les huit faisceaux lumineux émergeant perpendiculairement aux faces de la pyramide.

Une troisième combinaison préférable aux deux autres sous le double rapport théorique et pratique, a été appliquée par l'inventeur aux petits fanons lenticulaires de 25 à 30 centimètres de diamètre intérieur. Dans ces appareils qui, à raison de leur exigüité, ne comportaient pas l'emploi des miroirs, le système accessoire catoptrique a été remplacé par un système catadioptrique d'anneaux à section triangulaire produisant la réflexion totale.

Le premier appareil de cette espèce fut exécuté, peu de temps avant la mort d'Augustin Fresnel, par M. Tabouret, conducteur des Ponts et Chaussées, attaché au service spécial des phares.

L'application de ce système aux appareils de plus grandes dimensions devait, à cette époque, paraître presque inexecutable. A peine, en effet, pouvait-on obtenir la taille d'anneaux dioptriques de 75 à 80 centimètres de diamètre pour les grandes lentilles plan-convexes. Quant aux tambours dioptriques fixes, d'un diamètre excédant 0^m,30, on les composait d'éléments cylindriques dont l'assemblage présentait, au lieu d'un système annulaire

un système polygonal a 16 côtés pour les appareils de 0^m,50 de diamètre (3^e ordre, petit modèle), à 20 côtés pour les appareils de 1^m,00 de diamètre (3^e ordre, grand modèle), à 24 côtés pour les appareils de 1^m,40 de diamètre (2^e ordre) et à 32 côtés pour les appareils de 1^m,84 de diamètre (1^{er} ordre)

On pouvait sans doute exécuter un système polygonal catadioptrique par les procédés employés pour le système polygonal dioptrique mais la justesse de cette multitude de prismes à réflexion, dont la position ne pouvait être exactement réglée que sur place, eût présenté une complication inadmissible.

Il fallait, pour la solution pratique du problème, que le moulage et la taille des grandes pièces de verre fussent de nouveaux progrès.

Un fabricant de glaces de Newcastle, M. Cookson placé à cet égard dans une situation singulièrement favorable, à raison des moyens de tout genre que lui offrait son vaste établissement, tenta le premier, en 1836 d'exécuter au tour les tambours dioptriques de premier ordre qui, jusque-là, avaient été formés en prismes à 32 pans. Les résultats de ces premiers essais sans être pleinement satisfaisants, stimulèrent le zèle des deux artistes français qui se livraient à la fabrication des appareils lenticulaires, et bientôt nous obtinmes des tambours dioptriques de près de 2 mètres de diamètre, exécutés au tour avec une précision qui augmentait l'effet utile de cette partie principale des appareils de un quart environ.

Des lors il fut permis de reprendre, avec quelques chances de succès le projet d'exécuter sur une grande échelle les appareils catadioptriques. Toutefois la considération des dépenses d'outillage et du prix de revient était véritablement décourageante, surtout avec une perspective aussi étroite quant au placement de produits aussi chers.

Cependant l'habile ingénieur écossais chargé de la construction du phare de Scherivore, M. Alan Stevenson s'attacha avec ardeur et constance à l'idée de couronner ce monument, qui devait coûter deux millions, par le plus bel appareil d'éclairage dont l'exécution fût possible dans l'état de la science et de l'art.

Ce programme fut accueilli par la Commission des phares d'Écosse et il fut décidé que l'écueil de Scherivore serait signalé par un appareil catadioptrique de premier ordre, dont toute la partie optique serait exécutée à Paris.

Une correspondance suivie s'engagea à ce sujet entre M. Alan Stevenson et l'ingénieur secrétaire de la Commission des phares de France.

Celui-ci calcula d'abord, et fit exécuter, comme premier essai, deux

appareils catadioptriques de 1^m,00 de diamètre (3^e ordre), dont l'un soit des ateliers de M. Henri Lepaute, éclaire depuis quelques mois l'entrée du port de Gravelines, et dont l'autre, construit par M. François jeune, est destiné au phare qui s'élève à l'embouchure de l'Abervrach, sur la côte nord ouest du Finistère.

Malgré le succès complet de cette première expérience, l'exécution des anneaux réfléchissants de premier ordre se présentait toujours comme une entreprise grave et périlleuse. Aussi le secrétaire de la Commission des phares, en remettant à M. François jeune le tableau ci-joint des centres et rayons de courbures des dix neuf anneaux de verre qui devaient composer la partie catadioptrique d'un phare de premier ordre, crut-il devoir insister auprès de cet artiste pour qu'il pesât mûrement les conséquences de l'engagement qu'il allait prendre envers l'Administration des phares d'Ecosse.

M. François jeune n'hésita pas un instant. Il entreprit résolument un travail qui lui offrait de graves difficultés à vaincre dans un but de haute utilité publique.

On peut se faire une idée de ces difficultés à la seule inspection du tableau des rayons de courbure des surfaces réfléchissantes des anneaux catadioptriques, rayons qui varient de 6^m 816 à 8^m 749.

L'anneau n^o 1^{er}, auquel répond le rayon maximum, a 2 mètres de diamètre extérieur. Les deux côtés adjacents à l'angle obtus (de 117^o 26 42') ont respectivement 92^{mm},380 et 95^{mm},209 de longueur.

Les deux faces refractantes ont été supposées rectilignes dans le calcul. Mais en regard à la difficulté d'exécuter avec précision des surfaces coniques on a (suivant l'ingénieuse idée de l'inventeur) substitué aux deux génératrices rectilignes deux arcs de cercle d'égal rayon (4^m,00), en observant de les tourner en sens inverse afin que la convergence résultant de la convexité d'une face fût compensée par la divergence résultant de la concavité de l'autre face.

Chaque anneau a été composé de 4 arcs égaux.

Ces pièces ont d'abord été coulées, sous forme brute à la manufacture de Saint-Gobain, dans des moules fournis par M. François jeune.

Cette première opération a présenté des difficultés qui auraient pu décourager une volonté moins ferme et un esprit moins fertile en ressources.

Chaque anneau brut a ensuite été rodé au gres, *douci* à l'émeri et poli au rouge d'Angleterre sur un tour mù par une machine à vapeur.

On conçoit quelles précautions requerrait la bonne exécution d'une surface annulaire réfléchissante, à tailler au moyen d'un frottoir emmanché

d'une tige oscillante de 8^m,75 de longueur, et combien devaient être soigneusement étudiés les moyens d'assurer la rigidité de cette tige, ainsi que l'exactitude de position et la fixité du centre de rotation

Non-seulement ce difficile problème a été résolu avec un plein succès mais il l'a été sans tâtonnement, sans fausse manœuvre, et sans qu'on ait eu à regretter la perte d'un seul anneau cissé sur le tour

Après avoir été vérifiés par la réflexion d'une petite balle rouge placée à leur foyer, les anneaux ont été assemblés en panneaux

Pour satisfaire aux dispositions arrêtées par M Alan Stevenson M François jeune a divisé sa coupole catadioptrique en 8 fuseaux embrassant chacun 45 degrés

L'un de ces fuseaux a été mis deux fois en expérience à l'Observatoire

Illuminé par une lampe de premier ordre à quatre meches concentriques, brûlant de 670 à 700 grammes d'huile par heure, ce panneau catadioptrique présentait une barre brillante qui, d'après la moyenne de six observations d'équilibre équivalait à 140 becs de lampe de Carcel, brûlant 42 grammes d'huile par heure

La coupole catoptrique, que remplace le nouveau système, se compose ordinairement de 7 zones horizontales comprenant chacune 32 miroirs concaves. Son éclat paraît plus ou moins grand, selon que l'on se place dans la direction de l'axe ou des intervalles des miroirs, mais l'éclat moyen répondant à l'effet utile a été trouvé de 87 becs de Carcel

Ainsi donc, l'effet utile de la nouvelle coulonne est à celui de l'ancienne comme 1,61 est à 1

Il est à présumer que le même rapport existera, ou à peu près, pour la partie inférieure au tambour lenticulaire, et comme on a trouvé 46 becs pour l'éclat moyen des 4 zones inférieures de miroirs, on peut compter sur 74 becs pour l'éclat des 6 anneaux catadioptriques correspondants

L'état d'un tambour lenticulaire fixe de premier ordre, a éléments annulaires, étant d'ailleurs équivalent à 350 becs on peut resumer par le petit tableau suivant le rapprochement dont il s'agit

		ÉCLATS MESURÉS EN BECS DE CARCEL	
		1 ^{er} système	2 ^e système
1 ^o	Tambour dioptrique fixe	360 becs	360 becs
2 ^o	Partie accessoire {	87	140
		46	74
Totaux		493	574

(29)

En définitive, la substitution des anneaux prismatiques aux miroirs d'un phare fixe de premier ordre augmenterait l'éclat moyen de 81 becs, c'est-à-dire de plus de l'équivalent d'un phare de troisième ordre.

A cet accroissement d'effet de 16 $\frac{1}{2}$ pour 100 sur l'éclat total se joignent deux avantages capitaux : celui de la égale distribution de lumière, et celui de l'inaltérabilité du pouvoir réfléchissant des anneaux catadioptriques.

Bien que la question fiscale ne soit ici que secondaire, il n'est peut-être pas inutile d'en dire un mot en terminant.

Le système des onze zones de miroirs courbes d'un phare de premier ordre coûte avec les pièces accessoires 6 000 fr.

Le système catadioptrique correspondant a été soumis comme au prix de 10 000

Augmentation 14 000

Si donc on prend pour exemple un phare de premier ordre coûtant annuellement en frais d'éclairage et de service ordinaire 7 500 fr.

et qu'à cette somme on ajoute pour l'intérêt de la valeur de l'appareil d'éclairage 1 500
9 000

On trouvera que le boni ci-dessus calculé de 16 $\frac{1}{2}$ pour 100 équivaldrait à 1 485 francs somme supérieure à l'intérêt des 14 000 francs d'excédant de prix d'acquisition.

Ainsi donc, à ne considérer le nouveau système que sous le point de vue fiscal, on voit que l'augmentation d'effet utile qu'il offrirait ne serait pas acquise à trop haut prix.

PHYSIQUE APPLIQUÉE — *Appareils destinés à fixer avec précision le point de l'ébullition de l'eau dans la graduation d'un thermomètre par*
M. P. TAVERNIER (de la Nièvre)

(Commissaires MM. Babinet, Regnault)

Depuis plusieurs mois je m'occupe de la détermination *exacte* du point de 100 degrés en appelant ainsi la température nécessaire pour donner à la vapeur d'eau distillée une force élastique égale à la pression normale de 0^m 76 de mercure à 0 degré.

C'est en partant de cette définition, donnée par M. Babinet que j'ai monté deux appareils que je désire décrire à l'Académie.

Le premier de ces appareils consiste en un bouilleur métallique surmonté d'un tube vertical de même nature, coudé à sa partie supérieure et ajusté à un long tube de cristal horizontal, terminé, soit par une pomme d'arrosoir, soit par un bouchon qui le ferme imparfaitement.

Dans le bouilleur, j'ai mis de l'eau ordinaire, dans le tube horizontal, j'ai disposé le thermomètre destiné à devenir un thermomètre étalon, lequel est parfaitement calibré, et divisé dans toute sa longueur en millimètres, dans ce même tube de cristal, j'ai placé des manomètres remplis d'eau distillée et recourbés à angle droit, de manière à faire plonger leur branche libre, également divisée en millimètres, dans des tubes beaucoup plus larges, de même longueur, et contenant seulement quelques centimètres d'eau. Cet appareil ainsi disposé, le bouilleur a été chauffé dessus et dessous, et voici ce que j'ai observé. La vapeur, en se dégageant, remplit le tube de cristal, élève la température des objets qu'il renferme, et, bientôt, l'eau distillée des manomètres passe à l'état de vapeur et déprime l'eau contenue dans les vases qui servent de manchon, le thermomètre étalon que l'on veut régler marque un certain nombre de divisions et, correction faite du baromètre et de la température du lieu où l'on opère, ainsi que de la hauteur en plus ou en moins dans les branches verticales des manomètres, on devrait avoir la température qui correspond à la force élastique de la vapeur des manomètres, eh bien, il n'en est pas ainsi! De nombreux essais m'ont prouvé que diverses circonstances influent de manière à empêcher que les résultats fussent identiques.

De ces diverses expériences, j'ai cru pouvoir conclure

1° Que la température de vapeur d'eau qui parcourt un vase cylindrique n'est pas la même dans toute sa masse, qu'elle est plus chaude dans la direction de l'axe, que le rayonnement l'abaisse auprès des parois du vase, enfin, que cette température est un peu plus élevée à l'extrémité du tube par laquelle la vapeur entre, qu'à celle par laquelle elle sort.

2° La vapeur, en se refroidissant dans les tubes des manomètres et dans l'eau avec laquelle elle se trouve en contact, produit, par sa précipitation, un mouvement oscillatoire qui peut rendre incertaine la hauteur vraie de la colonne.

Ce procédé, théoriquement, promettait une exactitude plus grande dans la mesure de la pression supportée par la vapeur des manomètres, et, par conséquent, dans la mesure de la température à laquelle ils étaient soumis ainsi que l'étalon, que le procédé suivant, dans lequel les manomètres sont faits avec du mercure, et, bien que cette exactitude fût dans le rapport

inverse de la densité des deux liquides dont je viens de parler, je me suis vu forcé d'abandonner ce premier appareil

Celui auquel je me suis arrêté consiste en un tube en cristal de 0^m,05 de largeur et de 0^m,70 de longueur, à l'une des extrémités duquel je place deux manomètres à deux branches verticales divisées, terminés par une tige horizontale qui traverse le bouchon et communique avec l'air intérieur. La branche verticale fermée de chaque manomètre est remplie de mercure et contient, dans sa partie supérieure, une petite quantité d'eau distillée

Pour l'autre extrémité, j'introduis mon étalon de manière que son réservoir soit entre deux manomètres, et ne touche pas aux parois du tube, je dispose les divisions de manière à ce que la lecture se fasse facilement, je remplis aux quatre cinquièmes le grand tube avec de l'eau, et je le ferme avec un bouchon qui ne laisse qu'une petite ouverture supérieure

L'appareil, suspendu par des fils métalliques, est placé au-dessus de fourneaux qui le chauffent dans toute son étendue, et portent le liquide à l'ébullition. Alors l'eau distillée des manomètres passe à l'état de vapeur, déprime le mercure de l'une des branches, et le fait monter dans l'autre jusqu'à ce que son poids, ajouté à celui de l'atmosphère, fasse équilibre à la force de ressort de cette vapeur. Dans cet état maximum, je lis la hauteur du mercure dans la deuxième branche du manomètre, le nombre de millimètres auquel est parvenu le mercure de mon étalon, puis, connaissant la pression atmosphérique marquée par le baromètre, toute correction faite, le calcul me donne immédiatement la température de la vapeur d'eau du manomètre, en prenant pour exacte la détermination de 27 millimètres, pour force élastique par degré. De là je conclus à la température qui fait monter mon thermomètre jusqu'à telle division, ainsi qu'au point de 100 degrés où il aurait été, si la pression eût été celle de 0^m,76 exactement

Avec cet étalon, que je mets sous les yeux de l'Académie, ainsi qu'avec les thermomètres que j'ai mis en expérience à l'Observatoire, je me propose de déterminer si 27 millimètres est le nombre exact qui représente la variation de la force élastique de la vapeur d'eau par degré, près du point de 100 degrés. Ce nouveau travail sera pour moi le sujet d'une communication ultérieure, j'y emploierai les plus grands étalons et ferai les lectures avec le plus grand soin. L'accord du point de 100 degrés, déterminé par plusieurs expériences sur le même étalon à une petite fraction de degré, me donne la certitude d'atteindre à une fixation définitive de ce nombre fondamental pour les petites corrections qui résultent d'une pression différente de la pression normale

PHYSIOLOGIE VÉGÉTALE — Réponse à quelques observations critiques de
M Dutrochet (*Comptes rendus*, t XVII, p 1085), par M PAYER

(Commission précédemment nommée)

• Dans l'une des précédentes séances, M Dutrochet a présenté quelques observations relatives à nos *Mémoires sur l'influence de la lumière sur les tiges et les racines des plantes*, la célébrité de son nom, qui est resté pendant longtemps attaché à l'un des plus curieux phénomènes de la physiologie végétale, et le lieu dans lequel elles ont été produites, leur donnent trop d'importance pour que nous n'essuyions pas d'y répondre en peu de mots

• Nos expériences se divisent naturellement en trois grandes classes, selon qu'elles ont eu pour objet d'étude 1° l'influence de la lumière blanche, 2° celle de la lumière transmise par des verres de couleur, 3° celle enfin des différents rayons du spectre solaire

• I Les expériences de la première catégorie notamment celles qui avaient pour but de prouver que ce n'était pas la transpiration plus grande du côté que venait la lumière, qui produisait la courbure de la tige vers elle, puisque cette inflexion avait également lieu dans l'eau, M Dutrochet les a-t-il répétées? Il n'en parle en aucune façon, mais il paraît naturel de penser qu'il en a reconnu l'exactitude puisqu'il abandonne aujourd'hui la théorie dont elles démontraient le peu de fondement, pour lui en substituer une autre

• II Il est beaucoup plus explicite sur celle de la seconde catégorie, il a fait germer du cresson alenois sous des verres rouges, et ses résultats sont en tous points conformes aux nôtres. Pourquoi donc, en présence de ces preuves de la réalité de nos observations, jeter le doute sur celles de la troisième catégorie, qu'il n'a pu répéter? Après avoir vérifié la plus grande partie de nos expériences, n'était-il pas naturel, au contraire, de croire que les autres étaient également exactes?

III A la fin de notre premier travail, nous avons discuté les diverses opinions émises successivement pour expliquer le phénomène de la tendance des tiges vers la lumière, et si nous n'avons point parlé de celle qui l'attribuait à l'influence du *pouvoir éclairant*, c'est que nous l'avons considérée comme suffisamment réfutée par M Adolphe Brongniart, dans une Note fort remarquable placée à la suite d'une Lettre de M Morren, sur un sujet analogue. M Dutrochet ayant repris cette ancienne théorie, et ayant cherché

à appuyer par de nouvelles expériences, nous avons eu besoin répéter ces dernières, et le résultat de cet examen nous eût convaincu davantage en core, s'il eût été possible, que les verres de couleur ne peuvent servir en aucune façon pour arriver à des faits comparables

En effet, 1° il peut se faire qu'un verre rouge, par exemple, laisse passer une si petite quantité de lumière blanche qu'elle soit insensible pour notre œil, dans lequel les sensations se succèdent mais ne s'ajoutent pas, tandis qu'elle peut influer pourvu que le terme de son action se prolonge suffisamment, sur une plante ou les effets de cette action, quelque petits qu'ils soient, s'ajoutent de manière à produire un effet total visible, bien que tous les effets partiels dont il se compose ne le soient point

2° Nos yeux ne sont pas tous également sensibles pour apprécier de petites quantités de lumière, et tout le monde sait que la ou tel n'y voit plus, tel autre peut encore se diriger

3° Enfin, comme on apprécie ces petites quantités de lumière d'autant mieux qu'on est dans une chambre plus obscure, il est évident qu'il sera plus difficile de reconnaître une petite quantité de lumière blanche transmise par un verre rouge qui laisse passer beaucoup de cette lumière rouge, que celle transmise par un verre rouge plus foncé, qui laisse passer très-peu de cette lumière rouge, et pourtant nous met dans une obscurité plus complète.

Ces difficultés presque insurmontables que l'on rencontre dans l'analyse des verres de couleur jointes à l'hétérogénéité des matières colorantes et d'une foule d'autres circonstances qu'on ne peut apprécier exactement et qui cependant ne peuvent être négligeables, expliquent la différence des résultats de M. Dutrochet et de ceux que nous avons obtenus en cherchant à répéter ses expériences

IV J'ai fait germer les plantes suivantes *Alisma media*, *Papaver Rhœas*, *Papaver somniferum*, *Agrostemma cœli-rosa*, *Avena flavescens*, *Agrostis laemantha*, *Spergula arvensis*, *Oethonema saxatile*, *Medicago lupulina*, dans trois boîtes éclairées au moyen la première, du verre rouge qui m'a servi à faire mes expériences précédentes la deuxième d'un autre verre rouge qui laissait passer, outre la lumière rouge, quelques-uns des rayons d'une réfrangibilité différente, la troisième enfin, d'un verre bleu beaucoup plus foncé que les deux autres

Les résultats de ces expériences furent les suivants Dans la première boîte, éclairée par une lumière rouge pure, aucune tige ne se courbe vers cette lumière dans la deuxième, éclairée par la lumière rouge légèrement

mélangee de lumière d'une autre réfrangibilité, il y en eut qui s'infléchirent et d'autres qui restèrent droites : celles qui s'inclinèrent furent *Alsiue media* (diamètre de la tige, 40 centièmes de millimètre), *Papaver Rhœas* (38 cent), *Papaver somniferum* (40 cent), *Agrostemma cœli-rosa* (50 cent), *Oethionema saxatile* (41 cent), *Medicago lupulina* (70 cent). Celles qui restèrent droites sont *Avena flavescens* (40 cent), *Agrostis laemantha* (45 cent), *Spergula arvensis* (60 cent).

Puisque l'*Avena flavescens* et l'*Agrostis laemantha* ont un diamètre bien inférieur à celui de l'*Oethionema saxatile* et du *Medicago lupulina*, et que cependant elles restent droites tandis que ces dernières se courbent, ce n'est donc pas seulement, comme le pense M. Dutrochet, la grosseur de la tige qui influe sur ces phénomènes, nous croyons contrairement à l'opinion de cet habile physiologiste, que la nature de la plante, la solidité de son tissu, sa croissance plus ou moins rapide etc., influent également sur cette faculté plus ou moins grande de se courber vers la lumière, absolument comme les différences d'élasticité que l'on observe dans des verges métalliques proviennent non-seulement de la grosseur de ces verges, mais aussi et surtout de leur nature intime.

V Si dans les expériences de M. Payer, dit M. Dutrochet, la lumière transmise par le verre violet qu'il a employé a eu moins de puissance que la lumière transmise par son verre bleu pour déterminer l'inflexion des tiges végétales, cela provient, je le pense, de ce que dans les verres qui ont servi à ses expériences il y a eu plus de lumière bleue transmise par son verre bleu qu'il n'y a eu de lumière violette transmise par son verre violet.

Il me suffit, pour répondre à cette objection, de présenter ici le verre violet à travers lequel on peut parfaitement lire, et le verre bleu qui est tellement foncé qu'on ne peut distinguer nettement les objets, et ceci détruit complètement la théorie du pouvoir éclairant.

VI M. Dutrochet prétend tirer de ses expériences et des nôtres que la propriété de fléchir les tiges appartient aux rayons extrêmes du spectre, et il ajoute : Cette propriété appartenant ainsi aux rayons colorés extrêmes du spectre solaire, il me paraît certain qu'elle doit appartenir aux rayons colorés moyens de ce spectre.

Mais est-il permis de conclure l'influence des rayons moyens du spectre de celle des rayons extrêmes, en présence des nombreuses expériences physiques de toute nature qui prouvent au contraire que les rayons de réfrangibilité différente sont également différents quant à leurs propriétés calorifiques, et chimiques, et même électriques?

VII M Dutrochet suppose que ces certaines racines fuient la lumiere, et si d'autres y restent insensibles, cela provient probablement de ce que les premieres sont tres-minces et renferment peut-être de la matiere verte tandis que les secondes sont tres-grosses et non vertes

La réponse est encore facile : voici des plantes dont les racines sont tres-greles, et qui ne fuient pas la lumiere (*Adenophora fistulosa*, 40 centimètres de millimètre de diametre), en voici d'autres dont les racines sont tres-grosses, et qui cependant la fuient (*Rhagadiolus lampanoides*, 80 cent) voilà des plantes dont les racines présentent a leur extremité une petite quantite de matiere verte et qui cependant ne fuient pas la lumiere (*Pisum sativum*), en voilà d'autres dont les racines n'en presentent point, qui y sont ties-sensibles au contraire (*Cichorium spinosum*, *Hieracium foliosum*)

C'est qu'en effet le phénomène est beaucoup plus compliqué qu'on ne le suppose, et que de longtemps encore peut-être nous ne pourrions faire la part exacte de chaque circonstance

VIII Dans son post scriptum M Dutrochet nous reproche d'avoir dit que le phénomène de la tendance des racines a fuir la lumiere avait *totallement* échappé aux recherches des physiologistes

Nous connaissions parfaitement son expérience sur le *Mirabilis jalapa*, mais, outre que ce fait ne peut entrer dans la science, puisqu'on ne peut pas le reproduire, je n'en avais nul besoin dans un Mémoire où il s'agit de la tendance de la racine à fuir la lumiere et non à se diriger vers elle

Nous n'ignorions point également ce qu'il a dit des racines du *Pothos violacea*, mais, comme le fait est connu depuis longtemps et que l'explication est toute hypothétique et à notre avis peu fondée, nous avons cru devoir lui passer sous silence, persuadé que l'Académie, et en particulier M Dutrochet, comprendrait le sentiment de convenance qui nous empêche et nous empêchera toujours de relever sinon dans nos Mémoires du moins publiquement, les quelques inexactitudes qui peuvent se rencontrer dans un beau travail, en présence surtout de cette phrase si caractéristique Les racines n'affectent ordinairement aucune tendance ni pour rechercher ni pour fuir la lumiere, et l'on peut s'en assurer en faisant développer les racines d'une plante *quelconque* dans l'eau qui remplit un vase de verre que l'on expose à la lumiere

IX Enfin cette lumiere, ajoute-t-il, comprise entre les raies F et H du spectre solaire, consiste en *une partie des rayons verts*, les rayons bleu et indigo et la moitié environ des rayons violets

Évidemment cette phrase n'a pu être mise que par inadvertance, car

tout le monde sait, et M Dutrochet lui-même sans aucun doute que la raie F ne se trouve point dans *la partie verte du spectre*, ni même à la limite du vert et du bleu mais bien dans le commencement du bleu Et, comme toute son argumentation repose précisément sur cette erreur, je demande la permission de lui laisser le soin d'en faire lui-même une complète justice

ENTOMOLOGIE — *Remarques sur la famille des Scorpions, et description de plusieurs especes nouvelles de la collection du Muséum, par M PAUL GERVAIS* (Extrait par l'auteur)

(Commissaires, MM Duméril, Isidore Geoffroy-Saint-Hilaire, Milne Edwards)

A l'extérieur les Scorpions sont aisément distingués des trois autres groupes (Téléphones, Phrynes et Chélifères) avec lesquels on peut les comparer, par leurs yeux, leurs appendices pectinés, la prolongation caudiforme de leur abdomen et la vésicule aiguillonnée par laquelle cette prolongation se termine Il est digne de remarque que ces diverses parties soient aussi celles dont les variations, toujours spécifiques, nous ont offert les meilleures indications pour la subordination méthodique des espèces A mesure que l'on s'éloigne des premiers scorpions pour arriver à ceux que nous avons regardés comme les derniers de tout le groupe, on reconnaît en effet

1° Que la partie caudiforme d'abord volumineuse et élargie, souvent aussi fort longue, devient grêle et faible, et que sa vésicule diminue le plus souvent, dans les mêmes proportions,

2° Que les peignes sont moins longs et à dents de moins en moins nombreuses,

3° Que les yeux, au nombre de douze d'abord, puis de dix, de huit ensuite, sont réduits à six seulement dans les dernières espèces

Il semble que ces animaux perdent peu à peu les caractères distinctifs de leur propre groupe tout en conservant ceux qui sont réellement distinctifs de l'ordre auquel ils appartiennent

Les yeux ne sauraient donc fournir, comme l'ont admis Hemprich et M Ehrenberg et d'après eux M Koch, les seuls caractères à employer dans la classification de ce groupe, et les subdivisions qu'on peut établir parmi les scorpions ne constituent point de véritables genres, comme le pensent les deux premiers de ces naturalistes Encore moins peut-on en faire des familles, comme le voudrait le dernier

* Les *Androctones* les *Centrures* et certains *Buthus* des anciens auteurs dont les yeux latéraux sont au nombre de trois paires, égaux entre eux et équidistants, les *Atrés* de M Koch, nous semblent former un premier groupe, que l'on pourra toutefois partager en trois sous-genres, suivant qu'il y a deux yeux accessoires auprès du troisième œil latéral, ou bien qu'il y en a un seulement ou qu'il n'y en a pas du tout

1° *ANDROCTONUS*, Hemp et Ehr les espèces que nous avons observées sont toutes de l'ancien monde Europe (*Scorpio occitanus*) Asie, Afrique, Madagascar et Nouvelle-Hollande (1 espèce nouvelle *Sc. curvifigitatus* *armillatus* et *madagascariensis*)

2° *CLATHRUS* Hemp et Ehr peu nombreux mais tous d'Amérique d'après les observations de MM Lhrenberg et Kock

3° *ATRIUS* Kock nombreux en espèces surtout dans le nouveau monde, quelques uns sont de l'Inde ou d'Afrique (1 espèce nouvelle *Sc. Edwardsii*, de Geier et Henrichs, voisins du *Sc. biaculeatus*, l'attribution comme lui américains, *Sc. obscurus forcipula*, Peron, *spinicaudus* et *margaritatus*)

4° *TFLEGONUS*, Kock leurs trois yeux latéraux sont petits sur une ligne courbe et très-serrés. Leurs forme, etc, les rapprochent des précédents. Exemple *Sc vittatus*, Guérin Ils sont des parties chaudes de l'Amérique (Espèce nouvelle *Sc. Ehrenbergi*)

* Le *Sc. squama*, espèce nouvelle de la Nouvelle-Hollande est intermédiaire aux *Téléphones* et aux *Buthus*

5° *BUTHUS* leur troisième œil est le plus petit et reculé, le céphalothorax est échancré en avant, la queue est médiocre et les peignes moins nombreux que dans les sous-genres précédents, mais plus que dans ceux qui suivent, d'Afrique, d'Asie et de l'Amérique septentrionale (Espèces nouvelles *Sc. Lesueurii* et *Whitei*)

* 6° *CHACTAS* deux paires d'yeux latéraux seulement, céphalothorax peu ou point échancré, queue moyenne, peignes peu denticulés d'Amérique (Espèces nouvelles *Sc. Vanbenedeni* et *granosus*)

7° *SCORPIUS*, Hemp et Ehr deux paires d'yeux latéraux, mains aplaties, céphalothorax un peu échancré, queue grêle, peu de dents aux peignes, de l'Inde et du périphe méditerranéen (Espèce nouvelle *Sc. Hardwickii*)

* 8° *ISCHNURUS*, Kock trois paires d'yeux latéraux, tout à fait marginaux, forme des précédents, d'Afrique, de l'Inde et de l'Amérique septentrionale (Espèces nouvelles *Sc. elatus*, *Cumingu*, *Waigiensis* et *Trichiurus*)

* Les *Ischnurus* sont les scorpions les plus rapprochés des *Téléphones* qui

nous paraissent former, dans la classification méthodique, la famille suivant immédiatement celle de ces animaux

La famille des Scorpions est la première ou la plus élevée en organisation dans l'ordre auquel elle appartient »

M TREUTIER adresse, de Berlin, la description et la figure d'un *telegraphe de nuit* inventé par son père Il croit que l'industrie pourra faire d'utiles applications de ce système de signaux, et, par exemple, qu'on s'en servirait avec avantage pour les avertissements que peut exiger la sûreté des transports par chemins de fer

Cette Note est renvoyée à l'examen de la Commission qui avait été nommée pour le système de télégraphie nocturne proposé par M S Vilallongue

M VANDER PANT adresse une Note relative à un moyen qu'il a imaginé pour empêcher un train de wagons marchant sur un *chemin de fer* de se carter de la voie

(Commission des chemins de fer)

M DITTMAR envoie de Geneve un Supplément à sa Notice sur un *Appareil de sauvetage destiné pour les cas d'incendie*

(Renvoi à la Commission précédemment nommée)

M DE GEMINI soumet au jugement de l'Académie un Mémoire sur le *mode de transmission de la peste*, et sur la génération des maladies en général

(Commission des quarantaines)

Un autre Mémoire du même auteur est relatif à la *direction des aérostats*

CORRESPONDANCE

M BRAUTEMPS-BEAUPRE présente, au nom de M le *Ministre de la Marine*, le dernier volume du *Voyage autour du Monde*, fait par ordre du Roi, sur les corvettes *l'Uranie* et *la Physicienne*, pendant les années 1817 à 1820, par M de Freycinet Ce volume comprend les observations de magnétisme terrestre faites dans le cours de l'expédition (voir au *Bulletin bibliographique*)

M le **PRÉFET DE LA SEINE** annonce que l'inauguration de la statue de *Mohers* aura lieu le 15 de ce mois MM les membres de l'Institut recevront, chacun en particulier, une invitation pour assister à cette cérémonie

M le **DIRECTEUR DES DOUANES** écrit que, conformément à la demande qui lui en a été adressée, une caisse venant d'Angleterre, et contenant un buste de *James Watt* destiné à l'Académie des Sciences, ne sera point sujette à la visite à son arrivée au port, et sera transmise pour être ouverte seulement à Paris

PHYSIQUE — *Recherches sur les températures des divers rayons lumineux qui composent le spectre solaire, par M. MELLONI*

On connaît les vicissitudes qu'ont éprouvées les notions admises par les physiciens sur la distribution de la chaleur dans le spectre solaire. L'analyse de Newton fit penser d'abord que les rayons diversement colorés et réfringibles, dont la lumière blanche se compose, possédaient des degrés de chaleur proportionnels à leurs intensités ou *forces éclairantes*. Cette manière de voir parut confirmée par les expériences de Landriani, Rochon, Sennebier, qui donnerent la plus haute température dans la bande la plus éclairée du spectre, c'est-à-dire dans le jaune, ou le commencement de l'orange. L'opinion changea lorsque Heischel fit paraître ses belles observations héliothermiques d'où il déduisit 1° qu'il existait des rayons calorifiques obscurs au delà de l'extrémité rouge ou inférieure du spectre solaire, 2° que le maximum de température se trouvait parmi ses rayons, tout près de ladite extrémité inférieure. Malus et Bérard répétèrent plus tard les expériences d'Heischel en présence de Berthollet, et confirmèrent les faits observés par le célèbre astronome allemand en ce qui regarde l'existence de la chaleur moins réfrangible que le rouge, mais ils ne tombèrent pas d'accord avec lui sur la position du *maximum* de température qui leur parut décidément sur la limite même du spectre, et non dans l'espace obscur adjacent. Leslie, Englefield, Wunsch, Ritter, Davy, Ruhland, entreprirent aussi des recherches analogues, et vinrent appuyer tantôt l'un, tantôt l'autre de ces résultats.

Il était difficile de croire que les expériences d'un si grand nombre de physiciens, et de physiciens si habiles, fussent entachées d'erreur, il était difficile de supposer, en d'autres termes, que chacun d'eux n'eût réellement

obtenu le résultat annoncé d'où provenaient donc les différences? Seebeck montra qu'elles étaient dues à l'action de diverses substances diaphanes qui composaient le prisme avec lequel on décomposait le rayon solaire. Effectivement, en étudiant la marche comparative du thermomètre sur des spectres fournis par des prismes d'eau, d'acide sulfurique, d'alcool, de crown glass et de flint glass, M. Seebeck observa que le *maximum* se trouvait sur le jaune pour le prisme d'eau, sur l'orange pour l'alcool et l'acide sulfurique, dans la position voulue par Malus et Bérard en se servant d'un prisme de crown glass ou de certaines espèces de flint glass, et dans la zone indiquée par les expériences de Herschel si l'on employait un prisme de flint glass anglais.

Maintenant on demandera pourquoi des substances incolores ne produisant aucune variation dans les intensités relatives des éléments lumineux donnent de si grandes différences à l'égard de la chaleur. Voilà précisément la question que je tâchai de résoudre il y a une douzaine d'années par une série d'expériences dont les premiers résultats furent communiqués à l'Académie par l'entremise de M. Arago, et imprimés ensuite dans les *Annales de Chimie et de Physique* de Paris pour l'année 1832. Ayant pris les températures des principales bandes colorées d'un spectre fourni par un prisme de crown-glass, et verifié que le *maximum* de température y était à l'extrémité du rouge, j'continuai à exploiter au moyen du thermo-multiplicateur rectiligne, la distribution de la chaleur au delà de cette extrémité, et je notai les six bandes intérieures de chaleur obscure isothermes aux six couleurs supérieures du spectre, puis j'interposai une couche d'eau de 0^m 00/3 d'épaisseur renfermée entre deux lames parallèles de verre, de manière que les rayons émergents du prisme fussent transmis au travers de cette couche dans une direction qui ne s'écartait pas beaucoup de la perpendiculaire, et je mesurai de nouveau les températures des bandes obscures et lumineuses. Je les trouvai tellement altérées que quelques unes avaient été totalement détruites, d'autres s'étaient affaiblies d'une quantité plus ou moins grande, on en trouvait enfin qui n'avaient subi qu'une diminution à peine appréciable. La zone qui avait éprouvé la destruction totale était la moins réfrangible, c'est-à-dire la bande isotherme du violet, de là la perte devenait de moins en moins prononcée à mesure que l'on s'approchait de la bande rouge, elle diminuait encore sur le rouge, l'orangé et une partie du jaune, après quoi les rapports des températures initiales se conservaient à peu près constants jusqu'à la limite violette supérieure.

Cette action inégale exercée par l'eau sur les diverses bandes du spectre devait évidemment déplacer le *maximum* de température et le faire marcher

vers les rayons plus réfractes, puisque les bandes les moins réfrangibles que nous appelons, pour abrégé, *bandes inférieures*, éprouvaient une perte beaucoup plus forte que les bandes les plus réfrangibles ou supérieures. C'est aussi ce qui advint car le maximum de chaleur passa de la dernière limite du rouge à la partie supérieure du violet. Cette expérience prouvait incontestablement que la chaleur répandue dans les différentes parties du spectre solaire n'est pas un agent homogène.

Frappe de la haute portée que me paraissait avoir ce fait nouveau, relativement au flux de chaleur rayonnante, j'entrepris des recherches étendues sur les propriétés des radiations calorifiques en général et je fus conduit ainsi à une découverte qui me paraît devoir changer complètement les idées reçues sur la nature des rayons de chaleur obscure. Je veux parler du pouvoir que possède le sel gemme de transmettre ces rayons dans la même proportion que la lumière calorifique ou la chaleur lumineuse, quelle que soit d'ailleurs la qualité ou la température des sources rayonnantes.

Dans toutes les expériences analogues exécutées jusqu'alors sur des corps diaphanes incolores, solides ou liquides, on avait trouvé la quantité de chaleur immédiatement transmise d'autant plus faible que la température de la source était moins élevée. Cependant cette quantité de chaleur immédiatement transmise ne commençait à devenir bien appréciable qu'avec l'oppression de la lumière. De là l'opinion que la chaleur obscure se transformait graduellement en radiation lumineuse que l'on croyait de tout autre nature. On comprend que le seul fait d'une substance diaphane incolore telle que le sel gemme transmettant également bien toute sorte de rayons lumineux ou obscurs, devait renverser de fond en comble ces hypothèses et suggérer une manière de voir plus conforme à la vérité. Dans le cours de mes recherches je me convainquis, en effet, que l'hétérogénéité observée dans la chaleur solaire existait aussi dans les flux de chaleur provenant des sources terrestres lumineuses ou obscures que je trouvais composées d'éléments calorifiques divers, tantôt coexistants, tantôt séparés, et totalement analogues aux différents rayons colorés qui composent la lumière. Ces éléments étaient tous transmis abondamment et en proportions à peu près égales par les couches très-minces de verre, d'eau, d'alcool, et traversaient en proportions très-différentes les couches épaisses de ces mêmes corps, de plus, des quantités égales de chaleur émergente des couches de diverse nature passaient en quantité si différente par une lame donnée d'une substance diaphane incolore que certains rayons étaient entièrement transmis, d'autres complètement absorbés. En combinant ces données avec la notion de la transmission cou-

stante du sel gemme pour toute sorte de rayonnements, directs ou modifiés, pendant leur passage au travers des milieux diathermiques, je crus pouvoir en conclure hardiment que le verre, l'eau, le cristal de roche, et généralement tous les corps diaphanes et incolores, étaient thermochimiques, c'est-à-dire qu'ils agissent sur les rayons calorifiques comme le font les milieux colorés sur la lumière

A lors la question de la distribution des températures dans le spectre solaire se présenta sous son véritable point de vue. On trouverait certainement absurde le procédé de celui qui voudrait comparer les intensités relatives des éléments lumineux séparés par les différences de réfraction d'un prisme de verre fortement coloré en bleu par l'oxyde de cobalt, ou doué de toute autre coloration énergétique. C'était tout juste l'œuvre qu'on avait accomplie jusqu'alors en étudiant la distribution de la chaleur sur les spectres donnés par les prismes ordinaires de crown-glass, de flint, d'eau, d'alcool et d'autres substances incolores. Pour avoir les véritables températures des zones prismatiques, lumineuses ou obscures, il fallut évidemment décomposer le rayon solaire avec le prisme de sel gemme, qui, étant également perméable à toute espèce de radiation calorifique constituant, pour ne pas sortir de notre comparaison, le verre blanc de la chaleur. Je ne manquai pas de faire cette expérience capitale, et je trouvai que le *maximum* de température, dans ce spectre normal existait réellement dans l'espace obscur, non pas au contact de la limite rouge, comme l'avait observé Herschel père avec son prisme de flint-glass, mais tout à fait détaché des couleurs, à une *distance moyenne* égale à celle qui existe, en sens contraire, entre le rouge et le jaune.

» Je dis que la décomposition des rayonnements calorifiques effectués moyennant un prisme de verre, d'eau, d'alcool ou d'autre matière analogue, est entièrement faussée par la force absorbante du prisme qui, éteignant certains éléments de chaleur, transmet le reste du flux rayonnant dans un état de composition toute différente de celle qui existait avant l'incidence. Cette proposition, dont l'exactitude ne saurait laisser l'ombre du doute dans l'esprit des personnes qui connaissent l'ensemble de mes expériences sur la transmission calorifique, peut se démontrer directement de la manière suivante.

» Décomposons d'abord le rayon solaire par le prisme de sel gemme, et interposons ensuite sur le passage de la radiation prismatique une couche de matière limpide et incolore. D'après nos idées sur l'hétérogénéité des éléments qui composent les flux de chaleur rayonnante, et sur l'absorption élective

exercée par la substance interposée, il est clair que nous devons obtenir des effets semblables à ceux que l'on avait observés sur les spectres fournis par des prismes de verre, d'eau et autres substances analogues, avant la connaissance du pouvoir diathermique constant du sel gemme. Effectivement, je fis passer mon spectre calorifique normal par une plaque assez épaisse de flint-glass le *maximum* de température se rapprocha un peu de la bande rouge, en se maintenant toujours dans l'espace obscur. Je remplaçai le flint par du verre ordinaire le *maximum* pénétra dans le rouge. Je substituai enfin l'eau à l'alcool, et le *maximum* passa au commencement du jaune. Or, à cause de la limpidité des milieux traversés, les couleurs n'éprouvaient aucune altération sensible et le *maximum* restait toujours invariablement fixé au commencement du jaune.

Ainsi les bandes inférieures du spectre peuvent conserver les mêmes rapports d'intensité lumineuse et perdre les relations qui existent entre leurs températures. Les éléments calorifiques ne suivent donc pas le sort des éléments lumineux correspondants. Donc la lumière et la chaleur sont deux agents différents ou deux modifications essentiellement distinctes d'un seul agent.

« Cette argumentation contre le *principe de l'identité* serait sans réplique, si l'on était bien certain qu'à chaque point du spectre correspond un rayon doué d'un seul degré de réfrangibilité, et que plusieurs rayons d'espèces différentes ne s'y trouvent pas superposés. Or la séparation complète des éléments qui composent le rayon solaire par voie de réfraction est une limite que nous ne pouvons jamais atteindre, mathématiquement parlant, néanmoins, si l'on se place en des circonstances favorables, il n'y a nul doute qu'on ne parvienne à séparer assez les rayons pour que chaque ligne ou bande mince du spectre solaire soit sensiblement formée d'éléments doués d'un seul degré de réfrangibilité (1). Newton en a donné de beaux exemples dans ses admirables

(1) Il faut remarquer toutefois que si, au moyen de la force réfringente d'un prisme diaphane et incolore, on parvient à séparer les éléments de la radiation solaire au point que chaque bande mince du spectre puisse être considérée comme formée par une seule espèce de rayons, il est absolument impossible de placer, par cette même force de réfraction, les divers éléments lumineux dans des circonstances identiques. En effet, deux éléments d'une nuance fort rapprochée, c'est à-dire deux éléments différant très-peu dans l'ordre de la réfrangibilité, devront s'écarter et diverger d'autant plus en traversant le prisme, qu'ils appartiendront à un groupe de rayons plus réfrangible, en sorte que les zones supérieures du spectre auront évidemment une densité moindre que les zones inférieures. Le spectre newtonien ne saurait

expériences sur l'analyse de la lumière, mais les physiciens qui ont analysé la chaleur solaire ont-ils réellement opéré sur des rayons homogènes dans chaque bande du spectre? La question est vitale pour le *principe de l'identité*, car si le rouge, l'orange et le jaune, au lieu d'être purs, contenaient des rayons calorifiques obscurs, il serait possible que les changements de température observés dérivassent de l'absorption plus ou moins grande exercée sur ces derniers rayons et non sur ceux qui constituent les couleurs, et que, par conséquent, malgré les apparences contraires, les actions calorifiques des bandes inférieures fussent réellement inattaquables par les substances diaphanes incolores, comme cela doit être effectivement si l'on admet que la chaleur et la lumière dérivent des mêmes radiations élémentaires dans toute l'étendue des couleurs newtoniennes.

C'est effectivement ce que je crois avoir prouvé dans un Mémoire que j'ai lu dernièrement à l'Académie royale des Sciences de Naples, Mémoire dont les principaux résultats avaient été sommairement annoncés à la cin-

que fournir des données exactes sur les rapports des *pouvoirs éclairants* que possèdent les divers rayons colorés qui entrent dans la composition de la lumière solaire. Pour obtenir ces rapports, le professeur Massotti a soumis aux concours qui concourent à la formation des spectres fournis par les réseaux — où les couleurs élémentaires s'étalent les unes à côté des autres en vertu de la simple interférence, et occupent ainsi des espaces dépendant uniquement de leur période vibratoire, ou longueur d'ondulation. Dans ces spectres, exempts du défaut signalé ci-dessus, M. Massotti a trouvé le point le plus clair au beau milieu du jaune, qui est lui-même placé à égale distance des deux extrêmes — il a trouvé, de plus, que l'intensité lumineuse décroît régulièrement et également des deux côtés, en sorte que la limite rouge et la limite violette sont les points les moins éclairés du spectre, et possèdent tous les deux la même intensité lumineuse. M. Massotti a démontré, enfin, que les couleurs de ces deux limites sont constituées par des ondes éthérées dont les longueurs respectives ont entre elles le rapport remarquable de 2 à 1. Ces beaux résultats, communiqués par l'auteur au dernier Congrès des savants italiens, furent accueillis par de vifs applaudissements. Les physiciens en apprécièrent au premier coup d'œil toute l'importance, je me permettrai seulement d'ajouter qu'ils s'accordent parfaitement bien avec le principe que j'ai émis dernièrement sur les diverses *consonnances et dissonances* de la retine par rapport aux périodes vibratoires de l'éther (voir la *Bibliothèque universelle de Genève*, avril et mai 1862). D'après ce principe, la vision serait un véritable phénomène de *résonnance* qui, à cause des limites de tension propres aux molécules nerveuses de la retine, n'aurait lieu qu'en vertu d'un certain groupe d'ondulations éthérées. Le spectre contiendrait une série d'ondulations beaucoup plus étendue que celle des couleurs, en deçà du rouge, on trouverait des ondulations plus longues, au delà du violet, des ondulations plus courtes — du reste, excepté la longueur, ces ondulations ne présenteraient aucune différence de constitution avec les ondulations lumineuses. Les ondulations

quatrième réunion des savants italiens (1). A mon avis, les résultats obtenus par Seebeck et les physiciens qui l'ont précédé et suivi, relativement à la position différente que le *maximum* de température occupe dans le spectre solaire ne sont pas simples mais composés. Ce *maximum* fut trouvé tantôt dans le rouge, tantôt dans l'orange et tantôt dans le jaune parce que les diverses substances incolores qui constituent le prisme absorbaient en proportions plus ou moins grandes certains rayons de chaleur obscure mêlés aux bandes inférieures du spectre par la méthode defective employée.

Afin de montrer à l'Académie comment je suis parvenu à cette conclusion si importante pour la *théorie de l'identité* je vais rapporter les conclusions insérées à la fin de mon Mémoire.

Concluons que tout en admettant l'exactitude des résultats obtenus par Seebeck, Wunsch, Davy, Ingfield et autres physiciens qui se sont occupés avant nous de la distribution de la chaleur dans les spectres solaires fournis par des prismes de différentes substances incolores on ne saurait adopter les conséquences qu'on a cru devoir en tirer, c'est à dire la position du

placés hors des deux limites visibles du spectre seraient obscures, parce qu'elles ne pourraient développer aucun mouvement vibratoire sur la rétine, parce qu'elles manqueraient, en d'autres termes d'être en phase avec l'élasticité de l'éther. L'ondulation jaune, au contraire, serait la plus lumineuse de toutes parce qu'elle imprimerait aux molécules nerveuses de la rétine le mouvement vibratoire le plus énergique en vertu de son accord parfait avec la tension moléculaire de cette membrane de l'œil. En adoptant cette manière de voir, on conçoit comment, dans le spectre solaire, l'amplitude des ondulations éthérées, leurs forces et par conséquent leurs températures peuvent continuer à augmenter du jaune au rouge et au delà tandis que l'intensité lumineuse décroît rapidement et s'éteint à l'extrémité rouge. Mais on ne comprend guère pourquoi ce décroissement ait lieu d'une manière beaucoup plus rapide qu'en allant du côté opposé c'est à dire du jaune au violet.

Maintenant, d'après le travail de M. Mussoiti nous voyons que cette différence d'intensité lumineuse existe uniquement à cause de l'inégale distribution des rayons dans le spectre solaire, et qu'on ne le retrouve plus dans les spectres des réseaux où les rayons sont distribués d'une manière uniforme.

L'élasticité de la lumière est donc plus forte dans le centre jaune de l'usage normale où se trouve l'ondulation douce de la période vibratoire la plus convenable à la tension moléculaire de la rétine. De là elle décroît également d'un et de l'autre côté jusqu'au point où les pulsations des ondulations éthérées deviennent trop rapides ou trop lentes pour exciter aucun mouvement de résonnance dans les molécules de la rétine.

(1) Ce Mémoire paraîtra sous peu dans le *Compte rendu des séances de l'Académie des Sciences de Naples*, et dans la *Bibliothèque universelle de Genève*.

maximum d'intensité calorifique ne peut et ne doit être relative qu'à une seule série de radiations élémentaires développées selon leurs degrés de réfrangibilité et les expériences que nous venons de rappeler donnent les chaleurs résultantes de la superposition de plusieurs séries véritable pelemêle où la force individuelle est rendue totalement méconnaissable par l'action des masses.

Pour avoir les forces échauffantes propres aux seules couleurs du spectre il était indispensable d'opérer sur un faisceau de rayons solaires beaucoup plus étroit dans le sens de la normale à l'axe du prisme, que ceux employés par nos prédécesseurs il fallait aussi mesurer les températures des rayons élémentaires à une certaine distance dépendante de la largeur du prisme il fallait enfin avoir recours à un corps thermoscopique occupant une bande longitudinale suffisamment resserree du spectre. Ces deux premières conditions, singulièrement négligées par tous les physiciens qui ont étudié jusqu'ici la chaleur dans le spectre solaire ressortaient évidemment des expériences si précises de Newton sur la décomposition de la lumière. Quant à la troisième personne ne semblait avoir remarqué avant nous que dans certains spectres *la position du maximum de chaleur était hors de la zone où l'on trouvait expérimentalement la température plus élevée, lorsque le volume du corps thermoscopique employé atteignait certaines dimensions* et que ces dimensions ont été dépassées dans plusieurs expériences de nos devanciers.

Nous avons tâché d'éviter toutes ces causes d'erreur et alors les températures des couleurs prismatiques se sont montrées d'un caractère opposé à celui qu'on leur avait attribué d'abord car on avait cru qu'elles changent leurs relations mutuelles d'intensité au point de faire passer le *maximum* de l'une à l'autre couleur par l'action de diverses substances diaphanes incolores nous les avons vues, au contraire maintenir constamment la plus haute température à l'extrémité du rouge, quelle que fût la qualité de la substance incolore employée sous forme de prisme afin de décomposer le rayon solaire dans ses radiations élémentaires ou sous forme de lame pour explorer l'action absorbante du corps sur ces diverses radiations.

En employant des milieux qui ne soient plus parfaitement limpides mais réduits à un certain degré d'opacité par la présence d'une matière brune attaquant indistinctement toutes les couleurs du spectre purifié, nous verrons dans un second Mémoire, ces couleurs si intimement liées à leurs températures que, pendant la transmission, elles perdront précisé-

ment autant de chaleur que de lumière en sorte que le rapport entre ces deux agents restera toujours inaltérable Il est presque superflu d'ajouter que nous verrons ces memes teintes purifiées du spectre se réfléchir et se diffuser et se polariser en perdant la meme proportion de l'un et de l'autre agent

Ainsi les radiations lumineuses, dégagées de toute autre radiation heterogene, ont une chaleur propre qui suit exactement les memes vicissitudes de maniere que les diverses phases d'un rayon donné de *lumière simple* peuvent se mesurer indistinctement par ses rapports lumineux ou calorifiques

Cependant l'expérience nous a appris que les différences d'intensité calorifique et lumineuse observées par nos devanciers dans la partie inferieure du spectre solaire dérivait de l'absorption des milieux incolores sur les rayons obscurs decouverts par Herschel pere au dela de la limite rouge Nous rassemblerons dans le Mémoire indiqué tantôt, les faits divers qui se rapportent à ces rayons que nous trouverons donc d'une thermocroûte tout a fait analogue à celle des rayons calorifiques terrestres possédant tous les caracteres de la coloration proprement dite, soit dans la radiation elle-même soit dans la matiere pondérable On sait, d'autre part que la chaleur obscure d'Herschel est soumise aux memes lois générales de propagation de réflexion de transmission et de polarisation qui régissent les mouvements de la lumière

La visibilité est donc la seule propriété qui distingue dans le spectre solaire les elements chauds et lumineux de ceux qui sont simplement doués d'une action calorifique. Mais nous avons remarqué ailleurs que la propriété d'éclairer n'a qu'une importance tout a fait secondaire par rapport au flux rayonnant, car on trouve des personnes qui ne voient point le violet extreme du spectre d'autres qui confondent le rouge extreme avec le bleu ou le vert Or un rayon ne saurait etre en meme temps bleu, vert et rouge, visible et invisible La faculté d'agir ou de ne point agir sur l'œil est donc tout a fait extrinseque, accidentelle entièrement due à la structure particulière de l'homme et de certaines classes d'animaux, elle ne saurait donc établir en aucune maniere une difference caracteristique entre les deux agents.

Dont les radiations lumineuses de Newton ne diffèrent des radiations obscures d'Herschel que par des propriétés spécifiques totalement semblables à celles qui distinguent entre eux les éléments de la lumière, c'est-à-dire qu'entre un rayon lumineux du spectre et un rayon de la chaleur

obscur placee au-dessous du rouge, on trouve precisement les memes caracteres distinctifs de deux rayons colorés

Ainsi se confirme de plus en plus l'opinion énoncée dans l'un des derniers Mémoires, savoir, que *la lumière n'est qu'une certaine série d'indications calorifiques sensibles à l'organe de la vue*, ou, *vice versa*, que les *radiations de la chaleur obscure sont de véritables RADIATIONS INVISIBLES de lumière*

ASTRONOMIE — *Sur la découverte de la variation* — Lettre de M. SEDILLOT

Le *Compte rendu des séances de l'Académie des Sciences* (t. XVII, p. 1315 et 1316) contient une nouvelle Note relative à la découverte de l'inégalité lunaire, appelée *variation*

D'après cette Note, il résulterait d'une suite d'articles insérés au *Journal des Savants* et présentant l'ensemble des découvertes qui ont été successivement faites dans la théorie de la Lune, par les observateurs grecs, arabes, européens, qui ont précédé Newton, que la circonstance astronomique décrite par Aboul-Wefa, sous le nom de *troisième inégalité lunaire*, n'est pas la *variation*, mais le mouvement oscillatoire de l'apogée, tel que Ptolémée l'a décrit et construit au chap. V du 5^e livre de l'*Almageste*, avec les mêmes éléments déterminatifs et les mêmes erreurs.

J'aurais désiré, tout le premier, que l'on fût enfin fixé sur le véritable sens du passage arabe que j'ai traduit et publié en 1836, et que la question se trouvât résolue clairement et sans appel, mais elle ne me paraît point avoir fait un seul pas, et les articles du *Journal des Savants* nous laissent dans la même incertitude qu'auparavant, pas un argument nouveau n'a été ajouté à ceux que l'on avait proposés, et les différences radicales que nous offre le chapitre V du 5^e livre de l'*Almageste* de Ptolémée, avec l'exposé d'Aboul-Wefa, ne sont nullement expliquées. Une version mot à mot faite sans intelligence du sujet, et dont la plupart des termes nécessiteraient un commentaire, conduirait bien rarement, dans quelque langue que ce fût, et surtout en matière de science, à l'expression propre et à la deduction rigoureuse de la pensée d'un auteur, ce n'est point, d'un autre côté, par des suppositions hasardees ou des appréciations incomplètes, par des interprétations forcées ou des jugements téméraires, qu'on peut réussir à dépouiller un peuple de la gloire qui lui appartient, et il est aussi impossible aujourd'hui de refuser aux travaux des Arabes le mérite réel et l'originalité qui les caractérisent, que de reconnaître ces traits distinctifs dans l'ancienne astronomie chinoise qui n'a jamais été, à proprement parler, *une astronomie*.

Remarques de M Biot sur la Lettre précédente

M Sedillot a tout droit, sans doute, d'avoir et d'exprimer son opinion sur une question d'astronomie mais il me permettra aussi d'avoir la mienne. Je n'avais pas prononcé son nom devant l'Académie, et je ne l'ai pas, non plus, fait intervenir dans les articles du *Journal des Savants* auxquels il fait allusion. Il ne peut donc s'en prendre qu'à lui-même si l'on s'aperçoit aujourd'hui qu'il était l'auteur de l'assertion que j'ai combattue. N'ayant pas attaqué personnellement M Sedillot je ne me crois pas obligé d'entrer en lutte avec lui, et je m'en réfère aux démonstrations que j'ai rapportées pour justifier mon sentiment. Mais, au lieu de mettre seulement l'opinion en balance, M Sedillot pourrait chercher à l'appuyer d'autorités qui seraient bien plus décisives. Je n'étais pas seul membre de la Commission que l'Académie avait désignée et qui a cru devoir abandonner la question à la libre controverse des recherches particulières. MM Arago et Foucault en faisaient partie comme moi. Il y a encore, dans l'Académie, d'autres astronomes et d'autres géomètres, qui pourraient porter sur ce sujet des lumières fort supérieures aux miennes. Que M Sedillot tienne à persuader à quelqu'un d'entre eux que le passage cité d'Aboul Wéti constitue réellement *la variation*, et qu'il détermine ce géomètre, ou cet astronome à soutenir cette opinion comme sienne. Alors, sans doute, je devrais accepter la discussion pour défendre mon sentiment ou l'abandonner. Jusqu'à présent, je me bornerai à dire que j'y persiste.

PHYSIQUE DU GLOBE. — *Note sur la coïncidence des secousses de tremblement de terre, en haute Normandie et en Bretagne, avec l'alteration momentanée de la limpidité des eaux au puits artésien de Grenelle, par M F LEFORT, ingénieur des Ponts et Chaussées, attaché au service des eaux de Paris*

On sait que les eaux du puits artésien de Grenelle après avoir charrié longtemps, et avec abondance, des sables et des argiles, ont fini par acquiescer une grande limpidité. Néanmoins, des troubles accidentels s'y manifestent encore, et comme rien, jusqu'à ce jour, n'a permis de prévoir le retour de ces alternatives, qui se produisent brusquement et disparaissent de même, il a été nécessaire de prendre quelques précautions pour empêcher que les conduites de distribution ne vinssent à s'engorger par l'introduction d'une masse considérable de sable.

Mettant à profit une idée émise par M. Mary, chef du service auquel je suis attaché, j'ai projeté, et j'ai fait exécuter sous mes yeux un appareil qui interdit l'accès des sables dans les tuyaux de conduite, en opposant à cet accident la cause même qui le produit. Il me suffira de dire, pour l'objet de cette Note, que l'eau, à sa sortie du tube ascensionnel, est reçue dans une cuvette concentrique à ce tube, et équilibrée par des contre-poids. Des orifices placés à la partie supérieure de la cuvette projettent l'eau dans un bassin qui porte une soupape de distribution, et une bonde de fond et de superficie. Quand les sables arrivent mêlés à l'eau, par delà certaines proportions prévues d'avance dans le règlement de l'appareil, l'excès de poids acquis doit par la masse liquide fait descendre la cuvette et décrocher la soupape. L'eau, n'ayant plus d'issue par la conduite de distribution s'élève dans le bassin et se rend à la décharge par la bonde de superficie. Cet appareil dispense de maintenir constamment un agent sur les lieux pour faire les manœuvres que l'altération des eaux rendrait nécessaires, et il exécute lui-même ces manœuvres avec plus de sûreté et d'à-propos.

Les rapports de mon service me mettant à même d'être exactement informé des variations importantes qui surviennent dans la distribution, je me suis proposé de profiter de l'appareil pour vérifier, c'est-à-dire pour constater ou pour contredire un fait que j'avais déjà cru observer il y a huit à neuf mois, le fait de la coïncidence de secousses de tremblement de terre dans la haute Normandie et de la Bretagne, avec l'altération momentanée dans la limpidité des eaux amenées par la colonne ascendante.

Où, voici ce que portait le bulletin de service à la date du lundi 25 décembre, je le transcris textuellement :

Puits artésien — L'eau ayant monté une grande quantité de sable et de vase pendant la nuit de samedi à dimanche (du 23 au 24), la cuvette s'était abaissée et avait fait fermer la soupape de la conduite de distribution. — Hier soir (24) l'eau était revenue claire et ne montait plus que très-peu de sable.

Des lors j'ai lu les journaux avec un scrupule tout particulier. Dans le *Journal des Débats* du 31 décembre, j'ai trouvé ce qui suit :

Phare de Cherbourg, le 28 décembre — Une secousse de tremblement de terre a été ressentie ici, vendredi 22 décembre, à quatre heures moins quelques minutes de l'après-midi, on s'en est à peine aperçu dans l'intérieur de la ville, mais elle a été très-forte dans tout le quartier des Mielles et à Touilleville, etc.

On écrit de Saint-Malo, que le même jour, à la même heure, une se-

cousse de tremblement de terre s'est fait sentir aux environs de Saint Malo. Plusieurs habitants de la commune de Paramé ont rapporté que leurs maisons avaient été ébranlées, etc.

Je suis loin de vouloir tirer une conclusion scientifique d'un rapprochement de faits observés depuis si peu de temps et en si petit nombre. J'ai désiré seulement appeler l'attention des observateurs sur un sujet que je crois nouveau, et qui me semble propre à ajouter quelques lumières à celles que nous possédons déjà sur la constitution physique de la couche corticale du globe terrestre.

Si la matière ne paraît pas indigne d'intéresser l'Académie, je m'empres-
serai de lui signaler les nouveaux faits qui pourraient parvenir à ma connais-
sance »

MINÉRALOGIE — *Doutes relativement à l'existence d'un gisement de mercure dans le département de l'Aveyron* — Lettre de M. MARCHE DE SPERRES

Lorsque j'ai lu dans les journaux quotidiens l'annonce pompeuse qu'ils ont faite d'une mine de mercure natif au milieu des calcaires de l'Aveyron, les doutes les plus graves se sont élevés dans mon esprit. Ces doutes ne se sont point portés sur la réalité de l'existence des gouttelettes de mercure natif au milieu des roches secondaires de ce département, mais seulement sur la possibilité d'en tirer parti et d'en faire l'objet d'une exploitation profitable.

Les Mémoires que j'ai publiés sur le mercure et le calomel natif de Montpellier m'ont inspiré le désir de savoir si mes prévisions étaient fondées. Je me suis donc adressé aux personnes les plus instruites de Saint-Paul-des-Fonts afin d'obtenir des enseignements précis à cet égard, et je vais monsieur le Secrétaire perpétuel transcrire exactement les données qui m'ont été fournies. On me permettra toutefois de taire les noms de ceux à qui je les dois. On en concevra facilement le motif.

Il y a quarante ans, m'écrit une personne qui, par son rang et par son instruction, mérite toute confiance, que j'habite Saint-Paul-des-Fonts en qualité de... et je n'ai entendu parler de mercure que cette année. Il y a peu de temps que M. Boulomié, encore substitué de M. le procureur du roi de Rodez, vint dans cette commune, accompagné d'un professeur de Toulouse qui avait eu quelque éveil relativement à ce métal. Ils furent visiter les lieux où l'on prétendait en avoir vu, mais tout s'est borné à cet égard à des oui-dire qui n'avaient aucun fondement.

Quelques jours après cette visite nous avons eu celle de M le vicomte de Pignon pendre de M le receveur général de l'Aveyron, qui accompagné d'un de ses mis est venu faire de nouvelles recherches. Elles n'ont pas été plus heureuses que les premières tout s'est borné à des recommandations adressées à l'instituteur de la commune. On l'a engagé à pratiquer quelques ouvertures aux endroits qu'on lui a indiqués. On lui a encore recommandé de recueillir le mercure avec des soucoupes de le collecter dans des bouteilles et de s'assurer si ce métal reparaîtrait de nouveau.

Ces messieurs ont dit à notre instituteur que quelque petite que fût la quantité de mercure qu'il parviendrait à recueillir ils feraient de toutes les dépenses nécessaires à cette exploitation. Ces recommandations n'ont pas été suivies de résultats. Personne n'en a vu la moindre gouttelette. Si on présentait toutefois je ne manquerai pas de vous en informer.

Si ces renseignements ne suffisaient pas pour laisser peu d'espoir sur la possibilité d'utiliser le mercure natif que l'on suppose exister dans la commune de Saint-Paul-des-Fonts en voici d'autres qui sont encore plus explicites.

Je m'empresse, monsieur, de vous donner les renseignements que vous me demandez sur le prétendu gîte de mercure de l'Aveyron. Ce que je sais à cet égard est fort peu de chose. ma visite officielle des lieux ne m'a rien appris si ce n'est qu'on a fait beaucoup de bruit pour une chose qui n'en vaut pas la peine du moins quant à présent.

Il y a déjà bien des années qu'on a reconnu que les marnes bitumineuses liassiques dont est formé le sol des petites vallées de Tournemire de Roquefort, de Saint-Paul-des-Fonts laissent échapper à de très rares intervalles de petites quantités de mercure natif. C'est à la constatation de ce fait bien connu que se borne la découverte dont les journaux ont tant parlé. C'est aussi le seul résultat que j'ai obtenu de ma dernière excursion. On m'avait bien annoncé la présence du cinabre aux environs de Roquefort mais il n'en existe pas du moins je n'en ai point vu en sorte que jusqu'à preuve contraire je ne crois pas du tout à l'existence d'un gisement de mercure dans la localité indiquée.

En général les mines de ce métal sont ouvertes dans les terrains du groupe carbonifère et surtout dans le gres rouge où le minerai est ordinairement en amas. On les trouve quelquefois dans des terrains plus anciens comme, par exemple à Almaden.

Tout cela n'est pas sans doute une raison pour qu'on n'en découvre pas

« un jour dans des terrains d'âge plus récent mais tant que je ne l'aurai pas vu de mes propres yeux, je ne considérerai le fait annoncé, au sujet du mercure natif de l'Aveyron, que comme une singularité minéralogique sans aucune importance industrielle »

Il me paraît donc utile de désabuser ceux qui, dans l'espoir d'un gain considérable, se laisseraient aller aux illusions que pourraient leur faire naître des spéculateurs avides. En effet, le mercure natif de Saint-Paul-des-Fonts ne saurait être utilisé. Il en est ainsi de tous les minerais de ce métal qui sont enfouis au milieu des roches meubles ou des roches fissurées, et qui ont été produits par une véritable sublimation, ou, si l'on veut, par volatilisation. Tel me paraît celui des environs de Montpellier et des marnes subapennines qui composent le sol superficiel sur lequel cette ville est bâtie.

« En supposant que la quantité que l'on pourrait en recueillir dans les environs de Saint Paul des Fonts fût plus considérable que celle qui a été découverte jusqu'à présent à Montpellier elle ne pourrait jamais permettre une exploitation régulière ni profitable. Les globules de mercure y sont trop divisés et disséminés sur des espaces trop étendus pour pouvoir être recueillis de manière à être utilisés »

Aussi avons-nous repoussé toute idée de recherches dans nos terrains superficiels, quelque facilité qu'ils puissent présenter pour leur fouille et ce que nous avons fait à leur égard, nous croyons devoir engager les industriels à en faire de même pour ceux de l'Aveyron. En effet, les formations tertiaires des environs de Montpellier semblent beaucoup plus riches sous le rapport de la quantité de mercure qu'elles renferment que les couches secondaires de l'Aveyron, par conséquent, les recherches dans les premières pourraient avoir un résultat plus avantageux.

Les grands travaux entrepris de toutes parts pour les chemins de fer de Cette et de Nîmes viennent de prouver combien le mercure natif, accumulé quelquefois sur des points peu spacieux, est rare dans les terrains qui le recèlent, lorsqu'on les fouille sur une grande échelle. Il en serait tout autrement si l'on venait à découvrir ce métal avec le sulfure de mercure, ou avec d'autres minerais du même genre.

Il est difficile de l'espérer dans les terrains subapennins des environs de Montpellier, et même dans les formations liassiennes de l'Aveyron. Sans doute le mercure qui se montre ainsi volatilisé dans des formations bien anciennes est une circonstance que la science doit enregistrer dans ses annales mais quelque intérêt qu'elle puisse avoir pour l'histoire physique du globe,

on ne doit pas perdre de vue qu'elle est sans importance pour les arts et l'industrie »

MÉCANIQUE APPLIQUÉE — *Lettre de M FAULCON relative à la réclamation qu'il avait adressée dans la séance du 2 janvier 1844*

Après avoir lu dans un journal un extrait de la communication de M Séguier à l'occasion de perfectionnements à apporter au mode d'action des locomotives j'avais été frappé de la similitude de position qui existe entre les roues horizontales qu'il propose, et celles que j'ai fait breveter le 15 février 1841

Un examen attentif de la Note entière me porte à reconnaître que bien que mes roues motrices fonctionnent dans la même position, leur mode d'action est différent les roues dentées décrites dans mon brevet, engrenent sur les côtes des deux rails actuels disposés en crémaillères celles que M Séguier propose, complètement lisses et cramponnées à l'aide de ressorts sur un rail additionnel, prennent leur adhérence dans cette seule compression

Je reconnais donc que le mode de traction indiqué par M Séguier dans sa Note n'a, avec celui décrit dans mon brevet, de commun que la position horizontale des roues

MÉTÉOROLOGIE — *Sur une aurore boréale observée le 8 décembre 1843 à Paimë* — Lettre de M COLLA à M Aïago

Avant hier, 8 décembre, entre 5^h 40^m et 6^h 50^m du soir (temps vrai civil) j'ai observé une faible aurore boréale, qui a été accompagnée et suivie par une très forte perturbation magnétique

L'aurore boréale consistait en un segment de cercle de couleur rougeâtre mais fumeux, situé à l'horizon entre le nord-est et l'ouest-nord-ouest et dont l'elevation, dans la partie plus convexe, pouvait être de 6 à 7 degrés. De ce segment, dans la direction du méridien astronomique occupé par les principales étoiles de la grande Ourse partait une colonne lumineuse de teinte jaunâtre qui se tendait vers la région méridionale du ciel, en traversant quelques moments après sa formation, la queue du Dragon partie de la petite Ourse, Cassiopée, Andromède et les Poissons, et une demi-heure après la queue Persée, le Triangle, le Bélier et la Baleine. Cette colonne lumineuse, à son origine, avait une largeur d'environ 4 degrés et à la partie opposée, vers le sud, elle a varié de 6 jusqu'à 10 degrés

Ce que j'ai remarqué de singulier dans les apparences de cette colonne c'est qu'elle présentait la plus grande intensité lumineuse à environ 20 degrés d'élévation du côté du nord et à son extrémité méridionale en proximité de l'horizon. Outre cela, j'ai observé dans la partie qui occupait le milieu de sa longueur, des interruptions en forme de petites bandes obscures parallèles entre elles, dirigées de l'est à l'ouest, qui se succédaient à de très-courts intervalles, en conservant presque toujours les mêmes dimensions. Les étoiles qui étaient enveloppées par la colonne étaient pâles et moins scintillantes que les autres situées dans leur voisinage, et j'ai remarqué que les premières brillaient toutes d'une lumière orangée. y compris les étoiles γ , δ d'Andromède, α du Bélier et β de la Baleine dont la couleur ordinairement est rougeâtre.

» Outre les apparences ci-dessus signalées, à 6^h 25^m, on vit tout à coup vers le midi, entre la constellation de la Baleine et les plumes de Mars et Jupiter, des taches blanches et globuleuses qui après une immobilité de quelques minutes se dirigèrent avec un mouvement très-sensible vers le sud-est et s'effacèrent presque simultanément avant d'atteindre l'horizon. Une autre tache blanche qui avait la forme d'une comète, et qui parut presque au même instant que les précédentes, dans le voisinage de l'étoile γ de Pégase, se porta avec une vitesse considérable vers le sud, et s'évanouit entre les deux étoiles β , η de la Baleine. Ces apparences ne durèrent, en totalité, qu'un quart d'heure.

» A 6^h 45^m la colonne lumineuse commença à s'affaiblir et à perdre sa forme régulière, et cinq minutes après elle disparut entièrement. Le segment lui-même s'évanouit, et à 6^h 50^m on ne voyait plus dans le ciel aucune trace du phénomène.

Pendant cette aurore boréale, je vis une seule étoile filante vers l'ouest et je ne pus obtenir que des faibles signes d'électricité avec l'électromètre atmosphérique de Volta, placée à la partie plus élevée de l'observatoire. A 6 heures, la hauteur du baromètre ramenée à 0 degré était = 27^p 11^l, 8, le thermomètre, exposé au nord, marquait + 5°, 4 Réaumur, et l'hygromètre à cheveu 93 degrés. A 9 heures les valeurs étaient = 28^p 0^l, 0, + 3°, 6 et 96 degrés. L'anémomètre, pendant toute la journée, jusqu'à minuit, a indiqué un vent d'est. Quant à l'état du ciel, il demeura constamment serein pendant toute la durée du phénomène, à l'exception de l'horizon, qui dans toute son étendue et à la hauteur de 2 à 3 degrés, était voilé par une zone de vapeurs grisâtres qui ne s'effacèrent qu'à vers la naissance du jour suivant. Ces va-

peurs il ne faut pas les confondre avec celles qui composent le segment, car ces dernières étaient fumeuses et colorées en rouge

J'ai dit que cette aurore boréale a été accompagnée et suivie par une forte perturbation magnétique. En voici les valeurs, que j'ai observées dans la déclinaison, avec un appareil très sensible qui donne les variations jusqu'à une seconde, en arc. Je dois signaler que l'état moyen de l'instrument entre 5 et 11 heures du soir pendant cette saison est environ $17^{\circ}13'$ ouest

(Temps vrai civil)

4 ^h 0 ^m S	17° 14' 12	7 ^h 34 ^m S	17° 12' 0"	9 ^h 30 ^m 0 ^s S	16° 59' 10
5 0	17 13 50	7 43	17 12 28	9 35 0	17 0 0
5 40	17 18 0	7 54	17 12 0	9 40 0	17 0 8
5 50	17 15 20	8 11	17 11 14	9 41 0	17 0 30
6 0	17 15 5	8 35	17 4 9 0	9 42 0	17 1 0
6 7	17 15 3	9 0	17 10 30	9 43 0	17 1 28
6 15	17 14 56	9 10	17 9 10	9 44 0	17 1 56
6 30	17 4 45	9 15	17 7 50	9 44 30	17 2 0
6 36	17 13 0	9 17	17 6 0	9 45 0	17 2 10
6 50	17 12 10	9 19	17 4 0	9 50 0	17 4 20
6 58	17 10 40	9 20	17 4 20	9 52 0	17 4 30
7 0	17 10 30	9 21	17 3 0	10 0 0	17 6 0
7 3	17 10 0	9 22	17 1 40	10 15 0	17 7 0
7 7	17 10 20	9 23	17 1 0	10 35 0	17 11 54
7 11	17 10 42	9 24	17 0 20	10 37 0	17 12 0
7 14	17 10 30	9 25	17 0 8	10 50 0	17 13 0
7 23	17 11 50	9 27	17 0 0	11 40 0	17 13 0
7 27	17 12 0	9 29	16 58 0	12 0 0	17 13 0

Hier soir entre 8 et 9 heures, l'aiguille a donné encore des signes de perturbation ayant varié de $8^h 5^m$ à $8^h 15^m$ depuis $17^{\circ}9'$ 0 jusqu'à $17^{\circ}12'$ 0. Aujourd'hui même les variations sont très-irrégulières (*) »

ASTRONOMIE — *Elements paraboliques de la comète découverte le 22 novembre 1843 par M. Faye* (Extrait d'une Lettre de M. PLANTAMOUR à M. Arago)

Il ne m'a été possible d'observer que deux fois jusqu'à présent la nou-

(*) Pendant cette année j'ai vu encore des traces d'aurore boréale les soirs du 13 mars et du 17 octobre, avec perturbations magnétiques.

velle comète découverte par M Faye, soit à cause d'un brouillard épais qui regne presque constamment depuis quinze jours dans le fond de notre vallée soit à cause du clair de lune. Les deux positions apparentes de la comète que j'ai observées sont

Temps moyen à Genève	Ascension droite	Déclinaison
Decembre 3,4735	5 ^h 19 ^m 51 ^s 02	+ 4° 54' 28,5
9,3134	5 17 1 89	+ 4 5 49,1

En joignant à ces deux positions celle qui a été observée à Paris le 24 novembre, j'ai calculé les éléments paraboliques de l'orbite pour lesquels j'ai trouvé les valeurs suivantes

Passage au périhélie 1843 septembre	7,8340 t m à Genève
Distance périhélie	2,30064
Longitude du périhélie	45° 1 17,0 } rapporte à l'équinoxe moyen
Longitude du nœud	223 0 42,0 } du 1 ^{er} janvier 1844
Inclinaison	19 47 24 0
Mouvement	direct

» Ces valeurs des éléments ne peuvent être regardées que comme des résultats approximatifs, à cause de la circonstance défavorable que présente la petitesse du mouvement apparent de la comète, ainsi, les erreurs que ces éléments donnent sur le lieu de la comète dans la seconde observation sont de — 1 47,5 en longitude, et de + 3 44 en latitude

En admettant cependant, comme je crois qu'on peut le faire, que ces éléments ne s'écartent pas considérablement de la vérité, on peut conclure

1° Que cette comète est nouvelle,

2° Que son orbite est remarquable par la grandeur de la distance périhélie, en sorte que la même année aura vu paraître deux comètes qui, sous ce point de vue, occupent à peu près les deux extrêmes,

3° Que la comète a dû être en opposition environ le 10^{ème}, 65

» Je suis très impatient que le temps me permette de faire de nouvelles observations, à l'aide desquelles je puisse vérifier et corriger les éléments que j'ai l'honneur de vous envoyer

Eléments paraboliques de la même comète, calculés par M VALS

Passage au périhélie, 1843, septembre	10,977 t m de Marseille
Distance périhélie	1,7132
Longitude du périhélie	30° 8'
Longitude du nœud ascendant	217 55
Inclinaison	125 20
Mouvement	direct.

(On remarquera que ces éléments diffèrent assez sensiblement de ceux de M. Plantamour. J'ajouterai que M. Faye n'a pas réussi jusqu'ici à représenter convenablement les observations par une orbite parabolique. Ce jeune astronome attend que l'état du ciel lui ait permis d'obtenir une nouvelle position de l'astre qu'il a découvert, pour entreprendre la détermination des éléments elliptiques)

M. DENIDOFF transmet le tableau des *observations météorologiques* faites par ses soins, à Nyné-Tagulsk (Oural), pendant les mois de juillet, août et septembre 1843

M. CHAUSSENOI écrit relativement à des *appareils de sûreté* qu'il a imaginés pour prévenir les *explosions des chaudières à vapeur*, et dont il a, depuis plusieurs années, entretenu l'Académie. Il annonce que depuis l'époque de ces premières communications, ses appareils ont été adoptés par plusieurs industriels qui emploient, comme moteurs, des machines à vapeur et que l'expérience a complètement justifié les espérances qu'il en avait conçues. Il prie en conséquence l'Académie de vouloir bien se faire faire un Rapport sur cette invention.

(Renvoi à la Commission des Arts insalubres)

M. JOBARD annonce que le musée de l'Industrie de Bruxelles possède depuis longtemps le modèle d'une *ecluse* qui se ferme et s'ouvre, comme celle qu'a proposée M. Fourneyron par l'effort même des eaux dont l'écluse est destinée à régler le cours. Il ajoute que plusieurs écluses de cette espèce existent en Hollande, il en cite une en particulier qui a été construite par le général Goblet, aujourd'hui ministre.

M. ARAGO remarque que ces faits étaient connus de l'Académie, devant laquelle ils ont été discutés à l'occasion de la dernière élection pour la place vacante dans la Section de Mécanique. M. Jobard paraît ne pas bien connaître les particularités qui distinguent l'écluse de M. Fourneyron de celle que le général Goblet a fait construire.

M. CHEVALLEY DE RIVAZ, médecin de l'ambassade de Naples, adresse, relativement à la dernière *eruption de l'Etna*, quelques détails qui n'ajoutent aucun fait important à ceux qui avaient été déjà connus par la voie des journaux.

M. LÉNA, au moment de partir pour la Chine, écrit dans le but de faire remarquer que déjà, en 1841, il avait imprimé qu'il serait possible d'exécuter

des piles puissantes, avec du charbon et du zinc M Itier demande si le travail de M Bunsen est antérieur au sien

M REGNAULT fait remarquer que la proposition d'employer le charbon comme élément de la pile est beaucoup plus ancienne il pense qu'elle a été faite pour la première fois par M Cheuvreuse, professeur de chimie à l'École de l'artillerie et du génie de Metz auquel on doit des recherches importantes sur les propriétés physico-chimiques du charbon On trouve en effet, dans son Mémoire inséré dans le tome XXIX des *Annales de Chimie et de Physique*, année 1825 page 440 la phrase suivante

Des applications découlent naturellement de ces observations

1° C'est qu'il serait possible de composer des piles qui présenteraient de l'économie et de la supériorité sur celles qui sont en usage, en remplaçant le cuivre par les charbons des hauts fourneaux, et par d'autres qui auraient été exposés à une température élevée

M MILLER propose l'emploi d'une nouvelle *ligne trigonométrique*, et annonce l'envoi d'un Mémoire plus développé sur ce sujet On attendra le Mémoire annoncé pour soumettre à l'examen d'une Commission l'idée de M Miller

M DURAND adresse une Note sur un appareil qu'il propose d'établir dans les observations pour marquer, à chaque instant de la journée et en l'absence d'un observateur, la *direction des vents*

M PASSOT demande si les diverses communications qu'il a adressées à l'Académie relativement à sa *turbine*, faisaient partie des pièces admises au concours pour le prix de mécanique de 1842 pièces parmi lesquelles MM les Commissaires qui ont été chargés de les examiner, n'ont rien trouvé qui parût mériter le prix

Cette Lettre est renvoyée à l'examen de la Commission qui a fait le Rapport lu dans la séance du 26 décembre 1843

M DELPON écrit relativement à deux Notes qu'il a adressées en novembre dernier à M le Ministre de l'Intérieur, et qu'il croit avoir été renvoyées à l'examen de l'Académie Ces Notes sont relatives à la *cause des explosions des chaudières à vapeur*

L'Académie accepte le dépôt de trois *paquets cachetés* présentés par M FERMONT, par M JOBERT, de l'amballe, et par M MARGUERITE

L'Académie se forme en comité secret à 5 heures

A

BULLETIN BIBLIOGRAPHIQUE

l'Académie a reçu, dans cette séance, les ouvrages dont voici les titres

Comptes rendus hebdomadaires des séances de l'Académie royale des Sciences
1^{er} semestre 1844, n^o 1^{er}, in-4^o

Voyage autour du Monde, fait par ordre du Roi, sur les corvettes l'Uranie et la Physicienne, pendant les années 1817-1820, publié sous les auspices de M l'amiral DUPERRÉ; par M DE FRÉYCINET Magnétisme terrestre, 1842, in-4^o

Annales de la Chirurgie française et étrangère, décembre 1843, in-8^o

Voyages de la Commission scientifique du Nord en Scandinavie, en Laponie, au Spitzberg et aux Féroé, sous la direction de M GAIMARD, 14^e livr., in-fol
Un Hivernage scientifique en Laponie, par M MARTINS, broch in-8^o (Extr de la Revue indépendante)

Mémoire sur le mouvement propre du Système solaire dans l'espace, par M BRAVAIS, broch in-4^o (Extr du *Journal de Mathématiques pures et appliquées*)

Œuvres complètes de BERNARD PALISSY, édition conforme aux textes originaux imprimés du vivant de l'auteur, avec des Notes et une Notice historique, par M. P.-A. CAP, 1 vol in-12

Types de chaque famille et des principaux genres des Plantes croissant spontanément en France, par M F PLÉE, 1^{re} livr., in-4^o

Observations et réflexions sur l'Intoxication miasmatique, par M E BERGULUS, in-8^o

Technologie de la Garance, par M GIRARDIN Rouen, in-8^o

Annales de la Société royale d'Horticulture de Paris, décembre 1843, in-8^o

Annales de la Société entomologique de France, 2^e série, tome 1^{re}, 3^e trimestre 1843, in-8^o

Journal de Chimie médicale, de Pharmacie et de Toxicologie, janvier 1844, in-8^o

Journal d'Agriculture pratique et de Jardinage, décembre 1843, in-8^o

La Clinique vétérinaire, janvier 1844, in-8^o

Journal de Médecine, janvier 1844, in-8^o

Bericht über Analyse des Mémoires lus à l'Académie des Sciences de Berlin, et destinés à la publication, août, septembre et octobre 1843, in-8^o

Das Kaiserreich *L'Empire de Russie exposition statistique de sa situation agricole industrielle et commerciale*, par M DE REDEN, 1 vol in-8° Saint-Petersbourg, 1843

Allgemeine *Manuel de Statistique et de Géographie industrielle et commerciale* de M DE REDEN Saint-Petersbourg, 1843, in-8°

Die Eisenbahnen *Exposition statistico-historique des Chemins de fer de l'Allemagne*, par le même, in-8°

Theoria Syphilidis ejusque therapiae universae compendium quod pro gradu doctoris medicinae legitime capessando exaravit P HORANINOW Petropoli, 1823 in 8°

Systema pharmacodynamicum et Nomenclatura pharmacum emendata, par le même, 1829, in-12

Primæ lineæ Systematis naturæ auctore HORANINOW, 1834, in-8°

Tetractis naturæ seu Systema quadrimembre omnium naturalium par le même, 1843, in 8°

Beitrag . *Essai sur l'histoire et le traitement du Choléra épidémique* par le même Saint-Petersbourg, 1837, in 8°

Du Choléra épidémique de Saint-Petersbourg de 1831 (en russe), par le même Saint-Petersbourg, 1832, in 8°

Manuel de Minéralogie (en russe), par le même, 1835, in-8°

Manuel de Zoologie (en russe), par le même, 1837, in 8°

Eléments de Botanique (en russe), par le même, 1843, in-8°

Gazette médicale de Paris, t XII, n° 1, 1844

Gazette des Hôpitaux, t VI, n° 1 et 2

L'Echo du Monde savant, 10^e année, t IX, n° 1 et 2, in-4°

L'Expérience, n° 340, in-8°



OBSERVATIONS METEOROLOGIQUES. — JUNE 1843.

JOURS du mois	9 HEURES DU MATIN.			MIDI.			3 HEURES DU SOIR.			9 HEURES DU SOIR.			THERMOMETRE.		ETAT DU CIEL A MIDI.	VENTS A MIDI.
	BAROM. à 0°	THERM. exter.	HIGROM.	BAROM. à 0°	THERM. exter.	HIGROM.	BAROM. à 0°	THERM. exter.	HIGROM.	BAROM. à 0°	THERM. exter.	HIGROM.	MAXIMA.	MINIMA.		
1	755.20	+10.2		755.16	+10.8		755.47	+9.0		758.40	7.1		+11.1	6.5	Couvert, pluie fine	N O
2	751.18	+7.0		751.89	+7.6		762.70	+8.0		764.58	7.1		+8.2	6.9	Couvert	N N faible
3	758.20	+7.0		758.68	+7.9		768.32	+8.0		769.55	7.6		+6.9	3.1	Couvert	N O
4	758.83	+7.2		758.68	+8.1		768.31	+8.9		767.91	7.8		+6.9	6.5	Couvert	N O
5	757.25	+6.2		758.68	+8.1		765.04	+5.9		765.84	7.9		+6.9	6.2	Couvert	S O
6	758.30	+6.2		758.68	+10.5		769.24	+8.2		770.48	6.8		+11.0	6.9	Nuageux et vapeurs	O S O
7	759.61	+6.8		758.27	+7.5		764.54	+8.2		764.87	8.6		+12.7	10.3	Quelques éclaircies	O fort
8	754.57	+10.9		764.27	+12.0		764.55	+11.5		764.38	10.2		+10.7	8.8	Couvert	O
9	755.18	+9.0		764.55	+9.3		764.55	+9.4		765.88	8.1		+8.5	7.0	Couvert	N
10	755.50	+7.8		765.26	+7.9		765.04	+7.2		766.14	6.5		+6.6	1.7	Beau	E.
11	755.04	+1.8		765.29	+3.1		765.53	+2.5		770.00	0.0		+3.3	1.7	Beau	E S E
12	758.10	+3.0		765.04	+1.9		765.71	+2.5		770.04	3.9		—	4.0	Brouillard épais	S E
13	759.86	+1.4		765.04	+2.3		769.47	+1.6		775.62	2.3		+1.9	—	Conv. et, brouillard	N O
14	772.83	+1.6		772.14	+1.2		773.18	+1.6		775.62	4.3		+6.8	3.5	Couvert	S S E
15	772.03	+1.3		771.54	+0.9		770.04	+3.5		769.97	4.3		+8.8	4.0	Couvert	S O
16	769.37	+5.6		769.24	+7.2		768.35	+8.4		769.37	7.8		+9.2	4.3	Couvert	S O
17	770.00	+4.9		769.80	+8.4		769.66	+8.5		770.16	8.0		+3.7	1.3	Brouillard épais	S O
18	770.00	+4.5		769.80	+8.4		769.25	+6.0		770.42	2.2		+3.7	1.9	Conv. uniformement	S E
19	770.44	+2.0		769.88	+3.1		769.55	+3.0		770.78	2.4		+4.2	1.8	Conv. uniformement	S E
20	770.24	+1.3		769.68	+1.4		770.06	+3.2		770.78	2.4		+4.2	1.8	Conv. uniformement	S E
21	770.51	+2.4		770.27	+3.0		770.26	+3.4		771.47	1.8		+5.1	2.2	Conv. uniformement	S E
22	771.66	+1.9		770.27	+3.2		771.68	+4.3		771.78	3.3		+3.7	1.8	Conv. uniformement	S E
23	772.24	+2.8		771.80	+4.2		771.57	+4.8		771.33	4.7		+3.7	1.8	Conv. uniformement	S E
24	771.26	+2.8		771.61	+4.2		771.57	+4.8		771.33	4.7		+3.7	1.8	Conv. uniformement	S E
25	769.14	+1.9		768.08	+1.6		767.37	+8.8		770.49	7.3		+9.2	4.9	Tres nuageux, vapeurs	S E
26	769.14	+1.9		768.08	+1.6		769.30	+1.7		770.34	2.2		+2.4	1.2	Conv. uniformement	S
27	771.04	+3.4		770.08	+4.5		770.54	+5.4		771.02	4.6		+5.2	2.0	Conv. uniformement	S
28	771.39	+4.8		771.21	+4.9		770.76	+5.4		770.67	5.0		+5.9	4.2	Conv. uniformement	S
29	769.27	+3.3		769.10	+2.9		768.49	+2.3		768.06	0.6		+3.2	0.7	Conv. uniformement	S
30	769.27	+2.2		768.21	+2.4		764.34	0.0		764.86	0.6		+0.9	0.2	Conv. uniformement	S
31	761.93	+0.2		760.99	+2.0		760.13	+2.7		758.37	0.5		+3.0	1.6	Conv. uniformement	S
1	765.48	+7.9		765.32	+8.7		765.12	+8.2		765.71	7.5		+9.6	6.7	Moy du 1 ^{er} au 10	Pour les courbes
2	769.89	+2.0		769.76	+3.1		769.27	+3.3		769.75	2.2		+3.9	6.7	Moy du 11 au 20	Cour 1.017
3	769.12	+2.5		769.03	+3.5		768.63	+3.8		768.57	2.9		+4.3	1.6	Moy du 21 au 31	Terr 0.910
	768.35	+4.1		768.07	+5.1		767.71	+5.0		768.03	4.2		+5.9	2.9	Moyenne du mois	+ 4.74

COMPTE RENDU

DES SÉANCES

DE L'ACADÉMIE DES SCIENCES.

SEANCE DU LUNDI 15 JANVIER 1844

PRÉSIDENCE DE M. CHARLES DUPIN

MEMOIRES ET COMMUNICATIONS

DES MEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE L'ACADÉMIE

PHYSIOLOGIE VÉGÉTALE. — *Replique à la Vote que M. Payer a communiqué à l'Académie dans sa dernière séance, par M. DUTROCHET*

J'ai fait part à l'Académie, dans sa séance du 13 novembre 1843, de mes observations qui prouvent que la lumière rouge n'est pas étiangère au pouvoir de déterminer l'inflexion des tiges végétales, ainsi que l'avait annoncé M. Payer, j'ai exposé ces faits avec toute la conviction que l'on doit apporter dans les discussions scientifiques. Cependant il paraît que cela a blessé vivement M. Payer qui, jeune encore, est loin d'avoir acquis cette philosophie qui apprend à voir sans colère. Je dirai plus, avec satisfaction l'exposition de la vérité, même lorsqu'elle contrarie nos opinions. J'aurais cru lui rendre un service en lui indiquant, par mes expériences, qu'il peut être bon de rechercher de nouveau si tous les rayons du spectre solaire ne seraient pas propres à produire l'inflexion des tiges végétales, mais peut-être avec une puissance différente. J'ai indiqué les précautions à prendre, dans cette recherche, pour éviter l'erreur. M. Payer me répond en dirigeant d'abord contre moi des attaques aussi vives qu'elles sont peu fondées, et qui sont

étrangeres au sujet de la discussion. Quand il en vient à cette dernière, il dit qu'il peut se faire qu'un verre rouge, par exemple, laisse passer une si petite quantité de lumière blanche qu'elle soit insensible pour notre œil — que nos yeux ne sont pas tous également sensibles pour apprécier de petites quantités de lumière, et que c'est cette lumière blanche inaperçue qui seule dans cette circonstance, produit l'inflexion des tiges végétales. Il semble ainsi vouloir insinuer que tel pouvait être le verre rouge qui a servi à mes expériences, mais ce soupçon ne peut subsister devant les expériences plusieurs fois répétées qui ont prouvé que mon verre rouge ne transmettait que les seuls rayons rouges du spectre solaire. Si ce verre eût transmis de la lumière blanche, les voies de transmission de cette lumière eussent inévitablement transmis des rayons colorés du spectre autres que les rayons rouges. Les rayons rouges du spectre transmis exclusivement par ce verre rouge formaient une image parfaitement et nettement limitée de toutes parts, même du côté où aurait dû se trouver la continuation du spectre dans l'état normal. Ainsi il n'y a pas le plus léger doute à élever sur le fait de l'inflexion des tiges végétales très-fines sous l'influence de la lumière rouge, mais ces tiges, lorsqu'elles sont plus grosses, ne s'infléchissent pas. J'ai fait observer que cette différence provenait de ce que les tiges fines avaient plus de flexibilité que les tiges plus grosses, en sorte que c'est à cette flexibilité seule que j'ai attribué la facilité plus ou moins grande de l'inflexion de ces tiges, il s'ensuit implicitement et nécessairement que toute autre cause qui influera sur la flexibilité des tiges influera, *ipso facto*, sur la facilité de leur inflexion sous l'influence de la lumière, toutefois je n'ai point exprimé cette dernière vérité qui découlait de la première. M. Payer en a conclu que je l'avais niée, puisqu'il dit qu'il croit, *contrairement à mon opinion* que la nature de la plante, la solidité de son tissu, sa croissance plus ou moins rapide, sont des conditions autres que le degré de grosseur qui influent sur la facilité d'inflexion des tiges vers la lumière, prenant ainsi la non-expression d'une vérité pour sa négation de ma part, négation qui serait une absurdité.

Voici un autre exemple de la manière de raisonner de M. Payer. Je lui avais reproché d'avoir dit qu'avant lui le phénomène de la tendance des racines à fuir la lumière avait *totalement échappé* aux recherches des physiologistes, et je lui avais cité une observation à moi, déjà ancienne, sur le même phénomène. M. Payer répond à cela qu'il n'ignorait point mon observation, et que s'il l'a passée sous silence, c'est parce que *le fait est connu depuis longtemps et que l'explication que j'en donne est toute hypothétique et a son*

avis peu fondée J'avoue ne pas comprendre comment ces raisons ont empêché M. Payer de reconnaître que le fait de la tendance des racines à fuir la lumière avait été au moins une fois, observé avant lui, qu'il n'avait pas totalement échappé aux recherches des physiologistes. En présence d'une pareille logique, je dois m'abstenir de toute polémique avec M. Payer. Je ne répondrai donc point à la majeure partie de sa Note. Je me bornerai à repousser la plus vive de ses attaques, celle qu'il dirige contre ma théorie touchant les causes de l'inflexion des caudex végétaux sous l'influence de la lumière.

Dès le début de sa Note M. Payer me fait l'honneur de me dire que mon nom est resté longtemps attaché à l'un des plus curieux phénomènes de la physiologie végétale. C'est de l'influence de la lumière sur les végétaux pour produire leur inflexion qu'il s'agit ici. Ceci est une manière de me dire très-explicitement que mon nom a cessé d'être attaché à ce phénomène et effectivement il expose immédiatement après comme quoi il a réfuté ma théorie par des expériences qui avaient pour but de prouver que ce n'était pas la transpiration plus grande, du côté que venait la lumière, qui produisait la courbure de la tige vers elle, puisque cette inflexion avait également lieu dans l'eau. M. Dutrochet les a-t-il répétées? ajoute-t-il, il n'en parle à aucun façon, mais il paraît naturel de penser qu'il en a reconnu l'exactitude, puisqu'il abandonne aujourd'hui la théorie dont elles démontraient le jeu de fondement, pour lui en substituer une autre.

Je commence par déclarer que je n'ai jamais eu l'idée d'abandonner ma théorie pour lui en substituer une autre et que rien de ce que j'ai écrit ne peut faire supposer cette intention de ma part. Je ne sais sur quoi M. Payer fonde cette assertion. Il me paraît qu'il ne connaît que très-imparfaitement ma théorie, qu'il prétend avoir réfutée. Ce n'est pas seulement l'inflexion des caudex végétaux vers la lumière que je fais dépendre et seulement en partie de l'excès de transpiration qui est provoquée sur l'un de leurs côtés par l'influence de la lumière, c'est aussi l'inflexion de ces mêmes caudex dans le sens opposé ou pour fuir la lumière. J'ai fait voir comment ces deux effets opposés résultent de la même cause lorsqu'elle agit sur des tissus végétaux qui offrent des dispositions organiques inverses. Enfin dans ma théorie de l'inflexion des caudex végétaux sous l'influence de la lumière, je fais intervenir l'action du tissu fibreux qui, lorsqu'il est très-jeune, possède une action d'incurvation sous l'influence de l'oxygénation que provoque chez lui l'action de la lumière. J'ai démontré cette action du jeune tissu fibreux dans mes expériences sur le sommeil des plantes, sommeil dont ce tissu fibreux est l'agent

J'ai pu, cette action étant démontrée, la faire intervenir, comme seconde cause, dans l'explication du phénomène de l'inflexion des caudex végétaux sous l'influence de la lumière

J'aborde actuellement l'examen de la réfutation que M. Payer a prétendu donner de ma théorie et d'abord je réponds à la question qu'il m'adresse avec tant d'autorité savoir, *si j'ai répété ses expériences* sur les végétaux plongés dans l'eau et qui s'infléchissent cependant vers la lumière. A cette question je réponds qu'il y a vingt deux ans j'ai publié des expériences qui prouvent que certains caudex végétaux, plongés dans l'eau se fléchissent vers la lumière. La priorité de ce genre d'expériences m'appartient donc je n'aurais pas besoin de celles de M. Payer pour m'éclairer sur cet objet. Or je n'ai point conclu de ces faits comme le conclut ce jeune observateur que l'immersion des végétaux fut un obstacle à ce que leur transpiration continuât d'exister et pût être augmentée par l'influence de la lumière. Tous les physiologistes savent que la transpiration des êtres vivants est le résultat d'une *action expulsive* ou d'une *exhalation*, laquelle ne cesse point d'avoir lieu lorsque l'être vivant fait pour vivre dans l'air est plongé dans l'eau. Cette *exhalation* ne cesse point d'être influencée par les causes qui peuvent l'augmenter ou la diminuer. La lumière conserve donc son pouvoir d'augmenter l'exhalation aqueuse chez les végétaux malgré leur submersion elle conserve donc par conséquent, son pouvoir de produire leur inflexion. Ainsi la réfutation que M. Payer prétend faire de ma théorie est fondée en entier sur une grave erreur physiologique comment d'ailleurs a-t-il pu supposer que j'aurais été assez aveugle pour ne pas voir que mes propres expériences auraient contredit ma théorie si il eût été vrai que la transpiration des végétaux n'existât pas lorsqu'ils sont plongés dans l'eau? Croit-il par hasard, que les poissons et les autres animaux qui vivent dans l'eau ne transpirent pas comme il le croit pour les végétaux submergés?

M. ARAGO met sous les yeux de l'Académie, un buste en marbre de *James Watt*, exécuté d'après le marbre original de Chantrey, et dont le fils de l'illustre ingénieur fait hommage à l'Académie

L'Académie arrête que le nom du donateur sera gravé sur le pedestal.

RAPPORTS

ZOOLOGIE — *Rapport sur une série de Mémoires de M. ARMAND DE QUATREFAGES, relatifs à l'organisation de divers animaux sans vertèbres des côtes de la Manche*

(Commissaires, MM. Dumeril, Isid. Geoffroy Saint-Hilaire, Milne Edwards, rapporteur)

Les zoologistes, dans leurs travaux de recherches, suivent deux voies principales : les uns s'appliquent à compléter le grand catalogue des êtres vivants, à mettre en évidence les signes extérieurs à l'aide desquels les espèces peuvent être distinguées entre elles, et à grouper celles-ci de façon à en rendre l'étude plus facile et plus fructueuse, les autres, voulant pénétrer plus profondément les secrets de la nature, s'adonnant de préférence aux investigations anatomiques et physiologiques, cherchent à voir comment la vie se considère sous le double rapport de ses manifestations et de ses instruments, se modifie chez les divers animaux, et dirigent leurs observations vers les points qui semblent les plus propres à jeter quelque lumière sur les lois de l'organisation animale. Les travaux de l'école descriptive sont d'une utilité évidente, on peut même dire qu'ils sont indispensables à l'existence de l'histoire naturelle ; mais les résultats qu'ils fournissent sont loin de constituer cette science tout entière, et peuvent être comparés aux mots d'une langue qui seraient soigneusement inscrits et définis dans un dictionnaire, sans avoir servi encore à la construction d'aucun édifice littéraire. La zoologie cultivée de la sorte est une étude aride qui exerce la mémoire plus que l'esprit, et qui, dans mon opinion, ne devrait être considérée que comme une sorte d'introduction à des investigations plus élevées. Mais il en est tout autrement de cette science telle que la comprennent les zoologistes qui, à raison de la direction de leurs travaux, constituent ce que j'appellerai l'école physiologique, elle a alors pour objet essentiel la connaissance de la nature intime des animaux, et elle attaque, par conséquent, les questions les plus élevées de la véritable philosophie.

Dans l'état actuel de la science, il est trois ordres de faits dont l'étude me paraît devoir contribuer le plus puissamment aux progrès de la zoologie envisagée au point de vue que je viens d'indiquer, et dont l'investigation me semble par conséquent devoir mériter surtout l'intérêt et les encouragements de l'Académie. Une de ces catégories comprend les phénomènes de nutrition considérée sous le rapport chimique, une autre embrasse l'histoire

du développement, soit normal, soit tératologique des êtres animés, et à la troisième appartient tout ce qui est relatif à l'organisation des espèces inférieures, chez lesquelles on voit la machine animale se simplifier à divers degrés et offrir les combinaisons les plus variées. De ces trois branches d'études, la première est presque entièrement du domaine de la physiologie expérimentale aidée de l'analyse chimique, les deux dernières sont, au contraire essentiellement anatomiques, et conduisent, par des routes différentes vers un même but. Ces routes, quoique bien distinctes jusqu'ici, sont même en quelque sorte parallèles, et les progrès que l'on fait dans l'une d'elles sont nécessairement liés à ceux qui sont effectués dans l'autre, car les modifications embryologiques de l'individu coïncident dans certaines limites avec les modifications zoologiques imprimées aux divers représentants du type organique auquel cet individu appartient, et, par conséquent, pour apprécier toute la valeur des résultats fournis par l'étude de l'un de ces ordres de faits, il faut pouvoir les comparer rigoureusement à ceux qui sont obtenus par l'examen des faits de l'autre catégorie. L'étude des organismes inférieurs, de même que celle des organismes en voie de formation, est éminemment propre à nous éclairer sur la constitution fondamentale des êtres animés, à nous donner des notions exactes sur les connexions que ces êtres peuvent avoir entre eux, et à nous initier aux principes de la zoologie générale. Le perfectionnement de nos méthodes de classification est aussi en grande partie subordonné aux progrès que l'on fera dans cette double voie, car ces classifications doivent être en quelque sorte l'expression figurée de l'ensemble de nos connaissances relatives aux modifications imprimées par la nature à la constitution des animaux. Les formes zoologiques variées presque à l'infini, et dont le catalogue a acquis de nos jours des dimensions gigantesques, peuvent être comparées aux formes cristallines secondaires, dont on ne comprend l'importance et la loi que lorsqu'on remonte aux formes primitives qui les ont engendrées. Ce qui dans le règne animal correspond à la forme primitive des cristaux, c'est le type essentiel ou plan fondamental de l'organisation, type qui règle le mode de coordination des divers matériaux de l'économie, et détermine les caractères des grandes divisions zoologiques. Or, pour démêler ce type primitif au milieu des modifications secondaires qui, chez les animaux d'une structure compliquée, en masquent souvent les traits principaux, et pour arriver ainsi à la connaissance des affinités naturelles, on ne peut en général mieux faire que de l'étudier, soit dans sa simplicité transitoire chez l'embryon, soit dans sa simplicité permanente chez les animaux inférieurs.

Au premier abord, ces considérations pouront paraître étranges, sur un sujet dont nous devons nous occuper dans ce Rapport, mais il me semble nécessaire de les présenter, afin de motiver l'importance que j'attache aux travaux de l'ordre de ceux qui ont été soumis au jugement de l'Académie par M^r de Quatrefages. En effet, les recherches de cet observateur ont pour objet de petits êtres qui ne présentent aucune particularité de mœurs propre à exciter la curiosité, et ne possèdent que des facultés des plus bornées qui n'offrent ni les couleurs brillantes ni les formes bizarres que les zoologistes descripteurs se plaisent d'ordinaire à signaler, et qui ne doivent remplir qu'un rôle bien infime dans l'économie générale de la nature. On pourrait donc se demander pourquoi M^r de Quatrefages, et les autres naturalistes engagés dans la même voie, étudient de pareils animaux jusque dans les moindres détails de leur organisation, et ne se bornent pas comme on le faisait jadis, à en donner brièvement le signalement extérieur, pourquoi dans cette école on attache tant d'importance à la connaissance du mécanisme de la vie chez des êtres en apparence si peu dignes d'intérêt et pourquoi on discute quelquefois longuement sur la place qu'il convient de leur assigner dans la classification naturelle? Mais, si l'on tient compte des observations qui précèdent, on comprendra facilement la raison de cette prédilection, car l'on verra que c'est à la condition d'adopter une marche pareille, que l'on peut légitimement espérer la solution d'un grand nombre des questions les plus fondamentales de la zoologie. D'ailleurs, si nous voulons montrer, par les résultats déjà obtenus, ce que la science est en droit d'attendre de travaux dirigés dans cet esprit, les exemples ne nous manqueraient pas et, pour rappeler une partie des services rendus de la sorte, il nous suffirait de citer les noms de M^r Savigny, en France, et de M^r Ehlenberg, en Allemagne.

Lorsque, pour les animaux inférieurs, on se contentait d'une nomenclature raisonnée, et que l'on ne demandait à l'anatomie comparée que des notions superficielles sur la structure de ces êtres, on pouvait se borner à les étudier dans les musées, et à les disséquer à loisir, après les avoir conservés pendant longtemps dans quelque liqueur spiritueuse. Mais lorsqu'on a voulu les connaître à fond, on a vu qu'il était en général indispensable de les observer à l'état vivant, et comme la plupart de ces animaux habitent les eaux de la mer, on a dû aller les étudier sur place. C'est ainsi que quelques zoologistes ont été conduits à s'occuper spécialement de la faune du littoral de la France. M^r de Quatrefages est de ce nombre, et il a déjà communiqué à l'Académie les résultats de ses travaux pendant trois campagnes. En 1841, il

est allé s'établir aux îles Chaussay, rochers qui, grâce aux progrès de l'industrie, sont aujourd'hui moins deserts qu'à l'époque déjà un peu éloignée où M. Audouin et votre rapporteur y ont commencé une série de recherches analogues. L'année suivante, M. de Quatrefages a consacré plusieurs mois à l'étude des minaux marins d'un autre point de la côte de Normandie dont j'ai eu également l'occasion d'entretenir jadis l'Académie, et pendant l'été dernier, il a été chargé par le Muséum d'une mission à l'île Brebat. Je n'ai pas à parler ici des collections d'annélides et de mollusques que M. de Quatrefages a formées pendant cette dernière campagne et a déposées au Muséum ; je dirai seulement que, dans une des dernières réunions des administrateurs de cet établissement, ces collections ont été l'objet d'un rapport très-favorable de la part de M. Valenciennes qui, ainsi que tous les zoologistes le savent, est un excellent juge en pareille matière. Les travaux dont l'Académie nous a chargés de lui rendre compte portent sur des espèces variées appartenant aux trois grands types inférieurs du règne animal : les annelés, les mollusques et les zoophytes, et ces recherches ont été pour la plupart entreprises dans la vue de constater la manière dont ces types peuvent se dégrader ou se mêler sur les limites extrêmes de leurs domaines respectifs.

Ainsi, dans un premier Mémoire qui a déjà été l'objet d'un Rapport favorable, M. de Quatrefages a fait voir comment les caractères anatomiques les plus saillants des Holothuriens tendent à s'affaiblir ou à disparaître chez les Synaptés, et dans un second Mémoire, il nous a fait connaître l'organisation d'un polype qui établit en quelque sorte le passage entre les Alcyoniens et les Zoanthaires, et qui montre combien la forme extérieure de ces animaux est quelquefois loin de traduire au dehors les particularités de leur structure intérieure, car la forme générale de ce zoophyte est à peu près celle d'un Actinien et la disposition de ses parties intérieures rappelle tout à fait ce qui existe chez les Alcyons.

Un troisième travail, dont l'Académie nous avait également chargés de lui rendre compte, mais dont nous ne parlerons ici que très-brièvement, M. de Quatrefages l'ayant déjà fait imprimer (1), porte sur un zoophyte que ce naturaliste a découvert, comme les deux précédents, sur les côtes de la Manche, et qu'il désigne sous le nom d'*Éleuthérie*. Considéré isolément, ce petit être offre déjà des particularités de structure qui ne pourraient manquer d'intéresser les zoologistes, mais lorsqu'on le compare aux Polypes, d'une part, et aux Médusaires, de l'autre, son étude acquiert une importance

(1) Voyez *Annales des Sciences Naturelles et Zoologie*, t. XVIII, p. 270.

nouvelle, car il est, pour ainsi dire, un représentant de l'affinité qui existe entre ces deux classes d'animaux à l'état de larve, et qui s'efface par les progrès de l'âge. Les belles observations de MM Sars, Löwen, Sieboldt, Dujardin et van Beneden nous ont appris que, d'une part, les Méduses, avant d'arriver à l'état parfait, passent par un état comparable à celui qui est permanent chez les Polypes hydriques, et que d'une autre part, ces derniers subsistent dans les premiers temps de leur vie des métamorphoses non moins considérables, ressemblent à des Méduses avant que de devenir des Polypes. Mais, jusqu'ici, cette double affinité entre ces zoophytes nageurs et ces zoophytes sédentaires ne semblait exister que chez les larves et l'on ne connaissait pas d'espèces intermédiaires établissant le passage entre ces deux types secondaires. Or l'Éleuthérie comble cette lacune dans le réseau zoologique, et pourrait presque aussi bien prendre place dans l'une ou dans l'autre de ces deux classes. M. de Quatrefages la considère comme étant un représentant perfectionné du type des Hydriques, et fonde son opinion sur la disposition générale de l'économie de ce petit être et sur la simplicité de sa structure intérieure, tandis que votre Rapporteur croit y voir plutôt une Méduse dont les formes permanentes seraient, à quelques égards, embryonnaires. Du reste, si je fais mention de cette dissidence d'opinion, ce n'est point parce que j'attache beaucoup d'importance à la place que l'on assignera à l'Éleuthérie, mais pour montrer par ces incertitudes mêmes combien doivent être intimes les liens que ce zoophyte établit entre les deux types secondaires aux caractères desquels il participe.

Un quatrième Mémoire du même auteur est destiné à nous faire connaître des polypes qui se trouvent souvent sur les coquilles de bivalves habités par des Pagures, et qui, au premier abord, ne semblent y constituer que des croûtes rugueuses et informes. Baster, et quelques autres naturalistes paraissent avoir remarqué ces corps, mais on les a toujours confondus avec le *Hydra squamata* de Muller, et jusqu'ici on n'en avait étudié ni la structure ni le mode de reproduction. M. de Quatrefages en a fait l'objet d'une étude attentive et a constaté ainsi plusieurs faits nouveaux dont l'intérêt est considérable pour la zoologie générale. Ces polypes, que notre auteur désigne sous le nom de Synhydries parasites, vivent, fixés par leur base, sur un tissu commun étendu en forme de lame et soutenu intérieurement par un réseau corné analogue au polyptère des Gorgones, mais d'une structure plus simple, et comparable à celle de la charpente solide des éponges. Chacun d'eux est creusé d'une grande cavité digestive analogue à celle des Hydres et ne débouchant pas intérieurement dans un canal commun, comme chez

les Sertulaires On pouvait donc supposer que les polypes, rassemblés de la sorte en colonies, étaient simplement agrégés par suite de la rencontre et de la soudure de la portion élargie de leur base, et qu'ils étaient tout à fait indépendants les uns des autres quant à l'exercice de leurs fonctions, mais M de Quatrefages a constaté qu'il n'en est pas ainsi, et que tous les individus vivant en société sont unis entre eux par un système de canaux capillaires logés dans la profondeur du tissu basilaire commun et établissant des communications faciles entre leurs estomacs respectifs Cette disposition, qui permet à tous les polypes d'une même colonie de profiter des matières alimentaires digérées par l'un d'entre eux, et qui rend leur nutrition commune, est tout à fait semblable à celle que j'avais observée chez les Alcyons, le Corail, les Gorgones, les Cornulaires, et quelques autres polypes de l'ordre des Alcyoniens, mais elle n'avait pas encore été signalée dans l'ordre des Hydraires, et cette découverte de M de Quatrefages nous fournit un nouvel exemple de la tendance qu'a la nature à modifier, par des procédés analogues, les diverses séries zoologiques appartenant à un même type essentiel Ici ce fait offre encore un intérêt particulier dépendant de la structure singulière d'un certain nombre de polypes réunis de la sorte en touffes Effectivement, M de Quatrefages a constaté que, parmi les individus dont se compose ces singulières aggrégations, les uns sont conformes de la manière ordinaire chez les Hydraires, et sont pourvus d'une bouche entourée de tentacules filiformes, de façon qu'il leur est facile de pourvoir directement à leur alimentation, tandis que les autres ne possèdent ni bouche ni tentacules, et, par conséquent, ne peuvent puiser au dehors les matières alimentaires nécessaires à l'entretien de leur vie, on ne comprendrait donc pas leur existence s'ils étaient isolés, mais les polypes à tentacules filiformes en sont pour ainsi dire les pourvoyeurs, ils sont chargés de manger et de digérer pour toute la communauté, et, à l'aide du système de canaux dont il vient d'être question, ils distribuent aux individus astomes la nourriture dont ceux-ci ont besoin Mais ces derniers, qui vivent en parasites, n'en remplissent pas moins un rôle important dans l'économie de ces singulières sociétés, car ils sont chargés d'une partie considérable du travail reproducteur, et paraissent être spécialement destinés à assurer l'établissement de colonies nouvelles

En effet, M de Quatrefages a vu ses Synhydres se multiplier par trois procédés bien distincts Tantôt le jeune individu provient d'un bourgeon qui se forme à la surface du tissu basilaire commun et qui se développe à peu près de la même manière que les bourgeons reproducteurs des Hydres et des Sertulaires, tantôt des œufs, comparables à ceux des Spongilles, nais-

sont dans l'épaisseur de ce même tissu commun et d'autres fois on rencontre sur la portion libre des polypes des corps reproducteurs qui ne peuvent être assimilés ni à des bourgeons, ni à des ovules car ils se constituent par extension de tissu comme les premiers, et, de même que les seconds, ils se séparent complètement de l'individu souche avant que de s'être développés en individus nouveaux. Les bourgeons reproducteurs servent à augmenter la population de la colonie au milieu de laquelle elles se forment, les œufs restent probablement enfouis dans le tissu basilaire après que l'hiver a amené la destruction des polypes dont celui-ci était couvert, et servent à en produire d'autres au printemps suivant, enfin, les bulbiles, devenus libres, sont facilement entraînés au loin par les courants, et venant ensuite à se fixer dans quelque lieu propice à leur existence, s'y développent s'y multiplient à leur tour par bourgeons et y fondent une colonie nouvelle, de la même manière que nous avons vu les *Ascidies* composées propager au loin leurs sociétés sédentaires à l'aide de leurs larves mobiles. Or les bulbiles sont produits exclusivement par les polypes astomes, autour du sommet desquels on les trouve groupés, et les polypes pourvus d'une bouche ne paraissent participer en rien au travail de la génération. Les premiers sont donc des individus reproducteurs comme leurs voisins sont des individus nourriciers, et les particularités de leur structure semblent être une conséquence de ces rôles différents. Chez les polypes reproducteurs, les tentacules ne sont représentés que par des tubercules, et l'appareil digestif ressemble à celui d'un polype ordinaire dont le développement n'est pas achevé et dont la cavité stomacale ne communique pas encore au dehors. Ces individus qui, sous le rapport de la puissance génératrice, sont bien supérieurs aux autres, semblent donc avoir été frappés d'un arrêt de développement en ce qui concerne les fonctions de nutrition ou de relation, et leur existence étant assurée par leurs associés, toute l'énergie de leur organisme semble se concentrer dans les instruments de reproduction. Rien ne peut faire penser que les individus nourriciers soient des mâles, et les astomes des femelles, et la division du travail fonctionnel entre ces divers membres d'une même communauté paraît correspondre aux deux grandes classes de phénomènes physiologiques les actes nécessaires à la vie de l'individu et les actes destinés à assurer l'existence de l'espèce.

La propagation par bulbiles que M. Quatrefages a découverte chez les *Synhydres* est une forme du travail reproducteur dont il n'y avait pas encore d'exemple bien constaté dans le règne animal, et par conséquent ses recherches à ce sujet intéressent la physiologie générale, autant bien que l'histoire

particulière des Polypes Il a étudié le phénomène avec beaucoup de soin, et il en a représenté les principales phases à l'aide d'excellents dessins

Une autre série de travaux soumis au jugement de l'Académie par M de Quatrefages est relative à des mollusques qui appartiennent à la classe des Gastéropodes et qui, pour la plupart, ont été confondus jusqu'ici avec les Doris sous le nom commun de *Nudibranches*, mais qui en diffèrent beaucoup par leur structure intérieure, et qui s'éloignent même de tous les mollusques ordinaires par la dégradation de leur organisation Sous le rapport de la forme générale du corps, de la disposition du cerveau et de la conformation des organes générateurs, ces animaux ressemblent beaucoup aux autres Gastéropodes, mais ils s'écartent considérablement du type normal de ce groupe par la manière dont s'exercent les fonctions de la circulation, de la respiration et de la digestion Une des grandes différences physiologiques qui se remarquent entre les mollusques ordinaires et les animaux articulés dépend de la nature de l'appareil circulatoire, qui, chez ces derniers, est constamment réduit à un état d'imperfection plus ou moins grand, tandis que, chez les premiers, il est toujours bien complet et acquiert un développement très-considérable En effet, chez les mollusques ordinaires, cet appareil se compose de deux systèmes de tuyaux membraneux réunis, par l'intermédiaire du cœur, à une de leurs extrémités, et communiquant entre eux au moyen du réseau capillaire par l'extrémité opposée Chez les animaux articulés, au contraire, un de ces systèmes manque toujours, et se trouve suppléé par les lacunes existant entre les divers organes, la circulation est au plus semi vasculaire, et souvent elle est même entièrement vague et interstitiale Mais ces particularités physiologiques ne constituent pas un des caractères essentiels de l'un ou de l'autre type, car j'ai constaté, il y a quelques années, que, chez les Ascidies composées et plusieurs autres Molluscoïdes, la constitution de l'appareil circulatoire se rapproche de ce que l'on connaît chez les animaux articulés, le système vasculaire proprement dit n'existant que dans la partie thoracique du corps, et étant remplacé par des meats ou lacunes dans toute la portion abdominale de l'économie, et chez les Bryozoaires, qui, dans mon opinion, sont les représentants inférieurs du même type zoologique, il n'y a plus de vaisseaux sanguins, et le liquide nourricier se trouve répandu dans les grandes cavités du corps. Jusqu'ici cependant on ne connaissait aucun mollusque proprement dit chez lequel la circulation ne fût pas complètement vasculaire, et l'on était loin de s'attendre à voir ce caractère physiologique s'effacer dans l'un des groupes les plus élevés de cette division naturelle. Mais, en étudiant les *Bolidiens* et plusieurs

autres gastéropodes d'une forme analogue M de Quatrefages a constaté ce genre de dégradation porté à des degrés variés. Ainsi, dans son genre *Eoludine*, il existe un cœur et des artères bien constitués, mais pas de veines proprement dites et le sang ne revient des diverses parties du corps que par l'intermédiaire d'un système de lacunes irrégulières, disposition tout à fait analogue à celle dont les Crustacés nous avaient déjà fourni un exemple. Enfin, dans d'autres espèces, que M de Quatrefages a découvertes sur les côtes de la Bretagne, le cœur et les artères disparaissent à leur tour, de sorte que la circulation devient des plus incomplètes et ressemble à celle qu'on aperçoit chez les Bryozoaires.

Ces modifications de l'appareil circulatoire entraînent pour ainsi dire à leur suite une dégradation correspondante dans la structure des organes de la respiration. Chez les Mollusques ordinaires, les rapports entre l'air et le fluide nourricier s'établissent par l'intermédiaire d'un réseau de vaisseaux capillaires très développé et dispose de manière à constituer des branchies ou des poches pulmonaires. Dans les Gastéropodes dont M de Quatrefages a fait connaître la structure il n'existe rien de semblable : tantôt la respiration est simplement cutanée et paraît s'exercer par tous les points de la surface du corps, tantôt, au contraire, elle paraît être plus ou moins complètement localisée et devenu l'apanage d'appendices particuliers qui recouvrent le dos de l'animal, mais lors même que cette concentration du travail respiratoire est portée à son plus haut degré, il n'existe aucun réseau vasculaire semblable à celui dont les branchies ordinaires sont composées, et la nature supplée à l'absence de ces vaisseaux en introduisant dans l'économie une combinaison organique que jusqu'en ces derniers temps l'on croyait appartenir exclusivement aux Méduses et à divers Helminthes. En effet, la cavité digestive donne alors naissance à un système de canaux dont les rameaux pénètrent dans les appendices branchiiformes du dos de l'animal, et y portent directement les matières nutritives qui, après y avoir subi l'influence de l'air, doivent se distribuer dans les diverses parties du corps et y servir à l'entretien de la vie. Ce système vasculo-gastrique, dont j'avais déjà signalé l'existence dans un *Eoludine* des côtes de Nice (1), a été étudié d'une manière très approfondie par M de Quatrefages : il paraît atteindre son plus haut degré de développement chez les Gastéropodes que cet observateur habile a désignés sous le nom d'*Eoludine*, mais chez d'autres mollusques construits d'ailleurs sur le même plan général, cet appareil se dégrade à son tour et quelques-uns

(1) Voyez *Annales des Sciences naturelles*, 2^e série, Zool., t. XXVI, p. 330.

des formes qu'il affecte ainsi rappellent tout à fait la disposition de la cavité digestive chez certaines Sangsues et chez diverses Planariées. Dans les genres Pavois et Chalide par exemple, M. de Quatrefages n'a plus trouvé d'appendices rameux en communication avec la cavité digestive, mais seulement deux grandes poches dans l'intérieur desquelles les matières alimentaires pénètrent et s'ajournent pendant quelque temps.

Le système nerveux de ces animaux est aussi moins parfait que dans les Gastéropodes ordinaires : la portion céphalique de cet appareil n'offre rien d'anormal mais les ganglions postœsophagiens ou ventraux, ainsi que la bandelette ou commissure transversale qui d'ordinaire unit ces ganglions entre eux et complète en arrière le collier œsophagien, manquent souvent. Enfin, ces mollusques sont également dépourvus de ganglions labiaux, et par conséquent la disposition générale du système participe aux caractères du même appareil chez les Gastéropodes ordinaires et chez les Tuniciens.

Des particularités d'organisation de cette importance doivent nécessairement être représentées dans nos méthodes naturelles aussi M. de Quatrefages a-t-il été conduit par les recherches anatomiques dont nous venons de rendre compte, à proposer l'établissement d'un ordre nouveau dans la classe des Gastéropodes. Ce groupe, que notre auteur désigne sous le nom de *Phlébentérées*, pour rappeler l'un des traits les plus saillants du type ordinaire, a beaucoup d'analogie avec la division des Polybranchés précédemment établie par M. de Blainville (1), mais en est différent sous plusieurs rapports et se compose déjà de plusieurs familles distinctes. Le genre Actéon, que l'on avait jusqu'ici confondu avec les Aphysiens, doit y prendre place, et, suivant toute probabilité, il faudra également y faire entrer les Glaucus, les Placobranches et tous les autres gastéropodes qui sont dépourvus de poumons et de branches vasculaires. Enfin, certaines Planaires viendront peut-être s'y rattacher.

Les recherches de M. de Quatrefages sur les Gastéropodes phlébentérés conduisent, comme on le voit, à des résultats très-importants pour l'histoire des mollusques, et parmi les travaux dont cette branche de la zoologie s'est enrichie depuis quelques années, il n'en est peut-être aucun qui renferme un nombre plus considérable de faits nouveaux et curieux. Elles font la matière de deux Mémoires, dont le premier a été lu à l'Académie le 22 mai dernier, et dont le second a été communiqué par extrait dans notre dernière séance.

Dans une troisième série de recherches, M. de Quatrefages s'est proposé d'étudier plus complètement qu'on ne l'avait fait jusqu'ici, l'organisation des

(1) Voyez Dictionnaire des Sciences naturelles, t. XXXII p. 275, et Manuel de Malacologie.

Annélides, et d'examiner comment le type dominant de ce groupe naturel se modifie et se dégrade, soit chez les espèces inférieures de la classe, soit chez d'autres Vers que la plupart des zoologistes rangent parmi les Helminthes. Dans cette vue, il a fait d'abord l'anatomie complète d'une annélide errante l'Eunice sanguine, et cette monographie, qui nous a paru exécutée avec une grande précision, renferme plusieurs observations entièrement nouvelles. Aussi aurais-je demandé la permission d'en entretenir l'Académie plus longuement si le nombre de Mémoires dont il me reste encore à rendre compte ne m'imposait l'obligation d'être bref.

En effet, les recherches de M. de Quatrefages sur les autres Annélides chétopodes ont été très-variées, et conduisent à plusieurs résultats que nous pouvons passer sous silence. Ainsi en étudiant d'une manière comparative le système nerveux des Eunices, des Néréides, des Phyllodocés, des Glycères et de quelques genres nouveaux, ce naturaliste a vu que dans cette classe d'animaux, l'appareil ganglionnaire est souvent beaucoup plus compliqué qu'on ne le pensait, et présente des modifications spécifiques analogues à celles que M. Serres avait remarquées chez les insectes, et que M. Audouin et moi avions décrites chez les crustacés.

Le système vasculaire présente, comme on le sait, un développement très-considérable chez toutes les Annélides étudiées jusqu'ici par les anatomistes. Mais chez quelques-uns de ces Vers cet appareil se dégrade comme chez les mollusques et les animaux articulés, car M. de Quatrefages a constaté que chez certains Tubicoles la circulation cesse d'être vasculaire et s'effectue à l'aide des lacunes situées entre les divers organes. Ainsi dans une espèce d'*Amphicoila* très-voisine de celle découverte par M. Ehrenberg, le sang facile à reconnaître par sa couleur verte, n'est pas renfermé dans des vaisseaux sanguins, mais se meut dans l'espace compris entre la couche musculaire sous-cutanée et la capsule de mésentère dont le tube alimentaire est enveloppé. Enfin, dans un genre nouveau d'annélides errantes qui est très-voisin des *Syllis*, et qui a été désigné par M. de Quatrefages sous le nom de *Doyeria*, il existe une combinaison organique intermédiaire entre cet état de dégradation extrême et l'état normal de l'appareil circulatoire dans cette classe d'animaux, car cet appareil existe en vestiges, mais se trouve réduit à un simple vaisseau dorsal.

Le genre *Aphlebine* de M. de Quatrefages offre un autre exemple de dégradation organique dont la connaissance est également importante. La forme générale des Aphlébines ne diffère pas de celle des Térébelles, mais ces animaux sont dépourvus de branchies et manquent aussi de vaisseaux sanguins. Le liquide nourricier, répandu dans un système de lacunes, est ici

incolor, mais la transparence hyaline du corps est si parfaite, que M de Quatrefages a pu y apercevoir le courant circulatoire, et découvrir même la cause de ce mouvement. Chez les annélides ordinaires, le mécanisme de la circulation est analogue à celui de cette fonction chez les animaux supérieurs, car le mouvement du sang est toujours déterminé par la dilatation et la contraction alternatives d'une portion du système de canaux dans lequel ce liquide est renfermé, et par conséquent, c'est toujours par le jeu d'une sorte de pompe foulante que l'impulsion est donnée. Mais dans l'Aphlébine il n'existe rien de semblable : le sang, au lieu d'être comprimé par les contractions d'une cavité analogue au cœur, est mis en mouvement par un système de palettes microscopiques qui le frappent à coups redoublés, et qui sont constituées par des cils vibratiles réunis en écharpes sur les parois de la cavité viscérale, en arrière de la base de chaque pied. Ce mécanisme est analogue à celui que j'avais observé chez les Beroés (1) et peut être cité comme un nouvel exemple de la tendance de la nature à introduire des termes correspondants dans les séries de modifications qu'elle imprime aux divers types dominateurs du règne animal.

Chez les Annélides cette disposition particulière des organes d'impulsion dans l'appareil circulatoire est également intéressante à connaître sous un autre rapport. Depuis longtemps j'avais été frappé de l'affinité qui semble exister entre les Annélides et les Rotateurs, dont la structure intérieure nous a été dévoilée par les beaux travaux de M. Ehrenberg, et j'avais proposé de ranger ces deux classes, ainsi que les Helminthes dans une division particulière de l'embranchement des animaux annelés (2). Or, les faits constatés par M. de Quatrefages établissent de nouveaux liens entre ces animaux, et viennent par conséquent à l'appui de l'opinion que je viens de rappeler. Mais l'hiatus qui semblait exister entre les deux premières classes du sous-embranchement des Vers est rempli d'une manière bien plus directe par une autre découverte de M. de Quatrefages. Effectivement, ce zoologiste a trouvé sur les côtes de la Bretagne une annélide qui, par sa conformation générale, ressemble beaucoup à un jeune Syllis, mais qui porte de chaque côté du corps une série d'organes locomoteurs analogues aux disques vibratiles des Rotifères, et disposés de manière à simuler, jusqu'à un certain point, les roues d'un bateau à vapeur. Chez ce singulier annélide, que M. de Quatrefages a désigné sous le nom générique de *Digardunia*, les palettes sont garnies de soie comme chez les autres annélides errantes, mais ces appendices

(1) Voyez *Annales des Sciences naturelles*, 2^e série, Zool., t. XVI, p. 207.

(2) *Encyclopédie du XIX^e siècle*, t. XXV, art. Vers (1838).

ne sont que des armes défensives et restent immobiles comme des chevrons de fer. quelquefois l'animal se déplace en agitant violemment sa queue et la manie d'une longue rame mais, en général, il n'agit lentement à l'aide des palettes latérales dont il vient d'être question. Ces cils, disposés en couronnes sur les bords de cupules supportées à leur tour par des mamelons placés sur les côtes du corps entre les pieds fonctionnent à la manière des cercles ciliaires des Rotifères et produisent comme ceux-ci, l'image d'une roue qui tourne. Il est aussi à noter que le Dujardin se rapproche des Rotateurs par la forme de son tube digestif et le volume considérable de ses œufs.

Le travail de M. de Quatrefrès sur la structure des Trilicomes et des Némertes offre aussi le double intérêt que nous venons d'indiquer en parlant des recherches de ce naturaliste sur les Aplousinés et le Dujardin car, en même temps qu'il nous fait connaître d'une manière très complète l'organisation de ces animaux, il fournit des matériaux précieux pour l'appréciation des affinités naturelles par lesquelles les Annélides se lient aux Planaires et aux Helminthes. Ainsi M. de Quatrefrès fait voir que les Némertes se rapprochent des annélides par la disposition générale de leur système vasculaire qui ressemble beaucoup à celui des Sangsues, par la structure de leur appareil buccal et par plusieurs autres points d'organisation intérieure tandis que leur appareil reproducteur est analogue à celui de plusieurs Helminthes que leur système nerveux ne peut être comparé qu'à celui des Inguis, et que leur tube digestif au lieu de s'étendre dans toute la longueur du corps et de souvrir en arrière par un orifice anal, comme dans tous les animaux annelés chez lesquels le type dominant de l'embranchement est bien marqué, se termine en cul de sac vers le tiers antérieur du corps et ne communique au dehors que par la bouche de la même manière que chez quelques Helminthes inférieurs et chez la plupart des Zoophytes.

On voit donc que chez ces divers animaux, non seulement l'organisation se simplifie, mais aussi que les caractères les plus brillants du grand type zoologique auquel ils appartiennent tendent à disparaître tour à tour et à se mêler à des particularités de structure empruntées, pour ainsi dire, à des types étrangers. La connaissance de ces anomalies zoologiques est de nature à jeter beaucoup de lumière sur les affinités existantes entre des types qui, d'ordinaire, paraissent être essentiellement distincts, et elle est aussi utile à l'honneur de la science que nous cultivons, car elle fait voir comment les naturalistes les plus habiles ont pu être conduits à adopter des opinions très-divergentes sur la place qu'il convient d'assigner à ces êtres inférieurs dans la classification méthodique du règne animal.

On ne sait encore que peu de chose relativement à la génération des annélides et des autres vers d'une structure analogue. Pallas assure que les Aphrodites sont dioïques et cette opinion a acquis récemment un nouveau poids par les observations de M. Grube de Königsberg, mais les zoologistes n'ayant pas encore fixés sur ce point particulier et tous s'accordaient à penser que la plupart des annélides sont hermaphrodites. M. de Quatrefages a fait voir qu'il en est autrement il a reconnu l'existence d'individus mâles et femelles bien distincts, non seulement chez un grand nombre d'Annélides errants et tubicoles, mais aussi chez les Thalassanthes et chez les Nemertes qui établissent le passage entre les Annélides ordinaires et les Helminthes. Il a observé également quelques phénomènes curieux relativement au mode de formation des spermatozoïdes chez les Nemertes, et, par ses remarques sur le développement de l'œuf des Eudobellés il a étendu à la classe des annélides le fait important constaté par Herold Rathke et quelques autres oölogistes relativement aux rapports du vitellus avec la face dorsale du corps chez l'embryon des insectes, des arachnides, des crustacés etc.

Mais parmi les résultats que M. de Quatrefages a obtenus de l'étude de l'annélides, le plus singulier est celui relatif à la propagation des Syllis.

Otho-Frédéric Muller qui a recueilli un grand nombre d'observations sur la faune maritime du Danemark, a trouvé une annélide de la famille des *Nereidiens* qui paraissait être en voie de se reproduire par bouture, et qui traînait après elle un second individu auquel elle adhérait obliquement. Muller ne poussa pas plus loin ses investigations et se borna à figurer ce double ver et à l'insérer dans son Catalogue descriptif sous le nom de *Nereis prolifera* (1). M. de Quatrefages a rencontré sur les côtes de la Bretagne un grand nombre de Syllis aggrégés de la même manière et il a constaté que les deux individus se forment aux dépens d'un seul dont le corps s'etringle au milieu, et se divise après que les premiers anneaux du tronçon postérieur se sont modifiés de façon à constituer une tête. Ces deux individus sont par conséquent assez semblables entre eux extérieurement mais ils sont doués de facultés bien différentes. Le premier continue à se nourrir de la manière ordinaire et à exécuter toutes les fonctions nécessaires à la conservation de la vie, et, suivant toute probabilité, ne tarde pas à se compléter en reproduisant une queue semblable à celle qu'il a perdue. Mais le second individu formé aux dépens de cette queue n'est destiné qu'à la multiplication de l'espèce, son canal alimentaire tend à s'atrophier, et il paraît ne se nourrir pour ainsi dire que des matières préexistantes dans son

(1) *Zoologia danica* vol II p 15 tab III fig 5 9

corps, mais il renferme la totalité des organes générateurs que possèdent l'individu souche et après sa séparation, il continue de vivre pendant assez longtemps pour que ces organes remplissant toutes leurs fonctions, produisent, soit des œufs soit des spermatozoïdes et assurent de la sorte la perpétuité de l'espèce.

En poursuivant ses recherches sur la structure des animaux inférieurs M de Quatrefages a eu l'occasion d'observer diverses espèces dont les éléments sont d'une transparence parfaite et il a profité de cette circonstance pour étudier sur des individus vivants et non mutilés quelques phénomènes physiologiques dont l'investigation présente chez les grands animaux des difficultés très considérables. Ainsi en examinant le mécanisme des mouvements chez les polypes du genre *Edwardia* il est arrivé en même temps que M Bowman à la connaissance de divers faits importants pour la théorie de la contraction musculaire. Il a vu, par exemple, que les fibres d'un même muscle ne se contractent pas toutes simultanément et que celles qui se contractent entraînent avec elles les fibres voisines restées en repos, déterminent dans celles-ci les plissements en zigzag que l'on avait considérés comme étant la cause efficiente du raccourcissement du muscle.

C'est ainsi en étudiant, à l'aide du microscope de petites annélides transparentes que M de Quatrefages est arrivé à découvrir un rapport curieux entre certains phénomènes de phosphorescence animale et l'influence de l'agent qui détermine la contraction musculaire, et qui à plusieurs égards semble avoir tant d'analogie avec l'électricité. Il est probable que la lumière plus ou moins vive que répandent un grand nombre d'animaux inférieurs ne dépend pas toujours de la même cause que tantôt c'est un phénomène qui accompagne la décomposition des matières organiques et que d'autres fois c'est le résultat de la sécrétion d'un liquide particulier, mais il est probable que, dans un grand nombre de cas la cause de la phosphorescence est entièrement physique et se lie comme la contraction musculaire, à l'influence nerveuse. Votre Commission n'a pas été en position de répéter les expériences de M de Quatrefages à ce sujet, mais elle ne doute nullement de leur exactitude et il est d'ailleurs quelques faits qui semblent corroborer les résultats présentés par ce zoologiste, et qui tendent à y donner plus de généralité. Ainsi les Béroés de la Méditerranée répandent souvent une lumière très-vive et en les examinant attentivement, j'avais déjà remarqué que ce phénomène a son siège dans les côtes, ciliées dont le corps de ces zoophytes est garni or c'est précisément la que se trouvent les organes du mouvement.

* Tels sont les divers travaux sur l'ensemble desquels l'Académie nous avait

chargés de lui présenter un Rapport D'après le nombre, la variété et l'importance des observations dont nous venons de rendre compte on a pu voir que nos côtes sont riches en matériaux précieux pour la science, et qu'en étudiant d'une manière approfondie la structure des animaux en apparence les plus insignifiants il est possible d'arriver à des résultats d'un grand intérêt. Nous devons féliciter M. de Quatrefages d'être entré dans cette voie, et surtout d'avoir pu y exécuter, dans le court espace de trois années des travaux si considérables. Il s'est montré bon observateur et anatomiste habile les sujets de ses investigations ont été heureusement choisis, et les conclusions qu'il en a tirées font preuve d'un jugement droit et de connaissances étendues. Ses travaux lui assurent déjà un rang des plus élevés parmi nos jeunes naturalistes, et doivent lui valoir des encouragements de la part de tous ceux qui s'intéressent à l'avenu de la Zoologie physiologique en France.

La Commission dont je suis en ce moment l'organe, pense par conséquent que l'Académie doit à M. de Quatrefages des témoignages de satisfaction et à ce titre nous proposerons d'accorder aux divers Mémoires dont nous venons de rendre compte la faveur la plus grande dont elle dispose c'est à dire les honneurs de l'impression dans le *Recueil des Savants étrangers*.

Les conclusions de ce Rapport sont adoptées.

Proposition additionnelle de la Commission — La Commission est d'avis qu'il serait très-important de faire sur l'anatomie et la physiologie des mollusques phlébentéres et des annélides propres à la mer Méditerranée des recherches analogues à celles dont nous venons d'indiquer les principaux résultats, et elle pense que si l'Académie voulait bien charger M. de Quatrefages de ce travail elle rendrait ainsi un véritable service à la Zoologie. Elle a par conséquent l'honneur de demander le renvoi de cette proposition à la Commission administrative.

L'Académie décide que ce renvoi aura lieu.

MÉCANIQUE — *Rapport sur une Note relative à la flexion des pièces chargées debout, présentée* (1) *par M. E. LAMARLE, Ingénieur des Ponts et Chaussées professeur à l'Université de Gand*

(Commissaires MM. Poncelet Liouville rapporteur.)

Dans cette Note de mathématiques appliquées M. Lamarle s'est proposé surtout d'établir les deux principes suivants

(1) Le 20 juin 1842. Notre regrettable confrère, M. Coriolis, faisait d'abord partie de la Commission.

1° Les charges que les pièces pressées debout peuvent supporter, *sans altération permanente*, sont indépendantes de leur longueur et simplement proportionnelles à leur section tant que le rapport entre la longueur et la plus petite dimension de l'équarrissage n'atteint pas une certaine limite

2° Au delà de cette limite et pour tous les cas d'application, la charge maximum peut être atteinte, mais non dépassée, l'effort correspondant à la flexion initiale

M. Lamarle montre d'ailleurs comment, les pièces étant supposées prismatiques, il suffit de connaître le plus grand changement de longueur compatible avec la conservation de l'élasticité, pour déterminer numériquement la limite dont il s'agit

Il fut remarqué, en outre, que les résultats fournis par le calcul s'accordent avec les faits généralement observés et qu'ils impliquent la conséquence resumée en ces termes par M. Duleau

Une barre rectangulaire, pressée debout, résiste jusqu'à ce que le poids qui la comprime ait atteint la valeur $Q = \frac{\pi^2 E}{4}$. Ce poids détermine la pièce à prendre une courbure sur la dimension la plus mince et sur-le-champ la pièce se plie en deux

Les déductions de l'auteur reposent essentiellement sur l'analyse que Lagrange a donnée pour le problème de la flexion des pièces chargées de bout. Mais en supposant la condition de ne point dépasser l'effort capable de produire une altération permanente, et en exprimant cette condition à l'aide de substitutions numériques, M. Lamarle a introduit dans la question un élément dont on n'avait point encore tiré parti pour la résoudre au point de vue pratique. L'introduction de cet élément fixe le degré de convergence des séries auxquelles on arrive et permet de déduire de la solution générale les règles dont le constructeur a besoin

On sait (et Lagrange l'a démontré) que la flexion des pièces pressées debout ne devient possible que lorsque la charge atteint une certaine valeur minimum. Si les pièces sont prismatiques, la charge correspondante à la flexion initiale croît en raison inverse du carré de leur longueur. Les contractions qu'elle produit, *indépendamment de toute flexion*, sont donc d'autant plus considérables par unité de hauteur que les pièces sont plus courtes et l'on conçoit que, pour un équarrissage donné, il existe toujours une longueur au dessous de laquelle il y a déjà altération d'élasticité, lors même que la charge est trop faible pour déterminer un commencement de flexion. De là le premier principe énoncé par M. Lamarle

Considérons maintenant le cas de la flexion et supposons le rapport de la longueur à la plus petite dimension de l'équarrissage assez grand pour que la flexion puisse commencer sans qu'il y ait déjà altération permanente. En ce cas la flèche *due au seul effet de la flexion* croît proportionnellement à la flèche et M. Lamarle démontre qu'il suffit d'une augmentation presque insensible de l'effort correspondant à la flexion initiale pour qu'il y ait aussitôt altération imminente de l'élasticité. De là le second principe de l'auteur non absolu mais assez général cependant pour comprendre tous les cas qui peuvent échapper au premier dans les circonstances ordinaires des applications pratiques.

Ces deux principes offrent dans leur ensemble une solution satisfaisante à la question des poutres chargées debout.

Nous pensons donc que la Note de M. Lamarle mérite l'approbation de l'Académie et qu'elle doit être insérée dans le *Recueil des Savants étrangers*.

Les conclusions de ce Rapport sont adoptées.

THEORIE DES NOMBRES — *Rapport sur divers Mémoires de M. HOUY*
géomètre en chef du cadastre etc.

(Commissaires MM. Liouville, Cauchy rapporteurs)

L'Académie nous a chargés, M. Liouville et moi, de lui rendre compte de divers Mémoires de M. Houy qui tous ont pour objet ce qu'il appelle des *expériences sur les nombres*. Dans ces divers Mémoires l'auteur, après avoir résolu numériquement certains problèmes d'arithmétique ou même d'analyse indéterminée, se trouve conduit par l'examen des solutions obtenues à l'énoncé de théorèmes qu'il présente en conséquence, sinon comme rigoureusement démontrés, du moins comme construits par l'expérience, entre certaines limites. Plusieurs de ces théorèmes sont relatifs au nombre des chiffres que renferme la période d'une fraction ordinaire convertie en fraction périodique dans un système quelconque de numération. L'auteur considère en particulier le cas où la fraction ordinaire a pour numérateur l'unité et pour dénominateur un nombre premier. On sait que, dans cette hypothèse, la détermination du nombre des chiffres de la période se réduit à la détermination de l'indice correspondant à la base du système de numération et à la recherche du quotient qu'on obtient quand on divise le nombre entier immédiatement inférieur au nombre premier donné par le plus grand commun diviseur de ce nombre entier et de l'indice. Cela posé, il est clair que la démonstration d'une grande partie des théorèmes énoncés

par M Houry se deduit de la consideration des racines primitives correspondantes aux nombres premiers, et des indices relatifs à ces racines. On reconnaîtra ainsi, par exemple, que n étant un nombre premier, le nombre des chiffres de la période que renfermera le développement de $\frac{1}{n}$ en fraction périodique sera dans tout système de numération, un diviseur l de $n - 1$ et de plus, on trouvera autant de systèmes de numération propres à fournir chacun une période composée de l chiffres qu'il y aura de nombres entiers inférieurs à l et premiers à l . On en conclut aisément que parmi les valeurs de l correspondantes aux divers systèmes de numération, celles qui se représenteront un plus grand nombre de fois seront les valeurs $n - 1$ et $\frac{n - 1}{2}$, si $\frac{n - 1}{2}$ est un nombre impair, et la seule valeur $n - 1$ dans le cas contraire ce qui s'accorde encore avec une des observations faites par M Houry.

En résumé les Commissaires proposent à l'Académie de remercier M Houry de l'envoi des Mémoires soumis à leur examen ces Mémoires étant propres à fournir des documents qui peuvent être utiles aux personnes dont les travaux ont pour objet la théorie des nombres et la solution des problèmes d'analyse indéterminée »

Les conclusions de ce Rapport sont adoptées

MEMOIRES PRESENTES

HYDRAULIQUE — *Aperçu général d'une théorie de la contraction des veines d'eau lancées par des orifices en minces parois planes*, par M BAYEN colonel d'état major au service de S. M. le roi de Prusse (Extrait par l'auteur)

(Commissaires, MM Poncelet, Probert Morin)

Il y a plusieurs mois que j'ai eu l'honneur de présenter à l'Académie des Sciences, par la bienveillance dont m'honore M. de Humboldt, un Mémoire sur la distribution des eaux

• L'intérêt qu'un des membres de l'Académie, dont les recherches ont tant contribué aux progrès de l'hydraulique, a daigné marquer pour mon travail, m'encourage à soumettre à cette illustre Société un nouveau travail relatif à la théorie de la contraction des veines fluides

En comparant les diverses expériences concernant l'écoulement de l'eau par des ouvertures verticales et en minces parois planes on est frappé d

la grande variation qu'éprouve le coefficient par lequel il convient de multiplier, dans chaque cas, la formule théorique de la dépense. En examinant les faits plus sévèrement, on trouve deux sortes de variations distinctes, dont l'une dépend uniquement de la grandeur de la charge, et l'autre de la forme de l'orifice. L'existence de la première est un signe certain que la formule employée ne satisfait point aux expériences. La seconde prouve que l'eau menant du réservoir subit une loi de mouvement dont l'effet est modifié par la forme de l'ouverture.

• En réfléchissant sur ces difficultés, j'ai été frappé d'une idée très-simple et qui semblait mériter un examen rigoureux. C'est cet examen qui est l'objet de mon Mémoire. Pour présenter les résultats sous leur vrai jour, je donnerai ici, d'une manière concise, l'aperçu du travail auquel je me suis livré.

J'admets hypothétiquement que les molécules d'eau, dans le bassin, se meuvent vers le centre de l'orifice avec des vitesses qui sont en raison inverse du carré des distances à ce centre.

Il suit de là que les molécules qui distantes du centre de l'ouverture ont une même vitesse et sont situées sur un hémisphère décrit de ce centre, avec un rayon égal ou plus grand que celui de l'orifice. Lorsque les molécules sont arrivées dans l'hémisphère décrit avec le rayon de l'orifice même, leur vitesse se décompose en deux autres, dont l'une est parallèle à l'axe de l'orifice, et l'autre perpendiculaire à cet axe. La première donne la vitesse perpendiculaire au plan de l'orifice; l'autre représente la vitesse de la contraction. Mais pour déterminer, selon l'hypothèse adoptée, l'une et l'autre de ces vitesses, il faut chercher la distance moyenne des molécules du plan de l'orifice dans les sections de l'hémisphère passant par son axe, c'est-à-dire la distance moyenne des molécules sur la périmétrie d'un demi-cercle de même diamètre. On arrive ainsi, pour les orifices circulaires, à des résultats conformes à ceux des expériences de Bossut, Poleni, Lytelwein, etc.

Par cette recherche, on a trouvé, pour les orifices dont il s'agit, la variation de l'écoulement qui dépend de la forme de l'orifice, il ne s'agit plus que de chercher celle qui dépend de la charge, ou de déterminer la vraie vitesse moyenne de l'écoulement, ce qui se fait par les méthodes connues. On arrive ainsi, pour déterminer le coefficient de contraction k , des orifices rectangulaires verticaux, à la formule générale

$$k = \frac{1}{b} \frac{(m + \sqrt{\pi})^2 - \left[m + \left(1 - \frac{b}{l} \right) \sqrt{\pi} \right]^2}{0,1140449 \left[\sqrt{m+1} \left[\frac{1}{2} - \frac{1}{64(m+1)^2} \right] - \right]}$$

l est la base du rectangle, b sa hauteur, π le rapport de la circonférence au diamètre, m est déterminé au moyen de l'équation $m = \frac{(H - \alpha - l) \sqrt{\pi}}{l}$ dans laquelle H signifie la charge au-dessus du bord inférieur de l'orifice rectangulaire, α est la hauteur d'une colonne d'eau qui fait équilibre à la différence des pressions de l'atmosphère sur la surface de l'eau dans le réservoir et sur le centre de l'orifice. Cette valeur, prise dans le tableau suivant, est égale à 0^m,0020

« Pour faire voir la correspondance de la formule avec les observations, je la comparerai avec les belles expériences qui sont dues à MM Poncelet et Lesbros faites à Metz en 1828. En calculant seulement les coefficients des premières expériences, dans les six tableaux, du n° IV jusqu'au n° IX, j'obtiens

NUMÉROS des tableaux	CHARGES au dessus du bord inférieur H	CÔTÉS DE L'ORIF. RECTANGULAIRE		VALEURS DU COEFFICIENT k		DIFFÉRENCES
		côté vertical b	côté horizontal l	observées	calculées	
IV	1,5720	0,20	0,20	0,6026	0,6034	— 0,0008
V	1,6054	0,10		0,6111	0,6135	— 0,0024
VI	1,7151	0,05		0,6175	0,6180	— 0,0005
VII	1,8960	0,03		0,6229	0,6225	+ 0,0004
VIII	1,4102	0,02		0,6217	0,6234	— 0,0017
IX	1,4070	0,01		0,6204	0,6246	— 0,0042

« Ces différences ne surpassent pas celles qu'offrent entre eux les résultats des expériences plusieurs fois répétées. On trouve les valeurs calculées de k un peu trop grandes, parce qu'on a négligé toutes les autres petites corrections, telles que le frottement aux bords de l'orifice, la température, la résistance de l'air, etc.

« Dans le Mémoire, j'ai employé une formule approximative qui ne s'écarte que très-peu de la valeur exacte, et qu'on trouve en supposant que les vitesses, dans les orifices rectangulaires, sont en raison des racines carrées des charges au dessus de leur centre

» Toutes ces formules supposent cependant que le niveau dans le réservoir reste constant ce qui n'a lieu, dans la pratique, que pour des charges qui sont dix ou douze fois plus grandes que le rayon de l'orifice. Pour les petites charges il y a une dépression de niveau au-dessus de l'orifice, de laquelle il faut tenir compte pour avoir des résultats exacts. C'est pourquoi il faut encore multiplier toutes les formules par un facteur dépendant de la dépression par ce moyen je trouve des équations qui sont en même temps applicables aux grandes et aux petites charges, comme aux déversoirs mêmes.

Les différentes formes des veines d'eau se déterminent enfin au moyen du théorème mentionné plus haut, que la force de la contraction est en raison des rayons de l'orifice. De là il suit que la contraction dans les sections diagonales d'un orifice carré est plus grande que dans les sections passant par le milieu des côtes parallèles et, comme la contraction peut être regardée comme une force agissant perpendiculairement sur l'axe de la veine, il en résulte que les particules d'eau, dans les plus grandes sections s'approchent de l'axe pendant que les particules, dans les plus petites sections, s'en écartent, c'est ce qui explique les formes trouvées par l'expérience.

Distrait par d'autres occupations, je ne puis pour le moment, continuer ce genre de recherches. J'espère cependant les reprendre à une autre époque et leur vouer cette persévérante attention que mérite un objet intimement lié aux besoins des constructions hydrauliques.

ORGANOGENIE — *De la formation des organes de la circulation et du sang dans les animaux vertébrés*, par MM. PREVOST et LESLAT

(Commissaires, MM. Dumeril, Dumas, Milne Edwards)

Des observations exposées dans le courant de ce Mémoire résultent les faits suivants

1° La vésicule germinative se voit de bonne heure dans l'ovule de la grenouille, elle disparaît après la fécondation.

2° Les éléments qui constituent l'œuf non fructifié se forment de la manière suivante. L'ovule peu avancé contient des vésicules à noyaux, l'enveloppe et le contenu cellulaire de ces vésicules se transforment en granules et en petits globules qui forment des agglomérations, soit entre eux, soit autour des noyaux développés, qui, à leur tour, se sont transformés en globules diaphanes. Ces agminations s'entourent, pour la plupart, de membranes d'enveloppe, et ainsi se forment les globules vitellins. L'œuf parvenu à sa maturité est donc composé de granules, de petits globules, d'agmina-

tions groupées en partie autour de vésicules diaphanes, et de globules vitellins contenant tous des éléments qui entourent la vésicule germinative

3° L'œuf fructifié contient les éléments suivants *a*, des granules de $0^m,0012$ à $0^m,0025$, *b*, des globules primitifs aplatis, d'une forme oblongue, de $0^m,0087$ à $0^m,01$ de longueur sur $0^m,005$ à $0^m,0062$ de largeur, *c*, des grands globules de $0^m,05$ à $0^m,0875$ et au delà, formés de granules et de globules primitifs groupés autour d'un noyau diaphane de $0^m,025$ à $0^m,03$ ce sont les globules du vitellus correspondant aux globules du jaune de l'œuf de l'oiseau. Ce qui augmente encore cette analogie, c'est qu'on rencontre quelquefois une cavité centrale dans son intérieur, semblable à celle remplie de globules blancs qu'on trouve dans l'œuf de l'oiseau. Un certain nombre de ces globules n'ont point de membrane d'enveloppe *d*, des globules granuleux de $0^m,0125$ à $0^m,025$, *e* des globules de $0^m,02$ à $0^m,03$ contenant des granules en mouvement moléculaire dans leur intérieur, des petits globules et un noyau diaphane de $0^m,0125$ à $0^m,015$. Ces globules, que nous appelons *organo-plastiques* constituent la base de la première formation du sang, de tous les tissus et de tous les organes.

4° La séparation des éléments de l'œuf en globules vitellins et en globules organo-plastiques est un des premiers effets de la fécondation.

5° La membrane d'enveloppe de l'embryon est formée à sa partie interne de globules organo-plastiques aplatis par suite de l'expansion de l'œuf qui est la conséquence du développement. Ces globules renferment de très-bonne heure des grains pigmentaires.

6° L'embryon de la grenouille offre sur toute la surface du corps des cils vibratiles qui ne sont pas des appendices de cellules épithéliales. On les observe encore chez des embryons d'un centimètre de longueur.

7° Le pigment se forme dans des globules organo-plastiques. Dans la choroiide, dans laquelle il est d'un bleu noirâtre, les globules gardent leur forme à peu près régulière, dans la peau, les globules qui renferment le pigment prennent une forme irrégulière et aplatie avec des prolongements latéraux qui, plus tard, offrent tout à fait un aspect étoilé, et ensuite une disposition frangée, ils continuent à communiquer les uns avec les autres au moyen de canaux, et ainsi se forment les vaisseaux pigmentaires.

8° Les muscles du mouvement volontaire se développent chez le batracien avant celui des organes de la circulation. Ils tiennent leur origine de globules organo-plastiques qui s'allongent et se groupent par faisceaux, leur contenu granuleux et vésiculaire se transforme en fibres primitives.

9° La corde dorsale se forme de noyaux des globules organo-plastiques. Les

vésicules diaphanes grandissent en absorbant les granules et les globules primitifs qui les entourent. Dans quelques reptiles, dans les larves de triton entre autres, il se forme des noyaux dans l'intérieur de ces grandes cellules. Le long de la corde dorsale, on voit un bord composé de petites vésicules diaphanes et de grandes qui se prolongent entre les plaques vertébrales. Il paraît unir ces dernières à la corde elle-même, et former ainsi peut être un commencement de cartilage.

10° Les globules du sang constituent une transformation directe des globules organo-plastiques. Ces derniers se dépouillent d'abord d'une partie de leur contenu granuleux et vésiculeux, ceux de ces éléments qui restent dans leur intérieur prennent une teinte jaunâtre, ensuite ces globules deviennent ellipsoïdes. Les petits globules en paillette disparaissent avant les granules, et à mesure que ces derniers diminuent, la teinte jaune devient rougeâtre et uniforme par tout le globule. L'opinion que les globules du sang tirent leur origine des noyaux des globules organo-plastiques nous paraît contraire à l'observation. La formation des globules blancs du sang appartient à une époque bien postérieure.

11° Le cœur ne se forme dans le batracien qu'après que les organes du mouvement volontaire ont acquis un certain degré de développement. Il est d'abord constitué par un canal renflé dans son milieu, placé à la jonction de la partie vitelline et organique avec la partie animale de l'embryon. Les premiers mouvements ne sont que des oscillations faibles et des contractions comme péristaltiques. Bientôt se voit la séparation de l'oreillette et du ventricule, plus tard le bulbe de l'aorte devient distinct, et lorsque toutes les parties sont bien marquées, la pointe du cœur prend la forme qu'elle doit garder. Les mouvements sont devenus de plus en plus énergiques et réguliers, le péricarde a entouré le cœur, des la première démarcation de l'oreillette et du ventricule.

12° La substance musculaire du cœur était d'abord formée par des globules organo-plastiques intacts, ensuite leurs parois ont en partie disparu, leur contenu a constitué une substance intermédiaire granuleuse, leurs noyaux se sont allongés et ont passé par l'état de corpuscules fusiformes à celui de cylindres arrondis, dans l'intérieur desquels se forment plus tard les fibres primitives. Dès que la substance du cœur a acquis quelque solidité, on y reconnaît des vaisseaux qui président à la nutrition et à son accroissement.

* 13° Les branchies paraissent d'abord comme de simples bourrelets entre les fentes branchiales, ensuite ils sont régulièrement trilobés, et après

avoir pénétré les teguments chaque lobe se subdivise en trois lobules allongés. Leur surface est garnie de cils vibratiles, leur substance est formée, dans le principe, de globules organo-plastiques qui, au moment de l'établissement de la première circulation se groupent et s'écartent d'une manière très-régulière.

14° Il est probable que les premiers vaisseaux se forment dans une membrane hémoplastique, ou dans quelque chose d'analogue, se répandant depuis le cœur dans toutes les parties dans lesquelles la première circulation s'établit.

» 15° La circulation dans le crochet des larves de têtard très-simple, vu que l'artère se replie directement en une veine, cesse, ainsi que celle des branchies, par retrait et par disparition des vaisseaux, ce qui amène l'atrophie et la flétrissure de ces organes.

16° La première circulation fœtale complète dans les batraciens est en peu de mots la suivante : le sang veineux, passant de l'oreillette dans le ventricule, se repand par le bulbe de l'aorte dans les branchies, donnant cependant des vaisseaux aussi à d'autres parties qu'à ces organes respiratoires. Ce sang veineux devient artériel dans les branchies et retourne en bonne partie après avoir donné aussi des branches à diverses parties ambiantes, de chaque côté dans un trouc qui aboutit à l'aorte. De là le sang parcourt toutes les parties du corps et revient à l'oreillette par les gros troncs veineux.

17° Le cœur, pendant l'acte de la contraction diminue d'un tiers de son diamètre, sa contraction est aussi visible d'une manière active dans le bulbe de l'aorte, qui sous tous les rapports, paraît être un renfort du centre de la circulation.

18° Les capillaires se forment toujours d'une manière centrifuge et toujours sous l'influence de la circulation générale. Ce sont des arcs secondaires, tertiaires et ainsi de suite, qui vont d'une artériole à une petite veine. Jamais nous n'avons observé dans l'embryon des animaux vertébrés des vaisseaux se formant indépendamment de la circulation générale, et qui finissaient par y aboutir.

19° L'observation démontre l'existence de capillaires trop petits pour permettre le passage des globules sanguins, dans d'autres un peu plus grands on voit tantôt passer du sang qui contient des globules, tantôt un liquide incolore qui n'en renferme point.

» 20° Les deux plus grands avantages des études embryologiques chez les batraciens consistent : 1° Dans le grand diamètre de leurs globules organo-plastiques, qui permet de saisir tous les détails de leur transformation,

2° dans le développement complet de la circulation branchiale, qui nous rend compte de l'état rudimentaire de ce genre de circulation dans l'embryon de l'oiseau et dans celui du mammifère. Elle est en même temps, comme nous le démontrerons, ailleurs, très-instructive pour comprendre la formation et la structure des poumons de l'embryon et de l'adulte.

PHYSIOLOGIE COMPARÉE — *Mémoire sur la formation de la soie*,
par M. ROBINET (Extrait par l'auteur)

(Commissaires, MM. Duméril, Milne Edwards)

Il s'est élevée une discussion dans ces derniers temps, sur la question de savoir dans quel état se trouve la matière soyeuse avant d'être expulsée, sous forme de fil par les chenilles et particulièrement par le ver à soie.

Les uns ont soutenu l'opinion ancienne, d'après laquelle les réservoirs destinés à cette substance la contiendraient à l'état liquide, d'autres ont prétendu que le fil de soie est tout formé dans la chenille et que celle-ci ne fait que développer un cheveu quand elle expulse la soie pour construire son cocon.

Je me suis efforcé de mettre fin à cette incertitude au moyen de nouvelles observations. Voici les principales conclusions auxquelles sont parvenues mes recherches.

1° La soie s'échappe par un orifice simple, membraneux, pratiqué dans un appendice conique et charnu, adhérent à la levre inférieure du ver à soie.

J'appelle *trompe soyeuse* l'ensemble de cet organe.

2° La soie arrive à cet orifice par un canal unique très-court, résultant de la réunion des deux tubes soyeux.

3° La partie antérieure des tubes soyeux est *capillaire*. Elle est soudée à la partie moyenne très-renflée qui constitue le *réservoir* proprement dit.

La partie postérieure consiste en un cylindre *grêle* très-allongé, c'est probablement l'organe sécréteur.

4° La soie est à l'état d'un liquide épais, gélatineux, dans les deux parties postérieures de l'organe, elle se *solidifie* dans le tube capillaire. Elle arrive à l'état concret au méat externe.

5° Le ver comprime son fil au moyen des contractions d'un *coude* qui forment les deux tubes capillaires à leur point de réunion. C'est ainsi qu'il parvient à arrêter l'excrétion de la soie et à se suspendre par son fil.

6° La matière soyeuse est toujours incolore par elle-même. Elle doit la

couleur qu'elle affecte dans certains cas à la présence d'un *enduit* qui l'accompagne dans les réservoirs et sort avec elle

7° La forme conique du fil de soie est due au retrécissement progressif des tubes capillaires qui doivent être considérés comme la *filère* de la soie

8° Tous les autres phénomènes qui avaient fait supposer que la soie existait à l'état d'écheveau dans les réservoirs s'expliquent facilement par le fait de sa solidification dans les tubes capillaires *avant leur réunion*

Il reste à expliquer ce dernier phénomène, c'est à-dire à déterminer sous quelle influence la matière soyeuse liquide prend dans les tubes capillaires la forme d'un fil solide. A cet égard il n'existe que des conjectures

Lorsque j'ai rompu le tube capillaire d'un réservoir soyeux, aussi près que possible de sa jonction avec son congénère, je suis parvenu à tirer des fils de soie simples dont quelques-uns ont plusieurs décimètres de long. J'ai eu le soin d'en garder. Je ne pense pas que personne en ait jamais obtenu de semblables. Ce résultat a été obtenu *sous l'eau*.

BOTANIQUE — *Addition à un précédent Mémoire sur la Clandestine d'Europe, par M. DUCHARTRE (Extrait)*

(Commission précédemment nommée)

Dans un Mémoire sur l'organogénie de la Clandestine d'Europe présentée à l'Académie dans sa séance du 18 décembre 1843, j'ai signalé la *présence des stomates sur les feuilles et sur les jeunes tiges de cette plante*, et j'ai dit que ce fait formait exception à une règle regardée jusqu'alors comme générale : l'absence des stomates sur les feuilles des végétaux qui vivent en parasites sur les racines d'autres végétaux.

Une seconde plante, à la vérité, le *Lathrœa squamaria*, Linn., me paraissait à cause de sa ressemblance de structure avec la Clandestine pouvoir faire encore exception à cette loi ; mais le travail spécial et consciencieux de M. Bowman était venu détruire mes conjectures, par l'énoncé positif de l'absence complète des stomates chez cette espèce.

Cependant, depuis la présentation de mon Mémoire, j'ai trouvé, dans un ouvrage de M. Schleiden, et à l'occasion d'une tout autre question, quelques mots qui indiquent l'existence de ces organes chez ce dernier végétal. Je ne sais s'ils suffisent pour infirmer l'assertion précise de M. Bowman, mais j'ai cru devoir dès à présent appeler l'attention de la Commission chargée d'examiner mon travail, sur ce point qui s'y rattache de très près, et qui paraît avoir besoin d'être éclairci.

ZOOLOGIE — *Aperçu d'une nouvelle classification des oiseaux, fondée sur des considérations tirées de l'os palatin, par M CORNAY (Extrait)*

(omissaues MM de Blainville, Flourens Isid Geoffroy-Saint-Hilaire)

Les caracteres anatomiques proposes jusqu'à present ne me paraissant pas suffire pour former le point de départ d'une classification naturelle j'ai senti la nécessité d'en rechercher de nouveaux et j'ai cru les trouver dans un os de la face

Cet os est le palatin antérieur, qui présente 1° une extrémité maxillaire, 2° une extrémité opposante cette extrémité est articulée avec l'os palatin postérieur, que j'appelle *os opposant palatin*, parce qu'étant appuyé en arrière sur les carrés, il contre-boute en avant le palatin antérieur 3 le corps, partie grêle, ronde ou aplatie, etc, faisant suite à l'extrémité maxillaire, 4° le limbe ou partie étalée de l'os, situé entre le corps proprement dit et l'extrémité opposante ce limbe est composé d'une lame inférieure ou buccale, d'une lame supérieure ou nasale et d'une lame laterale Dans certains groupes, le limbe n'a qu'une seule lame dans d'autres groupes il en a deux, quelquefois une ou deux lames sont rudimentaires enfin, dans d'autres groupes encore, les trois lames existent

L'os palatin présente, dans la série des oiseaux, une multitude de formes variées et appropriées à leur genre de vie et à leurs mœurs Il constitue en effet la partie postérieure des fosses nasales, ce qui fait qu'il est modifié suivant la rapidité du vol des oiseaux et la quantité d'air qu'ils doivent respirer dans un temps donné, il sert de point d'attache à certains muscles qui agissent dans les mouvements de la mandibule inférieure et dans ceux de déglutition il reçoit, ainsi, des modifications nombreuses dans les différents ordres, suivant le genre de nourriture des oiseaux, il sert d'attache à la membrane pituitaire et palatine Il est placé entre le crâne et la face, et reçoit par conséquent l'influence de leur conformation Aussi est-il de tous les os celui qui m'a paru présenter les caracteres les plus utiles pour classer les oiseaux

Il résulte, en effet, des observations déjà assez nombreuses que j'ai pu faire, les trois lois suivantes

1° Il y a coïncidence de telle forme d'os palatin antérieur avec telle forme du crâne dans les oiseaux de même ordre,

2° Il y a ressemblance entre les os palatins antérieurs dans les oiseaux de même ordre,

3° Il y a des rapports de ressemblance entre les os palatins antérieurs dans les groupes d'oiseaux qui sont voisins les uns des autres

C'est sur ces trois lois que je fonde ma classification, qui repose tout entière sur la forme du crâne ainsi que l'indique la première loi. Les caractères que j'emploie sont ainsi exclusivement des caractères de premier ordre, tandis que ceux qu'on a employés jusqu'ici pour les classifications et qui sont tirés du bec et des pattes ne sont que des caractères secondaires.

Le bec peut avoir une forme plus ou moins allongée, plus ou moins renflée ou courbe, enfin une disposition particulière. Les pieds peuvent avoir des membrures, les doigts être déviés en arrière, les jambes être plus ou moins longues sans que l'oiseau s'éloigne pour cela de ceux qui n'ont point cette conformation, tandis que les caractères indiqués plus haut se retrouvent parfaitement dans les petites espèces comme dans les grandes, ainsi, par exemple, la caillie et l'os palatin antérieur semblable à celui du paon.

Dans les gallinacées l'os palatin a la forme d'une charnière antique et déjà je puis, au moyen de cette remarque, retrancher du groupe des gallinacées des oiseaux qui y avaient été mal à propos compris : ce sont les pigeons et les tourterelles.

Enfin, en disant que les pigeons établissent un léger passage des gallinacées aux passereaux, me paraît être tout à fait dans l'erreur. Pour moi les pigeons forment un groupe qui est séparé des autres, car leur os palatin et leur crâne n'ont aucun rapport avec l'os palatin et le crâne des passereaux.

MEDECINE — Sur l'hypertrophie de la rate dans la fièvre intermittente
par M. CORNAY

M. Cornay considère l'affection de la rate comme un des résultats qui peut amener la fièvre intermittente, et non comme l'affection primitive, ainsi que la soutient M. Piorry dans un travail présenté il y a quelques mois à l'Académie.

Ce Mémoire est renvoyé à la Commission chargée de faire un Rapport sur le travail de M. Piorry.

La même Commission est chargée d'examiner un troisième Mémoire de M. CORNAY, ayant pour titre : *Sur les sources des miasmes qui occasionnent le typhus et les fièvres intermittentes à Rochefort (Charente-Inférieure)*.

CORRESPONDANCE

M. ARAGO fait verbalement l'histoire des recherches des astronomes sur la nouvelle comète

Cet astre a été découvert à l'Observatoire de Paris par M. FAYE, le 22 novembre 1843. Ce jeune astronome s'empresse d'en calculer les éléments paraboliques. À mesure que les observations se multiplient, M. Faye connaît que la parabole était complètement insuffisante pour représenter la suite des positions que la comète avait occupées, et il annonce qu'il déterminerait l'orbite elliptique aussitôt que l'état du ciel ayant permis de suivre le nouvel astre dans des régions suffisamment éloignées de celles où on l'avait d'abord aperçu, personne ne pourrait élever de doute sur la certitude du résultat. C'est donc à multiplier des observations devenues excessivement difficiles par la faiblesse de la comète, que M. Faye s'attache de préférence. Les choses en étaient à ce point, lorsqu'une Lettre de M. Schumacher nous a appris qu'un élève de M. Gauss, M. le Dr Goldschmidt, déjà calculé une orbite elliptique en se servant de l'observation de Paris du 24 novembre et de celles du 1^{er} et du 9 décembre, faites à Altona. M. Goldschmidt est arrivé à une orbite beaucoup moins excentrique que celles des autres comètes déjà connues, en voici les éléments

Époque de la longitude moyenne, 1843, décembre 2, 11876, temps moyen de Berlin	58° 31' 30"	(Équin appar.)
Moyen mouvement diurne	535,7079	
Périhélie	52° 32' 55"	
Angle de l'excentricité	31° 26' 39"	
Logarithme du demi grand axe	0,5473857	
Nœud	208° 21' 20"	
Inclinaison	10° 58' 58"	
Mouvement	direct	

Ces éléments fondés sur le court intervalle de quinze jours, représentent à quelques secondes près les observations qui ont servi de base au calcul, les erreurs augmentent du 9 au 13 décembre, mais sans atteindre une demi-minute tant en ascension droite qu'en déclinaison.

Depuis le milieu de décembre, le ciel est resté continuellement couvert jusqu'au 12 janvier. Les observations de ce jour, faites à Paris, sont repré-

sentées soit exactement en longitude, par l'orbite de M Goldschmidt et l'erreur en latitude ne dépasse guère $2'$ (*)

M ARAGO met sous les yeux de l'Académie un *manometre* construit sur un nouveau principe par M COLLARDEAU Cet instrument, que l'inventeur présente aujourd'hui seulement pour prendre d'ici, et qu'il se propose de faire prochainement connaître d'une manière plus complète, est une sorte de thermometre construit partie en verre et partie en métal, de telle sorte que l'enveloppe constitue un appareil compensateur, et que, quel que soit le changement de température, la hauteur du liquide dans le tube reste toujours la même La compensation d'ailleurs a lieu seulement tant que la forme du réservoir reste la même, or les parois de ce réservoir étant en partie en lames flexibles de métal, le moindre changement de pression le déforme momentanément et ce changement est accusé par le mouvement de l'index dans la colonne Si donc on suppose le réservoir placé dans une chaudière à vapeur on voit que les changements de pression seront indiqués par les oscillations du liquide dans le tube, qui peut être entièrement visible

M FLOUrens présente une épreuve d'une très-belle gravure en taille douce représentant un portrait d'homme La planche qui a donné cette épreuve avait été obtenue du cuivre original, au moyen des procédés galvanographiques de M Kobell et sans autre retouche que dans quelques parties des chairs

(*) *Note ajoutée le mercredi* Il paraîtra peut-être singulier à quelques personnes, de ne trouver dans les Catalogues aucun orbite qui ressemble complètement à celle de cette comète à courte période M Liroy a remarqué à ce sujet que, d'après les éléments ci-dessus le nouvel astre a dû passer vers son aphélie, assez près de Jupiter pour en éprouver des perturbations sensibles On pourrait donc supposer qu'il présente un cas analogue à celui de la comète de Levell dont l'orbite parabolique fut transformée par l'attraction de Jupiter en une orbite elliptique, et redevenant plus tard parabolique par l'action perturbatrice de la même planète

Au reste, l'état du ciel a permis dans ces derniers jours de recueillir des observations plus éloignées du point de départ, et M Leye s'occupe d'achever, d'après l'ensemble des positions observées à Paris, le calcul de l'orbite elliptique, il présentera à l'Académie, dans une de ses prochaines séances, le résultat de son travail, et recherchera ce qu'il serait possible de déduire d'une sorte d'analogie qui existe, à première vue, entre la comète actuelle et la seconde comète de 1766 dont Burckhardt calcula l'orbite d'après les observations de la Nux

M BONJEAN a lu une Note qui fait suite à ses précédentes communications sur le *seigle ergoté* et qui a pour objet de prouver contre une opinion assez généralement admise que ce poison, lorsqu'il est introduit dans les aliments et qu'il a subi par conséquent la fermentation panaire et le degré de chaleur nécessaire pour la cuisson du pain, a perdu une grande partie de son activité. A la fin du mois de novembre dernier une famille entière a été empoisonnée par l'usage d'un pain dans lequel il entraient 14 pour 100 de seigle ergoté et quoique les accidents qui ont suivi l'ingestion de cet aliment aient été des plus graves à l'époque où vivait M Bonjean aucun des neuf individus dont se composait cette famille n'avait encore succombé. Cependant la quantité de seigle ergoté prise par chacun d'eux était en moyenne de 140 grammes. Il est un qui a eu cet accident avait à un très haut degré la saveur déplaisante qui indique la présence du grain ergoté, mais cette saveur était peu sensible dans la croûte aussi le père qui a mangé beaucoup plus de pain que les enfants (l'aîné des sept est âgé seulement de 16 ans), mais qui a mangé principalement de la croûte, a été le moins malade (et accident a eu lieu dans la paroisse d'Arechies, canton de Brulhoit canton déjà signalé par M Bonjean comme la partie de la Savoie où le seigle ergoté est le plus commun et cause le plus de ravages). L'observation a été recueillie par M Bugnol, recteur à Brulhoit.

M RACIBORSKI prie l'Académie de vouloir bien comprendre son *Traité de la puberté et de l'âge critique chez la femme* parmi les ouvrages admis à concourir pour les prix de Médecine et de Chirurgie fondés par M de Montyon. Conformément à la décision prise par l'Académie relativement aux livres et aux travaux inédits adressés pour ce concours M Raciborski envoie une indication des parties qui dans son ouvrage lui paraissent mériter par leur nouveauté de fixer l'attention de la Commission.

M MARTINELLI écrit relativement à un projet qu'il a conçu pour approvisionner d'eau potable la petite ville d'Anagni (États romains). Les eaux étant prises à un point peu élevé ne pourraient être amenées jusqu'à la surface mais un canal souterrain creusé dans la colline sur laquelle la ville est bâtie les conduirait dans une sorte de réservoir, d'où elles seraient élevées par l'action d'une machine. C'est sur le choix de la machine à employer que M Martinelli aurait desiré obtenir l'avis de l'Académie.

M le Président fait observer qu'il n'est pas dans l'usage de l'Académie d'accéder à des demandes de ce genre. On le fera savoir à M Martinelli.

M **PASSOT** a fait de nouveau relativement au Rapport fait dans une des précédentes séances sur le concours pour le prix de Mécanique M Passot désirait savoir s'il ne lui sera pas permis de présenter sa *turbine* a un prochain concours

M le baron **CHARLES DUPIN** fait remarquer que si M Passot fait éprouver son Mémoire une amélioration quelconque il pourra le reproduire au prochain concours pour le prix de Mécanique

M **ROUSSEAU-LAVERGNE** adresse sous enveloppe cachetée une Note pour laquelle il demande un examen sans publicité (cette demande étant contraire aux usages de l'Académie la Note sera considérée comme un simple dépôt que l'auteur pourra reprendre ou dont il demandera l'ouverture en consentant à la publicité

L'Académie accepte le dépôt de deux autres piquets cachetés présentés par M **AVRIL** et par M **BODIERNÉ**

A 5 heures, l'Académie se forme en comité secret

COMITÉ SECRET

La Commission des prix de Médecine et de Chirurgie fait par l'organe de M **ANDRAL** un Rapport dont les conclusions sont ainsi conçues

La Commission a l'honneur de proposer à l'Académie

1° D'accorder un *prix* de six mille francs à MM **STROMPFER** et **DIEBENBACH**, à l'un pour avoir le premier institué et exécuté sur des cadavres l'opération du strabisme, et à l'autre pour avoir le premier pratiqué avec succès cette opération sur l'homme vivant,

2° D'accorder, a titre de *récompense*,

A MM **BOURGERY** et **JACOB** cinq mille francs pour leur *Iconographie d'anatomie chirurgicale et de médecine opératoire*

A M le docteur **THIBERT**, quatre mille francs, pour ses pièces artistiques d'anatomie pathologique

A M le docteur **LONGET**, trois mille francs pour la partie pathologique de son ouvrage sur l'anatomie et la physiologie du système nerveux

A M le docteur **VALLÉE**, deux mille francs pour son *Traité des nevralgies*,

3^o D'accorder des mentions honorables, a titre d'*encouragement*,

A M le docteur **AMUSSAT**, pour ses recherches expérimentales sur les blessures des vaisseaux sanguins,

A MM les docteurs **SERRURIER** et **ROUSSEAU**, pour leur ouvrage sur les maladies des voies aériennes de l'homme et de certains animaux,

A M le docteur **PHILIPPE BOYER**, pour son ouvrage sur le traitement des ulcères par la compression à l'aide de bandelettes

Ces conclusions sont adoptées

La séance est levée à 6 heures trois quarts

F

ERRATUM (Séance du 8 janvier 1844)

PAGE 48, ligne 37 *ajoutez* la phrase suivante

Je prie donc l'Académie de vouloir bien suspendre son opinion définitive sur la question qui de jure s'est agitée si souvent devant elle, jusqu'à ce que toutes les pièces de la discussion aient été mises sous les yeux du public

BULLETIN BIBLIOGRAPHIQUE

- I. Académie a reçu, dans cette séance, les ouvrages dont voici les titres
- Comptes rendus hebdomadaires des séances de l'Académie royale des Sciences*
1^{er} semestre 1844, n° 2, in-4°
- Annales de Chimie et de Physique*, par MM GAY-LUSSAC, ARAGO, CHE-
VREUIL, DUMAS, PELIGREUX, BOUSSINGAULT et REGNAULT, 3^e série, tome IX
décembre 1843, in-8°
- Annales des Sciences naturelles*, octobre 1843, in 8°
- Annales maritimes et coloniales*, décembre 1843, in 8°
- Voyages de la Commission scientifique du Nord en Scandinavie en Lapomé*
au Spitzberg et aux Féroé sous la direction de M. GAIMARD, 15^e livr. in fol
- Essai sur les luxations de la Clavicule* par M. MOREL LAVALLEE bioch in 8°
- Bulletin de la Société industrielle d'Angers*, septembre, octobre, novembre
et décembre 1843, in 8°
- Journal de la Société de Médecine pratique de Montpellier*, janvier 1844
in-8°
- The Electrical *Le Magasin d'Electricité dirigé par M. WALKER* vol 1^{er}
n° 3, janvier 1844 in 8°
- Astronomische *Nouvelles astronomiques de M. SCHUMACKER* n° 493
in-4°
- Erster . *Première Addition au Mémoire sur le Galvanisme considéré*
comme moyen thérapeutique par M. G. GRUBER Saint Petersbourg 1842
in 8°
- Nueva Descripcion. *Nouvelle Description de la portion pierreuse du Fem-*
oral, faite dans le but de mettre en évidence plusieurs découvertes relatives à
l'organisation de l'Ouïe, Mémoire lu dans la Section des Sciences anthropologiques
de l'Académie royale des Sciences naturelles par DON MARCOS VINALS Y
RUBIO Madrid, 1843, in 8°
- Dell azione . *De l'action des Engrais, et de l'état dans lequel leur emploi*
peut être le plus avantageux, Mémoire rédigé à l'occasion du cinquième congrès
des Savants italiens réunis à Lucques en septembre 1843, par M. D. DI WIC-
CHI Florence, in 8°
- Gazette médicale de Paris*, t. XII, n° 2, 1844
- Gazette des Hôpitaux*, t. VI, nos 3 à 5
- L'Expérience*, n° 341, in-8°
- L'Echo du Monde savant*, 10^e année, t. IX, nos 3 et 4, in-4°

COMPTE RENDU

DES SÉANCES

DE L'ACADÉMIE DES SCIENCES.

SÉANCE DU LUNDI 22 JANVIER 1844

PRÉSIDENCE DE M CHARLES DUPIN

MEMOIRES ET COMMUNICATIONS

DES MEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE L'ACADÉMIE

Note lue par M Biot

J'ai l'honneur de présenter à l'Académie l'ensemble des articles du *Journal des Savants*, où j'ai entrepris d'exposer la partie de l'histoire de l'astronomie observatrice qui est relative à la théorie de la Lune. Ce travail ne s'étend encore qu'aux Grecs et aux Arabes. Tout astronome, et tout géomètre qui voudra prendre la peine de le lire, reconnaîtra, je crois, avec évidence, que le *Traité arabe* d'Aboul-Wéfa, où l'on a prétendu trouver la découverte de la *variation*, n'en contient aucune trace, et que, dans le chapitre où l'on a cru la voir, l'auteur arabe, suivant pas à pas Ptolémée, a pour but unique d'exposer le second élément de l'*evectio*, qui il présente absolument comme le géomètre grec, avec la même construction géométrique, et au même lieu ou l'ordre logique des idées l'amène, par nécessité quand on suit la doctrine des épicycles, comme il le fait. J'oppose, de nouveau, cette assertion formelle à toute protestation contraire, parce que les preuves mathématiques que j'ai rapportées ne laissent aucun sujet de doute. J'avoue même, avec sincérité, qu'une si grande réunion d'arguments aurait

été inutile, pour un esprit plus exercé à ce genre de recherches que je ne l'étais avant de m'en occuper car le seul énoncé théorique de la *variation* rend l'assimilation supposée mathématiquement impossible

PHYSIQUE DU CIOBE — *Mémoire sur les débordements du Rhône,*
par M. DE GASPARIN

PREMIERE PARTIE — *Des causes des inondations et des moyens proposés pour s'en garantir*

Les débordements du Rhône et de ses affluents se succèdent depuis quelques années avec une continuité qui, après avoir gravement compromis la fortune et la vie de ses riverains, ne leur laissant aucune relâche, les met dans l'impossibilité de réunir les ressources nécessaires pour résister à ces invasions. La pitié publique et la sollicitude du Gouvernement se sont émues et ne sont pas restées inefficaces, mais ce mal, qui semble passer à l'état chronique, lasse la compassion et l'on se demande si, tout en pourvoyant aux besoins du moment, il n'y aurait pas quelque remède radical à substituer aux palliatifs impuissants qu'on a opposés au mal.

Sans remonter au delà du commencement de ce siècle, les grands débordements du Rhône ont eu lieu en 1803, 1810, 1811, 1840, 41, 42, 43. En 1827 plusieurs des affluents de la rive gauche, et entre autres l'Ardèche causèrent de grands ravages. Les trois premières de ces crues eurent lieu au printemps par suite de la fonte des neiges, les quatre dernières, par l'effet des pluies d'automne. Il n'y a donc rien de bien régulier ni dans la saison où ont lieu les inondations, ni dans la période d'années qui les sépare. Dans le siècle dernier, la crue de 1755 avait été très-considérable, et l'on éleva alors les chaussées au-dessus du niveau de l'inondation : elles furent successivement montées en 1810 et 1811. Depuis cette époque jusqu'à 1840, le Rhône ne put atteindre à leur niveau, mais alors elles succombèrent presque partout et, depuis, de nouveaux malheurs ont appris qu'il était imprudent de ne pas prévoir le retour de crues autant et plus élevées.

La création de ces digues n'est-elle pas un bien ? C'est ce dont il est permis de douter en présence de quelques faits agricoles.

Quand le Rhône submerge un terrain sans rencontrer d'obstacle, il s'épanche au loin en prenant son niveau, perd sa rapidité en s'étendant, et laisse déposer sur son passage le limon qu'il entraîne avec lui. Si les inondations ont lieu en automne au moment où les semences de blé sont terminées, elles ne causent aucun mal aux plantes déjà sorties de terre, à

moins que l'inondation ne se prolonge huit ou dix jours, mais tous les grains de ble dont le germe n'a pas encore rompu son enveloppe sont perdus, et il faut ressemer les terres qui sont en cet état. Si l'inondation arrive en mai ou en juin, et qu'elle ne surmonte pas les épis formés, elle ne cause encore aucun mal. C'est un événement très-fréquent dans les terres non diguées, et cette année même nous avons vu le Rhône déborder et arriver jusqu'à l'écume des chaumes, sans que les bles aient aucunement souffert. Si les eaux surmontaient et baignaient l'épi, la récolte serait fort avinée. Quand le débordement a lieu après la moisson, il est rare qu'on n'ait pas le temps de mettre les gerbes à l'abri.

Il y a des chances défavorables crueses par les débordements du Rhône dans les lieux non couverts par les digues.

Voici maintenant les avantages de ces terrains. Le Rhône y laisse un limon riche et abondant qui dispense de les fumer, et permet d'y supprimer les jachères en les soumettant indéfiniment à l'assolement de la luzerne et du ble. Ces terres exhausées par les crues, se trouvent généralement plus élevées que celles qui sont garanties par les chaussées, elles restent donc bien moins longtemps sous l'eau que ces dernières, inondées par la rupture de leurs défenses. Celles-ci, ne recevant pas d'amendements annuels, doivent être fumées pour porter de pleines récoltes. Et en comparant leur situation respective, d'un côté, les risques dont nous avons parlé, mais une richesse naturelle qui rend la culture des terres indépendante des engrais et permet de vendre leurs pailles, de l'autre, des chances moins fréquentes de dégâts, mais aussi l'obligation de fumer et de payer les frais d'entretien et d'entretien des digues, on trouve que les terres non défendues valent la moitié en sus et souvent le double des terres couvertes par les chaussées, et que c'est sur ce pied qu'elles se vendent les unes et les autres. Après ce fidèle exposé, on se demande par quelle singulière aberration des populations entières se sont soumises à un pareil régime, et ont accepté un traité qui consiste à être assuré, chaque année, d'une récolte d'une valeur moitié moindre, au lieu d'une récolte qui, toutes pertes compensées, finit par être d'une valeur double. C'est avoir une grande horreur des chances aléatoires et un grand amour de la régularité, c'est avoir un grand besoin d'aligner symétriquement un budget annuel. Cette disposition annonce un manque d'avances, un défaut de prévoyance qui influe sur toutes les actions de la vie, ce sont les mêmes causes qui ont perpétué le métayage et mis un obstacle invincible à l'introduction du fermage.

« Cependant il ne faut pas se dissimuler que le reproche qui a toute sa

force duge contre des populations qui voudraient se diguer aujourd'hui que nous connaissons les faits, en perd beaucoup, appliqué au temps où les digues n'existent pas on n'avait pas sous les yeux l'exemple de cette énorme différence entre les terres qu'elles couvrent et celles qui sont en dehors de leur enceinte.

Pourrait-on maintenant sortir de l'état actuel sans inconvénient et renversant toutes les digues élevées à grands frais, se remettre dans la position d'où l'on est sorti? Cela nous paraît impossible pour plusieurs raisons. Les terres qui sont en dehors des défenses se sont exhaussées de manière à surmonter de beaucoup le niveau des terres défendues. Il en résulterait donc si l'on rabattait les digues que les eaux, en débordant, se répandraient sur les terres de l'intérieur, non pas lentement et par un mouvement progressif mais avec un courant qui y causerait des affouillements et qui après le débordement les eaux y séjourneraient longtemps, faute de pouvoir s'écouler librement dans le fleuve dont elles seraient séparées par les terres plus élevées. Ce ne serait qu'après une série d'années considérable et après des pertes qui ne pourraient être évaluées, que le niveau des terres se serait rétabli. Mais on ne peut avoir la pensée d'imposer de telles chances à toute une ville. Et si jamais on renonce aux crues, ce sera par impuissance de les entretenir, impuissance qui ne pourrait résulter que d'une administration vicieuse ou négligente. Les moyens de remédier à ces inconvénients formeront la seconde partie de ce Mémoire.

Mais si il était vrai qu'il y eût une cause générale d'inondations qu'il fut possible d'attaquer dans sa source et de vaincre radicalement tout en cherchant à consolider les digues préservatrices on ne pourrait les considérer que comme un moyen provisoire, et conserver l'espoir qu'il viendrait un temps où elles seraient moins nécessaires. Or on a proposé plusieurs hypothèses pour expliquer le retour des grandes crues, et chacune d'elles semblait indiquer le remède radical que nous cherchons. Il faut donc les examiner avec soin avant de prendre un parti définitif.

On a prétendu d'abord que les inondations étaient l'effet de l'exhaussement du lit du Rhône. Si l'on réfléchit que la série de quatre années (1840 à 1843) d'inondations consécutives a été précédée d'une assez longue durée de repos on sera tenté de croire que le lit du fleuve n'a pu s'exhausser aussi subitement et que cette cause, si elle existe, n'est que très-secondaire. Il n'est pas douteux cependant que le lit du Rhône, qui s'est beaucoup prolongé dans les temps historiques, depuis Arles jusqu'à la mer, n'ait subi par cela même un certain exhaussement dans sa partie supérieure mais cet effet

est bien léger, et ne s'est fait sentir qu'au-dessous de cette ville. En effet nous trouvons d'abord qu'à Arles même on a découvert sur le fond actuel du fleuve, les tuyaux de plomb qui conduisaient du temps des Romains le canal de la ville à son faubourg dans l'île de Camargue; le Rhône ne parvient qu'en débordant au niveau des fosses du château de Farascon, taillées dans le roc, dans des temps déjà anciens si le lit s'est exhaussé, il y se joindraient habituellement les piles du pont Saint-Benezet, à Avignon, ne pourraient pas avoir été enterrees on decouvrit encore le pied des arches du pont de Saint-Espirit construit comme le précédent pendant le xiv^e siècle, passe, près de la ville sur le lit de rochers qui lui a servi de base il y a cinq-cents ans les rochers du bouig Saint-Andolun ont pu être recouvertes par les attissemens et présentent toujours les memes dangers qu'autrefois les piles du pont Romain à Vienne, dominant toujours le fond du fleuve enfin à Lyon on a trouvé dans le lit de la Saône les pieds d'une statue antique de bronze qui y avoit été jetée probablement lors des irruptions de Barbaires. Tous ces faits concourent à prouver que le régime du fleuve est établi depuis un temps immémorial et il n'y a donc pas lieu de penser que l'on pût parvenir à empêcher les inondations par les moyens qui consistent à approfondir son lit.

La seconde hypothèse par laquelle on a prétendu pouvoir expliquer les débordemens récents du fleuve les fait résulter du déboisement des montagnes. Un article très-sensé d'un de mes collègues à la Chambre des Pairs membre du conseil général de l'Isère, a rappelé que le déboisement a été plus complet encore après la révolution, et que depuis longtemps l'État et les communes ont mis en défense de vastes étendues de terrain dans lesquels les bois repoussent avec vigueur. Les années nefastes que nous venons de subir n'ont donc pas répondu à l'époque du maximum du déboisement et c'est précisément à cette époque que les crues ont paru être moins fortes. D'un côté les inondations des siècles précédents consignées dans l'histoire prouvent que les montagnes étoient couvertes de bois, inondations dont quelques unes ont dépassé le niveau des dernières, de l'autre, celles de 1810 et 1811 encore si récentes survenues quand le déboisement étoit à son comble mais suivies d'un intervalle de près de trente ans de repos pendant lequel les eaux n'ont pris cause de notables dommages, prouvent que les effets du déboisement ne sont que secondaires et que, s'ils les favorisent, ils sont incapables de les déterminer.

Nous savons, d'ailleurs, que dans les Alpes le déboisement a été opéré par deux motifs le désir d'étendre les pâturages des nombreux troupeaux

qui viennent y chercher leur nourriture d'été, et dont le revenu est bien supérieur à celui des bois celui d'opère des défrichements. Ces défrichements ont eu principalement des résultats funestes pour les vallées inférieures. Une fois le gazon enlevé le sol est raviné par les pluies le rocher est mis à nu. Les terres et les roches sont entraînées dans les vallées qui sont rendues infertiles par cette immense couche de débris. M. DuRoi a décrit ces fâcheux effets dans un très-bon ouvrage que l'Académie des Sciences a couronné. Il est certain que les eaux ne coulant plus par filets entre les touffes de gazon, et creusant dans les rivières qu'elles descendent avec beaucoup plus de rapidité, et grossissent subitement les torrents d'une plus grande masse d'eau. Mais aussi les eaux épanchées sur les vastes surfaces de cailloux roulés et des sables qu'elles trouvent au bas des pentes, s'y infiltreront et s'évaporeront au loin et perdent beaucoup de leur volume. Cependant l'effet total est fâcheux il doit contribuer à rendre les grandes crues plus fréquentes et moins longues. C'est une cause accessoire qui contribue beaucoup à accroître le mal, et tout ce que l'on pourra faire, soit pour proscrire les défrichements des terrains en pente soit pour reboiser ceux qui ont été défrichés soit pour combattre ces fâcheux ravins ces entonnoirs qui se forment au fond des vallées, sera une œuvre tellement utile. Sans empêcher les débordements futurs, de tels travaux contribueraient, sans doute, à les rendre moins graves. Quant aux terrains en pâturage, l'autorité publique éprouverait sans doute de grands obstacles à les reboiser. Elle aurait à combattre l'intérêt privé et communal, armes du droit sacré de propriété et qui exigeraient des indemnités proportionnées à la grande différence qui existe entre le revenu des pâturages alpins et celui des jeunes bois.

L'article d'un de mes collègues que j'ai cité, attribue tout le mal aux digues nombreux qui se sont faits dans les vallées supérieures. A mesure que le prix des terres s'est élevé on a cherché à les mieux préserver et à en aggraver aux dépens du lit des rivières et des torrents. Les eaux qui se répandaient autrefois dans les plaines adjacentes et y séjournaient quinze et vingt jours arrivent aujourd'hui en deux ou trois jours à la partie inférieure du lit du cours, elles y arrivent toutes à la fois ce qui cause cet afflux prodigieux d'eau auquel on doit attribuer les débordements actuels. Il y a ici encore une partie de la vérité, et il ne faut pas le méconnaître. Ainsi, pour parler d'une rivière du midi quoiqu'elle ne soit pas un affluent du Rhône, autrefois les crues du Vidourle étaient moins subites qu'elles ne le sont aujourd'hui. Quel changement est-il donc survenu? Toutes les terres des hautes vallées des Cévennes ont été soigneusement élevées et terrassées des rigoles d'écoulement

pivées garnissent chaque terrasse, et se rendent à un chemin également pivé qui descend de haut en bas de chaque pente les eaux arrivent ainsi toutes à la fois à la rivière. On ne peut nier que la rapidité et le volume de ces crues ne soient dues à de pieux travaux faits à la fois sur une grande étendue de pays.

Mais les travaux faits sur le Vidourle, le Gardon, l'Isère, sont loin d'avoir été poussés ailleurs avec la même activité. La plupart de ceux faits sur l'Isère datent de loin, et sont bien antérieurs aux dernières inondations, la Durance n'est diguée que sur la partie inférieure de son cours, et elle l'est depuis longtemps, le Roubion, la Drôme ne présentent pas cet appareil de défenses dont on nous entretient. Celles qui y existent ont été construites dans le dernier siècle. L'Ardeche est dans le même état ou elle était de temps immémorial, et cependant l'énorme crue éprouvée en 1843 à Beauvoire et à Larascon est venue presque uniquement de la Durance et de l'Ardeche. Aucun travail remarquable et suivi n'a eu lieu sur les nombreux torrents qui descendent sur les deux rives du fleuve. Ils s'écoulent tous avec une rapidité qu'ils doivent à leurs pentes, et que leur encreusement n'augmenteront pas beaucoup. Il est certain que l'endiguement de la Saône produirait un grand effet en formant obstacle à l'épanchement de ses eaux sur les vastes prairies qui bordent cette rivière, mais ces travaux ne sont pas même entrepris. Ainsi sans nier l'accroissement que donnent aux crues les travaux partiels entrepris dans deux ou trois vallées, les plus riches et les plus industrieuses, on ne peut voir encore ici qu'une cause accessoire qui favorise les grandes crues mais non pas les causes principales qui les déterminent nécessairement.

En effet, des débordements très considérables ont eu lieu avant que cet état de choses n'existât, quand la situation du pays était moins favorable encore au prompt écoulement des eaux que celui qui est résulté de l'activité nouvelle imprimée aux travaux de défense des vallées, avant la construction des digues du Rhône, quand le fleuve débordait pouvait s'étendre dans toutes les plaines. Ces débordements, antérieurs aux travaux qu'on leur assigne pour cause, ont dépassé en intensité les débordements récents. Nous pouvons reconnaître dans nos plaines des alluvions anciennes du Rhône, que celles de 1840 n'ont pu recouvrir. Ainsi, les débordements ont eu lieu quand les vallées supérieures n'étaient pas diguées, ils n'ont pas eu lieu longtemps après qu'elles l'ont été.

Il y a donc une cause primitive, qui, revenant à certaines périodes cause les crues extraordinaires du Rhône, et dont les autres ne sont que des accessoires. Cette cause est un phénomène météorologique.

La vallée du Rhône et les plaines qui l'avoisinent reçoivent leurs grandes pluies des vents du sud et du sud-est. Le vent du sud-ouest ne lui parvient qu'après avoir traversé l'Espagne et s'y être déchargé d'une partie de l'eau qu'il tient en suspension. Le vent du sud, dans son trajet à travers la Méditerranée chargé d'une forte dose de vapeurs aqueuses, le vent du sud-est qui arrive directement en Provence sans avoir rencontré de grandes étendues de terres depuis la Syrie, parcourt une étendue encore plus grande de mer. Il est un si certain de pluie pour cette contrée, et si il dure plusieurs jours de suite. Les pluies diluviales. Quand ces vents humides ont saturé au loin l'atmosphère et vient le vent du nord qui condense toute cette vapeur, la précipitation forme de pluie dans la vallée principale depuis Tignes jusqu'à la mer et dans les vallées latérales le long des montagnes des Alpes et des Cévennes. On a vu de ces pluies torrentielles dans lesquelles on mesure jusqu'à 810 millimètres d'eau à Oëns 0,791 à Joyeux (Ardèche), 0,324 à Saint-Symphorien-le-Chatillon en 1834 0,325 à Marseille en 1772 et à Orange 0,192 et 0,145. Que l'on pense quel épouvantable déluge produisent de pareilles pluies quand elles sont générales ! On s'explique alors facilement comment huit jours de durée des vents pluvieux peuvent produire les effets dont nous avons tant à souffrir.

Mais ordinairement le vent du nord est plus impétueux et ne laisse pas une si longue domination aux vents du sud. Il se prononce avant qu'ils aient pu amasser une si grande quantité de vapeurs dans le bassin du Rhône, et de vagues et de grandes masses d'eau. Et alors la précipitation de la pluie est moins considérable. Il y a crue il n'y a pas débordement.

Quand les vents pluvieux sont uniquement ceux du sud-est les nuages sont poussés sur la crête des Cévennes les Alpes abritent les vallées de l'est et les affluents de la rive droite sont ceux qui donnent la crue. Si les vents sont du sud les vapeurs passent par l'axe de la vallée et aussi par les cols le long des Alpes, la Saône et les rivières de la rive gauche sont celles qui fournissent le plus d'eau, mais ces directions elles-mêmes sont dérangées par celle que prend le vent du nord à son apparition. On a vu alors il refoule à droite ou à gauche et quelquefois dans les deux sens, la masse de vapeur que ses antagonistes du sud continuent à amener.

Si les pluies arrivent à la fin de l'été, la terre desséchée en absorbe une grande partie et en laisse peu parvenir aux cours d'eau, aussi les crues d'août et de septembre sont-elles rares, mais si aux pluies abondantes de septembre, en succèdent d'autres en novembre, il y a débordement. En mai, le sol, encore imbibé des pluies d'hiver, laisse couler l'eau à sa surface, et la

crue est encore augmentée par la fonte des neiges des montagnes. Habituellement les vents du sud-est sont peu fréquents dans cette saison.

Après plusieurs années de sécheresse il arrive que les vents du sud même prolongés passent sur la vallée sans se décharger en pluie. Le rayonnement de la chaleur du sol fait dissoudre les vapeurs et les terres ne fournissent rien à l'évaporation : les couches inférieures de l'air demeurent sèches. C'est ce qui est arrivé en 1838, où des vents du sud-est constants ne produisent pas des pluies abondantes, tandis qu'en 1839 une moindre durée de ces vents donna une crue considérable.

Ainsi les crues du Rhône sont régies par ces faits : abondance de pluie amenée par une longue durée des vents du sud et sud-est et arrivant à une époque où la terre n'est pas desséchée et voilà ce qui se passe de puis qu'ils arrivent.

On a déjà remarqué, dans la marche et dans la fréquence des vents certaines périodes qui reproduisent la prédominance des courants d'air venant de certainsumbs et qui après un règne plus ou moins long sont remplacés par des courants venant d'autres directions. Ainsi pour parler d'une manière plus générale M. Lesauvres ayant analysé les observations de Milan de 1763 à 1838 trouve que leur direction moyenne écarte par rapport à la méridienne

De 1763 à 1792	De 1803 à 1838	De 1848 à 1858
81 10	27 25	5° 43

Qu'ainsi cette direction avait marché continuellement de l'est au nord d'environ 1 degré par an.

Schouw a trouvé qu'à Copenhague la direction moyenne avait tourné de l'ouest au sud de 1765 à 1800.

En analysant les résultats de *Cotte*, nous trouvons que la direction moyenne des vents était à Paris,

De 1763 à 1772	De 1782 à 1791
229 81	317° 4

Ainsi, jusqu'à la fin du siècle dernier, la direction des vents a marché de l'ouest au nord, et les observations de M. Bouvard, insérées dans les Mémoires de l'Académie, nous donnant 248° 21 la direction des vents retrograderait donc du nord à l'ouest.

Mais ces résultats moyens comprennent des oscillations qui embrassent de plus petites périodes. Ainsi, à ne considérer que les vents principaux de notre vallée du Rhône, les vents septentrionaux et les vents méridionaux nous trouvons que les vents du nord sont inférieurs à leur moyenne.

annuelle

de 1818 à 1822	5 ans
Supérieurs de 1823 à 1829	7 ans
Inférieurs de 1830 à 1831	2 ans
Supérieurs de 1832 à 1837	6 ans
Inférieurs de 1837 à 1842	5 ans

Mais si au lieu de considérer l'année entière, nous nous bornons à notre principale saison de pluies, l'automne, nous trouvons que les vents du nord ont été

Inférieurs à la moyenne	de 1816 à 1822	7 ans
Supérieurs	de 1823	1 an
Inférieurs	de 1824	1 an
Supérieurs	de 1825 à 1829	5 ans
Inférieurs	de 1830 à 1831	2 ans
Supérieurs	de 1832 à 1835	4 ans
Inférieurs	de 1836	1 an
Supérieurs	de 1837	1 an
Inférieurs	de 1838 à 1841	4 ans

On voit ici des périodes de cinq ans pendant lesquelles domine le vent du nord, et une de sept de supériorité de vent du sud. Ces alternatives sont bien autrement compliquées si l'on se borne à l'examen des groupes formés par la durée des vents pendant plusieurs jours consécutifs, et ce sont pourtant ces groupes qui constituent les véritables chances de grandes pluies et d'inondations, ou de pluies faibles et de faibles crues.

Dans les cinq années qui viennent de se couler, toutes les conditions se sont réunies pour avoir de grandes pluies en automne.

	VENTS PRÉVAUANT			Total
	sud est	sud	sud o. est	
De 1835 à 1838, nous avons eu	28	141	12	181
De 1839 à 1842	51	149	27	227

Quoique dans la première période se trouve comprise l'année 1836, qui donne un fort contingent de ces vents, on voit la grande supériorité des vents du sud et surtout des vents du sud-est dans la dernière. Telles sont les véritables causes qui ont produit les grandes inondations du midi, et comme nous sommes complètement ignorants sur la durée de la domination de ces vents, nous ne pouvons faire que des conjectures fort incertaines sur le terme

auquel on peut attendre une suspension du fléau qui nous frappe depuis 1840

La puissance de l'homme qui a pu aggraver les causes qui rendent les grandes crues plus fréquentes et plus menaçantes, ne peut rien contre celles qui dépendent des influences atmosphériques. Nos moyens préventifs se bornent donc à une assez faible action sur le reboisement des montagnes. nous devons donc nous attacher à consolider et perfectionner, à compléter nos moyens défensifs, à élever nos digues au dessus du niveau des plus hautes inondations connues, et à les entretenir par l'emploi des meilleurs procédés administratifs. Ceux-ci feront l'objet de la seconde partie de ce travail, qui par sa nature, ne rentre pas dans le cercle des travaux de l'Académie, mais je ne puis terminer sans parler de l'exhaussement que l'observation attentive des dernières crues paraît rendre nécessaire.

Les mesures de la hauteur des eaux pendant les différentes inondations sont loin d'être d'accord entre elles dans les différentes parties du cours du fleuve, et ce n'est pas seulement la circonstance d'être placé au-dessus ou au-dessous du confluent de telle ou telle rivière, c'est encore et surtout pour les points compris entre deux affluents les brèches qui se sont formées dans les digues qui, en permettant aux eaux de prendre une grande expansion ont réduit leur hauteur sur certains points tandis qu'elle ne l'était pas dans ceux où les digues, étant conservées, forçaient les eaux à s'écouler tout entières dans leur lit.

En 1840 toute observation sérieuse tendant à établir le niveau que les eaux auraient atteint, si les chaussées avaient été suffisantes fut impossible en effet après que les chaussées eurent été surmontées, et que les brèches eurent atteint leur dimension d'équilibre le Rhône continua à croître, et dépassa, sur la plupart des points, le niveau de ces chaussées mais en 1841 cette observation a été facile, et elle a été faite avec un soin minutieux sur trois points. En effet alors la rupture des anciennes brèches arriva à peu près au moment du maximum des eaux, et les terres étant fraîchement remuées, ces brèches atteignirent immédiatement la dimension d'équilibre de 1840. Il résulta de ces ruptures mêmes un abaissement moyen de 80 centimètres dans le niveau des eaux car pendant l'époque correspondante dans les points où le fleuve restait encaissé, la hauteur des eaux n'avait pas varié. Il est donc permis d'établir que cette hauteur de 80 centimètres est une limite inférieure de la surélévation que les eaux auraient prise en 1840, si elles étaient restées seulement dans les chaussées, je dis limite inférieure, car la crue de 1841 fut de beaucoup moins forte que celle de 1840.

Cette observation, en fixant la hauteur probable des eaux du Rhône

en 1840 lors de sa plus grande crue, permettra de la comparer dans la suite avec celles qui surviendront quand les travaux seront rendus insubmersibles. On saura que pour les évaluer il ne faudra pas se borner à les comparer aux repeirs tracés par cette crue, mais supposer qu'elle a atteint une hauteur de 0^m 80 au dessus d'eux.

PHYSIOLOGIE VÉGÉTALE — *Note sur l'embryogenie du Taxus baccata*
par MM DE MIRBEL et SPACH

Le *Taxus baccata* comme on sait a été placé par les botanistes dans la famille des Conifères. Il nous parut curieux de rechercher si, dans l'ovule de cet arbre nous retrouvions la pluralité constante d'embryons naissants qui a été signalée pour la première fois, en 1810 dans des fruits de *Cycas* que l'un de nous eut en sa possession et plus tard par M. Brown en 1834 dans ce même *Cycas* et dans les *Pinus sylvestris*, *pinaster* et *strobis*. Nous allons exposer en peu de lignes les faits que l'anatomie microscopique nous a fait découvrir.

À l'époque de la floraison, l'ovule du *Taxus* ressemble en miniature à un œuf dont le petit bout serait dressé et tronqué. Au fond de cet ovaire est fixée la nucelle, corps ovoïde composé d'un tissu cellulaire assez consistant, lequel ne remplit qu'incomplètement la capacité de l'ovaire. Dans l'intérieur du nucelle rien ne révèle encore la naissance du sac embryonnaire. Six semaines de végétation amènent de notables changements. Le nucelle s'est accru de telle sorte que sa surface touche en tout point la surface interne de la cavité ovarienne sans néanmoins y adhérer, si ce n'est par sa base comme on l'a déjà dit. Dans la région centrale de ce même nucelle se sont développées trois petites vessies surmontées chacune d'une excroissance tubuleuse de longueur variable. Deux de ces vessies sont tantôt ovoïdes et tantôt de formes plus ou moins irrégulières. La troisième vessie, plus centrale que les deux autres et placée un peu plus bas, est constamment ovoïde. Elle renfermera plus tard un tissu délicat composé d'uticules au centre de chacune desquelles sera logée une seule sphéroïde. Cette troisième vessie est le sac embryonnaire, et la majeure partie du tissu qui remplit sa cavité se transformera bientôt en perisperme. Mais que penser des deux autres vessies qui nous offrent tant de traits de ressemblance avec le sac embryonnaire? Seraient-elles donc des sacs embryonnaires avortés ou plutôt n'auraient-elles pris leur origine une toute autre destination? Nous sommes bien tentés de le croire quand nous observons la marche de leur de-

veloppement. Sitôt que le perisperme commence à s'accroître et longtemps avant que l'embryon paraisse ces petites vessies s'attachent par leur base au sommet du sac embryonnaire et le boyau qui suit monte chacune d'elles s'allonge à travers le nucelle jusque tout près de la surface de son point culminant. Les boyaux s'appellent jusqu'à certain point les boursofflures membraneuses qui s'allongent à la surface du sommet de l'ovule des *Thuja*. Ici tout nous induit à croire qu'elles sont destinées à jouer un rôle important dans l'acte de la fécondation. Ici dans le *Taxus* le but ce nous semble n'est pas moins nettement indiqué. Une des deux petites vessies ou les deux ensemble que naguère nous avons découvertes dans l'intérieur du tissu du nucelle entre le sommet de celui-ci et l'embryonnaire auquel elles sont attachées transportées par la puissance des développements jusqu'au haut du perisperme y reparaissent à l'un dans une petite dépression qui s'est creusée à son sommet comme pour leur donner place. On remarque que c'est de la base de ces vessies qu'ont pris les suspenseurs et par conséquent les embryons. Il est donc très probable que le jeu de l'organisme que nous venons de décrire a principalement la fécondation pour objet tandis que dans beaucoup d'autres végétaux ce phénomène s'opère au moyen de l'introduction du boyau pollinique jusque dans l'intérieur de l'ovule, où il rencontre nécessairement le sac embryonnaire et le suspenseur.

Pendant que l'ovaire avance en âge, le volume du perisperme s'accroît sensiblement aux dépens du nucelle. Environ ce temps, le tissu de ce menu perisperme se déchire de haut en bas dans la direction de l'axe jusqu'à la moitié ou les deux tiers de sa longueur. Cette destruction du tissu que nous avons déjà observée dans les Pins assure aux suspenseurs et à l'embryon viable la place nécessaire pour leur développement. Tout près du sommet de cette très-étroite civité nous retrouvons les petites vessies dont nous parlions tout à l'heure. Continueraient-elles de faire corps avec le sac embryonnaire? Nous serions fort tentés de le croire. Toutefois nous devons déclarer qu'il nous a été impossible de retrouver le moindre vestige de la présence de ce sac aurait-il été résorbé ou plutôt se serait-il attaché si fortement à la surface du perisperme qu'il n'y avait plus possibilité de l'en séparer et de le distinguer? Cette dernière version nous paraît la moins contestable.

• Venons aux suspenseurs. Il est évident pour nous, qu'ils procèdent de la base des petites vessies, et qu'ils y restent attachés jusqu'à complète maturité de la graine. quelquefois il n'y en a qu'un, d'autres fois on en compte

deux. Nous n'en avons jamais trouvé plus. Chacun se compose de cinq ou six boyaux réunis en faisceaux. Les boyaux contiennent des granules plus ou moins rares ou abondants. L'extrémité inférieure du faisceau se termine par quelques petites utricules groupées en mamelon et qui contiennent aussi des granules. Le mamelon est l'embryon naissant. Les suspenseurs et l'embryon descendent et s'allongent librement dans l'espace détreint formé par la destruction d'une partie du tissu central du périsperme.

Nous ne dirons rien des développements de l'embryon du *Taxus*. Ils ne diffèrent pas essentiellement de ce que nous avons observé dans les *Thuja*, les Pins, les Sapins.

ANALYSE MATHÉMATIQUE — *Mémoire sur les fonctions continues,*
par M. AUGUSTIN CAUCHY

Dans les ouvrages d'Euler et de Lagrange, une fonction est appelée *continue* ou *discontinue*, suivant que les diverses valeurs de cette fonction correspondantes à diverses valeurs de la variable, sont ou ne sont pas assujetties à une même loi, sont ou ne sont pas fournies par une seule et même équation. C'est en ces termes que la continuité des fonctions se trouvait définie par ces illustres géomètres, lorsqu'ils disaient que les fonctions arbitraires introduites par l'intégration des équations aux dérivées partielles, peuvent être des fonctions continues ou discontinues. Toutefois la définition que nous venons de rappeler est loin d'offrir une précision mathématique, car, si les diverses valeurs d'une fonction correspondantes aux diverses valeurs d'une variable dépendent de deux ou de plusieurs équations distinctes, rien n'empêchera de diminuer le nombre de ces équations, et même de les remplacer par une équation unique, dont la décomposition fournirait toutes les autres. Il y a plus : les lois analytiques auxquelles les fonctions peuvent être assujetties se trouvent généralement exprimées par des formules algébriques ou transcendentes, et il peut arriver que diverses formules représentant pour certaines valeurs d'une variable $-x$, la même fonction, puis, pour d'autres valeurs de x , des fonctions différentes. Par suite, si l'on considère la définition d'Euler et de Lagrange comme applicable à toutes espèces de fonctions, soit algébriques, soit transcendentes, un simple changement de notation suffira souvent pour transformer une fonction continue en fonction discontinue, et réciproquement. Ainsi, par exemple, x désignant une variable réelle, une fonction qui se réduirait tantôt à $+x$, tantôt à $-x$, suivant que la variable x serait positive ou négative, devra, pour

ce motif, être rangée dans la classe des fonctions discontinues, et cependant la même fonction pourra être regardée comme continue, quand on la représentera par l'intégrale définie

$$\frac{2}{\pi} \int_0^{\infty} \frac{x^2 dt}{t^2 + x^2},$$

ou même par le radical

$$\sqrt{x^2},$$

qui est la valeur particulière de la fonction continue

$$\sqrt{x^2 + t^2},$$

correspondante à une valeur nulle de t . Ainsi, le caractère de continuité dans les fonctions, envisagé sous le point de vue auquel se sont d'abord arrêtés les géomètres, est un caractère vague et indéterminé. Mais l'indetermination cessera si à la définition d'Euler on substitue celle que j'ai donnée dans le chapitre II de l'*Analyse algébrique*. Suivant la nouvelle définition, une fonction de la variable réelle x sera *continue* entre deux limites a et b de cette variable, si, entre ces limites, la fonction acquiert constamment une valeur unique et finie, de telle sorte qu'un accroissement infiniment petit de la variable produise toujours un accroissement infiniment petit de la fonction elle-même. Alors, si la variable est prise pour abscisse, la fonction supposée réelle sera l'ordonnée d'une branche de courbe *continue*, comprise entre deux droites perpendiculaires à l'axe des abscisses, et rencontrée en un seul point par chacune des droites parallèles que l'on pourrait tracer entre les deux premières. La continuité des fonctions ainsi définie est d'ailleurs un caractère dont l'importance se trouve aujourd'hui généralement appréciée par les géomètres. C'est en tenant compte des solutions ou interruptions observées dans cette espèce de continuité, que je suis parvenu à déterminer, pour les équations algébriques, le nombre des racines qui satisfont à des conditions données, par exemple, le nombre des racines dont le module demeure compris entre deux limites données, et c'est encore cette espèce de continuité qui forme, comme je l'ai démontré, le caractère distinctif des fonctions développables en séries convergentes ordonnées suivant les puissances entières et ascendantes d'une ou de plusieurs variables.

Enfin, de l'analyse dont j'ai fait usage pour établir le théorème 11 -

Aut à la convergence des développements des fonctions, on peut aisément déduire l'extension donnée par M. L'HUIT à ce théorème, et l'on reconnaît ainsi que la continuité est encore le caractère distinctif des fonctions développables en séries ordonnées suivant les puissances entières, positives et négatives de variables. Comme cette dernière proposition peut recevoir un grand nombre d'applications utiles il importe de la bien préciser et d'en traiter ce sujet dans quelques détails.

Considérons une variable imaginaire x . Elle sera le produit de son module par une certaine exponentielle trigonométrique, et, pour obtenir toutes les valeurs de la variable correspondantes à un module donné, il suffira de faire croître l'argument de cette variable c'est-à-dire l'argument de l'exponentielle trigonométrique depuis la limite zéro jusqu'à une circonférence entière 2π , ou, ce qui revient au même depuis la limite $-\pi$ jusqu'à la limite π . Si tandis que l'argument varie entre ces limites et le module entre deux limites données une fonction réelle ou imaginaire de x reste continue par rapport à l'argument et au module de manière à reprendre la même valeur quand l'argument passe de la valeur $-\pi$ à la valeur $+\pi$ cette fonction sera, entre les limites assignées au module ce que nous appelons une fonction *continue* de la variable x . Cela pose le théorème général sur le développement en séries des fonctions d'une seule variable peut être énoncé dans les termes suivants.

1^{er} Théorème Une fonction réelle ou imaginaire de la variable x sera développable en une série convergente ordonnée d'un côté suivant les puissances entières positives d'un autre côté suivant les puissances entières négatives de x tant que le module de x conservera une valeur comprise entre deux limites entre lesquelles la fonction et sa dérivée ne cesseront pas d'être continues.

Ce théorème introduit évidemment le suivant

2^e Théorème Une fonction réelle ou imaginaire de la variable x sera pour une valeur donnée du module de x développable en une série ordonnée d'un côté suivant les puissances entières positives d'un autre côté, suivant les puissances entières négatives de la variable si dans le voisinage de cette valeur la fonction et sa dérivée restent continues par rapport à x .

Les théorèmes que nous venons de rappeler peuvent être immédiatement étendus au développement des fonctions de plusieurs variables.

D'ailleurs ces théorèmes ne sont pas seulement applicables au développement des fonctions explicites d'une variable x ils s'appliquent encore au

développement des fonctions implicites. Mais alors se présente à résoudre un nouveau problème il s'agit de reconnaître si, pour un module donné de la variable x , une fonction u de x , déterminée par une équation entre x et u reste avec sa dérivée, continue par rapport à x . Or, ce nouveau problème peut être effectivement résolu dans un grand nombre de cas, à l'aide des considérations suivantes.

Supposons que, le second membre de l'équation entre x et u étant nul, le premier membre renferme avec x et u , un ou plusieurs paramètres. Il arrivera souvent que, pour une valeur particulière de l'un de ces paramètres, une racine de l'équation résolue par rapport à u sera évidemment fonction continue de x , au moins tant que le module de x restera lui-même compris entre certaines limites. Concevons maintenant que l'on fasse varier par degrés insensibles le paramètre α dont il s'agit et supposons que le premier membre de l'équation proposée reste, du moins entre certaines limites fonction continue non seulement de ce paramètre mais encore de x et de u . Enfin admettons, pour fixer les idées, que la racine en question soit une racine simple. Alors, par des raisonnements semblables à ceux dont nous avons fait usage dans le Mémoire sur la nature et les propriétés des racines d'une équation qui renferme un paramètre variable (voir le 2^e volume des *Exercices d'Analyse et de Physique mathématique*, pages 111 et suivantes), on prouvera que la racine en question variera généralement avec le paramètre α par degrés insensibles, en restant fonction continue de x , jusqu'à l'instant où, de nouvelles racines devenant équivalentes à la première, l'équation proposée acquerra des racines égales. D'ailleurs, on prouvera sans peine qu'avant cet instant le développement de u suivant les puissances entières de x se trouvera représenté par une série dont le module ou les modules seront inférieurs à l'unité, et l'on peut ajouter qu'à cet instant même les dérivées de u , prises par rapport à x , deviendront généralement infinies à partir d'un certain ordre, ce qui exige qu'alors le module ou l'un des modules du développement de u se réduise à l'unité. Ces observations fournissent le moyen de déterminer en général le module ou les deux modules de la série qui représente une fonction implicite de la variable x , développée suivant les puissances entières et ascendantes, ou même suivant les puissances entières positives et négatives de cette variable.

Dans un autre Mémoire j'appliquerai les principes que je viens d'établir aux séries qui représentent en astronomie les développements des fonctions perturbatrices.

§ 1^{er} — Formules générales

» Soit

$$x = re^{p\sqrt{-1}}$$

une variable imaginaire dont r représente le module, et φ l'argument. Soit de plus

$$f(x) = f(re^{p\sqrt{-1}})$$

une fonction de x qui reste, avec sa dérivée $f'(x)$, continue par rapport à x , c'est-à-dire par rapport au module r et à l'argument φ , pour toutes les valeurs du module r inférieures à une limite donnée R . Soit enfin

$$z = Re^{p\sqrt{-1}}$$

une nouvelle variable imaginaire qui ait pour argument la constante R , et pour module l'angle variable p . On aura, en supposant $r < R$,

$$(1) \quad f(x) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \frac{zf(z)}{z-r} dp$$

puis en posant, pour abrégé,

$$a_n = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \frac{f(z)}{z^n} dp,$$

on tirera de l'équation (1),

$$(2) \quad f(x) = a_0 + a_1 x + a_2 x^2 +$$

» Soit maintenant ρ le module de la série

$$a_0, a_1, a_2, \dots,$$

c'est-à-dire la plus grande des limites vers lesquelles converge, pour des valeurs croissantes de n , la racine $n^{\text{ième}}$ du module de a_n . Le module de la série

$$(3) \quad a_0, a_1 x, a_2 x^2,$$

sera évidemment représenté par le produit

$$\rho^r,$$

et, comme ce produit exprimera encore les modules des séries composées des termes que l'on obtiendra en différenciant une ou plusieurs fois de suite, par rapport à x , les divers termes de la série (3), comme d'ailleurs une série est toujours convergente, et offre une somme finie, tant que son module reste inférieur à l'unité, il est clair que, si la fonction $f(x)$ ou ses dérivées deviennent infinies pour la valeur R du module r de x , le produit ρR devra se réduire à l'unité. On aura donc alors

$$\rho = \frac{1}{R},$$

et par suite la série (3) aura pour module $\frac{r}{R}$. Alors aussi, pour $r < R$, il sera facile de calculer une limite supérieure au module du reste de la série (3) arrêtée après un nombre quelconque de termes.

Désignons maintenant par la seule lettre u la fonction $f(x)$, et supposons que u soit une fonction implicite de x qui représente une racine simple de l'équation

$$(4) \quad F(u, x) = 0$$

Enfin concevons que le premier membre de l'équation (4) renferme, avec les variables x et u , un ou plusieurs paramètres, et que pour une certaine valeur, par exemple pour une valeur nulle du paramètre α , la racine simple u de l'équation (4) reste fonction continue de x , du moins tant que le module de x ne dépasse pas une certaine limite. En raisonnant comme à la page 113 du volume II des *Exercices d'Analyse*, on prouvera que, si le paramètre α vient à varier, et si, tandis qu'il varie, le premier membre de l'équation (4) reste fonction continue de x , u et α , la racine simple u restera généralement fonction continue de x , jusqu'à l'instant où, une seconde racine devenant égale à la première, l'équation (4) acquerra des racines multiples. Soit R la valeur du module r pour laquelle une seconde racine de l'équation (1) deviendra égale à u . Il est clair qu'à cette valeur de r , et pour une valeur correspondante de l'argument φ de la variable x , on aura

$$D_u F(u, x) = 0$$

Donc alors aussi la valeur de $D_x u$, tirée de l'équation (4) et déterminée par la formule

$$D_x u = - \frac{D_x F(u, x)}{D_u F(u, x)},$$

deviendra généralement infinie. Cette démonstration ne serait plus admissible, si la valeur de x qui rend une seconde racine à u , réduisait $D_x F(u, x)$ à zéro. Mais il est facile de s'assurer qu'en général le module R correspondant à cette racine rendrait infinies, à partir d'un certain ordre, les dérivées

$$D_x u, D_x^2 u, D_x^3 u,$$

Donc, en vertu de ce qui a été dit plus haut, le module de la série qui représentera la fonction u développée suivant les puissances ascendantes de x sera généralement

$$\frac{r}{R}$$

Soit maintenant

$$u = f(x)$$

une fonction de x qui, avec sa dérivée $f'(x)$, reste finie et continue par rapport à x , pour des valeurs du module r comprises entre les limites

$$r = r_0, \quad r = R$$

et posons simultanément

$$y = r_0 e^{p\sqrt{-1}}, \quad z = R e^{p\sqrt{-1}}$$

L'équation (1) devra être remplacée par la suivante

$$(5) \quad f(x) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \frac{zf(s)}{z-x} dp - \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \frac{yf(y)}{y-x} dp,$$

et, en posant, pour abréger,

$$a_n = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \frac{f(s)}{s^n} dp, \quad a_{-n} = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} y^n f(y) dp,$$

on tirera de l'équation (5)

$$(6) \quad f(x) = a_0 + a_1 x + a_2 x^2 + \dots + a_{-n} x^{-n} + a_{-n-1} x^{-n-1} + \dots$$

On pourra d'ailleurs supposer, comme ci-dessus, que u représente une racine simple d'une certaine équation (4) qui renfermerait, avec les variables x et u un paramètre α . Si, pour une valeur particulière de ce paramètre, u se réduit effectivement à une fonction continue de x , alors, le paramètre venant à varier, u ne cessera pas d'être fonction continue de x du moins entre certaines limites de r , jusqu'à l'instant où, une seconde racine de l'équation (4) devenant égale à u , cette équation acquerra des racines égales. Cela posé, si l'on designe par r_0 , R les limites inférieure et supérieure qu'atteint le module r , quand une seconde racine de l'équation (4) devient, par suite de la variation du paramètre α , équivalente à la racine u , alors, en raisonnant comme dans le cas précédent, on prouvera que les deux modules de la série

$$a_0 x^0 + a_1 x^1 + a_2 x^2 + \dots + a_{n-1} x^{n-1} + a_n x^n$$

se réduisent généralement aux deux rapports

$$\frac{r_0}{r} \text{ et } \frac{r}{R}$$

§ II — Application

Appliquons à quelques exemples les principes établis dans le § I^{er}, et d'abord supposons que la fonction u de x représente celle des racines de l'équation

$$(1) \quad \alpha u^2 - 2u + x = 0$$

qui, pour une valeur nulle du paramètre α , se réduit à

$$u = \frac{1}{2} x$$

Comme le premier membre de l'équation (1) est une fonction toujours continue des variables x , u et du paramètre α , il en résulte que si ce paramètre, cessant d'être nul, acquiert une valeur infiniment petite, u restera fonction continue de la variable x , au moins pour des valeurs finies de cette variable. Si, le paramètre α variant encore, son module croît de plus en plus par degrés insensibles, u ne cessera pas d'être, pour un module donné de la variable x , fonction continue de cette variable, jusqu'au moment où, par suite de la variation de α , une seconde racine u de l'équation (1), devenant égale à la première, vérifiera non-seulement cette équation, mais

encore l'équation dérivée

$$(2) \quad \alpha u - 1 = 0,$$

par conséquent jusqu'au moment où l'on aura, en vertu des équations (1) et (2)

$$(3) \quad \alpha x = 1,$$

Où comme on tire de la formule (3)

$$\alpha = \frac{1}{x} \pmod{\sigma} = \frac{1}{\pmod{x}}$$

et réciproquement,

$$x = \frac{1}{\alpha}, \pmod{x} = \frac{1}{\pmod{\alpha}},$$

il suit de cette formule que, si l'on pose

$$\frac{1}{\pmod{\alpha}} = R,$$

u restera fonction continue de x , non-seulement quel que soit le paramètre α , dans le voisinage d'une valeur nulle de x , mais encore, pour une valeur quelconque de ce paramètre, jusqu'au moment où l'on aura

$$\pmod{x} = R$$

Donc, en vertu des principes établis dans le § I^{er}, celle des racines de l'équation (1) qui se réduit à $\frac{1}{x}$ pour une valeur nulle du paramètre α , sera, pour un module r de x inférieur à R , développable suivant les puissances ascendantes et entières de x en une série convergente, dont le module se réduira au rapport

$$\frac{r}{R},$$

c'est à dire au module du produit αx . On vérifie aisément ces conclusions, en commençant par tirer de l'équation (1) la valeur de u en x , et développant la valeur ainsi trouvée, savoir,

$$(4) \quad u = 1 - \sqrt{1 - \sigma x},$$

suitant les puissances entières et ascendantes de x

* Concevons maintenant que la fonction u de x représente celle des racines de l'équation

$$(5) \quad u e^{-\frac{\alpha}{2} \left(u + \frac{1}{u} \right)} - x = 0$$

qui se réduit à x , pour une valeur nulle du paramètre α , et supposons le module de x différent du zéro. Le premier membre de l'équation (5) sera toujours fonction continue de x , α et u , excepté dans le voisinage d'une valeur nulle de u , et si le paramètre α , cessant d'être nul varie par degrés insensibles, u ne cessera pas d'être fonction continue de x , jusqu'au moment où, par suite de la variation de α , une seconde racine u de l'équation (5), devenant égale à la première, vérifiera non-seulement cette équation, mais encore l'équation dérivée

$$(6) \quad 1 - \frac{\alpha}{2} \left(u + \frac{1}{u} \right) = 0$$

Admettons, pour fixer les idées, que l'on attribue toujours au paramètre α une valeur réelle et positive. Supposons d'ailleurs que l'on ne fasse pas croître ce paramètre au delà de l'unité. Alors l'équation (6), résolue par rapport à u , offrira deux valeurs réelles et positives, inverses l'une de l'autre. Les deux valeurs correspondantes de x , tirées de l'équation (5), seront pareillement deux quantités réelles et positives inverses l'une de l'autre, de sorte qu'en désignant la plus petite par r_0 et la plus grande par R , on aura

$$r_0 = \frac{1}{R},$$

ou

$$R r_0 = 1$$

Cela posé, il résulte des principes établis dans le § 1^{er}, que, pour une valeur de α positive, mais inférieure à l'unité, et pour un module r de x compris entre les limites $R, \frac{1}{R}$, une racine de l'équation (5), savoir, celle qui se réduit à R quand α s'évanouit, sera développable, suivant les puissances entières, positives et négatives de x , en une série convergente dont les deux modules seront

$$\frac{1}{Rr} \quad \text{et} \quad \frac{r}{R}$$

Ces memes modules se réduiront l'un et l'autre a la fraction

$$\frac{1}{R}$$

si le module r de la variable x se réduit à l'unité

§ III — Observations relatives aux fonctions discontinues

Les formules (11) et (5) du § I^{er}, dans lesquelles

$$(1) \quad u = f(x)$$

représente une fonction explicite ou meme implicite de la variable imaginaire

$$(2) \quad x = r e^{\sqrt{-1} \varphi}$$

supposent que cette fonction reste continue, par rapport au module r , entre les limites 0 et R , ou r_0 et R , et par rapport à l'argument φ entre les limites $-\pi$, $+\pi$. Elles supposent par suite, non-seulement que u varie par degrés insensibles avec le module φ , mais encore que u reprend la même valeur quand l'angle φ se trouve augmenté d'une circonférence entiere. Si cette dernière condition cessait d'être remplie, les formules (1) et (5) devraient subir des modifications que nous allons indiquer, en nous occupant seulement de la formule (5), qui comprend comme cas particulier la formule (1)

Supposons u déterminé en fonction de x par l'équation (1), ou meme par une équation de la forme

$$(3) \quad I(u, x) = 0$$

On aura, eu égard à la formule (2),

$$(4) \quad D_x u = \frac{1}{r\sqrt{-1}} D_\varphi u,$$

et l'on peut observer qu'une racine u de l'équation (3) satisfait généralement à la condition (4), lors même que cette racine ne reprendrait pas les mêmes valeurs quand on fait croître l'argument φ d'une circonférence. Ainsi, en particulier, l'équation (4) sera satisfaite si l'on prend pour u la racine

$$(5) \quad u = 1(r) + \varphi \sqrt{-1}, \quad < 1^{\text{st}} \text{ } >$$

qui vérifie l'équation

$$e^u = x$$

ou la racine

$$(6) \quad u = r^{\frac{1}{m}} e^{\frac{2\pi\sqrt{-1}}{m}}$$

qui vérifie l'équation

$$u^m = x$$

m étant un nombre entier supérieur à l'unité. Mais ces deux racines, si l'argument φ peut varier depuis la limite $-\pi$ jusqu'à la limite $+\pi$ seront des fonctions discontinues de φ et par conséquent de x , attendu que leurs valeurs seront altérées, quand on passera de la limite $\varphi = -\pi$ à la limite $\varphi = \pi$.

Supposons maintenant que la fonction

$$u = f(x),$$

et sa dérivée relative à x , soient des fonctions discontinues de x , analogues à celles que déterminent les formules (5), (6), c'est-à-dire des fonctions dont la discontinuité consiste seulement en ce qu'elles changent de valeurs quand on passe de la limite $\varphi = -\pi$ à la limite $\varphi = \pi$. Si l'on intègre les deux membres de l'équation (4) par rapport à φ entre les limites $-\pi, \pi$, et par rapport à r entre les limites r_0, R , alors, en écrivant p au lieu de φ , et v au lieu de r , en posant d'ailleurs, pour abréger,

$$y = r_0 e^{p\sqrt{-1}}, \quad z = R e^{p\sqrt{-1}},$$

et en désignant par

$$A\sqrt{-1}$$

l'accroissement que prend le facteur u quand l'argument φ passe de la limite $-\pi$ à la limite $+\pi$, on trouvera

$$(7) \quad \int_{-\pi}^{\pi} f(z) dp - \int_{-\pi}^{\pi} f(y) dp = \int_{r_0}^R \frac{A}{v} dv.$$

Si dans cette dernière équation l'on remplace $f(z)$ par le produit

$$z \frac{f(z) - f(x)}{z - x},$$

on obtiendra une formule nouvelle analogue à l'équation (5) du § I Cette formule nouvelle sera

$$(8) \quad f(x) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \frac{u f(u)}{u-x} dp - \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \frac{v f(v)}{v-x} dp - \Delta,$$

la valeur de Δ étant

$$(9) \quad \Delta = \frac{1}{2\pi} \int_r^R \frac{R dv}{v+x}$$

Si, pour plus de simplicité, on écrit

$$u, v, w$$

au lieu de

$$f(x), f(y), f(z),$$

alors v, w seront ce que devient u quand on pose successivement

$$r = r_0, \quad r = R,$$

en remplaçant d'ailleurs φ par p , et l'équation (8) se présentera sous la forme

$$(10) \quad f(x) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \frac{z v}{z-x} dp - \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \frac{y w}{y-x} dp - \Delta,$$

Δ étant toujours déterminé par la formule (9)

Il importe d'observer que des intégrales comprises dans le second membre de la formule (10), la première peut être développée suivant les puissances positives de la variable x , et la seconde suivant les puissances négatives de la même variable, les coefficients des diverses puissances étant indépendants du module r aussi bien que de l'argument φ . Quant à la valeur de Δ , on peut la présenter sous la forme

$$(11) \quad \Delta = \frac{1}{2\pi} \int_r^R \frac{R dv}{v+x} + \frac{1}{2\pi} \int_r^r \frac{R dv}{v+x},$$

et par conséquent la décomposer en deux intégrales qui soient elles-mêmes développables, la première suivant les puissances positives, la seconde suivant les puissances négatives de x . Mais, dans les deux nouveaux développements ainsi obtenus, les divers coefficients, en restant indépendants de l'angle φ , deviendront évidemment fonctions du module r .

Si, pour fixer les idées, on suppose la fonction u déterminée par la formule (5), $R\sqrt{-1}$ sera l'accroissement que prendra cette fonction quand on fera croître φ de la circonférence 2π . On aura donc $R\sqrt{-1} = 2\pi\sqrt{-1}$,

$$R = 2\pi$$

Alors aussi on tirera de la formule (5), en y écrivant p au lieu de φ , et remplaçant r par r_0 ou par R ,

$$v = l(r_0) + p\sqrt{-1}, \quad w = l(R) + p\sqrt{-1}$$

Cela posé, l'équation (10) donnera

$$l(r) + \varphi\sqrt{-1} = l(R) + \frac{\sqrt{-1}}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \frac{px}{s-x} dp - \frac{\sqrt{-1}}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \frac{py}{y-x} dp - \Delta,$$

puis on en conclura, en intégrant par parties, de manière que le facteur p se trouve différentié,

$$(12) \quad l(r) + \varphi\sqrt{-1} = l(R) + l\left(1 + \frac{x}{R}\right) - l\left(1 + \frac{r}{x}\right) - \Delta,$$

tandis que la formule (11), réduite à

$$\Delta = \int_r^R \frac{dv}{v+x} + \int_{r_0}^r \frac{dv}{v+x},$$

donnera

$$(13) \quad \Delta = l\left(\frac{R+x}{r+x}\right) + l\left(\frac{x+r}{x+r_0}\right),$$

et par suite

$$\begin{aligned} \Delta &= l\left(\frac{R}{r}\right) - l\left(1 + \frac{x}{R}\right) + l\left(1 + \frac{r}{x}\right) \\ &= -l\left(1 + \frac{x}{r}\right) + l\left(1 + \frac{r}{x}\right) \\ &= -2\left(\sin \varphi - \frac{\sin 2\varphi}{2} + \frac{\sin 3\varphi}{3} - \text{etc.}\right)\sqrt{-1} \end{aligned}$$

Or, en égard à la dernière formule, on tirera de l'équation (12), pour toutes les valeurs de φ comprises entre les limites $-\pi$, $+\pi$,

$$(14) \quad \frac{1}{2}\varphi = \sin \varphi - \frac{\sin 2\varphi}{2} + \frac{\sin 3\varphi}{3} - \text{etc.},$$

et l'on se trouvera ainsi ramené à une équation déjà connue.

M le **PRESIDENT** rappelle que, dans le cours de l'année qui vient de s'écouler, l'Académie a perdu plusieurs de ses correspondants, en conséquence, il invite les Sections de Géométrie, d'Économie rurale, d'Anatomie et de Zoologie, de Médecine et de Chirurgie, à se réunir le plus promptement possible pour préparer des listes de candidats aux places de correspondants qui sont vacantes dans leur sein

RAPPORTS

GÉOLOGIE — *Rapport sur un Mémoire de M ROBERT, ayant pour titre*
Sur les volcans de l'Auvergne

(Commissaires, MM Al Brongniart, Dufrénoy rapporteur)

Guettard et Malesherbes, au retour d'un voyage qu'ils firent en Italie en 1751, pour étudier les phénomènes qui accompagnent les éruptions du Vésuve, traversèrent la France centrale à la disposition conique des montagnes qui dominent Clermont, la nature de leurs roches, la forme de leurs pentes tout enfin rappela à ces deux académiciens les terrains volcaniques des environs de Naples. Il leur semblait fouler encore les scories brûlantes du Vésuve, et les cratères éteints de la chaîne des Puys leur présentèrent l'image des bouches fumantes qu'ils venaient de visiter. Guettard fit connaître cette découverte, qui alors parut surprenante, dans un Mémoire (1) qu'il présenta à l'Académie des Sciences, en 1752, la découverte du savant académicien trouva d'abord, comme la plupart des idées nouvelles, de nombreux contradicteurs et devint un sujet d'études pour les naturalistes.

Desmarest donna, quelques années plus tard, des preuves irrécusables de la nature volcanique de la chaîne des Puys et même des roches basaltiques (2) qui diffèrent essentiellement, par leur compacité et leur état cristallin, des produits des volcans actuels. Ce savant distribua en époques les terrains de l'Auvergne et en fit alors une classification (3) qui est encore adoptée en grande partie.

(1) Mémoire sur quelques montagnes de la France qui ont été des volcans, par M Guettard *Histoire de l'Académie royale des Sciences*, année 1752, page 27

(2) Mémoire sur la nature du basalte *Histoire de l'Académie*, année 1771, page 72

(3) Mémoire sur la détermination de quelques époques de la nature par les produits des volcans et sur l'usage de ces époques dans l'étude des volcans *Histoire de l'Académie des Sciences*, année 1775

C'est à la suite de cette intéressante discussion qu'un géologue, devenu si justement célèbre par son esprit philosophique et par les grandes vérités qu'il a introduites dans la science, M. de Buch frappé de la variété des phénomènes de l'Auvergne, écrit à Pictet : Si vous voulez voir des volcans n'allez pas en Italie, mais choisissez Clermont de préférence au Vésuve et à l'Etna.

« C'est qu'en effet le Vésuve, malgré ses éruptions fréquentes, l'Etna, malgré sa masse imposante qui domine la Sicile et la Calabre ne montrent pas cette diversité d'accidents qui rendent l'étude de la chaîne des Puys si instructive. Nulle part, en Italie on n'observe des coulées longues et étroites, comme celles de Gravenenc et de Murol, qui se sont répandues pendant des lieues entières dans le lit des vallées, dont elles ont suivi toutes les sinuosités se contournant au moindre obstacle, comme l'eau qui, dans sa marche tranquille, rencontre un rocher sur son passage.

Depuis cette époque, l'Auvergne est devenue un pèlerinage oblige pour tout géologue, il y recueille une abondante moisson de faits intéressants, et souvent ses recherches sont récompensées par des découvertes qui enrichissent la science et font faire un pas à l'histoire du globe. M. Rozet, capitaine d'état-major, appelé par les travaux géodésiques de la nouvelle carte de France à mesurer chacun des cônes volcaniques de l'Auvergne, à suivre pas à pas les coulées qui se sont échappées de leurs flancs, a consacré pendant deux ans, presque tous ses moments à étudier les phénomènes qui se développaient sous ses yeux. Ce long séjour dans la patrie des volcans a permis à M. Rozet, malgré les nombreux travaux dont l'Auvergne a été le sujet, et dont plusieurs, comme la *Carte de Desmarest* et l'*Essai sur la théorie des volcans*, par M. le comte de Montlosier, ont acquis une juste réputation à leurs auteurs, de faire le Mémoire remarquable que l'Académie a chargé M. Brogniart et moi d'examiner, et dont nous lui rendons compte dans ce moment.

« Le sol de l'Auvergne est composé de cinq ordres de formations, savoir les *terrains granitiques*, le *terrain houiller*, le *terrain tertiaire*, le *terrain diluvien*, enfin les *terrains volcaniques*. M. Rozet donne, au commencement de son Mémoire, un aperçu général de ces différentes formations, mais les dernières seulement ont fourni à l'auteur des observations nouvelles, et nous croyons devoir consacrer spécialement ce Rapport à les indiquer à l'Académie.

« Les *terrains volcaniques* forment, dans l'opinion générale des géolo-

gues, trois groupes distincts par leur âge et par l'ensemble des phénomènes qui s'y rattachent. Ce sont (1)

1° Les *trachytes*, 2° les *basaltes*, 3° les *volcans laviques*

» Cette distribution est établie sur la position relative des roches. Ainsi le trachyte est traversé par de nombreux filons de basalte qui, après s'être élevés de l'intérieur de la terre à travers les terrains préexistants, se sont répandus ensuite en nappes à leur surface. Il résulte de cette disposition que presque partout où ces deux roches volcaniques se trouvent réunies, on voit le basalte former un manteau général sur le trachyte, et, sans les coupures profondes ouvertes plus tard dans les montagnes trachytiques, cette roche n'apparaîtrait au jour que sur quelques points que les basaltes n'auraient pu recouvrir.

» Les laves qui forment la dernière période des éruptions volcaniques pénètrent à la fois dans les terrains trachytiques et dans les terrains basaltiques, mais plus souvent encore leur postériorité est établie par les nombreux fragments de l'une et de l'autre de ces roches qu'elles ont entraînés dans leur passage et qu'elles ont enveloppées à la manière des galets dans les poulingues.

La distinction que nous venons de rappeler entre les trois ordres de roches volcaniques se reproduit dans la nature même de ces roches, ainsi que dans les différentes circonstances de leur gisement, de sorte que là où l'on n'aperçoit ni les filons postérieurs ni les fragments que nous venons de signaler, on peut presque toujours établir l'âge de la formation volcanique par ses caractères minéralogiques et par la disposition de ses roches.

M. Rozet a reconnu et adopté ces trois périodes dans les phénomènes volcaniques de l'Auvergne, son Mémoire est divisé en plusieurs chapitres qui correspondent à chacune d'elles. Nous suivrons la marche de l'auteur, qui est à la fois la plus logique et la plus commode pour l'étude.

Le terrain trachytique forme trois groupes principaux, qui dominent le vaste plateau granitique qui occupe le centre de la France, ils lui impriment le principal caractère de son relief par les nombreuses vallées qui en divergent en tous sens, pour se rendre dans la Méditerranée, dans le golfe de la Gironde ou dans la mer du Nord. Ces groupes trachytiques sont le *Mézenc*, ou la Loire et l'Allier prennent leur source; le *Cantal*, dont le massif imposant donne son nom au département qu'il recouvre en grande partie; enfin

(1) Tableau des terrains, par M. de Brongniart, 1829.

les monts Dore, qui donnent naissance à plusieurs des rivières qui se rendent dans le golfe de la Gironde, et entre autres à la Dordogne, qui, par la longueur de son parcours et le volume de ses eaux, a mérité à son embouchure le nom de mer

» M. Rozet a étudié les deux derniers groupes, le Cantal, formé presque entièrement de trachyte, offre l'aspect général d'un vaste cône dont le centre est occupé par un gigantesque évasement de plus de 8 kilom. de diamètre des vallées profondes en divergent de tous côtés comme les rayons d'une roue, et communiquent à l'ensemble de cette montagne un caractère particulier, qui, joint à plusieurs phénomènes, nous a autorisés, M. Elie de Beaumont et moi, à le désigner sous le nom de *cratère de soulèvement* (1). Le trachyte qui le compose se présente ordinairement sous la forme de grandes nappes se relevant par une pente douce vers la dépression centrale. Son aspect général est celui d'une brèche dont les fragments et la pâte de même nature ne sauraient être distingués, malgré cette apparence fragmentaire toutes ses parties sont contemporaines on le désigne spécialement sous le nom de *tuf trachytique*, expression qui rappelle l'idée que la matière, sortie du sein de la terre à l'état pâteux, a donné naissance, dans la bouche volcanique même, à des fragments qui se sont soudés immédiatement par la masse affluente. Cette disposition de la roche, qui est dévoilée par tous les escarpements, est mise dans tout son jour dans le tunnel que l'on vient de percer sur 1200 mètres de long, entre les vallées d'Aurillac et de Murat, sur la route de Paris à Montpellier, pour en rendre le passage moins dangereux en hiver. Cette même galerie donne les moyens d'étudier les nombreux filons qui traversent cette masse de tuf trachytique.

L'uniformité de la roche, dans laquelle est ouvert le tunnel du Lioran, est un des faits les plus intéressants que nous dévoile ce grand travail d'art elle nous apprend que sur toute cette longueur on est dans une seule et même nappe de trachyte, circonstance qui ne peut s'allier avec la supposition admise par quelques géologues, que le massif du Cantal a été produit par l'accumulation de déjections successives, cette uniformité est, au contraire, une des preuves les plus certaines de sa formation par voie de soulèvement.

» M. Rozet fait remarquer que parmi les nombreux filons qui traversent le tuf trachytique, plusieurs sont composés de *phonolite*. Le plus considé-

(1) Mémoire sur les groupes du Cantal et du Mont Dore, et sur les soulèvements auxquels ces montagnes doivent leur relief actuel, par MM. Dufrénoy et Elie de Beaumont, ingénieurs des Mines.

vable, ajoute l'auteur, est le cône du puy de *Griou*, qui s'élève majestueusement au milieu du grand cirque, décrit plus haut. Il en existe encore deux autres moins considérables, entre le puy *Violent* et le puy *Marie*.

Le phonolite est donc plus moderne que le trachyte, mais, en même temps, M. Rozet annonce que le phonolite ne traverse jamais le basalte, son arrivée au jour serait, selon l'auteur, intermédiaire aux deux premières époques volcaniques que nous avons assignées, ou plutôt cette dernière roche serait un des derniers épanchements trachytiques. La conclusion que nous venons de rapporter nous paraît trop absolue. Dans notre opinion, le phonolite peut s'être épanché à plusieurs époques, dont l'une d'elles serait postérieure au basalte, c'est même à cette roche que M. Fie de Beaumont et moi nous avons rapporté la formation du relief actuel du Cantal, qui est évidemment postérieur à l'épanchement du basalte, dont les nappes affectent la même inclinaison que cette dernière roche.

Les montagnes des monts Dore constituent un immense massif au centre duquel il existe, comme au Cantal, un large évaseement, ce vide n'est pas aussi régulier que celui du Cantal, de sorte qu'on n'y reconnaît pas immédiatement la forme d'un cratère, mais si ce caractère est moins prononcé qu'au Cantal, la succession des nappes de trachyte est, au contraire, beaucoup plus marquée. « On les observe d'une manière très-distincte dans la vallée des Bains, où l'on compte cinq nappes superposées les unes aux autres, des assises régulières de lapilli ou de tuf ponceux les séparent, et simulent une véritable stratification que l'on retrouve dans toutes les vallées profondes dont les flancs escarpés mettent le terrain à nu sur une grande épaisseur.

La description que nous venons de transcrire est le résumé d'observations nombreuses faites, par M. Rozet, dans tout le massif du Mont-Dore, elle fournit une preuve presque matérielle en faveur de l'opinion qui consiste à supposer les montagnes trachytiques du centre de la France comme devant leur relief actuel à un soulèvement postérieur à la formation de leurs roches, en effet, les volcans en activité qui servent naturellement de points de comparaison pour expliquer la formation et l'origine des volcans de l'ancien monde ne présentent rien d'analogue, les coulées de laves longues et étroites ne forment sur les pentes du Vésuve ou de l'Etna, que des lamères qui en occupent au plus un soixantième de leur surface, en sorte que pour qu'il se forme une nappe sur tout le pourtour d'un de ces volcans, il faut qu'elle s'accumule au moins soixante coulées posées les unes à côté des autres; dans ce cas, au lieu

d'obtenir la continuité parfaite signalée par M. Rozet, et dont le tunnel du Cantal nous donne un exemple remarquable le cirque intérieur d'un volcan moderne doit présenter des lignes qui se croisent dans tous les sens, et son aspect varie à chaque instant avec la nature des coulées.

Après avoir fait connaître les principaux phénomènes que présente le groupe du Mont Dore, M. Rozet termine l'étude du trachyte par une description du Puy-de-Dôme, montagne qui a toujours fixé l'attention des géologues par sa forme particulière, par son isolement au milieu de la chaîne des Puys, la nature désagrégée de la roche, et sa hauteur considérable qui domine tout le pays.

Le chapitre suivant du Mémoire de M. Rozet est consacré aux phénomènes basaltiques. L'auteur commence par faire remarquer que l'uniformité du basalte, qui se présente toujours avec les mêmes caractères extérieurs et la même disposition a été cause que son étude a été généralement négligée.

La plupart des naturalistes qui ont visité l'Auvergne, dit-il, n'ont étudié avec détail que certains dépôts basaltiques remarquables par leur association avec les terrains tertiaires ou par d'autres circonstances géologiques.

Le long séjour de M. Rozet en Auvergne, l'examen circonstancié du terrain qu'il a été obligé de faire pour les travaux topographiques de la carte de France lui ont donné l'occasion de visiter les différents mamelons basaltiques et lui ont permis de trouver l'origine de chacune des nappes que cette roche constitue, cette étude presque minutieuse a conduit M. Rozet à donner une description de tous les points occupés par le basalte. Nous ne saurions dans un Rapport, suivre cette marche qui exigerait des descriptions qu'on ne pourrait comprendre sans le secours d'une carte, mais nous félicitons M. Rozet de l'avoir adoptée, elle donne à la géologie un cachet de certitude qui lui a été quelquefois trop étranger et qui cependant permet seul de comparer entre eux les grands phénomènes de la nature et d'en donner une explication rationnelle.

La détermination exacte des hauteurs de chacune des masses basaltiques a conduit M. Rozet à détruire l'opinion longtemps admise, que toutes les nappes, tous les pitons basaltiques de l'intérieur de la Limagne étaient les restes d'une vaste nappe qui s'était jadis étendue sur toute la contrée, et qui avait été ensuite déchirée par les courants diluviens. Peut-être, comme cela est naturel à l'esprit humain, M. Rozet tombe-t-il dans un excès contraire et pousse-t-il trop loin la conséquence intéressante qui résulte de ses observations, en admettant un trop grand nombre de nappes séparées, il nous

semble que souvent la même nappe basaltique doit s'être fait jour en des points différents au même moment, et dans ce cas, les coulées, quoique ayant des points de départ à des hauteurs diverses, ont pu se réunir en une seule nappe

« Nous nous permettrons de soumettre à l'auteur du grand travail que nous examinons dans ce moment devant l'Académie, une seconde observation, elle est relative au passage qu'il admet entre les trachytes et les basaltes, il dit à cet égard Dans les massifs du Cantal et du Mont-Dore, les basaltes sont intimement liés aux trachytes sur une foule de points On voit les deux roches passer insensiblement de l'un à l'autre

Cette opinion, opposée à celle que nous avons indiquée au commencement de ce Rapport, en donnant la division des terrains volcaniques, nous paraît contraire à la position générale des trachytes et des basaltes, position indiquée par l'auteur même Nous avons fait remarquer, en effet, que le basalte forme de nombreux filons dans le trachyte, tandis que l'inverse ne se représente jamais, mais ce qui nous paraît surtout caractéristique, c'est que nulle part on n'observe de nappes basaltiques intercalées dans les escarpements trachytiques, tandis que l'on observe constamment au contraire, soit au Cantal au Mont-Dore ainsi que dans la chaîne des Pays, que le basalte recouvre le trachyte, il forme une espèce d'auréole autour des montagnes que cette dernière roche constitue, et simule un vaste plateau déposé plus tard sur leur surface, qui serait continue sans les vastes déchirures marquées par les vallées

Cette différence d'opinion entre M. Rozet et vos Commissaires ne tient peut-être qu'à une différence dans la détermination des roches, ce que nous serions portés à croire par le passage relatif à la roche qui recouvre le plomb du Cantal, et que M. Rozet décrit, dans les termes suivants, comme appartenant au trachyte

« La roche brune qui forme tant de filons forme aussi une grande partie des dernières coulées trachytiques, que plusieurs géologues regardent comme des basaltes J'y rapporterais aussi le dyke du plomb du Cantal et tous les filons qui sont à l'entour, seulement, ici cette roche est un peu plus basaltique qu'ailleurs

« Le basalte, essentiellement composé de pyroxène, est souvent, en outre, caractérisé par des cristaux de péridot Dans la roche du plomb du Cantal, ces deux minéraux y sont fort distincts Vos Commissaires ne peuvent donc admettre le passage signalé par M. Rozet, qui n'existe pas dans les roches, et qui, suivant eux, ne saurait exister dans les phénomènes qui les ont

produits, ils croient, à cette occasion, devoir rappeler que l'étude minéralogique des roches doit presque toujours précéder l'examen de leur position géologique, car souvent la détermination exacte de leur nature devient un guide précieux pour la détermination du terrain qu'elles constituent.

Le dernier chapitre du travail de M. Rozet est consacré à la troisième période volcanique désignée sous le nom de *lavique*, la conservation des bouches d'où se sont épanchées les laves, leur identité de forme avec les cratères des volcans brûlants, la disposition régulière des couches qui portent encore partout l'empreinte du mouvement, ont été cause que, dès les premiers moments de la découverte de Guettard, l'attention des géologues s'est portée spécialement sur l'étude de cette partie de l'Auvergne. Chaque cratère a été visité et décrit avec soin, les travaux de M. Rozet sur cette période volcanique ne présentent donc que peu de faits nouveaux et que nous ne saurions analyser. Mais si M. Rozet n'a pu que glaner dans l'abondante moisson faite par ses devanciers, il a groupé leurs observations d'une manière intéressante, et les rapprochements qu'il a faits sur la distribution des cratères ainsi que sur la position des centres d'éruption des trachytes et des basaltes ont conduit l'auteur à déterminer trois lignes de direction suivant lesquelles les éruptions volcaniques ont eu lieu. Nous terminerons ce Rapport par l'exposition de ces considérations théoriques, qui donnent au Mémoire de M. Rozet, entrepris sur un sujet qu'on supposerait épuisé, un aspect nouveau et plein d'intérêt.

Pour rendre ces considérations plus faciles à saisir nous les présentons sous la forme de conclusions, et nous emprunterons en grande partie les paroles de l'auteur, qui sont empreintes d'une grande clarté.

1° Les trachytes forment les massifs du Cantal, du Mont Dore, du Puy-de-Dôme, et constituent la base du massif du Cézalier, ils ont fait éruption suivant deux grandes fentes pareillement dirigées qui se trouvent étroitement parallèles à la direction des Alpes françaises. Les trachytes, ajoute M. Rozet, ont percé le granite, le terrain tertiaire, et ont même recouvert le plus ancien des trois dépôts diluviens. Leurs lignes d'éruption ont croisé celle N. S. de la chaîne occidentale, à la hauteur du Cézalier et du Puy-de-Dôme.

2° La grande masse des éruptions basaltiques a suivi assez exactement les deux rameaux qui traversent la Limagne, et réunissent les deux chaînes du Forez et de l'Auvergne, dont l'une se trouve exactement sur le prolongement de la chaîne principale des Alpes, et l'autre qui est parallèle. La direction générale, suivie par les éruptions de cette époque, fait

« un angle de 60 degrés environ avec celles des éruptions trachytiques. Mais la matière en fusion, profitant des fentes déjà déterminées dans le sol par les dislocations des époques de soulèvement du mont Viso, de la Corse et des Alpes occidentales, s'est répandue au dehors de cette bande suivant des directions obliques et même perpendiculaires à celles-ci sur une étendue en longueur qui va jusqu'au quart de celles des grandes lignes.

Au sud de Saint-Flour il existe une troisième bande d'éruptions basaltiques parallèle aux deux autres, mais que M. Rozet n'a étudiée qu'à son extrémité orientale.

3° Les basaltes se sont épanchés par une infinité d'ouvertures, dont plusieurs sont encore parfaitement reconnaissables, beaucoup présentent des cônes de scories plus ou moins considérables, mais sur aucun on ne voit de cratères semblables à ceux qui ont vomis les coulées de laves.

4° Les nappes basaltiques ne sont compactes que lorsque l'inclinaison sous laquelle elles ont coulé ne dépasse pas 2 degrés. Lorsque l'inclinaison est plus forte, elles sont toujours scoriacées, enfin lorsqu'elles se sont répandues sous un angle de 6 degrés, elles se sont précipitées à la manière des laves. Lors donc qu'on observe des nappes ou des parties de nappes de basalte dont la texture est compacte sous une inclinaison de 8 à 12 degrés, comme cela a lieu au Mont-Dore et au Cantal, on doit en conclure qu'elles ont été dérangées postérieurement à leur consolidation.

5° Les cratères modernes d'où sont sorties des coulées de laves semblables à celles du Vésuve et de l'Etna sont placées sur le flanc du grand bombement de la chaîne du Puy-de-Dôme, suivant deux lignes éloignées de 6 kilomètres l'une de l'autre dans une direction nord-sud parallèle au soulèvement de la Corse, et qui fait avec les éruptions basaltiques un angle de 85 degrés. La plus grande partie des cratères est contenue dans un cirque elliptique très-allongé dans le sens du nord au sud, formé par des escarpements granitiques dont la hauteur dépasse 80 mètres. C'est par les fractures qui interrompent la continuité du cratère elliptique que les coulées de lave ont passé pour se répandre au loin.

M. Rozet remarque que les trois directions qu'il a signalées comme ayant présidé aux différentes éruptions volcaniques sont empreintes sur le sol de l'Auvergne par les accidents que présente son relief.

« Les fentes de l'époque trachytique sont moins apparentes que les autres, parce qu'elles ont été modifiées par celles des époques basaltiques et tertiaires, cependant on les reconnaît distinctement dans les vallées des pentes nord et sud du Cantal et du Mont-Dore. La carte de Cassini, quoique

sont imparfaite dans les parties de hautes montagnes, montre cette disposition.

Les fentes de l'époque basaltique sont les plus étendues et les mieux marquées, la vallée de la Bertrande au Cantal, qui s'étend vers l'ouest sur une longueur de 6 myriamètres, est une des fentes de cette époque; à l'est, cette même fente est représentée par la vallée de l'Allagna, comprise entre le Toran et Jourzac.

An nord du Mont-Dore, les vallées comprises entre les villages de la Queuille et de Naboussac, qui vont porter leurs eaux dans la Sioule, appartiennent à l'époque lavique, un des caractères de ces vallées, c'est de couper les nappes basaltiques, et par suite d'avoir été ouvertes postérieurement à l'épanchement de cet ordie de roches volcaniques.

M Fournet, dans son Mémoire sur le Mont-Dore (1), et dans son travail sur les filons (2), avait déjà indiqué au Mont-Dore des axes de soulèvement dans la direction du système des Alpes occidentales et de la chaîne principale des Alpes. Votre rapporteur avait également rapproché dans son Mémoire sur le Vesuve (3) les trachytes d'Ischia de ceux du Mont-Dore et du Cantal, et il avait coordonné l'époque de leur épanchement avec le soulèvement de la chaîne des Alpes.

Plus anciennement, M Élie de Beaumont, dans ses Recherches sur quelques-unes des révolutions de la surface du globe, avait signalé le parallélisme de la chaîne des Pnyx avec les accidents du système des îles de Corse et de Sardaigne.

M Rozet a embrassé l'ensemble des différents terrains volcaniques de l'Auvergne, et il a assigné pour chacun des trois groupes qui les constituent non-seulement l'époque géologique de leur épanchement, mais les directions suivant lesquelles elles ont eu lieu, ainsi que les zones qu'elles occupent. Ces rapprochements curieux établissent une liaison intime entre les phénomènes volcaniques et les phénomènes généraux du globe, et si l'origine des volcans était encore un problème, comme il y a quelques années, si les géologues n'étaient pas convaincus que les éruptions volcaniques prennent leur source dans la chaleur centrale de la terre, comme cela a eu lieu pour l'épanche-

(1) Aperçus sur les révolutions successives qui ont produit la configuration actuelle des Monts Dore, par M J Fournet *Ann des Mines*, 1834, vol V, p 237.

(2) Études sur les dépôts métallifères, par M J Fournet, 1835.

(3) Mémoire sur les terrains volcaniques des environs de Naples, 1834.

ment des roches cristallines de tous les âges géologiques, les observations importantes de M Rozet nous révéleraient ce fait si intéressant pour l'histoire de notre globe

M Rozet, desirant de comparer les terrains de l'Auvergne avec ceux de l'Italie, a visité il y a peu de mois, les environs de Naples Il a remis à votre Commission une Note sur les observations qu'il a faites sur le Vésuve et sur les champs phlégréens, une éruption récente lui a permis d'observer la marche des coulées Il a vérifié de nouveau ce fait important pour l'histoire des volcans, que, sur une inclinaison supérieure à 10 degrés, la lave ne s'arrête pas sur les parois du cône, et qu'elle se précipite à sa base, à la manière d'un torrent, que par suite, le Vésuve actuel ne saurait être le résultat d'une simple accumulation de la lave, et qu'une cause plus puissante a dû participer à sa formation Les autres observations de M Rozet sont presque entièrement conformes à celles que votre rapporteur a déjà consignées dans le Mémoire sur les terrains volcaniques des environs de Naples qu'il a cité plus haut, il paraît donc inutile de les rappeler

L'analyse que nous venons de faire du Mémoire de M Rozet doit avoir prouvé à l'Académie que ce travail, fruit de longues recherches, est rempli d'observations intéressantes, et que les considérations générales que l'auteur en a déduites établissent une relation remarquable entre les actions volcaniques et les phénomènes généraux du globe

Nous avons en conséquence l'honneur de proposer à l'Académie d'approuver le Mémoire de M Rozet, nous proposerions également son insertion dans le *Recueil des Mémoires des Savants étrangers* à l'Académie si nous ne savions que son auteur a l'intention d'en faire une publication spéciale

Les conclusions de ce Rapport sont adoptées

MEMOIRES LUS

CHIMIE VÉGÉTALE — *Recherches sur la composition élémentaire des différents bois, et sur le rendement annuel d'un hectare de forêts, par M. E. CAVENDISH* Premier Mémoire (Extrait par l'auteur)

(Commissaires, MM. Murbel, Dumas, Boussingault, Payen.)

« Le Mémoire que j'ai l'honneur de présenter à l'Académie se résume dans les conclusions suivantes »

1° Le produit moyen annuel de deux futaies de hêtre situées dans le grès bigarré est d'environ 9 stères de bois par hectare;

2° Le poids moyen du bois sec produit par hectare dans ces forêts est de 230 000 kilogrammes par année

3° Le carbone contenu dans le bois produit par 1 hectare s'élève à 1 800 kilogrammes par année,

4° L'hydrogène libre contenu dans le bois produit par 1 hectare s'élève à 26 kilogrammes par année,

5° L'azote contenu dans le bois produit par 1 hectare s'élève à 34 kilogrammes par année,

6° Les cendres contenues dans le bois produit par 1 hectare s'élèvent à 50 kilogrammes par année

7° Une forêt végétant dans ces conditions dépouillerait en neuf années de tout son acide carbonique le prisme d'air qui s'appuie sur elle

Voici les principaux renseignements nécessaires pour juger comment ces résultats ont été obtenus

En considérant les études forestières sous ce point de vue analytique, la première question qui se présente est de reconnaître, pour chaque essence le poids du stère sec et sa composition élémentaire

Puis viennent la détermination du produit réel c'est-à-dire du rendement moyen annuel d'un hectare de forêts en carbone, hydrogène, oxygène, azote et cendres la comparaison de ce rendement annuel pour différentes forêts et pour les terrains exploités par l'agriculture

Enfin l'analyse des cendres qui, indépendamment de ce qu'elle peut avoir d'intéressant par elle-même, prendra une importance toute nouvelle lorsqu'on la comparera à celle du sol sur lequel le bois a été coupé afin de chercher dans ce rapprochement quelques lumières tant sur l'influence qu'exerce la composition du sol sur la végétation que sur la nécessité des assolements en sylviculture comme en agriculture, nécessité qui paraît bien démontrée

Mes expériences ont porté sur plus de 600 stères de chêne, hêtre, charme, bouleau, tremble, aune, saule, sapin et pin, coupés pendant l'hiver dernier dans des terrains de grès vosgien, grès bigarré et muschelkalk, et dans toutes les circonstances d'exposition ou de sol qui me présentaient 4 000 hectares de bois dont la direction m'est confiée,

Les calculs sur le rendement moyen annuel porteront sur des périmètres variant de 25 à 80 ans, et comprendront environ 15 000 hectares situés, à

partir du Donon sur le versant occidental des Vosges dans le grès vosgien, le grès bigarre et dans les terrains de muschelkalk et les marnes irisées qui viennent s'appuyer contre ces montagnes

Bien que mon travail ne soit pas encore complet je puis en donner les résultats pour deux parties de futaies de hêtre presque pures pendant des périodes de 69 et 58 années, et comme ce sont, dans les circonstances locales où je me suis placé, les seules forêts régulières sur le produit desquelles j'ai pu me procurer des documents positifs, elles m'ont semblé de nature à être épurées des autres et à former pour ainsi dire un chapitre d'introduction au travail plus étendu que j'ai eu l'honneur de soumettre plus tard au jugement de l'Académie

J'ai réuni tous ces chiffres en deux tableaux donnant, coupe par coupe, le nombre de stères et de fagots (*) enlevés de la forêt

Il en résulte que l'accroissement annuel sur 1 hectare a été

Pour la forêt des Fesches	de 9 ^{me} 224	et 86 fagots
Pour la forêt du Sandwæch	de 9 ^{me} 617	et 114 fagots

Les poids du stère ou du cent de fagots parfaitement secs ont été déterminés au moyen d'échantillons réduits en poudre, chauffés à plusieurs reprises à 140 degrés et placés dans le vide sec jusqu'à ce qu'ils ne présentassent plus de pertes sensibles. Lorsque je pourrai soumettre à l'Académie mon travail complet sur la définition chimique du stère des différentes essences et dans différents terrains, toutes ces expériences et les tableaux qui les résument formeront un ensemble qui justifiera les chiffres que j'avance aujourd'hui

En comparant entre eux les résultats des analyses précédentes pour les divers échantillons d'une même essence, on voit qu'ils sont à très-peu de chose près constants, les cendres exceptées. Les différences qu'ils présentent rentrent dans les limites des erreurs d'analyses ou des inégalités qui ont pu avoir lieu dans les mélanges de sciure

J'ai donc réuni toutes les analyses relatives à une même essence et adopté la moyenne comme en représentant la composition élémentaire

(*) Fagots de 0^m 645 de circonférence et 0^m,906 de longueur

		Hêtre	Chêne	Boisau	Tremble	Saule
Les cendres deduites	Carbone	49 89	50 64	50 61	50,31	51 75
	Hydrogène	6 07	6 03	6 23	6,32	6 19
	Oxygène	43 11	42 05	41 04	42,39	41 08
	Azote	0 93	1 28	1 12	0,98	0 98
		100 00	100 00	100 00	100,00	100 00

La production annuelle par hectare a été

	Carbone	Hydrogène	Oxygène	Azote	Cendres
Pour les Fesches	1754 ^k	213 ^k	1507 ^k	133 ^k	48 ^k
Pour le Sandwæch	1854	225	1586	36	53

En comparant la quantité de carbone produite annuellement en moyenne par un hectare à celle contenue dans un prisme d'air dont cet hectare serait la base et qui s'élèverait jusqu'aux limites de l'atmosphère on trouve que ces deux quantités sont entrées dans le rapport de 1 à 9. En effet, ce prisme contient 16900 kilogrammes de carbone, et la moyenne de celui fixé par un hectare étant 1800 kilogrammes, on a

$$\frac{16900}{1800} = 9,39$$

Il en résulte que, si toute la surface du globe était couverte d'une végétation égale à celle de ces deux forêts, et que l'acide carbonique absorbé par elle ne se renouvelât point, au bout de neuf années l'air en serait entièrement dépouillé.

Bien que ce résultat soit complètement hypothétique il montre cependant avec quelle rapidité l'atmosphère a dû se purifier par l'effet de la végétation aux époques antérieures aux dépôts houillers, alors que probablement la plus grande partie du carbone enfoui aujourd'hui dans les entrailles de la terre y était encore répandue sous forme d'acide carbonique et que l'absence de la vie animale rendait la reproduction de ce dernier presque nulle.

Dans ces forêts la végétation commence vers la fin d'avril pour s'arrêter vers la fin de septembre, quand les feuilles commencent à jaunir et à tomber. On ne peut donc compter au plus que 5 mois, soit 150 jours, de végétation. Pendant cette période, l'absorption de carbone qui aura lieu chaque jour entre le lever et le coucher du soleil sera en moyenne de

$$\frac{1854}{150} = 12 \text{ kilogrammes}$$

Si l'on suppose maintenant un prisme d'air ayant même base et même hauteur que les arbres, soit 1 hectare de base et 20 mètres de hauteur, la quantité de carbone contenue dans ce prisme, en en déduisant $\frac{1}{4}$ pour l'espace occupé par les arbres, sera de 32 kilogrammes. Si donc le prisme d'air qui enveloppe la forêt restait immobile pendant toute une journée, il perdrait les $\frac{1}{12}$ ou environ les $\frac{1}{4}$ de son acide carbonique.

On voit par le calcul précédent combien il est important, pour activer la végétation des forêts, d'y faciliter la circulation de l'air, afin que par un renouvellement constant il présente toujours aux arbres une richesse aussi grande que possible en acide carbonique.

C'est aussi ce que démontre l'expérience.

Il résulte encore de ce calcul qu'en supposant un accroissement constant aux différents âges, et toutes choses égales d'ailleurs, la quantité proportionnelle d'acide carbonique enlevée à l'air sera en raison inverse de la hauteur des arbres, c'est-à-dire que si la forêt n'avait eu que 10 mètres de hauteur, son accroissement eût nécessité un épuisement deux fois plus fort d'acide carbonique. En prenant des hauteurs moindres, on arriverait au point où l'absorption en carbone est égale ou même supérieure à la quantité contenue dans le prisme enveloppant.

» C'est ce qui explique pourquoi l'accroissement annuel augmente en général avec l'âge, tant que la limite convenable pour la végétation n'est pas dépassée, mais on peut aussi en conclure que, par des éclaircies fréquentes et convenablement ménagées pendant la jeunesse des forêts, on compensait en grande partie cette différence.

CHIMIE — *Recherches sur les acides métalliques*, par M. ED. FRANKY
cinquième Mémoire

(Commission précédemment nommée)

J'ai examiné, dans quatre Mémoires que j'ai eu l'honneur de présenter à l'Académie, les principales propriétés des acides métalliques formés par les métaux usuels. Je fais connaître aujourd'hui les premiers résultats de mes recherches sur l'osmium et l'iridium. Je ne lirai qu'un extrait de mon Mémoire, pour ne pas abuser des moments de l'Académie.

Ces deux métaux qui, par leur abondance dans la mine de platine et l'ensemble de leurs propriétés, peuvent un jour donner lieu à des applications utiles, ont été jusqu'à présent peu étudiés. M. Berzelius dit en effet, en terminant son important Mémoire sur l'osmium et l'iridium, que ses recher-

ches ne peuvent être considérées que comme une esquisse de l'histoire longue et difficile des métaux qui sont associés au platine

J'ai pensé qu'avant d'étudier les acides métalliques formés par l'osmium et l'iridium, il était indispensable de reprendre en entier l'examen de ces deux métaux. La première partie du travail que je communique aujourd'hui fait connaître les procédés que j'ai employés pour obtenir avec facilité l'osmium et l'iridium parfaitement purs. La seconde partie sera consacrée à l'examen et à l'analyse des sels formés par ces métaux. Les résidus de la mine de platine avec lesquels j'ai fait mon travail m'ont été donnés par M. Desmoutis, fabricant de platine.

Si l'osmium n'a été examiné jusqu'à présent que par un petit nombre de chimistes, c'est que ce corps anguleux qui ressemble plutôt à l'arsenic qu'au platine dont on le rapproche cependant, peut sous l'influence de l'oxygène former un acide volatil dont les vapeurs, difficiles à condenser, exercent une action redoutable sur l'économie animale. Aussi M. Berzelius dans son Mémoire sur l'osmium, déclare qu'il n'a eu à sa disposition que 3 grammes de ce métal.

J'ai pensé que le seul moyen de faire sans danger un travail complet sur l'osmium était de l'engager dans des combinaisons cristallines et faciles à purifier. C'est ce but que je crois avoir atteint complètement.

L'iridium préparé par le procédé de M. Berzelius n'a jamais été débarrassé complètement d'osmium, car ce célèbre chimiste dit que l'iridium chauffé à l'air dégageait toujours des vapeurs d'acide osmique. L'iridium que je prépare est pur et ne contient pas d'osmium.

Je ferai connaître maintenant le procédé que j'ai suivi pour obtenir l'osmium et l'iridium.

Je mélange d'abord 100 grammes de résidu de mine de platine avec 300 grammes de nitre, j'introduis ces deux corps dans un grand creuset de Paris, et je les chauffe pendant une heure à une température rouge dans un fourneau à vent.

Après cette calcination, la masse est coulée sur une plaque métallique. Cette opération doit être faite à l'air, et il est même indispensable de se recouvrir le visage car sans cette précaution les vapeurs d'acide osmique agiraient vivement sur la peau.

Pendant la calcination avec le nitre on perd une certaine quantité d'acide osmique, mais j'ai reconnu que la proportion de cet acide, que l'on pourrait condenser, ne compenserait pas toujours les inconvénients d'une calcination dans une cornue de porcelaine.

» La masse decantée qui contient l'osmiate et l'iridiate de potasse est traitée dans une cornue par l'acide nitrique, qui dégage l'acide osmique que l'on condense dans une dissolution concentrée de potasse

» Le résidu de cette distillation est traité par l'eau, qui enlève le nitre, et repris par l'acide chlorhydrique qui dissout l'oxyde d'iridium

» On obtient donc ainsi l'osmium à l'état d'osmiate de potasse, et l'iridium à l'état de chlorure soluble

J'ai reconnu que l'osmiate de potasse pouvait, en dégageant de l'oxygène ou en le donnant aux autres corps, se transformer facilement en un sel rouge, cristallisant en beaux octaèdres, que je nomme *osmite de potasse*. Ce sel contient en effet un acide moins oxygène que l'acide osmique, car il se décompose, sous l'influence des acides faibles, en acide osmique et en deut-oxyde noir d'osmium

Le forme ordinairement l'osmite de potasse en versant une petite quantité d'alcool dans la dissolution d'osmiate de potasse, la liqueur s'échauffe, prend une teinte rouge et laisse déposer une poudre cristalline d'osmite de potasse. Dans ce cas, l'osmium est souvent précipité en entier de sa dissolution. Ce sel peut être lavé à l'alcool qui ne le dissout pas, et se conserve alors indéfiniment sans altération. Il sert à préparer tous les composés d'osmium

Si on le traite à froid par une dissolution de sel ammoniac, il se dissout d'abord et se décompose aussitôt pour donner naissance à un nouveau sel jaune, à peine soluble dans l'eau froide

C'est ce sel, d'une préparation si simple, qui, calciné dans un courant d'hydrogène, donne l'osmium parfaitement pur

L'osmiate de potasse traité par l'acide chlorhydrique, dégage de l'acide osmique et donne un chlorure d'osmium qui, sous l'influence du sel ammoniac, forme un précipité rouge de minium fort peu soluble dans l'eau

Je parle ici de ce sel rouge, parce qu'il peut être employé pour préparer l'osmium, car, par la calcination, il donne ce métal pur, et qu'ensuite on le retrouve dans la préparation de l'iridium

» Ces faits rendent, je crois, la préparation de l'osmium et de ses sels facile à exécuter

Pour extraire l'iridium, je traite le chlorure d'iridium, dont j'ai indiqué précédemment la préparation, par le sel ammoniac, il se forme un précipité d'un rouge brun, provenant de la combinaison des bichlorures d'osmium et d'iridium avec le sel ammoniac

« J'ai heureusement trouvé un procédé très-simple, qui m'a permis de séparer ces deux sels doubles.

L'acide sulfureux, en déchlorurant le sel double d'iridium, le rend très-soluble dans l'eau, tandis que le sel double d'osmium n'éprouve aucune réduction. Je fais donc passer un courant d'acide sulfureux sur les deux sels doubles mis en suspension dans l'eau, l'iridium entre en dissolution et l'osmium reste précipité à l'état de sel rouge.

Ainsi la séparation de ces deux métaux, qui par d'autres procédés se trouve toujours incomplète, est rendue très-simple par le procédé que je viens de faire connaître.

Le sel d'iridium soluble cristallise en gros prismes blancs dans des dissolutions de sel ammoniac. Il est donc facile de le purifier, quand on le calcine dans un courant d'hydrogène, il donne de l'iridium pur, qui conserve dans ce cas la forme cristalline du sel double.

Le sel d'iridium soluble peut, sous l'influence du chlore régénérer le sel non-soluble.

Tels sont les faits que je voulais faire connaître à l'Académie dans un prochain Mémoire j'aurai l'honneur de lui communiquer le résultat de mes recherches sur les combinaisons des deux métaux dont je crois avoir simplifié la préparation et facilité l'étude.

MÉMOIRES PRÉSENTES

CHIRURGIE — *Sur le moyen de distinguer entre elles, des leur début, certaines maladies de l'organe de la vue d'après l'absence d'une ou de plusieurs des trois lumières qui se peignent dans l'œil quand on présente devant la pupille une bougie allumée*, Extrait d'une Note de M. MAGNE

(Commissaires, MM. Roux, Velpeau, Regnault.)

Feu le professeur Sanson commença à observer en 1836 et signala à sa clinique en 1837 les faits suivants, qui lui paraissaient avoir une grande importance pour le diagnostic de certaines maladies des yeux. Lorsqu'en devant de l'œil d'un amaurotique dont la pupille est dilatée, on présente une bougie, on distingue toujours trois images de la flamme se succédant d'avant en arrière. La première, l'antérieure, la plus vive, est droite, la seconde ou moyenne, moins éclatante, est renversée, et la troisième ou postérieure, beaucoup plus pâle que les deux autres, est droite comme la première.

L'image droite antérieure est produite par la cornée

La moyenne renversée, est due au segment postérieur de la capsule cristalline

La droite, postérieure, provient du segment antérieur de cette même capsule

L'opacité de la cornée détruit les trois images

L'opacité de la capsule antérieure fait disparaître les deux images postérieures

» L'opacité de la capsule postérieure empêche la production de l'image renversée

En d'autres termes dans la cataracte capsulaire postérieure, on ne voit pas la lumière moyenne ou renversée, dans la cataracte capsulaire antérieure, la lumière antérieure droite est seule visible de même pour la cataracte capsulo lenticulaire Des expériences de M Pasquet, jointes à celles dont il vient d'être parlé, confirmeront cette conclusion, qu'une cataracte, même commençante, peut toujours être distinguée de l'amaurose et du glaucôme

Pour que l'épreuve cependant donne des résultats concluants, il faut que l'opérateur se place dans les conditions indiquées par l'inventeur lui-même aussi une première précaution est indispensable, c'est de dilater la pupille Le champ de la pupille est en effet d'une étendue très bornée la bougie présentée devant l'iris a pour action de resserrer encore l'espace pupillaire, et si l'on n'avait pas pris les mesures nécessaires pour s'opposer à cette rétraction, il en résulterait que l'on serait forcé de rechercher la marche des bougies dans un cercle de 3 millimètres au plus de diamètre Le chirurgien le plus exercé à cette expérience peut seul, et avec une peine infinie, distinguer ce qui se passe dans un espace aussi rétréci Il est donc essentiel de chercher à rendre la marge pupillaire le plus large possible A l'aide de la belladone le champ de la pupille peut doubler, tripler d'étendue, et le cercle dans lequel se meuvent les bougies peut alors acquies 7 à 8 millimètres de diamètre Mais l'action de la belladone est lente, et il se peut que l'examen ait besoin d'être fait instantanément, alors on obtiendra une dilatation immédiate en instillant dans l'œil quelques gouttes de l'atropine du docteur OFhler

Un autre précepte non moins important à noter, c'est que l'examen de l'œil se fasse dans une obscurité complète Autrement la lumière extérieure produira sur l'œil des reflets qui tantôt pourront simuler les images de la bougie, tantôt aussi empêcher de distinguer ces mêmes images

» Outre les causes qui se rattachent à l'état de la pupille et à l'action de la lumière extérieure, il en est d'autres encore qui pourraient faire supposer

les trois images en défaut Il existe deux cas de cataracte commençante dans lesquels il arrive cependant de distinguer la triple lumière, il est important de les signaler Le premier est celui où la cataracte est si peu intense, qu'elle consiste uniquement en un léger nuage à travers lequel les rayons pénètrent, quoique avec peine Le second est le cas où l'opacité a débute par la circonférence et n'affecte qu'un point limité de la surface du cristallin le reste demeurant intact

Le chirurgien qui a reconnu les trois lumières dans ces deux cas a dû conclure qu'il n'y avait point de cataracte et, au bout d'un certain temps, l'opacité étant devenue manifeste, il a rejeté sur l'infidélité du procédé de Sanson l'erreur de son diagnostic Ce sont les deux seuls cas embarrassants et toutefois l'observateur peut encore ne pas se tromper Voici comment si l'altération consiste dans un léger nuage, les lumières que l'on remarque ne ressemblent pas à celles que l'on voit dans un œil sain ou amaurotique, l'antérieure seule est brillante, et les autres sont tellement pâles que cette pâleur même est un avertissement, et que, réunie aux autres signes, elle peut déterminer l'opinion du chirurgien

Dans le second cas dont j'ai parlé, si l'appareil du cristallin n'est affecté que dans un point limité, si ce point ne se présente pas à la bougie, on rencontre toujours trois images, et cependant, d'après l'examen antérieur, l'oculiste n'a pu rapporter la diminution de la vue ni à l'amaurose, ni au glaucôme Il faut alors imprimer à l'œil des mouvements en tous sens, et lui présenter un objet qui suive tous ces mouvements, quand l'objet se trouvera dans la direction du noyau de cataracte, il ne sera pas aperçu par le malade Place ainsi sur la voie, le chirurgien fera mouvoir la bougie en cet endroit, qui lui avait échappé d'abord, il ne verra plus qu'une ou deux lumières, suivant que l'opacité sera antérieure ou postérieure, et il pourra alors conclure hardiment que la maladie est une cataracte »

MÉDECINE — *Mémoire sur l'histoire naturelle et les propriétés médicales du chanvre indien, par M. LAUTAUD (Extrait par l'auteur)*

(Commissaires, MM. de Gasparin, Payen, Rayet)

J'expose dans ce Mémoire, d'après les renseignements précis qui m'ont été fournis par les docteurs Monard et Jackson, de Calcutta, tous les détails sur la culture de cette plante qui pourraient être consultés avant de choisir les terrains, les amendements et les engrais convenables aux essais à entreprendre dans nos colonies J'insiste plus particulièrement sur celle de ces

conditions qui me paraît la plus favorable au développement du principe actif du chanvre c'est la présence des sels nitreux dans les terrains où la culture de cette plante réussit le mieux, circonstance que j'ai signalée déjà dans une Note sur la culture de l'opium du Bengale, transmise à l'Académie (séance du 23 octobre 1843) par MM. Payen, Boussingault et de Mirbel.

Les propriétés enivrantes du chanvre sont connues des populations de l'Inde depuis un temps immémorial. J'ai cru devoir donner quelques détails sur les diverses préparations enivrantes en usage parmi les habitants de Calcutta, d'après les indications du professeur de matière médicale O. Shan-nesy.

Pendant un séjour de près de deux ans dans l'Indo-Chine, j'ai pu souvent observer les phénomènes physiologiques qui caractérisent l'ivresse du chanvre. Ces phénomènes m'ont offert des particularités dignes d'intérêt que j'ai tâché de faire ressortir en les comparant aux effets que produit l'opium chez les fumeurs chinois.

Enfin la partie la plus importante du Mémoire qui vous est présentée se rapporte aux divers essais thérapeutiques tentés dans les hôpitaux de Calcutta avec la résine du chanvre, par les docteurs O. Brist, Ralagh, O. Shan-nesy, Lsdale, etc. Ces essais constatent, d'une manière évidente, les bons effets que l'on peut retirer de l'emploi de cette substance dans le rhumatisme articulaire, le tétanos, la rage, le choléra asiatique, le delirium tremens et les convulsions des enfants.

Des exemplaires desséchés du chanvre indien, de la poudre et de la résine du chanvre, ont été déposés dans les galeries du Muséum d'histoire naturelle avec les autres objets provenant des collections de la *Danaë*.

Avec son Mémoire sur le chanvre indien M. LIAUTAUD adresse la copie d'une planche d'anatomie chinoise trouvée à Tchinghai.

Cette planche qui est accompagnée d'une courte explication dont M. Stanislas Julien, de l'Académie des Inscriptions, a donné la traduction est renvoyée à l'examen de MM. Duméril et Serres.

CHIMIE — Sur la composition du vesou et de la canne à sucre créole de l'île de Cuba, par M. CASA SECA, professeur de Chimie à la Havane.

(Commissaires, MM. Pelouze, Boussingault.)

M. Casa Seca trouve, dans la canne créole de la Havane, une quantité de ligneux beaucoup plus considérable que celle qu'avait rencontrée M. Péligot dans la canne d'Haiti.

MÉDECINE — *De la variole confluente et de son traitement par la désinfection*
Mémoire de M BAILLEUL

Ce Mémoire, destiné par l'auteur au concours pour les prix de Médecine et de Chirurgie de la fondation Montyon est renvoyé à l'examen de la future Commission

PHYSIQUE — *Description d'un nouveau manomètre, par M COLJARDEAU*

Nous avons indiqué, dans le *Compte rendu* de la séance précédente le principe sur lequel repose la construction de cet instrument qui sera plus amplement décrit dans le Rapport de la Commission à l'examen de laquelle le Mémoire a été renvoyé

Cette Commission se compose de MM Arago, Becquerel Despretz

MÉDECINE — *Nouvelles recherches expérimentales sur le mode de développement sur l'action et sur les principes actifs de l'ergot des graminées et particulièrement du seigle ergoté, par M L PAROLA*

(Cette Commission a nommé pour plusieurs communications de M Bonjean sur le même sujet)

L'auteur qui avait annoncé, par une lettre reçue dans la séance du 26 décembre dernier l'envoi de ce Mémoire fait remarquer que les résultats de ses recherches diffèrent, sur divers points importants de ceux auxquels a été conduit M Bonjean

MECANIQUE APPLIQUEE — *Nouveau propulseur destiné aux bateaux à vapeur et qui permet de leur imprimer une vitesse supérieure à celle qu'on obtient aujourd'hui, sans augmentation de dépense de la force motrice, Mémoire de M BOULMIER, conducteur des Ponts et Chaussées*

(Commissaires, MM Poncelet Séguier, Morin

L'auteur discute les avantages et les inconvénients des différents propulseurs qui ont été essayés jusqu'à ce jour, roues à aubes planes, appareils palмпédés hélices et il s'attache à prouver la supériorité qu'auraient sur tous ces dispositifs des roues à aubes courbes conçues sur le même principe que celles qui ont été proposées par M Poncelet comme moteurs pour des machines fixes

M Fusz adresse la description et la figure d'une *voiture suspendue destinée à remplacer les charrettes ordinairement employées pour le transport des objets pesants*

(Commissaires, MM Piobert, Molin Ségurier)

MM DESIRABODF pere et fils soumettent au jugement de l'Académie un *Mémoire sur les moyens de prévenir ou de corriger les vices de la seconde dentition*

Le Mémoire est renvoyé à l'examen de la Commission déjà nommée pour un *Mémoire de M Jéoulon* sur le même sujet

CORRESPONDANCE

La COMMISSION CENTRALE ADMINISTRATIVE fait connaître, par l'organe de son président le résultat du dépouillement du scrutin ouvert dans les différentes Académies pour la *nomination d'un sous-bibliothécaire*, en remplacement de M Roulin devenu premier sous bibliothécaire

M Maury a réuni 112 voix, M Geraud, 24, M Dairembieg, 10 Il y a eu 10 voix perdues

En conséquence M MAURY a obtenu 112 voix sur 151 votants

M ANAGO met sous les yeux de l'Académie un portrait photographique exécuté par M DAGUERRÉ au moyen d'un procédé qui ne diffère du procédé ordinaire que par la composition de la couche sensible

L'exécution au daguerréotype des portraits d'après nature qui avait fait un progrès marqué par suite de la découverte des substances accélératrices laissait cependant encore beaucoup à désirer d'une part les photographes les plus exercés ne connaissaient que l'on échouait parfois complètement dans des circonstances en apparence tout à fait identiques avec celles où l'on avait le mieux réussi de l'autre dans ce que l'on considérait comme un résultat satisfaisant, les belles épreuves étaient tellement fort rares car si l'on voulait éviter les ombres fortes, qui déplaisent en général aux gens du monde le portrait avait communément de la sécheresse et peu de modelé et si l'on parvenait à éviter ces défauts, c'était souvent en devenant lourd et noir

En réfléchissant sur ces causes d'insuccès M Daguerre a cru reconnaître que la principale consistait en ce que la couche sur laquelle vient se peindre l'image était en général trop mince, et les essais qu'il a faits à ce sujet ont

confirme sa conjecture d'ailleurs il a cru possible de trouver pour la couche sensible une composition plus avantageuse et dans laquelle s'exerceraient des actions voltaïques Celle qu'il emploie maintenant paraît, en effet, devoir donner des résultats supérieurs à tous ceux que l'on avait jusqu'ici obtenus Le portrait que présente M. Arago, et qui n'était pas destiné à être mis sous les yeux de l'Académie réunit toutes les qualités que peut désirer un artiste et offre en particulier dans les ombres une finesse et une transparence dont on n'avait pas jusqu'ici approché Il repose sur laquelle a été formée cette image se compose au fond, d'une poussière d'argent, puis d'une poussière de plâtre entremêlée de molécules microscopiques de mercure Tout le reste de l'opération d'ailleurs s'est fait comme dans l'ancienne méthode

M. LEMOUSTY l'AMOITE prie l'Académie de vouloir bien le comprendre dans le nombre des candidats pour la place de correspondant devenue vacante par suite du décès de M. *Mathieu de Dombasle*, dans la Section d'Economie rurale

M. ORDINAIRE DE LA COLONGE adresse une demande semblable

Ces deux demandes qui sont chacune appuyées d'un exposé des titres des candidats sont renvoyées à l'examen de la Section

CHIMIE — *Analyse d'un poison employé par les indigènes des environs de Caracas* (Amérique du Sud) Lettre de M. *PEDRONI* à M. *Dumas*

Je viens encore vous prier comptant sur l'extrême obligeance avec laquelle vous avez accueilli ma première Lettre de vouloir bien communiquer à l'Académie des Sciences la Note suivante concernant un poison végétal dont se servent les Indiens de la province de Caracas pour empoisonner leurs rimes Je regrette seulement de ne pouvoir pas donner l'analyse quantitative mais j'avais si peu de matière à ma disposition que je n'ai pu répéter mes expériences

Ce poison était renfermé dans une dent Il est en consistance d'extrait solide attirant l'humidité de l'air soluble en toute proportion dans l'eau avec un résidu pulvérulent grisâtre

Solution aqueuse fortement colorée en brun foncé

Solution alcoolique couleur de bistre clair

Solution éthérée incolore

Au moyen des réactifs, j'ai pu reconnaître la présence de quelques

principes et je suis parvenu à isoler les autres, de manière à n'avoir aucun doute sur leur existence, sauf un seul, la brucine, que je manque d'un point de doute

* Voici le tableau des matières trouvées

Fécule	En assez grande quantité
Lignin	Quelque peu
Strychnine	Formant le sixième de la masse
Brucine ?	
Fer	{ En assez forte proportion car on obtient un précipité bleu fort abondant par le cyanure de potassium et de fer Proviendrait il des armes qu'on a voulu empoisonner? Ou plutôt n'aurait on pas évaporé l'extrait dans un vase de fer?
Sulfate de potasse	
Chlorure de potassium	
Resine	
Eau	
Chaux	

Un gramme de cette matière brûlé sur la feuille de platine et brûlé avec une flamme fuligineuse empyreumatique acre, et j'ai obtenu 2 centigrammes environ de cendres dans lesquelles j'ai constaté la présence de la chaux

Ayant voulu m'assurer de l'énergie de ce poison voici ce que j'ai observé
 1^{re} *Expérience* Ayant piqué un chat à la partie interne de la cuisse droite avec une lame trempée dans la solution aqueuse de ce poison l'animal parut au bout de quelques minutes avoir un malaise qui alla en augmentant Sept minutes après avoir été piqué il tomba dans un violent accès de tétanos qui dura jusqu'à sa mort arrivée cinq minutes plus tard

2^e *Expérience* Ayant répété la même expérience avec une lime trempée dans la solution alcoolique la mort arriva avec les mêmes symptômes onze minutes après que l'animal eut été piqué

Un phénomène que j'ai remarqué c'est que lorsqu'un animal est empoisonné avec de la noix vomique ou de la strychnine, les attaques de tétanos sont intermittentes tandis que dans les deux expériences ci-dessus, le tétanos a duré jusqu'à la mort depuis l'instant où l'animal tomba

Voilà quels sont Monsieur, les résultats auxquels je suis arrivé Quant à la plante ou aux plantes dont se servent les Indiens pour préparer cette matière, je n'ai pu me procurer aucune donnée sur elles, car, comme vous le savez, ces peuplades gardent le secret sur ces sortes de préparations

PHYSIQUE DU GLOBE — *Note sur le volcan éteint de Roque-Haute* (Hérault)
par M. P. DUCHARTRE

Sur le sol de notre France si souvent exploré dans tous les sens il semble bien difficile aujourd'hui d'arriver à une découverte en histoire naturelle. Une plante, un insecte nouveau sont devenus des trouvailles d'une très-grande importance et cependant on conçoit aisément qu'une plante ou un insecte échappent aux yeux des plus clairvoyants. Mais il semble plus étonnant qu'un ancien volcan tout entier, avec ses immenses déjections de lave ait passé inaperçu jusqu'à ce jour et cela dans une province qui a été l'objet d'ouvrages spéciaux et très étendus dans un département dont le chef lieu est riche en savants observateurs. C'est cependant un fait de ce genre que je crois devoir signaler aujourd'hui à l'attention de l'Académie.

A moitié distance à peu près entre les villes d'Agde et de Beziers tout près du petit village de Portiragnes à 2 kilomètres des bords de la Méditerranée se trouve le plateau de Roque-Haute. Or le premier coup d'œil jeté sur cette localité y fait reconnaître un volcan éteint dont le cône est parfaitement conservé dont les coulées de lave occupent une vaste surface et fournissent des basaltes pour les constructions des villages environnants. Ce lui de Portiragnes en est entièrement bâti celui de Vias, beaucoup plus considérable y puise aussi quoique moins habituellement enfin, pu suite d'un marché fait il y a environ soixante dix ans entre l'administration du canal du Midi et le seigneur de Villeneuve les Beziers propriétaire de cette carrière on retrouve à chaque pas ces basaltes dans toute la longueur du canal des deux mois. Comment se fait il donc qu'un point si remarquable ait passé inaperçu.

Gessane, dans son *Histoire naturelle du Languedoc* parle des volcans éteints d'Agde (Saint-Joup Saint-Martin Biescou) de ceux de Saint-Tybery, mais il ne fait nullement mention de celui de Roque-Haute, qui est bien autrement conservé. Guiraud Soulavie dans son *Histoire naturelle de la France méridionale*, ne le cite pas, et ne paraît pas l'avoir connu plus que Gessane. Il en est de même de M. Marcel de Serres dans son important article d'histoire naturelle inséré dans la *Statistique du département de l'Hérault*. Enfin, dans la belle carte géologique de France de MM. Élie de Beaumont et Dufrénoy je vois indiqués les volcans d'Agde mais non celui dont il s'agit ici.

Peu familiarisé avec les études géologiques je dois me borner à quelques

mots sur la configuration générale du volcan de Roque Haute, laissant aux géologues le soin de l'étudier plus en détail

Le point culminant de cet ancien volcan est formé par un cône à pente douce, d'une hauteur de moins de 100 mètres au dessus de la Méditerranée, laquelle a sa partie supérieure en un plateau qui ne peut être que le cratère comblé. C'est en effet évidemment l'ancien volcan lui-même. Sur les bords de ce petit plateau, comme sur les flancs du cône, se trouvent disséminés de gros quartiers de roches basaltiques, dont l'un surtout, remarquable par son volume, est connu dans le pays sous le nom de *gros roc*. Au pied du cône s'étend le plateau même de Roque-Haute, d'une vaste superficie, et forme tout entier ou du moins recouvert par une coulée de lave. C'est la la carrière exploitée dans le pays. Le plateau est divisé en deux portions distinctes qui se rattachent à la base du cône central, à partir duquel chacune d'elles va en s'élargissant considérablement. La plus étendue se dirige à peu près vers le N-O, et forme un vaste quadrilatère dont les côtés les plus éloignés du cône central sont les plus longs. Le cône lui-même occupe l'un des angles du quadrilatère. La deuxième portion a une direction opposée et une surface moins considérable. Les bords du plateau tout entier sont formés par une pente douce sur laquelle se trouvent entassés quantité de blocs volumineux.

Ces blocs, comme ceux du cône central, comme la couche épaisse qui recouvre le plateau, sont formés d'un basalte gris-noirâtre, très cellulaire, dont les cavités varient beaucoup en diamètre, d'un millimètre à un décimètre, et quelquefois davantage. Sur le plateau l'on voit l'assise de ce basalte se diviser en gros prismes assez courts (pres de 2 mètres de hauteur), et atteignant souvent 1 mètre d'épaisseur. Comme pierre à bâtir, cette matière présente beaucoup d'inconvénients, à cause de sa dureté, de son poids considérable, surtout de sa couleur sombre. Cependant, en l'absence des pierres calcaires que l'on doit aller chercher assez loin, on s'en contente souvent sur les lieux, à cause de son bas prix et du peu d'éloignement de la carrière.

Le plateau de Roque Haute est à une distance de 2 kilomètres environ de la grande route de Béziers à Agde, les bois qui le couvrent en majeure partie déguisent sa configuration, et par suite sa nature. Peut-être ces circonstances sont-elles la seule cause pour laquelle il semble être resté en dehors des recherches des géologues.

Roque Haute n'est pas seulement remarquable comme ancien volcan, c'est encore une localité botanique assez riche en plantes méridionales, dont

quelques-unes fort rares. Parmi ces dernières, je puis citer l'*Elymus caput-medusæ* des botanistes de Montpellier, et l'*Heliotropium supinum*, que je n'ai encore trouvé que là. C'est principalement en herborisant que je l'ai visité, et c'est d'après mes souvenirs que j'écris cette courte Note, afin de faire connaître aux géologues ce point remarquable que je crois digne d'attirer leur attention.

PHYSIQUE DU GLOBE — *Remarques sur un passage du Mémoire de M. Fuster concernant le climat de la France*, extrait d'une Lettre de M. RAULIN

M. Fuster se trompe, page 20, en confondant le pays d'Auge avec le territoire d'Eu. Le pays d'Auge, si renommé par ses pâturages, est situé sur les bords de la Dive, entre Caen et Lisieux, à plus de 15 myriamètres au sud-ouest d'Eu, il est placé sous le 49° degré de latitude à peu près, et forme une plaine basse, humide, argileuse, qui part du niveau de la mer pour s'élever dans sa partie méridionale à 40 ou 50 mètres, et qui se trouve abritée des vents d'est par le haut plateau crayeux de la Normandie orientale, élevé de 150 à 250 mètres. Les environs d'Eu, au contraire, placés sous le 50° degré de latitude, sont élevés de 80 à 120 mètres, et font partie du vaste plateau sec et crayeux de la Picardie et de la Normandie, exposé, sans abri à tous les vents par suite du grand éloignement de toute région élevée. Le territoire d'Eu est donc placé dans des circonstances climatologiques moins favorables que le pays d'Auge, et il est facile de voir quelle grave erreur on risque d'introduire dans la science en opposant les états physiques de deux contrées différentes au lieu de comparer seulement les états successifs d'une même contrée.

MINÉRALOGIE — *Remarques à l'occasion d'une communication récente de M. Marcel de Serres, concernant la constitution géologique du terrain dans cette portion du département de l'Aveyron où l'on a signalé la présence du mercure*, extrait d'une Lettre de M. RAULIN


C'est par inadvertance sans doute qu'un professeur de Montpellier se range à l'opinion émise par une autre personne, *Comptes rendus*, t. XVIII, p. 52, qu'il n'existe pas de mine de mercure dans des terrains plus récents que le grès rouge. Si l'avait lu les ouvrages de M. Boué, et notamment son *Aperçu sur la constitution géologique des provinces illyriennes* (Mém. de la Soc. Géol. de France, t. II), il aurait pu voir, p. 58, que ce savant géologue range sans la moindre hésitation dans la partie inférieure du terrain

jurassique, les celebres mines de mercure d'Ildria en Carniole, dans un étage par conséquent un peu supérieur à celui du bas dans lequel le mercure natif de Saint-Paul-des-Fonts a été rencontré. Aucune considération géologique ne suppose donc à ce qu'il puisse exister dans le bas des causes de l'Aveyron un gîte de mercure analogue à celui d'Ildria, et l'on peut même dire que la présence presque certaine du cinabre donne un assez grand degré de probabilité aux conjectures qui ont été faites. Il est donc également contraire à toutes les règles de l'analogie de dire qu'il n'y a pas plus de probabilités de trouver un gîte mercuriel exploitable dans le bas de l'Aveyron que dans le terrain tertiaire de Montpellier, parce que le mercure natif n'étant à la superficie du sol est moins abondant dans la première localité que dans la seconde.


CHIMIE — *Sur les produits de la distillation sèche des sulfocyanures*, par M. C. GERHARDT — Note présentée par M. Dumas

La rédaction de mon *Precis de Chimie organique* m'a fourni l'occasion de m'occuper des corps si intéressants que M. Liebig a obtenus dans la distillation sèche des sulfocyanures. Cette étude m'a fait découvrir plusieurs erreurs qui se trouvent reproduites dans tous les traités de chimie, et qui embarrassent singulièrement l'histoire de ces corps. Vous allez voir cependant que leurs nombreuses métamorphoses sont d'une grande simplicité.

Lorsqu'on distille du sulfocyanure de mercure, il se produit du sulfure de carbone, du cinabre, ainsi que le corps orangé auquel M. Liebig a donné le nom de *mellon*. Ce dernier renferme C^2N^1 . Tout récemment M. Volkel a contesté l'exactitude de cette formule, mais il est impossible d'y substituer une autre, vous verrez, d'ailleurs, que la formation du mellon par d'autres composés s'accorde entièrement avec la formule de M. Liebig. Voici comment le mellon dérive du sulfocyanure de mercure



Lorsqu'on chauffe au bain d'huile l'acide persulfocyanhydrique de M. Vobler ($2H^2N^2S^2$), il se décompose complètement en produisant du sulfure de carbone, de l'hydrogène sulfuré, et un résidu d'où une plus forte chaleur expulse du soufre, en laissant un corps grisâtre qui renferme encore du mellon



* C = 75 H = 6,25, N = 87,5 Les oxydes correspondant à l'eau H^2O sont représentés par Pb^2O , Hg^2O , Ag^2O , etc

Ce mellon ne joue pas le rôle d'un radical. Il se dissout dans la potasse caustique sans dégager d'hydrogène, et l'acide acétique précipite de la solution des flocons blancs de l'acide hydromellonique de M. L. Gmelin. Mais cet acide renferme de l'oxygène comme partie intégrante. Le mellonure de plomb, obtenu en mélangeant le sel de potasse avec du nitrate du plomb, renferme $C^*(HPb)N^*O + 2Aq$, comme l'indiquent les analyses de M. Gmelin. Les 14,5 pour 100 d'eau de cristallisation que ce sel renferme s'en vont par la dessiccation, mais le sel sec est oxygéné. Au reste, il est impossible qu'il en soit autrement, car le mellon fixe directement les éléments de la potasse $(KH)O$, comme le fait, par exemple, l'isatine en se transformant en isatate, ou le camphre en se convertissant en campholate de Delalande. On a donc


Acide hydromellonique	$C^*H^*N^*O$,
Mellonure de potassium	$C^*(HK)N^*O$,
Mellonure de plomb	$C^*(HPb)N^*O$

Ce qui prouve aussi que l'acide hydromellonique ne possède pas la composition que lui attribue la théorie des radicaux, c'est que ce corps donne, par l'échauffement dans un tube de verre, du mellon et de l'eau, ainsi que du cyanhydiate d'ammoniaque provenant d'une action secondaire de l'eau sur les éléments du mellon. On a donc



Vous voyez aussi, d'après ce qui précède, que le mellon, entièrement pur et sec, ne pourrait pas donner de mellonure par l'action du potassium, car d'où viendrait alors l'hydrogène que renferme le mellonure de potassium?

Une dissolution bouillante de potasse attaque le mellon avec dégagement d'ammoniaque, et le convertit en un sel d'où les acides précipitent de l'acide cyanurique. Cette décomposition résulte encore de la fixation des éléments de la potasse ou de l'eau, si l'on veut, car






Passons à la distillation sèche du sulfocyanhydiate d'ammoniaque. Ce sel donne du sulfure de carbone, de l'hydrogène sulfuré, de l'ammoniaque et un résidu grisâtre auquel M. Liebig donne le nom de *mélam*. Ce corps, selon moi, n'est qu'un mélange de mellon et de l'acalorde appelé *mélamine* par le célèbre chimiste de Gießen, il possède tous les caractères propres à un semblable mélange. Comme la mélamine renferme $C^*H^*N^*$, on a




La présence du mellon dans ce résidu s'explique si l'on considère que la mélamine elle-même se convertit à une chaleur élevée en mellon et en ammoniacque



Sous l'influence des alcalis ou des acides concentrés, la mélamine fixe les éléments de l'eau, élimine de l'ammoniaque et se transforme successivement en *ammeline*, *ammelide* et *acide cyanurique*





L'ammeline et l'ammelide elles-mêmes finissent par se convertir en acide cyanurique. La formule que M. Liebig attribue à l'ammelide ne saurait être conservée. Par l'action de la chaleur, l'ammeline et l'ammelide fournissent aussi du mellon. On a, en effet,



Rien de plus simple que ces métamorphoses, il s'agit toujours de la fixation ou de l'élimination des éléments de l'eau ou de l'ammoniaque, comme dans la plupart des réactions organiques.


Mais ce qui rend les trois alcaloïdes de M. Liebig encore plus intéressants, c'est qu'ils représentent les *amides* correspondant aux trois sels ammoniacaux de l'acide cyanurique. Ce dernier, en qualité d'acide tribasique, doit se combiner avec l'ammoniaque en donnant



de la même manière que l'acide oxalique, qui est bibasique, donne de l'oxalate ammoniacal (dit sel acide) et de l'oxalate biammoniacal (dit sel neutre). Or vous savez, monsieur, que ces deux oxalates se convertissent en amides en éliminant les éléments de l'eau



Appliquez ces équations aux trois cyanurates et vous aurez



La transformation de ces trois alcaloïdes en ammoniaque et en acide cyanurique, sous l'influence des acides et des alcalis concentrés, prouve bien, ce me semble, la justesse de mon opinion. Pour l'adopter, il est vrai, il faut renoncer à l'hypothèse de l'amidogène pour expliquer les réactions, en établissant des équations comme celles que vous venez de lire. C'est, d'ailleurs, une semblable marche que j'ai suivie dans mon livre, et tout me porte à croire qu'elle remplacerait avec avantage le système si vague et si confus qui se base sur des radicaux hypothétiques.

ZOOLOGIE. — *Remarques à l'occasion d'un passage du Rapport fait sur divers travaux de M. de Quatrefages, concernant les animaux invertébrés, Lettre de M. PALTIER à M. Milne Edwards*

Votre lucide et intéressant Rapport du 15 janvier dernier, sur les Mémoires de M. de Quatrefages, me fait connaître (page 80 du *Compte rendu*) une observation que ce savant a faite sur les Syllis et que Muller avait faite moins complètement sur la Néréide prolifère. Je veux parler de la séparation de l'animal en deux parties et formant ainsi deux individualités.

J'aurai l'honneur de vous rappeler que le 8 février 1836, j'ai communiqué à l'Académie des Sciences des observations analogues sur la séparation et l'individualisation des parties des animalcules au moyen de l'insanition. Comme je me proposais alors de reprendre cette question et de la traiter dans un travail spécial, je n'ai fait qu'indiquer sommairement les résultats que j'avais obtenus, ayant fait connaître antérieurement mes expériences à la Société des Sciences naturelles. Ces expériences ont été faites dans les années 1830, 31 et 32.

• Parmi les faits curieux que ce genre d'expérimentation m'a présentés, celui de la séparation en deux ou en un plus grand nombre d'individualités ne fut pas le moins intéressant. Dans les animaux qui ont un vaisseau dorsal contractile et dans lequel on peut suivre la marche du liquide nutritif, on voit qu'à mesure que le liquide s'appauvrit, la contraction se prolonge moins et qu'elle s'arrête où le liquide cesse d'arriver, ayant été absorbé par les parties antérieures. Lorsque ce mouvement s'est ainsi arrêté, on voit au milieu du corps, à l'endroit même où cesse de parvenir le liquide, nourricier et la

contraction du vaisseau, se former deux grosses vésicules absorbantes qui puisent, pour le compte de la partie postérieure, l'aliment qui ne leur arrive plus de la partie antérieure. Aussitôt que ces vésicules entrent en fonction, la deuxième moitié du vaisseau dorsal reprend ses mouvements contractiles. Ces contractions prennent leur origine aux vésicules nouvelles, et n'ont aucune communication avec la partie antérieure, ni aucun synchronisme avec son mouvement.

Lors avant de ces vésicules, il se forme un étranglement qui s'accroît peu à peu et finit par séparer complètement les deux portions qui font alors deux *individualités* distinctes. La portion antérieure mieux organisée, mieux pourvue d'appendices pour s'alimenter, a plus de vivacité, plus d'énergie que l'autre. Si l'on parvient à conserver la goutte d'eau sept à huit jours, la matière nutritive diminuant de plus en plus, il arrive pour les deux moitiés ce qui est arrivé pour l'animal entier, c'est que la quantité absorbée par les parties antérieures n'est plus suffisante pour l'alimentation totale, et laisse la portion postérieure dans une inanition complète. C'est ainsi que j'ai obtenu, dans un cas, une nouvelle séparation en deux de chacune des deux premières moitiés, et enfin une nouvelle séparation des deux quarts provenant de la moitié antérieure. Les deux parties séparées de la moitié postérieure ont cessé de vivre avant qu'il pût s'opérer une nouvelle séparation. Le résultat fut donc la formation de six *individualités* provenant de la séparation des parties que le vaisseau dorsal ne pouvait plus alimenter.

« J'ai pensé qu'il était utile de rappeler ces faits, à cause de leur importance physiologique et de leur similitude avec ce que M. de Quatrefages a observé chez des animaux libres et non soumis aux privations des aliments.

« M. MILNE EDWARDS ajoute qu'il connaissait les expériences curieuses de M. Peltier, et qu'il les aurait citées, ainsi que les travaux de Bonnet de Saint-Giovanni, de Duges et de plusieurs autres naturalistes, si, en rendant compte des observations de M. de Quatrefages sur les *Syllis*, il avait voulu appeler l'attention de l'Académie sur un nouvel exemple de *fission*, mais telle n'était pas son intention. Ce qui lui paraissait nouveau et important à signaler, ce n'était pas la division spontanée des *Syllis* en deux individus, c'était le rôle dévolu aux individus mâles ou femelles formés aux dépens du fragment postérieur de l'individu souche, et, à cet égard, il ne voit dans les expériences de M. Peltier rien qui se lie aux faits constatés par M. de Quatrefages. »

M HARTZ, a l'occasion d'un Mémoire récent de M *Stoutetten*, sur l'emploi de la trachéotomie dans la dernière période du *croup*, annonce qu'il enverra prochainement un Mémoire destiné à prouver que, dans le cas où l'on a pratiqué avec succès cette opération il eût été presque toujours possible d'en prévenir la nécessité par l'emploi fait à temps de la cantharisation de l'arrière-gorge avec l'azotate d'argent

M D'HOMBRES-FIRMAS adresse la description d'un électromètre qu'il a vu à Milan, et qui lui paraît présenter des avantages notables sur les appareils du même genre dont on fait communément usage Cet instrument est désigné par l'inventeur M *Mayocchi*, sous le nom d'*électromètre universel*

M DELARUE adresse de nouveaux tableaux des *observations météorologiques* qu'il fait depuis plusieurs années à Dijon Ces tableaux comprennent les observations des mois d'août, septembre et octobre 1843

M GUERIN-MENNVILLE présente des recherches sur le *chlorops des céréales* Ce travail est la première partie d'un ensemble de Mémoires sur les insectes nuisibles aux céréales

L'Académie accepte le dépôt de sept *paquets cachetés* présentés par M J BARSÉ, par MM CHOISELAT et RATEL, par MM DAURIAC et SARUQUE par M DUMONT, par M DUPRE, par M LAMARLE et par M ROUSSEAU LAFARGE

La séance est levée à 5 heures et demie

BULLETIN BIBLIOGRAPHIQUE

L'Académie a reçu, dans cette séance, les ouvrages dont voici les titres

Comptes rendus hebdomadaires des séances de l'Académie royale des Sciences
1^{er} semestre 1844, n° 3, in-4°

Sur un Traité arabe relatif à l'Astronomie par M BLOT (Extrait du
Journal des Savants) In-4°

Annales de la Chirurgie française et étrangère, janvier 1844, in-8°

Voyages en Scandinavie en Laponie, au Spitzberg et aux Feroë, sous la di-
rection de M GAIMARD *Geographia physica Géographie botanique Botani-
que et Physiologie* tome I^{er}, 1^{re} partie, in 8°

Traité des Phénomènes électro physiologiques des Animaux, par M C MAT-
TEUCCI, suivi d'*Études anatomiques sur le système et sur l'organe électrique de la*
Torpille, par M P SAVI Paris, 1844, in-8°

Chimie appliquée à la Physiologie végétale et à l'Agriculture, par M JUSTUS
LIEBIG, traduction faite sur les manuscrits de l'auteur par M GERHARDT
2^e édition Paris, 1844, in 8°

Cryptogamie — *Exposition sommaire de la morphologie des Plantes*, par
M MONTAGNE, broch in 8°

*Types de chaque famille et des principaux genres des Plantes croissant sponta-
nément en France*, par M PLÉ, 2^e livr., in-8°

Observations sur la Terebratula Diphya par M D HOMBRE-FIRMAS, 1 feuille
in-8°

Mémoires de la Société royale des Sciences Lettres et Arts de Nancy années
1842, 1843, in-8°

*Annales médico-psychologiques — Journal de l'anatomie, de la physiologie et
de la pathologie du Système nerveux*, par MM BAILLARGER, CERISE et LONGET,
janvier 1844, in 8°

Lettre de M PASSOT à M le président de l'Académie royale des Sciences,
4^e de feuille in 4°

Société d'Agriculture de Nancy — Funérailles de M MATHIEU DE DOMBASLE,
et *Souscription pour élever un monument à sa mémoire*, broch in-8°

Journal des Usines et des Brevets d'invention, juillet à décembre 1843,
in-8°.

Journal des Connaissances médico-chirurgicales, janvier 1844, in-8°, avec
atlas in 4°

Journal des Connaissances médicales pratiques, janvier 1844, in-8°

Journal de Chirurgie, janvier 1844, in-8°

Le Mémorial — Revue encyclopédique des Sciences décembre 1843, in 8°

Annales des Maladies de la Peau et de la Syphilis, janvier 1844, 1^{er} vol, n° 6 in-8°

Mémoires de l'Académie impériale des Sciences de Saint-Petersbourg 6^e série. Sciences mathématiques, physiques et naturelles, tome V, 1^{re} partie Sciences mathématiques et physiques tome III, 1^{re} 2^e et 3^e livr in 4°, tome VII 1^{re} partie Sciences naturelles tome V, 1^{re} et 2^e livr in-4°

Recueil des Actes des séances publiques de l'Académie impériale des Sciences de Saint-Petersbourg tenues le 31 décembre 1841 et le 30 décembre 1842, et de la séance solennelle tenue en l'honneur de M le président de l'Académie le 12 janvier 1843, in-4°

Bulletin scientifique publié par l'Académie impériale des Sciences de Saint-Petersbourg et rédigé par son secrétaire perpétuel tome X in 4°

Bulletin de la classe physico-mathématique de l'Académie impériale des Sciences de Saint-Petersbourg, tome I^{er} in 4°

Mémoires présentés à l'Académie impériale des Sciences de Saint-Petersbourg par divers savants et lus dans ses assemblées, tome IV, 5^e livr, in 4°

On the Structure... Sur la structure, les rapports et le développement de systèmes nerveux et circulatoire et sur l'existence d'une circulation complète du sang dans les Myriapodes et dans les Arachnides macroures, par M N NEWPORT (Extrait des Transactions philosophiques pour l'année 1843) Londres, 1843 in-4°

Gazette médicale de Paris, t XII, n° 3, 1844, in-4

Gazette des Hôpitaux, t VI, n° 6 à 8 in-fol

L'Echo du Monde savant, 10^e année, t IX, n° 5 in-4°

L'Expérience, n° 342, in-8°

L'Abeille médicale; 1^{re} année n° 1, in-4°

COMPTE RENDU

DES SÉANCES

DE L'ACADÉMIE DES SCIENCES.

SÉANCE DU LUNDI 29 JANVIER 1844

PRÉSIDENCE DE M CHARLES DUPIN

MÉMOIRES ET COMMUNICATIONS

DES MEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE L'ACADÉMIE

M BECQUEREL fait hommage à l'Académie du deuxième et dernier volume de son *Traité de Physique appliquée à la Chimie et aux sciences naturelles*.

Ce volume, qui vient de paraître, renferme de grands développements sur la température des corps organisés, la production de la phosphorescence dans les trois règnes, sur l'action chimique de la lumière, l'électrochimie et ses applications aux actions moléculaires lentes, sur l'action physiologique de l'électricité, etc , etc

M SILVESTRE, au nom de la *Section d'Économie rurale*, annonce que la section est en mesure de proposer, dans la prochaine séance, une liste de candidats pour la place de correspondant vacante par suite du décès de M Mathieu, de Dombasle

La *Section d'Anatomie et de Zoologie* déclare, par l'organe de M DUMÉNIL que, se trouvant en ce moment incomplète par suite de l'état de santé d'un de ses membres et l'absence momentanée d'un autre membre, elle devra attendre le retour, très prochain, de M Isidore Geoffroy-Saint-Hilaire pour préparer une liste de candidats à la place de correspondant devenue vacante par suite du décès de M Jacobson

RAPPORTS

ANALYSE MATHÉMATIQUE — *Rapport sur une Note de M. CELLÉRIER relative à la théorie des imaginaires*

(Commissaires, MM. Liouville, Cauchy rapporteur)

L'Académie nous a chargés, M. Liouville et moi, de lui rendre compte d'une Note de M. Cellérier relative à la théorie des imaginaires. Le théorème que l'auteur établit dans cette Note pouvant être fort utile dans les recherches d'analyse et de calcul intégral, nous avons pensé qu'il serait convenable d'en donner ici une idée en peu de mots.

L'un de nous a remarqué dans le XIX^e cahier du *Journal de l'École Polytechnique* [page 567] que $f(x)$ étant une fonction donnée de la variable réelle x , une expression imaginaire de la forme $f(x + y\sqrt{-1})$ se trouve ainsi suffisamment définie si on la considère comme l'intégrale φ de l'équation aux dérivées partielles

$$D_y \varphi = D_x \varphi \sqrt{-1},$$

cette intégrale étant assujettie à vérifier, pour une valeur nulle de y , l'équation de condition

$$\varphi = f(x)$$

C'est en adoptant cette définition, et en s'appuyant sur le théorème général relatif à la convergence du développement d'une fonction en série ordonnée suivant les puissances entières et ascendantes d'une variable x , que M. Cellérier a établi le nouveau théorème dont nous transcrivons ici l'énoncé réduit à sa plus simple expression.

Théorème $f(x)$ étant une fonction réelle ou imaginaire de x , si l'on a pour toutes les valeurs réelles de x ,

$$f(x) = 0,$$

on aura encore, pour des valeurs réelles de x et de y ,

$$f(x + y\sqrt{-1}) = 0,$$

tant que la variable y conservera une valeur numérique inférieure à la plus

petite de celles pour lesquelles la fonction $f(x + y\sqrt{-1})$ ou sa dérivée de premier ordre cessera d'être finie et continue. Par suite, quand on fera croître la valeur numérique de y , en laissant x constant, la fonction $f(x + y\sqrt{-1})$ ne cessera point d'être nulle sans devenir infinie ou indéterminée.

Dans des additions jointes à sa Note, M. Cellérier, en donnant plus de rigueur à la démonstration de son théorème, a montré sous quelles conditions il subsiste, et indiqué les cas où il pourrait devenir inexact.

Appliquée à la théorie des intégrales définies, la proposition énoncée par M. Cellérier fournit le moyen d'étendre des formules établies pour des valeurs réelles de certains paramètres au cas où ces paramètres deviennent imaginaires. On reconnaît ainsi que les formules subsistent généralement, tandis qu'on fait varier les paramètres, jusqu'au moment où les intégrales deviennent infinies ou indéterminées, ce qui s'accorde avec des observations faites par l'un de nous, dans le Mémoire sur les intégrales définies prises entre des limites imaginaires (pages 34 et 40), et dans le XVII^e tome des *Annales* de M. Guigonnat (pages 120 et 127), relativement à diverses formules qui fournissent les valeurs de certaines intégrales définies.

En résumé, les Commissaires pensent que la Note de M. Cellérier est digne d'être approuvée par l'Académie et insérée dans le *Recueil des Savants étrangers*.

Les conclusions de ce Rapport sont adoptées.

MEMOIRES LUS

CHIRURGIE — *Mémoire sur un nouveau mode de traitement des déviations de la taille sans l'ut mécanique ni section sous-cutanée des muscles*, par MM. CHAILLY et GODIER (Extrait par les auteurs.)

(Commissaires, MM. Serres, Roux, Velpeau.)

Notre mode de traitement, que nous désignons sous le nom de *rachidiorthose*, se réduit, en grande partie, à l'emploi des moyens suivants.

1^o Un appareil portatif à triple pression latérale, prenant son point d'appui sur le bassin et ne portant du reste exactement que sur les points correspondants aux convexités des courbures du rachis, laissant le reste du corps parfaitement libre, agissant avec une force facile à régler et dans la direction la plus convenable à son effet,

2° Une gymnastique spéciale, qui consiste simplement dans des attitudes et des mouvements en sens inverse de ceux qui se font remarquer chez tous les individus affectés de déviations de la taille

Le reste de notre méthode de traitement à quelques modifications près est conforme à tout ce qui a lieu dans les autres établissements orthopédiques tels que la gymnastique hygiénique, le régime approprié, et les remèdes dans les cas rares où ils paraissent nécessaires

Pour mettre en évidence la nécessité d'un mode de traitement différent de tous ceux actuellement en usage, nous avons consacré, dans le Mémoire que nous soumettons au jugement de l'Académie, un paragraphe à l'examen et à l'appréciation des principaux appareils orthopédiques inventés et employés depuis Ambroise Paré jusqu'à l'époque actuelle. Nous avons dû aussi parler de la section des muscles de la colonne, et nous croyons avoir démontré que la contracture musculaire étant une crampe chronique et indolente, qui ne peut affecter aucun des muscles de la colonne vertébrale, l'opération qu'on a proposée pour en faire cesser les effets est tout au moins inutile

Entrant ensuite dans les détails de ce qui concerne notre traitement nous avons donné d'abord une description de notre appareil, puis nous avons parlé de notre gymnastique spéciale. Après avoir indiqué sommairement ce qui la constitue, le principe sur lequel elle est établie, les motifs qui nous ont portés à l'adopter comme elle n'est au fond, suivant nous, qu'un emploi méthodique des procédés de la nature dans les redressements spontanés et, dans un sens inverse, une imitation des manœuvres employées pour produire des déviations factices, nous avons cherché à rappeler à la mémoire les exemples connus de ces effets de la puissance musculaire

Enfin, nous avons dit quelques mots sur la gymnastique purement dynamique. Nous ne devons pas nous arrêter sur un sujet aussi connu, mais comme nous ne l'avons adopté qu'en lui faisant subir de grandes modifications, nous avons dû faire connaître les motifs qui nous avaient déterminés à nous écarter de l'usage ordinaire

Nous avons joint à ce Mémoire une planche lithographiée représentant les déviations de la taille de différents degrés, avant, pendant ou après le traitement. Les figures ont été dessinées au moyen de l'homographe de M. Burnier, elles sont conséquemment d'une exactitude parfaite. Celles du premier rang offrent l'état de la taille du sujet au moment de son entrée dans l'établissement, celles du second rang font connaître les résultats obtenus.

PHYSIQUE — *Sur la maniere dont les sons se produisent, et sur les phénomènes qui en résultent, par M FERMONT*

(Commissaires, MM Babinet Dubrueil, Despretz)

Dans un Memoire que j'ai lu il y a quelque temps, j'ai cherché à démontrer que le son dans les tuyaux était produit par un mouvement en helice de la colonne d'air. Cependant j'avais déjà pu m'apercevoir que, dans certains cas, le mouvement pouvait être en helice, et pourtant ne produire aucun son. Il me restait donc à rechercher les conditions indispensables à la constante production du son, et, après quelques recherches, je suis arrivé aux résultats que j'ai l'honneur de présenter ici sous forme de résumé.

1° Lorsque l'on frappe une plaque sonore, en verre par exemple, sur laquelle on a placé de distance en distance quelques légers fragments de liège, on aperçoit le phénomène suivant. Tous ces fragments ne prennent pas la même direction, les uns décrivent des courbes irrégulières, les autres glissent dans un sens tantôt longitudinal, tantôt transversal, en tournant plusieurs fois sur eux-mêmes, enfin quelques-uns s'arrêtent en un point, et prennent un mouvement à peu près déterminé. On peut facilement voir qu'ils ont un mouvement composé dans lequel on reconnaît qu'ils suivent une petite courbe qui se ferme en cercle, et que, pendant ce mouvement, ils tournent plusieurs fois sur eux-mêmes, de manière à composer ce premier cercle de plusieurs autres plus petits.

Ce mouvement me semble offrir la preuve première d'un double mouvement des molécules de l'air. En effet, si l'air qui, sans aucun doute, est en mouvement au-dessus de la plaque, n'avait eu qu'un simple mouvement de translation suivant le grand cercle, il est clair que le corps léger eût glissé et décrit une simple courbe fermée. Il a donc fallu que les molécules d'air eussent pris elles-mêmes ce second mouvement pour l'avoir communiqué au liège.

2° Si l'on cherche à produire un son dans un helicophone renversé, on n'y parvient bien que lorsqu'on a donné au tube, en enfonçant le bouchon spiralé, une longueur égale à trois fois son diamètre. Il m'a paru probable, en admettant avec la plupart des physiciens la sphéricité des molécules, que dans ce cas, les molécules suivent le long de la paroi intérieure du tube, et y prennent le second mouvement déjà observé sur la plaque de verre.

3° Si l'on prend un flageolet en verre qui résonne bien, et si on le raccour-

duire alors une note tellement aigue que l'oreille ne la puisse plus percevoir, ou si l'on allonge, si l'on ferme, ou si l'on ne bouche qu'en partie le tuyau il rend un son qui laisse supposer que si le tuyau avait parlé, l'oreille aurait certainement perçu le son. D'ailleurs on entend un bruit qui indique la note mais ce bruit reste sans éclat. C'est que probablement, dans ce cas les molécules n'ont pas trouvé une longueur de tuyau suffisante pour prendre ce second mouvement. Cependant, comme nous le verrons plus loin, il se produit un phénomène dont l'effet est de déterminer dans les molécules ce mouvement de rotation. Une longueur de tuyau, au moins égale à son diamètre paraît nécessaire à la formation du son.

4° Dans un prochain Memoire de statique et mécanique moléculaire je démontrerai que la conséquence de ce mouvement de rotation des molécules d'eau est la formation d'une courbe qui, de distance en distance, doit produire dans la spirale une sorte d'etirement tout à fait analogue aux contractions que F. SIVART a décrites dans ses beaux travaux sur les veines fluides et qui sont bien loin d'être des nœuds tels qu'on les supposait. Dans cette hypothèse il m'a semblé que dans l'hélicophone je ne devrais constater de contraction que lorsque le tube aurait une longueur suffisante à la production des sons. L'expérience a en effet confirmé cette prévision. Pour étudier le phénomène aussi bien que possible j'ai pris un tube d'un mètre de longueur, à l'un des bouts duquel j'ai placé un bouchon spirale, par l'autre je l'ai rempli d'eau, et, par l'écoulement du liquide, voici ce que j'ai observé. Lorsque l'on ne laisse aucune longueur au tube, le fluide s'échappe par chacune des cannelures, en formant avec le prolongement de l'axe du tube, un angle d'autant plus obtus que la pression du liquide est plus forte. Lorsque l'on enfonce le bouchon pour donner au tube une certaine longueur, on voit les jets sortant des cannelures spirales, se joindre, s'étendre en nappe ventrale et spirale, et déjà l'on aperçoit la tendance de l'eau à former une contraction. Enfin si l'on donne au tube la longueur qui convient à la formation d'un son bien caractérisé, on voit la nappe ventrale se fermer en contraction tout à fait semblable à ce que nous allons voir arriver dans les tuyaux ouverts. La contraction dans les tuyaux, que l'on a considérée comme un nœud, ne me paraît être que la conséquence de ce mouvement de rotation.

5° Dans toute production de son il est impossible de ne pas constater une aspiration assez forte pour absorber des gaz, des balles de liège, et soulever même une colonne de liquide. Or, puisque cette aspiration se produit en sens contraire, il m'a paru évident que ces mouvements en sens contraire

doivent imprimer aux molécules un mouvement de rotation sui elles memes

6° Enfin, il est facile de concevoir que le son se produise dans la sirène bien qu'il n'y ait pas de tube, car le disque supérieur, en tournant doit imprimer aux molécules d'air le mouvement de rotation dont je viens de parler

Si l'on tire de ces expériences les memes consequences que celles que j'en déduis, on peut conclure que le son n'est pas produit dans les tuyaux par un simple mouvement en spirale, mais bien par un double mouvement de translation en spirale et de rotation. Ce double mouvement nous servira à comprendre d'une manière parfaite la propagation du son dans les trois dimensions de l'étendue, propagation que mes expériences m'ont conduit à considérer d'une autre manière que celle qui est admise aujourd'hui.

J'ai démontré ailleurs que le mouvement en spirale était lui même nécessaire à la formation du son, d'ailleurs, on peut s'assurer que, si l'on redresse le mouvement spiral par des appendices en liège ajoutés aux bouchons spirales produisant des sons, alors, quoi qu'on fasse, le son ne se reproduit plus. Dans une expérience extrêmement curieuse, M. Duhamel a démontré que, lorsqu'une corde produit un son, si un archet circulaire qui se meut continuellement est animé d'une vitesse toujours supérieure à celle de la corde, le son s'éteint et à sa place on entend une sorte de grincement qui n'a aucun rapport avec le son primitif de la corde. Ici, la corde est assez tordue pour ne pouvoir plus décrire la spirale qui formait le son. Voici sans doute pourquoi, afin que le phénomène s'accomplisse, il faut que l'archet ait une vitesse supérieure, sans cela, la corde, revenant sur elle-même, reproduirait le son. Ce phénomène me paraît devoir rentier dans la série de ceux que je viens de décrire.

Si je ne m'abuse, il me semble que l'on peut poser en principe que toute cause qui tend à troubler la marche ou la régularité de la spirale, ou à opposer au mouvement de rotation des molécules qui la composent, a constamment pour effet d'en amoindrir le son, et même de le détruire tout à fait.

Quoique cette proposition ne soit qu'une conséquence des faits que je viens d'avancer, j'ai cru néanmoins utile de chercher directement la preuve de cette manière de voir.

Si l'on trace sur une partie du pourtour d'un bouchon 2 ou 3 helices de manière à produire un son dans l'hélicophone, le son cesse peu à peu, à mesure que l'on dirige plus de vent dans une direction parallèle à l'axe de

l'instrument Il ne faut pour cela que pratiquer, de l'autre côté du pourtour du bouchon spirale, des cannelures longitudinales Le même phénomène se produit si l'on pratique une faible ouverture au centre d'un bouchon spiralé

Ce qui a lieu dans l'hélicophone se reproduit aussi dans les tuyaux à bouche Si lorsque le tuyau parle bien, on vient à diriger en même temps un courant d'air parallèle à l'axe, le tuyau cesse de parler à l'instant Le courant peut être dirigé le long de la paroi du tube opposée à la bouche ou au centre même de la spirale, le son cesse également Ces phénomènes sont surtout très-prononcés dans les tuyaux fermes

Ces observations me paraissent fournir une explication à la difficulté qu'éprouvent les facteurs de tuyaux d'orgues lorsqu'ils cherchent à obtenir des sons pleins et purs Toute la théorie de la formation de beaux sons me semble donc renfermée dans le principe que je viens d'énoncer Voilà sans doute pourquoi on se borne à faire des tuyaux d'orgues qui ne rendent que le son fondamental Si on leur faisait rendre des sons supérieurs, la lame d'air finirait par acquiescer trop d'épaisseur par rapport au son plus aigu, et l'impureté en serait altérée

Deux spirales peuvent marcher dans un tuyau l'une dans un sens *dextrorsum*, l'autre dans un sens *sinistrosum*, sans que pour cela le son soit détruit

Dans tous les tuyaux à bouche, on peut voir que ces deux mouvements ont lieu simultanément d'abord parce que la lame d'air qui arrive sur le biseau de la levre supérieure ne trouve aucune cause qui doive diriger la spirale plutôt dans un sens que dans l'autre, ensuite parce qu'en faisant l'expérience suivante, on rend ce phénomène très-apparent on tient le tuyau dans une position horizontale, et on place de la poudre de lycopode à la base du bouchon qui sert de porte-vent, ou vers l'embouchure Si dans cet état de choses, on souffle assez fortement pour produire l'un des sons 2, 3 ou 4, on voit le lycopode sortir en tourbillonnant, et si l'on étudie avec soin ce tourbillon, on reconnaît qu'il décrit deux spirales marchant en sens contraire l'une de l'autre Ce phénomène ne se rencontre pas seulement dans les tuyaux Dans les plaques vibrantes, on peut les apercevoir, et F. Savart a reconnu lui-même ce double tourbillon dans les plaques qui vibrent au sein d'un liquide tenant en suspension des particules légères de bois Enfin, nous pourrions reconnaître, plus tard, que la corde qui vibre doit nécessairement déterminer dans l'air ce double tourbillon en sens contraire

Pendant l'émission du son avec la poudre de lycopode, on peut constater la production de ventres et de contractions, ces dernières accusées par

des plaques elliptiques ou circulaires de lycopode. Ces plaques, disposées à des distances exactement égales les unes des autres, rendent compte des phénomènes que les physiciens avaient si bien observés, et ici certainement on peut ne voir dans la distance d'une de ces plaques à une autre que la longueur d'une onde, dans ce cas très-facile à mesurer et douée d'une propriété différente de celle que l'on reconnaissait à l'onde sonore.

• Enfin, il est facile de démontrer que le nœud des tuyaux n'a pas l'origine qu'on lui avait assignée et que, sur les membranes, ce que l'on considère comme lignes nodales ne sont que des lignes ventrales. Les lignes nodales véritables correspondant aux contractions des tuyaux se trouvent au centre de figure des lignes ventrales, et sont accusées par une poudre plus légère que le sable. Ces expériences, qui me paraissent d'une grande valeur dans la théorie des sons, seront étudiées plus complètement dans un prochain Mémoire.

Revenons maintenant sur le phénomène d'aspiration que j'ai indiqué plus haut. Il est impossible de ne pas saisir l'analogie qui existe entre les sons formés par la suene, l'hélicophone et un vent un peu violent. Cette observation m'a conduit à rechercher si, dans la production des sons par l'hélicophone, je n'obtiendrais pas en petit quelques-uns des phénomènes que l'on voit se produire en grand dans la nature. Certainement, pour moi, le son des vents avait une origine semblable aux sons de l'hélicophone. Le vent devait donc dans l'air régulariser une spirale, et, pourvu que le mouvement fût suffisamment accéléré, il devait ensuivre un son montant du grave à l'aigu, ou *vice versa*. En même temps, on pouvait reconnaître que des corps légers, placés dans le centre de ce mouvement, tourbillonnaient et étaient soulevés à des hauteurs souvent très-grandes. J'ai eu des lors l'idée de chercher, avec un large hélicophone, à reproduire de pareils effets, mais l'expérience m'apprit bientôt que des corps légers tournoyaient, mais n'étaient que projetés sur les côtés du mouvement. J'attribuai ce résultat à la confusion des spires, et j'essayai une autre expérience qui me réussit pleinement.

On place un tube en verre, plein de fumée, dans l'intérieur de l'hélicophone, en ayant soin, si on l'approche près du bouchon, d'y pratiquer une légère échancrure destinée au libre passage de la fumée. En soufflant fortement, l'hélicophone ne rend aucun son, mais la fumée est à l'instant absorbée en sens contraire du premier mouvement. Que le tube ne plonge que jusqu'au milieu de l'instrument, ou qu'on le tienne à son extrémité, le phénomène reste le même, à la condition, toutefois, qu'il sera tenu au centre même de

la spirale. En faisant l'expérience avec un tube contenant des petites balles de liège, on voit qu'à l'instant même elles se portent en sens contraire de la direction du vent. Si, au lieu de placer des balles de liège dans le tube, on plonge dans l'eau son extrémité libre, en soufflant fortement, l'eau s'élève à une certaine hauteur dans le tube, d'autant plus grande que le vent est plus fort et sûr que l'on ne puisse supposer que l'ascension de l'eau dans le tube ne soit due à la pression que pouvait exercer le vent au-dessus du liquide, j'ai eu soin d'entourer le tube d'un large morceau de carton qui pût conduire bien loin sur les côtés du liquide le mouvement qui pouvait influencer la marche du phénomène. L'expérience se fait aussi bien avec une flûte en verre, pourvu que l'on ait soin de plonger le tube intérieur jusque vers l'embouchure.

On pourra prendre une idée de la force de cette aspiration par les résultats suivants.

Une petite balle de liège, de 10 millimètres de diamètre, placée à l'extrémité d'un tube horizontal de 1 mètre de longueur, a été absorbée en moins de temps que la balle elle-même n'en peut mettre à parcourir par son propre poids le tube tenu verticalement. Dans le même tube, placé de manière à faire avec l'horizon un angle de 50 degrés environ, la balle de liège s'est élevée jusqu'à moitié du tube avec une vitesse à peu près égale à celle qu'aurait acquise le corps en tombant dans le même tube. Elle fut arrivée, sans aucun doute, au sommet si le vent qui était produit par mes poumons eût été assez prolongé. Le diamètre de l'hélicophone qui m'a servi pour produire ces effets avait au plus 24 millimètres de diamètre. En admettant, ce qui est probable, que la moitié soit destinée au mouvement d'aspiration, il reste 12 millimètres pour le courant hélicique, lesquels, divisés par 2, donnent 6 millimètres d'épaisseur pour la bande spirale, ou simplement 6 millimètres de section.

En me servant d'un hélicophone de 40 millimètres de diamètre, j'ai pu aspirer avec une assez grande vitesse une balle de liège de 24 millimètres de diamètre, du poids de 1 gramme, et placée dans un tube de 50 centimètres de longueur. D'après le calcul précédent, la section spirale aurait 10 millimètres.

En rapprochant ces phénomènes de ceux que l'on a pu observer dans la nature, on voit combien doivent être grands les effets produits sur une aussi grande échelle que celle sur laquelle peuvent agir les vents. Et d'abord, faisons observer que, pour que le son arrive à être sensible à notre oreille quand le vent agit sur une étendue seulement de 1 mètre, il faut qu'il ait une force prodigieuse pour déterminer la vitesse nécessaire à la perception du son,

car l'hélicophone dont la section hélicique est de 10 millimètres seulement rend, par l'effort des poumons, un son tellement grave, que c'est tout au plus si l'oreille peut le percevoir. Des lors, en combinant ces effets de vitesse avec l'étendue qui peut être quelquefois très-considérable, de 25 mètres par exemple, on pourra se rendre compte des phénomènes imposants qui doivent en être le résultat.

Si donc le son produit par les vents, et dont le timbre et la progression ressemblent tant au son de l'hélicophone, est aussi produit par un mouvement en spirale, il devient jusqu'à un certain point facile d'expliquer, par le mouvement hélicique et sa vitesse, ce phénomène météorologique connu sous le nom de *trombes*. Il est évident que si ce mouvement se produit à la surface des lacs, des mers, etc., l'aspiration pourra être assez grande pour élever l'eau à une grande hauteur et produire une *trombe d'eau* ou une *trombe marine*. Si, au contraire, le phénomène s'accomplit à la surface de la terre, il donnera lieu aux *trombes d'air* pendant lesquelles des corps plus ou moins pesants seront enlevés, des hommes renversés, des plantes arrachées, etc. etc.

Pour s'assurer que telle doit être l'explication du phénomène des trombes, il suffit de lire la description faite par le professeur Grossmann d'une trombe observée, en 1829, dans les environs de Trèves.

Il me paraît difficile de ne point reconnaître, dans cette description, des phénomènes en grand analogues à ceux que nous avons observés dans l'hélicophone. On voit donc que le mouvement spiral est la cause déterminante de l'absorption. Mais pourquoi cette absorption est-elle produite par ce mouvement hélicique? En vertu de quoi cette force se produit-elle? C'est ce que j'ai recherché, et je suis parvenu à reconnaître que ce phénomène n'est que la conséquence d'un principe d'une très-grande généralité, que l'on peut désigner sous le nom de *principe des mouvements contraires*, et dont la démonstration fera le sujet d'un Mémoire que je présenterai prochainement à l'Académie. C'est dans ce principe que viendront se ranger tous les phénomènes de réaction dont la physique nous offre de nombreux exemples.

MÉDECINE LÉGALE. — *De l'empoisonnement par le plomb, suivi de quelques considérations sur l'absorption et la localisation des poisons, par MM. DANGER et FLANDIN* (Extrait par les auteurs.)

(Commission précédemment nommée.)

Dans un précédent Mémoire sur l'empoisonnement par le cuivre, nous avions eu l'occasion de nous occuper, mais accessoirement, de l'empoison-

nement par le plomb et par les autres métaux fixes. D'une part, nous avons annoncé qu'il n'existe pas de plomb dans le corps humain à l'état normal, et, de l'autre, nous avons indiqué, pour la recherche des métaux fixes en général, un procédé de carbonisation à l'aide duquel on parvient à déceler ces poisons mêlés aux matières organiques dans la proportion de 1 cent millième. Pour le plomb en particulier, ce procédé consiste à carboniser les matières animales par le tiers de leur poids d'acide sulfurique, à porter le charbon à la température rouge sombre, à le traiter par l'acide chlorhydrique et par l'eau. On obtient ainsi, dégagé de toute matière organique, un chlorure de plomb soluble sur lequel il est facile d'opérer toutes les réactions propres à caractériser le métal.

Un procès criminel (le procès Ponchon) qui vient d'être récemment jugé en cour d'assises, et dans lequel nous avons été appelés à donner un avis, nous a déterminés à poursuivre et compléter nos recherches sur le plomb, bien que ce métal soit un agent peu toxique et peu propre en conséquence à servir des projets homicides.

Une première proposition qu'on aurait pu déduire de faits déjà communiqués par nous à l'Académie, mais que MM. Dupasquier et Rey de Lyon, ont mise hors de doute par des expériences directes, c'est que parmi les combinaisons de plomb, les composés solubles, ou ceux qui sont susceptibles de devenir tels en pénétrant dans l'organisme, sont seuls vénéneux, l'absorption étant en quelque sorte la condition première de l'empoisonnement.

Une seconde proposition, qui dérive de la première, c'est que si la mort a été l'effet immédiat d'un empoisonnement par des substances minérales, on retrouve le poison dans le cadavre, ou du moins dans certaines parties du cadavre, car relativement à l'absorption des poisons, nous admettons des phénomènes de localisation dont nous supposons même avoir pénétré les causes. Ainsi, lorsqu'un composé métallique a été introduit dans l'estomac ou appliqué sous la peau, c'est particulièrement dans le foie que l'analyse chimique le fait découvrir. Quel que soit le moment où l'on saigne l'animal durant les phases diverses de l'empoisonnement, on ne retrouve pas l'élément toxique dans le sang. On ne l'y retrouve même pas sensiblement lorsque après la mort on recueille toute la masse de ce liquide pour la soumettre à l'analyse.

» Par quelles voies passe le poison ?

Quand il a été ingéré par l'estomac, il est porté spécialement dans le foie par le système de la veine-porte.

» Quand le poison a été appliqué sous la peau, il paraît suivre la voie des vaisseaux superficiels sous-cutanés et sous-muqueux pour aller s'exhaler dans l'estomac et l'intestin, d'où il est rejeté par les vomissements et par les selles, s'il n'est saisi par le système de la veine-porte et transmis au foie, etc., absolument comme s'il avait été primitivement ingéré dans l'appareil digestif.

» Tous les poisons d'ailleurs ne sont pas éliminés par les mêmes voies. L'antimoine, le plomb, l'arsenic, une fois absorbés, sont rejetés par les reins, mais le cuivre ne traverse pas ces organes sécréteurs, il est exhalé par la transpiration pulmonaire et par la respiration insensible de la muqueuse gastro-intestinale.

» La localisation des poisons est un fait sur lequel nous insistons, surtout au point de vue de la médecine légale. Dans les expertises juridiques, en effet, ce ne sont pas toutes les parties du cadavre indifféremment qu'il faut analyser, comme on a eu jusqu'ici trop de tendance à le faire, ce sont certains organes déterminés qu'il faut exclusivement choisir, le tube intestinal et le foie en particulier, puis la rate, l'appareil rénal et les poumons. On entrave les opérations, on en compromet le succès, en agissant sur une masse de chair ou d'organes pris indistinctement. N'est-il pas plus facile d'attendre et de saisir les traces d'un poison dans une faible proportion de matières organiques que dans une plus forte? Et si l'on a choisi l'organe ou les organes qui recèlent, sous le plus faible volume, la proportion de poison la plus considérable, n'est-on pas plus assuré du résultat et des analyses que si l'on a augmenté inconsidérément le poids des matières animales sans augmenter la proportion du poison? Jusqu'ici c'est dans le sang et dans le cœur qu'on s'est plus particulièrement attaché à rechercher les substances toxiques. Or, ce n'est pas là qu'on les retrouve d'une manière appréciable, non plus que dans le cerveau, les muscles et les os.

Nous avons cherché, dans le travail que nous soumettons aujourd'hui au jugement de l'Académie, à fixer la symptomatologie et l'anatomie pathologique de l'empoisonnement par le plomb.

Parmi les symptômes, nous avons particulièrement signalé les vomissements de matières blanches spumeuses dans lesquelles se trouvent disséminées des particules de carbonate de plomb formé pour ainsi dire extemporanément au contact de l'air expiré. Il suffit d'avoir vu une fois de tels vomissements pour en deviner, ou du moins pour en soupçonner la nature.

Relativement aux lésions anatomiques, nous avons particulièrement appelé l'attention sur la coloration du tube digestif et des organes circonvoisins. Dans les cas d'empoisonnement aigu, la membrane muqueuse

gastro-intestinale est comme tannée par une sorte d'enduit grisâtre que forme le composé de plomb avec les tissus organiques. Dans les cas d'empoisonnements lents ou chroniques, les membranes du tube digestif sont plus ou moins colorées en jaune, en brun, en noir, avec des teintes intermédiaires. Les matières contenues dans les intestins sont d'une couleur gris d'acier plus ou moins foncée. Le foie, la rate, etc., participent quelquefois à ces diverses colorations qui disparaissent en partie ou totalement à l'eau, ou par le lavage, ce qui semble prouver qu'elles sont produites par un sulfure de plomb plus ou moins divisé qui se transforme promptement, au contact de l'oxygène, en sulfate incolore. Le plus souvent, les poumons présentent des traces d'engorgement ou de congestion qui simulent les effets de la pneumonie ou ceux de l'apoplexie pulmonaire. Cette dernière alteration peut servir à caractériser un empoisonnement par le plomb si l'on ajoute qu'elle est produite par la présence de ce métal dans les poumons ou l'on ne rencontre pas, d'une manière aussi tranchée du moins d'autres poisons, et surtout le cuivre et l'antimoine.

» En s'appuyant sur quelques faits d'observation et sur les expériences relatées dans notre Mémoire, expériences qui ont montré les poisons appliqués sous la peau transportés rapidement dans les organes digestifs, nous avons pensé que peut-être les coliques dites *métalliques* avaient pour cause la plus directe, chez les ouvriers qui travaillent le cuivre et le plomb, l'absorption cutanée. En conséquence, nous avons indiqué comme moyens prophylactiques, pour préserver de cette maladie si cruelle, les lotions et les bains acides, sulfureux ou savonneux, pensant qu'en pareil cas c'était remplir une indication toute spéciale qu'agir directement sur l'élément toxique, pour en faciliter, d'une part, l'élimination par la peau, et, de l'autre, en arrêter l'absorption ou le passage dans la circulation capillaire.

PHYSIQUE DU GLOBE. — *Mémoire sur les causes probables des irrégularités de la surface de niveau du globe terrestre, des anomalies observées dans la direction de la verticale, la marche du pendule et la hauteur de la colonne barométrique ramenées à cette même surface, par MM. HUSSARD et ROZET, capitaines d'état-major (Extrait par M. Rozet)*

(Commission précédemment nommée)

» En mai 1841, j'eus l'honneur de lire devant l'Académie un Mémoire dans lequel, en m'appuyant sur les observations géodésiques et astronomiques exécutées dans diverses contrées de l'Europe, sur les longueurs du

pendule et les moyennes barométriques observées dans toutes les parties du monde, j'étais parvenu à résoudre un certain nombre des questions relatives aux inégalités de la structure du globe terrestre. Mais dans ce premier travail mon but ayant été de démontrer les rapports qui existent entre les irrégularités de cette structure et les phénomènes géologiques je ne pouvais traiter la question avec toute la rigueur analytique qu'elle réclame. C'est après avoir travaillé longtemps cette belle question avec le capitaine Horsard, que je me suis décidé à soumettre au jugement de l'Académie un nouveau Mémoire dans lequel nous avons essayé de résoudre la plupart des difficultés que cette question présente.

Comme le principal but de ce Mémoire est la recherche des causes des inégalités de la surface des eaux tranquilles de notre planète nous avons rappelé d'abord les propriétés des surfaces de niveau et les principes qui leur servent de base.

» Nous avons étudié ensuite l'action d'une masse perturbatrice n très petite et placée à une petite profondeur sur une portion si peu étendue de la surface de niveau qu'on pût la considérer comme plane et négliger les ordonnées du menisque produit sur cette surface plane par l'action de la masse n relativement à la distance x de son centre de gravité au plan supérieur et admettre enfin que l'action exercée sur un point du menisque est sensiblement la même que celle qu'éprouve sa projection sur le plan inférieur.

Désignons maintenant par g l'intensité de la pesanteur par M la masse de la Terre R son rayon k un coefficient constant et soit $K = \frac{n}{M}$. Un point l ou sa projection l est soumis à deux attractions l'une verticale $g = \frac{M}{R^2}$ et l'autre provenant de la petite masse n $\frac{n}{(x+r)^2}$ dont la composante horizontale sera $\frac{nx}{(x+r)^3}$, ce qui donne pour la déviation du fil à plomb au point l

$$\frac{dy}{dx} = - \frac{KRx}{(x^2 + r^2)^{3/2}} = 1$$

d'où l'on tire

$$y = - kR^2 \int \frac{x dx}{(x^2 + r^2)^{3/2}} + C$$

Déterminant la constante d'après la condition $y = 0$ pour $x = \infty$ il vient

pour l'équation de la courbe méridienne du ménisque,

$$y = \frac{KR^2}{(x^2 + r^2)^{\frac{1}{2}}},$$

l'ordonnée maximum qui correspond à $x = 0$ étant $Y = \frac{KR^2}{r}$, cette équation devient

$$y = \frac{r}{(x^2 + r^2)^{\frac{1}{2}}} \cdot Y \quad \text{et} \quad T = rY \frac{x}{(x^2 + r^2)^{\frac{3}{2}}},$$

l'abscisse du point où a lieu le maximum de déviation sera donnée par la condition $\frac{dT}{dx} = 0$, d'où l'on tire

$$x = \frac{r}{\sqrt{2}} = (0,70711)r,$$

et pour la tangente de la déviation

$$\frac{dy}{dx} = (0,3849) \frac{Y}{r},$$

la valeur de l'ordonnée sera

$$y = \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{3}} Y = (0,8165) Y,$$

d'où il résulte pour la hauteur du bombement,

$$Y - y = (0,1835) Y$$

L'accroissement de la gravité au point culminant du ménisque sera $\frac{R}{r} \frac{KR}{r} g$, et la diminution due à l'exhaussement $\frac{2KR}{r} g$, celle due à l'accroissement de la partie centrifuge, $df = (0,000000063) g$, est négligeable

En comparant ces deux variations de la gravité, on voit que pour qu'il y ait augmentation au sommet du ménisque, il faut avoir $r < \frac{1}{4} R$; si l'on avait $r > \frac{1}{4} R$, il y aurait diminution de la gravité en ce point. Dans le cas où la masse perturbatrice se trouverait au-dessus de la surface de niveau, au lieu d'être au-dessous, elle produirait encore un renflement sur lequel l'action de la pesanteur serait constamment diminuée. L'augmentation du

ménisque de déformation due à son action propre a pour valeur

$$u = \frac{3}{4} \theta \frac{r}{R} Y \left[l \left(\frac{r^2}{2} + x \frac{\sqrt{Y^2 r^2}}{4} + r^2 x^2 + x^4 \right) - l \left(\frac{r^2}{2} + \frac{Yr}{2} \right) \right]$$

θ étant le rapport entre la densité du ménisque et celle du globe. Les applications numériques prouvent que cette valeur est presque nulle.

En considérant la surface de la sphere en général, nous avons trouvé pour la valeur de l'ordonnée,

$$y = \frac{KR^2}{R-a} - \frac{KR^2}{\sqrt{a^2 + R^2 - 2aR \cos S}},$$

et pour la hauteur totale du bombement,

$$h = \frac{2aKR^2}{(R+a)(R-a)},$$

a étant la distance de la masse perturbatrice au centre de la sphere, et S un élément angulaire.

Si dans ces équations on fait les memes suppositions que précédemment on retombe exactement sur les valeurs trouvées pour une surface plane. Seulement ici, il y a toujours augmentation de la gravité, à quelque distance que la masse perturbatrice se trouve du centre de la sphere.

Les applications numériques nous ont appris qu'une masse de 1000 kilometres cubes, située à une profondeur de 10 kilometres, produit un bombement de 0^m,69, sur lequel le maximum de déviation de la verticale est 92 centesimales, l'augmentation de la pesanteur (0,000375) g, et la diminution, par suite de l'augmentation de R , tout à fait négligeable. Cette augmentation de gravité produit une accélération de seize oscillations dans la marche du pendule en un jour moyen, accélération plus considérable qu'aucune de celles observées jusqu'à présent, ce qui prouve qu'au-dessous de la surface des eaux tranquilles, la croûte de notre globe ne présente point de masse perturbatrice de 1000 kilometres cubes.

La variation de la longueur du rayon terrestre, capable de donner une différence de deux oscillations dans la marche du pendule en vingt quatre heures, serait de 150 mètres; résultat démenti par la comparaison entre les mesures géodésiques et astronomiques.

10. L'abaissement de la colonne barométrique due à l'action de la masse de

1 000 kilometres cubes serait $0^{\text{mm}},3$ Les moyennes barométriques peuvent donc être sensiblement influencées par les variations dans la densité de la croûte du globe

Les effets observés ne sont probablement pas produits par une masse unique concentrée dans chaque localité, car pour une déviation de 18 sur une amplitude de 175 kilometres, la masse unique devrait avoir un volume de 28 000 kilometres cubes, et être située à une profondeur de 125 kilometres

De tout ce qui est exposé dans notre Mémoire, nous tirons plusieurs conclusions importantes dont voici les principales

1° La surface des eaux tranquilles de notre planète ne s'éloigne pas sensiblement de celle de l'ellipsoïde donné par la théorie des inégalités lunaires,

2° Les protubérances peu étendues de cette surface annoncent des masses perturbatrices peu profondes

3° Des masses perturbatrices profondes produiraient, au contraire, des protubérances très allongées,

4° Jusqu'à une assez grande profondeur, la présence des masses perturbatrices produira des protubérances avec augmentation de la gravité à leur surface, mais des masses perturbatrices très profondes produiront des protubérances allongées sur lesquelles l'intensité de la pesanteur aura peu augmenté,

5° Les inégalités de la surface des eaux tranquilles doivent plutôt être attribuées à une série de masses situées à une petite profondeur, qu'à une masse unique pour chaque localité,

6° L'augmentation de gravité produite par des masses voisines de la surface agissant sur le pendule et sur la colonne barométrique, il en résulte une accélération notable dans la marche du pendule, et un abaissement sensible de la colonne barométrique,

7° Les anomalies constatées dans la marche du pendule sur différents points du globe ne peuvent aucunement être expliquées par des inégalités de distance au centre,

8° De grandes inégalités de densité au-dessous de la croûte du globe sont peu probables, car la masse liquide intérieure est dans un état d'équilibre stable il résulte évidemment de là que les grandes variations de densité de cette croûte doivent être attribuées à des injections de la masse intérieure fluide, à des sublimations ou à des transports, par les forces électro-chimiques, des substances métalliques que cette masse renferme,

9° Il n'est pas possible d'admettre de grands renflements de la surface des eaux tranquilles produits par des déformations de la croûte extérieure,

10° Le renflement de l'équateur, dû à l'action de la force centrifuge, n'est aucunement de la nature de ceux que nous venons de considérer,

11° De tout ce qui précède il résulte enfin que les observations géodésiques et astronomiques combinées sont les seules capables de conduire à une connaissance exacte de la forme des eaux tranquilles de notre planète. Le pendule, dont on a souvent fait usage dans la recherche de cette forme, ne peut absolument rien apprendre relativement à elle,

12° Quant aux nivellements faits à de grandes distances, comme ceux des chaînes trigonométriques de la nouvelle carte de France, ils n'ont accusé, jusqu'à présent, que des différences que l'on peut attribuer, soit aux erreurs d'observation, soit aux inégalités de la réfraction, soit enfin à des ondulations de la surface de niveau de l'ordre de celles calculées par nous

» Les nivellements à de petites portées suivant exactement les surfaces de niveau, ne peuvent absolument rien apprendre sur leur forme

MEMOIRES PRESENTÉS

M L. HOSTE, ancien missionnaire à la Nouvelle Espagne, adresse un travail sur la *Statistique du Mexique* et fait remarquer que ce travail a été honoré du prix fondé en 1833 par le gouvernement mexicain, ce qui semble une garantie suffisante de son exactitude

(Commissaires, MM Dupin, Flourens, Élie de Beaumont, Dufrénoy)

M QUMARD, de Courtenay, prie l'Académie de vouloir bien charger une Commission d'examiner une *nouvelle machine à élever l'eau* dont il vient de faire exécuter un modèle qui fonctionne

MM Poncelet et Séguier sont invités à prendre connaissance de cet appareil et à faire savoir à l'Académie s'il a en effet la nouveauté que lui suppose l'auteur

M AVAL soumet au jugement de l'Académie une Note sur la *décomposition des solides polyédriques*

(Commissaires, MM. Poinset, Binet)

ASTRONOMIE — *Éléments de l'orbite elliptique de la dernière comète, découverte par M FAYE*

(Commissaires, MM Arago, Mathieu, Damoiseau, Liouville, Mauvais)

Orbite de M Faye		Orbite de M Goldschmidt.	
Époque de la longitude moyenne, 1 ^{er} janvier 1844 (midi moyen de Paris), 60° 27' 46" (équinoxe moyen)		Époques de la longitude moyenne 1843, décembre 2, 11876 (temps moyen de Berlin), (équinoxe app.)	
Moyen mouvement diurne	490,7991		535,7099
Longitude du périhélie	50° 19' 4"		52° 32' 55"
Demi grand axe	3,738 826		3,52684
Arc dont le sinus = e	33° 12' 42"		31° 29' 39"
Longitude du nœud ascendant	209° 13' 31"		208° 21' 20"
Inclinaison	11° 16' 50"		10° 58' 58"
Sens du mouvement	direct	Sens du mouvement	direct

La durée d'une révolution est 7 ans $\frac{7}{4}$

6 ans $\frac{1}{2}$

La distance du centre de l'ellipse au Soleil est environ 2,0479

1,8425

La plus courte distance de la comète au Soleil est 1,6909

1,6843

1 unité étant la distance moyenne de la Terre au Soleil

On voit que le Soleil est placé à peu près à la même distance du centre et du sommet de cette ellipse

Cette orbite a été calculée sur les observations du 24 novembre 1843 } corrigées de la aberration et de la parallaxe
du 13 décembre 1843 }
du 12 janvier 1844 }

L'orbite de M Goldschmidt calculée sur le court intervalle de 15 jours, satisfait aux observations comprises entre le 24 novembre et le 9 décembre. Ses erreurs vont en suite en croissant, et dépassent 2 minutes de degré

Elle les représente à 0,5 près

Les observations extrêmes comprennent un intervalle de près de 49 jours

Ce sont à la fois les plus distantes et les plus sûres, elles ont été faites à l'Observatoire de Paris, la première par M Laugier, la seconde par M Mauvais. L'observation intermédiaire, sur laquelle on peut également compter, a été faite à l'Observatoire d'Altona, dirigé par M Schumacher

L'arc parcouru par la comète est de plus de 24° (vu du Soleil)

M. LAFARGUE, de Saint-Émilien, adresse une Note sur un procédé qu'il a imaginé pour faire disparaître les tumeurs érectiles congénitales désignées sous le nom de *navi materni*, *envies*, etc. Ce moyen consiste à pratiquer, sur la surface, et autour de la tumeur, cinq à six piqûres avec une lancette dont la pointe a été trempée dans une goutte d'huile de *Croton tiglium*. On détermine ainsi une ulcération qui se traite à la manière ordinaire et qui laisse une cicatrice à peine visible, surtout si l'enfant sur lequel on agit est jeune et la tumeur peu étendue.

(Commissaires, MM. Rayet, Velpeau.)

M. V.-A. ROSSI prie l'Académie de vouloir bien se faire rendre compte d'un ouvrage qu'il vient de publier en italien, à Naples, et qui a rapport aux travaux hydrauliques à exécuter pour l'assainissement et la fertilisation de la campagne des environs de Vico (voir au *Bulletin bibliographique*).

M. MORIN est invité à faire un Rapport verbal sur cet ouvrage.

La Commission qui avait été chargée de l'examen d'un *appareil destiné à la mesure du temps*, présenté par M. PYLAIAS, demande l'adjonction d'un troisième Commissaire.

M. DESPREZ est désigné à cet effet.

CORRESPONDANCE

M. ARAGO annonce que M. DAGUERRE, qui devait adresser, dans cette séance, une Note sur son nouveau procédé pour former la couche sensible sur les plaques destinées à recevoir les images photographiques, croit avoir encore besoin de quelques nouveaux essais pour donner à la description de son procédé toute la précision nécessaire.


CHIMIE — *Sur les produits de la distillation du sulfure, de l'azoture et du sulfazoture de benzène*, par M. AUG. LAURENT.

« I. Le sulfure de benzène donne, soit par la fusion, soit par la distillation, deux corps cristallisés. L'un d'eux est le stilbène, l'autre est un nouveau corps que je nomme *sulf-essène*. La composition de celui-ci peut se représenter par cette formule $C^{12}H^{12}S$. Comme il ne cède son soufre à aucun réactif et comme il renferme un nombre impair d'équivalents d'hydrogène, on peut le faire dériver d'un carbure d'hydrogène hypothétique, l'essène


$\equiv C^{12}H^{10}$ Ayant essayé de le brûler dans un tube de verre, à l'aide d'un mélange de maïbre, de nitre et de chlorate de potasse, il s'est produit une série de détonations qui sont devenues tellement rapides, que le tube rendait des sons très-forts et dont on pouvait, à volonté, augmenter ou diminuer la gravité en chauffant le tube plus ou moins rapidement 1 gramme de la matière combustible a suffi pour donner un son continu pendant dix minutes

Dans la distillation du sulfure de benzène il se dégage, en outre, de l'hydrogène sulfuré et du sulfure de carbone

L'équation suivante rend compte de la formation de tous ces produits



Le sulf-essale donne, avec l'acide nitrique, naissance à un corps jaune pulvérulent dont la formule est



avec le brome il perd également 2 équivalents d'hydrogène qui sont remplacés par 2 équivalents de brome,



II L'azoture de benzène (hydrobenzamide) se décompose par la fusion ou par la distillation Il se forme de l'ammoniaque, une huile très volatile, un nouveau composé que je nomme *lophyle*, accompagné d'une quatrième matière cristalline dont je n'ai pas eu une assez grande quantité pour pouvoir l'examiner

Le lophyle, qui cristallise en aigrettes, a pour formule



Avec l'acide nitrique, il donne naissance au nihilophyle, dont la composition peut se représenter par celle du lophyle, moins 3 équivalents d'hydrogène, plus 3 équivalents d'acide hyposotique, $= - C^{12}H^{10}X^2As^2$

III Le sulfazoture de benzène, soumis à la distillation, donne naissance aux produits suivants stilbène, sulf-essale, lophyle, hydrogène sulfuré, ammoniaque, sulfure de carbone, matière huileuse, et le même produit cristallin inconnu que l'on obtient avec l'azoture de benzène. Ces composés sont donc les mêmes que ceux qui se forment en distillant séparément le sulfure et l'azoture de benzène

IV L'azotide benzoïque donne naissance, par la distillation, au lophyle et à quelques autres produits

(189)

* V Les produits bruts de l'action du sulfure d'ammonium sur l'essence d'amandes amères, soumis à la distillation, donnent tous les produits précédents, plus un nouveau composé cristallisé en beaux octaèdres, et que je nomme *picryle*. Sa composition se représente par



Il peut se combiner avec le brome pour former un composé qui a la formule suivante



Avec le chlore, il peut donner deux composés : la composition de l'un est $C^{14}H^{10}O^1Az^1Cl^2$, et celle de l'autre probablement $C^{14}H^{10}O^1Az^1Cl^1$, ou $C^{14}H^{10}O^1Az^1Cl^1$. L'acide n'acquiesce avec lui un composé jaune dont la formule est



Le lophyle retiré des produits bruts de l'action du sulfure d'ammonium sur l'essence d'amandes amères, est accompagné d'une nouvelle substance cristalline que je nomme *amaryle*. Cependant il n'est pas certain que ce corps ne soit pas un produit d'altération par les réactifs qui ont servi à l'isoler. Sa formule se représente par



par la chaleur, il donne le composé suivant, en perdant 2 atomes d'eau



Celui-ci, chauffé jusqu'à fusion complète, perd encore de l'eau et laisse dégager du deutoxyde d'azote : il reste un corps dont la formule est



En y ajoutant 3 atomes d'eau et 1 atome de deutoxyde d'azote, on a la composition de l'*amaryle*.

La composition de ces produits prouve donc que les chimistes peuvent imiter la nature qui, dans les végétaux, désoxyde des combinaisons très-simples et les transforme en carbures d'hydrogène ou en produits peu oxygénés et très compliqués.

Le stilbène, le sulf-essence, le lophyle, etc., renferment 52, 56 et 84 atomes de carbone, et tous peuvent s'obtenir à l'aide de l'essence d'amandes amères, qui ne renferme que 28 atomes de carbone.

PHYSIOLOGIE VÉGÉTALE — *Addition au Mémoire touchant l'action de la lumière sur les végétaux, par M. PATER*

C'est avec un profond sentiment de douleur que j'ai lu la dernière communication de M. Dutrochet. Depuis 1836 que je m'occupe de cette partie de la *physiologie végétale* qu'on peut appeler *expérimentale*, et aux progrès de laquelle, après Hales, Ingenhousz, Bonnet, Priestley, Th. de Saussure, plusieurs membres de cette Académie (1) ont puissamment contribué, je ne pouvais ignorer l'immense impulsion que lui avait donnée l'auteur des *Recherches sur l'Endosmose*, et j'étais loin de vouloir lui refuser le tribut d'admiration et de reconnaissance que lui doivent tous ceux qui s'intéressent à l'avenir de cette science. Seulement, comme les premières expériences de M. Dutrochet sur la lumière datent déjà de vingt huit ans, ainsi qu'il l'a dit lui-même, c'est-à-dire d'une époque où la constitution du spectre solaire n'avait point été l'objet de travaux aussi spéciaux qu'elle l'a été depuis, j'avais songé à reprendre cette question avec toute la précision que comporte actuellement l'optique, et dans l'énumération des faits que j'avais trouvés contradictoires aux siens, je pensais avoir mis toute la réserve, toute la mesure de langage toute la convenance que je dois à son âge, à son caractère et à sa position scientifique.

Ainsi, sans vouloir chercher à démontrer de nouveau l'exactitude de mes expériences, *exactitude qui, du reste, n'est pas niée par M. Dutrochet*, je me borne seulement à protester énergiquement contre toute interprétation de mes paroles qui tendrait à faire croire que j'ai voulu blesser cet habile physiologiste en quoi que ce soit, et que je n'apprécie pas tous ses travaux à leur juste valeur.

Ces quelques mots suffiront, j'espère, à ses yeux comme à ceux de l'Académie, pour prouver la pureté de mes intentions, et lorsque le printemps renaîtra, lorsque le soleil reparaitra sur l'horizon d'une manière durable, je demanderai à M. Dutrochet de vouloir bien venir constater par lui-même l'exactitude de mes expériences. »

(1) MM. Becquerel *Influence de l'Électricité sur les végétaux, etc.*, Biot, *Addition de la Seve*, Ad. Brongniart *Chaleur dégagée pendant la Fécondation*, Boudanville, *Respiration des Plantes*, Chevreul et Marbel, *Statique des Végétaux*, Pouillet, *Électricité dégagée par les plantes*, Dumas et Payen, *Nutrition des Végétaux, etc.*

« *Réponse de M. DUBOIS à M. Payer* »

« J'accepte avec plaisir la déclaration que me fait M. Payer, que son intention n'était point de me blesser par la forme un peu sévère de sa Note communiquée à l'Académie dans sa séance du 8 janvier dernier. Mais la question, pour moi, n'est pas toute là.

« L'Académie a retenu de la promesse qu'il a faite de démontrer, par des expériences faites sur des végétaux plongés dans l'eau, et qui cependant s'infléchissent vers la lumière, combien ma théorie touchant l'inflexion des végétaux sous l'influence de la lumière *avait peu de fondement*. Il a avancé qu'il lui paraissait que je le reconnaissais moi-même, puisque, a-t-il dit, *j'aban donnais aujourd'hui ma théorie pour lui en substituer une autre*. J'ai lieu de croire qu'aujourd'hui M. Payer ne regarde plus ces assertions comme fondées, j'en suis sûr avec bien de satisfaction qu'il eût dit ici quelques mots sur les points spéciaux que je viens d'indiquer. Certain que je suis de sa sincérité, mon estime pour lui s'en fût augmentée. »

M. FUSTER adresse une Note en réponse aux remarques faites récemment par M. Raulin sur un passage de son Mémoire concernant le *climat de la France*.

Je n'ai parlé, dit M. Fuster, du pays d'Eu et du pays d'Auge, que je distingue bien de ses environs, que pour constater l'usage du cidre en Normandie pendant le XIII^e siècle, j'ai si peu confondu ces deux pays, que je cite textuellement les passages de Guillaume-le-Breton où ils se trouvent distingués.

M. PIERRE écrit de Bourges relativement à quelques observations anatomiques qu'il a faites récemment sur une femelle d'*Ouistiti*. Chez cet animal le cerveau et le cervelet ne lui ont pas offert de traces de circonvolutions cérébrales. Deux animaux de cette espèce, mâle et femelle, qu'il a eus en sa possession, ont produit, à Bourges, un petit mort presque en naissant, et qu'il a envoyé, il y a peu de temps, au Muséum.

M. MAZARS, qui avait adressé, le mois dernier, un travail sur les *ventes alises*, lequel ne put être renvoyé à l'examen d'une Commission, attendu qu'il avait déjà paru dans les Mémoires d'une Société savante, envoie un Supplément à ses premières recherches, ce supplément est imprimé,

l'ensemble du travail ne pourra, comme le désirerait l'auteur, être l'objet d'un Rapport

M BODINSON demande l'autorisation de retirer des archives de l'Académie une Note qu'il avait adressée l'an passé sur un cas d'empoisonnement par le *bioxalate de potasse*

(cette autorisation est accordée)

L'Académie accorde la même autorisation aux auteurs de deux *Mémoires* précédemment présentés et sur lesquels il n'avait pas été encore fait de Rapport, savoir

A M PRÉRONI, médecin à Constantinople, pour un *Mémoire concernant la question de contagion de la peste, et celle des quarantaines*,

Et à M VALERIUS pour sa *Description d'un appareil destiné au redressement des déviations de la taille*

M DURAND prie l'Académie de vouloir bien hâter le travail de la Commission à l'examen de laquelle ont été soumises ses dernières communications concernant diverses questions de physique générale

(Renvoi à la Commission nommée)

À 4 heures trois quarts, l'Académie se forme en comité secret

COMITÉ SECRET

M DE BLAINVILLE fait, au nom de la Commission chargée de l'examen des pièces adressées au concours pour le *Prix de Physiologie expérimentale*, année 1842, un Rapport dont voici les conclusions

1° Le *Prix* est décerné à M le docteur LAURENT, pour ses *Recherches expérimentales, anatomiques et physiologiques sur l'hydre verte et l'éponge fluviatile*

2° Une mention honorable est accordée à M ROBERT LAROCHE pour ses *Recherches et expériences physiologiques et pathologiques sur le mécanisme de l'inflammation*

La Commission propose et l'Académie ordonne l'impression, dans le

(193)

*Recueil des Savants étrangers, d'un travail de M. Louis DuRoi a intitulé
Recherches anatomiques et physiologiques sur les Diptères*

Enfin sur la proposition de la Commission l'Académie accorde une somme de 2000 francs à M. Laurent pour l'indemniser des dépenses qu'il a été obligé de faire et lui faciliter les moyens de poursuivre ses recherches sur plusieurs points qui paraissent encore douteux

M. RAYET au nom de la Commission chargée de l'examen des pièces adressées au concours pour le prix Manni concernant les *moits apparentes* et les moyens de prévenir les enterrements prématurés déclare qu'aucune des pièces parvenues à l'Académie n'a paru mériter le prix et propose de remettre la question au concours pour l'année 1846

Cette proposition est adoptée

La séance est levée à 5 heures trois quarts

F

ERRATA

(Séance du 22 janvier 1844)

Page 4 lignes 3 et 4 *au lieu de* le poids moyen du bois sec produit par hectare dans ces forêts est de 230 000 kilogrammes par année *les* le poids moyen du bois sec produit par hectare dans ces forêts a été de 230 000 kilogrammes en soixante trois années soit 3 650 kilogrammes par an

BULLETIN BIBLIOGRAPHIQUE

L'Académie a reçu, dans cette séance, les ouvrages dont voici les titres

Comptes rendus hebdomadaires des séances de l'Académie royale des Sciences,
1^{er} semestre 1844, n° 4 in-4°

*Traité de Physique considérée dans ses rapports avec la Chimie et les Sciences
naturelles*, par M. BECQUEREL, tome II, 1844, in-8°, avec planches in fol
Bulletin de l'Académie royale de Médecine, t. IX, n° 7, in-8°

Essai sur la Statistique intellectuelle et morale des départements de la France
par M. FAYET tableau n° I, départements de la Moselle, du Bas-Rhin et
du Haut-Rhin (Présenté au nom de l'auteur par M. MORREAU DE JONNÈS)

Annales de la propagation de la Foi janvier 1844 n° 92, in-8°

*Météorologie — Mémoires sur les Vents alisés — 1^{er} Mémoire, Vents alisés
inférieurs* par M. A. MAIZIERES broch in-8°

*Second Mémoire sur la théorie élémentaire des Vents — Origine de presque
tous les Vents irréguliers* par le même, broch in-12

*Précis succinct sur mes deux Mémoires relatifs aux Vents réguliers et aux
Vents irréguliers*, par le même, 1/2 feuille in-4°

Encyclographie médicale, janvier 1844 in-8°

Flora batava, 131^e livr in-4°

The Zoology of *Zoologie du Voyage du Beagle, capitaine FITZROY, pu-
blié sous la direction de M. C. DARWIN, naturaliste de l'expédition — Cinquième
partie (Reptiles)*, n° 2, dernière livraison de l'ouvrage, in-4°

*Observations . Observations sur le genre Unio, avec la description de plu-
sieurs espèces nouvelles de Mollusques testacés*, par M. LEA, in-4° (M. DE BLAIN
VILLE est prié d'en rendre un compte verbal)

The Edinburgh *Nouveau Journal de Londres et d'Edimbourg*, octo-
bre 1843 à janvier 1844, n° 71, in-8°

Astronomische *Nouvelles astronomiques de M. SCHUMACKER*, n° 494,
in-4°

Kongl *Mémoires de l'Académie royale de Stockholm*, année 1841,
in-8°

*Araberattelse . Compte rendu annuel des progrès de la Chimie et de la Mi-
néralogie pour l'année 1841*, par M. BERZELIUS, Stockholm, 1841, in-8°

Araberattelse *Compte rendu annuel des progrès de la Chimie et de la Mi-
néralogie pour l'année 1842*, par le même Stockholm, 1842, in-8°

Araberattelse *Compte rendu annuel des progrès de la Chimie et de la Minéralogie pour l'année 1843, par le même* Stockholm, 1843, in-8°

Araberattelse *Compte rendu des progrès de la Technologie, présenté à l'Académie royale de Stockholm dans sa séance annuelle du 31 mars 1841, par M PASCH* Stockholm 1843 in-8°

Berattelse *Sur les progrès des Sciences astronomiques pendant les années 1837 et 1841, par M SELANDER* Stockholm 1842 in-8°

Araberattelse *Compte rendu des progrès de la Zoologie pendant les années 1838—1840 (Insectes) par M BOHEMAN* Stockholm 1843 in-8°

Memoria *Mémoire sur un projet de Travaux hydrauliques à exécuter pour l'amélioration définitive de la campagne des environs de Vico par M V A ROSSI* Naples 1843, in-4° (M MORIN est prié d'en rendre un compte verbal)

Gazette médicale de Paris, t XII, n° 4, 1844 in 4

Gazette des Hôpitaux, t VI, n° 9 à 11, in-fol

L'Expérience, n° 343 in-8°

COMPTE RENDU

DES SÉANCES

DE L'ACADÉMIE DES SCIENCES.

SÉANCE DU LUNDI 5 FÉVRIER 1844

PRÉSIDENCE DE M. CHARLES DUPIN

MEMOIRES ET COMMUNICATIONS

DES MEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE L'ACADÉMIE

ELECTRO-CHEMIE — *Deuxième Mémoire sur la coloration des métaux,*
par M. BECQUEREL

Preliminaires

Depuis les deux communications que j'ai eu l'honneur de faire à l'Académie touchant la coloration des métaux au moyen des dépôts successifs de peroxyde de plomb, opérée à l'aide de l'électricité voltaïque, je me suis attaché à multiplier les expériences dans le but de remonter aux causes des effets produits et de trouver les procédés les plus simples et en même temps les plus pratiques, à l'aide desquels on pût obtenir des teintes uniformes et durables sur des objets de forme diverse d'un métal quelconque afin que l'industrie fût à même de se livrer sans difficulté à ce nouvel art. Les résultats auxquels je suis parvenu, et qui sont consignés dans le Mémoire que j'ai l'honneur de présenter aujourd'hui à l'Académie, atteignent, du moins j'ose l'espérer, le but que je me suis proposé, car je n'ai omis aucun des détails pratiques propres à éclairer l'industrie et à la mettre à même d'assurer le succès de ses opérations.

Le phénomène de coloration électro-chimique produit sur des surfaces

metalliques est le même que celui des lames minces recouvrant les surfaces de certains corps et laissant voir par transparence ces mêmes surfaces avec des couleurs dont l'espece et l'éclat dependent de l'épaisseur des lames déposées, de la couleur du corps, et qui présentent souvent à nos yeux le brillant phénomène des anneaux colorés.

Nobili est le premier qui nous ait fait connaître la production des anneaux colorés, sur des lames de métal, au moyen de dépôts produits par l'électricité voltaïque, phénomènes analogues à ceux anciennement obtenus par Priestley avec des décharges successives de batteries électriques. Le physicien anglais avait observé qu'en transmettant à plusieurs reprises ces décharges d'une pointe métallique, sur une lame de métal, il en résultait sur cette dernière plusieurs séries d'anneaux colorés qui étaient les mêmes quelle que fût la direction de la décharge, c'est-à-dire que l'électricité positive partit de la pointe ou de la lame. On dut en conclure que la coloration dependait d'une cause agissant également des deux côtés. Les expériences ayant d'abord été faites sur le cuivre et l'acier, métaux qui se colorent en se refroidissant, après avoir été exposés à l'action d'une chaleur aussi forte que celle qui se dégage pendant la décharge, on dut croire que telle était la cause de la production des anneaux colorés. Mais comme on les obtint également ensuite sur le platine et l'or, on fut obligé d'admettre le transport de la matière même de la pointe, qui en se déposant sur la lame en couches d'autant plus minces qu'elles s'éloignent davantage du point central, donnait naissance à des anneaux colorés, conjecture qui s'est changée en certitude depuis les expériences de M. Fusinieri sur le transport de la matière à travers les substances métalliques, par l'effet des décharges, quelle que fût la direction de ces dernières.

Pour avoir une idée bien nette des phénomènes décrits d'abord par Priestley, puis étudiés avec de grands développements par Nobili, en se servant de l'électricité voltaïque, et les comparer à ceux dont il va être question dans ce Mémoire, je rapporterai les principaux résultats obtenus par ces deux physiciens.

Lorsqu'une plaque métallique est soumise à l'action de plusieurs décharges d'une batterie électrique, au moyen d'une pointe également de métal, la couleur de la plaque change à une distance considérable autour de la tache centrale, et l'espace entier est recouvert d'un certain nombre d'anneaux concentriques, dont chacun présente les belles couleurs du spectre. Plus la pointe est rapprochée de la lame, plus tôt on voit naître les couleurs, et plus aussi les anneaux sont serrés : si la distance est excessivement petite, les couleurs apparaissent à la première décharge ; mais alors elles sont confuses

Le nombre des anneaux augmente en raison du degré de finesse de la pointe plus celle-ci est émoussée plus les anneaux sont larges mais aussi moins ils sont nombreux. Sur une lame d'acier pour une distance donnée les couleurs ne se manifestent pas immédiatement autour de la tache centrale on observe d'abord une zone rouge obscure puis après quatre ou cinq décharges, en regardant obliquement la surface on aperçoit un espace circulaire légèrement ombré, ou empreint d'une couleur rouge extrêmement faible se remplissant par degrés d'anneaux de toutes les couleurs et dont les bords deviennent blanchâtres si l'on continue les décharges au delà du premier espace annulaire qui se dessine d'abord comme une ombre légère et qui est la première nuance des couleurs plus pâles se développant autour du rouge brun dont se compose la surface intérieure. Les teintes les plus prononcées se montrent d'abord autour de la tache centrale et reculent à mesure que l'on multiplie les explosions pour faire place à de nouvelles couleurs après trente ou quarante décharges. On a trois anneaux bien distincts en continuant les cercles colorés deviennent moins beaux et moins nets par la raison que le rouge domine et teint plus ou moins les autres couleurs.

Les anneaux déposés adhèrent suffisamment pour qu'une plume ou le doigt même mouillé ne les altèrent en rien néanmoins on peut les enlever avec l'ongle. Les anneaux intérieurs sont les plus résistants néanmoins comme on le voit, *ils ne peuvent résister à un frottement un peu fort*.

Quand les décharges sont trop énergiques et qu'on opère sur l'acier la surface se corrode et il en résulte des érosions qui nuisent à la netteté des effets produits. Ces érosions n'ont pas lieu sur l'argent l'étain et le bronze poli. Les anneaux colorés ainsi que les effets précédemment décrits qui les accompagnent se montrent sur l'or l'argent, le cuivre le bronze le fer le plomb et l'étain et toujours quel que soit le sens de la décharge.

Pour obtenir les anneaux colorés au moyen de l'électricité voltaïque il faut comme Nobili l'a fait le premier concentrer le courant venant d'un des pôles de la pile dans un fil de platine dont la pointe seulement plonge dans le liquide à décomposer tandis que l'autre pôle est en relation avec une lame de métal se trouvant dans le même liquide. Cette lame est placée perpendiculairement à la direction du fil et à environ 1 millimètre de la pointe. Les effets produits dépendent de la nature de la lame métallique de son état positif ou négatif et de la nature de la dissolution. On les obtient facilement en peu de secondes avec une pile de forme ordinaire.

» Nobili ayant soumis à l'expérience un grand nombre de dissolutions avec

un fil de platine et des lames de platine d'or, d'argent, d'étain, de bismuth de cuivre de l'aiton etc , a obtenu des resultats tres-variés dont je vais rapporter les principaux

Dissolution de sulfate de cuivre

Lame d'argent positive — Quatre ou cinq cercles concentriques alternativement clairs et obscurs

Lame d'argent negative — Trois petits cercles concentriques le plus grand et le plus petit d'un rouge foncé, le cercle intermédiaire d'une teinte plus claire

Lame de l'aiton positive — Traces legeres de cinq cercles concentriques de la couleur du l'aiton, les uns plus clairs, les autres moins, et alternant ainsi entre eux

» *Lame de l'aiton negative* — Cercles de deux nuances de cuivre métallique alternant comme sur l'argent

Dissolution de sulfate de zinc

Lame d'argent positive — Tache obscure au centre, cercle jaune clair puis un cercle d'un bleu léger, et enfin une belle zone tirant sur le jaune

Lame de l'aiton positive — Cinq petits cercles provenant de cuivre mis a découvert par l'action du courant et présentant deux teintes alternatives, l'une claire l'autre sombre

Dissolution de sulfate de manganese

Lame d'argent positive — Cinq cercles concentriques alternativement clairs et foncés, le cinquieme plus distinct que les autres, et entouré d'une auréole d'un jaune pble qui se fond en une teinte violacée Ces cercles ont de l'analogie avec ceux obtenus avec le sulfate de cuivre

Dissolution d'acetate de plomb

Lames d'or et de platine positives — Iris concentrique, composée d'anneaux naissant les uns des autres, et se propageant à la manière des ondes

Lame d'argent positive — Iris moins distincte que sur l'or et le platine

Dissolution d'acetate de cuivre

Lames de platine, d'or, d'argent positives — Rien de remarquable

Mêmes lames négatives — Avec l'argent, par exemple, souvent quatre

cercles concentriques, qui, exposés à l'air, prennent les teintes suivantes : bleu foncé au centre, puis rouge jaunâtre, bleu moins foncé, et rouge jaunâtre, et présentant une autre nuance que la seconde teinte

Dissolution d'acetate de potasse

Lame d'argent positive — Un cercle au milieu de trois autres, de 1 centimètre de diamètre, environné d'un filet d'argent très-brillant auquel succède une aureole de couleurs diverses, mais faible

Des résultats analogues ont été obtenus par Nobili avec beaucoup d'autres dissolutions, et notamment avec des liquides extraits de corps organiques, tels que les suc de carotte, d'oignon, de persil, d'ail, de pomme de raifort, de chou pomme, de feuilles de celeri, de betterave. Les effets obtenus avec ces liquides sont tellement curieux que je crois devoir en citer quelques-uns

Suc de carotte

Lame d'argent positive — Centre obscur entouré de deux cercles, l'un jaunâtre, l'autre verdâtre, puis diverses zones fortement colorées

Suc de raifort

Argent positif — Au centre un point obscur, autour un petit cercle blanc, une zone verdâtre, terminée par un cercle bleu; ensuite un ou deux cercles d'un beau jaune d'or, et enfin quelques iris assez faibles

Suc de betterave

» *Argent positif* — Au centre, un point rouge environné de quatre cercles, le premier jaune, le deuxième bleu, le troisième rouge et le quatrième vert, plus loin deux ou trois beaux iris

Nobili a tiré de ses expériences les conséquences suivantes

1° *Il existe une différence entre le mode d'action des deux pôles, relativement à la faculté qu'ils possèdent de se couvrir de matières*, le pôle positif l'emportant néanmoins de beaucoup sur le pôle négatif, surtout à l'égard des matières organiques,

2° En général l'effet du pôle négatif est augmenté en opérant avec un courant plus intense, ou bien en ajoutant aux sels métalliques un sel à base alcaline

» Le même physicien avait pensé qu'il pourrait bien se faire que les effets de coloration qu'il avait obtenus fussent dus à des dépôts de lames minces, mais il ne s'était pas rendu compte de la nature de ces dépôts. Par exemple, en

rapportant ce qui se passe avec un mélange des deux acetates de cuivre et de plomb, il jointe *Annales de Chimie et de Physique*, 2^e serie, t XXXIV, p 297)

« Mais si les uns proviennent, comme cela pourrait être, de quelque une des substances électro-négatives de la solution qui se déposent en lames minces à la surface de ces deux métaux, pourquoi n'en arriverait-il pas autant avec les autres métaux? C'est là peut-être une question qui n'est pas indigne d'exercer la sagacité des chimistes

Ils sont les résultats généraux obtenus, d'une part par Priestley et, de l'autre par Nobili dans leurs expériences sur la production des anneaux colorés au moyen de l'électricité, et que j'ai eu devoir rapporter, afin de faire connaître l'état de la question concernant la coloration, quand je l'ai reprise sous un point de vue différent de celui de ces deux physiciens. Je reviendrai sur ces résultats après avoir exposé ceux qui font le sujet de ce Mémoire

Pour colorer les métaux suivant la méthode indiquée dans mon premier Mémoire et décrite avec plus de détail dans les *Éléments d'électro-chimie* que j'ai publiés récemment je me sers d'une dissolution plombique alcaline dans laquelle l'oxyde joue le rôle d'élément électro-négatif. Je rappellerai en peu de mots le mode d'expérimentation. La dissolution est mise dans un bocal de verre, ou se trouve un cylindre de porcelaine degoudée rempli d'acide nitrique dans la dissolution plonge l'objet à colorer et dans l'acide une lame de platine. L'objet est mis en communication avec le pôle positif d'un appareil décomposant forme de quelques éléments et la lame de platine avec le pôle négatif on peut et cela est plus facile supprimer le vase poreux et l'acide nitrique et plonger la lame de platine dans la dissolution alcaline. Aussitôt que la communication est établie la surface de l'objet se recouvre de couches minces successives de peroxyde de plomb qui produisent des effets de coloration. L'adhérence de ces couches est aussi grande que celle de l'or sur le cuivre dans la dorure, par la raison que le protoxyde de plomb qui passe à l'état de peroxyde par la réaction de l'oxygène de l'eau et l'or se rendent au pôle qui convient au rôle que chacun de ces corps joue dans la dissolution. Le dépôt de peroxyde peut donc s'effectuer aussi régulièrement sur la surface positive que l'or sur la surface négative quand on remplit toutes les conditions qui seront indiquées ci-après. Je commencerai par la dissolution de plombate de potasse

De la composition de la liqueur

« La solution alcaline doit être complètement saturée d'oxyde de plomb,

sans quoi les couches déposées de peroxyde ne tarderaient pas à se dissoudre dans l'alcali, aussitôt que le courant cesserait de circuler ou seulement quand il y aurait un ralentissement dans son action chimique. Il est donc nécessaire, quand elle a servi, de la faire bouillir de temps à autre avec un excès de litharge dans un ballon, hors du contact de l'air autant que possible, pour empêcher que la potasse n'absorbe de l'acide carbonique. Quand elle a servi pendant longtemps et qu'elle renferme, par conséquent, du carbonate de potasse, il faut la faire bouillir avec de la chaux caustique, laisser déposer le carbonate de chaux formé, et filtrer s'il est nécessaire ou bien decanter la partie claire de la dissolution, que l'on verse dans un vase de forme convenable. Cette dissolution doit marquer de 24 à 25 degrés de l'aréomètre de Baumé, car l'expérience a prouvé que cette densité est la plus convenable pour obtenir les meilleurs effets. Quand elle ne sert plus, on la remet dans un ballon que l'on bouche avec soin.

La température de la liqueur doit être celle ambiante, c'est à dire qu'elle ne doit pas dépasser 12 à 15 degrés.

Le succès de l'opération dépend de la bonne composition de la liqueur, de sa densité, de sa température, et, en outre, comme nous le dirons ci-après, de l'intensité du courant et du parfait nettoyage des pièces. Cette opération est aussi essentielle pour la coloration des métaux que pour la dorure électrochimique ou par immersion. La présence des corps gras et autres substances non conductrices sur les surfaces métalliques exige ce parfait nettoyage.

De la préparation des surfaces.

« J'ai déjà dit que les couches de peroxyde de plomb déposées étant transparentes, laissent voir la surface des objets. Par conséquent, telle est la surface de ces objets, tel est leur aspect ou plutôt tel est l'éclat des couleurs. Par conséquent, il faut à leur donner préalablement l'état qui convient, c'est à dire le brillant ou le mat, si l'on veut avoir des couleurs brillantes ou ternes. Supposons qu'il s'agisse de lames polies d'or, de cuivre doré ou de platine. On commence par les frotter avec une brosse douce et de l'eau légèrement alcalisée, puis on lave à grande eau. Dans le cas où l'adhérence des matières étrangères est trop forte pour qu'elles soient enlevées par ce moyen, on frotte les lames avec une brosse recouverte de rouge d'Angleterre puis avec une brosse et de l'eau alcalisée, et on lave à grande eau. On voit alors que des pièces, qui étaient inactives d'abord, se recouvrent facilement des plus riches couleurs. Ces diverses préparations sont surtout

nécessaires quand ayant enlevé les couleurs, on remet de nouveau en expérience les pièces, car il reste souvent des dépôts qui nuisent à l'éclat des couleurs ou s'opposent même à tout dépôt ultérieur. Les pièces étant préparées, il faut éviter d'y toucher avec les doigts, car leur marque est indiquée par une absence de dépôt ou simplement un dépôt de mauvais effet. Il faut donc prendre les plus grandes précautions pour attacher les fils conducteurs. Ainsi est-on obligé de tenir les objets avec un linge n'ayant touché à aucune matière organique capable d'adhérer aux surfaces. D'une bonne préparation on le répète, dépend le succès de l'opération.

Il faut agir autrement à l'égard du cuivre, du fer et des métaux oxydables, qui, en raison de leur oxydation, ne sont pas toujours aptes à recevoir des couleurs aussi belles et aussi variées que l'or, le cuivre doré et le platine.

Pour les objets en cuivre, on doit d'abord leur faire subir un premier décapage, en chauffant les pièces jusqu'au rouge et les plongeant immédiatement dans de l'acide sulfurique étendu marquant 12 degrés à l'aéromètre et dont la température est de 60 à 80 degrés. On procède ensuite au décapage en les plongeant d'abord dans de l'acide nitrique, puis dans un mélange d'acide nitrique et d'acide sulfurique, dans la proportion de trois parties du premier et une du second avec addition d'une petite quantité de sel marin. On évite la suie qui pourrait déposer des matières grasses. On lave à grande eau et on plonge immédiatement dans le bain alcalin, sans sécher à la sciure, opération qui ne serait pas sans inconvénient, en raison des corps étrangers qui se déposeraient sur les surfaces.

Les pièces décapées peuvent rester à la vérité quelques instants dans l'eau hors de l'influence de l'air, mais néanmoins il ne faut pas trop attendre crainte d'altération.

Quand le cuivre a été bien décapé avec ce qu'on appelle le brillant, on obtient des effets de coloration très-satisfaisants, mais qui n'approchent pas cependant de ceux que donnent le bruni et le poli, avec le bruni surtout, qui donne une vigueur de ton que l'on n'obtient pas avec le décapage, mais, dans ce cas, l'opération même du poli ou du bruni apporte, sur les surfaces, des corps étrangers dont il faut les débarrasser en lavant comme ci-dessus, non avec une brosse et une solution aqueuse de potasse, mais bien avec un linge fin trempé dans de l'alcool tenant en dissolution une petite quantité de potasse puis laver à grande eau.

Toutes les fois que les pièces de cuivre ou de laiton, principalement ces dernières, n'ont que de petites dimensions 2 ou 3 centimètres carrés de

superficie égale, la coloration suit les memes phases que sur les surfaces dorées de petite ou de grande étendue mais lorsque les dimensions sont considérables, la surface reste brillante pendant plus ou moins de temps et semble se trouver dans un état passif semblable a celui du fer qui a été plongé dans l'acide nitrique concentré dans ce cas il n'y a aucun effet de coloration. D'où peut donc provenir cet état passif du laiton mis en rapport avec le pôle positif d'un appareil voltaïque? Est il dû ou a la formation d'un oxyde de cuivre qui s'oppose par conséquent à celle du peroxyde anhydre ou bien parce que le plombate de potasse est simplement décomposé? Ce sont des questions que nous avons dû indiquer en parlant de l'état des surfaces mais qui ne pourront être approfondies que lorsque je parlerai de la coloration. On reconnaît immédiatement à un signe certain que celle ci ne s'effectuera pas c'est lorsqu'il se dépose beaucoup de plomb sur l'électrode négatif et cela s'explique facilement le protoxyde de plomb n'étant pas peroxydé doit être réduit aussi peu d'instants après l'immersion on voit si la coloration aura lieu ou non.

Quant à la préparation du fer ou de l'acier lorsque la plaque a été polie on frotte la surface avec de l'eau alcalisée et on lave à grande eau.

Du procede de coloration

Lorsque l'on soumet à l'action d'un appareil composé de quelques couples une dissolution saturée de protoxyde de plomb dans la potasse au degré de densité indiqué en prenant pour électrode négatif un fil ou une lame de platine et pour électrode positif une lame d'or ou de platine il se dépose immédiatement sur celle ci une couche de peroxyde anhydre de plomb qui augmente peu à peu d'épaisseur en produisant successivement tous les effets de couleur que présentent les anneaux colorés ou les lames minces. Aussitôt que la coloration est terminée, il faut retirer la lame colorée de la dissolution plombique, et la laver à grande eau afin d'enlever toute la potasse qui reagirait assez promptement sur le peroxyde pour le changer en protoxyde qu'elle dissolverait. La coloration commence d'ordinaire sur les bords des lames, dans les parties les plus éloignées des points d'attache dans les parties, par conséquent, où l'action chimique du courant est la plus forte. C'est pour ce motif que sans précautions préalables, il est impossible d'avoir des couleurs uniformes. Les couches de peroxyde de plomb adhèrent tellement, qu'elles supportent le brun à la main ou au rouge d'Angleterre, et non le brun à la sanguine ou au brun noir d'acier ou de corne, par la raison que cette opération ne peut s'appliquer qu'aux

substances malléables dont les parties s'étendent sous le brunissoir, propriété que ne possède pas le peroxyde de plomb, qui dès lors doit se détacher de la surface sur laquelle il est déposé quand l'action du brunissoir est suffisamment forte. En outre, l'adhérence du peroxyde est d'autant plus forte que les métaux, du moins leurs oxydes, sont plus aptes à former des combinaisons avec ce composé, cette adhérence est tellement forte quelquefois que le dépôt résiste assez longtemps à l'action des acides étendus.

Le peroxyde de plomb n'étant pas conducteur de l'électricité, il en résulte que l'épaisseur de la couche qui colore est très-limitée. Avant de faire connaître les différents procédés que nous avons adoptés pour obtenir tous les effets de couleur désirables, je dois indiquer l'ordre que suit la coloration, afin de pouvoir analyser facilement tous ces effets.

Des différents ordres de coloration

La coloration obtenue sur les surfaces métalliques par le dépôt de couches successives de peroxyde de plomb est due, comme je l'ai dit, au phénomène des lames minces qui laissent voir par transparence, quand il n'y a pas oxydation, la surface métallique sur laquelle elles sont déposées. Si cette surface est colorée, les couleurs dépendant de l'épaisseur des lames se mêlent avec celle qui lui est propre, d'où résultent des effets qui, bien qu'altérant les couleurs des anneaux colorés, ne changent en rien la succession des ordres différents, lesquels ne sont plus alors composés de couleurs simples. Avec l'or, par exemple, il est impossible d'obtenir le bleu, puisque la couleur jaune se mêlant au bleu donne un vert bleuâtre, très-beau à la vérité, mais qui n'est pas le bleu des anneaux colorés. Avec le platine on arrive au bleu au bleu outremer, au plus beau bleu que l'on puisse obtenir. Je vais indiquer actuellement comment se succèdent, sur une lame d'or, les couleurs dues au dépôt de couches successives de peroxyde de plomb.

Premier ordre

Premier ordre des couleurs des anneaux colorés de Newton

Noir, bleu très-pâle, blanc vif, jaune-orangé, rouge

Premier ordre des couleurs des couches de peroxyde de plomb

Le léger dépôt dont la couleur ne peut être caractérisée, tant elle est fugitive orange, orangé foncé, gris-perle, tirant sur le verdâtre, le jaune d'or, rouge faible, beau rouge prismatique

Deuxieme ordre

Deuxième ordre des couleurs des anneaux colorés de Newton
Pourpre sombre, pourpre, vert-pré vif, jaune vif rose-cramoisi
Deuxieme ordre des couleurs des couches de peroxyde de plomb
Rouge tirant sur le violet vert-bleuâtre beau vert jaune, rouge

Troisième ordre

Troisième ordre de Newton
Pourpre bleu, vert-pré vif, jaune brillant, rose-cramoisi
Troisième ordre des lames de peroxyde de plomb
Violet vineux, vert foncé, vert tirant au rouge Les couleurs au delà prennent de plus en plus un aspect foncé, et enfin on arrive au noir d'ajet

En comparant les couleurs des anneaux colorés de Newton et celles des couches de peroxyde de plomb appartenant à un même ordre on voit des rapports bien manifestes puisque, à quelques exceptions près, il n'y a de différence que dans les teintes, l'ordre des couleurs se succède en effet assez bien

Sur le cuivre on observe les mêmes ordres de couleurs, si ce n'est qu'elles ne sont plus mélangées de jaune, mais bien d'une teinte rougeâtre qui leur donne de l'intensité

Sur l'argent parfaitement poli, on commence par apercevoir une couleur jaune-verdâtre, due en partie à l'oxydation de l'argent, puis le jaune le rouge, le bleu et le vert, ensuite d'autres couleurs qui deviennent de plus en plus foncées

Sur le platine, toutes les couleurs précédentes prennent de plus en plus une teinte bleue, aussi celles qui sont bleues ou vert-bleuâtre donnent-elles le plus beau bleu, le bleu éclatant de l'outremer

Sur le fer, et surtout sur l'acier, les différents ordres de couleurs se montrent avec assez d'intensité, mais en général elles sont assombries par la couleur grise du métal, j'ai soumis à l'expérience les métaux exempts de couleur et ceux qui offrent des couleurs foncées J'examinerai dans un autre Mémoire les effets obtenus sur le nickel, le cobalt, etc

Des diverses dispositions à prendre pour donner des teintes uniformes ou variées aux surfaces

Pour obtenir des teintes uniformes, il faut disposer l'objet pour que l'action du courant soit la même sur tous les points de la surface, sans quoi

il y aurait des parties plus recouvertes de couches de peroxyde que d'autres, de là des couleurs prismatiques ou des teintes plus ou moins variées sur la même surface ce qui produirait une irisation qui nuirait souvent à l'effet pittoresque. Pour avoir une seule couleur, il faut remplir plusieurs conditions qui dépendent des propriétés chimiques des courants, et de l'habileté de l'opérateur.

1° Les dépôts de peroxyde doivent être successifs et extrêmement minces afin de ne pas passer brusquement d'une couleur à une autre, c'est à dire qu'il faut s'arrêter pour avoir successivement toutes les teintes d'une même couleur. Dans ce cas on ne court le risque que d'avoir sur une même surface des tantes assez rapprochées d'une même couleur. On y parvient en prenant pour électrodes négatifs des fils de platine depuis 1 millimètre jusqu'à $\frac{1}{10}$ de millimètre. Chaque fil est introduit dans l'intérieur d'un tube de verre, dont l'une des extrémités est fondue à la lampe et le fil coupe ras à cette extrémité afin d'avoir en dehors du tube une pointe métallique plus ou moins fixe par laquelle le courant débouche, de cette manière on peut faire circuler dans le liquide un courant produit par une très-petite quantité d'électricité. À l'autre extrémité le fil est fixé avec du mastic, et on lui donne une certaine longueur, afin de le mettre en relation avec le pôle négatif de l'appareil décomposant. On prépare ainsi un certain nombre de tubes, tous en communication avec ce pôle afin de prendre celui qui convient à l'étendue de la surface soumise à l'expérience. L'électrode négatif étant ainsi réduite aux plus petites dimensions possibles puisqu'il ne peut avoir que la section d'un fil métallique presque microscopique, le dépôt des couches est graduel. Bien entendu qu'il faut enlever de temps à autre, le dépôt de plomb qui du reste est peu considérable quand l'action est lente.

Au lieu d'un tube, que j'appellerai tube électrode, souvent on en reunit plusieurs semblables, en les accolant les uns aux autres, de manière à ce que toutes les pointes soient dans le même plan, ou bien on introduit dans le même tube un certain nombre de fils de platine, en fermant à la lampe l'extrémité par laquelle ils doivent plonger dans la dissolution. On les coupe à une certaine distance du tube, et on les écarte de manière à avoir un véritable pinceau.

2° Les objets communiquent avec le pôle positif de l'appareil décomposant, quand ils n'ont qu'une étendue de 2 à 3 centimètres, on se borne à les attacher avec un fil de fer ou un fil de cuivre en relation avec ce pôle, ou bien on tient l'objet avec une pince de fer en relation avec l'appareil, en ayant l'attention de limer fréquemment l'intérieur des branches, afin d'en-

lever le peroxyde déposé qui, n'étant pas conducteur, empêcherait le courant de circuler. Si l'objet a une certaine étendue, il faut multiplier les fils de communication, afin que le courant débouche par un plus grand nombre de points. On peut saisir aussi l'objet avec une pince en métal, en la changeant de place sans quoi les points d'attache ne se coloreraient point. Enfin plus le nombre des points de contact sera multiplié plus le dépôt approchera de l'uniformité. Si l'on agit d'une surface carrée de peu d'étendue on attachera à chaque angle un fil. Si l'étendue est considérable on fera passer la lame sur deux fils croisés à angle droit passant par les milieux des côtés. Avec un triangle les trois angles sont mis en relation avec le pôle positif avec un cercle le point d'attache doit être au centre. Enfin la loi de symétrie relativement à la position des points de jonction doit être observée car c'est le seul moyen de rendre uniforme l'action décomposante du courant.

3° Si l'on agit d'un anneau cylindrique on placera la pince d'un côté intérieur et l'on ouvrira les branches en les tenant écartées avec un coin de bois, ou bien on introduira dans l'intérieur un mandrin conique qui permettra, en l'enfonçant plus ou moins d'appliquer la pièce sur le mandrin mis en relation avec le pôle positif. Si le cylindre est court, on le pose sur un plateau ou un treillage en cuivre communiquant toujours avec le pôle positif et en ayant le soin d'enlever le peroxyde déposé par un moyen que nous indiquons bientôt. Voilà pour ce qui concerne le mode de communication des objets avec le pôle positif. Je vais indiquer comment on doit opérer avec le tube électrode pour arriver à l'uniformité ou à la variété des teintes.

Cet électrode ne doit jamais rester en repos, car le dépôt serait toujours plus abondant dans les points les plus rapprochés de l'objet. Il est donc indispensable de le promener continuellement au dessus de la surface à recouvrir, en le tenant toujours sensiblement à la même distance qui doit être d'autant plus grande que les objets ont moins de surface. C'est le seul moyen de rendre égale la distance entre la pointe métallique et tous les points de la surface, puisque les lignes obliques diffèrent de moins en moins de la perpendiculaire. Cette différence est surtout moins grande à l'égard des creux et des reliefs qui, sans cette précaution, présenteraient des différences dans leur coloration. Quand les corps ont de grandes dimensions, il faut écarter davantage la pointe de la surface, il faut accélérer le mouvement du tube électrode de manière à porter sans cesse la pointe, si l'on agit d'un objet plan, du centre à la périphérie. Il est des cas où la pointe doit être éloignée de 1 à 2 décimètres de la surface. On pourrait croire qu'en employant des dissolutions de plom-

bate de potasse plus ou moins étendues, on arriverait plus sûrement au but qu'on se propose c'est-à-dire à une coloration lente et successive. La théorie l'indiquait effectivement, mais l'expérience a prouvé le contraire les meilleurs résultats sont ceux obtenus avec la dissolution plombique saturée de potasse marquant 24 à 25 degrés de l'aréomètre de Baumé à la température ordinaire. Avec des dissolutions moins saturées, les couleurs n'ont pas d'éclat, et sont si lentes à se former, qu'il faudrait un temps considérable pour arriver à toutes les successions de teinte que l'on veut avoir. Le vase dans lequel on opère doit avoir de grandes dimensions dans tous les sens, afin d'être libre dans la manœuvre et de pouvoir écarter les tubes électrodes de la surface des objets autant qu'on le juge convenable en vue des objets que l'on veut produire. La forme cylindrique est la plus convenable, parce qu'elle permet d'obtenir une action régulière en promenant le tube électrode appliqué le long de la paroi intérieure, quand les objets ont de grandes dimensions, le diamètre du vase doit être deux ou trois fois celui de ces objets.

Pour fixer les idées sur la manière de manœuvrer le tube électrode, je citerai quelques exemples. Sagit-il de recouvrir uniformément, non plus la surface supérieure d'une lame carrée, mais les deux surfaces, après avoir établi un conducteur à chacun des quatre angles, on place horizontalement cette lame dans la dissolution et l'on promène le tube électrode à une distance convenable des bords en maintenant constamment la pointe au niveau de la lame et dans le même plan qu'elle, afin que l'action du courant soit la même au-dessus et au-dessous. Si la pièce a de plus grandes dimensions, après y avoir attaché le nombre de conducteurs convenable le tube électrode simple ne suffit plus il faut un tube électrode à deux ou plusieurs branches, dont chaque fil vient aboutir à un autre en communication avec le pôle positif de l'appareil décomposant. Je considère d'abord le tube à deux branches, composé de deux tubes électrodes accolés l'un à l'autre, passés dans un bouchon, afin de pouvoir les faire glisser l'un sur l'autre dans le sens de leur longueur. Les deux bouts soudés sont recourbés à angle droit, d'abord à une distance qui doit être égale au moins à la demi-largeur de l'objet, puis à peu de distance de l'extrémité, afin de mettre les deux pointes sur la même ligne en regard. La branche terminale peut avoir seulement $\frac{1}{2}$ centimètre de longueur, la lame est placée entre les deux pointes, chaque surface à la même distance de la pointe en regard. On peut manœuvrer cet appareil de manière à présenter successivement chaque pointe également vis-à-vis tous les points correspondants de chacune des deux surfaces. Comme la longueur de chaque premier coude est égale à un peu plus de la demi-largeur de l'objet, pour

atteindre tous les points, il suffit de faire tourner tout le système autour de cet objet. Nous répétons que l'électrode double ou simple doit être continuellement en mouvement, en ayant soin que chaque pointe soit toujours à égale distance de la surface en regard, sans quoi l'action électro chimique serait plus forte d'un côté que de l'autre, on remplit cette condition au moyen de la disposition suivante. On fixe sur la paroi supérieure du vase deux petits tubes ou deux baguettes de bois dans une direction parallèle et l'on place l'objet, si c'est une lame carrée, de manière que deux des côtes soient à égale distance de ces bords. On applique le bord inférieur de la grande courbure du tube supérieur sur l'un des tubes de cette manière les deux pointes sont à égale distance des deux surfaces. Si l'on veut opérer régulièrement sur une surface circulaire on fait glisser le tube électrode dans l'intérieur d'une spirale horizontale de cuivre, dont le sommet correspond au centre du cercle et dont tous les points sont également éloignés de la surface supérieure de l'objet.

Veut-on colorier intérieurement une surface hémisphérique on remplit la capacité de la dissolution, et l'on met en communication le vase avec le pôle positif, en le posant sur une lame de cuivre en relation avec ce même pôle. On immerge le tube électrode de manière à placer la pointe au centre de la section, et on l'y laisse dans une position fixe. Dans ce cas l'action décomposante du courant est la même sur tous les points de la surface. Avec un vase cylindrique, le tube électrode doit être placé suivant l'axe et la pointe pointée constamment de haut en bas, si l'on s'agit d'une sphère il faudrait que la pointe fût placée au centre, immobile. On voit que dans tous ces arrangements, la loi de symétrie est remplie.

Pour être assuré que l'on passe successivement par toutes les teintes intermédiaires, et pouvoir s'arrêter non-seulement à la couleur, mais encore à la teinte que l'on désire avoir, l'immersion du tube électrode ne doit durer que quelques secondes, surtout à l'approche de cette couleur ou de cette teinte. On retire alors la pièce du bain on juge de l'état de coloration, mais, quand on cesse, il faut immédiatement laver à grande eau et faire tomber sur la pièce un courant d'eau froide, afin d'enlever les moindres quantités de potasse qui altéreraient assez promptement les couleurs.

J'ai à faire connaître maintenant comment il faut opérer pour donner à une surface ou à une portion de surface des couleurs différentes ou des teintes d'inégale intensité, comme cela doit avoir lieu pour colorer les pétales ou autres parties d'une fleur. Il faut, pour cela, partir de ces deux principes que les dépôts formés sur les lignes terminales sont les plus forts,

ainsi que les parties les plus rapprochées de la pointe du tube electrode. Rien n'est plus simple : à l'aide de ces deux principes et en prenant un certain nombre de fils de communication, d'arriver au but qu'on se propose.

Supposons un cercle représentant la projection horizontale d'une rose, et que l'on veuille colorier en vert la partie centrale : on commence par mettre le tube electrode pendant quelques instants au dessus de cette partie : la surface se couvrira d'un dépôt qui sera plus fort là que partout ailleurs. Si l'on fait on portera le tube bien au-dessus de la première position, pour que l'action soit partout uniforme : le vert se produira dans la partie centrale tandis que les parties latérales rouges auront une teinte d'autant plus uniforme qu'elles s'éloigneront du centre. Si l'on veut la nuancer on recommencera le tube electrode en décrivant sensiblement une spirale qui aboutira au centre. Avec une certaine habitude on parvient à *peindre* une fleur avec les tubes electrodes simple ou composé avec toutes ses nuances de sorte que ces tubes peuvent être comparés jusqu'à un certain point, à des pinceaux. La perfection des effets produits dépend 1° des connaissances électro-chimiques de l'opérateur 2° de son adresse 3° de son talent artistique.

Les objets colorés que j'ai l'honneur de mettre sous les yeux de l'Académie quoique ne réunissant pas toutes les qualités que la coloration électro-chimique présenterait un jour donneront cependant une idée du parti que l'on pourra tirer pour l'industrie, de l'art dont j'expose ici les principes généraux.

Je mets une foule de détails que l'opérateur trouvera facilement quand il aura acquis une certaine habitude dans les manipulations.

Quand une pièce est manquée rien n'est plus simple que d'enlever les couches de peroxyde : il faut la plonger pendant quelques instants dans de l'acide acétique étendu pour décomposer le peroxyde et dissoudre le protoxyde : brosser la surface puis laver.

De l'appareil décomposant

Pour obtenir tous les effets qui viennent d'être décrits il faut employer un appareil décomposant sensiblement à courant constant pendant toute la durée des opérations. Il doit être d'une manœuvre facile, et je n'ai rien trouvé de mieux que des couples composés d'un cylindre de cuivre de 1 décimètre de diamètre de 1 décimètre et demi de hauteur, d'un cylindre plein de zinc de 2 ou 3 centimètres de diamètre, qu'on amalgame préalablement et entouré du précédent, chaque couple est placé dans un bocal cylindrique de verre, et mis en relation avec le suivant au moyen des dispo-

sitions connues. La pile est chargée avec de l'eau renfermant environ $\frac{1}{6}$ d'acide sulfurique. Six couples suffisent ordinairement pour toutes les opérations. On peut en employer moins, mais les résultats les plus satisfaisants m'ont été donnés avec ce nombre.

Il faut toujours que le fil conducteur, ainsi que les diverses parties de communication, soient très propres, afin de ne pas avoir des irrégularités dans l'action du courant qui gêneraient l'opérateur.

On s'aperçoit que le courant a une trop forte intensité quand, au lieu de peroxyde anhydre, on voit apparaître le peroxyde hydraté jaune. Il faut alors y remédier, car toute coloration cesse.

De l'altération des couleurs et des moyens de la prévenir

Les couleurs produites par le dépôt de couches minces de peroxyde de plomb s'altèrent-elles plus ou moins promptement à l'air suivant les métaux sur lesquels elles sont déposées? C'est un point important à examiner pour les applications aux arts. Je vais indiquer les causes qui déterminent cette altération, ainsi que celles qui peuvent l'empêcher, ou du moins en atténuer les effets. Les observations que je vais présenter sont relatives à la coloration sur or, parce qu'elle est produite uniquement par les couches successives du peroxyde de plomb non mélangé ou combiné avec d'autres oxydes.

Toutes les causes qui décomposent le peroxyde de plomb altèrent nécessairement cette substance, ainsi, les acides et les alcalis font passer le peroxyde à un état d'oxydation moindre, pour se combiner avec le protoxyde. On doit donc éviter de laisser les objets colorés exposés aux émanations acides ou ammoniacales qui, en décomposant le peroxyde de plomb, altéreraient les couleurs. Le seul moyen d'empêcher le contact des émanations acides ou ammoniacales, est de placer les objets sous verre, ou bien de recouvrir leur surface d'un vernis transparent, résistant, et qui, en s'opposant à l'action des vapeurs, n'altère que le moins possible leur couleur. Le choix du vernis est donc d'une grande importance pour la conservation des objets colorés.

J'ai fait à ce sujet un grand nombre d'expériences, qu'il est inutile de rappeler ici, pour étudier les qualités de tous les vernis dont je pouvais disposer. Voici les principaux faits observés. Le meilleur vernis serait, sans aucun doute, celui qui, étant saturé d'oxygène, n'en enlèverait pas au corps qu'il recouvre. Or, aucun vernis ne possède cette propriété, on est donc forcé de prendre celui qui est le moins altérable à l'air.

- On distingue quatre espèces de vernis : 1° vernis à l'alcool, 2° vernis à

l'essence de terebenthine, 3° vernis à l'huile de lin, et 4° vernis à l'essence de terebenthine les résines employées pour faire les deux premiers étant ou la gomme laque ou la gomme copal. Les trois premiers vernis ne peuvent convenir, car ce sont ceux qui altèrent le plus les couleurs. Le quatrième les altère aussi, mais moins, surtout quand il est saturé de litharge, parce qu'alors il est moins disposé à réagir sur le peroxyde. Voici la composition de ce vernis : dans un pot vernisse on met $\frac{1}{2}$ litre d'huile de lin, de 4 à 8 grammes de litharge en poudre fine, 2 grammes de sulfate de zinc, et l'on chauffe à une chaleur modérée pendant plusieurs heures. Quand la dissolution de l'oxyde de plomb est faite, on filtre pour séparer la litharge excédante. Si l'huile s'est trop épaissie, on la dissout avec de l'essence de terebenthine qu'on a fait bouillir préalablement dans un ballon sur la litharge pour enlever l'acide succinique qui pourrait s'y trouver, lequel altérerait les couleurs. Le vernis préparé on l'étend sur la pièce en couche très-mince avec un pinceau, et on le fait sécher à une douce température. Quand la pièce est très-sèche, on met une seconde couche et l'on fait également sécher. À la première application du vernis, voici les effets que l'on observe : le bleu du second ordre disparaît, de sorte que le vert bleuâtre devient vert jaune, le jaune et le rouge changent très-peu. Quant aux couleurs du troisième ordre surtout le vert foncé, elles restent intactes.

De sorte qu'un moyen du vernis, les pièces sont tout à fait préservées. Quand on veut obtenir et conserver les couleurs du deuxième ordre à l'exception du vert bleuâtre, du vert pâle, il faut dès l'instant qu'on a passé le vert bleuâtre et que le vert jaune commence à paraître, il faut s'arrêter, laver bien sécher, mettre le vernis, alors la couleur est préservée. Il faut dire que ce vernis ne jouit pas d'une transparence parfaite, puisqu'il est coloré en brun les couleurs perdent de leur éclat mais gagnent en solidité. On peut se demander pourquoi les couleurs du troisième ordre sont plus facilement préservées que celles du deuxième, et surtout du premier. On pourrait croire que les couches de peroxyde étant plus épaisses, sont préservées plus facilement mais alors la première couche disparaissant, on devrait voir la couche qui précède, ce qui ne paraît pas être. Au surplus, la disparition du bleu du second ordre nous montre une action particulière du vernis, qu'il est bien difficile d'expliquer à priori. Je dis à priori parce que les couches de peroxyde de plomb sont si minces, qu'on ne peut analyser les effets produits. On ne peut qu'observer ces effets, les décrire en s'appuyant sur les données que la Physique et la Chimie nous fournissent. MM. Lefranc, habiles fabricants de vernis, ont eu la bonte de

me préparer un vernis gras à la gomme copal, qui, loin d'altérer le bleu produit sur le cuivre platiné, lui donne au contraire plus d'éclat, du moins pour certaines tentes. Ce vernis est le plus résistant que l'on connaisse.

De la coloration des pièces en cuivre, en platine, en argent, maillechort, laiton, en fer ou acier

• Tous les effets de coloration que je viens de décrire ont été produits sur l'or ou le cuivre doré, ces effets ont lieu, quelle que soit l'étendue des surfaces, mais il n'en est pas de même du laiton et quelquefois du cuivre rouge. Il se opere au commencement un phénomène dont je ne connais pas bien la cause, quoique je sois parvenu au moyen de m'en garantir.

• *Laiton* — Quand la pièce est petite (1 ou 2 centimètres de superficie) la coloration se opere dès que le circuit est fermé, et d'autant plus rapidement que la surface est plus petite, mais quand elle est plus grande, la pièce reste brillante pendant longtemps, et conserve même son éclat. La surface se trouve donc dans un état passif analogue à celui qu'on fait acquérir au fer par différents moyens, puisqu'il ne se opere aucun effet de coloration. Cet état apparent de passivité que présentent également d'autres métaux, est-il dû à un simple dépôt d'oxygène sur la surface ou à une couche d'oxyde de cuivre qui se forme avant la formation du peroxyde de plomb? Les faits qui vont suivre laisseront entrevoir la cause du phénomène. L'état apparent de passivité est indiqué par un dépôt abondant du plomb sur l'électrode négatif, ce qui s'explique facilement, puisqu'il ne se forme pas de peroxyde.

• L'expérience ayant appris qu'une très-petite surface se colore immédiatement, il s'ensuit qu'elle acquiert la modification nécessaire pour que le phénomène ait lieu. Cela pose, on peut faire acquérir à de grandes surfaces de laiton cette modification, pour que la coloration se opere comme sur de petites surfaces. Il faut pour cela plonger d'abord dans la dissolution alcaline une petite portion de la surface, qui se colore aussitôt, et continuer à immerger les parties voisines jusqu'à ce que toute la pièce soit en contact avec le liquide.

• La modification qu'acquiert alors la pièce est indiquée par un nuage fugitif qui recouvre toute la pièce et dont on ne peut définir la couleur, tant elle est fugace, mais ce qu'il y a de particulier et de non moins étonnant, c'est que la première partie plongée qui s'est colorée presque entièrement, perd sa couleur et reprend sensiblement celle du métal, sans qu'il soit possible de la recolorer, une fois le nuage étendu comme une ombre sur toute

la surface, en très-peu d'instants on voit toutes les phases de la coloration se produire telles qu'elles ont été décrites précédemment, et dont les couleurs rivalisent pour l'éclat avec ce que l'or le plus poli nous a offert de mieux. Il n'est question, bien entendu ici, que de la coloration analogue à celles obtenues sur l'or et le cuivre doré, et non de la coloration dont les teintes ont un aspect vineux que l'on obtient sur de grandes pièces, qui restent longtemps en expérience.

Quand on veut colorer une pièce ayant de certaines dimensions, en suivant la marche que je viens d'indiquer, on la pose sur un plan incliné plongeant dans la dissolution et le long duquel on la fait descendre lentement. Au moyen de cette disposition, il n'y a à chaque instant, en contact avec la liqueur, qu'une petite portion de la surface non encore soumise à l'action voltaique. On se voit porté à croire, en raison des effets produits, que si l'on augmentait les dimensions de l'électrode négative, on rendrait promptement active une grande surface, mais l'en est rien, car, que cet électrode soit grand ou petit, la surface positive, qu'elle a une certaine étendue, reste toujours passive, de sorte que pour la rendre active il faut suivre la marche que je viens d'indiquer. Quant à la véritable cause du phénomène, je ne l'ai pas encore aperçue. Seulement, comme les couleurs sont plus vives sur le laiton que sur l'or, il est probable qu'il se forme une combinaison ou peut-être un mélange d'oxyde de cuivre et de peroxyde de plomb que des recherches ultérieures feront connaître. En attendant, je dirai que parmi les couleurs obtenues, il y a, dans le second ordre, un jaune d'or comparable à celui de l'or, et qui, dans quelques cas même, paraît identique.

Le cuivre rouge prend aussi quelquefois l'état passif, mais moins fréquemment que le laiton.

L'argent n'est jamais passif quand sa surface est préparée en suivant toutes les indications que j'ai données, mais sa coloration ne ressemble en rien à celle des autres métaux. Quoique l'on puisse suivre les différents ordres des anneaux, attendu que ce métal éprouve promptement une oxydation qui donne une teinte jaunâtre vineuse à toutes les couleurs, quand la surface est parfaitement polie, et que le courant n'est pas assez intense pour altérer bien sensiblement l'argent, alors on peut obtenir des couleurs assez vives.

Le platine et surtout le cuivre platiné se colorent des plus riches couleurs bleues que l'art, je crois, puisse produire. Tout porte à croire que l'oxydation du platine intervient dans la production de ces couleurs, qui seraient le résultat de la combinaison ou du mélange d'un oxyde de platine et de peroxyde de plomb, c'est un point qui sera ultérieurement traité, bien que le

bleu soit la couleur dominante, néanmoins, on obtient plusieurs couleurs des diverses séries des anneaux colorés. Les violettes et les bleus qui se trouvent parmi les objets que j'ai l'honneur de présenter à l'Académie montreront, je crois jusqu'à quel point la couleur bleue dont il est question approche de celle des fleurs naturelles.

Le maillechort, frotté à sec avec de la ponce très fine et une brosse se colore très-bien, sans que sa surface devienne passive, du moins dans la plupart des cas. Quand sa surface est polie on peut y développer de très-belles couleurs.

» L'acier poli se colore facilement quand sa surface a été préparée convenablement. On retrouve les diverses teintes qu'il prend quand on le chauffe outre les tons qui dépendent des dépôts successifs de couches de peroxyde

Conclusion

Les détails dans lesquels je suis entré tant sur l'analyse des effets de coloration, que sur les moyens pratiques à l'aide desquels on peut les appliquer à l'industrie, suffisent je l'espère, pour mettre à même les personnes qui voudront s'en occuper de le faire sans éprouver de trop grandes difficultés. En terminant, je comparerai les effets que j'ai observés avec les anneaux électro-chimiques de Nobili dont il a été fait mention au commencement de ce Mémoire en rattachant particulièrement à ceux qu'il a obtenus avec l'acétate de plomb, me proposant d'examiner dans un autre Mémoire les effets résultant de la réaction des autres dissolutions. Pour obtenir les anneaux colorés concentriques plus ou moins rapprochés, sur une lame d'or rendue positive, Nobili avait employé une dissolution neutre ou sensiblement neutre d'acétate de plomb. Il a bien rapporté le fait mais sans chercher à l'expliquer. Ces anneaux devaient disparaître promptement aussitôt que l'acide acétique devenait libre, en raison de la réaction que cet acide exerce sur le peroxyde de plomb mon mode d'expérimentation et les effets obtenus sont différents. La dissolution que j'emploie est alcaline et ne pourrait être autre, parce qu'il faut que l'oxyde de plomb qui se porte au pôle positif en se peroxydant, joue relativement à la potasse, le rôle d'acide, pour que l'adhérence soit aussi forte que possible, ce qui ne saurait avoir lieu en opérant avec l'acétate de plomb ou un autre sel de plomb, par la raison que l'oxyde se comporte comme base. D'un autre côté on a toujours des anneaux colorés dans les expériences de Nobili, tandis qu'avec mon mode d'expérimentation on peut obtenir des teintes uniformes, durables et très adhérentes, sur des surfaces d'une certaine étendue. Nobili a cherché les anneaux colorés, et

moi je les évite Il n'y a réellement de commun entre les anneaux colorés électro chimiques de Nobili et les phénomènes de coloration dont il est question ici qu'en ce que les uns et les autres sont produits par des lames minces

Dans un troisième Mémoire, j'exposerai les effets divers obtenus en opérant sur des lames de cuivre ou d'un autre métal, recouvertes d'une couche métallique ou d'oxyde, afin de montrer jusqu'à quel point on peut varier les effets qui viennent d'être décrits, enfin, je n'omettrai rien de ce qui pourra éclairer le nouvel art dont je cherche à poser les bases »

(CHIMIE APPLIQUÉE A L'AGRICULTURE — *Analyses comparées des cendres laissées par les engrais et par les récoltes*, par M BOUSSINGAULT

ZOOLOGIE — *Considerations sur quelques principes relatifs à la classification naturelle des animaux, et plus particulièrement sur la distribution mythologique des mammifères*, par M MILNE EDWARDS

Ce Mémoire est trop étendu pour trouver place dans les *Comptes rendus des séances de l'Académie des Sciences*, et il me paraîtrait difficile d'en donner une idée exacte à l'aide d'un simple extrait Je me bornerai donc à dire ici que, dans ce travail, j'ai cherché à montrer les liaisons qui existent entre la marche des phénomènes génésiques et l'espèce de parenté ou d'affinité que les animaux offrent entre eux à des degrés variés Les faits embryologiques me paraissent éminemment propres à servir de base à la classification naturelle du règne animal et, après avoir exposé les principes qui m'ont servi de guide dans l'application de la zoogénie à la distribution méthodique des êtres animés, je rends compte des résultats généraux que j'ai obtenus en suivant cette voie

NOMINATIONS

L'Académie procède, par voie de scrutin, à la nomination de la Commission qui sera chargée de déterminer la *question qui sera proposée pour sujet du grand prix des Sciences physiques*, concours de 1845 Cette Commission doit être composée de cinq membres pris dans les Sections des Sciences physiques

MM de Blainville, de Mûbel, Dumas, Flourens et Milne Edwards réunissent la majorité des suffrages

MEMOIRES PRESENTES

PHYSIQUE DU GLOBE — *Mémoire sur les variations de niveau de la Méditerranée, par M. G. AIME* (Extrait par l'auteur)

(Commissaires, MM. Arago, Mathieu, Dupeirey)

Les causes qui font varier le niveau de la mer sont les brises, les vents, les courants, la pression atmosphérique, le Soleil et la Lune. Comme les effets produits par ces agents sont peu différents les uns des autres, il a été assez difficile de les isoler. Nous n'indiquerons pas ici la méthode que nous avons suivie pour arriver à ce résultat; nous ferons seulement remarquer que toutes les observations dont nous nous sommes servi au commencement de ce Mémoire, ont été rapportées à la valeur numérique qu'elles auraient eues si les marées n'existaient pas.

Influence de la pression atmosphérique sur la hauteur du niveau de la mer

Dans un Mémoire présenté en 1839 à l'Académie des Sciences, j'ai cherché à établir qu'une des principales causes des oscillations du niveau de la Méditerranée était la variation de la pression atmosphérique. Depuis cette époque, en continuant le même genre d'observations, j'ai trouvé une confirmation du fait que j'avais annoncé. Déjà en 1836, M. Daussey, en discutant des observations de marées prises dans le port de Lorient, avait reconnu l'influence atmosphérique et avait donné le nombre 15,5 comme exprimant le rapport des variations barométriques à celles du niveau de la mer. En combinant convenablement toutes les observations faites en janvier, février, mars, avril et mai de l'année 1843, je suis arrivé au nombre 13,1 qui représente à peu près le rapport de la densité du mercure à zéro degré à celle de l'eau de la Méditerranée à la température de 15 degrés.

Influence d'un coup de vent sur le niveau

Nous venons de voir comment agit la pression atmosphérique, et nous admettrons dorénavant que la loi indiquée a toujours lieu. Par conséquent, pour reconnaître l'influence des vents sur le niveau de la mer, il suffira d'observer ce niveau à des époques où la pression barométrique sera constante, ou bien, si la pression vient à varier, il faudra corriger la hauteur de la mer et la ramener à la valeur qu'elle aurait eue si le baromètre n'avait pas varié. Les différences obtenues entre les hauteurs observées par des temps

calmes et celles observées après des coups de vent, nous feront connaître comment agit tel ou tel vent

En passant en revue les observations de plusieurs années, nous avons reconnu que le vent d'est fait baisser le niveau et que le vent d'ouest le fait monter. La variation moyenne pour un coup de vent est de 12 à 15 centimètres pour le vent d'est et celui d'ouest. Le vent du nord fait monter ou baisser le niveau, suivant qu'il tourne de quelques degrés à l'ouest ou à l'est.

Les vents du sud sont extrêmement rares à Alger, je n'ai pu déterminer leur action sur le niveau, les vents de sud-ouest le font monter.

Variations produites par les courants

Nous avons reconnu qu'un coup de vent modifie toujours plus ou moins le grand courant du littoral, et que la perturbation apportée dans la vitesse ou dans la direction de ce courant, dure un ou plusieurs jours quand le calme atmosphérique est rétabli. Le niveau de la mer suit exactement les phases du courant. Ainsi, après un coup de vent d'ouest, la mer emploie un ou deux jours pour redescendre à son niveau normal, après un coup de vent d'est elle emploie le même temps à remonter.

Quelquefois la variation de vitesse ou de direction du grand courant est produite par un coup de vent insensible à Alger. La hauteur de la mer observée diffère alors de la hauteur calculée, et les choses se passent à peu près comme si le coup de vent avait eu lieu près de l'endroit des observations.

Variations annuelles du niveau moyen

La Méditerranée n'étant en communication avec l'Océan que par la passe resserrée du détroit de Gibraltar, on pouvait supposer avec quelque raison que puisque pendant l'hiver il pleuvait sur toute sa surface, il devait y avoir une différence entre le niveau moyen pendant l'hiver et le niveau moyen pendant l'été. L'expérience semble justifier cette hypothèse. En effet, les niveaux moyens des différents mois de l'année 1843 sont

1 ^{er} janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre
34 ^{cent} m	42	30	30	29	32	30	39	39	45	50	39

Toutes les observations ont été rapportées à la pression 760 millimètres.

* Nous n'avons pas présenté les moyennes des années 1840, 1841 et 1842, car elles sont peu différentes de celles de 1843.

Les nombres précédents nous montrent que pendant les mois de pluie le niveau est plus élevé que pendant ceux des sécheresses, mais la cause de

cette différence tient aux vents regnants. En avril, mai, juin, juillet et août c'est le vent d'est qui souffle ordinairement et pendant les autres mois c'est le vent d'ouest. Or, on a vu précédemment de quelle manière ils agissent. Nous pourrions donner plusieurs raisons qui établissent que le niveau moyen de la Méditerranée est à peu près invariable pendant les différents mois de l'année mais nous n'en parlerons pas ici.

Effets des brises sur le niveau de la mer

L'apparition des brises est en général d'autant plus constante qu'on les observe dans des lieux plus voisins de l'équateur. A Alger leur régularité est déjà bien remarquable. Par suite de l'existence de ces brises, le niveau de la mer éprouve une variation quotidienne qui dépend de leur orientation par rapport aux côtes de leur intensité et de leur durée.

Si la mer n'avait pas de marée on pourrait reconnaître facilement la variation moyenne mensuelle du niveau produite par les brises. Il suffirait d'observer les hauteurs de la mer d'heure en heure pendant un mois et en prenant les moyennes de chacune de ces séries d'observations aux mêmes heures on obtiendrait vingt-quatre nombres qui représenteraient exactement l'effet moyen mensuel. Si au contraire il existe une marée faible mais cependant appréciable, les nombres précédents ne représenteront plus seulement l'action des brises, mais ils indiqueront en même temps la mesure de la marée solaire. En effet, la marée observée est le résultat des actions simultanées du Soleil et de la Lune. Or, si l'on considère chacun de ces astres en particulier on voit que le Soleil produit une marée qui a lieu tous les jours aux mêmes heures, et que la Lune en produit une autre qui rétrograde tous les jours de trois quarts d'heure. Comme la marée luni-solaire est très faible dans la Méditerranée nous admettrons que la marée solaire et la marée lunaire ont chacune, prises isolément, la même grandeur pendant la durée du mois lunaire. Cette hypothèse étant une fois admise, il est évident que si l'on prend les moyennes d'observations faites pendant un mois, tous les jours, aux mêmes instants, la marée lunaire disparaîtra, et il ne restera plus dans les moyennes que la variation moyenne due aux brises et celle due à la marée solaire.

Nous verrons plus loin qu'à Alger la marée solaire est haute à 6 heures et basse à 12 heures, et que sa grandeur totale est de 25 millimètres.

En effectuant le calcul que nous venons d'indiquer pour tous les mois pendant cinq années, nous avons ainsi déterminé l'effet des brises dans les différents mois.

En juin et juillet, le niveau est à peu près le même depuis le matin jusqu'au soir,

En décembre et janvier, on observe le même résultat,

En mars et avril, la mer est haute le matin et basse le soir,

En août et septembre, elle est haute le soir et basse le matin

Les plus grandes variations arrivent aux équinoxes elles sont à peu près égales et de signes contraires, leur valeur est d'environ 7 centimètres les plus petites arrivent aux solstices.

Variations produites par les marées lunaires et solaires

Nous venons d'indiquer précédemment comment nous calculons l'effet moyen dû aux brises et à l'action solaire, maintenant il nous reste à parler de l'effet lunaire. Pour le déterminer, nous avons pris les observations d'un mois entier, faites de quart d'heure en quart d'heure, et après avoir cherché les moyennes des observations faites aux mêmes instants pendant tout le mois lunaire, nous avons ensuite, pour chaque jour, retranché de chaque heure la moyenne correspondante. De cette façon, nous avons corrigé toute notre série mensuelle d'observations de l'effet solaire et de celui des brises. Toutes les variations dans les observations corrigées étant dues à l'action lunaire nous avons pris, pour chaque jour, les valeurs particulières des quatre undulations de la marée, c'est-à-dire la différence entre un minimum de hauteur et le maximum suivant puis celle du maximum au minimum, etc. Nous avons déterminé la moyenne de ces quatre oscillations, de chaque jour, puis la moyenne des moyennes pendant tout le mois.

Nous avons ainsi obtenu, pour valeur de la marée totale lunaire, 62^{mm}. Ce nombre nous a servi à déterminer la marée solaire. Le rapport des variations de la Lune au Soleil étant 2,35 le quotient $\frac{62}{2,35} = 26^{\text{mm}}$ nous a représenté la marée solaire.

La marée luni-solaire, aux syzygies est égale à $62^{\text{mm}} + 26^{\text{mm}} = 88^{\text{mm}}$ et, aux quadratures, à $62^{\text{mm}} - 26^{\text{mm}} = 36^{\text{mm}}$, l'unité de hauteur est égale à $\frac{88}{2} = 44^{\text{mm}}$.

En discutant un grand nombre d'observations nous avons reconnu que l'heure de l'établissement du port était 6 heures et quelques minutes.

Réclamation de priorité

En 1842 M. Chazeron a présenté à l'Institut un Mémoire sur les marées

de la Méditerranée observées à Toulon, dans lequel il annonce avoir reconnu l'influence luni-solaire. Comme il n'a pas fait mention des résultats auxquels j'étais déjà parvenu, et qui étaient publiés avant sa communication, j'ai cru devoir adresser ici la réclamation suivante.

Dans un grand travail sur le port d'Alger publié en 1841 par M. Pouel ingénieur en chef des ponts et chaussées, à l'obligeance duquel je dois toutes les observations de hauteur de la mer dont je me suis servi dans mon Mémoire, il est dit, à la page 106 : M. Aimé a reconnu que la mer monte quand le baromètre baisse, et réciproquement de sorte que les variations de niveau de la mer sont, à peu de chose près, égales à treize fois et demi celles observées pour le baromètre, mais de signes contraires. Les marées barométriques ne sont pas les seules causes des changements de niveau : les marées lunaires ont aussi sur ce phénomène une influence, très-faible à la vérité, puisque les plus fortes ne dépassent pas le niveau moyen de 3 à 4 centimètres. L'heure de la pleine mer paraît arriver six heures après le passage de la Lune au méridien à l'époque des syzygies, etc.

Depuis cette publication toutes mes observations ont confirmé ces résultats. C'est bien à 6 heures qu'a lieu la haute mer aux syzygies, et la plus grande marée ne s'élève pas de plus de 4 centimètres et une fraction au-dessus du niveau moyen.

Dans son Mémoire, M. Chazalon dit qu'il a reconnu l'existence d'une marée semi-diurne et d'une marée diurne qui surpasse la moitié de la première. Il ajoute que l'intervalle de temps qui s'écoule entre l'instant de l'action des astres sur la mer et l'instant de la manifestation de cette action dans le port de Toulon, est à peu près de 38 heures pour la marée semi-diurne ou ordinaire, tandis que pour la marée diurne cet intervalle de temps est environ le double.

À propos de cette observation, je fais remarquer que M. Chazalon n'a pas tenu compte des effets produits par les brises, car il aurait vu qu'elles seules déterminent la variation diurne qu'il a observée, et non l'action luni-solaire.

La marée diurne, comme la théorie l'indique, doit sans doute exister dans la Méditerranée, mais elle y est si faible, qu'elle sera toujours inappréciable.

MECANIQUE APPLIQUEE — *Description d'un pese voiture hydraulique portatif,*
par M GALT-CATALAT

Commissaires, MM Becquerel, Pouillet, Babinet, Morin)

Il est si la police du roulage a pour but de limiter convenablement la pression que chaque roue d'une voiture exerce sur le sol. Cette pression ne peut point mesurer par les ponts à bascules en usage sur les routes, puisque ces machines ne font connaître que la charge totale qui est toujours inégalement répartie.

A ce vice fondamental des bascules s'ajoutent les inconvénients résultant de leur fixité, de leur inexactitude et des dépenses considérables qu'elles entraînent.

Voulant obvier à tous ces inconvénients j'ai imaginé un appareil hydraulique portatif sur lequel il suffit de faire passer une des roues d'une voiture pour connaître exactement la charge qu'elle porte.

Ce pese-voiture hydraulique se compose d'une boîte de bronze pleine d'eau alcoolisée, communiquant avec un manomètre et métalliquement emprisonnée par une feuille de cuivre rouge, parfaitement flexible dont le périmètre est soudé au bronze.

Quand une pression quelconque tend à aplatis la feuille de cuivre légèrement bombée, cette pression se transmet sans altération, au liquide emprisonné dont la réaction, égale à la force comprimante, est exactement mesurée par le manomètre fondé sur un principe nouveau.

Pour rendre cet appareil applicable au pesage des voitures, il convient de faire la boîte elliptique en lui donnant 3 décimètres de long, 1 décimètre de large et 3 centimètres de hauteur. Cette boîte est contenue dans une auge de fer sur la base de laquelle s'appuie la membrane bombée de cuivre rouge, tandis que la face opposée de bronze dépasse de 1 centimètre les bords de l'auge.

Graduation de l'appareil

Pour graduer expérimentalement l'échelle du manomètre, on place la boîte pleine d'eau sur une table, transversalement, sous un levier du second genre dont l'extrémité porte un bassin. En mettant un poids p dans le bassin le levier comprime, avec une force connue P , l'eau qui fait monter le mercure d'une colonne manométrique, jusqu'en un point au niveau duquel on grave P kilogrammes.

En faisant ainsi varier le poids p et les pressions correspondantes P on gradue expérimentalement l'échelle du manomètre

Principe des pesées

Lorsqu'un préposé de l'administration ambulante ou à demeure veut peser une voiture, il ordonne au conducteur d'arrêter les chevaux

Le préposé pose alors l'appareil transversalement sous la roue qui, passant au pas sur la boîte de bronze, fait remonter dans le manomètre le mercure qui pousse un index

Ce dernier, retenu par le ressort d'un cheveu comme dans les thermomètres à maxima, reste suspendu dans le tube de verre pour indiquer la pression quand le mercure est descendu après le passage de la voiture

Pour renouveler l'expérience il suffit de faire descendre l'index au moyen d'un aimant, quand le manomètre est à air comprimé ou au moyen d'une tige de bismuth quand le manomètre est à air libre

Description du manomètre

La cuvette du manomètre se compose de deux hémisphères assemblés par leur base au moyen de boulons qui les pressent contre une membrane très-flexible de platine. Cette membrane divise la capacité de la cuvette en deux chambres dont la supérieure est pleine de mercure qui s'élève jusqu'au zéro de l'échelle manométrique tracée sur un tube de verre mastiqué hermétiquement dans la douille de la cuvette. La chambre inférieure de la cuvette renferme une espèce de soupape dont la tête plaine sert d'appui au centre de la membrane de platine, et dont la queue remplit hermétiquement sans frottement appréciable, la douille inférieure qu'on a cylindriquement alésée

Quand le manomètre est en communication avec l'eau emprisonnée dans le pese-voiture, la réaction du liquide soulève la queue de la soupape dont la tête soulève à son tour la membrane de platine qui fait monter le mercure dans le tube de verre

Supposons que l'aire pressée par l'eau soit n fois plus grande que l'aire de la membrane qui supporte la pression de la colonne de mercure, selon les lois de la statique, la hauteur de la colonne de mercure devra être n fois plus courte que la hauteur qui mesurerait la réaction de l'eau, si cette dernière pressait directement la membrane de platine

Il est évident que ce manomètre peut servir à mesurer la tension de la vapeur dans les chaudières à haute pression

M ARAGO met sous les yeux de l'Académie un petit modèle destiné à faire comprendre le nouveau moyen de fermeture imaginé par M HALLETTE, pour le tube pneumatique qui forme la pièce principale du système de chemins de fer communément désignés sous le nom de *chemins atmosphériques*.

Dans le système de MM Clegg et Samuda, cette fermeture, comme chacun le sait, s'opère au moyen d'une longue bande de cuir armée de courtes lanières de fer, libre par un de ses côtés et fixée par l'autre au bord de la fente longitudinale qui donne passage à la tige par laquelle le piston est uni au premier wagon du convoi. Soulevée un instant par un galet interne pour le passage de cette tige, la bande retombe aussitôt, un galet, dont le mouvement est lié à celui du piston, la presse aussitôt après contre l'ouverture, et une substance onctueuse contribue encore à rendre l'adhésion plus complète. Mais, outre que le corps onctueux paraît s'altérer assez promptement au contact de l'air, la lanière de cuir doit peu à peu perdre de sa souplesse et tendre, dans quelques points, à se soulever un peu après le passage du galet compresseur, il était donc à désirer que l'obturation de la fissure longitudinale, au lieu d'être due à l'action d'un effort passager, résultât d'une action constante exercée en chaque point de la fissure. C'est ce but que M Hallette paraît avoir atteint en profitant de l'élasticité de l'air.

A cet effet il a disposé, au-dessus du tube pneumatique, et faisant corps avec lui, deux demi-cylindres longitudinaux ou, pour mieux dire, deux gouttières placées de champ, qui se regardent par leur concavité. Chacune de ces gouttières loge un boyau en tissu souple et parfaitement étanche, pour lui comme pour l'eau. Lorsque les deux boyaux remplis d'air sont suffisamment gonflés, ils se touchent l'un l'autre dans une partie de leur surface agissent comme les lèvres de la bouche de l'homme, et interceptent ainsi complètement la communication entre l'intérieur du tube pneumatique et l'air extérieur. Le piston vient-il à se mouvoir, la tige qui l'unit aux wagons se glisse entre les deux tuyaux, qui se rejoignent immédiatement après son passage. Cette tige, dont la section horizontale est celle d'un ménisque, et qui pénètre ainsi à la manière d'un coin entre les deux boyaux, n'exerce sur eux un frottement bien considérable. Cependant, pour assurer leur durée, M Hallette a jugé convenable de les garnir de cuir dans la partie où ils se touchent.

M Hallette fait remarquer tout le parti qu'on pourrait tirer, pour la navigation intérieure, de la propulsion atmosphérique perfectionnée par lui. En développant l'idée de M Hallette, M Arago fait remarquer qu'un système

des tubes pneumatiques, fixés le long des murs de quai de la Seine coûtait beaucoup moins à établir qu'un chemin de halage, et que l'emploi de la vapeur, pour faire remonter les bateaux, avait 1 plusieurs égards, sur l'emploi des chevaux, des avantages marqués

M ARAGO présente, au nom de M C -A LESULTUR, une planche lithographiée représentant des vues et des coupes du cap de la Heve, avec l'indication des restes organiques fossiles qui se trouvent dans ce terrain Cette planche qui n'a pas encore été livrée au commerce est renvoyée à l'examen le M Elie de Beaumont pour un Rapport verbal

M JANNIARD adresse une Note sur un nouveau système de tours pour l'éclairage de phares, de télégraphes, de sémaphores etc Ces tours en fer battu, pourraient, suivant l'auteur, être posées dans les cas où cela serait jugé nécessaire jusqu'à une très-grande élévation sans que leur stabilité en fut compromise

La Note et les dessins qui l'accompagnent sont renvoyés à l'examen d'une commission composée de MM Poncelet, Piobert et Dupeyrey

Dans la lettre qui est jointe à sa Note, M Janniard demande l'autorisation de reprendre une pièce qu'il avait précédemment adressée, et sur laquelle il n'a pas encore été fait de Rapport

CORRESPONDANCE

BOTANIQUE — Note extraite d'un travail inédit sur l'Aponogeton par M PLANCHON (Communiquée par M Auguste de Saint Hilaire)

En 1808, dans l'*Analyse du fruit*, I C Richard esquisse, en quelques mots, une nouvelle famille des Saururées en fermant le *Saururus* et l'*Aponogeton* (Thunb) Peut être ne rapprocha-t-il ces deux genres que parce qu'ils avaient été déjà placés par Jussieu dans le même ordre celui des Naiades Il compte les Saururées au nombre des Endorhizes d'après des idées théoriques inexacts sur la structure du *Saururus* Tout en adoptant cette famille d'autres botanistes la rangèrent parmi les dicotylédones Ce rapprochement plus naturel a prévalu dans la science, mais il était fondé sur l'organisation du seul genre *Saururus* Quant à l'*Aponogeton*, Richard et les autres botanistes ne paraissent pas en avoir connu les graines Du moins, Endlicher, qui a dû résumer les observations les plus récentes, donne de ces graines une description qui conviendrait parfaitement à une Saururée mais qui ne saurait con-

venit à l'*Aponogeton*. En effet, si le *Saururus* a évidemment deux cotylédons, l'*Aponogeton* n'en a bien certainement qu'un seul. Si le *Saururus* offre ce double périsperme qui le rend si remarquable, l'*Aponogeton* présente des feuilles sans trace de périsperme : ce qui m'a été démontré par l'examen de celles de l'*Aponogeton distachyon* (Ait.), sur lequel j'ai fait un travail détaillé qui je l'espère ne tardera pas à paraître dans les *Annales de Sciences naturelles*. Il y a lieu qu'un tégument unique recouvre immédiatement un embryon très-remarquable. Un cotylédon unique très-grand charnu, comme se termine inférieurement par un mamelon ridicule, et présente sur son bord antérieur qui n'est dans le fait que sa face, une fente assez ouverte d'où sort une plumule composée de deux feuilles réduites à leur pétiole, et déjà très-développées. L'ensemble bien connu des autres caractères et l'absence de périsperme rapprochent notre plante des Alismacées, mais le caractère si remarquable d'une plumule tout à fait nue l'y distinguait suffisamment comme Section. Peut-être même devrions-nous la considérer comme le type d'une famille nouvelle des Aponogétacées. Le genre *Ouvrandra*, que M. Delessert paraît regarder comme une Alismacée, devrait-il trouver place à côté de l'*Aponogeton*.

M. LAMARCHE adresse le tableau des *observations météorologiques* qu'il a faites à Saint-Florent pendant le dernier semestre de l'année 1843.

M. RENDI, près de partir pour l'*Amerique du Sud*, où il doit séjourner plusieurs années, et où il se propose d'étudier spécialement la topographie médicale des lieux qu'il visitera, se met à la disposition de l'Académie pour recueillir sur les points qu'elle voudrait bien lui indiquer les renseignements qui pourraient de nature à contribuer aux progrès des sciences médicales et chirurgicales.

(Renvoi à la Section de Médecine et de Chirurgie.)

M. HURAUT écrit relativement à une observation de *halo* qu'il a faite à Commeicy (Meuse), le 19 novembre 1839. Ce halo lui a paru avoir une forme elliptique très-prononcée. Il n'a pu d'ailleurs, faute des instruments nécessaires, constater, comme cela eût été nécessaire, la réalité de la différence qui lui semblait exister entre les deux diamètres.

Dans la même Lettre, M. Huraut donne quelques détails sur l'*aurore boréale* du 22 octobre 1839.

M. SOREL, qui avait adressé l'an dernier un Mémoire sur divers appa-

reils destinés à prévenir les explosions des chaudières à vapeur, demande que ce Mémoire, qui avait été compris dans le nombre de ceux admis à concourir pour le prix concernant les Arts insalubres, soit retiré du concours et renvoyé à l'examen d'une Commission

Renvoi à la Commission qui avait été déjà chargée de faire un Rapport sur un nouveau manomètre présenté par M Sorel, Commission composée de MM Arago, Regnault et Duhamel

M MAIZIERE réclame de nouveau contre la détermination qu'a prise l'Académie relativement aux pièces imprimées et autographiées qu'il lui a adressées, et qui concernent sa nouvelle *theorie des vents alises*

Les résolutions antérieures de l'Académie relativement aux travaux que leurs auteurs ont déjà rendus publics par la voie de l'impression, ne permettent pas d'obtempérer à la demande de M Maiziere

A 4 heures trois quarts, l'Académie se forme en comité secret

La séance est levée à 5 heures trois quarts

A

ERRATA

(Séance du 22 janvier 1844)

Page 164, ligne 19, après ces mots *Types de chaque famille et des principaux genres de plantes croissant spontanément en France*, par M PLEIX, 2^e livr., au lieu de in 8°, lisez in-4°

(Séance du 29 janvier)

Page 183, ligne 17, après ces mots «qu'une masse de 1000 kilogrammes cubes», ajoutez d'une densité telle que l'excès de cette densité soit égal à la densité moyenne du globe

BULLETIN BIBLIOGRAPHIQUE

- L'Académie a reçu, dans cette séance, les ouvrages dont voici les titres
- Comptes rendus hebdomadaires des séances de l'Académie royale des Sciences*, 1^{er} semestre 1844, n° 5, in-4°
- Annales maritimes et coloniales*, janvier 1844 et tables de 1843, in 8°
- Voyage dans l'Inde*, par M V JACQUEMONT 50 et 51^e livr , in 4°
- Recherches sur la maison de Rouen où est né DULONG* Rouen, 1844, in-8°
- Mémoire à consulter sur les Chemins de fer en général et sur le Système JOUFFROY en particulier*, in 4°
- Histoire abrégée de quelques Affections qui peuvent occasionner la mort subite*, par M PICHARD, 2^e édition, 1843, in-8°
- Types de chaque famille et des principaux genres des Plantes*, par M PLEB 3^e livr , in-4°
- Vues et Coupes du cap de la Hève*, par M LEBUEUR, 1 feuille grand aigle
- Journal de Chimie médicale, de Pharmacie et de Toxicologie*, février 1844 in-8°
- Annales de l'Agriculture française*, février 1844, in-8°
- Annales de Thérapeutique médicale et chirurgicale et de Toxicologie*, n° 11 février 1844, in-8°
- Le Technologiste*, février 1844, in 8°
- Journal d'Agriculture pratique et de Jardinage*, janvier 1844, in-8°
- La Clinique vétérinaire*, février 1844, in 8°
- Gazette médicale de Dyon et de la Bourgogne*, février 1844, in-8°
- Journal des Connaissances utiles*, janvier 1844, in-8°
- Journal des Découvertes et des Travaux pratiques importants en Médecine Chirurgie, Pharmacie, etc*, décembre 1843, in-4°
- Bibliothèque universelle de Genève*, décembre 1843, in-8°
- The Journal* *Journal de la Société royale géographique de Londres* vol XIII, part 1^{re}, 1843 Londres, 1844, in-8°
- Dissertatione*. . *Dissertation sur la Pourpre antique, et sur la découverte de la Pourpre dans les Murex*, par M B Bizio Venise, 1843, in-8°
- Intorno* *Recherches concernant l'action de la Chaux sur les carbonates de soude et de potasse*, par le même, in 4°
- Intorno* . *Recherches sur les Molécules des corps et leurs affinités*, par le même, in-4° (Extr du 1^{er} vol des *Mémoires de l'Institut impérial vénétien*)
- Gazette médicale de Paris*, t. XII, n° 5, 1844, in-4°
- Gazette des Hôpitaux*, t VI, n° 12 à 14, in-fol
- L'Echo du Monde savant*, 10^e année, t IX, n° 8 et 9, in-4°

OBSERVATIONS MÉTÉOROLOGIQUES. — JANVIER 1844.

JOURS du mois	1 ^{re} PERIODE DE MATIN.			MID.			3 ^{re} PERIODE DU SOIR.			5 ^{re} PERIODE DU SOIR.			THERMOMÈTRE.			ÉTAT DU CIEL A MID.	VENTS A MID.
	SALON à 0°	THERM ciel	NOTES	SALON à 0°	THERM ciel	NOTES	SALON à 0°	THERM ciel	NOTES	SALON à 0°	THERM ciel	NOTES	MAXIMA	MINIMA			
1	755,32	+ 2,5		750,32	+ 4,0		750,45	+ 3,6		750,84	+ 0,9		+ 5,0	- 0,8		Couvert	S fort
2	744,78	+ 2,6		744,50	+ 3,7		749,56	+ 3,6		755,58	+ 0,2		+ 4,8	- 0,1		Pluie et neige	S O fort
3	750,79	+ 2,2		750,71	+ 0,6		758,50	+ 0,3		755,66	+ 0,7		+ 0,4	- 0,1		Couvert	S S E
4	743,78	+ 2,0		743,78	+ 10,3		750,20	+ 10,6		754,07	+ 9,2		+ 11,5	- 0,7		Couvert	N O O
5	754,33	+ 8,3		753,68	+ 10,4		753,62	+ 10,1		751,41	+ 10,1		+ 11,7	- 0,3		Couvert	S O O
6	743,78	+ 8,3		743,49	+ 10,3		743,83	+ 8,8		744,02	+ 7,5		+ 11,2	- 0,1		Éclairs	S O O
7	743,78	+ 8,3		743,79	+ 7,1		743,83	+ 8,8		744,02	+ 7,5		+ 8,2	- 0,1		Quelques nuages	S O O
8	753,34	+ 5,6		753,34	+ 6,5		754,87	+ 7,8		758,80	+ 4,9		+ 7,7	- 0,8		Nuageux	N O O
9	764,78	+ 2,4		764,78	+ 2,2		764,78	+ 2,1		767,44	+ 1,4		+ 7,7	- 0,6		Couvert	N O O
10	764,78	+ 0,4		764,78	+ 3,1		764,78	+ 2,1		767,44	+ 1,4		+ 7,7	- 0,6		Couvert, neige	N O O
11	767,31	+ 1,2		766,49	+ 3,9		766,11	+ 3,8		766,36	+ 2,6		+ 4,2	- 0,7		Couvert	N E S E
12	766,69	+ 0,2		764,90	+ 0,6		763,64	+ 1,1		761,47	+ 2,4		+ 4,2	- 0,7		Couvert	N E S E
13	758,67	+ 4,6		757,91	+ 2,6		757,91	+ 1,9		757,89	+ 4,8		+ 1,4	- 5,8		Couvert	S S F
14	759,33	+ 5,0		759,33	+ 2,3		761,01	+ 2,3		763,35	+ 5,5		- 1,6	- 5,5		Beau	E S S E
15	764,96	+ 5,0		764,05	+ 4,5		763,19	+ 3,6		763,35	+ 5,5		- 3,3	- 6,2		Couvert	E N E
16	763,01	+ 6,1		761,33	+ 2,8		760,17	+ 0,8		760,85	+ 3,4		- 0,6	- 7,0		Beau	E N E
17	764,27	+ 0,4		764,02	+ 4,5		760,48	+ 3,2		761,00	+ 4,8		+ 4,5	- 4,8		Couvert	N N N
18	761,34	+ 4,6		760,51	+ 5,5		758,35	+ 6,3		763,63	+ 4,8		+ 7,2	- 3,9		Couvert	N O O
19	761,34	+ 4,6		760,51	+ 5,5		758,35	+ 6,3		763,63	+ 4,8		+ 7,2	- 3,9		Couvert	N O O
20	757,17	+ 3,6		757,68	+ 5,6		757,84	+ 5,2		758,36	+ 5,0		+ 7,2	- 4,0		Couvert	N O O
21	757,88	+ 5,7		757,17	+ 7,3		754,71	+ 5,2		754,78	+ 5,2		+ 7,9	- 4,9		Couvert	N O O
22	757,88	+ 5,7		757,17	+ 7,3		754,71	+ 5,2		754,78	+ 5,2		+ 7,9	- 4,9		Couvert	N O O
23	757,88	+ 5,7		757,17	+ 7,3		754,71	+ 5,2		754,78	+ 5,2		+ 7,9	- 4,9		Couvert	N O O
24	757,88	+ 5,7		757,17	+ 7,3		754,71	+ 5,2		754,78	+ 5,2		+ 7,9	- 4,9		Couvert	N O O
25	757,88	+ 5,7		757,17	+ 7,3		754,71	+ 5,2		754,78	+ 5,2		+ 7,9	- 4,9		Couvert	N O O
26	757,88	+ 5,7		757,17	+ 7,3		754,71	+ 5,2		754,78	+ 5,2		+ 7,9	- 4,9		Couvert	N O O
27	757,88	+ 5,7		757,17	+ 7,3		754,71	+ 5,2		754,78	+ 5,2		+ 7,9	- 4,9		Couvert	N O O
28	757,88	+ 5,7		757,17	+ 7,3		754,71	+ 5,2		754,78	+ 5,2		+ 7,9	- 4,9		Couvert	N O O
29	757,88	+ 5,7		757,17	+ 7,3		754,71	+ 5,2		754,78	+ 5,2		+ 7,9	- 4,9		Couvert	N O O
30	757,88	+ 5,7		757,17	+ 7,3		754,71	+ 5,2		754,78	+ 5,2		+ 7,9	- 4,9		Couvert	N O O
31	757,88	+ 5,7		757,17	+ 7,3		754,71	+ 5,2		754,78	+ 5,2		+ 7,9	- 4,9		Couvert	N O O
1	753,51	+ 4,5		763,32	+ 5,4		754,05	+ 5,6		755,46	+ 6,0		+ 6,5	- 2,7		Moy du 1 ^{er} au 10	Moins en continuant
2	762,23	+ 0,6		761,83	+ 0,9		761,25	+ 1,6		761,48	+ 0,2		+ 2,1	- 1,9		Moy du 11 au 20	Cou 3,75b
3	759,73	+ 3,6		759,61	+ 4,1		758,95	+ 5,7		759,25	+ 3,3		+ 6,4	- 1,9		Moy du 21 au 31	Ter 2,84g
	758,43	+ 2,5		758,30	+ 3,5		758,11	+ 4,3		758,78	+ 2,5		+ 5,0	- 0,9		Moyenne du mois	+ 2,9

COMPTE RENDU

DES SÉANCES

DE L'ACADEMIE DES SCIENCES.

SÉANCE DU LUNDI 12 FÉVRIER 1844

PRÉSIDENCE DE M. CHARLES DUPIN

MEMOIRES ET COMMUNICATIONS

DES MEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE L'ACADEMIE

ENTOMOLOGIE — *Histoire des métamorphoses et de l'anatomie du Prophila pectatoris* par M. LEON DUFOUR (Lecteur par l'auteur)

Un jambon envahi par des milliers de vers rrides et dévorants n'est aux yeux du monde, qu'un foyer de corruption un objet d'horreur. Pour l'homme de science pour l'investigateur scrupuleux des merveilles de la nature, c'est un sujet de graves études de difficiles autopsies de méditations profondes, et le célèbre auteur du *Biblia naturæ* n'avait pas dédaigné il y a trois demi-siècles, de consacrer à des recherches sur les vers du fromage un de ses plus beaux Mémoires. Or, le *ver du fromage* et le *ver du jambon* se changent, l'un et l'autre, en une petite mouche du même genre *Prophila*. Irrésistiblement entraîné dans le plan et les développements de Swammerdam, j'ai pensé que la science avait à gagner au rapprochement comparatif, au parallèle de faits fournis par deux insectes spécifiquement différents quoiqu'ils d'un genre identique, sur tout quand ces faits sont recueillis à deux époques si éloignées. J'ai donc la témérité de présenter le pendant du Mémoire de mon modèle, accompagné des figures à l'appui.

Ainsi que l'exprime le titre de mon texte je traite, dans deux chapitres les métamorphoses et l'anatomie

Dans le premier chapitre, j'ai exposé les diverses phases des métamorphoses du *Prophyla petasonis* qui est une nouvelle espèce. Si la larve, apode et acéphale comme celle des muscides en général, est cylindroïde, glabre atténuée en avant, tronquée et biépineuse en arrière, munie de deux crochets mandibulaires adossés et rétractiles et de deux paires de stigmates seulement. C'est, qui atteint à peine dans son plus grand développement 6 millimètres de longueur. Je nomme particulièrement du gras du jambon, qu'il pousse jusqu'à dans les interstices des muscles. Comme le ver du fromage, notre larve quoique privée de pattes peut, par un saut brusque, s'élever assez haut et assez loin. Cette manœuvre ce saut de carpe, s'opère en débarrassant tout d'un coup le corps, d'abord ployé en courbe parabolique, au moyen des mandibules accrochées avec force aux deux spinules du dernier segment. L'élasticité des téguments concourt aussi à cette projection instantanée.

La puppe, ou chrysalide est oblongue, d'un marron vif, déprimée en avant terminée en arrière par deux très petites pointes.

L'insecte adulte, ou la mouche, qui n'a que 4 ou 5 millimètres de long est noire luisante, avec la tête, les antennes la bouche, les hanches antérieures, les truses intermédiaires et postérieures d'un roux pâle dos du corps avec trois lignes longitudinales superficielles, ailes transparentes.

Le second chapitre est consacré à l'anatomie et de la larve et de l'insecte adulte.

Anatomie de la larve — 1° L'appareil respiratoire ne diffère pas non plus que le système nerveux de celui des larves des autres muscides. Il consiste en deux trachées-artères d'un côté les émettant d'innombrables trachées nutritives, et s'anastomosant en avant par un tronc tracheal. Ces vaisseaux circulatoires reçoivent ou renvoient l'eau par deux paires de stigmates ou orifices respiratoires l'une antérieure, fibrillaire à dix digitations l'autre postérieure d'apparence conoïde dans l'état d'occlusion, mais en sphincter testonne lorsqu'elle est ouverte. — 2° L'appareil digestif est beaucoup plus compliqué que celui de la mouche, et en harmonie avec les habitudes voraces de la larve. Les mandibules, désignées par Swammerdam sous le nom de crochets ou de jambes, à cause de la diversité de leurs attributions physiologiques, avaient été mal étudiées jusqu'à ce jour. Leurs crochets destinés à sortir du corps et à y rentrer au gré du ver, soit pour s'accrocher dans la locomotion soit pour déchirer l'aliment, sont articulés avec une tige

qui les met en jeu. Cette tige est formée de l'adossement de deux lamelles, munies de muscles nombreux et puissants qui président aux fonctions de la paire buccale. C'est entre les filets divergents qui terminent en arrière cette double lame que s'introduisent et l'osophage et le conduit excréteur des *glandes salivaires*. Celles-ci conformes à celles décrites et figurées par Swammerdam, consistent pour chaque cote en deux renflements vésiculaires dont le col s'unit à celui de son congénère pour la formation du canal excréteur qui verse la salive dans la bouche. — Le *tube alimentaire* a cinq fois la longueur de la larve et se moule en plusieurs enroulements. — L'*œsophage*, d'une gracilité capillaire simplifiée à un *gesser* à parois calleuses, appelé à tort *jalot* par Swammerdam et entouré de quatre *bourses ventriculaires* ou *appendices aveugles* de cet auteur. Le *ventricule chylifère*, filiforme, a les deux tiers de la longueur de tout le canal. Il est séparé du véritable *intestin* par une valvule iléo-cœcale et reçoit en outre les deux *canaux cholédoques* ou aboutissent par paires les quatre *vaisseaux hépatiques* assez courts et fusiformes. L'intestin est inégal bosselé assez long pour se replier en deux enroulements. Avant de se terminer à l'anus il offre un *rectum* simple. Le tissu *adiposé splanchnique* forme tout le long des flancs une bandelette flexueuse garnie sur un même plan de granules serrés arrondis.

Anatomie de l'insecte adulte. — La larve ne vit que pour l'individu et sa fonction principale est la nutrition. Aussi tous ses viscères se bornent-ils à l'ouvrage digestif. La mouche vit pour le peuplé et un double appareil digestif, annexé vient compliquer son organisation. C'est l'appareil genital. Découlons rapidement son anatomie.

1° L'appareil *digestif* a subi dans la métamorphose d'importantes modifications entraînées et par la sobriété de l'insecte et par son défaut de croissance. Les *glandes salivaires* ont perdu un des renflements vésiculaires. Le *tube alimentaire* moins long d'un cinquième n'a conservé ni le *gesser* ni les bourses ventriculaires de la larve, il a acquis une *panse* bilobée à long col capillaire et un bourrelet circulaire à l'origine du ventricule chylifique. Les vaisseaux hépatiques n'ont éprouvé d'autre différence que de n'être pas fusiformes. L'intestin, dépourvu de bosselures, est aussi moins long et le rectum plus développé, a gagné deux paires de boutons charnus oncoïdes sur les attributions fonctionnelles desquels nous sommes bien peu fixés. Enfin le tissu adipeux splanchnique qui, dans la larve fournissait les matériaux des constructions organiques, s'est dégraisé en passant dans le corps de la mouche, et ses granules y sont le plus souvent libres et isolés.

1° L'appareil *genital* va être exposé séparément dans les deux sexes

A *Organes mâles* — Ils se composent de deux *testicules* unicapsulaires allongés de configuration variable suivant leur degré de turgescence terminale d'un *conduct deferent* en utricule sphéroïdale d'une paire de *vesicules seminales* cylindroïdes ou en massue plus ou moins arquées, d'un *canal ejaculateur* que Swammerdam se contentait d'appeler *racine de la verge*, d'une *armure copulatrice* inaperçue par cet auteur, composée d'un *forceps* à branches arquées formant la tenaille et de deux stylets droits tenant lieu d'*voiselle*, enfin d'un *fourreau de la verge* située non entre les branches du forceps, comme c'est l'ordinaire, mais insérée à la base extérieure de ce forceps et enroulée en une spirale orbiculaire Ce fourreau, hérissé de poils soyeux, égale en longueur le corps de la mouche

B *Organes femelles* — Les *ovaires* ont chacun une quarantaine de *saines ovigères* subiloculaires, insérées à la paroi supérieure d'un plateau rond ou ovalaire La *calice*, ou réservoir des œufs à terme, s'abouche par un *col* tout à l'oviducte Celui-ci forme comme le canal ejaculateur du mâle le tronc de tout l'appareil genital et aboutit à la *vulve*

Sur l'oviducte de notre *Prophile* s'insère un double appareil organique qui échappe à Swammerdam et dont les fonctions ne sont pas nettement établies, malgré la vive lumière jetée sur cette question dans un *Mémoire* spécial de M. Loew qui a paru en 1841. L'un de ces appareils est celui que dans mes diverses publications, j'ai appelé *glande subifique* et que M. Loew a désigné sous le nom de *glande du mucus* Cette glande est destinée à sécréter une humeur d'une nature analogue au suif et qui sert, au moment de la ponte, à enduire les œufs d'un vernis preservative Elle consiste en deux paires symétriques de *vesicules* insérées à la paroi supérieure de l'origine de l'oviducte L'une, plus ou moins ovoïde, est *secréttoire* et débouche en un *conduct excreteur*, l'autre, en forme de boyau cylindroïde terminée par un col grele semble plus spécialement faire l'office d'un *reservoir* Le microscope y dénote une tunique contractile et un vaisseau inclus comme dans plusieurs organes sécrétteurs des insectes, notamment les glandes salivaires et les glandes vénéneuses 2° L'autre appareil est l'*appareil de fécondation* ou le *receptaculum seminis* de von Siebold Dans la même majorité des muscides il est formé de trois lentilles sécréttoires que M. Loew nomme *capsules glanduliformes* et que j'ai appelées *orbicelles* dans mon grand travail sur l'anatomie de tout l'ordre des diptères, soumis depuis deux ans au jugement de l'Académie des Sciences, qui l'a accueilli avec faveur Je pense, avec von Siebold, que les orbicelles sont les réservoirs de la

liqueur séminale éjaculée par le mâle, et qu'à l'époque où les œufs, suffisamment développés, descendent par l'oviducte, ils reçoivent, en passant à l'embouchure des conduits excréteurs, le baptême de la fécondation. Mais je crois aussi, avec M. Loew, que la structure singulière de l'orbicelle permet de supposer que ses attributions physiologiques ne se bornent pas au simple rôle de réservoir. Quoi qu'il en soit, cet organe est dans notre *Prophile*, une simplicité exceptionnelle qui n'est sans doute qu'une dégénération dans l'échelle descendante. L'orbicelle, située en arrière de l'insertion de la grande scissifère, est très unique, assez grande et sessile. Son limbe est une collerette festonnée blanchâtre, et son centre un large disque noir. Au côté droit de l'orbicelle est un cul-de-sac court, gros, arrondi plus ou moins plissé analogue suivant moi à la *poche copulatrice* d'Audouin quoique M. Loew refuse une semblable poche aux diptères en général. Et l'orbicelle et la poche aboutissent à un grand boyau qui semble une continuation de l'oviducte et dont la texture lobulée sur les côtes et finement plissée en travers, indique des propriétés exprinsibles.

De même que tout l'appareil génital male de notre petite mouche se termine par une armure copulatrice, susceptible de se porter hors du corps et d'y rentrer, l'organe femelle offre aussi à sa terminaison une pièce rétractile destinée au double but et de s'accommoder aux manœuvres copulatrices et d'émettre au dehors les produits de la fécondation. Cette pièce rétractile de la femelle est l'*oviscapte*. C'est un étui coriace-membraneux, composé de trois tuyaux qui peuvent rentrer l'un dans l'autre, comme ceux d'une lunette d'approche. Le terminal de ces tuyaux n'a pas les *tentacules vulvaires* qui subsistent dans beaucoup de diptères.

Swammerdam, trompé sans doute par des apparences, a cru que dans l'accouplement de la *Prophile du fromage* c'était le mâle qui recevait au lieu d'être reçu. J'ai été témoin très-attentif de l'union de deux sexes de la *Prophile du jambon*, et non-seulement je n'ai pas constaté l'assertion de Swammerdam, mais j'ai pu me convaincre, dans ce couple uni à la manière des chiens, que les organes copulateurs du mâle étaient logés dans le vagin ou oviscapte de la femelle. Malgré les plus grandes précautions pour amener par degrés et sans rupture la disjonction du couple, j'échouai. Une castration accidentelle, une mortelle mutilation laissèrent engagés dans la profondeur de l'organe femelle la verge et le forceps copulateur, comme il arrive parfois dans la violence des ébats amoureux chez les *Anthophores* parmi les hyménoptères, et comme Audouin l'avait artificiellement obtenu dans le hanneton pour constater la présence de l'armure du mâle dans la

poche copulatrice de la femelle. La petitesse des putics dans notre *Prophile* ne nous a permis de retrouver dans cette poche les parties si violemment séparées du corps du mâle.

M. BOISSIERAULT fut hommage à l'Académie du deuxième et dernier volume de l'ouvrage qu'il vient de publier sous le titre de *Economie rurale insulsee dans ses rapports avec la Chimie, la Physique et la Meteorologie* (voir au Bulletin bibliographique)

RAPPORTS

ECONOMIE RURALE — *Rapport supplémentaire sur l'opium d'Alger*

(Commissaires MM. de Mirbel, Bousingault, Pavyen rapporteurs)

Afin que nous puissions lever quelques doutes emus sur le rendement en morphine de l'opium récolté en Algérie par M. Simon, M. le maréchal Ministre de la Guerre nous a fait parvenir un Mémoire détaillé contenant la description des procédés analytiques suivis à la pharmacie centrale d'Alger par M. Herpin, pharmacien en chef.

Les produits obtenus dans deux analyses comparées de l'opium d'Alger et de l'opium d'Orient nous sont arrivés par la même voie.

Nous nous sommes empressés d'examiner ces pièces et échantillons.

Les moyens employés étaient clairement décrits et sont convenables d'ailleurs pour l'examen comparatif dont il s'agit. Cependant l'opium pris comme terme de comparaison, dit de *Constantinople* et provenant des magasins de médicaments pour les hôpitaux militaires à Marseille ayant donné une proportion de morphine moindre que les meilleures qualités des provenances de Smyrne et de l'Inde, il y a eu peu d'intérêt à comparer les quantités des deux produits, tandis qu'il pouvait être utile de vérifier le poids réel et la pureté de la morphine extraite de l'opium d'Alger. Le flacon qui la contenait, parvenu en bon état et cacheté avec soin, nous permit de faire ces vérifications.

Nous avons regretté toutefois de ne point trouver dans le Mémoire l'indication de l'eau hygroscopique que pouvait perdre l'opium par une dessiccation dans le vide, ce qui eût été nécessaire pour établir un rapport exact entre les résultats obtenus à la pharmacie centrale sur l'opium récolté par M. Simon, et ceux de nos analyses sur l'échantillon provenant de la récolte de M. Hardy.

Les deux produits de morphine que nous venions de recevoir ne pouvaient être complètement purs bien qu'ils fussent cristallisés, car leur nuance était fauve pour l'un et d'un gris jaunâtre pour l'autre. Quelques agglomérations paraissent être formées par l'interposition d'une matière étrangère entre les cristaux, ainsi qu'on en jugera en examinant l'échantillon encore en vente de la morphine tirée de l'opium d'Orient.

Nous avons pesé avec un grand soin toute la morphine extraite de l'opium de M. Simon : il s'en est trouvé 3520 milligrammes qui, desséchés dans le vide, se sont réduits à 3501, broyés et lavés jusqu'à épuisement par l'éther, puis par l'eau alcoolisée légèrement ils furent ensuite dissous dans l'alcool bouillant. La solution filtrée donna les cristaux blancs et puis que nous présentons ici, le résidu, évaporé, laissa cristalliser une faible quantité de morphine un peu colorée, puis une dernière portion légèrement fauve.

Les substances étrangères éliminées se composent

1° De la partie enlevée par l'éther, de couleur fauve, d'aspect résineux	65 milli
2° De la portion dissoute dans l'eau alcoolisée, de couleur jaunâtre	49
3° De corps insolubles contenant des particules charbonneuses et pesant	14
	<hr/> 128

En retranchant ces 128 milligrammes des 3501, il reste 3373 milligrammes, dou, déduisant encore les substances étrangères colorées déposées par l'évaporation des eaux mères enlevées par l'épuration des deux cristallisations, qui pesaient 46 milligrammes on obtint un poids net de 3327 milligrammes, poids un peu supérieur à la quantité de morphine pure recellément obtenue, et qui fut égale à 3225 milligrammes. Cette dernière quantité peut en effet représenter la morphine extraite dans des conditions semblables à celles où nous nous étions placés en faisant l'analyse de l'opium de M. Hardy.

Si nous admettons que l'échantillon analysé par M. Herpin contenait la même proportion d'eau hygroscopique et pesait 30 grammes, comme le Mémoire et l'étiquette du flacon l'indiquent, nous aurons le rapport

$$30 \quad 3,225 \quad 100 \quad 10,75,$$

ou très-approximativement la même richesse en morphine que dans le produit des cultures et de la récolte de M. Hardy.

Ce nous serait une raison de plus de conserver l'espoir d'obtenir en Algérie de l'opium d'une qualité plus constante que toutes celles du com-

merce, et d'une richesse en morphine égale à celle des plus belles variétés d'opium de Smyrne et de l'Inde, récoltées en larmes et exemptes de falsifications

On pourrait sans doute compter sur un résultat aussi important, dans l'intérêt de la médecine civile et militaire, si l'on continuait les essais de culture et de récolte avec les mêmes soins éclairés qu'y ont mis MM Hardy et Simon, peut-être obtiendrait-on un peu plus encore, si l'on parvenait à réunir toutes les conditions les plus favorables qu'eux-mêmes ils ont si bien signalées

Nous avons l'honneur de proposer à l'Académie d'envoyer ce supplément de Rapport à M le maréchal Ministre de la Guerre

Les conclusions de ce Rapport sont adoptées

NOMINATIONS

L'Académie procède par voie de scrutin, à la nomination d'une Commission de cinq membres pris dans les Sections des Sciences mathématiques. La Commission qui sera chargée de déterminer la question à proposer comme sujet du concours pour le *grand prix de Mathématiques* de l'année 1846

MM Biot, Arago, Liouville, Poinsot et Sturm réunissent la majorité des suffrages

L'Académie procède ensuite également par voie de scrutin, à la nomination de trois candidats qui seront présentés au choix de M le Ministre de la Guerre, pour la place de *directeur des études à l'École Polytechnique*

A un premier tour de scrutin destiné à la désignation du candidat qui sera porté le premier sur la liste le nombre des votants étant de 50,

M Chevreul obtient	30 suffrages,
M Duhamel	12
M Lamé	1
M Poncelet	2

Il y a un billet blanc

Le deuxième tour de scrutin ayant pour objet la désignation du candidat porté le second sur la liste, donne les résultats suivants sur 53 votants,

M Duhamel obtient	29 suffrages,
M Lamé	6
M Gay-Lussac	1

Il y a dix-sept billets blancs

Au troisième tour de scrutin, enfin, le nombre des votants étant de 51

M Lamé obtient	29 suffrages,
M Poncelet	2
M Berthier	1

Il y a dix-neuf billets blancs

En conséquence la liste présentée à M le Ministre portera de ces scrutins

En première ligne, M Chevreul
 En deuxième ligne M Duhamel
 En troisième ligne, M Lamé

MEMOIRES LUS

M DUPRE lit un Mémoire ayant pour titre *Recherches concernant la desinfection et la conservation cadaverique*

Frappé d'un inconvénient que présentaient presque tous les procédés jusqu'à présent employés pour la conservation des cadavres, celui d'introduire une quantité d'eau plus ou moins considérable qui ne peut manquer de ramollir et de macérer les tissus j'ai eu, dit M Dupre l'idée de faire pénétrer, sous forme gazeuse les substances antiseptiques, en plaçant ces substances dans une cornue qu'on chauffe suffisamment après en avoir adapté le tube à une des artères principales. Le composé qui m'a le mieux réussi est le produit de la distillation des matières végétales ou animales, et il semble peut-être digne de remarque que les produits d'une espèce de décomposition des matières organiques (la carbonisation) se trouvent être justement les meilleurs préservatifs d'une autre espèce de décomposition (la putréfaction). J'ai soumis vers le milieu du mois de décembre dernier le cadavre d'un enfant à l'action des produits provenant de la distillation d'un litre et demi de tannée introduite dans une cornue de capacité correspondante le cadavre s'est parfaitement conservé depuis cette époque.

Le Mémoire de M Dupré sera soumis à l'examen d'une Commission composée de MM Magendie et Pelouze.

M EMMANUEL GONON lit un Mémoire ayant pour titre *Système télégraphique nouveau, universel et perpétuel, pour le jour et pour la nuit*

« Mon télégraphe, dit l'auteur, est tellement simple, que tous les employés peuvent être parfaitement au courant des signaux dans quatre leçons d'une heure, et devenir réellement habiles après une pratique de deux ou trois semaines tandis que dans le système suivi en France, plusieurs employés confessent avoir eu besoin d'un exercice de six mois, et plus, avant d'être capables de rendre promptement et sans hésitation les signaux qui leur étaient transmis »

Mes signaux se faisant beaucoup plus rapidement que ceux du système de M. Chappe les employés bien exercés peuvent donner douze ou treize signaux par minute, et expédier facilement une dépêche de 900 à 1000 mots dans l'espace d'une heure, à une distance de 400 kilomètres environ. De plus, je gagne souvent sur les mots 10, 20, et jusqu'à 50 pour 100, c'est-à-dire que je puis rendre une dépêche de 100 mots par 90, par 80, et quelquefois même par 50 signaux seulement »

Le Mémoire de M. Gonon est renvoyé à l'examen d'une Commission composée de MM. Mathieu, Babinet et Seguier

MEMOIRES PRESENTES

CHIMIE — *Examen de la résine de Maynas, par M. B. LEWY*

(Commissaires, MM. Dumas, Ad. Brongniart, Boussingault)

La résine de Maynas nous vient de l'Amérique, et principalement de la province de Maynas d'où elle tire son nom

« C'est à l'obligeance de M. Adolphe Brongniart que je dois d'avoir pu étudier cette résine. L'échantillon sur lequel j'ai opéré provenait de la collection du Muséum du Jardin des Plantes »

D'après les renseignements que M. Goudot a bien voulu me donner, cette substance est fournie par le *Calophyllum caloba*, il ajoute que ce bel arbre se trouve dans les plaines de Saint-Martin. La résine s'extrait par incision, à l'état récent, elle est blanche et limpide, mais elle s'épaissit à l'air et prend une couleur jaunâtre

M. Goudot dit également avoir rencontré le *Calophyllum caloba* dans les plaines de l'Oriénoque, où on le désigne sous le nom de *Palo di Maria*, et dans le Canco sous le nom de *Palo di Aceite*

« Dans le voyage de MM. de Humboldt et Bonpland, j'ai trouvé désigné l'*Acceyti di Maria incolorum*, comme provenant du *Calophyllum longifolium*, ainsi il n'y a pas de doute que l'arbre qui fournit cette résine appar-

(243)

tient à la famille du *Calophyllum*, et je propose en conséquence de nommer la substance qui fait l'objet de cette Note, *resine de Calophyllum* au lieu de *resine de Maynas*

Cette substance ressemble, par ses caractères extérieurs, à la plupart des résines, mais quand on vient à la purifier en la dissolvant dans l'alcool bouillant, elle se présente sous la forme de petits prismes transparents

» Lorsque la cristallisation s'opère lentement, on obtient de très-beaux cristaux d'une belle couleur jaune et d'une grandeur peu commune pour ces sortes de matières. L'Académie en jugera par l'échantillon que j'ai l'honneur de mettre sous ses yeux

» La détermination de la forme de ces cristaux a été faite par M. de la Provostaye, et voici la Note qu'il a eu l'obligeance de me remettre à ce sujet

La résine de *Calophyllum* forme de très-beaux cristaux, qui appartiennent au système monoclinoédrique (prisme rectangulaire oblique)

Notation des faces

$$\begin{aligned} M &= \infty P, \\ h &= \infty P \infty, \\ T &= (\infty P \infty), \\ o &= + P, \\ n &= P \infty, \\ s &= (P \infty) \end{aligned}$$

Angles mesurés

$$\begin{aligned} b \quad s &= 143^{\circ} 15', \\ M \quad T &= 119^{\circ}, \\ h \quad b &= 101^{\circ} 17', \\ M \quad s' &= 98^{\circ} 45', \text{ à très-peu près,} \\ h \quad n &= 139^{\circ} 35', \\ h \quad M &= 150^{\circ} 30' \end{aligned}$$

$$\text{Valeur des axes} \quad a \quad b \quad c \quad 1,347 \quad 1 \quad 1,769$$

$$\text{Inclinaison des axes} \quad a \text{ et } b \quad \gamma = 78^{\circ} 43'$$

» La résine purifiée a donné à l'analyse les résultats suivants

I 0,387 de matière ont donné 0,255 d'eau et 0,954 d'acide carbonique

» II 0,423 de matière ont fourni 0,280 d'eau et 1,046 d'acide carbonique

(244)

III 0,491 de matiere ont produit 0,321 d'eau et 1,217 d'acide carbonique

• IV 0 502 de matiere ont donné 0,330 d'eau et 1,245 d'acide carbonique

• Ces nombres, traduits en centièmes, donnent

	I	II	III	IV
Carbone	67,22	67,43	67,59	67,63
Hydrogene	7,31	7,34	7,25	7,29
Oxygene	25,47	25,23	25,16	25,08
	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>

Les résultats qui peuvent se représenter par la formule suivante



qui donne, en effet

C	1050,0	67,20
H	112,5	7 20
O	<u>400,0</u>	<u>25 60</u>
	1562,5	100,00

formule qui représenterait de l'acide benzoïque auquel se seraient ajoutés 3 équivalents d'hydrogene

J'ai essayé de déterminer l'équivalent de cette substance en formant un sel d'argent, mais six préparations différentes de ce sel n'ont pas donné de résultats constants

On obtient ce sel en dissolvant la résine dans l'ammoniaque caustique, chassant l'excès d'ammoniaque et précipitant la dissolution limpide par du nitrate d'argent neutre

• Cette résine se comporte comme un acide elle entre en combinaison avec les bases, se dissout facilement dans la potasse, la soude et l'ammoniaque, même à froid, elle est insoluble dans l'eau, très-soluble dans l'alcool, l'éther, les huiles essentielles et les huiles grasses

Sa densité est de 1,12, elle fond à 105 degrés centigrades environ en un verre transparent. Une fois fondue, elle reste longtemps liquide, et ne se solidifie que vers 90 degrés centigrades

• C = 75, H = 12,5

» A la distillation sèche, elle fournit des bulles empyreumatiques, et laisse un résidu charbonneux

L'acide acétique la dissout même à froid l'acide sulfurique également celui-ci lui donne une belle couleur rouge, mais l'eau en précipite la résine non altérée

En chauffant cette substance avec un mélange de bichromate de potasse et d'acide sulfurique, on donne naissance à un dégagement d'acide carbonique, et il se forme en même temps de l'acide formique dont il est facile de constater la présence et les caractères distinctifs

» Le chlore et le brome réagissent également sur cette résine mais très lentement, et ne donnent rien de bien net

En traitant cette substance par l'acide nitrique fumant, il s'opère une réaction très-vive en précipitant par l'eau, on obtient un acide avoté d'un blanc jaunâtre incristallisable et soluble dans l'alcool et l'éther Deux préparations différentes de cet acide n'ont pas donné à l'analyse le même résultat

Quand on fait réagir de l'acide nitrique à 36 degrés sur cette résine, il se dégage beaucoup de vapeurs rutilantes, surtout à chaud, et il se forme un acide liquide et volatil qui possède tous les caractères de l'acide butyrique Il reste dans la cornue un liquide qui donne, par la concentration des petits cristaux d'acide oxalique

Il se forme, en outre, un acide cristallisable, soluble dans l'eau, ne précipitant pas les sels de chaux, mais que la petite quantité de matière dont j'ai pu disposer ne m'a pas permis d'examiner »

PHYSIOLOGIE — *Expériences sur l'engrais des oies, faites par M J PEARSON*
(Extrait)

(Commissaires, Magendie, MM Dumas, Boussingault)

» Je me suis procuré dix oies de même âge et de force sensiblement égale On les priva de toute nourriture pendant environ douze heures, et on les pesa au bout de ce temps pour établir leur poids respectif Une d'elles, le n° 10, fut immédiatement saignée, et je déterminai

1° Le poids du sang égal à	0 ^b ,167
2° Celui de la graisse qui entourait les intestins	0,100
3° Celui de la graisse qui se trouvait dans le tissu sous-cutané et les autres parties du corps »	0,212
4° Et enfin le poids du foie	0,061

Au moyen de ces données, je calculai par hypothèse le poids respectif de chacune de ces parties dans les neuf oies qui me restaient au moment où l'on allait les soumettre pour la première fois à l'alimentation par le maïs. Les nombres résultant de ce calcul sont consignés dans un des tableaux annexes à mon *Memoire*, le tableau C, en opposition avec le poids de ces mêmes parties donné par l'expérience.

Les quantités de maïs que ces neuf oies ont consommé se trouvent exprimées dans le tableau A. On n'y verra pas sans étonnement qu'une d'elles, le n° 2, a mangé jusqu'à 650 grammes de maïs par jour, ce qui formait à peu près la cinquième partie de son poids.

Pour pouvoir apprécier la quantité de graisse qui se formait en elles, je les pesai toutes à des époques déterminées : ces pesées se faisaient immédiatement avant le repas du soir, qui avait lieu douze heures après celui du matin, et, pour approcher le plus possible du chiffre exact de l'augmentation, je retranchai de chacune des pesées le poids de la moitié du dernier repas. Ainsi, par exemple, l'oie n° 1 fut pesée le 4 décembre au soir : son poids réel était de 4^k,055, mais comme le matin elle avait mangé 217 grammes de maïs, supposant que la moitié se trouvait encore dans les intestins de l'animal, j'adoptai le chiffre $4^k,055 - 108 = 3^k,947$. En agissant ainsi, il m'a semblé rentrer autant que possible dans les conditions où se trouvaient les oies quand elles furent pesées pour la première fois.

On voit à la fois, par le tableau B, la distance à laquelle les diverses pesées ont été faites (sept jours), et l'augmentation qu'a éprouvée chaque oie durant chaque période.

Dans la colonne *a* de ce même tableau sont portés les nombres représentant la moyenne de l'augmentation pour chaque jour; dans la colonne *c* se trouve relatée la quantité du maïs consommé par chaque oie. Le chiffre de l'augmentation des oies, multiplié par 100, ayant été divisé par la quantité de maïs employé, on a pu établir la relation existant entre la quantité de maïs consommé et l'augmentation des oies *f*.

Dans les dix premières colonnes *aa'*, *bb'*, *cc'*, *dd'*, *ee'* du tableau C, nous mettons en regard les quantités calculées de sang, de foie, de graisse que nous supposons exister dans les oies non engraisées, avec les quantités correspondantes de sang, de foie et de graisse retrouvées dans les oies après leur engrais. Dans la colonne *f* se trouvent les nombres représentant la quantité de graisse qui s'est formée durant l'alimentation. Ces nombres ont été établis en retranchant de la totalité de la graisse recueillie la quantité censée exister toute formée dans les oies maigres. Dans la colonne *g*

est représentée l'augmentation totale de chacune des oies, afin qu'on puisse comparer le chiffre de cette augmentation avec celui qui exprime la quantité de graisse retirée de chacune d'elles (voyez colonne *e'*). Dans la colonne *h* figurent les quantités de maïs consommées par chaque oie, dans la colonne *i*, la quantité de graisse que ce maïs représente, enfin dans la colonne *k* on trouve les nombres représentant la différence qui existe entre les quantités de graisse qui se sont formées par l'alimentation du maïs (colonne *f*), et la quantité de graisse qui se trouvait dans le maïs, en admettant, ce qui réellement ne peut pas être, que cette dernière ait été entièrement utilisée par l'oie.

• En jetant un coup d'œil sur le tableau A, on voit que les oies n'ont pas supporté le régime d'alimentation, décrit précédemment pendant le même nombre de jours, que les unes ont dû être tuées au bout du dix-neuvième jour, tandis que d'autres ont pu être gavées jusqu'au vingt-quatrième. Dans ce pays-ci, les personnes qui s'occupent de l'engrais des oies s'accordent toutes à dire qu'une oie ne peut être engraisée avec profit si l'on est obligé de la tuer soit avant dix-huit, soit après vingt-quatre jours d'engrais.

• Par ce qui est inscrit aux colonnes *a* et *b* du tableau B, on voit que toutes les oies ont augmenté de poids, mais que cette augmentation a été faible dans les oies n° 1 et 5, qui, par suite d'une fâcheuse influence, ont toutes deux considérablement perdu de leur poids dans l'espace de deux jours.

En effet, l'oie n° 1 pesait, au 14 décembre	4 ^k ,350
et le 16 elle ne pesait plus que	3,755
Différence ou perte	0,595

L'oie n° 5 pesait, au 18 décembre	4 ^k ,458
et le 20 elle ne pesait plus que	4,016
Différence ou perte	0,442

• Le 14 décembre, la femme qui s'était chargée du soin de mes oies me prévint que celle qui portait le n° 1 devait être immédiatement saignée, parce que, disait-elle, si l'on continuait à la gaver, non-seulement la nourriture ne lui profiterait plus, mais encore l'animal perdrait de son poids. Curieux de vérifier cette assertion, je voulus qu'on continuât à la traiter comme précédemment, et je vis avec la plus grande surprise que le surlendemain elle avait déjà perdu, comme je lui dis plus haut, 0^k,595.

• Pendant cette période, que j'appellerai de désagrégation, les excréments de cette oie étaient lactescents et contenaient, ainsi que je le vis plus tard,

beaucoup plus de graisse que ceux des autres oies. C'est à ce caractère liquide et laiteux que la femme déjà mentionnée avait jugé nécessaire de tuer l'oie n° 1.

Le phénomène de désagrégation me paraît si intéressant, que je me disposais à l'étudier dans tous ses détails sur l'oie n° 5, mais celle-ci étouffa.

Je ne manquerai pas, à la première occasion, d'examiner ce fait qui me paraît digne d'attention.

Je dois dire que les augmentations qui correspondent aux deux ou trois derniers jours d'alimentation ne sont point rigoureusement exactes, et que pour la plupart elles doivent être envisagées comme étant trop élevées, attendu les mauvaises digestions qu'entraîne l'état maladif de l'animal à cette dernière période de l'engrais. Ainsi, dans l'appareil digestif de certaines oies, nous avons retrouvé de 230 à 250 grammes tant de maïs que de matières pulvacees, tandis que dans les intestins de l'oie n° 10, tuée avant l'engrais, il n'y avait que 55 grammes de matières excrémentielles. En négligeant donc ces dernières augmentations et en ne tenant compte que de celles qui portent sur quatorze à vingt jours d'alimentation par le maïs, on voit que l'augmentation, calculée par rapport à la nourriture consommée, a toujours été en décroissant, à deux ou trois exceptions près.

Les nombres exprimés aux colonnes α et α' du tableau C établissent, si ce n'est pour les oies n° 1 et 5, que le poids du sang a presque doublé pour toutes. Dans le sang qu'on retire des oies engraisées par le maïs, on constate d'assez notables changements. Parfois il est tout à fait rouge, d'autres fois il est d'un blanc rosé, ce qui arrive le plus ordinairement, et d'autres fois enfin il est blanc, et a l'aspect de la crème. Dans le second cas, il se sépare en deux substances. L'une, rouge, se dépose sous forme de caillots, l'autre, plus liquide, a des propriétés physiques qui la rendent comparable à du lait. Cette partie séreuse ne contient plus que des traces d'albumine, car chauffée ou traitée par l'acide nitrique, elle ne donne qu'un faible coagulum.

Le sang retiré des oies grasses diffère aussi de celui des oies maigres par la quantité de graisse qu'il renferme et qu'on sépare facilement, sous forme d'un liquide oléagineux, par une simple dessiccation du sang dans une étuve, et à plus forte raison par l'éther.

Quant aux propriétés physiques du corps gras qui se rencontre dans le sang des oies grasses, elles offrent beaucoup plus d'analogie avec la graisse du maïs qu'avec celles qu'on trouve, soit sur l'épiploon, soit dans le tissu sous-cutané. C'est ce que nous espérons pouvoir démontrer un peu plus tard par l'étude comparée des propriétés chimiques de ces corps gras.

Beaucoup de graisse s'ajoute au foie d'une oie ainsi engrassée. On voit par la comparaison des nombres inscrits aux colonnes *b* et *b'* du tableau (que l'augmentation du foie a été à deux exceptions près, de cinq à six fois le poids primitif de cet organe. Les foies des oies n^{os} 1 et 5, au lieu d'être fermes et blancs comme ceux des sept autres étaient brunâtres, injectés de sang flasques et spongieux, présentant en un mot tous les caractères physiques résultant d'une réduction de volume qui s'explique par la perte qu'ont éprouvée ces deux oies et à laquelle le foie ne pouvait rester étranger. Nous avons cru remarquer une certaine relation entre le développement du foie et celui de la graisse. Or si cela est vrai l'inverse doit l'être aussi en sorte que la relation qui se constate durant l'assimilation doit se maintenir dans la désassimilation.

Que sous ce dernier point de vue nos observations aient porté sur le foie des oies maigres ou sur celui des oies grasses nous avons toujours observé que le poids du foie est environ la moitié de celui de la graisse retirée de l'intestin et environ le quart de celui de la graisse répartie dans les autres parties du corps de l'animal.

	oie n ^o 1 non engrassée	oie n ^o 5 engrassée mais qui étouffa	oie n ^o 9 engrassée
Poids du foie	0 062	0 160	0 335
Poids de la graisse des intestins	0 100	0 370	0 605
Poids de la graisse trouvée dans les autres parties de l'oie	0 212	0 762	1 065

Toutefois on ne doit pas ajouter à ces observations sur la relation qui semble exister entre le foie et la graisse d'une oie plus d'importance qu'elles n'en ont réellement tant qu'elles ne sont fondées que sur un si petit nombre d'exemples.

En comparant les nombres de la colonne *e* qui représentent la quantité de graisse absolue trouvée dans les oies engrassées avec les nombres consignés dans la colonne *g*, qui en exprime l'augmentation de poids, on voit que des dix-sept pour les n^{os} 1, 2, 5, 6, 7, 8 et 9, sont inférieurs à la

quantité de graisse trouvée Dans les oies nos 1 et 6, non-seulement le chiffre exprimant leur augmentation absolue de poids est inférieur à celui qui représente la totalité de la graisse, mais il est encore à ce même nombre diminué du poids de la graisse qui devait se trouver dans la oie morte. J'estime que, si j'avais pu établir le chiffre réel de l'augmentation du poids des oies engraisées l'exception que je viens de signaler n'aurait pas existé, et que dans toutes il y aurait eu une portion de l'animal lui-même qui eût participé d'une manière quelconque à la formation de la graisse. Mais cette évaluation rigoureuse était impossible puisque ainsi que nous l'avons dit, il y avait dans beaucoup d'oies des éléments non digérés dont on ne pouvait évaluer le poids inconnu et indéterminable des matières fécales qu'elles contenaient lors de leur prise au commencement de l'expérience.

À l'appui de cette proposition que les oies engraisées sont moins charnues que les oies maigres je dirai qu'en dosant la fibre musculaire d'une oie maigre j'ai trouvé 0^{kg} 981 tandis qu'en dosant la fibre d'une oie grasse je n'ai trouvé que 0^{kg} 798. Maintenant si cette proposition paraît en contradiction avec les observations de M. Fiebig, il ne faut sans doute l'attribuer qu'à ce que l'opération citée par ce célèbre chimiste a été faite dans des conditions toutes différentes de celles sur lesquelles nous avons basé notre propre opinion. D'abord l'oie engraisée à Giessen ne pesait que 2 kilogrammes avant d'être mise en expérience tandis que les oies que nous avons fait engraisser pesaient en moyenne plus de 3 kilogrammes. Des lors on doit penser que l'animal n'était pas arrivé au terme de son accroissement, et que le maïs qu'il a consommé a d'abord servi à son développement. En second lieu, l'oie dont il s'agit, si elle eût été givée comme on a l'habitude de le faire en Alsace, n'eût certainement pas pu supporter ce régime pendant trente six jours, or, si elle a vécu aussi longtemps c'est qu'elle a consommé journellement moins de maïs que les nôtres. Nous voyons en effet, que, tandis que celles-ci mangeaient en moyenne 194 grammes par jour, l'oie dont parle M. Fiebig n'en consommait en moyenne que 0^{kg} 333. Faisons remarquer, en outre, que ce dernier nombre n'exprimerait le rapport exact du maïs consommé journellement par l'oie de Giessen qu'autant qu'on aurait fait usage, comme nous l'avons fait à Strasbourg, de maïs ancien, attendu que la valeur nutritive de celui-ci est de beaucoup supérieure à celle du maïs récolté dans l'année. Cela est si bien reconnu dans ce pays-ci, que le maïs ancien se vend en moyenne de 15 à 16 francs l'hectolitre, tandis que 1 hectolitre de maïs nouveau ne se vend que 10 fr. 50 cent.

* Nous pensons que cette supériorité si bien reconnue du maïs ancien

sur le nouveau pourrait s'expliquer par la dessiccation que le maïs subit durant son exposition à l'air, dessiccation qui ayant pour résultat d'opérer la réduction du maïs, doit en augmenter le pouvoir nutritif. Mais pour que cette explication fût pleinement satisfaisante, il aurait fallu qu'en additionnant les nombres exprimant 1° la valeur de cette réduction 2° l'intérêt du capital, 3° le déchet on obtint un total dont le chiffre ajouté à celui du maïs nouveau représentât à peu près le prix moyen du maïs ancien, or, c'est ce qui n'est pas, ainsi que nous allons le démontrer.

* Pour connaître la réduction qu'éprouve le maïs par son exposition à l'air nous avons comparé entre eux les poids de volumes égaux de maïs tant ancien que nouveau.

Des pesées faites à la halle de notre ville il résulte que le poids d'un hectolitre de maïs ancien varie de	72 à 78 kilogr.
Et que celui d'un hectolitre de maïs nouveau varie de	65 à 73
Difference	$\frac{7 + 5}{2} = 6$

* D'une autre part en lisant des pesées sur une plus petite échelle j'ai obtenu les résultats ci-après :

Maïs ancien de même qualité que celui employé à l'engrais des oies sur lesquelles nous avons expérimenté

Poids de 1 litre	0 ^k 767	} Moyenne 76 ^k ,73 l hectolitre
id id	0 ,765	
id id	0 ,770	
	<u>2 302</u>	

Maïs nouveau qui venait d'être égrené

Poids de 1 litre	0 ^k ,669	} Moyenne, 66 ^k ,93 l hectolitre
id id	0 ,664	
id id	0 ,675	
	<u>2 ,008</u>	

D'après ces données on peut, sans crainte de s'écarter beaucoup de la vérité, estimer à 10 p 100 la perte occasionnée par la dessiccation. Si maintenant l'on évalue à 5 p 100 l'intérêt du capital, et à 3 p 100 le déchet, le total sera de 18 p 100 à ajouter au prix moyen du maïs nouveau.

Celui-ci étant de	f 10,50	
L'intérêt et la perte de	<u>1,89</u>	
Le prix du maïs ancien ne devrait donc être que de	12,49	au lieu de 15,50

Cette comparaison entre le prix calculé du maïs ancien et son prix réel démontre que la préférence dont il jouit doit être due, en grande partie, à une cause ou plutôt à une qualité encore inconnue inhérente à cette semence quand elle arrive à un certain degré de vétusté. Cette qualité était-elle en relation avec le fait que nous allons signaler, et d'après lequel le maïs ancien contiendrait plus d'huile que le maïs nouveau? Il y aurait témérité de notre part à nous prononcer dès à présent. Sur 100 parties de maïs récolté en 1842, nous avons retiré 7,850 d'huile, et sur 100 parties de maïs récolté en 1843, et égrené le 20 janvier 1844, nous avons retiré 3,400.

Si notre attention s'était portée plus tôt sur ce point important, nous aurions pu faire des expériences sur le maïs à partir du moment où il venait d'être récolté, et répéter de temps en temps nos expériences, afin de voir si réellement en vieillissant il ne subit pas, ainsi que beaucoup de fruits et de semences, une espèce de maturation ayant pour résultat de développer dans le maïs une plus grande quantité de corps gras.

Si de nouvelles expériences à ce sujet venaient à justifier le fait isolé que nous venons de rapporter, on trouverait la justification du désaccord qui existe entre les résultats obtenus à Paris et à Glessen, par des chimistes également habiles, touchant la quantité d'huile que renferme le maïs.

Selon les uns, le maïs renferme de 7 à 9 p. 100 de graisse,

Selon les autres, il en renferme de 1 à 4 p. 100,

Selon d'autres, enfin, il n'en renfermerait point.

Les nombres inscrits colonne A font ressortir la différence qui existe entre le poids de la graisse formée dans l'oise, et celui de la graisse renfermée dans le maïs consommé, et nous prouvent péremptoirement qu'une forte proportion de graisse a dû se former aux dépens du sucre et de la fécule du maïs. Mais comme lorsqu'une oie en engrais digère bien, ses excréments (*) ne renferment plus que le son proprement dit avec une certaine quantité de graisse, il faut admettre aussi que la graisse du maïs doit, selon toute probabilité, contribuer pour une certaine part à la graisse retrouvée dans l'oise.

D'une autre part, si les corps gras qui se trouvent dans les aliments

(*) Le poids des excréments desséchés a été, dans nos expériences, de 12 à 15 p. 100 de celui du maïs consommé.

100 parties d'excréments desséchés et finement pulvérisés ayant été traitées par l'éther, nous en avons retiré de 9 à 10,5 p. 100 d'huile.

exercent sur ceux qui s'en nourrissent une influence bien reconnue, est-il dit pour cela que les aliments dans lesquels il n'y a pas de graisse soient impropres à l'engrais des animaux? C'est ce que l'expérience n'a pas encore prouvé, car ce n'est pas répondre à la question que de dire qu'on peut engraisser des porcs avec des pommes de terre. N'ajoute-t-on pas toujours à cet aliment, soit des eaux grasses, soit quelques substances renfermant de la graisse? Si en est ainsi, rien n'est encore résolu à cet égard.

Le fait bien établi de la diminution de l'albumine dans le sang des oies grasses, celui de la participation que semble avoir la matière même de l'oeuf à la formation de la graisse nous donne à penser qu'on parviendrait peut-être, au moyen d'une fécule pure, mélangée avec une matière azotée (albumine ou caséine), à composer pour les oies une nourriture exempte de graisse. Si par ce moyen, que nous allons tenter, nous parvenons à les nourrir et à les engraisser, la question serait tranchée d'une manière définitive et ce fait, joint à celui de la diminution de l'albumine dans le sang des oies engraisées expliquerait alors pourquoi des engraisseurs expérimentés commencent d'abord par pousser la chair avant de pousser à la graisse. Si, au contraire, le résultat était négatif et qu'il fût prouvé qu'une certaine quantité de graisse est indispensable à l'engrais, nos observations relatives au plus ou au moins de corps gras que renferme le maïs, suivant qu'il est vieux ou nouveau, acquerraient beaucoup d'intérêt, car elles expliqueraient pourquoi on préfère le fourrage déjà un peu ancien au nouveau, pour la nourriture des bestiaux, pourquoi généralement, dans nos pays, on reconnaît plus de qualité au blé battu en janvier ou février et pourquoi enfin ceux qui cultivent le maïs le laissent en grappes et l'exposent à l'air pendant toute une année sous des hangars ou sous des toits.

D'après ce que nous avons dit l'oeuf pouvant être considérée comme un véritable laboratoire où se fabrique de la graisse, il suffira d'évaluer exactement, au moyen d'appareils convenablement appropriés les matériaux gazeux, liquides ou solides qui y entrent, et ceux qui en sont expulsés ou qu'on en extrait, pour établir une théorie rationnelle sur la formation de la graisse, et décider si l'oxygène agit directement ou indirectement sur la fécule ou sur le sucre pour transformer en graisse ces principes immédiats.

Résumons nous et disons

1° Que, d'après nos expériences, l'oeuf, en s'engraissant, ne s'assimile pas seulement la graisse contenue dans le maïs, mais qu'elle en forme elle-même une certaine quantité aux dépens de l'amidon et du sucre du maïs, et peut-être aussi à l'aide de sa propre matière puisque la quantité de graisse

formée en elle est ordinairement plus du double de celle qui se trouvait dans le maïs

2 Qu'après avoir été engraisée, une oie contient une quantité de graisse supérieure à l'augmentation de poids qu'elle a subie

3 Que durant l'engrais, le sang des oies change de composition qu'il devient riche en graisse, et que l'albumine en disparaît ou s'y modifie,

4 Qu'enfin il semble exister une certaine relation entre le développement du foie et la quantité de graisse produite

M. PERRON adresse, en même temps que son Mémoire sur l'engrais des oies, une Note ayant pour titre *Observations faites à l'occasion d'un travail sur l'arsenic, publiée par M. Jacquelin*

Cette Note est renvoyée à l'examen de la Commission désignée pour divers communications relatives à l'arsenic et aux poisons minéraux en général

BOTANIQUE — *Sur la géographie botanique des environs de Béziers (Hérault), par M. DUCHARTRE* (Extrait par l'auteur)

(Commissaires, MM. Richard, de Jussieu, Gaudichaud)

L'auteur présente d'abord des considérations générales relativement au climat des environs de Béziers, et à l'influence que doivent exercer sur leur flore leur température moyenne d'environ 15 degrés, le voisinage de la mer, les modifications diverses de la surface du sol, etc. Il détermine la circonscription de cette portion du bas Languedoc par une ligne qui régènerait à 8 ou 9 kilomètres au nord de la ville de Béziers, et qui de là irait en deux sens parallèles se terminer à la Méditerranée, ici elle comprendrait tout le littoral qui s'étend de l'embouchure de l'Hérault sous Agde, à celle de l'Aude, sous Vendres. Il passe ensuite à la classification des stations, qu'il croit pouvoir caractériser avec une précision suffisante, d'après les plantes qu'elles offrent le plus habituellement

Un premier partage sépare les plantes *maritimes*, ou sur lesquelles l'influence de la mer s'exerce à des degrés divers, d'avec celles de *l'intérieur des terres*, ou qui semblent entièrement soustraites à cette influence

A — Parmi les plantes maritimes, il en est qui habitent le littoral même, et d'autres qui, quoique s'écartant assez de la mer, paraissent toujours la suivre à quelque distance. celles-ci sont les plantes maritimes dans le sens le plus vague, celles-là sont les espèces *littorales*, ou maritimes proprement dites

« Ces dernières appartiennent à deux stations bien distinctes : 1° les *dunes* ou les *sables mouvants*, qui, sur cette partie du littoral de la Méditerranée, constituent la zone de végétation la plus rapprochée de la mer, 2° les *marais salés*, formés de sables fixes, fréquemment inondés par la mer, imprégnés de sel marin. La flore des dunes se compose de plantes glauques ou très-velues; celle des marais salés de plantes plus ou moins charnues, ou d'une glaucescence particulière, dans les dunes, on ne voit que des herbes ou des arbrisseaux très-bas, dans les marais salés, on voit paraître les formes frutescente et même arborescente (Tamarix). — Après des considérations sur l'une et l'autre de ces deux portions du littoral, sur le parti que la culture a su en tirer, etc., l'auteur énumère les principales espèces que lui ont présentées l'une et l'autre. Voici la liste de la plupart de ces espèces :

« 1°. Dans les dunes (les plantes étant rangées suivant qu'elles sont plus essentiellement littorales). *Eryngium maritimum* L. — *Echinophora spinosa* L. — *Polygonum maritimum* L. — *Crucianella maritima* L. — *Euphorbia paralias* L. — *Pancratium maritimum* L. — *Malcomia littorea* Br. — *Cakile maritima* Scop. — *Mathiola sinuata* Br. — *Orlaya maritima* Koch. — *Diots candidissima* Desf. — *Medicago marina* L. — *M. littoralis* Rhode. — *Schrenkianthus mucronatus* L. — *Buphtalmum maritimum* L. — *Anthemis maritima* L. — *Convolvulus soldanella* L. — *Euphorbia peplis* L. — *Ephedra distachya* L. — *Beta maritima* L. — *Rumex tingitana* L. — *Lavatera maritima* Gouan. — *Alyssum maritimum* L. — *Reseda alba* L. — *Astragalus masiliensis* Lam. — *Linaria caulorbiza* Delile. — *Cynanchum monspeliacum* L. — *Clematis flammula* L., var. *maritima* D. C. — *Mercurialis tomentosa* L. — *Asphodelus ramosus* Wild., etc. Pour les graminées : *Saccharum Ravennæ* Murr. — *S. cylindricum* Lam. — *Agrostis pungens* Schreb. — *A. maritima* Lam. — *Festuca maritima* D. C. — *Poa littoralis* Gouan. — *P. maritima* Huds. — *Triticum junceum* L. — *Hordeum maritimum* Vahl. — *Calamagrostis arenaria* Roth. — *Elymus arenarius* L. — *Rottbolla subulata* Sav., etc.

« Au milieu des dunes sont enclavées des sortes de petits bassins remplis d'une immense quantité de *Juncus acutus* et *maritimus* Lam., entremêlés de quelques espèces parmi lesquelles plusieurs appartiennent aux marais salés : *Linum maritimum* L. — *Daucus maritimus* Lam. — *Scabiosa maritima* L. — *Aster tripolium* L. — *Carex extensa* Good. — *Plantago maritima* L., etc., ces petits bassins sont nommés dans le pays *joncasses*.

« 2°. Dans les marais salés, les Chénopodées et les Staticees composent, en nombre et en quantité, la plus grande partie de la flore. Leurs principales espèces sont les suivantes : *Salicornia herbacea* et *fruticosa* L. — *S. macrosta-*

chya Moitc — *Salvula Kali* et *Tragus L.* — *Chenopodium fruticosum* et *maritimum L.* — *C. setigerum D.C.* — *Atriplex portulacoides, rosea* et *laciniata L.* — *Statice limonium L.* — *S. oleæfolia Pourr.* — *S. bellidifolia Gouan.* — *S. echinoides L.* — *S. ferulacea L.*, etc. Aux autres familles appartiennent les espèces suivantes *Frankenia pulverulenta L.* — *F. intermedia D.C.* — *Arenaria rubra L.*, var. *marina L.* — *A. media L.* — *Tetragonolobus siliquosus Roth.*, var. *maritima.* — *Tamarix gallica L.* — *Apium graveolens L.* — *Aster tripolium L.* — *Sonchus maritimus L.* — *Artemisia gallica Wild.* — *Plantago maritima L.* — *Triglochin maritimum L.* — *Crypsis schoenoides Lam.* pour toute graminée. Enfin, dans l'eau salée des lagunes. *Ruppia maritima L.*, et *Zostera marina L.*

» 3°. Parmi les plantes maritimes dans le sens le plus vague et formant la transition à celles de l'intérieur des terres, l'auteur range le *Tamarix gallica L.*, l'olivier, le *Vitex agnus-castus L.*, l'*Hyosciamus albus L.*, la *Mercurialis tomentosa L.*, etc.

» B — La deuxième section, ou celle des *plantes de l'intérieur des terres*, comprend 1° celles des lieux absolument incultes; 2° celles des lieux cultivés ou exploités par l'homme. Les plantes aquatiques composent une troisième division

» 1°. Les plantes des lieux incultes peuvent être rangées sous trois ou quatre catégories, dont l'une bien distincte, les autres se fondant peu à peu l'une dans l'autre. La première comprend les *garrigues*, vastes terrains composés d'amas de graviers et de galets, caractérisés par les Cistées et par une végétation formée surtout d'arbrisseaux durs ou épineux. Leurs espèces principales (en commençant par les plus caractéristiques) sont les suivantes : *Cistus monspeliensis L.* — *C. crispus L.* — *C. salvifolius L.* — *C. albidus L.* — *Helianthemum vulgare Gœrtn.* — *H. guttatum Mill.* — *H. eriocaulon Dun.* — *H. pulverulentum D. C.* — *H. funana Mill.* — *H. glutinosum D. C.*, etc. — *Ulex provincialis Lois.* — *U. europæus L.* — *Daphne gnidium L.* — *Quercus cocciferus L.* — *Ruta montana Clus.* — *Dorycnium suffruticosum Vill.* — *Astragalus monspesulanus L.* — *Erica cinerea L.* — *E. scoparia L.* — *Caluna crica D. C.* — *Phyllirea angustifolia L.* — *P. latifolia Lam.* — *Lavandula stœchas L.* — *L. spica L.* — *Osyris alba L.* — *Juniperus communis L.* — *J. oxycedrus L.* — *Euphorbia nicæensis All.* — *E. characias L.* — *Elychrysium stœchas D. C.* — *Rosmarinus officinalis L.* — *Lithospermum apulum Vahl.* — *A. hyllanthæ monspeliensis L.* — *Centaurea paniculata L.* — *Santolina incana Lam.* — *S. viridis Wild.* — *Trifolium purpureum Lois.* — *Chrysocoma lino-syris L.* — *Silene quinque vulnera L.*, et var. *cerastoides.* — *Buplevrum rigidum L.* — *Stebelina dubia L.*, etc.

» En deuxième lieu, les coteaux et les tertres ont une végétation qui leur

est généralement propre , mais qui forme une serie dans laquelle il est difficile d'établir un point d'arret Il semble cependant que l'on peut regarder comme appartenant surtout aux coteaux les especes suivantes *a* *Biscutella coronopifolia* All — *Dianthus carthusianorum* L — *Inum strictum* L — *L. narbonense* L — *Psoralea bituminosa* I — *Astragalus sesameus* I — *Opoponax chironium* Koch — *Scabiosa stellata* I — *Cephalaria leucantha* Schrad — *Cirsium acarna* D C — *Centaurea collina* I — *Convolvulus cantabrica* L — *Phlomis herba venti* I — *P. lychinitis* I — *Asphodelus fistulosus* L — *Melica ciliata et rimosa* Vill etc *b* Aux tertres *Camphorosma monspeliaca* L — *Plantago albicans* I — *Cynoglossum cheirifolium* L — *Hippocrepis comosa* I — *Paronichia argentea* Lam — *Thymus serpyllum* L — *Dianthus caryophyllus* I — *Silene nocturna* I — *Inum salso-loides* Lam — *Seseli tortuosum* L — *Erodium cicutarium* Wild — *I. mala-choides* Wild — *Urospermum Dalechampii* Desf — *U. picroides* Desf — *Picridium vulgare* Desf — *Plumbago europæa* I etc

En troisième lieu, l'on passe facilement des tertres aux bords des chemins peuplés surtout de Composées épineuses et d'Echium — *Onopordon acanthium et illyricum* L — *Cynira cardunculus* L — *Centaurea aspera* I — *C. salmantica* L — *C. solstitialis* L — *C. calcitrapa* L — *C. Pouzini* D C — *Kentrophyllum lanatum* D C — *Scolymus hispanicus* I — *Cichorium intybus* L — *Echium vulgare* L — *E. plantagineum* L — *E. violaceum* L — *E. pyrenaicum* L — *Dianthus prolifer* L — *Erodium cicutarium* L — *E. moschatum* Wild — *Salvia verbenica* L — *Thymus nepeta* Sin , etc

2° La deuxième division, celle des plantes des lieux cultivés ou exploités, comprend, en deux articles distincts, d'un côté, les plantes cultivées, de l'autre, les plantes spontanées ou subspontanées Parmi ces dernières, on établit d'ordinaire plusieurs catégories Le défaut d'espace permet seulement de donner ici les noms des principales especes rapportées à ces catégories ou à leurs stations

a — Autour des habitations, parmi les décombres *Sisymbrium irio* L — *S. Sophia* L — *S. polyceratum* L — *Diploaxis tenuifolia* D C — *D. muralis* D C — *Vaillantia muralis* L — *Xanthium strumarium* L — *X. spinosum* L — *Onopordon acanthium* L — *O. illyricum* L — *Datura stramonium* L — *Hyosciamus albus* L — *H. niger* L — *Amaranthus prostratus* Balb — *Chenopodium murale, urbicum* L , etc — *Urtica urens, dioica et pilulifera* L , etc

b — Au bord des champs et des vignes *Foeniculum officinale* All — *Inula viscosa* Desf — *Bupthalmum spinosum* L — *Scolymus maculatus et*

hispanicus I — *Lichium* — *Nonea alba* D C — *Asperugo procumbens* L —
Euphorbia scutaria I — *Allium roseum* L — *Cerinthe aspera* L — *Lathyrus*
tuberosus I — *Reseda lutea et luteola* I , etc

c — Dans les vignes *Clematis flammula* I — *Iribulus terrestris* L
Trifolium purpureum Lois — *T angustifolium* L — *T Cherleri* L —
I stellatum I — *Chondrilla juncea* L — *Xanthium macrocarpum* D C —
Anarithus albus I — *Chenopodium botrys* I — *Aristolochia clematitis*
I — *Plantago psyllium* I — *Tragus racemosus* I — *Buza maxima*,
media I , etc

d — Parmi les moissons *Adonis aestivalis* L — *Ranunculus acris* I —
Pipaver Rhæas argemone et dubium L — *Roemeria hybrida* D C —
Hypocoum procumbens I — *Lychnis githago* Lam — *Neslia paniculata*
Desv — *Myrrium perfoliatum* I — *Rapistrum rugosum* Berg — *Anthyllis*
vulneraria I — *Scorpiurus vermiculata et mucicata* I — *Astilobium scor-*
pioides D C — *I ithyus aphaca* I — *I sphaericus* Retz — *L angulatus* I
— *Olaya grandiflora* Hoffm — *Iurgenia latifolia* Hoffm — *Valerianella* —
Anthemis — *Centaurea benedicta* L etc

e — Dans les champs, soit après la moisson soit en jachère *Delphi-*
nium pubescens D C — *D consolida* I — *Fumaria spicata* L — *F me-*
dica Lois — *F officinalis* I — *Sinapis arvensis* L — *S incana* I —
Bunaris crucago I — *Reseda phyteuma* I — *Silene gallica* I — *Arenaria*
rubra et tenuifolia I , et plusieurs autres petites Caryophyllees *Spergula*
crastum *Alsine*, etc — *I inum gallicum* I — *L catharticum* I — *Medicago*
— *Trigonella monspeliaca* L — *Trifolium arvense* L — *Onobrychis caput-*
valli Lam — *Rubus cœsius* L — *Cnicianella angustifolia* L — *Solidago*
pratensis Lam — *Chrysanthemum segetum* L — *Anacyclus tomentosus*
D C — *Anthemis mixta* I , etc — *Centurea solstitialis* L — *Stellera pas-*
serina I — *Croton tinctorium* L — *Euphorbia chamaecice* L — *E fal-*
cata I etc — *Omithogalum rubronense* I , etc

f — Des haies et des buissons *Lycium europæum* L — *Amygdalus com-*
munis I — *Agrostium vulgare* L — *Jasminum fruticans* L — *Smilax as-*
pera L — *Asparagus acutifolius* L — *Lonicera etrusca* Santi — *L capri-*
folium L etc — *Clematis vitalba* L — *Rubus* — *I athyrus latifolius* L —
I sylvestris I — *Fumaria capricolata* L , etc

g — Prairies et lieux herbeux Avec les plantes fondamentales qu'il se-
rait trop long et inutile d'énumérer, attendu qu'elles reproduisent en général
ce que l'on voit dans la plupart des prairies, on trouve des especes plus re-
marquables ou plus locales *Althæa cannabina* L — *Trifolium resupina-*

tum L — *Smyrniololus* I — *Thunbergia tuberosa* D C — *Chironia spicata* Wild — *Gratiola officinalis* I — *Luphorbia pilosa* L — *Hyacinthus romanus* L — *Iris spuria* I — *Narcissus tazetta* L — *Leucocorydon astivum* I , etc

h — Bois et taillis Ces bois se distinguent par la présence du *Quercus ilex* I et par les espèces suivantes *Pistacia lentusca* et *terebinthus* I *Frica arborea* L — *Calluna erica* D C — *Cytisus scoparius* Link — *C. argenteus* L — *C. capitatus* Jacq etc — *Genista scorpius* D C — *Spirium junceum* L , etc

Le deuxième article de cette division comprend l'indication des cultures des environs de Béziers 1° la vigne au premier rang, pour l'importance et l'étendue 2° les céréales en quantité insuffisante pour la consommation parmi elles le maïs au premier rang très inférieur 3° les prairies artificielles bien nées à peu près à la luzerne cultivée en grand surtout pour sa grande ou saumon moins répandue 4° le riz (*Rizus communis* L), qui est cultivée en grand par un propriétaire de Villeneuve les Béziers 5° les salicornes et salsola, aujourd'hui presque entièrement abandonnées, étant cultivées au bord de la mer, avant l'invention des soutes artificielles 6° l'olivier dont la culture a été frappée au cœur par les hivers de 1789 1829, etc et diminue tous les jours d'importance

3° La troisième division, celle des plantes aquatiques termine cet exposé Généralement ces plantes présentent moins le caractère méridional que les terrestres Voici les principales et les plus remarquables

a — Dans les lieux inondés l'hiver, dans les fosses *Myosotis minimus* I — *Lepidium latifolium* I — *Coniza sicula* Wild — *Gracium Candollei* Brat — *Mentha cervina* I , etc

b — Dans les eaux douces une grande quantité de Graminées, Lyphacées, Cyperacées, communes à presque tous les marais, de plus le Nuphar et le Nymphaea, plusieurs Potamogeton (*crispum*, *densum*, *compressum*, *perfoliatum*, *pectinatum*, *natans*, etc) — *Myriophyllum* — *Ceratophyllum* — *Vallisneria spiralis* L — *Vallisneria nymphaeoides* Vent — *Utricularia vulgaris*, *Butomus umbellatus* L — *Marjica pubescens* Lenore (M Fabri Dun)

La liste sèche qui précède contient les éléments fondamentaux de la flore de Béziers, elle peut donner une idée de sa richesse et de la variété de ses espèces

BOTANIQUE — Notice sur une rubiacée du genre *Condaminea*, et sur le vernis qu'elle produit, par M J Goudot (Extrait par l'auteur)

(Commissaires, MM Dumas, Ad Brongniart, Boussingault)

Il (Condaminea utile, *Condaminea utilis* — *Arbor foliis ovatis aut obovatis integris, breviter acuminatis, basi subattenuatis, coriaceis, glabris, venosis, supra nitidis, subtus albidis, breviter petiolatis Stipulae interpetiolares, integrae, subrevolutae, paniculae laxae, terminales, folium æquantes, floribus et bracteis minutissimis, glabris, subsessilibus Crescit in regno Novo Granatensi, regione jam subfrigida, floret julio*

J'obtins les premiers enseignements sur cet intéressant végétal, au village de Fusagasugua, situé à une journée de Bogotà, où il est connu sous le nom d'*arbol de cera*, il se trouve aussi, plus au sud, sur différents autres points de la cordillère orientale, non loin de la ville de Neiva, et près de Soasa, mais toujours sur le revers occidental de la même cordillère, et, bien qu'on m'ait assuré qu'il existe aussi aux environs de la mine d'émeraude de Muzo, je ne l'ai point trouvé dans ce canton, non plus que dans la cordillère centrale, sur le même parallèle quoique j'y aie rencontré, en parcourant le Quindío, différentes autres espèces du même genre. Étant à Carthago, lorsque des habitants de Pasto y arrivaient avec quantité de petits objets vernis, je pus m'assurer que la substance que je vis entre leurs mains était bien la même que celle que j'avais recueillie, ils m'informerent aussi que l'arbre qui la produisait croissait dans les environs de leur ville. Ainsi, on peut dire que cet arbre précieux se rencontre depuis l'équateur environ jusque par les 40°, 35 latitude nord, dans la cordillère orientale de la Nouvelle-Grenade, et que c'est surtout aux environs de Pasto, et dans l'immense groupe de montagnes où sont situées les sources du fleuve de la Magdelaine et du Cauca, qu'il croît plus particulièrement.

Cet arbre n'est point rare aux environs de Fusagasugua où je l'ai vu plusieurs fois dans les grands bois, sur la route de ce village à la capitale, il croît à la même élévation que les chênes du pays, les naturels n'en font aucun usage, et je n'ai commencé à en voir employer la résine que longtemps après, à Neiva, où l'on s'en servait pour couvrir de couches très-minces les fruits du *Crescentia cujete*, formant ainsi des vases d'un usage très-répandu dans le pays, mais c'est surtout à Timana et à Pasto que l'on prépare, en les recouvrant de ce vernis, une multitude de petits objets, à l'usage domestique, ce qui forme, pour ces pays, une petite branche d'industrie.

Le procédé usité pour vernir est fort simple, quoique long la résine une fois recueillie, on la fait bouillir dans l'eau pour la nettoyer complètement, et lui enlever partie de sa couleur verte on ajoute ensuite à l'eau la couleur qu'on veut lui donner qui ordinairement est du rocou (*bixa orellana*), puis on en prend une petite quantité qu'on pétrit et étend avec les mains jusqu'à la rendre assez mince pour pouvoir l'appliquer sur les objets, dans cet état, elle forme des feuilles plus ou moins étendues extrêmement ténues, et dont l'épaisseur ne dépasse pas celle d'une feuille de papier à écrire

Lorsqu'on veut avoir un vernis doré on applique sur la feuille du vernis une feuille d'or tel que celui que le commerce européen introduit en petits livrets elle adhère parfaitement et sert ainsi à embellir par des dessins variés l'objet que l'on vernit Les vernisseurs ont aussi un procédé assez ingénieux pour recouvrir la partie concave des vases, ils en ferment exactement la surface par une feuille du vernis, puis pratiquant un trou imperceptible par lequel ils introduisent une paille ils aspirent par ce moyen tout l'air intérieur ce qui oblige la feuille de vernis à s'appliquer d'elle même contre la paroi interne

Tout ce travail se fait à une température élevée et souvent à l'aide de la vapeur de l'eau bouillante

Les vases et autres objets ainsi vernis sont inaltérables par l'action prolongée de l'eau froide ou chaude j'en ai vu qui, depuis plus d'une année résistaient à l'action détériorante des substances contenues dans l'urine d'autres, dans lesquels on faisait brûler de l'eau de vie, ne montraient non plus aucune altération, la substance cependant est soluble en partie dans l'alcool

La résine de *Condaminea*, à l'état naturel, se rencontre au sommet des jeunes rameaux, ou elle recouvre en entier, d'une couche transparente extrêmement épaisse, les bourgeons, leur formant une calotte qui a souvent le volume d'un gros pois comestible ou d'une fève Cette couche s'étend sur la surface naissante des jeunes feuilles, s'amincissant à mesure que celles-ci se développent, jusqu'à ce qu'enfin elle disparaisse entièrement (1) On

(1) Ce mode de bourgeonnement, très rare dans les végétaux des tropiques, nous rappelle celui que nous voyons en Europe dans les peupliers mais la nécessité de l'enduit dans un pays où la température varie très peu, ne peut guère être expliquée, comme on l'a fait dans le cas que nous venons de citer, par la nécessité de protéger le bourgeon contre les températures basses de l'hiver

pourrait supposer, d'après cela, que au le bourgeon elle se trouve constamment à l'état visqueux, tandis qu'au contraire, tant que la température de l'air est peu élevée, comme pendant la nuit et le matin, elle est très friable, et se pulvérise facilement lorsqu'on la détache du végétal, la chaleur de la main suffit d'ailleurs pour la ramollir complètement et en former une masse ductile elle est verte et insipide, sans odeur jetée sur les charbons, elle y brûle avec une grande clarté et en pétillant

Il est singulier que, ni le célèbre Mutis qui a fait explorer les Andes de la Nouvelle Grenade ni d'autres voyageurs botanistes qui ont parcouru les localités où croît ce végétal n'en aient fait aucune mention, cela est d'autant plus remarquable que cette petite branche de l'industrie des *Pastusos* s'étend de fort loin et est même, peut-être, antérieure à l'arrivée des Espagnols.

Jusqu'à présent, je crois, on n'a encore signalé aucun produit analogue appartenant à la nombreuse famille des Rubiacées, dont plusieurs sont déjà si utiles aux arts et à la médecine. J'ai cru donc qu'il pouvait être de quelque intérêt d'indiquer cette substance qui pourra peut-être plus tard, lorsque les contrées où croît ce végétal seront mieux connues recevoir une application plus générale.

MÉCANIQUE CÉLESTE. — *Mémoire sur les perturbations dans les mouvements des comètes dues à la résistance de l'éther, par M. BARNET-RIVAT* première partie.

(Commissaires MM. Biot, Arago, Poussin.)

M. BONJEAN adresse de Chambery une Note sur les *effets du kermès minéral, et, en général, des préparations antimoniales administrées à l'intérieur*, etc.

Il résulte des recherches auxquelles l'auteur s'est livré, les conséquences suivantes :

1° Le kermès minéral administré à l'intérieur, même à haute dose n'est pas absorbé comme les sels solubles d'antimoine il en est probablement de même pour tous les composés insolubles de ce métal.

2° Dans un cas d'empoisonnement par une préparation insoluble d'antimoine on devra surtout s'attacher à rechercher le poison dans les matières vomies, et dans celles qui se trouveront contenues dans l'estomac et les intestins. Cependant, si le malade a survécu à l'intoxication, il peut arriver qu'on ne retrouve plus aucune trace du poison qui est insensiblement éliminé par les selles.

3° Pour opérer la carbonisation des matières organiques dans lesquelles

on recherche la presence d'un compose antimonial l'emploi de l'acide sulfurique seul me paraît suffire dans toutes les circonstances, et être a la fois le plus facile, le plus prompt et le plus économique de tous les moyens qu'on propose et adoptés jusqu'ici

La Note de M. Bonjean est renvoyée a l'examen d'une Commission spécialement nommée pour diverses communications relatives a l'arsenic et autres poisons metalliques

M. FLEURY-VALIAT soumet au jugement de l'Academie une Note sur les avantages que l'on trouverait dans l'application a l'industrie des effets de la pression atmospherique

M. FLEURAU adresse une Note et un dessin relatifs a un procede qu'il propose pour faire remonter les bateaux au moyen de machines fixes placées de distance en distance et mises en jeu par le courant même de l'eau

M. Seguer est prié de prendre connaissance de ces deux communications et de faire savoir à l'Academie si elles sont de nature a devenir l'objet d'un Rapport

CORRESPONDANCE

M. FLOURBES en présentant le premier volume d'un ouvrage de M. FOVILLE sur l'anatomie la physiologie et la pathologie du système nerveux cérébro spinal (voir au *Bulletin bibliographique*) donne une idée du contenu de cette première partie

Cet ouvrage a pour objet principal de faire connaître la *structure de la moelle épinière et du cerveau*. L'auteur expose dans une série de recherches historiques les idées des anciens sur le système nerveux, et les méthodes successives de dissection employées depuis Galien jusqu'à nos jours. A la suite des recherches historiques vient un exposé de l'état actuel de la science et puis une idée générale du système nerveux, suivie de la description extérieure de la moelle épinière et de l'encéphale

» Dans cette description les circonvolutions du cerveau sont divisées en quatre ordres

Le quatrième ordre n'existe, avec tous les caractères qui le distinguent que dans l'espèce humaine

Enfin les différences qui distinguent le cerveau de l'homme de celui des animaux sont tracées d'après la seule considération de la forme extérieure

Puis vient la structure

Les fibres nerveuses sensoriales sont distinguées des fibres nerveuses locomotrices non seulement dans la moelle épinière mais encore dans le cervelet et dans le cerveau. Les deux ordres de fibres se rattachent en différents lieux à la couche intime considérée comme la partie active par excellence comme l'organe de l'intelligence dans le cerveau.

La commissure extérieure est décrite comme formant le rendez-vous central de toutes les parties de chaque hémisphère et en même temps de toute la longueur de l'axe cérébro-spinal.

L'étude de certaines déformations artificielles du crâne est jointe à la description de ses formes à l'état normal. Cette étude des déformations montre, entre autres exemples, la tendance constante de l'auteur à rattacher la pathologie à ses investigations anatomiques.

M. FLOURENCE en présentant au nom de l'auteur, une nouvelle livraison de *Histoire générale et particulière du développement des corps organisés* par M. COSTE appelle l'attention sur les faits nouveaux ou plus complètement observés que cette livraison est destinée à faire connaître.

Parmi ces faits un de ceux sur lesquels insiste d'abord M. Coste est l'existence de chaque côté du cou des fœtus des mammifères de quatre fentes transversales qui s'ouvrent dans le pharynx. Ces fentes sont séparées entre elles par des espèces de cloisons charnues qui correspondent aux arcs branchiaux des poissons car l'appareil vasculaire qui s'y distribue jusqu'à un certain point, la forme qu'il affecte d'une manière permanente chez les vertébrés inférieurs. On voit en effet sur les figures que M. Coste a fait représenter, que le bulbe de l'aorte du fœtus des mammifères au lieu de se courber immédiatement en une crosse unique, se divise au contraire, en trois ou quatre branches de chaque côté du cou et que toutes ces branches après avoir longé chacune un arc branchial viennent se réunir en un point commun pour former l'aorte descendante. Mais bientôt elles s'effacent ainsi que les fentes branchiales auxquelles elles correspondent et il n'en reste que deux du côté gauche dont l'une se convertit en crosse de l'aorte pendant que l'autre, après avoir existé sous forme de canal artériel, finira par constituer le tronc de l'artère pulmonaire.

Cet appareil branchial transitoire n'existe pas seulement chez le fœtus des mammifères et des autres vertébrés, on le rencontre encore, avec des formes identiques chez l'homme, car M. Coste conserve dans sa collection un fœtus humain de vingt-cinq jours sur lequel quatre fentes branchiales se

dessignent si nettement de chaque côté du con, qu'il serait impossible de distinguer ce fœtus de celui des mammifères, si on le séparait de ses membranes.

» M. Coste s'occupe aussi, dans cette livraison, du *système vasculaire de l'allantoïde*, et, par conséquent, *des veines ombilicales* auxquelles se rattache l'existence d'un appareil particulier qui doit être signalé. On croit assez généralement que les veines ombilicales ou allantoïdiennes, parvenues dans le ventre du fœtus, ne commencent à fournir de branches qu'après leur entrée dans le foie. Mais cette opinion, qui est parfaitement exacte tant qu'il ne s'agit que d'une époque avancée du développement, se trouve complètement fautive quand on remonte aux premières et aux plus importantes périodes de la vie embryonnaire. On reconnaît alors en effet que les veines ombilicales fournissent dans l'abdomen, avant d'arriver au foie, un très-grand appareil vasculaire qui se distribue non-seulement dans toute l'étendue des parois du ventre et de la poitrine, mais encore dans la colonne vertébrale. Cet appareil si considérable, qui joue un rôle important et d'assez longue durée dans la circulation primitive, forme, avec celui des veines *azygos*, la voie principale à la faveur de laquelle le sang du fœtus retourne au cœur.

» M. Coste l'a rencontré chez tous les vertébrés qui ont une allantoïde, et il conserve plusieurs préparations qui en démontrent l'existence chez l'homme »

MM. JOLI, professeur à la Faculté des sciences de Toulouse, et LAVOCHAT, chef des travaux anatomiques à l'Ecole vétérinaire de la même ville, adressent une première Note sur les observations anatomiques qu'ils ont faites en disséquant une girafe qui était destinée au Muséum et qui est morte en chemin. Parmi les faits qu'ils signalent nous nous contenterons de citer ceux qui suivent.

La longueur du canal digestif, non compris l'œsophage et l'estomac, était de 62^m,45. La longueur de cette partie, dans le chameau à deux bosses, a 42^m,13, dans le bœuf, à 48^m,86; dans le cheval, à 25^m,18.

L'absence du ligament coxo-fémoral, et la profondeur de la cavité cotyloïde qui présentait une ouverture latérale située vers sa partie postérieure.

L'énorme développement des sinus frontaux et, en général, la disposition des frontaux. « Il nous a paru, disent les auteurs, que la troisième corne attribuée à la girafe n'est rien autre chose qu'une saillie moyenne du frontal, saillie d'autant plus prononcée que l'individu lui-même est plus âgé. Les

cornes latérales nous paraissent être aussi de simples prolongements des os du front, et non , comme l'a dit un anatomiste célèbre, des os distincts qui s'appliquent sur le frontal. »

M. **DUBOIS**, d'Amiens, écrit relativement à un ouvrage qu'il avait présenté l'an passé au concours pour les prix de Médecine et de Chirurgie, et sur lequel la Commission n'avait pas porté de jugement parce qu'elle l'avait considéré comme étant plutôt du domaine de la Commission chargée de décerner le prix de Physiologie expérimentale. M. Dubois demande que cette dernière Commission soit, en effet, chargée de l'examen de son travail qui a pour titre. *Préleçons de pathologie expérimentale.*

(Renvoi à la future Commission de Physiologie expérimentale.)

M. **MOLÉNAARS** adresse un paquet cacheté.

L'Académie en accepte le dépôt.

A quatre heures trois quarts, l'Académie se forme en comité secret

COMITE SECRET.

La Section d'Économie rurale, par l'organe de M. DE GASPARI, présente la liste suivante de candidats pour la place de correspondant vacante par suite du décès de M. *Mathieu*, de Dombasle

En première ligne, M. Vilmorin, aux Barres, près Noyen sur-Vernisson (Loiret),

En seconde ligne, *ex æquo* et par ordre alphabétique,

MM. Crud, à Lausanne,

Ridolfi, à Pise;

Rieffel, à Grand-Jouan (Seine-Inférieure);

Schattenmann, à Bouxwiller (Bas-Rhin);

Villeroy, Prusse Rhénane.

L'élection aura lieu dans la prochaine séance MM. les membres en seront prévenus par lettres à domicile.

La séance est levée à 6 heures.

F.

ERRATUM. (Séance du 15 janvier 1844.)

Page 85, ligne 23, au lieu de M. **BARYER**, colonel d'état-major, lisez M. **BARYER**, chef d'escadron d'état-major

BULLETIN BIBLIOGRAPHIQUE

L'Académie a reçu, dans cette séance, les ouvrages dont voici les titres .

Comptes rendus hebdomadaires des séances de l'Académie royale des Sciences, 1^{er} semestre 1844; n° 6, in-4°.

Annales de Chimie et de Physique, par MM. GAY-LUSSAC, ARAGO, CHEVREUL, DUMAS, PELOUZE, BOUSSINGAULT et REGNAULT, 3^e série, tome X, janvier 1844; in-8°.

Annales des Sciences naturelles; novembre 1843; in-8°.

Économie rurale considérée dans ses rapports avec la Chimie, la Physique et la Météorologie, par M. BOUSSINGAULT; tome II, in-8°.

Bulletin de la Société géologique de France; 2^{me} série, tome I^{er}, janvier 1844, in-8°.

Illustrationes Plantarum orientaliū; par M. le comte JAUBERT et M. SPACH, 9^e livr., in-4°.

Histoire générale et particulière du développement des Corps organisés, publiée sous les auspices de M. VILLEMAIN; par M. COSTE; I^{re} partie, 2^e livraison: *vertébrés*; in-fol.

Excursion pittoresque et archéologique en Russie sous la direction de M. A. DÉMIDOFF, 2^e livr., in-fol.

Recueil de Lettres et de Mémoires adressés à l'Académie des Sciences pendant les années 1842 et 1843, par M. LEROY-DÉTIOLLES, 1844, 1 vol. in-8°.

Rapport annuel sur les progrès de la Chimie, présenté, le 31 mars 1843, à l'Académie royale des Sciences de Stockholm, par M. J. BERZELIUS; traduit du suédois par M. PLANTAMOUR; 4^e année. Paris, 1844, in-8°.

L'Évangile médical, ou Traité des causes premières de l'Homme, par M. CHRISTOPHE. I^{re} partie *Anatomie et Physiologie*, tome I^{er}, in-8°.

Des falsifications des Substances alimentaires, et des moyens chimiques de les reconnaître; par MM. GARNIER et HAREL; in-12. (Adressé pour le concours au prix concernant les Arts insalubres.)

Traité complet de l'anatomie, de la physiologie et de la pathologie du Système nerveux cérébro-spinal, par M. FOVILLE. I^{re} partie. *Anatomie*, 1 vol. in-8°, avec atlas de 23 planches in-4°.

Phumous et paraphumosis accidentels. — L'efficacité de la Belladone est de nouveau constatée, par M. DE MIGNOT. Bordeaux, 1843, in-8°.

De l'origine du Gypse dans les terrains supercrétacés du bassin du sud-ouest de la France; par M. LAGREZE-FOSSAT. Montauban, 1843; in-8°.

De l'Electricite en général et de ses applications en particulier, par MM. GALLETTI et JOUNIN, 1844; broch. in-8°

Bulletin de la Société d'Agriculture de Caen, octobre 1843, in-8°

Journal de Médecine de Bordeaux, et *Bulletin des travaux de la Société de Médecine de la même ville*, janvier à décembre 1843; in-8°

Votes des Travaux de la Société de Médecine de Bordeaux, par M. BURGNET, secrétaire perpétuel, broch. in-8°.

Programme des Prix de la Société de Médecine de Bordeaux. Séance publique annuelle du samedi 23 décembre 1843, in-8°

Journal de Pharmacie et de Chimie, tome V, n° 2, février 1844, in-8°.

Journal des Usines et des Brevets d'invention, janvier 1844, in-8°

Journal de Médecine, février 1844, in-8°.

Bulletin et Annales de l'Académie d'Archéologie de Belgique, années 1843 tome I^{re}, 2^e livr., in-8°.

Schriftedl. *Publications de l'Observatoire de Seeberg* — *Sur la détermination des perturbations absolues dans des ellipses d'excentricité et d'inclinaison quelconques*, par M. HANSEN; I^{re} partie. *Calcul des perturbations exercées par Saturne dans la marche de la comète de ENCKE*, donné comme exemple de l'application de cette méthode. Gotha, 1843, in-4°

Annalen . . Annales de Météorologie et de Magnétisme terrestre, publiées par M. J. LAMONT, année 1843, V^e partie. Munich, 1843; in-8°

Informazioni. . Renseignements statistiques recueillis par la Commission royale supérieure pour les Etats de terre ferme de S^M le roi de Sardaigne. — *Mouvement de la population*, vol. II. Turin, 1843, in-4°.

Gazette médicale de Paris, t. XII, n° 6, 1844, in-4°

L'Expérience, n° 344

Gazette des Hôpitaux, t. VI, n° 15 à 17, in-fol

L'Echo du Monde savant; 10^e année, t. IX, n° 10, in-4°.

COMPTE RENDU

DES SÉANCES

DE L'ACADEMIE DES SCIENCES.

SIÈGE DU LUNDI 19 FÉVRIER 1844

PRÉSIDENCE DE M. CHARLES DUPIN

MEMOIRES ET COMMUNICATIONS

DES MEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE L'ACADÉMIE

M. **SERRES**, sur l'invitation de M. le Président, donne des nouvelles très-satisfaisantes de la santé de M. **GAY LUSSAC**.

L'Académie apprend, avec bonheur, que l'accident arrivé à l'illustré académicien n'aura aucune suite fâcheuse.

M. **PAYEN**, en présentant un volume qui contient l'ensemble de recherches dont il a précédemment entretenu l'Académie, s'exprime dans les termes suivants :

J'ai l'honneur d'offrir à l'Académie une collection de *Mémoires* sur les développements des végétaux.

Les conclusions de chacun de ces *Mémoires* tendaient à dévoiler certaines lois naturelles qui président à l'organisation des plantes. Afin de les énoncer plus nettement et d'une manière définitive, j'ai soumis à de nouvelles vérifications la plupart des résultats que j'avais obtenus depuis l'année 1823 jusqu'en 1842. Après avoir achevé ce dernier travail, j'ai cru devoir les résumer en peu de mots et les présenter à l'Académie.

Sans doute quelques détails analytiques seront ultérieurement com-

plètes ou modifiées, mais ces rectifications, plus ou moins importantes pour les progrès de la science, n'altéreront, je l'espère du moins, ni les principales conclusions de ces Mémoires, ni les lois générales suivantes que j'en ai déduites

Lois naturelles du développement des végétaux

1° *Spongioles* — Les spongioles des radicelles de toutes les plantes phanérogames se distinguent des autres parties des tissus en contiguïté par l'abondance des substances azotées, molles, contractiles, absorbantes, qui remplissent leurs cellules

Les proportions considérables de ces substances sont en rapport avec l'énergie vitale l'activité de développement des extrémités radicellaires et les importantes fonctions qu'elles accomplissent pour la nutrition végétale. Peut-être démontrera-t-on plus tard que ces corps organiques azotés ont aussi une influence directe sur les absorptions spéciales exercées dans un même sol par certaines familles ou certaines espèces de végétaux

2° *Jeunes organes des végétaux* — Tous les très-jeunes organes foliaires florifères ou fructifères, plus directement alimentés par la sève ascendante lorsque les stomates et les parties vertes ne sont pas encore développés, contiennent en abondance des substances organiques à composition quaternaire dont les proportions augmentent en raison directe des facilités de développement, et diminuent en raison de l'âge des organismes végétaux

3° *Distribution des corps azotés dans les organismes des plantes* — Les corps azotés agents principaux de la vie active des plantes se retrouvent dans toutes les cavités celluleuses ou tubulaires, libres ou adhérents aux parois. Le développement de ces corps précède la formation des enveloppes celluluses

4° *Sécrétion et composition élémentaire de la substance amylicée* — La substance amylicée apparaît dans les tissus où s'accumulent les matériaux propres aux développements ultérieurs de l'édifice végétal, on ne la jamais observée dans les tissus rudimentaires (spongioles, rudiments des bourgeons, pollen naissant, ovules non fécondés), ni dans les vaisseaux, les méats, l'épiderme

Sa densité = 1520, son poids équivalent = 1930, anhydre, sa formule = $C^{24}H^{18}O^6$ à l'état d'amylate d'eau ou d'amidon parfaitement desséché = $H^2O, C^{24}H^{18}O^6$, elle forme des hydrates avec 2, 4 et 10 équivalents d'eau, bien agglomérée, elle est insoluble à froid

5° *Amidon formation et structure* — Les grains d'amidon offrent des configurations très-variées dans les divers végétaux, mais ressemblantes dans une même plante. Leur formation a lieu par intussusception de la substance dont le passage laisse la trace d'un entonnoir pénétrant autour et près du centre ou de l'axe de chaque sphéroïde, ellipsoïde, etc. Chaque couche interne est ainsi plus récente et moins agitée que la couche enveloppante et a plus forte raison que les couches plus rapprochées encore de la superficie. Cette formation s'effectue sans que les grains soient attachés ou adhérents aux parois des cellules.

6° *Diastrase transformations de la substance amylacée* — Au moment où l'approvisionnement de la substance amylacée doit servir à développer de nouveaux tissus, son hydratation et sa dissolution ont lieu à la faveur d'une matière active qui apparaît alors (diastase) douée d'une énergie énorme, bien que neutre ou inerte relativement aux autres corps de la nature. C'est ainsi que plusieurs fois transforme en dextrine et en glucose soluble, cet approvisionnement passe successivement d'un tissu dans un autre, tantôt pour s'accumuler de nouveau, tantôt pour s'engager dans une plus forte aggrégation sous formes membranueuses stables, constituant alors la trame des cellules.

7° *Pectine et acide pectique* — L'acide pectique et la pectine existent simultanément combinés avec la chaux, la soude et la potasse dans un grand nombre de végétaux. On peut les extraire à l'état de pureté en refroidissant à froid.

8° *Cellulose composition structure, rôle dans la végétation* — La cellulose isomérique avec l'amidon, la dextrine et l'inuline constitue la substance même des parois des cellules vésiculeuses polyédriques ou allongées en fibres, tubes, vaisseaux ou trachées. Dans les parois rapidement épaissies, on remarque de nombreux canalicules. La cellulose injectée de matière azotée et de silice forme l'épiderme ou la cuticule épidermique des tiges et des feuilles, parfois, comme dans les épines, tissus épidermiques des cactées, les couches superposées de cellulose alternent avec les pectates et pectinates calcaires et alcalins. Ces composés souvent remplissent les méats entre les cellules ou les fibres, la cellulose se rencontre injectée d'inuline chez les lichens, fucus, etc. Impregnée d'incrassations organiques, elle forme les bois et les concrétions dures des noyaux, des poires, des écorces, etc.

9° *Caractères distinctifs entre les végétaux et les animaux* — Peu ou pure ou abondamment injectée, la cellulose caractérise les êtres végétaux en constituant la trame qui relie toute leur structure. On ne la trouve en-

contre parmi les membranes animales, qui toutes renferment des proportions d'eau plus considérables même que la cuticule épidermique des végétaux.

10° *Fibres et concrétions ligneuses* — Les fibres ligneuses sont caractérisées par des matières organiques incrustantes injectées dans la trame de cellulose, au nombre de quatre, et dont les proportions variables fidèlement mesurées, rendent les bois durs, pesants, fragiles, susceptibles de poli, plus riches en carbone, dont ils renferment depuis 47 jusqu'à 53 centièmes, plus abondants en hydrogène dont ils contiennent tous un excès depuis 0,3 jusqu'à 0,7 pour 100.

11° *Causes des altérations spontanées des différents bois* — Sous les influences réunies de l'humidité et de la température de l'air, certains de ces bois, les matières azotées contenues dans les fibres ligneuses s'altèrent rapidement, leur putréfaction occasionne la pourriture du bois.

Les végétaux d'Acacia réunissent plusieurs conditions de structure et de composition qui expliquent leur résistance remarquable en des lieux où, dans un temps moins long, les bois sont désagréés par la pourriture. Ce sont : 1° l'épaississement de leurs fibres par la cellulose fortement agglomérée à des proportions deux à trois fois moindres des matières incrustantes interposées qui dans les bois très durs accélèrent la pourriture en divisant trop la cellulose. L'emploi dans les boisages des minces gougnables des rivières, encoignures des caisses d'orange, échafais des vignes, et l'usage des roues de voitures, le bois d'Acacia peut avoir une durée double de celle du cœur des Chênes, si l'on ajoute que ce bois, en raison même de la proportion de la ténacité de sa cellulose et du faible volume de son aubier, s'emploie avantageusement pour confectionner les alluchons et dentures des machines, qu'en fin sa croissance est rapide. On fera bien comprendre l'intérêt que doit offrir la culture de l'Acacia.

12° *Composition immédiate des organismes reproducteurs des végétaux* — Les organismes plus particulièrement destinés à la reproduction des plantes, les fruits, graines, spores et sporules, contiennent réunis, en proportions souvent plus fortes que dans les autres tissus, les produits indispensables aux développements ultérieurs. Ce sont, 1° outre la cellulose, une ou plusieurs de ses congénères désagrégeables, ou solubles (amidon, dextrine, sucre, glucose) 2° des substances neutres azotées, sous formes concrètes et solubles, 3° des matières grasses, 4° des sels de chaux, potasse ou soude, 5° de la silice 6 de l'eau.

13° *Sécrétions minérales dans les plantes* — Les substances miné-

rales, loin d'être distribuées au hasard dans les plantes, y sont triées, puis réparties dans des organismes spéciaux disposés pour les recevoir.

Tels sont la *silice*, plus particulièrement portée vers la périphérie injectée dans les membranes épidermiques, et surtout dans l'épaisseur de la cuticule des feuilles des tiges et des poils exposés à l'air atmosphérique l'*oxalate de chaux*, dont la base puisée dans le sol s'unit à un acide végétal. Ce sel, universellement répandu dans les plantes, y affecte les diverses formes polyédriques des raphides en longues aiguilles prismatiques et des cubes rhomboïdes, prismes courts irréguliers, conformations déterminées par les corps organiques qui enveloppent et réunissent les particules cristallines dans des cellules appropriées. Les agglomérations de ces cristaux sont très-nombruses et uniformes dans la plupart des feuilles autour des vaisseaux des nervures.

Le carbonate de chaux forme, dans les feuilles des plantes de la grande famille des Utricées, ces jolies concrétions mamelonnées contenues dans un léger tissu qui se rattache autour d'un pédicelle élégamment suspendu à l'épiderme au milieu d'une cellule agrandie d'avance le même sel calcareux vient incruster à l'aide d'un tissu spécial qui le fixe les parois extérieures des cellules allongées et des tubes de plusieurs espèces de Characées tandis que d'autres plantes de la même famille sont dépourvues du tissu sécrété et de la concrétion minérale quoique vivant dans les mêmes eaux.

Les oxalates de soude et de potasse en solution alcaline incolore sont contenus dans les glandes vésiculeuses qui entourent et décorent toutes les parties aériennes de la Glaciale (*Mesembrianthemum crystallinum*), tandis qu'à l'intérieur des mêmes feuilles et tiges de cette plante se trouvent des matières vertes dans un suc acide.

Ainsi donc, dans les végétaux, les substances minérales comme les matières grasses, comme les huiles essentielles et divers principes immédiats sont sécrétées sous l'influence des corps à composition quaternaire et rangées dans des organismes spéciaux.

14° *Formation, développement, oblitération des stomates, feuilles decurrentes, panachures des feuilles, feuilles automnales* — Étudions sur les parties d'abord enveloppées, où l'air commence à prendre accès et détermine leur formation, les stomates se développent; comme tous les appareils des végétaux, sous l'influence de corps à composition quaternaire. Une pellicule, injectée de matière azotée et continue avec la cuticule épidermique, pénètre dans l'ouverture d'un vase de chaque stomate, dont elle tapisse les parois jusque dans la cavité pneumatique.

» Lorsque, sous certaines influences, les fonctions des feuilles se ralentissent, leurs stomates, s'oblitérant par degrés, interceptent le libre passage des gaz et des vapeurs il en résulte que plusieurs feuilles consistantes font entendre de petites explosions lorsqu'on les expose à la flamme. Dans beaucoup de cas, cette diminution de perméabilité, retardant l'exhalation aqueuse, fut infiltrer dans les tissus et les couches épidermiques des liquides colorés qui produisent des panachures, enfin, une crise analogue opère les modifications qui caractérisent l'état de souffrance des feuilles automnales.

15° *Composition élémentaire générale des plantes à l'état normal* — La somme des éléments de toute plante prise dans son ensemble peut être représentée, outre l'azote, par du carbone, de l'eau, plus un excès d'hydrogène. Les substances azotées, neutres et grasses, concourent surtout à donner cet excès d'hydrogène dans les cryptogames et les plantes herbacées. Ces substances, moins abondantes, et les concrétions ligneuses donnent le même résultat dans les végétaux ligneux.

16° *Composition immédiate des tourbes* — Les tourbes, engendrées par la décomposition incomplète de divers végétaux, contiennent sept produits qui correspondent à l'altération de chacun des principes immédiats du ligneux et des parties herbacées.

17° *Corps doux de vie dans les plantes* — Enfin, une loi sans exception me semble apparaître dans les faits nombreux que j'ai observés, et conduire à envisager sous un nouveau jour la vie végétale. Si je ne m'abuse, tout ce que dans les tissus végétaux la vue directe ou amplifiée nous permet de discerner sous les formes de cellules et de vaisseaux ne représente autre chose que les enveloppes protectrices, les réservoirs et les conduits, à l'aide desquels les corps animés qui les sécrètent et les façonnent, se logent, puisent et chassent leurs aliments, déposent et isolent les matières excrétées.

Adoptant cette opinion des mes premières études sur les organismes et l'alimentation des végétaux, j'y fus ramené sans cesse en cherchant des faits nouveaux capables de dévoiler la vérité.

» Au moment d'exprimer cette pensée, je me suis bien souvent tenu dans des termes de doute qui la laissent entrevoir, peut-être aurais-je quelque temps encore gardé la même réserve s'il ne m'eût semblé que M. de Mirbel, par une autre voie surprenant au milieu d'un fluide le travail de l'organisation qui précède la formation des cellules, arrivait à des conclusions concordantes avec celles de mes propres travaux.

A cet imposant appui vinrent se joindre les résultats confirmatifs des

investigations que nous avons entreprises de conceit, et dont nous soumettrons prochainement les details a l'Academie

Je n'hesite donc plus aujourd'hui, mais, dans l'esperance qu'on voudra bien suspendre une critique prematuree, je m'empresse d'ajouter que ces deductions nouvelles de la chimie appliquee a la physiologie vegetale s'accordent aussi avec les faits introduits dans cette science par nos illustres devanciers et contemporains. Lorsque je developperai ces applications, j'espere pouvoir établir, en outre, comment elles expliquent plusieurs observations qu'il etait bien difficile de comprendre avec le seul secours des faits organographiques précédemment admis

Afin de completer aujourd'hui l'enoncé du fait general, je rappellerai que les corps doués des fonctions accomplies dans les tissus des plantes sont formes des éléments qui constituent, en proportions peu variables, les organismes animaux, qu'ainsi l'on est conduit a reconnaitre une immense unite de composition élémentaire dans tous les corps vivants de la nature

RAPPORTS

MÉCANIQUE APPLIQUÉE — *Rapport sur un Memoire de M. CLAPEYRON, relatif au reglement des tiroirs dans les machines locomotives, et a l'emploi de la detente*

(Commissaires, MM. Poncelet, Piobert, l'auteur rapporteur)

L'Academie nous a chargés, MM. Poncelet, Piobert et moi, de lui faire un Rapport sur un travail présenté, en mai 1842, par M. Clapeyron, et intitulé *Memoire sur le reglement des tiroirs dans les machines locomotives et sur l'emploi de la detente*

On pourrait croire, au premier abord, qu'il s'agit uniquement ici de cette disposition connue sous le nom d'*avance du tiroir*, et dont les avantages ont été analysés dans diverses publications, mais, comme on va le voir, le probleme pratique que s'est propose M. Clapeyron, et qu'il a resolu, est plus general et plus important. Pour faire concevoir en quoi consiste ce probleme, quelques details préliminaires sont indispensables

Dans toute machine à vapeur, une des faces du piston, dans une double oscillation qui correspond a une révolution complete du volant, traverse quatre périodes distinctes dont les durées relatives ont une influence capitale sur le travail transmis. Lors de la premiere, la face du piston est en commu-

nication avec la vapeur dans la chaudière, et marche en général dans le sens de la pression qu'exerce cette vapeur. Plus tard la communication avec la chaudière est interrompue, la vapeur renfermée entre le piston et l'appareil distributeur quitte par détente c'est la deuxième période. La troisième commence à l'instant où la communication s'ouvre, soit avec le condenseur, soit avec l'atmosphère, et finit au moment où cette communication est interrompue. Le mouvement du piston est alors ordinairement rétrograde. Enfin, la quatrième période s'étend depuis le moment où la communication se ferme avec le condenseur, jusqu'à celui où la communication s'ouvre avec la chaudière, pendant cet intervalle de temps, la vapeur, d'abord à la pression du condenseur, reste emprisonnée entre le piston et l'appareil de distribution et peut même éprouver une certaine compression. Pour simplifier, nous appellerons ces quatre périodes *période d'admission*, *période de détente*, *période de chasse* ou *d'évacuation*, enfin *période de compression*.

* Si l'on représente par une ligne droite, considérée comme axe des abscisses l'espace décrit par le piston, si l'on élève des ordonnées représentant chacune la pression éprouvée en son lieu par la face du piston que l'on considère, tant lors du mouvement direct que lors du mouvement rétrograde les extrémités de ces ordonnées décriront une courbe rentrante ou un polygone fermé et le travail transmis par la vapeur sera représenté par l'aire de ce polygone.

Cela pose, le meilleur règlement du tiroir ou la meilleure distribution sera réalisée, si l'on peut rendre l'axe dont il s'agit un maximum, pour une même quantité de vapeur fournie par la chaudière. C'est le but que M. Chevreton s'est proposé d'atteindre par de nombreuses recherches théoriques et pratiques. Attache pendant longtemps comme ingénieur en chef aux chemins de fer de Saint-Germain et de Versailles (rive droite) son attention s'est particulièrement fixée sur les machines locomotives. Mais avant d'exposer le résultat de ses travaux, il importe de rappeler à quel point en fait la question quand il l'aborda à son tour.

Il y a huit ou dix ans, la plupart des constructeurs de machines locomotives étaient dans l'habitude de donner à la partie de la palette du tiroir qui forme une sorte de soupape glissante, et que l'on désigne dans les ateliers par l'expression singulière de *bride du tiroir*, une largeur ou épaisseur précisément égale à la lumière de communication avec le cylindre. Par cette disposition primitive, lorsque le piston est à l'extrémité de sa course, le tiroir est au milieu de la sienne, et sa bride recouvre exactement la lumière. La période d'admission dure alors tout le temps du trajet direct du piston, la

période de détente est nulle; la période d'échappement dure autant que le mouvement rétrograde du piston; enfin la période de compression est nulle.

» Le polygone fermé, dont l'aire représente le travail transmis, quand on néglige la contre-pression reconnue plus tard, se réduit alors à un rectangle, dont les côtés horizontaux sont la course même du piston, et dont les côtés verticaux représentent la différence entre la tension initiale de la vapeur et la pression dans le condenseur ou l'atmosphère. C'est, au reste, la traduction géométrique de la formule admise dans la théorie ordinaire de la machine à vapeur sans détente.

» Mais les praticiens avaient reconnu depuis longtemps que la machine locomotive gagne en puissance, et économise en combustible, lorsque, sans rien changer au tiroir, on fait tourner à demeure l'excentrique qui dirige son mouvement sur l'essieu coudé, de telle sorte que l'admission de la vapeur et son évacuation, au lieu de commencer précisément au moment où le piston atteint le point mort, précèdent cet instant d'une certaine quantité. Cette disposition s'était introduite dans les ateliers sous le nom d'*avance du tiroir*. Elle était établie sur les machines locomotives importées d'Angleterre, en 1837, pour le service du chemin de fer de Saint-Germain.

» L'explication des avantages qui résultent de cette disposition n'était pas un mystère : on savait que l'avance du tiroir a pour effet de diminuer l'influence de la contre-pression, qui, dans le règlement sans avance, a lieu pendant tout le temps qui s'écoule entre l'ouverture de la lumière d'échappement, et l'instant où l'équilibre de pression s'établit entre la vapeur qui a accompli son travail et le condenseur ou l'atmosphère. En outre, on s'était aperçu que l'*avance* introduisait la vapeur sur une des faces du piston, avant que cette face eût atteint le fond du cylindre, et l'on avait paré à cet inconvénient en accroissant la bride du tiroir de quelques millimètres du côté de la chaudière, ou en lui donnant un faible recouvrement extérieur. L'avance du tiroir est mentionnée dans la première édition de l'ouvrage de M. de Pamhour sur les locomotives.

» Plus tard cette disposition a été l'objet de recherches approfondies dans l'ouvrage intitulé : *Guide du Mécanicien*, publié, en 1840, par MM. Flachet et Pétiet. Ces ingénieurs conseillent de régler les machines locomotives de telle sorte que la vapeur, s'introduisant un moment avant que le piston ait changé de mouvement, commence à s'échapper lorsque la manivelle a encore 25 degrés à parcourir pour atteindre le point mort; la vapeur n'est alors introduite que pendant les 0,87 de la course du piston. MM. Flachet et Pétiet ont fait ressortir les avantages qui résultent

de cette économie de vapeur, ensuite, à l'aide d'hypothèses plausibles et d'une méthode de calcul approximative, ils ont cherché à découvrir la loi de la pression variable que conserve la vapeur durant l'échappement, et à représenter par des nombres le bénéfice que l'on trouve à faire tourner au profit du travail utile cette même pression qui dans le règlement sans détente en consomme inutilement une portion très-notable. Mais, à limitation des constructeurs, MM. Flachet et Pétiet s'étaient trop tôt arrêtés dans la voie du progrès signalé par de premiers succès pratiques et qu'ils avaient eux-mêmes contribué à éclaircir et à répandre.

Jusque-là on s'était uniquement préoccupé de l'idée d'ouvrir la communication avec l'atmosphère, ou le condenseur, avant que le piston ait atteint le terme de sa course. Le recouvrement du tiroir, du côté extérieur, avait pour but de n'introduire la vapeur que dans le voisinage du point mort. On avait remarqué, il est vrai, que ce recouvrement donnait naissance à une véritable détente mais tout en reconnaissant cet avantage on le regardait comme une conséquence heureuse de la disposition adoptée et l'on ne faisait aucun effort pour l'accroître.

C'est en cela que les dispositions proposées et appliquées par M. Flachet se distinguent nettement du mode de règlement connu sous le nom d'avance du tiroir. La détente acceptée jusqu'à lui comme une conséquence, il se l'est proposée comme un but et il est effectivement parvenu à l'accroître notablement sans employer aucun nouvel appareil, et sans rien changer aux conditions essentielles de l'admission et de l'échappement de la vapeur.

Revenons maintenant aux quatre périodes que nous avons distinguées dans le mouvement direct et retrogade de l'une des faces du piston. Il est évident, à priori, que la période d'admission doit avoir son origine au moment où le piston commence sa course, et se terminer lorsque la quantité de vapeur introduite est celle que comporte la puissance évaporatrice de la chaudière. La période de détente, au premier abord, semble devoir se terminer à l'instant où la vapeur dilatée n'a plus qu'une tension égale à la pression de l'atmosphère ou à celle du condenseur, mais ici interviennent deux considérations pratiques qu'on ne saurait abstraire. D'abord on ne peut accroître outre mesure les dimensions du cylindre, et ensuite, pour les locomotives il faut conserver à la vapeur s'échappant dans l'atmosphère, une pression suffisante pour accélérer son évacuation, ou, comme le croient les praticiens pour activer convenablement le tirage, afin de tenir compte de ces restrictions, on peut dire que la période de détente doit avoir lieu pendant

la plus grande fraction possible de la course du piston. La période d'échappement doit se terminer à l'instant même où la face du piston que l'on considère a atteint le terme de son mouvement direct, néanmoins on peut avec avantage sacrifier quelque chose de la rigueur de ce principe, dans le but de diminuer la capacité du cylindre, et assigner pour condition que la troisième période se termine lorsque le piston, dans son mouvement rétrograde, ne s'est encore éloigné que de fort peu du point mort. Enfin la période dite de compression doit se terminer à l'instant où le piston achève sa double course.

Telles sont les conditions que doit remplir une bonne distribution. On peut y satisfaire à l'aide de plusieurs appareils connus depuis longtemps et qui ont l'avantage de procurer une détente variable, mais ces appareils ajoutent une nouvelle complication dans la locomotive, ou une extrême simplicité est plus désirable encore que pour toute autre machine à vapeur. Or l'appareil ordinaire de distribution nommé *tiroir* renferme plusieurs éléments indéterminés : ne serait-il pas possible d'en disposer de manière à remplir les conditions que nous venons d'énoncer sans ajouter aucun nouveau mécanisme ? voilà le problème que s'est posé M. Clapeyron.

Mais pour satisfaire à quatre conditions, il faut pouvoir disposer de quatre variables, l'appareil de distribution les fournit-il ? c'est ce qu'il importe d'examiner. Supposons le tiroir au milieu de sa course : la lumière qui communique avec le cylindre est alors recouverte par la bride du tiroir qui dans le cas le plus général, dépasse la lumière des deux côtés du côté de la vapeur : cet excédant porte le nom de *recouvrement extérieur*, du côté du condenseur ou de l'atmosphère on peut l'appeler *recouvrement intérieur*. Ces deux recouvrements sont à la disposition du constructeur. Ce n'est pas tout : l'excentrique qui commande le tiroir peut être diversement placé par rapport au bras de la manivelle, voilà une troisième variable dont on peut encore disposer, mais là cesse toute indétermination. Ainsi il n'existe que trois variables pour satisfaire à quatre conditions, ces trois variables sont le recouvrement extérieur, le recouvrement intérieur, et l'angle qui fixe l'axe de l'excentrique.

Des quatre conditions à remplir il fallait donc en sacrifier une, et conséquemment rechercher avec soin les trois conditions qui influent le plus sur la marche de la machine. La discussion nécessaire pour atteindre ce but fut partie du Mémoire de M. Clapeyron. Nous devons nous borner ici à indiquer les résultats pratiques auxquels cet ingénieur a été définitivement conduit.

Dans la machine *le Creuzot*, sur laquelle eurent lieu les premières expériences, et dont le nouveau mécanisme fut commencé en mai 1840, le recouvrement extérieur fut porté à $0^m,03$ ou au quart de la course du tiroir le recouvrement intérieur à $0^m,018$, et l'angle compris entre l'axe de la manivelle et celui de l'excentrique à 55 degrés. Avec ces dispositions, et comme l'intérieur le fait voir à l'aide d'une construction géométrique fort simple, la période d'admission cesse quand le piston a parcouru les $0,7$ de sa course. La période de détente finit aux $0,96$, la manivelle faisant alors un angle de 19 degrés avec la position correspondante au point mort. La période d'évacuation dure jusqu'à ce que le piston ait atteint les $0,79$ de sa course rétrograde. Elle commence la période de compression qui se termine au moment où la communication avec la chaudière s'ouvre de nouveau, et lors que le piston a presque atteint le point mort, la manivelle n'en étant séparée que d'un angle de 6 degrés.

M. Clapeyron admet dans son Mémoire que, dans la quatrième période, la vapeur, d'abord à la pression du condenseur, peut se comprimer sans se liquéfier, à cause de la haute température que doivent conserver les parois du cylindre dans les locomotives. Il était à désirer que ce fait remarquable fût vérifié par des expériences directes. C'est ce que vient de faire M. Clapeyron, à l'aide de l'indicateur de Wirtz, la courbe tracée par l'instrument justifie toutes ses prévisions.

Cette compression, dont l'existence est maintenant constatée, semble au premier abord devoir réduire le travail utile de la vapeur employée. Il paraît même que cette considération a empêché les constructeurs d'augmenter convenablement les recouvrements du tiroir. Mais, comme le fait observer M. Clapeyron, il n'y aura inconvénient que si la vapeur comprimée acquiert une tension supérieure à celle de la chaudière. Si cette limite n'est pas dépassée, et seulement atteinte, il arrivera qu'au commencement de la période d'admission l'espace que le piston laisse libre à l'extrémité du cylindre, et les conduits qui y aboutissent renfermeront un fluide à la pression de la chaudière, la consommation sera donc réduite du poids de la vapeur qui, dans l'hypothèse ordinaire, eût dû remplir ces espaces, lesquels n'ont pour toujours donner une capacité suffisante pour qu'il en soit ainsi.

Si l'on compare la disposition adoptée par M. Clapeyron à ce qui a toujours été fait par ses devanciers, on remarquera qu'il ne change rien aux époques où doivent commencer les périodes d'admission et d'échappement, mais qu'il profite d'une indétermination qui reste encore, pour accroître la détente dans des limites pratiques. Le succès obtenu dans la machine *le Creuzot* le prouve.

à pousser plus loin encore la détente dans d'autres locomotives, ou la vapeur est maintenant interceptée aux 0,65 de la course du piston

Dans le matériel des chemins de fer de Saint-Germain et de Versailles (rive droite), le nombre des locomotives modifiées d'après cette théorie monte actuellement à treize. Le diamètre des cylindres a été porté de 13 pouces à 15 pour sept de ces machines, et de 11 pouces à 13 pour les six autres. Dans toutes, l'effet utile s'est accru de 40 à 50 p. 100. La consommation a été réduite, mais cette diminution doit être attribuée en partie à d'autres causes que l'emploi de la détente. Le mode de distribution ou de *détente fixe*, inventé par M. Clapeyron, s'est introduit, depuis plus de deux ans, dans la plupart des ateliers où l'on construit et répare les locomotives.

Avant ce perfectionnement, les fortes locomotives du chemin de fer de Versailles (rive droite) ne pouvaient franchir la rampe de $\frac{1}{100}$, qui existe sur 18 kilomètres du parcours total, qu'avec un convoi de huit wagons. Aujourd'hui les mêmes machines, modifiées d'après la théorie actuelle, sans consommer une plus grande quantité de vapeur, conservent la vitesse normale de 4 myriamètres à l'heure, en tête d'un convoi de douze wagons ou d'un poids total de 75 tonnes, et cela sur une rampe ascendante, que son inclinaison, et surtout sa longueur, rendaient très difficile.

Certes il y a lieu de se tonner qu'un résultat aussi important que celui d'augmenter de 40 à 50 p. 100 le travail utile d'une même quantité de vapeur ait été obtenu par quelques millimètres de plus données aux recouvrements du tiroir, appareil qui occupe une si petite place dans une locomotive. On pourrait être surpris, surtout, que le bénéfice énorme qui résulte d'une modification aussi simple, et qui peut s'appliquer à toutes les machines à vapeur, eût été découvert si tard. Mais des recherches intenses, faites récemment par M. Clapeyron, et qu'il nous a communiquées, établissent que l'importance du réglage du tiroir avait été pressentie avant 1805, par Watt lui-même, qu'une pratique s'en était suivie dans ses ateliers, pratique conservée mystérieusement, et en quelque sorte comme une propriété exclusive, par les constructeurs anglais, élèves de cet illustre maître, que vers 1836, des ingénieurs de la marine française, en recevant et essayant les machines importées d'Angleterre pour les bateaux à vapeur de l'Etat, ont reconnu les avantages du mode de distribution adopté dans ces machines, que l'un d'eux, M. Reitch, en a fait une étude approfondie et a rédigé sur ce sujet un travail important, que l'administration doit publier prochainement. D'autres renseignements font voir que, depuis 1840, les ingénieurs des chemins de fer anglais ont été conduits à un mode de réglage

ment des tiroirs, dans les locomotives, qui présente une grande analogie avec les dispositions adoptées par M Clapeyron, mais qui en diffère par plusieurs points essentiels

Nous avions eu d'abord l'intention de développer ces recherches historiques, mais les bornes d'un Rapport, déjà dépassées dans celui-ci, nous forcent à renvoyer ces développements à une autre séance, ils ne se rattachent d'ailleurs qu'indirectement au travail dont nous avons à rendre compte

En résumé, vos Commissaires sont d'avis que le Mémoire de M Clapeyron, tant par les discussions théoriques qu'il contient que par les résultats auxquels il a conduit, est très digne de l'approbation de l'Académie et mérite d'être inséré dans le *Recueil des Savants étrangers*

Les conclusions de ce Rapport sont adoptées

HIMIR — *Rapport sur un Mémoire de M JACQUELAIN, relatif aux produits de l'action réciproque de l'acide sulfurique anhydre et de l'ammoniaque*

(Commissaires, MM Pelouze, Regnault, Dumas rapporteur)

L'Académie nous a chargés, MM Pelouze, Regnault et moi, d'examiner un Mémoire de M Jacquelin, concernant les produits de l'action réciproque de l'acide sulfurique anhydre et de l'ammoniaque nous venons lui en rendre compte

Les recherches de M Jacquelin se rapportent à une classe de phénomènes signalés par Davy à l'attention des chimistes, et soumis plus récemment par M H Rose à un examen expérimental, qui a fourni des résultats d'un grand intérêt

Davy a fait voir que les oxacides se combinent purement et simplement aux bases oxygénées, de façon que KO et SO³ donnent KO, SO³ Il a montré que les hydrobases se unissent de même tout simplement aux hydracides, de manière que AzH³ et HCl donnent le sel ammoniac AzH⁴, HCl Sans doute on peut lire ces formules de diverses manières, mais elles représentent, dans toutes les hypothèses, tous les éléments de l'acide et tous ceux de la base, qui de fait existent en entier dans les sels formés par ces deux sortes de réactions

Mais, si l'on met en présence un hydracide avec une base oxygénée, on obtient des résultats tout différents; il se forme de l'eau et un composé métallique binaire qui se sépare KO et HCl donnent KCl et H₂O

Enfin, vient-on à faire réagir des acides oxygénés sur des bases hydro-

génées, et l'on détermine presque toujours une élimination d'eau et la formation d'un composé qui n'est plus un sel. En général, après la découverte de l'oxamide on a été disposé à considérer comme autant de composés analogues les produits résultant de ces réactions et à les formuler de la même manière.

En ce qui concerne l'acide sulfurique et l'ammoniaque les recherches de M. Regnault ont fait admettre l'existence de la sulfamide A^1H
SO analogue à l'oxamide A^2H
CO.

À la vérité M. H. Rose en faisant réagir l'ammoniaque sur l'acide sulfurique, n'avait pas donné naissance à la sulfamide mais bien à des produits plus compliqués et d'une théorie difficile.

M. Jacquelin vient de reprendre cette question et il lui a fait faire un pas important par la découverte d'un corps bien cristallisé provenant de l'action directe de l'acide sulfurique anhydre sur l'ammoniaque et par celle d'une combinaison barytique à laquelle ce corps donne naissance.

D'après ses analyses le corps cristallisé renferme $4\text{SO}^3 + 3\text{A}^2\text{H}^3$ et la combinaison barytique qui en dérive $3\text{SO}^3 + 2\text{BaO} + \text{A}^2\text{H}^3$.

Certes, voilà des formules bien imprévues et qui demandent une étude approfondie pour être interprétées. Le premier Mémoire de M. Jacquelin pour objet l'analyse exacte de ces corps. Nous devons l'encourager et poursuivre cet examen sous le point de vue de l'interprétation des formules qu'il a trouvées, ce qui exige une comparaison attentive de leurs réactions.

En attendant que l'auteur fasse connaître le résultat des recherches qu'il a entreprises à cet égard la Commission propose à l'Académie d'encourager un chimiste zélé et consciencieux en accordant une place dans le *Recueil des Savants étrangers* à la description du nouveau corps dont il a enrichi la science.

Les conclusions de ce Rapport sont adoptées.

(CHIMIE VÉGÉTALE — Rapport sur un Mémoire de M. EUGÈNE CHEVANDIER, relatif à la composition des différents bois et au rendement annuel d'un hectare de forêts.

(Commissaires, MM. de Mirbel, Boussingault, Payen, Dumas rapporteurs.

Nous avons été chargés, MM. de Mirbel, Boussingault, Payen et moi de prendre connaissance d'un Mémoire présenté à l'Académie par M. Che-

vandier. Nous venons lui rendre compte de ce travail, et lui faire connaître le jugement que nous en avons porté

M Chevandier, à qui ses fonctions comme sous-directeur de la manufacture des glaces de Cirey attribuent la gestion et la surveillance d'environ 1 000 hectares de forêts, s'est livré à des études approfondies de l'art du forestier, et s'est trouvé conduit à essayer la solution de quelques questions d'un intérêt général qui devaient d'ailleurs lui fournir des renseignements importants pour la direction des exploitations confiées à ses soins

Parmi ces questions, la première qui s'est présentée à son examen, celle dont il est venu entretenir l'Académie, a pour but

1° De faire connaître la valeur réelle d'un stère de bois de diverses essences ramené à ses éléments

2° D'apprécier la production annuelle d'un hectare de forêts en carbone, hydrogène, azote, etc, sous la forme de produits exportables

Convaincu de l'importance de ces déterminations, tant au point de vue industriel et forestier qu'au point de vue de la physique du globe, l'auteur n'a rien négligé pour en assurer l'exactitude

La première partie du travail exécutée dans la forêt a consisté à mesurer et à peser 600 stères de bois de diverses essences pris dans des conditions diverses aussi de sol, d'exposition et d'âge

On a donc ainsi formé un premier tableau renfermant le poids de chacun des stères sur lesquels on se proposait d'opérer

Mais comme les bois, au moment de la coupe, pourraient contenir des quantités d'eau variables, on prélevait sur chacun des stères trois bûches qui étaient elles-mêmes pesées avec soin et numérotées

Toutes les bûches ayant été réunies dans une étuve, on les a soumises pendant six semaines à l'action d'une température de 30 à 40 degrés, en les changeant de place de temps à autre. Par ce moyen, elles ont été ramenées à un état hygrométrique tellement uniforme, que divers échantillons d'une même essence sortant de l'étuve et séchés, dans le vide, à 140 degrés, éprouvaient une perte de poids qui ne variait pas au delà de $\frac{1}{4}$ pour 100 ou environ

Les bûches étant pesées à cet état, il est devenu facile de corriger le poids primitif du stère auquel chacune d'elles appartenait, et de le ramener à l'état uniforme et comparable auquel le séjour à l'étuve avait porté tous les échantillons

Restait à savoir alors combien chacun de ces stères de bois renfermait de carbone, d'hydrogène, d'azote et de cendres

• Par des raisons particulières à la méthode analytique adoptée par l'auteur, il a préféré faire ses analyses sur des bois desséchés à 140 degrés dans le vide. Il a d'ailleurs déterminé le carbone, l'hydrogène et l'azote par les procédés ordinaires. Les cendres ont été dosées par une simple combustion à l'air.

En général, les bois de même essence lui ont fourni des résultats identiques. Il a donc pu conclure de ce premier ensemble de faits, la valeur absolue du stère des divers bois pris dans les conditions dans lesquelles il a opéré.

• Pour arriver à la détermination du rendement moyen d'un hectare de forêts, il fallait quelque chose de plus, car indépendamment du bois en stères, la forêt fournit, au moment des coupes, des fagots dont il fallait nécessairement tenir compte. On en a donc recueilli des échantillons qui ont été soumis aux mêmes épreuves que les bois.

A l'aide de cet ensemble de renseignements l'auteur est parvenu aux résultats suivants :

• Le poids moyen du bois séché à 140 degrés produit par hectare dans les forêts qui ont été l'objet de son expérience, est de 3 650 kilogrammes par annee.

Le carbone contenu dans ce bois s'élève à 1 800 kilogrammes environ où l'on peut tirer quelques rapprochements importants.

En effet un prisme d'air d'un hectare de base en admettant la teneur moyenne de $\frac{1}{10000}$ d'acide carbonique en poids contient environ 16 900 kilogrammes de carbone de telle sorte que si une forêt était forcée de vivre aux dépens du prisme d'air qui la couvre, elle en épuiserait tout le carbone en neuf années.

• D'un autre côté, l'expérience ayant appris que, chaque homme adulte devant brûler à peu près 300 grammes de carbone par jour pour satisfaire aux besoins de sa respiration, il devient facile d'en conclure que 1 hectare de forêts détruit l'acide carbonique développé chaque jour par quarante hommes et qu'elle fixe les 12 kilogrammes de carbone qu'ils ont brûlé.

• La végétation de nos forêts qui, à ces points de vue semble donner d'une énergie remarquable, paraîtra bien lente au contraire si nous ajoutons que, dans l'espace de cent années, elles ne pourraient fixer que la dose de carbone précisément suffisante pour produire une couche de brouille de 16 millimètres d'épaisseur à la surface du sol qui les alimente, en admettant même que le carbone appartenant au bois se retrouvât tout entier dans la brouille. Les géologues qui avaient déjà essayé ces sortes de calculs et qui

en avaient tiré à peu près les mêmes nombres, trouveront dans les expériences de M Chevandier une base solide pour leurs raisonnements

» Les expériences démontrent d'ailleurs combien il serait curieux et important de tenter soit au Brésil, soit dans quelque autre portion de l'Amérique des essais analogues sur des forêts favorisées par cette vive lumière, cette chaleur constante et cette humidité qui excitent si puissamment la végétation tropicale. C'est là seulement, sans doute, que nous pourrions prendre une juste idée de la marche de la végétation dans les forêts de l'ancien monde

M Chevandier s'est assuré que tous les bois renferment, indépendamment de l'eau ou de ses éléments, une quantité notable d'hydrogène en excès, dont il estime la production à 26 kilogrammes par hectare et par année, ce qui revient à dire que chaque hectare de forêts décompose sensiblement 150 kilogrammes d'eau annuellement pour en fixer l'hydrogène. Toutes les expériences viennent donc confirmer le rôle réducteur des plantes et démontrent le pouvoir qu'elles possèdent de décomposer l'eau

L'azote que renferme le bois s'y montre constamment aussi, et ne s'élève pas à moins de 30 kilogrammes par hectare et par année. Or, comme cet azote s'y trouve à l'état de matières azotées analogues à la fibrine ou à l'albumine, on voit que chaque hectare de forêts ne produit pas moins de 100 kilogrammes de ces matières. On voit, de plus, que le bois n'en renferme guère moins de 6 à 8 pour 100 de son poids, circonstances qui expliquent assez comment tant d'insectes peuvent vivre aux dépens des matières animales contenues dans les bois, et comment aussi il suffit d'empoisonner ces matières animales, ou de les rendre indigestibles, pour assurer la conservation du bois

Les cendres contenues dans le bois exporté de 1 hectare de forêts chaque année s'élèvent à 50 kilogrammes au moins. Leur nature sera l'objet d'un travail spécial dont l'auteur s'occupe en ce moment

» L'Académie a pu juger, par les détails qui précèdent, de la manière large et précise à la fois qui a présidé aux recherches de M Chevandier. Elle y aura reconnu l'influence des idées qu'elle a tant contribué à répandre sur la saine intervention des procédés scientifiques dans la discussion des questions agricoles, car l'auteur n'a aboué, dans le cours de son travail, aucun point de vue sans le soumettre immédiatement au contrôle de la balance

» De telles études méritent tous les encouragements de l'Académie. Elles entraînent à de grands frais, elles exigent une persévérance rare, elles sont

tellement pénibles, qu'il est donné à peu d'hommes d'en supporter les fatigues

De ces études il ressort des résultats importants pour la philosophie naturelle, l'industrie et l'agriculture y trouvent des données exactes qui leur manquaient. En conséquence votre Commission pense que l'Académie voudra, en donnant au travail de l'auteur une place dans son *Recueil des Savants étrangers*, lui accorder un encouragement mérité et lui faire un devoir de persévérer dans la voie nouvelle qu'il vient de suivre.

Les conclusions de ce Rapport sont adoptées

CHIMIE — *Rapport sur un Mémoire de M. CAHOURS relatif à l'huile volatile de Gaultheria procumbens*

(Commissaires MM. Thenard, Chevreul, Dumas rapporteur)

« Nous avons été chargés par l'Académie MM. Thenard, Chevreul et moi de lui rendre compte du Mémoire de M. Cahours dont nous venons de rappeler le titre : nous venons remplir ce devoir.

Tout le monde sait combien de notions nouvelles et curieuses la science a puisées dans l'étude des huiles volatiles et en particulier des huiles volatiles pesantes. Les travaux entrepris depuis quelques années sur l'huile d'amandes amères, sur l'huile de cannelle, sur l'huile de reine des pieux, montrent assez que ce groupe de corps possède des propriétés tranchées et d'une haute importance pour les théories générales de la science.

« On ne sera donc pas étonné de voir que l'étude d'une huile appartenant à ce groupe ait conduit M. Cahours à des résultats d'une haute valeur par leur nombre, leur netteté, leur importance.

« Il s'agit de l'huile obtenue des fleurs du *Gaultheria procumbens* que le commerce des États-Unis importe depuis quelque temps en Europe en assez grande quantité, et qui, à raison de son odeur douce et suave, prend sa place dans le commerce de la parfumerie.

M. Cahours a reconnu d'abord l'identité de cette huile avec un éther composé, obtenu au moyen de l'acide salicylique et de l'esprit de bois. Cet éther facile à produire artificiellement, possède exactement toutes les propriétés de l'huile naturelle. Voilà donc un éther composé préexistant dans les fleurs des plantes : voilà, en outre, une combinaison naturelle de l'esprit de bois, tandis que jusqu'ici on n'avait trouvé l'esprit de bois que dans les produits pyrogénés de la distillation du bois.

« Mais en étudiant soit l'huile naturelle, soit le salicylate artificiel de mé-

thylene M^r Cahours n'a pas tardé à constater un phénomène nouveau et inattendu. Ces corps, qui devraient être neutres, peuvent s'unir à un équivalent de potasse et constituent ainsi des sels à deux bases, l'une formée par l'éther méthylique, l'autre par la potasse elle-même.

L'acide salicylique est donc un acide analogue à l'acide phosphorique, et comme lui capable de former des sels avec 1 ou 2 équivalents de base.

« Ces propriétés devaient se retrouver dans l'éther salicylique de l'alcool M. Cahours est assuré par l'expérience qu'il en était ainsi.

En outre, comme le chlore, le brome, la vapeur nitreuse peuvent remplacer un ou plusieurs équivalents d'hydrogène dans l'acide salicylique, il était d'un haut intérêt de s'assurer que, par ces modifications, l'acide salicylique ne perdait pas le caractère que nous venons de signaler. M. Cahours s'en est convaincu par des expériences variées et décisives, qui au mérite de faire connaître des corps nouveaux, joignent celui de constater de la manière la plus claire la permanence du caractère bibasique de l'acide salicylique.

M. Cahours a reconnu bientôt que l'acide salicylique renfermant 5 équivalents d'oxygène il y avait lieu de supposer que les propriétés qu'il venait de découvrir se retrouveraient dans les acides organiques peu nombreux qui renferment comme lui 5 équivalents d'oxygène. Il se réserve de le démontrer plus amplement dans un nouveau travail.

« Le Mémoire de M. Cahours ouvre, comme on voit, aux recherches de la chimie organique un champ nouveau d'études. Il prouve tout ce qu'il y a de prématuré dans les généralités fondées sur les recherches qui n'embrassent que les acides à 3 équivalents d'oxygène. Il conduira les chimistes à porter une attention plus particulière à l'examen des acides qui possèdent une formule qui ne rentre pas dans la formule habituelle au plus grand nombre des acides organiques connus. Aussi, quoiqu'il ait soin de faire ressortir toute la simplicité que ses nouveaux résultats reçoivent de l'interprétation qui considère les acides et les sels qui en dérivent comme des corps où l'hydrogène est remplacé par un métal, nous devons nous abstenir de le suivre sur ce terrain pour rester dans le domaine des faits.

« Sous ce rapport, le Mémoire de M. Cahours offre un ensemble d'expériences dirigées avec sagacité, exécutées avec toute la précision convenable, et donnant l'histoire d'une série complète de combinaisons nouvelles dans leur forme et curieuses dans leurs propriétés.

Réclamer pour un travail de ce genre l'honneur de l'insertion dans le *Recueil des Savants étrangers*, c'était pour la Commission un devoir, elle espère que le vote de l'Académie viendra consacrer son jugement.

« Elle a donc l'honneur de vous proposer de décider que le *Mémoire* de M Cahours sur l'huile du *Gaultheria procumbens* sera inséré parmi les *Mémoires des Savants étrangers*

Les conclusions de ce Rapport sont adoptées

NOMINATIONS

L'Académie procède, par la voie du scrutin, à la nomination d'un Correspondant pour la Section d'Économie rurale en remplacement de feu M *Mathieu de Dombasle*

Au premier tour de scrutin, le nombre des votants étant de 45,

M Vilmorin obtient	44 suffrages
M Crud	1

M **VILMORIN** ayant réuni la majorité absolue des suffrages, est déclaré élu

MEMOIRES LUS

M **COULVIER-GRAVIER** lit un nouveau *Mémoire* sur le parti qu'on peut tirer, suivant lui, de l'observation des *étoiles filantes* pour prévoir quelques jours d'avance les changements de temps

Ce *Mémoire* est renvoyé à l'examen de la Commission précédemment nommée pour d'autres communications de M Coulvier-Gravier sur le même sujet.

MEMOIRES PRESENTES

PHOTOGRAPHIE — *Études de photométrie électrique*, par M **A. MASCOY**
Premier *Mémoire* (Extrait par l'auteur)

(Commissaires, MM Dumas, Pouillet, Regnault)

« La lumière électrique éprouve dans son intensité des variations tellement liées aux autres effets produits par l'électricité, que l'étude de ces variations et leur mesure doit conduire à une connaissance plus intime d'un agent qui, par des métamorphoses jusqu'alors inconnues, donne naissance à tous les phénomènes attribués à plusieurs causes

« Afin d'obtenir les rapports qui existent entre le fluide électrique et ses effets lumineux, j'ai cherché à mesurer les intensités des étincelles électriques

Dans l'impossibilité d'employer dans mes recherches les photomètres connus, tous applicables seulement à des lumières fixes, j'ai, pour évaluer les rapports des intensités de lumières, dont la durée moyenne peut être portée à un millionième de seconde, employé un procédé qui repose sur les principes suivants. Si, en présence d'une lumière fixe, on fait tourner rapidement un disque recouvert de secteurs noirs et blancs, on apercevra, et la cause en est bien connue, un disque blanc. Si l'éclairement est produit par une lumière instantanée, le cercle paraîtra fixe, et l'on distinguera nettement les secteurs.

» Si le disque est en même temps éclairé par une lumière permanente et une lumière instantanée — une étincelle électrique par exemple — on verra les secteurs, si la lumière instantanée éclaire suffisamment le disque. L'éclairement nécessaire dépendra de la sensibilité de l'organe et de l'intensité de la lumière fixe. Mais, dans tous les cas, le rapport qui devra exister entre les intensités des deux lumières, pour qu'on voie les secteurs s'effacer, sera constant pour un même individu ou une même disposition de l'organe. On admet généralement que si, sur un papier blanc, on projette une ombre très-légère, elle sera vue sur le fond — surtout en la faisant mouvoir, lorsqu'elle produira une différence d'éclairement de $\frac{1}{100}$ environ. On pourra, dans nos expériences, prendre sensiblement cette limite pour le rapport des intensités de la lumière fixe et de la lumière instantanée au moment où l'on cesse d'apercevoir les secteurs, cette limite, bien entendu, variera avec la sensibilité de l'organe. Pour faire concevoir l'analogie entre les effets produits sur notre appareil par la lumière instantanée et ceux qu'on obtient en projetant une ombre légère sur un fond blanc, nous devons entrer ici dans quelques détails. Lorsque le disque se meut rapidement, et qu'il est éclairé par une lumière fixe — il apparaît blanc, et la sensation produite est persistante. Au moment où la lumière instantanée éclaire les secteurs, les parties du cercle apparent correspondantes aux secteurs noirs agissent sur l'organe comme si la lumière instantanée n'existait pas, et les autres reçoivent au contraire un accroissement d'illumination. On est alors dans les conditions suivantes : l'œil aperçoit des secteurs ayant le même degré d'illumination que le disque quand la lumière instantanée n'existe pas, et d'autres secteurs un peu plus éclairés. Cette différence, uniquement due à la lumière instantanée, fait apercevoir la division du disque en secteurs, et, d'après ce que nous avons dit plus haut, cette différence est une fraction de la lumière fixe, le rapport entre les deux éclairements dépend de l'organe de l'observateur. Il est utile de remarquer ici que, si les secteurs blancs et noirs sont égaux en surface, l'illumination du disque est la moitié de l'éclairement que produirait la

lumière fixe sur un disque entièrement blanc, elle en serait seulement le dixième si les secteurs noirs occupaient une surface dix fois plus grande que celle des secteurs blancs. En conséquence, si, dans la comparaison des lumières fixes à une lumière instantanée, on commet une erreur sur la mesure des éclairements produits par les premières, il faut diviser cette erreur par le rapport des surfaces des secteurs noirs et blancs, pour avoir l'erreur commise sur la mesure de la lumière fixe totale.

L'appareil que j'ai employé, et que je désignerai sous le nom de *photomètre électrique*, est simplement composé d'un disque ayant 8 centimètres de diamètre et portant 60 secteurs égaux. Il est mis en mouvement par un mouvement d'horlogerie, et fait deux à trois cents tours par seconde.

Les éléments dont j'ai étudié l'influence relativement à l'intensité de la lumière électrique sont

1° I a distance d'explosion que je désignerai par x ,

2° I a distance y de l'étincelle au disque,

3° I a distance z de la lumière fixe au photomètre,

4° La surface s des condensateurs qui étaient formés de carreaux de verre recouverts de feuilles d'étain,

5° I épaisseur E de ces condensateurs,

6° I a nature des pôles de l'étincelle.

Dans un prochain Mémoire, je donnerai l'influence de la conductibilité du circuit parcouru par l'étincelle et l'action exercée par les variations du pouvoir condensant des condensateurs.

De nombreuses expériences m'ont conduit à des lois qui sont toutes comprises dans la formule suivante

$$I = \frac{K [1 + m(x-1)^2 s]}{y^2 E}$$

K et m sont des constantes, fonctions de la conductibilité du circuit et du pouvoir condensant des condensateurs,

I est l'intensité de l'éclairement produit par l'étincelle, à l'unité de distance.

L'intensité de la lumière électrique n'est nullement modifiée par la forme des cadres.

I a nature des boules entre lesquelles est produite l'étincelle change la valeur absolue de l'intensité, sans altérer les lois contenues dans la formule précédente.

Nous avons été conduit par nos expériences à admettre que la lumière

électrique est une simple explosion dans le fluide étheré qu'elle met en mouvement, et à croire que le métal transporté par l'étincelle n'est pas la cause de la lumière, qu'il augmente en déterminant un accroissement dans la conductibilité du circuit. Nous pensons en outre que l'étincelle électrique agit dans les combinaisons et les décompositions chimiques de deux manières : premièrement comme courant électrique, et, dans ce cas, elle décompose, secondement comme corps en ignition, à cause de l'incandescence des substances pondérables qu'elle transporte, et alors elle produit des combinaisons.

Lorsque les conditions de la production d'une étincelle électrique restent invariables, l'intensité de sa lumière est fixe, ce qui nous porte à croire que nous avons enfin trouvé une unité photométrique constante. Il est inutile d'ajouter que le photomètre électrique peut servir non seulement à mesurer des lumières instantanées, mais encore à la mesure des lumières fixes, et qu'en lui donnant diverses formes on pourra l'employer à l'étude des intensités des différentes parties du spectre lumineux. »

PHYSIQUE DU GLOBE. — *Supplément au Mémoire sur les causes probables des irrégularités de la surface de niveau du globe terrestre, etc., par*
• MM Hossard et Rozet (Extrait par les auteurs)

(Commission précédemment nommée.)

D'après la demande de M. Élie de Beaumont, nous avons cherché à déterminer l'action d'une chaîne de montagnes d'une longueur indéfinie, d'une largeur $2X$ d'une hauteur H et d'une densité Δ sur le pied de la verticale placé au bas d'un de ses versants, en assignant à cette chaîne la forme d'un prisme triangulaire. L'intégration nous a donné pour la totalité de son action

$$\frac{4\Delta \log 2}{\log 3} H,$$

d'où nous avons tiré, pour la déviation de la verticale,

$$T = (66,633) \theta H \quad (H \text{ est exprimé en kilog}),$$

θ étant le rapport de la densité de la montagne à celle du globe

» L'auteur de la, nous avons montré que l'on pouvait rendre compte de plus grands effets observés sur la direction de la verticale et sur la marche du pendule, en supposant $\theta = 1$, c'est-à-dire en admettant que dans les

rhaines, dans une profondeur égale à la hauteur de chacune, les roches ignées et les masses métalliques dont nous voyons les dernières ramifications à travers les roches, ont pris un certain développement. Il n'est donc pas nécessaire d'avoir recours à des masses perturbatrices considérables et situées à une grande profondeur, pour expliquer les effets observés sur la direction de la verticale et la marche du pendule.

Nous avons montré aussi que si l'on divise un arc terrestre en plusieurs parties sur lesquelles on ait fait à la fois des observations géodésiques et astronomiques, ainsi que des mesures de la longueur du pendule en supposant la masse perturbatrice décomposée en autant de parties qu'il y a de points de station, on pourra, pour chacun de ces points, établir deux équations, et comme chacun fournit aussi deux inconnues, n la masse perturbatrice et r la profondeur à laquelle elle est située, nous aurons donc autant d'équations que d'inconnues. On pourra ainsi calculer la valeur de chaque masse perturbatrice et la profondeur à laquelle elle est située. Le pendule devient donc un véritable instrument de géologie.

PHYSIOLOGIE — *Mémoire sur la musculature de l'iris*, par M MAUNOIR de Geneve (présenté par M Dumeril)

(Commissaires, MM Roux, Velpeau)

MÉCANIQUE APPLIQUÉE — *Addition à une Note récemment présentée, sur une machine à élever l'eau, caractères qui distinguent cette machine de l'appareil de Vera*, Note de M QUENARD

(Commissaires, MM Poncelet, Morin)

MÉCANIQUE APPLIQUÉE — *Description et figure d'une nouvelle pompe destinée particulièrement aux irrigations*, par MM LEBOT, ROBERT et DOUET

(Commissaires, MM Duhamel, Morin, Séguier)

M JEANMAIRE, qui avait soumis précédemment au jugement de l'Académie une Note sur une *machine à vapeur* de son invention (machine à rotation continue), transmet aujourd'hui des documents imprimés destinés à faire connaître les bons résultats qu'on a obtenus d'une machine construite d'après ce système.

(Renvoi à la Commission chargée de l'examen du Mémoire)

M DELPECH adresse une Note sur divers *moyens destinés à diminuer les dangers des chemins de fer*, et sur d'autres améliorations dont lui semble susceptible ce mode de transports

(Commission des chemins de fer)

M MALE présente des considérations relatives à la *navigation par la vapeur*

(Commissaires, MM Poncelet, Piobert, Seguiér)

CORRESPONDANCE

M le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DU COMMERCE envoie, pour la Bibliothèque de l'Institut, le L^e volume des *Brevets d'invention expirés* (Voir au Bulletin bibliographique)

M le DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L'ADMINISTRATION DES DOUANES transmet le *Tableau des mouvements du cabotage pendant l'année 1842*, ouvrage qui forme la suite et le complément du *Tableau général du commerce extérieur de la France pendant la même année*, que l'Académie a reçu au mois de novembre dernier

ANALYSE MATHÉMATIQUE — *Mémoire sur la forme générale des équations aux différences partielles, linéaires et à coefficients constants, propres à représenter les lois des mouvements infiniment petits d'un système de points matériels, soumis à des forces d'attraction ou de repulsion mutuelle*, par M LAURENT

M Cauchy a donné sous une forme générale les équations propres à représenter les lois des mouvements infiniment petits d'un système de points matériels soumis à des forces d'attraction ou de repulsion mutuelle. Les équations aux différences partielles et linéaires sont composées d'un nombre infini de termes, et comprennent en général les dérivées partielles de tous les ordres des déplacements des points matériels. Dans le cas où l'on suppose que la constitution du système est telle que les mouvements infiniment petits se propagent suivant les mêmes lois dans tous les sens, M Cauchy a donné la forme que doivent prendre ces équations, sans faire aucune hypothèse sur les relations entre les masses et les positions relatives des points

matériels de nature à assurer cette uniformité dans les lois de propagation, et il fait voir que, dans ce cas, ces équations ne peuvent contenir que des dérivées partielles d'ordres pairs. D'un autre côté, il est facile de reconnaître que la démonstration de cette proposition peut être ramenée aux théorèmes établis par le géomètre, sur les sommes de fonctions semblables des coordonnées de divers points qui restent constantes lorsqu'on change la direction des axes des coordonnées.

L'examen des démonstrations de ces théorèmes, insérées dans le 1^{er} volume des *Exercices de Physique mathématique*, j'ai pensé qu'il devait en exister d'analogues relatifs aux sommes de fonctions semblables des coordonnées relatives de divers points, qui restent constantes, non plus lorsqu'on change la direction des axes des coordonnées, mais lorsque au contraire, cette direction demeurant invariable, on transporte l'origine des coordonnées relatives d'un de ces points à un autre. J'avais d'autant plus d'intérêt à rechercher si mes prévisions étaient exactes, que dans les équations générales données par M. Cauchy, les coefficients sont formés de sommes auxquelles on attribue cette propriété, et que dès lors il pouvait en résulter quelque modification dans la forme même de ces équations.

Effectivement, j'ai reconnu qu'il était possible de démontrer la proposition suivante :

Les équations aux différences partielles, linéaires et à coefficients constants, propres à représenter les lois des mouvements infiniment petits d'un système de points matériels, ne peuvent, dans aucun cas, contenir les dérivées partielles des ordres impairs des déplacements.

Ainsi, sans faire aucune hypothèse sur les relations qui peuvent exister entre les masses des points matériels et leurs positions relatives, la constance des coefficients des équations du mouvement entraîne comme conséquence nécessaire que ces équations ne peuvent contenir que les dérivées partielles d'ordres pairs.

Voici la démonstration de cette proposition.

Soient $M_0, M_1, M_2, M_3, \dots, M_n$ divers points situés dans l'espace,

k, k' deux nombres entiers quelconques pouvant recevoir toutes les valeurs possibles depuis 0 jusqu'à ∞ inclusivement,

x_k, y_k, z_k les coordonnées de l'un quelconque M_k des points par

rapport à trois axes rectangulaires menés par le point M_0 ,

$f(x_k, y_k, z_k)$ une fonction de ces coordonnées relatives,

$m_0, m_1, m_2, \dots, m_n$ des constantes données

, Si l'on pose

$$(1) \quad K_0 = S_i^* m_k f(x_k, y_k, z_k),$$

la notation S_i^* indiquant la somme de tous les termes semblables relatifs aux valeurs 1, 2, 3, ..., n de k , K_0 sera une somme de fonctions semblables des coordonnées des divers points, relatives à l'un M_0 d'entre eux. En représentant par K_k ce que devient cette somme, en prenant un autre M_k de ces points pour origine des coordonnées relatives, on aura

$$(2) \quad \begin{cases} K_k = S_i^* m_k f(x_k - x_{k'}, y_k - y_{k'}, z_k - z_{k'}) \\ - m_{k'} f(0, 0, 0) + m_0 f(-x_{k'}, -y_{k'}, -z_{k'}), \end{cases}$$

d'où l'on tire

$$(3) \quad \begin{cases} S m_k K_{k'} = S_i^* m_{k'} S_i m_k f(x_k - x_{k'}, y_k - y_{k'}, z_k - z_{k'}) \\ - f(0, 0, 0) S^2 m_i^2 + m_0 S_i m_{k'} f(-x_{k'}, -y_{k'}, -z_{k'}) \end{cases}$$

Or si l'on suppose que la somme $K_{k'}$ est indépendante du nombre k , c'est-à-dire que l'on ait

$$(4) \quad K_0 = K_1 = K_2 = \dots = K_n,$$

en vertu des équations (1) et (3), on aura

$$(5) \quad \begin{cases} S_i^* m_{k'} S_i^* f(x_k, y_k, z_k) = S m_{k'} S_i^* m_k f(x_k - x_{k'}, y_k - y_{k'}, z_k - z_{k'}) \\ - f(0, 0, 0) S_i m_i^2 + m_0 S_i^* m_{k'} f(-x_{k'}, -y_{k'}, -z_{k'}) \end{cases}$$

Si l'on suppose en outre que la fonction $f(x, y, z)$ soit telle que l'on ait

$$(6) \quad f(x, y, z) = -f(-x, -y, -z),$$

on aura

$$(7) \quad \begin{cases} f(-x_k, -y_k, -z_k) = -f(x_k, y_k, z_k), \\ S_i^* m_{k'} S_i^* m_k f(x_k - x_{k'}, y_k - y_{k'}, z_k - z_{k'}) = S_i^* m_i^2 f(0, 0, 0), \end{cases}$$

et, dans cette hypothèse, l'équation (5) conduit à

$$(8) \quad S_i^* m_k f(x_k, y_k, z_k) = 0,$$

c'est-à-dire que, par suite des équations (1) et (4), on aura

$$(9) \quad K_0 = K_1 = K_2 = \dots = K_n = 0,$$

on peut donc énoncer le théorème suivant

Théorème — Les sommes des fonctions semblables des coordonnées relatives de divers points, qui demeurent constantes quel que soit celui de ces points qu'on prenne pour origine des coordonnées relatives, sont nulles lorsque les fonctions prennent des valeurs égales, mais de signes contraires pour des valeurs égales et des signes contraires des variables

Or, en se reportant à la page 6 du premier volume des *Exercices de Physique mathématique*, on voit que dans les équations générales par lesquelles M. Cauchy représente les lois des mouvements infiniment petits d'un système de molécules, les coefficients des dérivées des variables principales se réduisent toujours à des sommes de la forme

$$S[mx^m, y^m, z^m F(r)],$$

dans lesquelles m représente la masse de l'un quelconque des points matériels, et x, y, z les coordonnées de ce point par rapport à trois axes rectangulaires menés par celui dont les variables principales représentent les déplacements, la quantité r étant déterminée par l'équation

$$r^2 = x^2 + y^2 + z^2,$$

de plus ces coefficients correspondront à des dérivées partielles d'ordres pairs ou impairs, selon que la somme $n + n' + n''$ sera un nombre pair ou un nombre impair. Si donc on suppose ces coefficients constants, on voit qu'en vertu du théorème que nous venons de démontrer, ceux correspondant aux valeurs impaires de $n + n' + n''$, c'est-à-dire aux dérivées partielles d'ordres impairs, sont tous nuls. La proposition générale qui fait l'objet du présent Mémoire se trouve donc démontrée.

P. S. Comme application de la proposition démontrée ci-dessus, on peut citer le théorème suivant

Les mouvements vibratoires infiniment petits, d'un système de points matériels, ou de deux systèmes de points matériels qui se pénètrent, dont les lois peuvent être représentées par des équations aux différences partielles linéaires et à coefficients constants, se propagent toujours suivant les mêmes lois dans les directions directement opposées.

CHIMIE — *Sur les propriétés optiques de la salicine de la phloridzine et du cnisin, par M BOUCHARDAT*

Dans mon *Memoire sur les propriétés optiques des alcalis végétaux*. (*Annales de Chimie et de Physique*, 3^e série, tome IX, page 213) j'annonçai que dans une prochaine communication, je m'occuperais des principes immédiats neutres qui sont habituellement employés comme fébrifuges je viens aujourd'hui exposer mes recherches sur les propriétés optiques de la salicine, de la phloridzine et du cnisin J'ai déterminé le pouvoir rotatoire moléculaire propre à chaque substance en suivant la formule de M Biot *Comptes rendus des séances de l'Académie des Sciences* tome XV, p 621) que je rappelle ici

$$[\alpha] = \frac{m\alpha}{l \cdot d}$$

Conformément à la formule j'ai employé les dénominations suivantes, dont tous les éléments ont été déterminés par l'expérience

proportion pondérale de la substance active dans chaque unité de poids de la solution,

d la densité de la solution prise comparativement à l'eau distillée

l la longueur du tube d'observation en millimètres

α la déviation du plan de polarisation primitif observée à travers le tube de la longueur l et évaluée pour une longueur de 100 millimètres

* Parmi nos fébrifuges indigènes, la salicine vient au premier rang celle que j'ai employée avait été préparée par son inventeur, M Leiroux, elle avait été desséchée en la conservant pendant plusieurs jours sur de la chaux vive, dans une cloche fermée J'ai consigné les résultats dans le tableau A

Tableau A

DÉNOMINATION et état de la substance employée	Proportion pondérale dans un tétraèdre de la solution	Densité de la solution dans l'équilibre à la température	Longueur du tube d'observation en millimètres	Déviations de la normale de passage blanc et violet observées à la température	Déviation observée à travers le verre rouge mm.	Déviation calculée en multipliant α par $\frac{1}{10}$ mm.	Pouvoir moléculaire rotatoire	
Salicine cristallisée Eau distillée	7 193	0,035	1,00803	499,29	-13°	-10°	-9° 9'	-56° 60'
Salicine Eau	10 300	0,032258	1,008	523,7	-12° 25'			-55° 06'

A la température ordinaire, l'eau distillée prend environ 3,5 pour 100 de salicine. L'alcool en dissout beaucoup moins. J'ai dû préférer l'eau comme dissolvant.

Le pouvoir moléculaire rotatoire de la salicine est de $\alpha_r = -55,832$ (moyenne des deux expériences).

On sait que la salicine se modifie sous l'influence des acides étendus à la température de l'ébullition. M. Piria a fait connaître les produits intéressants de cette réaction.

A la température de 10 degrés, cette modification est nulle ou extrêmement lente. En effet, j'ai ajouté 1 centième d'acide chlorhydrique dans une dissolution de salicine, et le pouvoir est resté le même pendant quarante-huit heures, il n'a également pas changé sous l'influence de l'ammoniaque en excès.

La salicine se modifie à la température ordinaire d'une manière très remarquable, comme le montre M. Piria, sous l'influence de la synaptase, j'étudierai à part ces réactions intéressantes dans un travail que je publierai bientôt.

Phloridzine

La phloridzine a été extraite, par MM. Koninck et Stass, des écorces fraîches des racines de pommier, de poirier, de cerisier et de prunier. C'est une substance qui se rapproche beaucoup de la salicine par sa composition chimique, par ses propriétés principales et par ses usages thérapeutiques, elle s'en rapproche également par son action sur la lumière polarisée, comme le montrent les résultats compris dans le tableau B.

Tableau B

DES GYAT OK a bota p yee	Se po i on penti afe dane u s de po da de la soloi on	Dene te de la soloi on celle de l'ou d et l'lee d'au p se pour ne té d	Longue de l'ube d'obee vat on en m il se tres l	Dit at on de la te nte de passege bleme v'olée obee de à l'ou α	De at on obee c a t ave le v c ong n α	De at on ce cube en multi pl ant α pa 12 max	Penne molecule r otatoe α [α]
li hi r dzine 2 Al cool 98	o 02	o 8529	499 5	- 4° 75'	- 3° 75'	- 3° 64'	- 4° 49'
Phlor dzine 5 Alcool 96 5	o 0532 57	o 87018	499 5	- 12° 00'	- 9° 21'	- 9° 2'	- 3° 46'

J'ai employé l'alcool pour dissoudre la phloridzine, car, contrairement à la salicine, elle est beaucoup plus soluble dans l'alcool que dans l'eau.

La phloridzine, comme la salicine, devie à gauche les rayons de la lumière polarisée, mais son action est plus faible. En effet, nous avons pour moyenne de deux expériences $-39^{\circ},98 \backslash$, au lieu de $-55^{\circ},832 \backslash$ qui est le pouvoir moléculaire rotatoire de la salicine. La phloridzine, comme la salicine, se modifie, sous l'influence des acides étendus, à l'aide de l'ébullition, mais il paraît que cette modification ne s'effectue pas, ou qu'elle se opère très-lentement à la température ordinaire. En effet, en ajoutant 0,01 d'acide chlorhydrique, le pouvoir ne varie pas même après quarante-huit heures.

Ссылки

Le cnisin est une substance très intéressante extraite, par M. Nativelle, du chardon béni. C'est un principe remarquable par la facilité avec laquelle il se modifie sous les influences les plus légères. Il a fallu à M. Nativelle une grande habileté de manipulation pour l'obtenir. Cette grande altérabilité m'a fait penser qu'il pouvait agir sur la lumière polarisée, et, comme on va le voir, mes prévisions n'ont pas été trompées. Le cnisin que j'ai employé se présentait sous forme de belles aiguilles blanches, il m'avait été remis par M. Nativelle, il a été desséché à la température ordinaire, sous une cloche contenant du chaux vive. J'ai employé l'alcool aqueux pour le dissoudre, c'est, en effet, son meilleur dissolvant.

Je n'ai pu malheureusement faire qu'une seule série d'observations par défaut de substance, mais j'ai redoublé d'attention pour assurer l'exactitude des résultats que je présente dans le tableau suivant

Tableau C

Quantité de la substance employée	Se proportion pondérale dans l'analyse de la substance	Densité de la solution de la substance dans l'eau	Longueur du tube d'observation	Déviations de la lumière polarisée	Déviations de la lumière polarisée avec le couple	Déviation absolue en alignement	Pouvoir rotatoire
					max	max	[α]
Cnisin aqueux	2 g	0,8125	499	+15°	+11 5'	+1 5'	+30 683'

Dans la dissolution de cnisin, j'ajoutai 1 pour 100 d'acide chlorhydrique. La déviation qui était primitivement de $+15^{\circ}$, descendit peu à peu à $+12^{\circ}$, et resta stationnaire à ce degré.

Dans cette liqueur acide, j'ajoutai un léger excès de soude caustique. Le liquide se colora un peu, son extrême amertume disparut complètement et la déviation observée dans le même tube ne fut plus que de $+6^{\circ}$.

L'excès de soude fut saturé par de l'acide chlorhydrique, la liqueur se decolora et la déviation augmenta aussitôt, mais elle ne reprit jamais son amplitude primitive, elle resta à $+7^{\circ},5$.

On le voit le cnisin se modifie sous l'influence des acides et des bases fortes d'une manière permanente, il s'altère également, d'après M. Nativelle, sous l'influence d'une élévation de température.

L'histoire des produits dérivés du cnisin, dans ces diverses conditions, présentera beaucoup d'intérêt, j'ai appris avec une grande satisfaction que M. Nativelle se proposait de poursuivre ces recherches.

Si maintenant on compare les résultats précédemment exposés on voit que les trois principes immédiats qu'on doit regarder comme les moins importants des succédanés indigènes de la quinine agissent sur la lumière polarisée la salicine et la phloridzine, qui sont unies par de si étroites analogies dévient à gauche les rayons de la lumière polarisée, et le cnisin les dévie à droite, et cela avec beaucoup d'énergie. Son pouvoir moléculaire rotatoire est, en effet, de $\alpha = +130^{\circ},683$.

Le cnisin se rapproche peut-être davantage, par ses propriétés physiologiques et thérapeutiques, des principes actifs de la saignée de la digitale, de l'ipécacuanha, que de la phloridzine et de la salicine. Il possède, comme les principes que je viens de mentionner, une action contro-stimulante bien manifeste.

Il ne peut être pas sans intérêt de remarquer en terminant, que les trois matières dont nous avons examiné le pouvoir moléculaire rotatoire sont très altérables, comme tous les principes immédiats qui possèdent cette belle propriété de dévier les rayons de la lumière polarisée, il faut ajouter que leurs molécules très complexes se dédoublent avec facilité sous diverses influences, car ces deux conditions paraissent nécessaires pour que les principes immédiats manifestent leur action sur la lumière polarisée. En effet, la creosote, l'acide cyanhydrique, qui sont très altérables mais qui n'ont point un atome très complexe, ne dévient pas les rayons de la lumière polarisée. Le persulfate de potasse, dont l'atome est complexe, mais qui est très-stable est également sans action.

CHIRURGIE — *Sur l'application d'un nouveau procédé opératoire pour l'ablation d'une partie de la base de la langue*, Note de M. C. SEDILLOR

J'ai été appelé, il y a peu de temps, auprès d'une personne de Strasbourg atteinte d'un cancer à la langue. Toute la moitié gauche de cet organe était profondément altérée jusque auprès de l'épiglotte, et tous les hommes de l'art s'accordaient à regarder une opération comme la dernière chance de salut. La malade très forte et bien constituée, s'y soumettait sans opposition, et j'avais été choisi pour y procéder.

Deux méthodes connues s'offraient à moi : 1° enlever la langue par la bouche ; 2° la mettre à découvert et en faire l'ablation par la région supérieure du cou dans l'intervalle de la mâchoire à l'os hyoïde.

La première de ces méthodes, quoique d'une apparente simplicité, est cependant d'une exécution si pénible, que j'ai vu d'habiles chirurgiens obligés d'y renoncer. La difficulté des manœuvres opératoires dans l'espace si rétréci de la bouche, le rapprochement involontaire des arcades dentaires, la suffocation produite par le sang, constituent des obstacles très-graves dans les cas où il faut inciser la base même de la langue, et nous ne pouvions recourir à la ligature ni à la cautérisation contre un ulcère carcinomateux, aussi étendu et aussi profond que celui dont nous avions entrepris la cure.

La deuxième méthode ne nous offrait pas de chances plus heureuses, l'intervalle maxillo-hyoïdien est beaucoup trop étroit pour mettre aisément à nu et transporter une moitié de la langue, à moins que l'on ne détache toutes les parties molles insérées au contour interne de la mâchoire, comme l'a fait, peut-être tout, M. Regnoli, pour l'incision d'une tumeur qu'on eût certai-

nement enlevée par un procédé moins compliqué si l'on s'en rapporte aux planches publiées par ce chirurgien

» Il fallait cependant trouver un moyen de débarrasser sûrement et méthodiquement la malade de son cancer, et voici celui que j'imaginai et que je mis à exécution

» Je commençai par enlever la première incisive gauche inférieure, puis j'incisai verticalement, à quelques millimètres à gauche de la ligne médiane, toute l'épaisseur de la levre inférieure ainsi que les téguments du menton et de la région antérieure du cou jusqu'au niveau de l'hyoïde. Je passai un bistouri étroit derrière la portion correspondante du maxillaire, en ayant soin de ménager complètement le côté droit, et je divisai l'os d'un trait de scie. Deux aides ayant immédiatement écarté les branches de la mâchoire, je séparai les parties molles de la branche gauche de l'os jusqu'au voile du palais, et, au moyen d'un bistouri droit, je pratiquai la section de la langue sur la ligne médiane, et j'en enlevai la moitié malade, en la contournant en arrière au niveau de l'épiglotte

Cette opération s'exécuta avec une extrême facilité, et sans nous présenter le moindre obstacle. Je posai une ligature sur l'artère linguale, et toute hémorragie fut arrêtée. Les tissus malades avaient été incisés, et MM. Aronhson, Stœss, Risteloube, Schaff, Lhuillier, etc. présents à l'opération constatèrent ce résultat

Le pansement consista dans l'affrontement des branches de la mâchoire maintenues en contact par une petite lame d'or, appliquée et soutenue au devant des arcades dentaires par un fil de soie, appareil aussi simple que solide. La levre fut réunie par la suture entortillée, et je laissai une meche dans la plaie du cou pour le passage des mucosités et du pus

La malade était si peu fatiguée, qu'elle resta assez longtemps debout pour se débarrasser de toutes les traces sanglantes de l'opération. Elle n'avait pas éprouvé un seul moment de suffocation, n'avait nullement été incommodée par le sang, elle articulait quelques paroles d'une manière intelligible, la langue, soutenue par le muscle génio-glosse resté intact, ne s'étant pas rejetée en arrière, et on n'eût pas soupçonné, en voyant l'opérée, la terrible épreuve qu'elle avait subie

» Aujourd'hui, neuvième jour de l'opération, la levre est complètement réunie, la mâchoire se consolide, les plaies de la langue et de la bouche sont désinfectées, et tout fait espérer un résultat complètement heureux

» Cette opération, effrayante sans doute au premier aspect, nous paraît cependant la moins dangereuse, la plus facile et la plus sûre de celles qui ont

été proposé dans des conditions semblables à celles où nous l'avons entreprise

La section verticale de la mâchoire donne un écartement de plus de 10 centimètres, sans aucun tiraillement douloureux des articulations temporo-maxillaires. Le sang coule au dehors sans gêner la respiration, l'hémorragie est aisément prévenue, le chirurgien, voyant et touchant les parties malades, soulève sans peine tous les tissus altérés, et l'ablation d'un cancer de la langue devient, par cette méthode, une opération aussi simple et aussi certaine qu'elle était autrefois périlleuse et semée d'écueils.

Quelques objections m'ont cependant été faites et elles me semblent confirmer mon opinion.

1° La division des commissures labiales, ne changeant pas les rapports des arcs des dents, ne donnerait pas un espace suffisant pour l'emploi des instruments. L'arrière-bouche et le larynx formeraient également le point le plus déclive de la plaie et le sang, en s'y accumulant, produirait de même la suffocation et forcerait à suspendre à chaque instant les manœuvres opératoires.

2° En séparant la lèvre inférieure du maxillaire il faudrait la disséquer dans une étendue fort considérable et elle maintiendrait ensuite moins bien les fragments osseux.

3° La section de l'os offre réellement pas de danger, puisque l'on en lève chaque jour des portions altérées de la mâchoire et que les malades guérissent nonobstant la perte de substance ainsi produite.

4° Personne ne saurait mettre en doute la facilité de la réunion des lèvres.

5° L'immobilité des deux branches de la mâchoire pourrait être assurée par des appareils variés mais d'une égale efficacité. Ceux proposés contre les fractures seraient ici parfaitement applicables et un de mes confrères M. Schure, en avait mis un à ma disposition.

6° La plus grande étendue des plaies ne saurait entrer en parallèle avec la sécurité et la simplicité de notre méthode.

7° Enfin, on n'a à redouter ni la rétraction de la langue, ni une fistule salivaire, puisque le muscle génio-glosse droit est ménagé et que la glande sous-maxillaire et le conduit de Warthon restent complètement intacts.

J'ose donc espérer que l'opération dont je viens d'avoir l'honneur de vous entretenir trouvera d'heureuses applications et sera acceptée comme un véritable progrès.

PHYSIQUE DU GLOBE — *Observations sur les parties arrondies que présentent en Suisse les flancs des montagnes — deductions tirées de ces faits relativement à l'origine des blocs erratiques* (Extrait d'une Lettre de M. Debon à M. Élie de Beaumont,)

Dans une précédente Lettre je vous ai signalé, comme un trait particulier des hautes régions alpines, le fait que la plupart des grands pics, tels que le Schreckhorn, le Finsteraarhorn, le Moench, la Jungfrau, etc. sont des arêtes tranchantes excessivement disloquées et delitées. Ces pics étant tous situés dans le domaine du gneiss, j'en avais conclu que cette dislocation extraordinaire était une conséquence de la nature fissile de la roche, et je supposais que les arêtes situées à l'est de ces hautes sommités, dans la région du granite, sur les deux rives du glacier de l'Aar, devaient être bien plus compactes et plus massives. Mais je fus entièrement détrompé lorsqu'au mois d'août dernier je fis l'ascension du Rothhorn et de plusieurs autres sommets granitiques de la chaîne de *Mieselen*, qui forme la rive gauche du glacier de l'Aar. Le Rothhorn, qui s'élève à plus de 3000 mètres, est une arête tranchante non moins delitée que le sommet gneissique du Schreckhorn et de la Jungfrau, avec cette seule différence que les quartiers de roc sont en général plus épais et plus volumineux, car il n'est pas rare de rencontrer des dalles de 3, 4 et 5 mètres de longueur. Je retrouvai la même chose sur d'autres cimes granitiques des environs, telles que le *Thierberg* (3500 mètres), le *Zaesenberg*, le *Grunberg* sur la rive droite du glacier de l'Aar et les cimes attenantes au Rothhorn. Je me suis ainsi convaincu que c'est un caractère général de toutes les montagnes primitives de la chaîne des Alpes bernoises d'être profondément disloquées et delitées, au dessus d'un certain niveau qui n'excède pas 1800 à 2000 mètres, et qu'au-dessous de ce niveau, les flancs de ces mêmes massifs sont ordinairement dégarnis de blocs détachés, si bien que la roche compacte affleure partout sous la forme de roches arrondies, moutonnées ou polies.

L'aspect des sommités est tout différent lorsqu'on descend dans des régions moins élevées. Là, la plupart des cimes sont arrondies, et il n'y en a plus qu'un petit nombre dont le sommet soit dentelé et disloqué. Déjà dans le voisinage du hospice du Grimsel, qui n'est qu'à 10 kilomètres du Rothhorn, la plupart des sommets sont dégarnis de blocs, et si l'on en rencontre par-ci par-là quelques uns, ce sont des blocs erratiques venant d'ailleurs. Le Siedelhorn et quelques autres cimes font exception, aussi les cit-

on ordinairement comme des phénomènes extraordinaires. Et, en effet, il y a quelque chose d'étrange dans cette accumulation prodigieuse d'énormes blocs granitiques au sommet du Siedelhorn, tandis que les flancs de la montagne (au-dessous de 2 700 mètres) sont gazonnés et évidemment balayés et façonnés. La même chose se voit lorsqu'on s'élève du col du Grimsel vers la montagne de Sars, qui domine le glacier du Rhône, à l'opposé du Siedelhorn. Ici aussi on rencontre, jusqu'à la hauteur de 2 600 à 2 700 mètres, des surfaces arrondies et moutonnées qui, plus haut, font soudain place à d'immenses champs de blocs éboulés, absolument semblables à ceux du sommet du Siedelhorn.

« Évidemment, ce n'est pas par un effet du hasard que tous les grands pics de la chaîne bernoise sont délités à leur sommet, tandis que plus loin les sommets du second ordre sont généralement dégarnies de blocs. Je crois que l'explication de ce singulier arrangement ressort de la manière la plus frappante de la comparaison des localités entre elles. Si l'on suit des yeux la limite supérieure des roches polies sur les rives du glacier de l'Aar, on ne tarde pas à s'apercevoir que cette limite passe par *dessus* la plupart des cimes qui avoisinent l'hospice du Grimsel, et que quelques-unes seulement, le Siedelhorn entre autres, la dépassent quelque peu.

« Or, du moment que l'on admet que la limite supérieure des roches polies, limite qui est très-distincte dans une foule de localités, indique le niveau supérieur de l'*agent erratique* qui a laissé partout des traces si manifestes de sa présence en Suisse, quoi de plus naturel que d'admettre que c'est ce même agent qui a balayé les flancs de toutes les montagnes au-dessous de cette limite et qui a entraîné les blocs au loin, puisque partout où une cime, telle que le Siedelhorn, dépasse ce niveau, les blocs disloqués reparaisent à son sommet? J'en conclus qu'avant le transport des blocs erratiques, toutes les sommets des Alpes devaient être garnies de roches éboulées et disloquées. De même aussi la forme actuelle de certains cols qui ont un petit plateau au sommet, tandis que leurs prolongements latéraux sont tranchants (le col de la *Meyenwand* par exemple), me fait présumer que ces cols, avant d'avoir été balayés, étaient sensiblement plus hauts qu'ils ne sont maintenant. Peut-être leur hauteur primitive pourrait-elle être fixée à la ligne d'intersection des deux plans qui représentent les pentes générales des deux flancs de la montagne.

D'un autre côté, nous savons maintenant que la limite supérieure des roches polies suit une pente déterminée (1 degré environ) depuis les hautes sommets jusque dans les vallées inférieures. Or, cela étant, il s'ensuit que l'on

devra trouver des sommets garnis de roches défilées, à des piveaux toujours plus bas, à mesure que l'on s'éloignera des grands pics ou cette limite atteint sa plus grande hauteur, et c'est en effet ce qui a lieu dans la vallée de la Reuss, entre Andermatt et Amsteg

« Si cette interprétation est fondée, comme j'en ai la conviction, elle devra aussi trouver son application en dehors du domaine des Alpes, partout où il existe des phénomènes semblables à ceux du Siedelhorn. J'envisage en particulier les champs ou mers de rochers (*Felsenmeere*) de la forêt Noire comme susceptibles de la même interprétation. En effet, si l'est vrai, comme tous les observateurs s'accordent à l'admettre, que l'agent erratique a étendu son action dans ces contrées, pourquoi n'y aurait-il pas produit les mêmes effets que dans les Alpes, et pourquoi la base de ces champs de rochers n'indiquerait-elle pas aussi ici la limite supérieure de l'action erratique, d'autant plus que, de l'aveu même de M. Fromherz, ces champs de rochers occupent presque toujours les plus hautes sommités? Cette explication me paraît du moins bien plus probable que celle de plusieurs géologues allemands, et en particulier de M. Fromherz, qui veulent voir dans ces mers de rochers l'effet de violentes secousses locales, qui auraient disloqué les montagnes. Mais si l'en était ainsi, on ne comprendrait pas pourquoi les secousses auraient affecté de préférence les sommets des montagnes, tandis que leurs flancs seraient restés intacts. En donnant ainsi la clef d'un phénomène important, l'explication que je propose nous fournira en même temps le moyen d'apprécier la puissance qu'a dû attendre dans les différentes localités l'agent erratique, qu'il importe quelle ait été sa nature, liquide ou solide, courant ou glacier.

CHIRURGIE — *Sur l'abus et le danger des sections tendineuses et musculaires dans le traitement de certaines difformités* (Extrait d'une Note de M. MALGAIGNE, chirurgien de l'hôpital Saint-Antoine)

« L'Académie des Sciences a entendu, il y a quelques années, les premiers récits d'opérations merveilleuses par leur nombre et par leur innocuité, par les résultats que l'on croyait pouvoir s'en promettre, ou même que l'on disait en avoir déjà obtenus. C'est ainsi que, le 20 janvier 1840, on vous communiquait l'histoire d'une jeune fille de quatorze ans à qui l'on avait fait treize sections tendineuses dans la même séance, et, quelques mois plus tard, cette tentative hardie était de bien loin laissée en arrière par une autre du même genre, exécutée sur un jeune homme de vingt-deux ans à qui l'on avait coupé, en une seule fois, quarante-deux muscles ou ten-

dans le premier cas, on avait en vue de corriger deux luxations incomplètes des genoux, et, dès le lendemain de l'opération, le but avait été si pleinement atteint, qu'il ne restait des deux difformités qu'un certain degré de flexion permanente de l'articulation. Pour le second cas, la nature des difformités n'était point indiquée, et les résultats étaient encore dans l'avenir, mais on promettait de les communiquer en temps opportun à l'Académie.

Cependant depuis bientôt quatre années, ce temps opportun n'est point encore arrivé et je ne serais pas venu rappeler à l'Académie ces histoires interrompues si l'on n'avait tenté récemment de préconiser une doctrine chirurgicale nouvelle qui me paraît des plus dangereuses, et sur laquelle ces deux faits, unis à quelques autres, pourront édifier les praticiens. Il s'agit de savoir si il est permis de couper des tendons et des muscles dans les difformités produites ou entretenues par la paralysie, et, sans prétendre ici discuter cette doctrine à fond, je me contenterai d'exposer les résultats qu'elle a déjà donnés.

Cette jeune fille de quatorze ans, qui avait subi d'abord treize sections tendineuses, lesquelles ont été portées plus tard jusqu'à une vingtaine, était une malheureuse paralytique de la Salpêtrière où elle est encore couchée aujourd'hui, section Saint-Charles. Tous ses membres étaient plus ou moins contracturés, pieds bots, luxation des genoux, flexion de l'avant bras et des doigts, etc., elle offrait toutes les difformités avec une paralysie irrémédiable. On a attaqué d'abord les luxations des genoux, soit que l'opérateur se soit fait illusion, soit que les résultats observés le lendemain de l'opération aient disparu depuis, les luxations existent encore, on a attaqué les pieds bots, ils persistent toujours, on a attaqué l'abduction d'une main et la résistance de la malade a seule empêché qu'on n'allât plus loin. Par suite de ces vingt sections, qu'a-t-elle gagné? absolument rien, mais elle a perdu quelque chose, ainsi, elle ressent dans les deux jambes, au niveau des diverses sections, de vives douleurs qu'elle n'avait pas auparavant, ainsi elle pouvait encore travailler toute la journée à l'aiguille avec la main droite, et, depuis l'opération, elle ne le peut plus, elle avait quitté le service orthopédique de l'Hôpital des Enfants, le 29 juin 1840. Ce fut deux mois après ce premier résultat que fut faite la deuxième opération sur le jeune homme de vingt-deux ans.

« Celui-ci était plus impotent et plus paralytique encore, tous les membres étaient fléchis, et l'on se proposait de les redresser tous. Malgré toutes mes recherches, il m'a été impossible de savoir au juste quels ont été les

résultats de cette opération. Mais nous avons l'histoire complète, publiée par un chirurgien honnête et consciencieux, d'une opération toute semblable, tentée par lui, pour un cas tout pareil. C'était sur un enfant de onze ans contracturé et paralysé, de tous les membres, cul-de-jatte, mais pouvant, au moins, encoire balancer le tronc en avant et en arrière, de côté et d'autre. M. Phillips, entraîné par l'exemple, coupa tous les tendons refractaires, redressa tous les membres contracturés, et le résultat fut que le malheureux enfant allongé comme une barre de fer, les bras collés contre le tronc n'eut plus même la ressource de ces mouvements de totalité permis au cul-de-jatte, et qu'il se trouva ainsi étendu dans son lit comme un cadavre avec la tête seule de libre position effrayante et devant laquelle l'imagination n'ose s'arrêter.

Depuis le 1^{er} août 1843 jusqu'au 1^{er} juillet 1843 il est entré onze dans le service orthopédique des enfants malades, six sujets atteints de paralysies plus ou moins complètes quatre paraissent avoir été générales. De ces quatre sujets l'un est la jeune fille dont il a été question tout à l'heure, une autre n'est restée dans le service que six jours les deux autres sont morts à l'hôpital. Dans les deux autres cas la paralysie n'affectait que le pied ou les membres inférieurs. L'un a échappé à toutes mes recherches, à l'autre on a coupé le tendon d'Achille, et la paralysie et le pied bot ont persisté comme auparavant.

ASTRONOMIE. — *Éléments elliptiques de la comète découverte par M. Faye le 22 novembre 1843* (Extrait d'une Lettre de M. PLANTAMOUR à M. Arago.)

Voici les éléments elliptiques de la comète découverte par M. Faye, que j'ai calculés avec l'observation du 24 novembre faite à Paris, et celles du 17 décembre et du 18 janvier, que j'ai faites à Genève.

Longitude moyenne, époque du 1 ^{er} janvier, à		} rapportées à l'équinoxe moyen du 1 ^{er} jan vier 1844
midi temps moyen de Paris	59° 33' 47" 67	
Longitude du périhélie	49° 29' 38" 30	
Longitude du nœud	209° 31' 14" 50	
Inclinaison	11° 22' 17" 3	
Excentricité	33° 46' 37" 8	
Demi grand axe	3,80801	
Durée de la révolution	7 ^{ans} 4310	
Moyen mouvement diurne	477' 48367	

* Ces éléments représentent, de la manière suivante, les observations,

en tenant compte de l'aberration et de la parallaxe de la comète, les signes affectés aux erreurs en longitude et en latitude indiquent l'excès des positions observées sur les positions calculées

DATES	ERREUR en longitude	ERREUR en latitude	LIEU de l'observation
24 novembre 1843	+ 3,3	— 0,4	Paris
3 décembre	+ 5,0	— 13,8	Genève
9	+ 14,5	— 5,7	<i>Idem</i>
17	+ 2,1	+ 0,9	<i>Idem</i>
9 janvier 1844	— 9,0	— 2,2	<i>Idem</i>
11	— 2,5	+ 0,5	<i>Idem</i>
12	— 8,1	+ 2,1	<i>Idem</i>
16	— 3,6	+ 0 8	<i>Idem</i>
18	— 3,2	+ 0 6	<i>Idem</i>
22	— 6,6	— 1 5	<i>Idem</i>
25	— 6,6	+ 2,9	<i>Idem</i>

Je n'ai pas pu observer la comète depuis le 25 janvier, soit à cause du clair de Lune, soit à cause du mauvais temps, et je crains qu'il soit impossible d'obtenir de nouvelles observations, vu la rapidité avec laquelle la comète s'éloigne de la Terre.

MINÉRALOGIE — *Réponse aux remarques de M Raulin concernant un gisement de mercure annoncé dans le département de l'Aveyron, Note de M MARCEL DE SERRES*

« Si M Raulin avait lu avec attention la Lettre que j'ai eu l'honneur de vous adresser, il y a plus de six mois, sur la prétendue mine de mercure de l'Aveyron, il n'aurait probablement pas supposé que c'était sans doute par inadvertance que j'avais cru ce métal boine aux terrains du grès rouge ou à ces formations plus anciennes

» La personne à laquelle je me suis adressé pour avoir des renseignements à ce sujet a prétendu qu'en général, les mines de mercure étaient ouvertes

dans les terrains du groupe carbonifère, et surtout dans le grès rouge, où ce minéral est en amas Elle ne dit pas cependant que l'on ne puisse en découvrir dans des terrains d'un âge plus récent, car elle soutient cette dernière opinion

Je n'ai donc été ici que simple historien il aurait été facile à M. Raulin de l'apercevoir s'il avait été moins empressé de m'adresser un reproche dont, peut-être, il aura maintenant quelque regret Je n'ai pas dit davantage que des considérations géologiques s'opposaient à ce que l'on pût découvrir, en Aveyron, un gîte de mercure analogue à celui d'Idria car je ne suis pas allé apprendre que M. Bouc a exploité les mines dans les terrains jurassiques Je ne crois cependant à la possibilité de rencontrer en Aveyron des minerais de mercure exploitables que lorsqu'on y aura découvert du cinabre Aussi suis-je loin d'admettre, comme M. Raulin, la *présence presque certaine* du sulfure de mercure dans le bas de Saint Paul des Fontès (1)

En vous adressant quelques détails sur la découverte du mercure natif dans l'Aveyron mon but a été d'empêcher les capitalistes d'un département où je vais presque chaque année d'être dupes des spéculateurs avides Mon but a été complètement atteint (2) Aussi la supposition peu convenable que M. Raulin m'a prêtée ne m'otera pas la satisfaction d'avoir, dans cette circonstance, pu faire quelque bien

M^M THIFFA et WARDLI adressent diverses estampes en taille douce imprimées avec des planches que avaient été obtenues, les unes par les procédés galvanoplastiques, les autres par la *galvanographie* Ces produits sortent de l'établissement qu'ils ont fondé à Vienne pour l'exploitation de ces deux nouvelles branches d'industrie

Les planches obtenues par la galvanoplastique ne sont, ainsi que chacun le sait, que des contre-épreuves d'une planche gravée en taille-douce mais comme on en peut obtenir beaucoup sans endommager la planche matrice qui n'est exposée à aucune cause d'usure, on a ainsi un moyen d'obtenir un nombre presque illimité de belles épreuves La galvanographie est un

(1) Il n'en est pas de ce minéral comme du mercure natif produit par sublimation, qui peut se rencontrer dans les terrains de tous les âges Les gisements de l'Hérault et, de la Haute-Vienne en sont la preuve

(2) Ces voyages m'ont mis en mesure de publier une Notice géologique sur l'Aveyron, cette Notice publiée en 1842, est déposée dans la bibliothèque de l'Académie Cette observation répond à ce qu'ont avancé certains journaux, que je n'avais jamais été en Aveyron

art dans lequel le travail du graveur n'intervient pour rien, comme il a été déjà dit à l'occasion des premiers spécimens présentés à l'Académie par M. Al. Brongniart au nom de l'inventeur, M. Köbell de Munich (voir les *Comptes rendus*, tome XI, page 768)

M. DEMIDOFF adresse, de Florence, le relevé des observations météorologiques faites à Nijne-Tagnilsk pendant le mois d'octobre 1843

M. COUCHE présente, à l'occasion d'une Note récente de M. Melloni, des considérations théoriques sur les phénomènes de chaleur et de lumière

M. TREUTLER, de Berlin, écrit relativement à une communication qu'il a faite dans une des séances précédentes sur un nouveau *telegraphe de nuit*. Il tant oblige de quitter prochainement Paris, et pensant que la Commission qui a été chargée de faire un Rapport sur son Mémoire pourrait avoir besoin de quelques renseignements oraux, il prie l'Académie de vouloir bien hâter le travail de cette Commission

L'Académie accepte le dépôt de deux *paquets cachetés*, présentes, l'un par MM. CANQUOIN et MILLARDET, l'autre par M. GRAYNELT

À 4 heures trois quarts l'Académie se forme en comité secret

La séance est levée à 6 heures

A

ERRATA

(Séance du 12 février 1844)

Page 240 ligne 17 sujet du concours pour le grand prix des Sciences Mathématiques de l'année 1846, lisez de l'année 1844

Page 240, lignes 24 et suivantes, lisez

Le nombre des votants étant de 50,

M. Chevreul obtient	30 suffrages,
M. Duhamel	12
M. Lame	1
M. Poncelet	1

Il y a six billets blancs

Page 255, lignes 29 et suivantes, lisez

La longueur du canal digestif non compris l'œsophage et l'estomac, elle était de 62^m,43. La longueur de cette partie dans le chameau à deux bosses est de 42^m,13, dans le bœuf, de 48^m,86, dans le cheval, de 25^m,18.

BULLETIN BIBLIOGRAPHIQUE

L'Académie a reçu, dans cette séance les ouvrages dont voici les titres

Comptes rendus hebdomadaires des séances de l'Académie royale des Sciences
1^{er} semestre 1844, n° 7, in-4°

Bulletin de l'Académie royale de Médecine, t IX, n° 8, in-8°

Dictionnaire universel d'Histoire naturelle, tome IV, 43^e et 44^e livr in 8°

Description des Machines et procédés consignés dans les Brevets d'invention de perfectionnement et d'importation, tome I., in-4°

Administration des Douanes — Tableau général des mouvements du Commerce pendant l'année 1842, 1 vol in-4°

Suite des Mémoires et Observations de Physique et d'Histoire naturelle par M le baron D HOMERES-FIRMAS, broch in-8°

Histoire naturelle des îles Canaries, par MM. WEBB et BERTHELOT 72 et 73 livr., in-4°

Traité du mouvement de translation des Locomotives, et Recherches sur le frottement de roulement, par M FLVRE, broch in-8° avec atlas in-4°

Encyclopédie des Chemins de fer et des Machines à vapeur, à l'usage des praticiens et des gens du monde, par M F TOURNEUX, 1 vol in-8°

Comice agricole d'Epinal — Séance publique du 25 septembre 1843, brochure in-8°

Société royale et centrale d'Agriculture — Bulletin des séances, tome IV n° 2, in-8°

Journal de la Société de Médecine pratique de Montpellier, février 1844, in-8°

Annales de la Société royale d'Horticulture de Paris, janvier 1844, in 8°

Journal des Connaissances médico-chirurgicales, février 1844, in 8°

L'Abeille médicale, février 1844, in-4°

Nouveaux Mémoires de la Société impériale des naturalistes de Moscou dédiés à S M l'empereur NICOLAS I^{er}, tome VII Moscou, 1841, in-4°

Bulletin de la Société impériale des naturalistes de Moscou, année 1843, n° 2 et 3, in-8°

Memoirs of Mémoires de la Société chimique de Londres, pour les années 1841 à 1843, vol 1^{er} Londres, in-8°

Memoirs Mémoires et Procès-verbaux de la Société chimique, partie VI, novembre 1843 Londres, broch in-8°

Astronomic il *Observations astronomiques faites a l'Observatoire Radcliffe d'Oxford par MM J JOHNSON*, vol. II Oxford, 1843, in-8°

Astronomische *Nouvelles astronomiques de M SCHUMACKER*, n° 495, in-4°

Untersuchungen . *Recherches sur la structure du Système nerveux*, par MM STILLING et WALLACH, I^{re} partie *Texture de la moelle épinière* Leipsick, 1843 in-4° II^e partie *Recherches sur la texture et les fonctions de la moelle allongée*, in-4° avec atlas petit in-fol

Atti della *Actes de l'Académie royale des Sciences du royaume des Deux-Siciles, section de la Société royale bourbonnienne*, vol V, partie I^e Naples 1843, in-4°

Elogio *Eloge de M F RICCIARDI, lu a la séance annuelle de l'Académie royale des Sciences de Naples du 11 juin 1843, par M GRIMALDI* Naples, 1843, in-4°

Lettera *Lettre de l'abbé P PILLORI, de Florence, au sieur BEDOTTI, de Bologne, sur la prétendue découverte des Ephemérides des Satellites de Jupiter* par GAILLIE Bologne, 1843, in-8°

Risposta *Réponse de M F ALBERI a la brochure de M PILLORI* Marseille, 1844, in-8°

Gazette médicale de Paris, t XII, n° 7, 1844, in-4°

Gazette des Hôpitaux, t VI, nos 18 à 20, in-fol

L'Expérience, n° 345, in-8°

L'Echo du Monde savant 10^e année, t IX, nos 11 et 12 in-4



COMPTE RENDU

DES SÉANCES

DE L'ACADÉMIE DES SCIENCES.

SIÈGE PUBLIC DU LUNDI 26 FÉVRIER 1844

PRÉSIDENCE DE M DUMAS

La séance s'ouvre par la proclamation des prix décernés et des sujets de prix proposés

PRIX DÉCERNÉS

POUR L'ANNÉE 1843

SCIENCES MATHÉMATIQUES

RAPPORT SUR LE GRAND PRIX DE MATHÉMATIQUES POUR
L'ANNÉE 1842

(Commissaires, MM Liouville, Sturm Poinsoy Duhamel Cauchy
rapporteur)

L'Académie avait proposé comme sujet de prix la question suivante
*Trouver les équations aux limites que l'on doit joindre aux équations
infinies pour déterminer complètement les maxima et minima des inte-
grales multiples*

Elle avait demandé, en outre, des applications relatives aux inte-
grales triples

» Des quatre Mémoires qui ont été adressés à l'Académie avant l'expira-
C R, 1844, 1^{er} Semestre (I. XVIII, N° 9)

tion du concours, deux ont été particulièrement distingués par les Commissaires, savoir le n° 3, dont l'épigraphe est *A force d'étudier un sujet sous toutes sortes de faces, on finit par en tirer quelque chose*, et le Mémoire n° 2

Les Commissaires ont jugé, 1° Que l'auteur du Mémoire n° 3, en établissant, à l'aide d'un nouveau signe, appelé par lui signe de substitution, des formules élégantes et générales qui fournissent, sous une forme convenable, les variations des intégrales multiples, et qui permettent de leur appliquer, dans tous les cas, l'intégration par parties, a contribué d'une manière notable au perfectionnement de l'analyse, et mérité ainsi le grand prix de Mathématiques,

2° Que l'auteur du Mémoire n° 2, sans avoir donné à ses calculs toute la généralité désirable, a néanmoins, en raison de l'élégance de quelques-unes de ses formules, surtout en raison des applications qu'il en a faites et de ses recherches sur la distinction des maxima et minima, mérité une mention honorable

L'auteur du Mémoire couronné est M SARRUS, doyen de la Faculté des sciences, à Strasbourg

La pièce n° 2 est de M DELAUNAY, répétiteur à l'École polytechnique

PRIX D'ASTRONOMIE

POUR 1842

(FONDATION DE M DE LALANDE)

Une Commission composée de MM Bouvard, Mathieu, Arago, Damoiseau et Laouville, a été d'avis de décerner la médaille fondée par Lalande à M LAUGIER, qui a découvert une comète, et qui en a calculé l'orbite. L'Académie a sanctionné cette décision

M Laugier est actuellement membre de l'Académie

RAPPORT SUR LE CONCOURS DE 1842 POUR LE PRIX DE MÉCANIQUE

(FONDATION MONTYON)

(Commissaires, MM Poncelet, Comolís, Piobert, Ch Dupin, Séguier)

M le baron Charles Dupin déclare, au nom de la Commission pour le prix de Mécanique, qu'aucun des ouvrages présentés au concours n'a mérité le prix »

RAPPORT SUR LE CONCOURS DE 1842 POUR LE PRIX DE STATISTIQUE

(FONDATION MONTYON)

Commissaires MM Ch Dupin, Mathieu, Pouillet, de Gasparin,
Franceau rapporteur)

Il y a huit concourants pour le prix de Statistique fondé par M de Montyon. Les ouvrages présentés ont été lus et examinés avec soin par les membres de la Commission. Cinq de ces ouvrages ont été écartés comme ne traitant que de faits étrangers à la Statistique, ou d'idées qui n'ont rien de neuf ou renfermant des erreurs graves. Les trois autres ont seuls fixé l'attention de la Commission. Nous allons, messieurs, vous faire connaître la nature de ces ouvrages, et l'opinion que nous nous sommes formée de leur mérite.

Sous le n° 6, M FAYET, professeur au collège de Colmar, a présenté quatre volumes in folio manuscrits, sous le titre de *Statistique intellectuelle et morale*. L'auteur réunit et rapproche tous les chiffres relatifs à l'instruction publique, aux établissements de bienfaisance, à l'enseignement des conscrits, etc., et se propose de comparer ces chiffres à ceux des crimes, délits, suicides, naissances naturelles, etc. Nous avons dû vous entretenir d'un travail aussi étendu, fait avec une grande persévérance, d'après de nombreuses recherches. Dans la comparaison que l'auteur a faite, il s'est fondé sur des éléments évidemment incomplets et imparfaits, conduisant à cette conséquence, qu'il y a, toute proportion gardée avec les classes correspondantes de la société, trois fois et demie plus de coupables lettrés que de coupables qui ne savent ni lire ni écrire, résultat qui ne nous semble nullement démontrer, et qu'aucun document positif ne justifie.

En effet, l'auteur n'a pas fait réflexion que les classes instruites habitent en très-grande majorité les villes, où la nomenclature des crimes est beaucoup plus étendue que dans les campagnes. Ce seul fait, toutes choses égales d'ailleurs, ferait pencher la proportion défavorable du côté des classes instruites, alors même qu'en réalité, pour un même nombre de personnes placées dans les mêmes circonstances, le nombre des crimes ne serait pas plus grand dans la classe instruite que dans la classe ignorante.

D'ailleurs, beaucoup d'enfants sont instruits hors des écoles publiques, et, d'un autre côté, une multitude de crimes et de délits échappent à la sévérité des tribunaux. On n'a aucun moyen d'établir la proportion des nombres d'hommes instruits et ignorants, coupables et condamnés.

Nous ne pouvons donc, messieurs, vous proposer d'accorder un prix à ce travail. On ne peut décider une question aussi grave, en l'absence des éléments complets qui est indispensable de faire intervenir.

Sous le n° 5 M **PESCHE**, ex-chef de division à la préfecture de la Sarthe a présenté un *Dictionnaire topographique, historique et statistique* de ce département en six volumes in 8°. Cet ouvrage nous paraît mériter quelque encouragement parce qu'il contient sur l'ensemble des localités qu'il embrasse une foule de documents qui pourraient servir à perfectionner la statistique générale de la France.

L'ouvrage de M Pesche fait connaître les monuments les antiquités les grands événements historiques dont la Sarthe a été le théâtre, sa population son agriculture, son commerce et son industrie. Mais la forme de dictionnaire se prête mal à la comparaison des nombres et à la discussion des moyennes. L'auteur n'entreprend pas cette tâche mais il recueille avec soin les éléments qui devront plus tard être mis en œuvre. C'est un travail qui reste à faire et que M Pesche pourra présenter à un nouveau concours.

Dans l'état actuel des choses nous pensons que les éloges que nous avons donnés à l'ouvrage de M Pesche sont la juste récompense de ses travaux.

Sous le n° 8 M **MOREAU DE JONNES** a présenté un volume in 8° imprimé intitulé *Recherches statistiques sur l'esclavage colonial*. Cet ouvrage est divisé en trois parties. La première traite des mouvements de la population esclave des colonies européennes nous y avons remarqué des documents relatifs aux mariages aux naissances aux décès et aux affranchissements des noirs. La seconde partie expose les moyens proposés ou adoptés pour supprimer l'esclavage colonial. La troisième présente les projets de l'auteur pour atteindre ce but dans les colonies françaises.

Ces deux dernières parties n'étant pas de nature à faire le sujet d'un concours de statistique c'est seulement sur la première que l'attention de la Commission s'est portée, comme présentant des faits nouveaux qui requerraient s'ils étaient bien constatés une haute importance dans les circonstances actuelles.

Les Recherches statistiques de M Moreau de Jonnes sur l'esclavage colonial sont dirigées dans un bon esprit, mais elles ont l'inconvénient grave de s'appuyer sur des dénombremens offerts par le Gouvernement, qui en les publiant avec réserve, est convenu qu'il a trouvé, à les faire, des difficultés insurmontables.

• Il en est résulté que les dénombremens de naissances et de décès dans

les quatre colonies françaises présentent des disparités extrêmes dont l'auteur n'a pas pu se rendre compte. Plusieurs documents offrent en effet des impossibilités palpables.

Ainsi pour la plus grande de nos colonies, le nombre total des enfants vivants de zéro à quatorze ans se trouve plus grand que quatorze fois les naissances annuelles prises pour base des calculs, et l'on ne compte pour rien le nombre des morts dans cette durée.

Il nous semble qu'on doit inviter l'auteur à revoir ses calculs, à demander au Gouvernement des renseignements plus exacts et qui soient d'accord avec eux-mêmes. En perfectionnant son travail, il pourra le reproduire plus tard, après l'avoir rendu digne du suffrage de l'Académie, et nous lui réservons à cet égard tous les droits.

Notre conclusion est qu'il n'y a pas lieu d'accorder le prix de Statistique pour l'année 1842.

PRIX FONDÉ PAR MADAME LA MARQUISE DE LAPLACE

Une ordonnance royale ayant autorisé l'Académie des Sciences à accepter la donation qui lui a été faite par madame la marquise de Laplace d'une rente pour la fondation à perpétuité d'un prix consistant dans la collection complète des ouvrages de Laplace, prix qui devra être décerné chaque année au premier élève sortant de l'École polytechnique.

Le Président remittra de sa main les cinq volumes de la *Mécanique céleste*, l'*Exposition du Système du monde*, et le *Traité des Probabilités* à M. Rivoir (Louis-Edouard), premier élève sortant de la promotion de 1842.

SCIENCES PHYSIQUES.

PRIX DE PHYSIOLOGIE EXPERIMENTALE

RAPPORT SUR LE PRIX DE PHYSIOLOGIE EXPERIMENTALE POUR L'ANNÉE 1842.

(Commissaires, MM. Magendie, Serres, Flourens, Andral, de Blainville, rapporteur.)

La Commission de l'Académie chargée par elle de décerner pour l'année 1842, le prix fondé par M. de Montyon sur la physiologie experi-

mentale a reçu six ouvrages manuscrits ou imprimés. Trois ne lui ont pas pu devoir être pris en considération. Son jugement n'a donc porté que sur les trois autres seulement.

Le premier, de M. le docteur **ROBERT LATOUR**, intitulé *Recherches et Expériences physiologiques et pathologiques sur le mécanisme de l'inflammation, sur la Pathologie des animaux vertébrés à sang froid*, forme un Mémoire assez peu étendu, dans lequel l'auteur s'est proposé de démontrer par des expériences, que chez ces animaux l'inflammation et la suppuration n'ont jamais lieu, ce qui ne l'empêche pas de reconnaître que ces phénomènes morbides se manifestent dans les animaux à sang chaud.

L'importance de la question, son intérêt sur un point assez vivement controversé dans ces derniers temps par plusieurs pathologistes distingués en France et à l'étranger, ont déterminé la Commission à accorder une mention honorable, à titre d'encouragement, à M. le docteur Robert Latour dans l'espoir qu'en continuant son travail, en multipliant et variant ses expériences sur un plus grand nombre d'espèces animales, et sur des parties diverses, il pourra arriver à un résultat satisfaisant, et à l'abri de toute contestation.

Le second ouvrage distingué par la Commission, et intitulé *Recherches anatomiques et physiologiques sur les Diptères, etc, etc*, est un nouveau Mémoire de notre confrère, correspondant de l'Académie, M. **LÉON DUFOUR**, déjà bien connu d'elle et de toutes les personnes qui s'occupent d'entomologie d'une manière un peu approfondie. Il a pour sujet des recherches anatomiques sur les insectes hexapodes de l'ordre des diptères, en prenant pour type une ou plusieurs espèces de chaque famille, au nombre de quatorze, depuis les *Coucins* jusqu'aux *Hippoboscques*, et cela dans les états adulte et de métamorphose, manuscrit de plus de 150 pages, accompagné d'un grand nombre de dessins en dix planches. Nous aimons à répéter ici ce que vos Commissaires, dans les années précédentes, vous ont déjà dit, en parlant des cinq premiers Mémoires de M. Léon Dufour, tous publiés dans le *Recueil des Savants étrangers*, et dont le premier a été couronné par l'Académie. Ce travail, suite presque nécessaire des premiers, se fait remarquer par l'habileté et la persévérance avec lesquelles un sujet aussi délicat que l'anatomie d'animaux souvent plus petits qu'une mouche, a été traité par son auteur. Aussi proposons nous à l'Académie de décider qu'il sera inséré dans le plus prochain volume consacré à la publication des *Mémoires des Savants étrangers*, comme fort digne des précédents Mémoires de M. Léon Dufour.

Le troisieme travail soumis au jugement de la Commission, intitulé *Sur la Spongille fluviatile, et sur la production et le developpement de l'Hydre*, est de M le docteur LAURENT, qui a déjà présente à l'Académie plusieurs Mémoires d'anatomie, de physiologie et de zoologie. Ceux qu'il a envoyés au concours, quoique appartenant au même sujet le développement et les différents modes de reproduction d'animaux des classes les plus inférieures de la série, embrassent l'histoire de l'Hydre commune et celle de l'éponge fluviatile. Ces deux productions animales se trouvant assez communément dans la plupart des eaux douces des environs de Paris, M Laurent a pu multiplier ses observations et ses expériences, les varier autant qu'il le juge convenable, et cela pendant plusieurs années et dans toutes les saisons. Dans un Rapport fait à l'Académie vers le milieu de l'an dernier. Rapport imprimé dans les *Comptes rendus*, la Commission avait conclu à l'insertion dans le *Recueil des Savants étrangers*, et cette proposition avait été acceptée par l'Académie. La Commission actuelle d'accord avec l'ancienne, insiste de nouveau sur l'importance de ce travail dans lequel son auteur a non seulement confirmé tous les faits curieux et extraordinaires même, observés par Trembley il y a plus de cent ans, mais encore éclairci plusieurs points restés obscurs ou entièrement nouveaux, à l'aide de nouveaux procédés d'investigation et d'une comparaison habile avec ce qui existe dans les animaux plus élevés.

Quant au second Mémoire de M Laurent, dont le but était également de confirmer, de vérifier et d'étendre ce que l'on savait sur la structure, le mode de reproduction, de développement, d'agglomération de l'Éponge fluviatile prise comme type de ce grand genre linneen, M Laurent n'a pas moins réussi en sorte que l'histoire de cette production animale si hétérogène a été encore fortement avancée, et les faits observés fixes démontrés par une suite de figures convenablement disposées et soigneusement exécutées.

En conséquence, la Commission a cru devoir décerner le prix de *Physiologie expérimentale* fondé par M de Montyon, à M le docteur Laurent pour ses *Recherches expérimentales, anatomiques et physiologiques sur l'Hydre commune et sur l'Éponge fluviatile, recherches comprenant les modes de reproduction et l'histoire du developpement de ces animaux à toutes les époques de la vie*.

Et comme la valeur pécuniaire de ce prix (895 francs) est assez loin de pouvoir indemniser M Laurent des dépenses nombreuses qu'il a dû faire nécessairement pour envoyer recueillir, et surtout avoir constamment à sa

disposition et a celle de vos Commissaires, les animaux qu'il a dû entretenir et nourrir sans interruption pendant plus de trois années consecutives, nous proposons a l'Académie de vouloir bien ajouter au prix, et comme indemnité, une somme de *deux mille francs*, dans l'espoir qu'elle mettra M. Laurent dans la possibilité de pousser encore plus loin ses recherches, de maniere a lever quelques-unes des incertitudes qui peuvent exister dans son travail, et qui lui ont été indiquées par vos Commissaires

PRIX RELATIF AUX ARTS INSALUBRES

RAPPORT SUR LE CONCOURS DE L'ANNÉE 1842

(Commissaires, MM Dumas, Thenard, Pelouze, d'Arcet, Payen rapporteur)

La Commission a reçu les Memoires et pieces diverses envoyées par dix-huit concurrents pour les prix de la fondation Montyon relatifs a l'assainissement des procedes industriels

Tous les sujets traités par les auteurs ont un grand interet, mais la plupart sont encore depourvus des caracteres d'utilité pratique qui seuls permettent d'accorder les prix de cette fondation

Nous indiquons d'abord les applications qui nous semblent être dans ce cas et sur lesquelles un jugement définitif doit être ajourné

Fabrication des tuyaux de conduite, d'après un nouveau système, moins sujets que les tuyaux usuels, aux fuites de liquides ou de gaz qui ont parfois donné lieu a de graves accidents cette invention remarquable fut présentée au concours, en 1841, par M. CHAMEROY, trop recente alors pour avoir droit au prix, elle a depuis donné lieu a une industrie qui s'est graduellement développée elle utilise annuellement 300 000 kilogrammes de brai provenant de la distillation des houilles grasses, et employés a préparer un mastic solide et adhérent qui enveloppe les tubes en tôle Ces produits semblent réunir les conditions d'économie et d'imperméabilité désirables, quant a la durée, une année de plus ne semblera pas inutile pour en juger Ce fut par cette raison, et aussi parce qu'en ce moment même une nouvelle et plus grande usine construite par M. Chameroy devra réaliser de nouveaux perfectionnements que la Commission a trouvé convenable d'ajourner sa décision

Des motifs semblables ont amené la même résolution a l'égard des tuyaux en verre reconvertis d'un enduit de mastic bitumineux, présentés par M. HUTTEN, habile manufacturier de Saint-Étienne

Les observations ingénieuses de M. JOHARD, de Bruxelles, sur les explo-

sions des chaudières à vapeur, constitueraient sans doute des titres aux récompenses décernées par l'Académie, si elles conduisaient l'auteur à réaliser des moyens pratiques pour prévenir ces explosions : jusque-là nous devons nous abstenir de prononcer.

» La dessiccation économique des substances animales, en évitant leur putrefaction, a été établie en grand par M. CAMBACÈRES dans un laboratoire des chevaux près de Paris, le procédé consiste à faire passer sur la chair, préalablement cuite et découpée mécaniquement, les gaz perdus des foyers, aspirés au sortir des fourneaux et lancés par un ventilateur dans le séchoir.

C'est une application nouvelle offrant quelques circonstances avantageuses, spéciales, d'un moyen employé ailleurs pour la concentration des vinasses. Cette application se perfectionnera sans doute, elle est trop récente encore pour être convenablement appréciée.

Une substance commerciale nouvelle, préparée au moyen de plantes sèches, divisées, obtenues à bas prix, fut présentée l'année dernière par M. SALMON, et envoyée au concours en raison de la propriété désinfectante qui lui rend à la fois utile à l'assainissement et à la confection des engrais, l'auteur, déjà récompensé pour une application du même genre, pense avoir acquis de nouveaux droits en trouvant un produit de beaucoup préférable à celui qu'il avait d'abord exploité, bien que des renseignements favorables nous soient parvenus à cet égard, une expérience plus décisive et une pratique plus complète qui ne sauraient être improvisées, surtout en agriculture, sont indispensables pour fixer l'opinion de l'Académie.

Diverses indications relatives à l'économie domestique, présentées au concours par M. LAIGNEL, peuvent être considérées comme des conseils ou des projets non réalisés, et s'éloignent, surtout en ce sens, du but de la fondation Montyon.

Les nouveaux calorifères et les appareils ingénieux contre les explosions, décrits par M. SOREL, manquent aussi du caractère de réalisation pratique, condition essentielle pour avoir droit aux prix.

Nous devons en dire autant d'un procédé dont l'objet a d'ailleurs une si haute importance, et que M. GARNAL indique pour détruire toutes les causes d'insalubrité dans la préparation de la céruse.

» Un nouveau procédé de rouissage du chanvre, proposé par MM. AVOUSTIN et GISQUET, est parvenu à la Commission avec des documents très-favorables, il pourra offrir une grande utilité lorsque l'expérience en grand en aura sanctionné le mérite, nous devons attendre cette époque avant de l'admettre à recevoir un prix.

Un nouveau four pour la cuisson du pain, construit par M FERRAND, ne nous a semblé, ni dans ses principes ni dans l'application réalisée, pouvoir être considéré comme rendant *un art ou un métier moins insalubre*

Un Memoire de MM MELSSENS et GUILLOT *sur la cure du tremblement mercuriel par l'iodure de potassium*, promet des résultats nouveaux importants tels qu'on est en droit de les attendre de ces observateurs exacts et consciencieux ils se sont proposé eux-mêmes de recueillir des faits plus nombreux et concluants, demandant pour toute faveur, jusque là de prendre ici dite de leurs espérances

« Un *appareil usuel* qui pourrait faire prévoir la formation des *mélanges détonants*, soit dans les mines, soit dans les lieux habités où l'on fait usage du gaz *Light*, rendrait certainement un éminent service à la salubrité, à la sécurité publiques, car les dangers, prévus alors, pourraient être évités

Tel est le grave et difficile problème que M CHUARD a tenté de résoudre par des moyens très-ingénieux, et que vous ont fait bien connaître et apprécier le Rapport d'une Commission dont M Regnault, notre confrère était l'organe Par ses efforts persévérants, M Chuard s'est montré digne de l'intérêt de l'Académie, en usant de toutes ses ressources pour approcher du but qu'il s'était proposé

« Quelques sacrifices encore l'y conduisaient peut être, mais déjà nous pouvons le dire, il a dépassé ses forces

Dans ces circonstances, la Commission n'a pas cru pouvoir décerner un prix à M Chuard, mais elle a jugé convenable de l'indemniser des dépenses dans lesquelles il a dû être entraîné, en lui accordant une somme de *deux mille francs* à titre d'encouragement

Les trois concurrents dont il nous reste à exposer les titres nous paraissent avoir parfaitement rempli les conditions de nos programmes

« 1° M MARTIN, de Vervins, avait, en 1837, envoyé au concours les pièces relatives à son *Procédé d'extraction de l'amidon des farines, sans altération du gluten et sans fermentation putride*

La Commission, dans son Rapport de 1838, déclarait qu'il manquait seulement à ce procédé la sanction de la pratique, pour qu'il fût digne d'une récompense les droits de l'auteur furent réservés

Depuis cette époque, d'importantes améliorations ont encore été introduites dans la méthode de M Martin, les consommateurs ont reconnu la bonne qualité de ses produits, le gluten trouve actuellement un débouché facile dans la préparation des plus beaux pains de nos boulangeries, dans la

confection des pâtes d'Italie auxquelles il donne l'apparence et les bonnes qualités des pâtes provenant des blés du Midi

» Tous ces faits, constatés dans un récent concours de la Société d'encouragement, sont d'ailleurs démontrés par les pièces authentiques qui nous sont parvenues

» Si nous ajoutons que l'industrie de l'amidonnerie perfectionnée, en montrant l'inutilité, les inconvénients même, pour les intérêts du fabricant d'une fermentation poussée jusqu'à la putridité, réagit déjà sur les anciens procédés, et permettra d'extraire, des grains concassés, une plus forte proportion d'amidon qu'on n'en obtenait autrefois, pourvu qu'on limitât les réactions à des fermentations lactique et acétique rendues plus promptes nous aurons fait comprendre que deux industries de nature à se maintenir concurremment seront ainsi devenues moins insalubres, et, à tel point qu'en y joignant un facile écoulement des eaux, elles pourront être rangées dans une autre classe

La Commission par ces motifs, a voté une récompense de quatre mille francs en faveur de M. Martin

» 2^o Le sieur LAMY, ancien ouvrier, puis contre-maitre à Rouen et près de Paris, a présenté au concours une invention qu'il a mise en pratique dès l'année 1822, dans le département de la Seine-Inférieure, perfectionnée depuis lors, et introduite dans une grande fabrique du département de la Seine, elle s'applique fort avantageusement à l'épuration du soufre opération manufacturière qui, malgré certaines améliorations faites à Marseille offrait encore des inconvénients et de grands dangers en effet, parfois elle donnait lieu à la formation de mélanges détonants, dont l'explosion, dans de vastes chambres en maçonnerie, compromettait la vie des hommes

» Les moyens et appareils simples et économiques imaginés et mis en usage par M. Lamy, ont complètement changé l'état des choses le soufre est d'abord soumis à une épuration qui sépare sans frais l'eau, les débris organiques et les matières minérales plus lourdes, très-facilement décanté ensuite dans un cylindre clos, sans émanations ni pertes sensibles, il est entièrement distillé, ne laissant qu'un faible résidu pulvérulent Plusieurs opérations se succèdent sans démontage, et lorsque cette dernière mesure devient utile, un obturateur mobile intercepte la communication avec la chambre, et prévient la formation de l'acide sulfureux, en même temps que l'introduction des cendres dans les chambres

» D'ailleurs les chambres en briques, solidement maintenues et cimentées, sont munies de larges soupapes faciles à soulever Toutes ces dispo-

sitions ont tellement atteint le but de l'auteur, qu'aucun accident, même le plus léger, n'est survenu depuis leur adoption, et que les produits obtenus sous les formes de soufre raffiné en *fleur* et en *canon*, ont constamment réuni les meilleures qualités commerciales

Le problème de l'épuration du soufre par des procédés et appareils salubres et économiques, se trouvant ainsi résolu sans rien laisser à désirer, la Commission a voté en faveur du sieur Lamy un prix de *trois mille francs*

» 3^e Dans plusieurs localités, de graves inconvénients sont résultés de la stagnation et des infiltrations souterraines des eaux provenant des féculeries

Un étang aux environs de la capitale en fut naguère infecté, les eaux des puits sont souvent devenues putrides par de semblables infiltrations, et surtout lorsque, sous l'influence des matières organiques, le terrain abondant en sulfate calcaire donnait lieu à la formation de sulfure, et par suite à la production de l'hydrogène sulfure

Telle était, avant 1839, la situation fâcheuse de la féculerie de Trappes, dont les eaux putréfiées répandaient au loin leurs émanations et menaçaient d'altérer les grands bassins-réservoirs des eaux de Versailles MM JARRIN et LONGCOTÉ, directeurs de l'usine et des cultures de M Dailly, mettant à profit les données de la science, parvinrent, par des dispositions ingénieuses et nouvelles, à repandre en utiles irrigations, successivement absorbées, toutes ces eaux durant chaque campagne

Les dépôts même, si facilement putrescibles, furent, par leurs soins intelligents, réunis à une dessiccation économique, et convertis en un engrais pulverulent

Réalisant ainsi la valeur théorique de ces deux résidus, appliqués comme agents de la fertilité du sol, ils ont changé une cause d'insalubrité et de dépréciation de la propriété en une source de véritables profits

» Un tel moyen, évidemment efficace et économique de rendre salubre un des arts agricoles les plus utiles, est digne d'être cité comme exemple, et c'est non seulement pour récompenser MM Jarrin et Longcoté, mais encore afin d'encourager les manufacturiers et les agriculteurs à les imiter, que la Commission leur décerne un prix de *deux mille francs* »

PRIX DE MEDECINE ET DE CHIRURGIE

RAPPORT SUR LES PRIX DE MÉDECINE ET DE CHIRURGIE POUR L'ANNÉE 1842

(Commissaires, MM Bieschet, Double, Serres, Duméril, Larrey, Magendie, Roux, de Blainville, Ponsset, Velpeau, Andral rapporteur)

La Commission chargée par l'Académie d'examiner les travaux relatifs à la médecine et à la chirurgie, et de lui proposer pour eux des prix ou des récompenses, s'il y avait lieu, a eu à juger les travaux de vingt-six auteurs, elle a dû rechercher, parmi ces travaux, quels étaient ceux qui pouvaient être regardés comme ayant plus ou moins contribué au perfectionnement de l'art de guérir. Neuf seulement lui ont présenté ce caractère, ce sont ceux de MM STROMEYER, DIEFFENBACH, BOURGERY et JACOB, THEIBERT LONGET, VALLEIX, AMUSSAT, SERRURIER et ROUSSEAU, PHILIPPE BOYER.

Depuis quelques années, une opération nouvelle, ayant pour but de remédier au strabisme, a été introduite dans la chirurgie. Imaginée et proposée d'abord par M Stromeyer de Hanovre, et pratiquée par lui sur des cadavres, en 1838, elle fut exécutée pour la première fois sur l'homme vivant par M Dieffenbach, de Berlin, en 1839. Dans un court espace de temps, ce chirurgien la pratiqua un très-grand nombre de fois, et le bruit des succès qu'il obtint ne tarda pas à se répandre. Des ce moment, en plusieurs pays de l'Europe, on répéta l'opération pratiquée par le chirurgien de Berlin, soit en la pratiquant exactement comme lui, soit en la modifiant. Dans l'espace de deux années, un très-grand nombre d'individus atteints de strabisme furent ainsi opérés avec des succès divers. Cependant l'utilité réelle de l'opération du strabisme n'était point encore généralement reconnue, et l'on pouvait encore douter de sa valeur, lorsque plusieurs des chirurgiens qui l'avaient pratiquée vinrent soumettre à l'Académie des Sciences l'exposé des heureux résultats qu'ils disaient avoir obtenus, et les présentèrent comme un titre au prix Montyon.

Ainsi saisie de la question, la Commission des prix de Médecine et de Chirurgie, pour l'année 1841, ne se trouva pas suffisamment éclairée. Elle suspendit en conséquence son jugement, et renvoya à de futurs concours les travaux relatifs à l'opération du strabisme, travaux dont elle se plut d'ailleurs à reconnaître toute l'importance.

Cependant, depuis que cette décision a été prise, l'opération du stra-

bisme a été de plus en plus étudiée, sa valeur véritable a pu être mieux appréciée et aujourd'hui la Commission pense qu'à l'égard des travaux qui sont relatifs à cette opération il n'y a pas lieu à un nouvel ajournement. L'opération du strabisme lui parut en effet compter maintenant assez de succès tels pour être introduite et définitivement admise dans la pratique de la chirurgie.

En conséquence la Commission a l'honneur de proposer à l'Académie de décerner à MM. Stromeyer et Dieffenbach un prix de *six mille francs*, qu'ils partageront. Elle le décerne à M. Stromeyer pour avoir le premier institué et exécuté sur des cadavres l'opération du strabisme, et à M. Dieffenbach pour avoir le premier pratiqué avec succès cette opération sur l'homme vivant.

* Cependant plusieurs chirurgiens, entre autres M. Bonnet, chirurgien en chef de l'hôpital de Lyon, M. Julien Boyer, de Paris, M. Ferrall, de Londres etc., ont apporté des modifications, et sans doute des perfectionnements aux procédés employés d'abord par le chirurgien de Berlin. La Commission rend justice à leurs efforts, elle ne doute pas que ces efforts et les tentatives diverses ne contribuent à accroître l'utilité de l'opération du strabisme. Mais pour récompenser ces travaux suivant leur mérite il faut qu'on ait pu, par une lente et mûre comparaison, apprécier les résultats de chacun d'eux plus complètement qu'il n'a été possible de le faire jusqu'à présent. La Commission actuelle pense donc qu'il y a lieu à ajourner tout jugement sur la valeur respective des modifications apportées à l'opération primitive du strabisme comme la Commission précédente avait pensé qu'il y avait lieu à ajourner tout jugement sur la valeur de l'opération elle-même.

Les travaux relatifs à l'opération du strabisme ont paru à la Commission les seuls auxquels un prix dût être décerné parce que seuls ils portent le caractère de l'invention. Ceux dont il nous reste à parler nous ont paru toutefois encore assez recommandables sous d'autres rapports, pour mériter des récompenses ou des mentions honorables.

* Sous le titre d'*Iconographie d'anatomie chirurgicale et de médecine opératoire*, MM. BOURGAT et JACOB ont publié un ouvrage qui a paru à la Commission devoir rendre à la chirurgie de véritables services. Dans des planches parfaitement exécutées, et qui leur ont coûté un immense travail, ils ont représenté tous les procédés, toutes les méthodes opératoires sans exception, ce qui n'avait encore été fait aussi complètement par personne. La fidélité et l'exactitude de ces représentations sont telles, qu'elles peuvent singulièrement faciliter l'étude des opérations et en guider la pratique. En

outre, les auteurs ont donné des figures toutes nouvelles et très-utiles, ou se trouvent retracés, soit les voies de communication des divers organes, soit leurs différens modes d'isolement

La Commission propose à l'Académie d'accorder une récompense de cinq mille francs aux auteurs de l'*Iconographie d'anatomie chirurgicale et de médecine opératoire*

» Sil est incontestable que les progrès de la médecine sont dus en grande partie au soin avec lequel, depuis deux siècles surtout on a étudié les altérations que les maladies impriment aux organes on doit accueillir avec faveur les efforts tentés en sens divers pour pouvoir représenter ces altérations dont de simples descriptions ne sauraient toujours donner une idée suffisante à ceux surtout qui n'ont pas été en position de les voir. Sous ce rapport les pièces artificielles d'anatomie pathologique faites par M. le docteur THIBERT doivent être considérées comme un travail propre à rendre service à la Médecine et à la Chirurgie et à en aider les progrès. M. Thibert est parvenu en effet à reproduire avec une fidélité remarquable toutes les pièces possibles d'anatomie pathologique. Après les avoir représentées par des dessins coloriés dont la Commission a pu apprécier toute l'exactitude il les moule puis il coule dans le moule une matière analogue au carton-pierre et il applique ensuite les couleurs à cette matière les parties altérées se trouvent ainsi reproduites de la manière la plus exacte dans leurs formes dans leurs reliefs dans leur coloration. La Commission s'est assurée que ces pièces subsistent sans se détériorer l'épreuve du temps on peut en tirer autant d'exemplaires qu'il est nécessaire, et leur prix est infiniment moins élevé que celui des pièces en cire.

La Commission a examiné avec soin la collection des pièces de M. Thibert, elle a été frappée de la fidélité avec laquelle étaient représentées, par exemple, jusque dans leurs plus minutieux détails, les maladies de la peau, celles des membranes muqueuses, et en particulier les altérations des follicules intestinaux dans la fièvre typhoïde, un grand nombre d'affections du cerveau du foie, des poumons, des organes génito-urinaires, du système osseux. Elle est restée convaincue qu'il n'était guère d'altérations des organes, produites par la maladie, que le procédé de M. Thibert ne pût exactement représenter, et qu'indépendamment de l'utilité qui pourrait en résulter pour l'instruction isolée des médecins, l'enseignement théorique et pratique de la pathologie devrait en tirer un grand avantage.

En conséquence, la Commission propose à l'Académie d'accorder à

M Thibert une récompense de quatre mille francs pour ses pièces artificielles d'anatomie pathologique

La Commission a jugé également dignes de récompense deux ouvrages, l'un de M le docteur LONGET, intitulé *Anatomie et physiologie du système nerveux de l'homme et des animaux vertébrés, avec des observations pathologiques relatives au système nerveux de l'homme*, et l'autre de M le docteur VALLEIX, intitulé *Traité des névralgies, ou affections douloureuses des nerfs*

M Longet a retracé dans son ouvrage une histoire complète de la structure et des fonctions du système nerveux de l'homme et des vertébrés. Si à cela se bornait le travail de M Longet, tout en lui donnant de légitimes éloges nous n'aurions pas pu l'admettre à concourir pour les prix de Médecine et de Chirurgie mais dans cet ouvrage il y a une partie pathologique, et c'est celle là seule que la Commission dans sa spécialité, pouvait être appelée à récompenser. D'abord M Longet s'est heureusement servi de ses faits anatomiques et physiologiques comme d'arguments souvent puissants pour infirmer ou confirmer les opinions des pathologistes sur la valeur séméiologique des différents troubles de l'action nerveuse. Mais surtout il a réuni un très grand nombre de faits relatifs aux maladies du système nerveux et qui jusque-là, étaient restés le plus souvent épars et isolés dans les livres. En les rassemblant, il leur a donné une nouvelle valeur, car il a pu de cette façon les contrôler les uns par les autres, et les soumettre à une discussion qui n'est nulle part aussi complète que dans son livre, il a ainsi avancé nos connaissances sur la séméiologie du système nerveux maladies qui offraient encore longtemps un champ vaste aux investigations des médecins

Persuadée que tout effort, fait dans ce sens et qui porte quelque fruit, est utile et mérite encouragement, la Commission propose d'accorder à M Longet une récompense de trois mille francs pour la partie pathologique de son ouvrage sur l'anatomie et la physiologie du système nerveux

» M le docteur Valleix a publié sur les névralgies un traité qui, lui aussi, a été utile à l'art de guérir, en contribuant à donner une précision beaucoup plus grande au diagnostic de ces maladies, et en soumettant leur thérapeutique à une discussion plus approfondie qu'on ne l'avait fait jusqu'à lui. Un grand nombre de faits disséminés et comme perdus dans les auteurs, se trouvent rassemblés et analysés dans l'ouvrage de M Valleix avec une rigueur qui il serait à désirer qu'on trouvât plus souvent dans les ouvrages de pathologie. Les névralgies faciales et femoro poplitées y sont plus complé-

tement décrites qu'ailleurs. D'autres névralgies, comme la cervico-occipitale, la dorso-intercostale, la lombo-abdominale, plutôt indiquées que décrites par les auteurs qui ont précédé M. Valleix, ont été pour lui le sujet de recherches qui les font infiniment mieux connaître. La production isolée de la douleur sur certains points bien circonscrits des cordons nerveux, points le plus souvent les mêmes, est encore un fait qui, au double point de vue du diagnostic et de la thérapeutique, n'avait pas, avant le travail de M. Valleix, l'importance qu'il mérite, et qu'il a su lui donner.

D'après ces considérations, la Commission propose à l'Académie d'accorder une récompense de deux mille francs à M. le docteur Valleix pour son *Traité des Névralgies*.

• Pour terminer sa tâche, la Commission a encore à signaler à l'Académie quelques autres travaux auxquels elle lui propose d'accorder des mentions honorables.

Un habile chirurgien, dont plusieurs fois déjà l'Académie a récompensé les travaux, M. AMUSSAT, a présenté au concours, pour le prix Montyon de 1842, le résumé d'un grand nombre d'expériences, avec dessins et pièces pathologiques à l'appui, expériences entreprises sur les animaux vivants, et dans lesquelles il a essayé de prouver,

1° Qu'une plaie faite à une artère était susceptible de se cicatriser assez solidement et assez complètement pour qu'il fût possible, dans un grand nombre de cas, de se borner à comprimer une artère ouverte, au lieu de la lier,

2° Que la coagulation du sang, qui, à la surface des plaies, s'accomplit dans le bout des petites artères coupées, par suite de la rétraction de la tunique moyenne de ces vaisseaux, et de l'imprégnation, par le sang, de leur gaine celluleuse, donne lieu à la formation d'espèces de mamelons solides qui peuvent aider le chirurgien à trouver les artères qu'il s'agit de lier,

3° Qu'en intéressant, dans une blessure faite à un animal, une grosse artère, on peut toujours distinguer, au milieu du caillot formé par le sang épanché, une sorte de cratère ou de puits, dans l'étendue duquel le sang a une autre couleur et une autre consistance, et qui peut conduire directement l'instrument du chirurgien au point blessé de l'artère,

4° Qu'on peut produire chez les animaux diverses sortes d'anévrysmes par la blessure des vaisseaux.

Tout en rendant grande justice au zèle persévérant avec lequel M. Amussat s'est livré à ces expériences, tout en reconnaissant qu'elles ne sont ni sans intérêt ni sans importance, la Commission a pensé que le tra-

vail dont ce chirurgien a communiqué les résultats à l'Académie avait besoin d'être poursuivi pour rendre tout ce qu'il peut certainement donner, elle a été d'avis qu'il était nécessaire que l'observation sanctionnât chez l'homme l'utilité réelle dont pourraient être pour la chirurgie pratique plusieurs des résultats annoncés par M Amussat elle a cru surtout que le fait de la cicatrisation définitive des plaies des artères était un fait trop grave dans ses applications à l'espèce humaine, pour qu'on ne dût pas attendre que M Amussat l'ait démontré par des pièces anatomiques encore plus probantes, surtout par rapport à l'homme que celles qu'il a montrées à la Commission

• D'après ces motifs la Commission propose à l'Académie de mentionner honorablement les recherches expérimentales de M Amussat sur les blessures des vaisseaux sanguins en l'engageant à les poursuivre et à les compléter

• La Commission propose également d'accorder une mention honorable à MM Serrurier et Rousseau pour leur ouvrage sur les maladies des voies aériennes de l'homme et de certains animaux Elle pense que cette mention leur est due pour le zèle avec lequel ils ont étudié ces maladies et surtout pour la persévérance qu'ils ont mise à rechercher dans différents animaux des altérations des voies aériennes dont la comparaison avec les altérations analogues chez l'homme peut éclairer la nature de celles-ci MM Serrurier et Rousseau doivent voir dans cette mention qui leur est accordée pour la seconde fois en raison des additions qu'ils ont faites à leur travail, un nouvel encouragement donné à la direction de leurs recherches

La Commission, enfin a l'honneur de proposer à l'Académie d'accorder aussi une mention honorable à M le docteur Philippe Boyer pour avoir, dans un ouvrage spécial, fortement contribué à propager le traitement des ulcères par la compression à l'aide de bandelettes de diachylon gommé pour avoir fait profiter du bénéfice de ce traitement un grand nombre d'individus de la classe pauvre et avoir ainsi servi l'humanité

PRIX PROPOSÉS

POUR LES ANNÉES 1843 1844 1845 ET 1846

SCIENCES MATHÉMATIQUES

GRAND PRIX DES SCIENCES MATHÉMATIQUES

POUR 1840, REMIS AU CONCOURS POUR 1845

L'Académie rappelle qu'elle a proposé pour sujet du grand prix des sciences mathématiques qu'elle décernera, s'il y a lieu, dans la prochaine séance publique, la question remise au concours, et énoncée dans les termes suivants

Perfectionner les méthodes par lesquelles on résout le problème des perturbations de la lune ou des planètes, et remplacer les développements ordinaires en séries de sinus et de cosinus, par d'autres développements plus convergents, composés de termes périodiques que l'on puisse calculer facilement à l'aide de certaines Tables construites une fois pour toutes

Le prix consistera en une médaille d'or de la valeur de trois mille francs. Les Mémoires ont dû être arrivés au secrétariat de l'Académie avant le 1^{er} avril 1843. Ce terme était de rigueur.

GRAND PRIX DES SCIENCES MATHÉMATIQUES

PROPOSÉ EN 1844, POUR ÊTRE DÉCERNÉ EN 1847

L'Académie propose pour sujet du grand prix des sciences mathématiques de 1844, qu'elle décernera, s'il y a lieu, dans la séance publique de 1847, la question suivante

• Etablir les équations des mouvements généraux de l'atmosphère terrestre, en ayant égard à la rotation de la terre, à l'action calorifique du soleil, et aux forces attractives du soleil et de la lune

• Les auteurs sont invités à faire voir la concordance de leur théorie avec quelques uns des mouvements atmosphériques les mieux constatés.

Si la question n'était pas complètement résolue, mais que l'auteur d'un Mémoire eût fait quelque pas important vers sa solution, l'Académie pourrait accorder le prix.

Les pièces de concours devront être remises au secrétariat de l'Institut avant le 1^{er} mars 1847.

PRIX D'ASTRONOMIE,

FONDÉ PAR M DE LALANDE

La médaille fondée par M. de Lalande, pour être accordée annuellement à la personne qui, en France ou ailleurs (les membres de l'Institut exceptés), aura fait l'observation la plus intéressante, le Mémoire ou le travail le plus utile aux progrès de l'astronomie, sera décernée dans la prochaine séance publique

La médaille est de la valeur de 635 francs .

PRIX EXTRAORDINAIRE SUR L'APPLICATION DE LA VAPEUR A LA NAVIGATION

POUR 1844

Le Roi, sur la proposition de M. le baron Charles Dupin, ayant ordonné qu'un prix de *six mille francs* serait décerné par l'Académie des Sciences en 1836,

Au meilleur ouvrage ou Mémoire sur l'emploi le plus avantageux de la vapeur pour la marche des navires; et sur le système de mécanisme, d'installation, d'armement et d'armement qu'on doit préférer pour cette classe de bâtiments,

L'Académie annonça qu'elle décernerait le prix dans sa séance publique de 1836

Les auteurs des inventions présentées n'avaient pas donné aux Commissaires de l'Académie les moyens d'effectuer les expériences qui seules pouvaient en constater le mérite pratique. L'Académie remit donc la question au concours. De nouvelles pièces, de nouvelles inventions furent admises à concourir avec les premières

Aucun des Mémoires n'ayant paru digne du prix, l'Académie a proposé encore une fois la même question

Le prix, s'il y a lieu, sera décerné dans la séance publique de 1844. Les Mémoires devront être arrivés au secrétariat de l'Institut avant le 1^{er} mars 1844 .

PRIX DE MECANIQUE,

FONDÉ PAR M. DE MONTYON

« M. de Montyon a offert une rente sur l'Etat, pour la fondation d'un prix annuel en faveur de celui qui, au jugement de l'Académie royale des Sciences, s'en sera rendu le plus digne, en inventant ou en perfectionnant des instruments utiles aux progrès de l'agriculture, des arts mécaniques ou des sciences

Ce prix sera une médaille d'or de la valeur de *cinq cents francs*. Les ouvrages ou Mémoires adressés par les auteurs, ou, s'il y avait lieu, les modèles des machines ou des appareils, ont dû être envoyés, francs de port, au secrétariat de l'Institut avant le 1^{er} avril 1843

PRIX DE STATISTIQUE,

FONDÉ PAR M. DE MONTYON

« Parmi les ouvrages qui auront pour objet une ou plusieurs questions relatives à la *Statistique de la France*, celui qui, au jugement de l'Académie contiendra les recherches les plus utiles, sera couronné dans la prochaine séance publique. On considère comme admis à ce concours les Mémoires envoyés en manuscrit, et ceux qui, ayant été imprimés et publiés, arrivent à la connaissance de l'Académie sont seuls exceptés les ouvrages des membres résidents

« Les Mémoires manuscrits ou imprimés, adressés par les auteurs, ont dû être envoyés au secrétariat de l'Institut, francs de port, et remis avant le 1^{er} mai 1843

« Le prix consiste en une médaille d'or équivalant à la somme de *mille soixante francs*

« Les concurrents pour tous les prix sont prévenus que l'Académie ne rendra aucun des ouvrages envoyés au concours, mais les auteurs auront la liberté d'en faire prendre des copies

SCIENCES PHYSIQUES

GRAND PRIX DES SCIENCES PHYSIQUES

POUR 1845

L'Académie propose pour sujet du grand prix des Sciences physiques, qui sera décerné, s'il y a lieu, dans sa séance publique de 1845, la question suivante

Démontrer par une étude nouvelle et approfondie et par la description accompagnée de figures, des organes de la reproduction des deux sexes, dans les cinq classes d'animaux vertébrés, l'analogie des parties qui constituent ces organes, la marche de leur dégradation, et les bases que peut y trouver la classification générale des espèces de ce type

Une espèce bien choisie dans chaque classe, et telle que les faits avancés puissent être vérifiés et appréciés facilement par exemple, un lapin ou un cochon d'Inde pour la classe des mammifères, un pigeon ou un gallinacé pour celle des oiseaux, un lézard ou une couleuvre pour celle des reptiles, une grenouille ou une salamandre pour celle des amphibiens, et enfin une espèce de carpe, de loche ou même d'épinoche et de lamproie pour celle des poissons animaux que l'on peut tous se procurer partout en Europe communément, suffira sans doute pour fournir aux concurrents les bases de la démonstration demandée par l'Académie toutefois, ils devront aider habilement des faits acquis à ce sujet dans l'état actuel de la science de l'organisation, sur des animaux plus rarement à la portée de l'observation, comme les didelphes, les ornithorhynques, les raies et les myxiniés, sans la considération desquels, en effet, la démonstration resterait nécessairement incomplète

Les Mémoires devront être parvenus au secrétariat de l'Institut avant le 31 décembre 1845

GRAND PRIX DES SCIENCES PHYSIQUES

PROPOSÉ POUR 1845, ET REMIS AU CONCOURS POUR 1845

L'Académie rappelle qu'elle a proposé pour sujet d'un grand prix des Sciences physiques qui sera décerné, s'il y a lieu, dans sa séance publique de 1845, la question suivante

Determiner par des expériences précises les quantités de chaleur dégagées dans les combinaisons chimiques

Plusieurs physiciens distingués ont cherché à déterminer par des expériences directes les quantités de chaleur dégagées pendant la combinaison de quelques corps simples avec l'oxygène, mais leurs résultats présentent des divergences trop grandes pour que l'on puisse les regarder comme suffisamment établis, même pour les corps tels que l'hydrogène et le carbone, qui ont le plus particulièrement fixé leur attention

L'Académie propose de déterminer par des expériences précises

1° La chaleur dégagée par la combustion vive dans l'oxygène, d'un certain nombre de corps simples, tels que l'hydrogène, le carbone, le soufre, le phosphore, le fer, le zinc, etc., etc ;

2° La chaleur dégagée dans des circonstances analogues, par la combustion vive de quelques-uns de ces mêmes corps simples dans le chlore, .

3° Lorsque le même corps simple peut former, par la combustion directe dans l'oxygène, plusieurs combinaisons, il conviendra de déterminer les quantités de chaleur qui sont successivement dégagées,

4° On déterminera, par la voie directe des expériences, les quantités de chaleur dégagées dans la combustion par l'oxygène, de quelques corps composés binaires, bien définis, dont les deux éléments soient combustibles comme les hydrogènes carbonés, l'hydrogène phosphoré, quelques sulfures métalliques,

5° Enfin les expériences récentes de MM Hess et Andrews font prévoir les résultats importants que la théorie chimique pourra déduire de la comparaison des quantités de chaleur dégagées dans les combinaisons et de compositions opérées par la voie humide. L'Académie propose de confirmer, par de nouvelles expériences, les résultats annoncés par ces physiciens et d'étendre ces recherches à un plus grand nombre de réactions chimiques en se bornant toutefois aux réactions les plus simples. Elle émet le vœu que les concurrents veuillent bien déterminer, autant que cela sera possible, les intensités des courants électriques qui se développent pendant ces mêmes réactions, afin de pouvoir les comparer aux quantités de chaleur dégagées

EXTRAIT DU RAPPORT FAIT DANS LA SÉANCE
DU 27 JUIN 1842

M Regnault, au nom de la Commission chargée de l'examen des Mé-

moires adresses pour le prix sur la *chaleur spécifique des corps* (1841), Commission composée de MM Regnault, Gay-Lussac, Arago et Becquerel, fait un Rapport dont les conclusions sont

1° Qu'il n'y a pas lieu de décerner le prix, aucun Mémoire n'ayant été adressé sur ce concours,

2° Que la question soit retirée,

Et 3° qu'elle soit remplacée par celle de la *chaleur dégagée dans des combinaisons chimiques*

La Commission propose de doubler le prix, qui sera par conséquent de *six mille francs* (1)

Les Mémoires devaient être parvenus au secrétariat de l'Institut le 1^{er} avril 1845

• GRAND PRIX DES SCIENCES PHYSIQUES

PROPOSÉ EN 1837 POUR 1839, ET REMIS AU CONCOURS POUR 1845

L'Académie avait proposé pour sujet du grand prix des Sciences physiques de décerner, *dans la séance publique de 1839*, la question suivante, qu'elle a remise au concours pour 1843 (2)

Determiner par des expériences précises quelle est la succession des changements chimiques, physiques et organiques, qui ont lieu dans l'œuf pendant le développement du fœtus chez les oiseaux et chez les batraciens

Les concurrents devront tenir compte des rapports de l'œuf avec le milieu ambiant naturel, ils examineront par des expériences directes l'influence des variations artificielles de la température et de la composition chimique de ce milieu

Dans ces dernières années, un grand nombre d'observateurs se sont livrés à des recherches profondes sur le développement du poulet dans l'œuf, et, par suite, à des études analogues sur le développement du fœtus dans les autres animaux ovipares. En général, ils se sont occupés de cet examen au point de vue anatomique. Quelques-uns pourtant ont abordé les questions

(1) Une lettre ministérielle a approuvé cette proposition

(2) Les pièces adressées pour le concours de 1843 ne seront jugées que pendant l'année 1844

chimiques nombreuses et pleines d'intérêt que cet examen permet de résoudre

» Admettons, en effet, que l'on fasse l'analyse chimique de l'œuf au moment où il est pondue, que l'on tienne compte des éléments qu'il emprunte à l'air ou qu'il lui rend pendant la durée de son développement, enfin qu'on détermine les pertes ou les absorptions d'eau qu'il peut éprouver, et l'on aura réuni tous les éléments nécessaires à la discussion des procédés chimiques employés par la nature pour la conversion des matériaux de l'œuf dans les produits bien différents qui composent le jeune animal

En appliquant à l'étude de cette question les méthodes actuelles de l'analyse organique, on peut attendre le degré de précision que sa solution exige

Mais s'il est possible de constater par les moyens chimiques ordinaires les changements survenus dans les proportions du carbone, de l'hydrogène, de l'oxygène ou de l'azote, si ces moyens suffisent, à plus forte raison, en ce qui concerne les modifications des produits minéraux qui entrent dans la composition de l'œuf, il est d'autres alterations non moins importantes qui ne peuvent se reconnaître qu'à l'aide du microscope

» L'Académie désire que, loin de se borner à constater, dans les diverses parties de l'œuf, la présence des principes immédiats que l'analyse en retire, les auteurs fassent tous leurs efforts pour constater, à l'aide du microscope, l'état dans lequel ces principes immédiats s'y rencontrent

Elle espère d'heureux résultats de cette étude chimique et microscopique des phénomènes de l'organogénèse

Indépendamment de l'étude du développement du fœtus dans ces conditions normales, il importe de constater les changements que les modifications de la température ou de la nature des milieux dans lesquels ce développement s'effectue, peuvent y apporter Les concurrents auront donc à examiner pour les œufs d'oiseaux, leur incubation dans divers gaz, pour ceux des batraciens, leur développement dans des eaux plus ou moins chargées de sels, plus ou moins aérées »

Le prix consistera en une médaille d'or de la valeur de 3 000 francs Les Mémoires ont dû être remis au secrétariat de l'Académie avant le 1^{er} avril 1843

GRAND PRIX DES SCIENCES PHYSIQUES

PROPOSÉ POUR 1837 PUIS POUR 1839, ET ADMIS AU CONCOURS POUR 1845

L'Académie avait proposé pour sujet du grand prix des Sciences physiques et décerner en 1837, la question suivante

Determiner par des recherches anatomiques et physiques quel est le mecanisme de la production du son chez l'homme et chez les animaux vertebres et invertebres qui jouissent de cette faculte

Cette question n'ayant point été résolue, l'Académie, en 1837, la remit au concours pour l'année 1839, en la restreignant dans les termes suivants

Determiner par des recherches anatomiques, par des experiences d'acoustique et par des experiences physiologiques, quel est le mecanisme de la production de la voix chez l'homme et chez les animaux mammiferes

La question réduite à ces termes, ne fut point, non plus, résolue

Voici le Rapport de la Commission qui avait été chargée de juger les pieces adressees pour le concours

RAPPORT DE LA COMMISSION

Commissaires MM Savait, Magendie Breschet Flourens, de Blainville
rapporteur)

Six Mémoires ont été envoyés au concours

Iles n° 4 et 5, étant imprimés, avec le nom de leurs auteurs, n'ont pu être admis d'après l'une des conditions imposées aux concurrents, celle d'adopter une epigraphe et d'envoyer leur nom dans un billet cacheté

Des quatre autres concurrents deux seulement ont paru avoir senti la nature véritable et la difficulté de la question. Cependant la Commission n'a pas jugé leur travail digne du prix, par défaut de recherches anatomiques ou d'experiences d'acoustique suffisantes. En conséquence, elle déclare qu'il n'y a pas lieu à ce que le prix des Sciences physiques pour 1839 soit décerné

Mais, vu le grand intérêt du sujet, et dans l'espoir que les personnes qui ont déjà commencé un long travail pourront le perfectionner et ainsi atteindre le but, la Commission propose à l'Académie de remettre pour la troisième fois la question au concours, en la divisant en deux parties l'une limitée à l'espèce humaine et aux experiences d'acoustique et de physiologie, l'autre qui se bornerait aux recherches d'anatomie comparée dans

l'homme et chez les mammifères. Mais dans ce dernier cas, la Commission demanderait à l'Académie que la somme nécessaire pour l'établissement de ce second prix pût être prise sur les fonds Montyon en réserve »

L'Académie adopte les conclusions de ce Rapport

En conséquence, les deux questions suivantes sont proposées pour l'année 1843 (1)

1°. *Déterminer par des expériences d'acoustique et de physiologie quel est le mécanisme de la production de la voix chez l'homme*

2°. *Déterminer par des recherches anatomiques la structure comparée de l'organe de la voix chez l'homme et chez les animaux mammifères*

Chaque prix consistera en une médaille d'or de la valeur de 3 000 fr.

Les Mémoires ont dû être remis au secrétariat de l'Académie avant le 1^{er} avril 1843

PRIX DE PHYSIOLOGIE EXPERIMENTALE

FONDÉ PAR M. DE MONTYON

Feu M. le baron de Montyon ayant offert une somme à l'Académie des Sciences, avec l'intention que le revenu en fût affecté à un prix de Physiologie expérimentale à décerner chaque année, et le Roi ayant autorisé cette fondation par une ordonnance en date du 22 juillet 1818

L'Académie annonce qu'elle adjudgera une médaille d'or de la valeur de huit cent quatre-vingt-quinze francs à l'ouvrage, imprimé ou manuscrit, qui lui paraîtra avoir le plus contribué aux progrès de la Physiologie expérimentale

Le prix sera décerné dans la prochaine séance publique

Les ouvrages ou Mémoires présentés par les auteurs ont dû être envoyés au secrétariat de l'Institut avant le 1^{er} avril 1843

DIVERS PRIX DU LEGS MONTYON

Conformément au testament de feu M. le baron Auger de Montyon, et aux ordonnances royales du 29 juillet 1821, du 2 juin 1824 et du 23 août 1820, il sera décerné un ou plusieurs prix aux auteurs des ouvrages ou des découvertes qui seront jugés les plus utiles à *l'art de guerir*, et à ceux qui auront trouvé *les moyens de rendre un art ou un métier moins malalubre*

(1) Les pièces adressées pour le concours de 1843 ne pourront être jugées que pendant 1844

L'Académie a jugé nécessaire de faire remarquer que les prix dont il s'agit ont expressément pour objet des découvertes et inventions propres à perfectionner la médecine ou la chirurgie, ou qui diminueraient les dangers des diverses professions ou arts mécaniques

Les pièces admises au concours n'auront droit aux prix qu'autant qu'elles contiendront une *découverte parfaitement déterminée*

Si la pièce a été produite par l'auteur, il devra indiquer la partie de son travail où cette découverte se trouve exprimée dans tous les cas la Commission chargée de l'examen du concours fera connaître que c'est à la découverte dont il s'agit que le prix est donné

Les sommes qui seront mises à la disposition des auteurs des découvertes ou des ouvrages couronnés, ne peuvent être indiquées d'avance avec précision, parce que le nombre des prix n'est pas déterminé mais les libéralités du fondateur et les ordres du roi ont donné à l'Académie les moyens d'élever ces prix à une valeur considérable, en sorte que les auteurs soient dédommagés des expériences ou recherches dispendieuses qu'ils auraient entreprises, et reçoivent des récompenses proportionnées aux services qu'ils auraient rendus soit en prévenant ou diminuant beaucoup l'insalubrité de certaines professions, soit en perfectionnant les sciences médicales

Conformément à l'ordonnance du 23 août, il sera aussi décerné des prix aux meilleurs résultats des recherches entreprises sur les questions proposées par l'Académie, conséquemment aux vues du fondateur

Les ouvrages ou Mémoires présentés par les auteurs ont dû être envoyés, francs de port au secrétariat de l'Institut avant le 1^{er} avril 1843

PRIX RELATIF A LA VACCINE,

POUR 1842 (1)

L'Académie rappelle quelle a proposé pour sujet d'un prix de 10 000 francs, la question suivante

La vertu preservative de la vaccine est-elle absolue, ou bien ne serait-elle que temporaire?

(1) En 1842, l'Académie décida que, vu le grand nombre (trente cinq) des ouvrages envoyés au concours, le prix ne serait décerné que dans la séance de 1843

En 1843 la totalité des pièces n'a pu encore être soumise à un examen général, et l'Académie a arrêté que la Commission ne présenterait son Rapport que dans l'année 1844

Dans ce dernier cas, déterminer par des expériences précises et des faits authentiques le temps pendant lequel la vaccine préserve de la variole

Le cow-pox a-t-il une vertu preservative plus certaine ou plus persistante que le vaccin déjà employé à un nombre plus ou moins considérable de vaccinations successives?

En supposant que la qualité preservative du vaccin s'affaiblisse avec le temps, faudra-t-il le renouveler, et par quels moyens?

L'intensité plus ou moins grande des phénomènes locaux du vaccin a-t-elle quelque relation avec la qualité preservative de la variole?

Est-il nécessaire de vacciner plusieurs fois une même personne et dans le cas de l'affirmative, après combien d'années faut-il procéder à de nouvelles vaccinations?

Les Mémoires ont dû être remis au secrétariat de l'Académie avant le 1^{er} avril 1842

PRIX FONDÉ PAR M. MANNI,
POUR 1846

M. Manni, professeur à l'Université de Rome ayant offert de faire les fonds d'un prix spécial de quinze cents francs, à décerner par l'Académie sur la question des morts apparentes et sur les moyens de remédier aux accidents funestes qui en sont trop souvent les conséquences, et le Roi, par une ordonnance en date du 5 avril 1837, ayant autorisé l'acceptation de ces fonds et leur application au prix dont il s'agit, l'Académie avait proposé, en 1837 pour sujet d'un prix qui devait être décerné dans la séance annuelle de 1839 la question suivante

Quels sont les caractères distinctifs des morts apparentes?

Quels sont les moyens de prévenir les enterrements prématurés?

Sept Mémoires furent adressés à l'Académie, aucun d'eux ne fut jugé digne du prix, et il fut remis à l'année 1842

Depuis cette époque, l'Académie a reçu sept nouveaux Mémoires, et la Commission a décidé que, cette année encore il n'y avait pas lieu de décerner le prix

Ce sujet de prix est remis au concours pour l'année 1846

Voici quelques considérations sur lesquelles il est bon d'appeler l'attention des concurrents, et qui sont tirées du Rapport fait sur le concours

de 1844 par une Commission composée de MM. Andral, Magendie, Seirès, Bichat et Rayer rapporteur.

L'Académie croit devoir faire remarquer que les relations d'entente prématurées témoignent bien plus souvent de l'ignorance ou de la légèreté des auteurs de ces malheurs que de l'incertitude de la science. L'Académie demande non un tableau des erreurs déplorables qui ont pu être commises, mais un exposé des connaissances actuelles sur la question proposée. Ce qu'elle desire surtout, ce sont des observations propres à rendre plus prompt et plus sûr le diagnostic, dans le petit nombre de cas qui peuvent laisser de l'incertitude sur l'état de vie ou de mort.

Les Mémoires doivent être remis au secrétariat de l'Institut avant le 1^{er} avril 1846.

LECTURES

M. ARAGO, secrétaire perpétuel pour les sciences mathématiques, a lu dans cette séance publique des extraits d'une biographie de BAILLY.



COMPTE RENDU

DES SÉANCES

DE L'ACADÉMIE DES SCIENCES.

SÉANCE DU LUNDI 4 MARS 1844

PRÉSIDENCE DE M CHARLES DUPIN

MEMOIRES ET COMMUNICATIONS

DES MEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE L'ACADÉMIE

MÉCANIQUE APPLIQUÉE. — *Note additionnelle au Rapport sur le Mémoire de M Clapeyron, concernant le règlement des tiroirs dans les machines locomotives, et l'emploi de la détente, par M LAMÉ*

Après avoir indiqué le but et les résultats du travail de M Clapeyron, il m'a paru nécessaire de recueillir les faits, connus antérieurement, sur le règlement des tiroirs dans les machines à vapeur

Pour trouver la date des premiers efforts tentés dans le but d'opérer un vide moins imparfait derrière le piston, avant qu'il retourne sur ses pas, il faut remonter jusqu'à l'illustre Watt. Cette origine est mise hors de doute par la copie d'un dessin communiqué à M Campagnac, ingénieur de la marine, par M Miller, célèbre constructeur anglais (1) Ce dessin est dressé d'après les indications de Watt, et porte la date de 1805, il fait voir que,

(1) Voir sur ce sujet une correspondance intéressante, entre MM Miller et Campagnac, insérée dans les nos 4 et 5, année 1843, de la *Revue générale de l'Architecture et des Travaux publics*

des cette époque, Watt avait reconnu la convenance de déterminer les dimensions du tiroir et la position de l'excentrique, de manière à interrompre l'admission de la vapeur aux 0,87 de la course du piston, et a ouvert la communication avec le condenseur lorsque le bras de la manivelle a encore 24° degrés à parcourir avant d'atteindre le point mort.

Cette méthode fut conservée dans l'établissement de Watt et Bolton, à Soho, où M. Miller la recueillit vers 1814 ou 1815. Un petit nombre d'autres constructeurs en eurent connaissance par la même voie, et cet utile perfectionnement, dû au génie de Watt, resta pendant longtemps la propriété exclusive de quelques-uns de ses élèves.

Lorsque la marine française, après avoir importé d'Angleterre des machines destinées à l'armement de ses bâtiments à vapeur, eut fait construire sur les mêmes modèles d'autres appareils dans les établissements français, on fut frappé de la différence des effets obtenus avec ces diverses machines, en apparence identiques. Avec les appareils français, la production de vapeur était insuffisante, le nombre des coups de piston moindre, et les bâtiments marchaient moins vite, quoique la consommation du combustible fût plus considérable.

Il fut enfin reconnu que cette différence d'effets tenait uniquement à la *regulation des valves glissantes*, ou au règlement des tiroirs. Les appareils anglais arrêtant l'admission de la vapeur aux 0,8, et même aux 0,7, tandis que dans les machines françaises cette admission se prolongeait jusqu'à la fin de la course du piston.

Ce résultat est principalement dû à des recherches suivies avec persévérance par M. Reech, ingénieur de la marine. Dans un Rapport adressé le 7 décembre 1836, au Ministre de la Marine, M. Reech fait voir que l'infériorité des appareils français disparaîtrait si, par un simple déplacement du *toc* qui fixe la position de l'excentrique sur l'arbre de la manivelle, on ariétait l'introduction de la vapeur entre les 0,7 et les 0,8 de la course du piston (1).

Depuis, de nouvelles expériences faites à Lorient, pour recevoir les paquebots-postes de la Méditerranée, et d'autres expériences entreprises, en 1837, à Lorient et à Indret, sur les bâtiments à vapeur de la marine royale, ayant confirmé ses assertions antérieures, M. Reech revint ses calculs, les

(1) M. Hubert, directeur des constructions navales du port de Rochefort, dans un Rapport daté du 16 mars 1837, propose d'arrêter l'admission de la vapeur aux 0,8 de la course des pistons, sans autres modifications aux autres parties de la machine.

rendit plus complets, et en composa un Mémoire qu'il adressa à l'Académie avant le 1^{er} mai 1838, et qu'il retira en juin 1839 pour le remettre au Ministère de la Marine

L'un des résultats les plus saillants, renfermés dans le travail de M Reech, est compris dans l'énoncé suivant

Dans les machines à vapeur à basse pression disposées et proportionnées comme celles du *Sphinx* (bâtiment à vapeur de l'Etat) avec un tiroir qui doit fermer l'entrée de la vapeur aux 0,9 de la course si l'on avance ou recule le toc de l'excentrique sur l'arbre moteur de manière à faire varier le point de fermeture du tiroir depuis les 0,8 jusqu'à la course entière toute chose restant égale d'ailleurs le travail utile loin d'être proportionnel à la vapeur dépensée, est au contraire à son minimum quand la fermeture a lieu à la fin de la course et croît rapidement à mesure que l'on donne moins de vapeur jusqu'à ce que la fermeture ait lieu vers les 0,854. A cette fraction d'introduction correspond le maximum absolu de puissance. Pour une moindre fraction, la puissance diminue en même temps que la dépense, mais le rapport de cette puissance à la consommation ne cesse pas d'aller encore en augmentant.

Ce n'est pas ici le lieu d'analyser le savant Mémoire de M Reech les détails qui précèdent suffisent pour constater l'antériorité de ses recherches en ce qui concerne les machines établies sur les bâtiments à vapeur.

• Relativement aux machines locomotives, divers articles, insérés dans le *Rail-way magazine* (1), prouvent que les ingénieurs anglais ont successivement modifié le règlement des tiroirs, de manière à obtenir, en dernier résultat, une économie de combustible que M Wood évalue à 30 p 100. La disposition définitivement adoptée ne paraît pas remonter au delà du mois d'août 1840, elle fut établie l'année suivante sur plusieurs locomotives du chemin de fer de Liverpool à Manchester. Depuis, cette méthode s'est étendue dans toute l'Angleterre et sur le continent.

De son côté, M Clapeyron était arrivé à un résultat analogue par une voie théorique, et dès le mois de mai 1840, il établissait ses nouvelles dispositions sur la machine *le Creusot*. Toutefois, quoique ces deux perfectionnements sappuient évidemment sur le même principe, ils diffèrent quant à leurs applications. Les ingénieurs anglais ont pris pour but l'économie du combustible, M Clapeyron s'est proposé d'accroître la puissance de ses machines sans augmenter la consommation.

(1) Numéros des 27 novembre, 11 et 18 décembre année 1841.

Les deux méthodes nouvelles se distinguent en outre sur deux points essentiels : les constructeurs anglais n'interceptent pas la vapeur avant les 0,7 de la course du piston, M. Clapeyron adopte la limite de 0,65. Les premiers dans toutes leurs machines à vapeur suppriment complètement le recouvrement intérieur, tandis que M. Clapeyron regarde les deux recouvrements comme étant indispensables dans ses locomotives, la nécessité de les conserver résulte pour lui d'expériences comparatives qu'il a citées dans son *Mémoire*.

Au reste, la question du recouvrement intérieur, ou ce qui revient au même, celle de l'angle sous lequel commence l'échappement, se lie au temps que met la vapeur à perdre son excès de pression. Cet angle doit être plus petit lorsque les lumières d'évacuation sont plus larges, plus grand lorsqu'elles sont plus étroites. Or, M. Clapeyron, en faisant construire ses nouveaux cylindres, a notablement accru la largeur des conduits de vapeur et cette circonstance paraît expliquer l'avantage constaté d'un recouvrement intérieur dans ses machines en opposition avec la méthode anglaise.

Tels sont les faits historiques relatifs à la régulation des organes distributeurs dans les machines à vapeur. Il est remarquable qu'en Angleterre et en France, des hommes de pratique et de théorie soient ainsi arrivés à des résultats à peu près identiques, qu'il s'agisse de machines fixes, d'appareils pour les bâtiments à vapeur, ou de locomotives, sans que comme tout porte à le croire il y ait eu aucune liaison entre leurs travaux. Quand on pense à l'époque reculée à laquelle remonte la pratique de Watt on se demande comment une disposition aussi simple et qui, employée avec intelligence, peut ajouter 40 à 50 p. 100 au travail utile d'une quantité donnée de combustible, a pu rester pendant près d'un demi-siècle le secret d'un petit nombre de constructeurs. Nous voyons là un motif de se féliciter que l'Académie ait approuvé les conclusions du Rapport. La publicité donnée au travail de M. Clapeyron contribuera à répandre des notions utiles et provoquera des recherches nouvelles, indispensables pour éclaircir plusieurs points qui restent encore obscurs, tels que : la limite de la détente possible, sans l'emploi d'un appareil spécial, la nécessité absolue ou relative du recouvrement intérieur, enfin, la possibilité de s'opposer à toute perte de force qui proviendrait de la compression, en donnant des dimensions convenables à l'espace libre du cylindre et aux conduits de vapeur ».

M. DE JUSSIEU fait hommage à l'Académie de la deuxième partie de son *Traité élémentaire de Botanique* (Voir au *Bulletin bibliographique*)

RAPPORTS

PHYSIOLOGIE VÉGÉTALE — *Rapport sur un Memoire de M CASABEIA intitulé Recherches sur la composition de la canne creole cultivee a la Havane*

(Commissaires MM Pelouze Boussingault rapporteur)

L'Académie nous a chargés de lui rendre compte d'un travail de M Casabéa, sur la composition chimique de la canne du pays cultivée à la Havane

De toutes les cultures qui sont établies dans les îles des régions tropicales, celle de la canne offre le plus haut degré d'intérêt. Objet d'exploitations considérables le sucre est la principale source du commerce des Antilles, et de la prospérité de l'île de Cuba

En présence de cette importance il doit paraître surprenant qu'avant l'année 1839 la science n'eût pas encore enregistré une analyse exacte satisfaisante de la canne à sucre. L'Académie se rappelle en effet qu le premier travail d'ensemble sur l'industrie sucrière des colonies est dû à M Péligot. Au reste il est peut-être facile d'expliquer l'ignorance dans laquelle on est resté sur la véritable constitution de la canne à sucre, et sur la richesse réelle du suc. Pendant longtemps l'industrie sucrière des colonies a été des plus lucratives les planteurs jouissaient de cette sécurité qui chez les individus comme chez les nations naît d'un manque absolu de concurrence. Les tentatives peu fructueuses qui avaient été faites dans les parties les plus méridionales de l'Europe étaient de nature à rassurer complètement les colons contre la crainte de voir leur industrie s'acclimater dans l'ancien continent en même temps qu'elles les affermissaient dans la croyance que le soleil des tropiques était indispensable à une abondante production du sucre.

Les graves événements politiques qui agiterent le monde au commencement de ce siècle vinrent révéler aux planteurs combien leur sécurité était peu fondée. L'industrie européenne guidée par les lumières de la science avait placé la betterave au rang des plantes saccharifères et tels furent les progrès de la nouvelle industrie sucrière que bientôt elle devint compromettante pour les plantations des colonies.

Dés lors les colons accueillirent, provoquèrent même des recherches dont jusqu'à ce jour ils avaient méconnu l'utilité, et ce fut dans cette enceinte qu'un

chimiste que l'Académie a souvent encouragé, M Péligré, apprit aux cultivateurs des Antilles, a ceux des possessions anglaises dans les Indes, la richesse réelle de la canne à sucre, et en même temps les pertes énormes, incroyables, qui ont lieu par suite de l'imperfection de leur fabrication. Ainsi il fut prouvé que la canne ne renferme pas deux espèces distinctes de matières sucrées, l'une cristalline et l'autre sirupeuse, comme on l'admettait communément, et que la canne, qui rend ordinairement par les procédés actuels 60 à 100 p 100 de sucre marchand (1), en contient réellement 18 à 19. La canne ne contenant en définitive, que du ligneux, de l'eau, du sucre et quelques millièmes de substances salines, on reconnaît, d'après sa composition, que, durant l'action du moulin, on éprouve, par le vésou qui reste dans le ligneux, une perte tellement considérable, qu'en faisant même une très-large part à l'imperfection des pressoirs établis à la Martinique ou à la Guadeloupe, on n'y croit pas sans quelque difficulté.

Il était donc à désirer que les analyses de M Péligré, qui avaient été faites à Paris sur des produits conservés et préparés dans les Antilles françaises, fussent répétées sur les lieux mêmes de la culture de la canne. C'est ce qui a été fait à la Havane par M Casaseca. Cet habile professeur a opéré sur la variété connue sous le nom de *cana de la tierra*. Le vésou a été recueilli au moment même où il découlait du pressoir, et la matière solide qui s'y trouvait dissoute a été obtenue par une évaporation dans le vide sec, exécutée à la température ordinaire de l'atmosphère, cette matière était, à quelques millièmes près, du sucre cristallin et presque sans couleur. Deux analyses concordantes ont indiqué dans le vésou de la canne créole de Cuba

Sucre cristallin	20,94
Eau	78,80
Matières minérales	0,14
Matières organiques autres que le sucre	0 12
	100,00

La proportion si minime de matières minérales renfermées dans le vésou examiné s'accorde presque complètement avec les analyses de M Péligré, quand on les corrige de quelques erreurs de plume qui, suivant M Casaseca, se sont évidemment glissées dans le Mémoire du chimiste français. Cet accord dans la proportion pour ainsi dire insignifiante des sels du vésou, est

1) Dans Venezuela, d'après M Godazzi, le rendement moyen est porté à 7,5

pour M Casaseca le motif qui l'empêche d'admettre, avec M Pélégot l'action que ces matières salines exercent sur la formation de la mélasse

Si la composition du vesou de la canne de la *tierra* de la Havane est identique à celle de la canne d'Otaïti, il n'en est plus de même pour la constitution du végétal considéré dans son ensemble. La canne de la *tierra* renferme une proportion de ligneux beaucoup plus élevée elle est composée d'après M Casaseca, de

Eau	65,9
Sucre et sels minéraux	47 7
Ligneux, etc	16 4
	<hr/> 100,0

Les analyses de M Pélégot ne portent qu'à environ 10 pour 100 le ligneux de la canne d'Otaïti

Cette différence dans la proportion du ligneux contenu dans des cannes à sucres de variétés diverses méritait d'être signalée, elle fixera, sans aucun doute, l'attention des planteurs, et elle rend raison des quantités variables de bagasse fournies par la canne. Quelques essais exécutés par M Casaseca lui ont donné les résultats suivants

Avec 100 de canne cristalline on a obtenu	bagasse	65,0
id <i>rubancee</i> ,	id	55 0
id d Otaïti,	id	43,5

Ces chiffres parlent d'eux mêmes et font voir qu'il ne fallait pas se hâter de conclure d'analyses faites sur une variété, la canne d'Otaïti que le ligneux qui forme la charpente solide du végétal y existe en moyenne dans la proportion de 9 à 11 pour 100. Nous venons de voir que la *cana de la tierra* en renferme 0,16, et, d'après les considérations développées dans le Mémoire de M Casaseca, il est extrêmement probable que la variété cristalline qui laisse au moulin une si forte quantité de bagasse renferme de 25 à 30 de ligneux. C'est là, au reste, un point que l'auteur soumettra à un plus ample examen, immédiatement après son arrivée à Cuba

M Casaseca termine son intéressant Mémoire par un examen critique d'un procédé inventé en *Europe* et proposé pour le traitement de la canne en *Amerique*. Ce procédé, qui a été appliqué à la betterave, votre rapporteur ne saurait dire si ça été avec profit, consisterait à dessécher d'abord la canne coupée en tranches, pour la traiter ensuite par l'eau à l'aide de la méthode de macération. M Casaseca montre, dans sa critique, une

connaissance profonde des exigences de la fabrication, et des difficultés locales qu'elle peut offrir ainsi, dans plusieurs *ingenios*, on passe au moulin pendant la campagne, de 6 à 7 millions de kilogrammes de canne. Ce chiffre pose, M Casaseca demande aux partisans de la nouvelle méthode si la dessiccation d'une masse aussi enorme de matière pourra s'opérer sans danger par la simple exposition au soleil, dans un pays où l'air est presque toujours saturé d'humidité. A cette crainte, qui nous paraît fondée, on doit ajouter qu'il ne faut réellement que quelques heures d'exposition de la canne à l'air, pour y voir développer un germe d'acidité. Quant aux étuves, M Casaseca les croit inapplicables, à cause de la cherté des constructions et de la rareté du combustible. Enfin, l'énorme quantité d'eau qu'exigeait le procédé de la macération suffirait pour le faire repousser de l'île de Cuba. En effet, M Casaseca trouve que, dans un *ingenio* où l'on traite 6 à 7 millions de kilogrammes de canne, il faudrait environ 22 millions de litres d'eau chaude. Or, les habitations de l'île les mieux pourvues en eau n'ont à peine la quantité nécessaire pour la boisson des nègres et les besoins domestiques.

Néanmoins cette proportion d'eau indiquée par l'auteur paraît exagérée, car, théoriquement, rien ne suppose à ce que, la canne étant desséchée en partie, on fasse usage de vesou, extrait d'une autre partie de la canne comme liquide de lavage. De telle façon qu'en se servant des procédés connus dans l'art du salpêtrier pour le lavage méthodique du platras, on aurait, d'une part, du vesou saturé de sucre, et, de l'autre, un résidu de canne à sucre lavée, que la pression ramènerait à l'état de bagasse.

D'ailleurs, il y a beaucoup de localités où, comme à la Martinique et à la Basse-Terre de la Guadeloupe, les eaux sont suffisamment abondantes.

Après avoir fait ressortir les inconvénients que présenteraient la dessiccation et la macération de la canne desséchée, dans l'île de Cuba, M Casaseca signale les avantages que présentent les appareils imaginés pour le traitement de la canne et la cuite, par deux constructeurs français, MM Derosne et Cail. A l'aide de ces appareils, on obtient en abondance, pendant la cuite, l'eau qui faisait partie du vesou, c'est là une grande ressource dans certains établissements, car il suffit d'aérer cette eau pour la rendre potable. Quant au combustible, celui que fournit la bagasse suffit amplement.

Les Commissaires ont cru devoir insister sur cette partie du Mémoire de M Casaseca, c'est parce que le procédé de la dessiccation de la canne et de la macération a été recommandé à M le Ministre de la Marine et des Colonies.

On voit que, malgré les belles recherches de M Pélégot sur la canne de la Martinique, le travail de M Casaseca démontre que les questions techniques qui se lient à l'industrie sucrière sont loin d'être épuisées. Il serait donc à désirer, dans l'intérêt de cette belle industrie coloniale, que ces questions continuassent à être examinées sur les lieux mêmes de la production de la canne par un chimiste exercé. M Casaseca qui est un élève distingué d'un de nos illustres confrères, est, par ses connaissances, à la hauteur d'une semblable mission. Aussi verrions-nous avec plaisir l'Académie s'associer aux vœux que nous formons pour que le gouvernement espagnol et les autorités locales prêtent leur appui au professeur de l'université de la Havane, en le mettant à même d'accomplir dignement des recherches qui intéressent à un haut degré la science agricole et l'industrie coloniale.

En résumé, le Mémoire de M Casaseca renferme des documents précieux, des renseignements utiles, et le détail des analyses qui s'y trouvent consignées prouve que l'auteur est au niveau de la science.

En conséquence, nous avons l'honneur de vous proposer d'adresser des remerciements à M Casaseca pour son intéressante communication.

Les conclusions de ce Rapport sont adoptées.

NOMINATIONS

L'Académie procède, par la voie du scrutin, à la nomination de la Commission qui sera chargée de l'examen des pièces adressées au concours pour le grand prix des Sciences mathématiques, année 1844.

MM. Liouville, Binet, Arago, Poinso, Cauchy, réunissent la majorité des suffrages.

MEMOIRES LUS

ORNITHOLOGIE — *Remarques sur quelques points de l'anatomie et de la physiologie des Procellariées, et essai d'une nouvelle classification de ces oiseaux, par MM HOMERON et JACQUINOT* (Extrait par les auteurs)

(Commissaires, MM de Blainville, Flourens, Isidore Geoffroy Saint-Hilaire)

Dans la première partie de ce Mémoire, qui traite des mœurs des Albatros et des Pétrels, nous nous efforçons de prouver :

Que ces oiseaux sont les seuls qui soient essentiellement pélagiens, qu'ils ne vivent que de mollusques ptéropodes et céphalopodes, et de crustacés

quelquefois de cadavres de cétacés, mais jamais de poissons. Leurs habitudes, leur vol, leurs allures, la forme de leur bec paraissent s'y opposer, du reste les poissons manquent dans les parages que fréquentent habituellement les Albatros et les Pétrels.

Les Pétrels ne possèdent point, comme on l'a souvent répété, la faculté d'annoncer les tempêtes, si alois ils suivent constamment les navires, c'est pour se nourrir des excréments qui en tombent car ils ne trouvent point de nourriture ailleurs.

Ils ne se posent jamais sur les agrès des navires, leur conformation leur rendant cet acte impossible.

Leur présence en grand nombre n'annonce point le voisinage des terres mais seulement une abondance de crustacés et mollusques dont ils font leur nourriture, etc etc.

Dans la deuxième partie, nous traitons de la distribution géographique de ces oiseaux. Contrairement à l'opinion de Cuvier et des auteurs, qui regardent les oiseaux grands voiliers comme devant être répandus partout vu la puissance de leur vol, nous pensons qu'ils ont des limites de climat et d'habitation. Les Pétrels habitant les glaces du Nord ne sont point ceux du sud et entre ces deux extrêmes vivent d'autres espèces qui ne s'éloignent point des zones torride et tempérée. Les saisons et quelques circonstances atmosphériques reculent quelquefois les limites de leur habitation ordinaire. Les Pétrels antarctique et de neige, habitant les glaces du Sud, quittent-ils pendant l'hiver ces climats glaces où règne une nuit continuelle ou bien seraient-ils diurnes pendant la moitié de l'année, nocturnes pendant l'autre moitié, etc ?

La troisième partie traite de la classification. Frappés de l'imperfection des caractères zoologiques qui servent à classer ces oiseaux, nous en avons cherché d'autres dans le reste de l'organisation, et nous croyons en avoir trouvé de plus rationnels dans la conformation intérieure du bec qui, en effet présente dans les diverses espèces de notables différences. D'après ces caractères, tous les genres de la famille des Procellariidées peuvent se rattacher à trois types très-naturels et bien limités, de la trois divisions.

Première division — Bec en général plus long que la tête, bords des mandibules creusés d'une gouttière qui rend pour ainsi dire chaque bord double en le divisant en deux lames tranchantes, l'une extérieure, l'autre intérieure. La langue est petite, ayant environ le tiers de la longueur du bec, elle est en forme de fer de lance, dentelée et en arrière sur les côtés. A cette division appartiennent les genres suivants

• Premier genre *Diomedea*, L — Bec plus long que la tete, robuste crochu, extrémite de la mandibule inférieure tronquée, narines s'ouvrant sur les côtes du bec à peu de distance du front en deux tubes dents minces allongées, tranchantes absence totale de ponce

• Espèces *D exulans* L — *D Drachyura* Temm — *B fuliginosa* Gm — *D Melanophris*, Temm — *D chlororhynchos*, Lath

Nous avons trouvé dans les mers du cap Horn un Albatros de la taille et de la couleur du *Chlororhynque*, qui, au lieu d'une seule bande jaune sur le bec en présente deux latérales il formera peut être une espèce nouvelle Nous avons aussi aperçu dans les memes parages un Albatros de la taille du précédent et dont le plumage était entièrement blanc

Deuxieme genre *Puffinus*, Cuv — Bec de la longueur de la tete droit assez large a la base, comprimé a la pointe qui est crochue mandibule inférieure terminée en pointe suivant la courbure de la mandibule supérieure Dents peu distinctes, se confondant avec le bord intérieur Voûte palatine garnie de papilles cornees, aigues Langue petite en fer de lance, hérissée sur les côtés de papilles presque jusqu'à l'extrémite Ce genre se divise en deux sous genres

Premier sous genre *Puffinus* — Bec grele Narines ovales regardant en haut et un peu en avant s'ouvrant en deux tubes distincts faisant a la base du bec une legere saillie et séparées par un assez large espace qui se continue avec la voûte du bec Voûte palatine garnie de deux rangées de papilles longues, dures et aigues — Espèces *Puff Anglorum*, Penn — *Pr obscura* L — *Pr fuliginosa*? etc

Deuxieme sous-genre *Profinus*, Nob — Bec de la meme longueur que dans le sous-genre precedent mais plus gros, plus solidement articulé a suture plus apparentes Les narines regardent en avant et s'ouvrent dans un véritable tube nasal, qui fait à la base du bec une forte saillie Le palais presente trois rangées de papilles une médiane dans toute la longueur du bec et deux latérales — Espèces *Pr cinerea*, Forst — *Pr æquinoctialis* Edw etc — *Pr arctica*?

Troisieme genre *Thalassidroma*, Vig — Bec court moins long que la tete, mince crochu Absence de dents le bord intérieur se continuant jusqu'à la pointe Deux rangées de papilles au palais Langue plus longue que chez les précédents Jambs demi-nues tarses longs et greles — Espèces *Pr pelagica*, L — *Pr Leachii*, Temm — *Th oceanica*, Ch Bonap — *Pr fregatta*, Lath — *Pr marina*, Lath, etc

Deuxieme division — Elle comprend les espèces dont le bord de la man-

mandibule supérieure est garni de nombreuses lamelles transverses Jusqu'ici ce groupe n'a été représenté que par une seule espèce, le *Prion caeruleus*, dont le bec revêtu à l'intérieur de lames analogues à celles des canards, la fait séparer des autres Pétrels comme genre Mais l'examen du bec de plusieurs Pétrels nous a fait découvrir chez quelques uns des lames analogues Ainsi le Duculot, le Fulmar, le P géant, présentent des lames qui, sans être aussi longues que chez le Prion, n'en sont pas moins très distinctes — Ce groupe pourrait être considéré comme un seul genre, le genre *Prion*, ainsi caractérisé bords de la mandibule supérieure garnis de lamelles nombreuses Langue de la longueur du bec, large, épaisse, libre seulement à la pointe — Les subdivisions suivantes seraient alors des sous-genres

Premier sous genre *Prion*, Lacép — Bec moins long que la tête, très large à la base voûté, dilaté, comprime à la pointe qui est petite et faible Narines petites présentant deux ouvertures à l'extérieur d'un même tube Bords de la mandibule supérieure garnis de lamelles fines, serrées et très nombreuses Bord de la mandibule inférieure large, obtus Vestiges de dents Langue épaisse, libre seulement à l'extrémité, adhérent et se confondant presque en arrière et sur les côtes avec les parois intérieures du bec

Une seule espèce, le *Prion caeruleus*, décrit sous les noms de *Vittata*, *Cærulea*, *Forsteri* et peut-être *Turtur*

Deuxième sous-genre *Daption*, Steph — Bec moins long que la tête large, déprime, voûté, à pointe crochue assez forte Mandibule inférieure tronquée, deux petites dents Bord interne de la mandibule supérieure strié de lames courtes, obliques beaucoup plus écartées et moins nombreuses que chez le Prion Langue large, épaisse, de la longueur du bec

Espèces *Pr capensis*, Gm

Troisième sous genre *Fulmarus*, Leach — Bec de moitié moins long que la tête, gros, court, large à la base, fort, composé de pièces arrondies et solidement articulées Bords de la mandibule supérieure présentant des lames obliques, dures, courtes et obtuses, bord inférieur épais et arrondi Deux fortes dents courtes, tranchantes Une rangée de petites papilles cornées à l'extrémité antérieure de la voûte palatine Mandibule inférieure tronquée Langue large, longue, charnue, garnie en arrière de papilles fines et déliées — Espèces *Pr glacialis*, Gm

Quatrième sous-genre *Ossifraga* ? — Bec le plus gros et le plus robuste de tous les Pétrels, plus long et moins large proportionnellement que chez les précédents Narines placées dans un tube long, déprimé, large à la base, occupant les trois cinquièmes de la longueur du bec, la pointe en sort

pour se recourber brusquement Bords des mandibules épais, larges, sinueux le supérieur rayé de lames courtes, obliques, obtuses le bord inférieur présente aussi quelques stries dans son milieu Deux dents courtes, tranchantes Langue inconnue — Espèces *Pr gigantea*, Gm

Cinquième sous-genre *Procella*, Nob — Ce sous-genre est le passage des Prions aux vrais Pétrels Avec la forme du bec de ces derniers, il présente encore, comme chez les genres précédents, des lames, mais très-affaiblies Dents longues, minces, tranchantes Bord inférieur large, obtus — Espèces *Pr Garnotii*, Nob

Troisième division — Ici plus de doubles bords, plus de lames transverses Les mandibules sont simples, tranchantes, et offrent deux dents minces, allongées Nous n'avons pu examiner l'intérieur du bec de la plupart des espèces, aussi nous les réunissons, quant à présent, dans un seul genre — Genre *Procellaria*, L — Bords du bec simples, tranchants Dents minces, longues Voûte palatine lisse ou présentant quelques papilles déliées Langue de moyenne longueur intermédiaire à celle des Puffins et des Prions

La longueur du bec sépare ce genre en deux groupes Dans le premier, le bec est très court, il a à peine la moitié de la longueur de la tête, fort cependant, arrondi, très crochu — Espèces *Pr nivea*, Gm — *Pr desolata*, Lath — *Pr brevirostris*, Less, etc — Dans le second le bec est plus long, quoique avec les mêmes proportions Les principales espèces sont *Pr antarctica*, Gm — *Pr Lessonii*, Garn — *Pr hasita*, Forst, etc

D'après cette classification, on voit que chez les Pétrels, tandis que les formes extérieures du bec sont à peu près les mêmes, l'intérieur offre les différences les plus tranchées On peut supposer, par analogie, qu'il en est de même chez les autres oiseaux Si ce fait se confirme, on conçoit toute son importance pour la classification ornithologique, si défectueuse et si peu naturelle Dans toute la série zoologique, les principaux et les meilleurs caractères sans contredit sont tirés des dents, pourquoi n'en serait-il pas ainsi chez les oiseaux? Les bords tranchants des mandibules, les lames cornees et les tubérosités qui revêtent l'intérieur de leur bec, ne sont qu'une modification de l'appareil dentaire des autres animaux D'après ces considérations, il nous semble que les caractères tirés de l'intérieur du bec et de la langue, réunis à ceux employés jusqu'ici, aideraient à perfectionner la classification ornithologique De plus, l'étude et la comparaison de ces caractères, basés sur l'anatomie et la physiologie, donneraient sur le mode et le genre de nourriture, des notions auxquelles se rattachent en grande partie les mœurs des oiseaux Dans l'examen des divers genres de la fa-

mille des *Procellariidées*, nous n'avons pas parlé d'un genre admis par tous les auteurs, le genre *Pelecanoude* de Lacép., *Halodroma* d'Illiger : c'est que cet oiseau, essentiellement plongeur, à ailes courtes, ne nous paraît pas être un Pétrel, et, loin d'être un Longipenne, ce serait un Brachyptère, sa place serait à côté du *Guillemot* nain, *Cephus alle*, dont il serait le représentant dans l'hémisphère austral.

MICROGRAPHIE — *Recherches microscopiques et physiologiques sur la tuberculisation*, par M. le docteur **LEBERT** (Extrait par l'auteur)

(Commissaires MM. Magendie, Serres, Andral)

1° Les éléments microscopiques constants du tubercule sont des granules moléculaires, une substance interglobulaire hyaline, et les corpuscules ou globules propres aux tubercules. Ils ont de 0^m.005 à 0^m.010, leur forme est irrégulière, anguleuse, à angles arrondis, leurs contours sont ordinairement très-distincts, ils renferment dans leur intérieur jaunâtre, un peu opalin, un certain nombre de granules moléculaires, mais point de noyaux. L'eau, l'éther et les acides faibles ne les altèrent presque pas, les acides concentrés, de même que l'ammoniaque liquide et la solution concentrée de potasse caustique, les dissolvent.

2° Les variations des dimensions des globules du tubercule sont indépendantes de l'âge et des organes dans lesquels les tubercules sont déposés. Le tubercule jaune cru est le plus propre pour leur étude.

3° L'opinion, que la substance tuberculeuse et ses globules ne soient qu'une modification du pus, est réfutée par l'inspection microscopique, qui montre des différences tranchées entre les corpuscules du tubercule et ceux du pus. Ces derniers sont plus grands, régulièrement sphériques, contenant de un à trois noyaux, et offrant une surface grenue, comme framboisée, ils sont ordinairement libres et isolés, tandis que ceux du tubercule, surtout à l'état cru, sont étroitement unis ensemble. Les globules du cancer sont deux à quatre fois plus grands et renferment un noyau, dans lequel on trouve souvent un à trois nucléoles.

4° Dans le sarcocèle, ainsi que dans le squarre et dans l'encephaloïde du sein, on rencontre quelquefois une substance jaunâtre caséeuse, qui ressemble beaucoup au tubercule, mais l'inspection microscopique n'y démontre que des noyaux de globules de cancer infiltrés de graisse. Ces noyaux, en saillant, peuvent offrir quelque ressemblance avec les corpuscules du tubercule.

5° Lorsque le tubercule se ramollit, sa substance interglobulaire se liquéfie, les corpuscules se désagregent, sarrondissent, et peuvent, en absorbant du liquide, paraître plus volumineux, cela ne constitue pas un accroissement, mais au contraire un commencement de décomposition

6° Le pus qui se trouve mêlé au tubercule ramolli provient des parties qui l'entourent, et n'est nullement une transformation de la substance tuberculeuse elle-même, mais le pus altère promptement le tubercule et rend ses éléments difficiles à connaître

7° Les globules du tubercule ramolli finissent par se dissoudre en un liquide granuleux, et le ramollissement passe ainsi à l'état de diffuence

8° L'état crétacé des tubercules se montre sous le microscope, sous forme de granules minéraux amorphes, mêlés souvent de cristaux de cholestérine et d'éléments de pigment Une partie des globules tuberculeux est alors resorbée, tandis qu'une autre peut persister pendant longtemps à l'état intact

9° On trouve quelquefois dans le tubercule de la graisse, de la mélancolie des fibres des globules verdatres, et des cristaux ayant la forme du phosphate ammoniaco-magnésien

10° Les éléments de l'inflammation de l'exsudation, de la suppuration et les diverses formes d'épithélium, se trouvent quelquefois accidentellement mêlés, sous le microscope, avec les éléments des tubercules, et ont ainsi donné lieu à des erreurs sur la composition de ces derniers

11° Le siège des tubercules dans les poumons est ordinairement le tissu cellulaire élastique intervasculaire, cependant ils sont quelquefois réciétés dans les vésicules pulmonaires ou dans les bronches capillaires

12° Le tissu ambiant des tubercules est, ou à peu près normal, ou enflammé dans ce cas, la phlogose, soit lobulaire soit lobaire n'offre point de caractères spécifiques

13° Le degré de consistance des poumons qui sont le siège d'une inflammation aiguë ou chronique dépend de leur contenu en fibrine en blastème liquide ou en globules Beaucoup de fibrine avec peu de blastème et peu de globules, produit l'induration La prédominance de beaucoup de liquide et de globules produit le ramollissement Un mélange égal de ces divers éléments produit une consistance moyenne

14° Les granulations grises, demi-transparentes, des poumons sont composées de globules tuberculeux, de substance interglobulaire plus abondante et plus transparente que dans le tubercule jaune, et de fibres pulmonaires plus ou moins intactes Elles ne sont, du reste, pas toujours le point de

départ du tubercule jaune miliaire, ce dernier peut se former d'emblée comme tel

15° Les études microscopiques réfutent l'opinion que la granulation n'est soit le produit de l'inflammation

16° La cavité tuberculeuse est un ulcère pulmonaire tout à fait analogue à l'ulcère cutané ou intestinal tuberculeux, et n'est pas nécessairement la conséquence d'un travail de suppuration. En général, la phthisie est accompagnée d'une diathèse ulcéreuse

17° Le liquide des cavernes contient les éléments suivants *a*, de la matière tuberculeuse *a* globules boursoufflés ou diffusés, *b*, des globules du pus, quelquefois en petite quantité, *c*, des globules pyoïdes, *d*, des globules granuleux, *e*, du mucus ou du mucopus, *f*, des globules du sang, *g*, des fibres pulmonaires, *h*, du pigment noir, *i*, de l'épithélium, *k*, des cristaux, *l* des globules de graisse. Du reste, on trouve rarement tous ces éléments ensemble

18° Sous cette couche liquide se trouvent des fausses membranes sous lesquelles on rencontre une véritable membrane pyogénique fibro vasculaire. Elle est ordinairement incomplète, parce que les excréments tuberculeux successifs la soulèvent et la déchirent

19° Cette membrane pyogénique est un effort curatif de la nature tendant à isoler la cavité pour la cicatrifier. La cicatrisation est souvent favorisée par une sécrétion fibreuse nouvelle, accompagnée, dans un certain nombre de cas, d'une sécrétion cicatricielle

20° L'expectoration des phthisiques renferme les éléments suivants *a*, du mucus, *b*, des globules du pus, *c*, de l'épithélium, *d*, une substance granuleuse abondante, provenant probablement d'une certaine quantité de matière tuberculeuse diffuse, *e*, des petites pellicules jaunâtres, débris de fausses membranes, *f*, des fibres pulmonaires, *g*, des vésicules graisseuses, *h*, des globules du sang mêlés de fibrine, *i*, des grains, globules granuleux, *k*, des petits vibrions et des restes d'aliments qui n'y sont mêlés qu'accidentellement, provenant souvent de vases malpropres

21° L'expectoration des phthisiques n'offre donc en général point de caractères particuliers. Les fibres pulmonaires qu'on y rencontre quelquefois constitueraient le seul indice certain qu'on a affaire à des cavernes tuberculeuses. Du reste, la plus grande partie de l'expectoration provient des bronches et point des cavernes

22° L'épaississement de la plèvre, qui accompagne ordinairement la tuberculisation des poumons, n'a pas sa seule cause dans l'inflammation, mais

aussi dans une augmentation de nutrition l'a plevie devient plus vasculaire, parce qu'elle reçoit une partie du sang des capillaires oblitérés de la surface des poumons, elle devient ainsi un organe supplémentaire de circulation dans la phthisie, et elle augmente encore les anastomoses avec la circulation aortique par ses adhérences intimes avec les paires thoraciques

23° Il ne se forme ni autour des tubercules, ni dans les fausses membranes des plevies, des vaisseaux nouveaux indépendants de la circulation générale. Les recherches embryogéniques et pathogéniques nous ont conduit à l'opinion que les vaisseaux nouveaux ne se formaient que d'une manière centrifuge, provenant toujours de la circulation générale

24° La transformation cartilagineuse des fausses membranes n'est qu'un développement fibreux dense, leur ossification n'est qu'un amas ou un dépôt de substances minérales amorphes

* 25° Les tubercules du système osseux sont plus rares qu'on ne l'admet généralement aujourd'hui. On prend souvent pour tels du pus concret. En cas de doute le microscope seul peut décider

26° Il faut séparer des maladies scrofuleuses les affections tuberculeuses, ainsi que les inflammations chroniques des yeux, des glandes, de la peau, des os et des articulations, dans lesquelles l'examen attentif ne ferait point découvrir d'élément dyscrasique particulier. En un mot la détermination rigoureuse des caractères propres aux scrofules devient un besoin de plus en plus urgent dans la science

27° Les granulations grises des méninges montrent d'une manière évidente, dans une trame fibreuse, les globules propres aux tubercules

28° Le foie est quelquefois le siège d'une tuberculisation très-étendue et alors on la confondrait facilement avec le cancer, de même que ce dernier offre quelquefois l'apparence du tubercule. Dans le premier cas, le microscope montre les globules du tubercule, dans le second, les globules déformés de l'encéphaloïde

29° La dégénérescence graisseuse du foie et celle du cœur, très-bien décrite par M. Bizot, montrent dans la phthisie pulmonaire une tendance aux dépôts graisseux internes, tandis que la graisse disparaît partout dans les organes extérieurs

30° La perforation intestinale produite par des tubercules du péritoine amène, dans des cas très-rare, une inflammation adhésive avec les paires abdominales et la formation d'un anas contre nature qui permet au malade de vivre encore quelque temps. Cette fistule intestinale trouve son analogue

dans les fistules bronchiques qu'on rencontre quelquefois chez les phthisiques, soit sur le sternum, soit sur le col

31° La consistance du tubercule cru sous muqueux des intestins est en general moins ferme que dans d'autres organes. L'ulcere tuberculeux intestinal ne montre point de pus, on y voit des débris de la membrane muqueuse et de la musculaire mêlés aux globules diffluents des tubercules et de plus de l'épithélium cylindrique, dont les jeunes cellules pourraient être prises pour des globules du pus

32° On rencontre quelquefois sur cette membrane muqueuse intestinale malade, des excroissances polypeuses, melanotiques et tuberculeuses

33° Dans des cas fort rares, on trouve de la matière tuberculeuse entre les parois des artères

34° Le péricarde contient quelquefois beaucoup de matière tuberculeuse dans des anciennes fausses membranes. Dans un cas d'adhérence du péricarde avec le cœur et avec toutes les parties ambiantes il s'était établi des anastomoses entre les branches de l'artère coronaire et les vaisseaux de la surface des poumons

35° Le tubercule et le cancer ne s'excluent pas mutuellement on les rencontre non-seulement ensemble, mais il n'est pas même démontré qu'ils s'entravent dans leur marche et leur développement. On ne saurait, en general, mettre assez de réserve dans l'énonciation des lois d'exclusion en pathologie

MEMOIRES PRESENTES

ELECTRO-CHIMIE — *Des lois qui président à la décomposition électro-chimique des corps*, par M. EDMOND BECQUEREL (Extrait par l'auteur)

(Commissaires, MM. Dumas, Pouillet, Regnault)

Le but que je me suis proposé, dans le travail que j'ai l'honneur de soumettre à l'Académie, est de faire connaître les lois qui président à la décomposition électro-chimique des corps

M. Faraday avait posé en principe que lorsqu'on faisait traverser un même courant électrique à travers plusieurs dissolutions métalliques, telles que celles de nitrate de cuivre, de plomb, d'argent, etc., des quantités équivalentes de métal se déposaient au pôle négatif dans chaque dissolution. Mais cette loi n'est vraie que dans un petit nombre de cas, lorsque le sel est formé d'un équivalent d'oxyde et d'un équivalent d'acide, et ne rend pas

compte des effets que l'on observe dans la décomposition d'un très-grand nombre de combinaisons

Je citerai, comme exemple, les hyponitrites de plomb, qui donnent, au pôle négatif, deux et trois fois et demie autant de plomb que le nitrate pour un même courant

J'ai examiné l'action décomposante de l'électricité sur des séries de corps bien analysés, ainsi j'ai successivement soumis à l'expérience tous les chlorures métalliques, les oxydes et l'eau oxygénée, les acétates et les hyponitrites de plomb, etc

Tous les résultats que j'ai obtenus m'ont conduit aux conclusions suivantes

Lorsqu'une combinaison binaire ou ternaire est soumise à l'action décomposante de l'électricité la décomposition se fait toujours en proportion définie, de telle sorte que pour un équivalent d'électricité employé, un équivalent de l'élément électro-négatif, ou du moins du composé qui joue le rôle d'acide dans la combinaison, se porte au pôle positif, et la quantité correspondante de l'élément électro-positif ou qui se comporte comme base se porte au pôle négatif

Cette loi peut être encore formulée comme il suit

Un équivalent d'une combinaison formée par la réunion d'un équivalent d'acide et d'une quantité correspondante de base, exige toujours un équivalent d'électricité pour être décomposé électro-chimiquement

J'ai nommé *équivalent d'électricité* la quantité d'électricité nécessaire pour décomposer un équivalent d'eau

Ces lois ne sont relatives qu'à l'effet direct du courant et nullement aux effets secondaires, car il existe certains sels, tels que les acétates de plomb, qui ne sont décomposés que par l'action réductrice de l'hydrogène provenant de la décomposition de l'eau, et qui donnent toujours un équivalent de métal au pôle négatif

Si l'on fait un équivalent d'électricité pour décomposer un équivalent d'une combinaison quelconque, on peut admettre que si les deux éléments électro-positif et électro-négatif, qui forment la combinaison, sont séparés et se recombinent ils dégagent exactement un équivalent d'électricité De là, en se reportant à la loi énoncée plus haut, on déduit les conclusions suivantes, qui sont *très-importantes pour la chimie moléculaire*

1° Lorsqu'un équivalent d'un corps, soit simple, soit composé, se combine avec un ou plusieurs équivalents d'un autre corps, si le premier joue le rôle d'acide dans la combinaison, le dégagement d'électricité qui résulte

de leur action chimique est tel, qu'il se produit toujours un équivalent d'électricité

2° Si un équivalent d'un corps, tel que l'oxygène, s'est déjà combiné avec un autre qui joue le rôle de base, et que la combinaison s'unisse de nouveau avec un équivalent du premier corps, c'est-à-dire d'oxygène, pour former un deuto sel, il se dégage encore, lors de cette deuxième action, un équivalent d'électricité

Ainsi la quantité d'électricité dégagée ne dépend que du corps qui joue le rôle d'acide dans la combinaison

Il n'a été question dans mon Mémoire que des substances inorganiques, parce que les composés organiques sont pour la plupart non conducteurs de l'électricité, et que, lorsqu'ils conduisent, les effets secondaires masquent tellement l'effet direct, qu'il est très difficile de reconnaître l'action définie de l'électricité

Les principes que j'ai posés représentent bien tous les résultats obtenus, quant aux effets directs, de sorte qu'il existe un rapport constant entre la théorie chimique des équivalents et les décompositions par l'électricité. Il était très-important de les établir car ils doivent servir de point de départ à toute théorie électro-chimique.

(CHIMIE APPLIQUÉE — *Recherches sur la composition des gaz produits dans les opérations métallurgiques, etc.* par M. EBELMEN (Extrait par l'auteur))

(Commissaires, MM. Thenard, Chevreul, Berthier, Dumas, Regnault)

Dans le travail que j'ai l'honneur de mettre sous les yeux de l'Académie, j'ai continué à m'occuper de l'analyse des gaz produits dans les opérations du traitement du fer pour en déduire, soit la valeur calorifique de ces gaz, soit l'explication théorique des phénomènes qui se passent dans l'appareil métallurgique. J'ai cherché à étudier, sous ce double point de vue, le traitement du fer par la méthode anglaise, c'est-à-dire la fabrication de la fonte avec le coke, et l'affinage de la fonte à la houille, dans le four à reverbere.

J'ai exécuté, sur deux hauts fourneaux au coke, ceux de Vienne et de Pont-Évêque (Isère), un travail semblable à celui que j'ai présenté, il y a deux ans, à l'Académie, concernant les deux hauts fourneaux de Clerval et d'Audincourt, marchant au charbon de bois. J'ai examiné les variations qu'éprouve la composition de la colonne gazeuse ascendante aux divers points

de la hauteur du fourneau, et j'ai comparé les résultats de ces expériences entre eux et avec ceux précédemment obtenus dans les fourneaux au charbon de bois. Voici les principales conclusions auxquelles m'a conduit cette comparaison.

Dans la région du fourneau, comprise entre la tuyère et le *grand ventre*, il y a identité dans la composition des gaz produits avec le charbon de bois ou avec le coke. Dans les deux cas, l'acide carbonique, premier produit de la combustion, se change rapidement en oxyde de carbone, à une faible distance de la tuyère, et le mélange d'oxyde de carbone et d'azote produit arrive au *grand ventre* sans éprouver de variations notables dans sa composition.

Les analyses prouvent que la réduction de l'oxyde de fer du minerai à l'état métallique s'opère presque complètement dans la cuve, sans consommation de charbon par la transformation partielle de l'oxyde de carbone en acide carbonique. Ce résultat confirme pleinement les conclusions théoriques de mon premier travail. Dans les hauts fourneaux au charbon de bois, la zone de réduction se trouve placée dans la moitié inférieure de la cuve. Avec le coke, au contraire, c'est dans la partie supérieure de la cuve du fourneau que la réduction s'opère avec le plus d'énergie.

La proportion d'hydrogène qui s'élevait de 2 à 6 pour 100 de la base de la cuve au gueulard, dans les fourneaux au charbon de bois, reste constante avec le coke sur toute la hauteur du fourneau. Ce fait s'explique facilement par la différence de composition des deux combustibles.

La présence du sulfure de fer dans le coke m'a conduit à rechercher le soufre isolé ou en combinaison dans les gaz du haut fourneau. Je n'en ai pas trouvé de traces sensibles. Tout le soufre se retrouve dans la fonte ou dans le laitier à l'état de sulfure de calcium, comme l'a démontré M. Berthier.

Pour expliquer les différences de position de la zone réductrice suivant qu'on emploie le coke ou le charbon de bois, j'ai été conduit à comparer la température des fourneaux d'Audincourt et de Pont-l'Évêque dans les points semblablement placés de l'appareil. J'ai introduit dans le fourneau, à diverses hauteurs, des métaux inégalement fusibles, de façon à pouvoir connaître deux limites entre lesquelles cette température se trouvait comprise. J'ai reconnu ainsi que la température des hauts fourneaux au coke était toujours notablement plus élevée que celle des parties correspondantes des fourneaux au charbon de bois. Si la réduction de l'oxyde de fer commence avec énergie, tout près du gueulard, dans les fourneaux au coke, c'est que la température propre des gaz, à leur sortie, est encore très-élevée, tandis qu'elle

s abaisse souvent au-dessous de 100 degrés dans les fourneaux au charbon de bois

Ces différences de température entre les deux classes de fourneaux s'expliquent à leur tour par ce fait que l'on consomme en moyenne dans le haut fourneau, deux fois plus de carbone avec le coke qu'avec le charbon de bois, pour obtenir le même poids de la même nature de fonte

Dans le cubilot, où l'on refond la fonte pour les moulages on trouve le résultat inverse. Il faut ici deux fois plus de charbon de bois que de coke pour refondre la même quantité de fonte

J'ai cherché à montrer dans mon Mémoire, à quelles causes on doit attribuer ces différences singulières entre les effets calorifiques produits par les deux espèces de combustibles dans les fourneaux dont je viens de parler ainsi que dans d'autres fourneaux employés dans les arts ou dans les laboratoires. L'explication que je propose m'a paru s'appliquer à tous les cas. Elle est fondée sur les différences bien constatées, reconnues dans la combustibilité relative des deux espèces de charbon, et sur les résultats déduits des expériences de Dulong sur les chaleurs de combustion du carbone et de l'oxyde de carbone.

Dulong ayant aussi déterminé la chaleur de combustion du fer, j'ai pu, en aidant des résultats de cet illustre savant, et des faits reconnus sur la composition des produits gazeux dans le haut fourneau, arriver à une explication simple et rationnelle de plusieurs circonstances fort singulières que présente leur allure et dont la cause était restée jusqu'ici tout à fait cachée.

Après avoir présenté les conclusions théoriques de mon travail, j'ai déterminé, au moyen des résultats des analyses, les quantités de chaleur que pourrait produire la combustion des gaz, leur volume total et la température de combustion, j'ai reconnu aussi que le coefficient qui représente la chaleur perdue était représenté dans les deux fourneaux au coke étudiés, par les fractions 0,815 et 0,835, la chaleur totale produite par la combustion du charbon étant représentée par l'unité dans le fourneau au charbon de bois d'Audincourt, ce coefficient était 0,670.

La composition des gaz des fourneaux au coke, l'absence du soufre dans ces gaz et l'énorme quantité de chaleur développée par leur combustion dans les fourneaux au coke, qui produisent ordinairement 10 000 à 12 000 kilogrammes de fonte par jour, ne permettent pas de douter que leur emploi ne conduise à d'importants résultats. L'habile maître de forges de Pont-l'Évêque M. V. Fierejean en brûlant les gaz de son haut fourneau par des procédés identiques avec ceux découverts à Vasseralingen par M. Faber-

Dufaur, est arrive a les utiliser pour l'alimentation d'un four à réverbère de Mazerie dont le roulement est, le plus pres d'un an tout à fait régulier

J'ai examiné, dans une autre partie de mon travail, la composition de l'air des cheminées des fours a puddle et a rechauffer. La manière dont la combustion s'opère sur la grille des fours a réverbère à haute température n'était pas bien connue jusqu'à present et les métallurgistes admettaient assez généralement que la quantité d'air non altérée par son passage à travers la grille était ordinairement la moitié de la quantité totale. Mes expériences prouvent que cette manière de voir n'était pas fondée, et que la proportion d'air non brûlé en traversant le combustible n'est guère, en moyenne que les 6 ou 8 centièmes de l'air total. Quand l'excès d'air s'abaisse au dessous de cette limite on trouve, dans la cheminée, des proportions très notables de gaz combustibles le maximum de température du four correspond a un excès d'air de 5 à 10 pour 100 dans les gaz des cheminées. Ce résultat se rapproche beaucoup des données théoriques d'après lesquelles ce maximum correspondrait à la transformation réciproque et complete de l'air et du combustible en eau, acide carbonique et azote.

J'indique à la fin de mon Mémoire les résultats de nouvelles expériences sur la transformation des combustibles solides en gaz. Le coke brûle dans un fourneau à cuve, par un courant d'air forcé, et produit un gaz formé d'oxyde de carbone et d'azote dont la combustion a permis de maintenir pendant plusieurs jours un four à réverbère à la chaleur nécessaire pour la fusion de la fonte. L'analyse des gaz produits m'a permis de constater un fait intéressant la présence d'une proportion notable d'hydrogène sulfure résultat qu'on ne peut attribuer qu'à la réaction de la vapeur d'eau contenue dans l'air injecté sur le sulfure de fer du coke.

Les essais dont j'ai eu l'honneur d'entretenir l'Académie dans deux précédentes communications (*Comptes rendus*, t. XIV, p. 174, et t. XVI, p. 279) sur la transformation des combustibles en gaz ont donné lieu dans les usines de la compagnie d'Audincourt, à des procédés devenus tout à fait pratiques. Trois générateurs de gaz, ne consommant que des menus charbons presque sans valeur sont maintenus en roulement régulier et continus dans ces usines. L'un d'eux alimente un four à tôle qui permet de fabriquer, depuis cinq mois 30 000 kilogrammes de tôle fine par mois. Dans les deux autres, on chauffe au blanc soudant des trousses destinées à la fabrication des grosses tôles avec une production journalière de 3 500 à 4 000 kilogrammes environ par chaque four.

Il y a tout lieu de croire que des procédés semblables à ceux employés

à Audincourt permettront d'utiliser des combustibles terieux et de mauvaise qualité pour la production des températures les plus élevées dont on ait besoin dans la métallurgie du fer

ENTOMOLOGIE — *Recherches sur les mœurs, les métamorphoses, l'anatomie et l'embryogenie d'un petit insecte coleoptère (Colaspis atra, Latr., vulgo Négril) qui ravage les luzernes du midi de la France, suivies de l'indication des procédés employés pour les détruire, par M N JOLY (Extrait par l'auteur)*

(Commissaires, MM Duméril, Flourens, Milne Edwards)

La rédaction du Mémoire que j'ai l'honneur de présenter à l'Académie était complètement terminée vers la fin du mois de septembre dernier, mais désireux de savoir d'une manière positive si, comme je le présumais, le *Colaspis atra*, une fois parvenu à l'état d'insecte parfait, passait l'automne et l'hiver dans une espèce de sommeil léthargique, j'ai attendu jusqu'à présent pour livrer mon travail à la publicité. Il est résulté de ce retard que plusieurs idées que je pouvais considérer comme m'appartenant en propre il y a quatre ou cinq mois, ne m'appartiennent plus aujourd'hui, au moins par droit de priorité. En effet, M Milne Edwards vient d'émettre (1), sur certains points de l'embryogenie des invertébrés, des opinions avec lesquelles j'ai été flatté de voir les miennes offrir des points de ressemblance, et tout récemment M Kolliker a publié sur le même sujet un Mémoire où se trouvent consignés plusieurs faits que j'ai probablement observés en même temps que l'anatomiste de Zurich (2). Les résultats auxquels je suis parvenu en étudiant l'embryogenie du *Colaspis* venant à l'appui des nouvelles théories de M Milne Edwards, ou remplissant certaines lacunes qui, de l'aveu même de l'auteur, se trouvent dans le travail de M Kolliker, j'ai pensé que je pouvais laisser subsister mon histoire du *Colaspis* telle que je l'avais rédigée il y a près de cinq mois. C'est cette histoire dont je vais donner une courte analyse.

Mon Mémoire est divisé en trois parties.

La première est consacrée à l'histoire des travaux dont le *Colaspis* a été jusqu'à présent l'objet.

(1) Voir le journal *l'Institut* (Séances de la Société Philomatique, 11 décembre 1843).

(2) *Observationes de prima insectorum generis, adjecta articulorum evolutionis cum vertebratorum comparatione* (Annales des Sciences naturelles, novembre 1843, p. 253, 2^e série).

» Dans la deuxième partie, je decris l'animal sous ses quatre états d'œuf de larve, de nymphe et d'insecte parfait, puis j'étudie ses mœurs et son anatomie

Dans la troisième enfin j'indique les procédés employés ou à mettre en usage pour s'opposer aux ravages du *Colaspis*

» Déjà inscrit par Olivier de Serres au nombre des bestioles ennemies de la luzerne, ce petit coléoptère, qui commet aujourd'hui de si grands dégâts dans nos départements méridionaux, était, il y a vingt ans à peine, presque totalement inconnu des naturalistes. J'ai tâché de tracer son histoire d'une manière aussi complète que possible, et je crois être parvenu à constater quelques faits intéressants au point de vue de la zoologie et de l'anatomie comparative. Ainsi j'ai acquis la certitude que, à l'inverse de ce qu'on observe chez presque tous les insectes, les *Colaspis* s'accouplent plusieurs fois avant que le ponte ne soit entièrement terminée. Je sais maintenant, à n'en pas douter, qu'au lieu de rester, comme on l'avait dit, enfermée pendant dix mois dans le sein de la terre, la nymphe subit sa dernière métamorphose au plus tard dans les premiers jours de septembre. C'est l'insecte parfait qui passe l'automne et l'hiver en léthargie dans le nid même que s'est creusé la nymphe.

» Quant à l'organisation intérieure de ce coléoptère, elle a, comme on pouvait s'y attendre, beaucoup de rapport avec celle des vrilges *Chrysomela*.

» Le canal digestif de la larve ressemble presque en tout à celui de l'insecte parfait. Ici l'identité de régime explique l'identité de forme.

» Les vaisseaux biliaires, au nombre de six, s'insèrent au ventricule chylifique par une de leurs extrémités, et par l'autre au rectum, mais cette dernière insertion n'est qu'apparente, ainsi que l'a si bien prouvé M. Léon Dufour, et ainsi que je m'en suis assuré moi-même après cet habile et consciencieux anatomiste.

L'appareil genital mâle est assez compliqué, celui de la femelle est des plus simples. Je n'ai pu, malgré bien des recherches, constater chez cette dernière l'existence de la poche copulatrice. Peut-être cette absence de *spermotheca* (si toutefois elle est réelle) pourrait-elle expliquer la fréquence des accouplements et la succession des pontes, phénomènes corrélatifs et probablement rendus nécessaires pour assurer la fécondation des œufs dont le nombre est très-considérable (plus de deux cents).

» J'ai étudié le développement de l'embryon avec tout le soin et toute l'attention que j'ai pu apporter à cette étude, d'ailleurs si difficile en raison du

pen de transparence et de la petitesse presque microscopique de l'œuf. Voici, en résumé, ce que j'ai vu vingt quatre heures après la ponte, un vrai blastoderme, forme aux dépens du vitellus s'étale à la face ventrale du futur embryon. La tête et la partie postérieure de l'abdomen commencent à se dessiner vers le quatrième jour, le cinquième on aperçoit les segmentations de la face ventrale et les premiers rudiments des pattes thoraciques, le sixième jour, les antennes et les organes manducateurs déjà bien distincts le jour précédent, se détachent de la tête les pattes sont mieux dessinées, l'œsophage, l'intestin grêle et le rectum sont complètement formés mais le ventricule chylifique n'existe pas encore, la chaîne nerveuse commence à paraître, le huitième jour, les yeux deviennent distincts six taches jaunâtres disposées sur deux rangs, telle est alors pour chaque côté la constitution de l'organe visuel ces taches oculaires ne tardent pas à noircir. Les vaisseaux biliaires sont adhérents au ventricule chylifique, encore l'organe ou vert à sa partie dorsale le neuvième jour, l'animal exécute dans l'œuf des mouvements bien marqués le dixième les poils existent le onzième, les trachées se montrent sous la forme de tubes extrêmement grêles ramifiées mais dépourvus de la fibre spirale qui entre à plus tard dans leur composition. Vers la fin de ce même jour, ou au commencement du suivant la larve sort de l'œuf jaune au moment de l'éclosion elle est toute noire quelques heures après.

Mais c'est sans contredit le développement du système nerveux qui m'a offert les particularités les plus intéressantes. Au lieu d'être formé sur le modèle indiqué par la plupart des anatomistes pour la grande majorité des larves d'insectes hexapodes, c'est-à-dire composé de deux cordons parallèles offrant de distance en distance des renflements qui viennent se toucher sur la ligne médiane ou ne sont séparés les uns des autres que par un très-léger intervalle, le système nerveux du *Colaspis atra*, étudié chez l'embryon est formé de deux ganglions céphaliques et de onze ganglions rachidiens, tous contigus, tous dépourvus de filets nerveux et de cordons interganglionnaires. Les ganglions céphaliques, également contigus, mais non soudés à leur partie antérieure, s'écartent postérieurement pour laisser passer l'œsophage. Cet état, assez analogue à celui qu'on observe d'une manière permanente chez quelques larves de coléoptères (*Oryctes nasicornis*, de Swammerdam, *Cetonia aurata*, de Léon Dufour), n'est que transitoire chez l'embryon du *Colaspis*. Un peu avant la naissance, on voit se former les filets nerveux des ganglions et les premiers cordons interganglionnaires, c'est-à-dire ceux qui unissent les ganglions de la moitié antérieure de la chaîne, ceux qui servent

de moyen d'union entre les ganglions postérieurs n'existent pas lors de l'éclosion, mais on les trouve tous chez la larve âgée de quatre jours. Nous sommes porté à croire que les ganglions eux-mêmes suivent dans leur formation un ordre inverse de celui d'après lequel procèdent les cordons interganglionnaires, ce qu'il y a de certain, c'est que les ganglions postérieurs offrent chez l'embryon beaucoup plus de consistance que les antérieurs, et c'est seulement chez la larve de cinq jours qu'on voit les lobes céphaliques se réunir au moyen d'une bandelette nerveuse. Espèce de corps calleux qu'on n'aperçoit plus chez l'insecte parfait.

Ces résultats et quelques autres que nous a fournis l'examen comparatif du système nerveux chez l'embryon, la larve et l'insecte complètement développé, viennent à l'appui des nouvelles idées théoriques sur la formation des organes dont MM. Milne Edwards et Duvernoy ont récemment entretenu la Société Philomathique de Paris.

Après avoir étudié les mœurs et décrit l'organisation interne et externe du *Colaspis atra*, j'indique les procédés à employer pour le détruire et je donne la préférence à celui qui consiste à retarder la première coupe de la luzerne parce qu'étant basé sur les habitudes naturelles de l'insecte ce procédé est à mes yeux le plus rationnel et le plus efficace de tous ceux qui ont été proposés jusqu'à présent par les agriculteurs.

CHIMIE APPLIQUÉE — *Mémoire sur la faïence pour poêles et cheminées*,
par M. BARBAZ (Extrait par l'auteur.)

(Commissaires, MM. Thenard, Berthier, Dumas)

Les poêles en faïence qu'on rencontre en France sont recouvertes d'un très-grand nombre de petites fentes dirigées en tous sens et qui semblent naître sous la main lorsqu'on presse même légèrement la faïence. Ces fentes, qu'on a appelées des *trassailures*, des *geiçures*, en laissant passer les liquides renversés sur la faïence, peuvent donner lieu, en vertu de la chaleur du poêle, à un dégagement de vapeurs infectes, elles rendent sale la surface de la faïence, et permettent aussi à l'émail de s'écailler.

Dans ces derniers temps, on a fabriqué une faïence qui ne présente pas ces inconvénients, l'émail est et demeure continu lorsqu'on frotte la main sur le poêle. Cette nouvelle faïence diffère de la première en ce qu'elle contient 14 p. 100 de chaux environ, tandis que la première n'en renferme que des traces, 1 p. 100; elle est aussi beaucoup plus dense que la faïence qui gerce.

Mais si la nouvelle faïence est ingérçable, elle ne supporte pas aussi bien l'action du feu, elle se brise lorsqu'on la soumet à des variations même peu rapides de température elle est aussi beaucoup plus fusible que l'ancienne Cette fusibilité facile provient de la grande quantité de chaux renfermée dans le biscuit Quant à son peu de solidité, elle provient de ce que le sable et le ciment qui entrent dans les deux faïences se sont tout à fait combinés avec l'argile dans la nouvelle faïence, et ne peuvent plus s'opposer, comme dans l'ancienne, aux variations de forme à mesure que la température s'élève

On obtient aussi une faïence ingérçable en introduisant dans la pâte de la faïence ordinaire pour poêles une certaine quantité de soude ou de potasse combinée à l'avance avec du sable, de manière à former une fritte

Quand on veut avoir une faïence qui ne gerce pas, qui puisse se travailler très-facilement, et qui soit capable de donner de très belles pièces revêtues d'un très bel émail, capable de bien recevoir les couleurs, il est convenable d'employer un mélange d'argile plastique, de ciment, et d'une marne sableuse Mais cette faïence n'est pas non plus très propre à résister aux changements de température

En élevant considérablement la première température de la cuisson de la faïence qui gerce, on la rend assez compacte pour qu'elle ne fasse plus gercer le vernis Pour ne pas se soumettre à cette élévation de la température de la cuisson, et cependant conserver à la faïence une très-grande solidité il faudrait changer la nature de l'émail actuellement employé Mais les expériences que j'ai entreprises à cet égard ne m'ont pas encore donné de résultat

PHYSIOLOGIE — *Nouveau Mémoire sur la keratoplastie*, par M. FELDMANN de Munich

(Renvoyé, ainsi que le précédent Mémoire dont celui-ci forme le supplément à la Commission du prix de Physiologie expérimentale)

Les expériences exposées dans ce second Mémoire ont été faites dans le laboratoire de M. Flourens, et souvent avec le secours des deux aides du professeur, MM. Aug. Duméril et Ph. Constant Avant d'exposer les résultats de ses nouveaux essais, l'auteur trace dans quelques pages un résumé de l'histoire de la keratoplastie, puis il discute les diverses méthodes d'opération qui ont été proposées et donne quelques indications sur les instruments à employer, il présente enfin quelques remarques sur le travail organique de la réunion Le Mémoire est terminé par une relation détaillée de vingt expé

riences, dont plusieurs ont réussi, du moins en considérant les résultats du point de vue physiologique. Relativement au point de vue pratique, l'auteur confesse qu'il n'a pas encore eu de véritable succès, mais ces succès il est loin de le regarder comme impossible, surtout quand on agira sur l'homme. On ne rencontrera plus alors les obstacles qui chez les animaux, sont presque inévitables ces mouvements qui pendant le travail plastique viennent déplacer les parties mises en contact souvent au moment où la continuité commençait déjà à s'y établir.

Des expériences rapportées dans le Mémoire de M. Feldmann, nous nous contenterons de rapporter les suivantes

PREMIÈRE EXPÉRIENCE — *Transplantation de la corne d'un lapin sur l'œil d'un autre lapin*
(Méthode de Reisinger)

18 janvier 1843 — Le lambeau corneal, d'une grandeur considérable et d'une forme assez régulière fut transplanté sur le moignon corneal d'un autre animal. Les différents temps de l'opération la keratomie supérieure les coups multiples de ciseau vers le bord inférieur pour détacher entièrement la corne de l'œil et l'application de deux sutures une en haut, une autre en bas, furent exécutées sans lésion de l'iris. La chute du cristallin fut produite avec intention avant qu'on eût serré les nœuds des ligatures. La corne transplantée fut bien étendue, mais elle ne couvrit pas la plaie béante de l'œil dans toute son étendue.

19 janvier — En retirant l'animal de sa cage pour lui enlever les sutures, il trappa avec une de ses pattes l'œil opéré, de sorte que la suture inférieure se déchira, et le corps vitre, se précipitant en dehors, resta pendant hors de l'œil entre les bords cornéaux. Le bord supérieur de la cornée est adhérent au moignon corneal.

25 janvier — La corne transplantée est toujours adhérente en haut et encore transparente. La suppuration s'est faite entre les bords cornéaux inférieurs.

28 janvier — La vascularisation commence à se développer vers le bord inférieur de la cornée transplantée, et au-dessous d'elle.

30 janvier — Les vaisseaux se sont développés très-distinctement, et s'avancent vers la cornée transplantée.

8 février — La suppuration a cessé. Les vaisseaux se répandent sur tout le bord inférieur de la cornée transplantée, ils commencent même à se développer sur le bord supérieur. La cornée, aussi bien que le moignon corneal, sont d'une couleur grise foncée et luisante.

2 mars — Un vaisseau très-distinct, provenant du fond de la conjonction scléroticale, s'étend sur la cornée transplantée

10 mars — Le vaisseau en haut a disparu, des filets sanguins en bas sont encore visibles. La cornée commence à devenir *blanchâtre*

6 janvier 1844 — L'animal tué, on enlève l'œil. La cornée transplantée est rapetissée de plus de la moitié du volume qu'elle avait au jour de l'opération. La cornée est bombée, et présente un aspect luisant, ses couches les plus superficielles paraissent être transparentes, les couches profondes sont opaques. L'œil est adhérent dans la circonférence de la cicatrice

HUITIÈME EXPÉRIENCE — *Transplantat on d'une cornée de lapin sur l'œil d'un autre lapin (Méthode d'opération ordinaire)*

13 avril 1843 — La cornée transportée étant d'une étendue considérable forme un pli transversal. *Amputation de la troisième paupière immédiatement après l'opération*

15 avril — On enlève les ligatures. La cornée est *adhérente dans toute sa circonférence*, elle est *transparente et bombée*. La réunion de la cornée avec le moignon corneal s'est faite à l'aide d'une exsudation grise plastique

18 avril — La cornée est bombée, sa transparence est troublée par une *nuance grisâtre*. L'exsudation plastique a changé de couleur, elle est devenue brun foncé. Exophtalmie

19 avril — On remarque, au bord supérieur de la cornée, un trou noir rempli d'un fluide séreux

24 avril — La substance intermédiaire entre la cornée et le moignon cornéal est luisante comme la substance corneale, mais elle n'est pas transparente. La suppuration *interne* a commencé, ce qu'on voit à travers la cornée transplantée. Il n'y a pas de suppuration externe, il n'existe que des mucosités puriformes fournies par la conjonctive concomitante

25 avril — La *vascularisation* commence à se développer en bas

29 avril — L'injection des vaisseaux, devenue de couleur *écarlate* s'étend de plus en plus sur la cornée. La suppuration interne a diminué (par résorption)

2 mai — La vascularisation existe *sur toute l'étendue* de la cornée, surtout dans toute sa circonférence. La cornée est devenue proéminente à la manière d'un staphylome

La circonstance que la vascularisation est devenue *générale*, de manière que les filets sanguins sont répandus sur la cornée entière, et que celle-ci prend à peu près l'aspect de l'état pathologique appelé *pannus scarlatinus*,

cette circonstance, disons nous est due a la maniere dont la reunion des bords corneaux a eu lieu car il n'y a pas eu de suppuration entre les bords. Les vaisseaux ont pu arriver a l'aide d'une *exsudation plastique*, plus ou moins considerable, presque de tous les côtés a la fois. Nous disons presque a la fois car en effet le travail vasculaire commençant en bas ne avançant pas beaucoup celui des autres parties de la circonférence corneale. Aussi est-ce en bas que l'exsudation plastique fut le moins considerable il ne fallut, pour l'accroissement des bords corneaux qui se touchent a cet endroit qu'une légers exsudation. Plus tard, l'injection vasculaire a disparu la cornée est devenue *blanchâtre et luisante* la proéminence staphylomateuse a diminué de plus en plus.

Mois de novembre — L'animal tué la corne est opaque et bien injectée elle presente encore des traces de sa proéminence staphylomateuse.

DIX-NEUVIÈME EXPÉRIENCE — *Transplantation de la cornée d'un petit chat sur l'œil d'un grand lapin*

16 septembre 1843 — L'animal reculant sous l'instrument se tait pendant l'opération le coup de couteau monta jusqu'au bord de la sclérotique en enlevant en même temps la partie correspondante de l'iris. Cette circonstance amène la nécessité d'appliquer les sutures à droite et à gauche au lieu d'en haut et d'en bas. Il reste un petit intervalle entre le bord sclérotical et le bord de la cornée transplantée ou l'on peut très bien distinguer le corps vitreux le cristallin étant retiré de l'œil. La cornée transplantée est chevauchante vers le bas. On est obligé de tenir fermées les paupières à l'aide d'un agglutinant afin que le bord supérieur de la cornée transplantée ne soit pas renversé par les mouvements de la paupière supérieure. A cause de l'application particulière de deux sutures il n'est pas nécessaire de couper la troisième paupière. On attache encore les pattes de l'animal.

17 septembre — On ouvre les paupières la cornée est bien étalée et bombée.

26 septembre — La moitié supérieure de la cornée est bien adhérente aux parties voisines elle est *transparente*, la moitié inférieure est soulevée par la paupière inférieure, et imbibée par du pus.

29 septembre — *Opérations accessoires*. Pour ne pas compromettre le succès de cette expérience, on est obligé d'enlever à l'aide des ciseaux le quart inférieur de la cornée, laquelle est, dans les trois quarts de son étendue gonflée et indurée (comme cartilagineuse) par le pus imbibé. En s'apercevant que cette amputation ne suffit pas encore pour mettre la cornée transplantée

à l'abri des mouvements fâcheux de la paupière inférieure, on entreprend de tendre la paupière inférieure pour annuler complètement son action .

5 octobre — L'intervalle indique vers le haut, entre le bord sclérotical et le bord cornéal, est couvert de pus. Le quart supérieur de la cornée nouvelle *restée transparente jusqu'à présent*, présente une *vascularisation commençante*. Cette vascularisation ne s'étend que jusqu'à la ligne bien marquée qui sépare la partie transparente de la partie imbibée et indurée, celle-ci ne participe pas à la nouvelle vie.

11 octobre — *La partie transparente s'est troublée à la suite de la vascularisation générale*. On remarque qu'un *nouveau bord cornéal*, encore mince, s'est formé en haut. La suppuration s'opère de nouveau vers le bas. La partie indurée de la cornée se ramollit.

14 octobre — La partie ramollie tombe par cause du travail éliminatoire. La partie conservée de la cornée est *injectée, blanchâtre et bombée*.

Novembre et décembre — La partie très-petite de la cornée transplantée qui restait après l'ablation pratique le 29 septembre a encore diminué d'étendue par suite d'une résorption active. Une substance blanchâtre la remplace inférieurement .

Le procédé opératoire suivi par M. Feldmann a été, dans presque toutes ces expériences celui qui a recommandé Reisinger, seulement, au lieu de donner quatre ou six petits coups de ciseaux pour former supérieurement une incision demi-circulaire il se contente de donner deux larges coups de ciseaux. On obtient, dit M. Feldmann, une coupe plus régulière et l'on a en outre, dans l'angle que forment les deux lignes à leur intersection, un point avantageux pour l'application des sutures. Il faut avoir soin, pour que les surfaces qu'on met en rapport soient bien correspondantes de donner à la portion de cornée que l'on transplante des dimensions beaucoup plus grandes que celles du morceau emporté. Il ne faut pas enlever les sutures trop tôt après l'opération. Il ne convient pas d'en appliquer plus de deux. Si on les multiplie, on trouve une grande difficulté à empêcher la cornée rapportée de se plisser, ce qui rendrait la parfaite coaptation presque impossible. Il convient, quand on transporte une cornée d'un animal à un autre, d'avoir soin que les épaisseurs ne soient pas très-différentes.

» On a proposé de prévenir, au moyen de sutures, les mouvements des paupières qui pourraient tendre à déranger la nouvelle cornée. Ce procédé est mauvais, il excite trop d'inflammation. Quant à la troisième paupière, dont les mouvements aussi pourraient être nuisibles, il convient de la couper en terminant l'opération .

De l'emploi du caoutchouc dans différents cas de stomatonomie, par
M DE LA BARRE fils

(Commissaires, MM Breschet, Andral, Velpeau)

Ayant remarqué, dit l'auteur, que le caoutchouc se gonfle sensiblement par la chaleur de la bouche, je l'ai d'abord employé pour faire disparaître le croisement des dents. Cette difformité résulte, comme on le sait, soit d'un défaut de développement de l'arcade dentaire, soit d'un excès de largeur des dents elles-mêmes. Pour y remédier, les chirurgiens-dentistes avaient coutume d'employer des ligatures de platine, d'or, de soie ou de lin, mais à ce procédé vicieux à plusieurs égards, mon père en substitua un autre bien préférable et qui consistait à introduire entre les dents croisées des petits morceaux de bois blanc. Ce procédé, toutefois, laissait encore quelque chose à désirer, mais en remplaçant, comme je l'ai fait, les coins de bois par des lames de caoutchouc de dimension convenable, j'ai obtenu les mêmes résultats sans être exposé aux mêmes inconvénients.

Le caoutchouc trouve encore son emploi dans des cas contre lesquels on n'avait jusqu'ici à employer que des moyens très-impairfaits. Il s'agit, par exemple, d'enlever la carie dont une dent est attaquée sur une des deux faces par lesquelles elle touche ses voisines, ordinairement on a recours à la lime, et le résultat de ce procédé est toujours de produire un vide désagréable à l'œil. Pour éviter cet inconvénient, mon père avait recours de préférence au burin, mais dans bien des cas cela devenait impossible, faute d'un espace nécessaire au jeu de l'instrument. Or cet espace, je puis le produire à volonté dans quelques jours, au moyen de lames de caoutchouc d'une épaisseur graduée, et une fois l'opération terminée, il suffit de cesser l'emploi des lames élastiques, pour que les dents reprennent peu à peu leur première position.

M Lefoulon adresse quelques remarques relatives à son Mémoire sur les moyens de prévenir et de corriger les irrégularités de la *seconde dentition*, et aux observations dont ce travail a été l'objet de la part de MM Desirabode. M Lefoulon demande à soumettre à l'examen de MM les Commissaires chargés de faire le Rapport sur cette méthode, divers individus qui sont maintenant en voie de traitement.

• (Renvoi à la Commission précédemment nommée)

M LIMOUZIN-LAMOTHE présente un Memoire ayant pour titre *Institutions rurales pouvant être considérées comme une amelioration importante en agriculture*.

L'auteur, dans cet écrit, s'attache à faire voir les avantages qui résultent de l'établissement d'un conseil de prud'hommes choisis par le corps municipal, et ayant qualité de connaître, sans formes judiciaires, du principe et de la nature de toute contestation relative aux intérêts ruraux. Ce Mémoire, conformément au desir exprimé par M LIMOUZIN-LAMOTHE, est renvoyé à l'examen de la Section d'Économie rurale.

M BOULMIER soumet au jugement de l'Académie la description et la figure d'un appareil destiné à diminuer les chances de rupture pour les essieux des vehicules employés sur les chemins de fer.

(Renvoi à la Commission chargée de l'examen des diverses communications relatives aux moyens de diminuer les dangers des chemins de fer)

M MARGOTON adresse un supplement à son Mémoire sur les moyens propres à assurer la conservation des bois.

(Renvoi à la Commission précédemment nommée) .

L'Académie reçoit un Memoire destiné au concours pour le prix extraordinaire concernant la navigation par la vapeur, Memoire qui sera inscrit sous le n° 1.

CORRESPONDANCE

M le MINISTRE DE LA GUERRE annonce qu'il vient de nommer à la place de Directeur des études à l'École Polytechnique M DUMANEL, l'un des candidats présentés par l'Académie et par le conseil de l'École.

M VILMORIN, nommé récemment à une place de Correspondant pour la Section d'Économie rurale, adresse ses remerciements à l'Académie.

M VELPEAU présente, au nom de l'auteur, M BURGARET, professeur d'anatomie à l'université de Gand, un ouvrage ayant pour titre *Histologie ou Anatomie de texture* (voir au Bulletin bibliographique). Dans cette production nouvelle, dit M Velpeau, l'auteur a coordonné et discuté toutes les notions histologiques que la science possède actuellement. Des recherches

spéciales soit au moyen du microscope, soit au moyen des réactifs chimiques soit à l'aide de dissections soignées, lui ont d'ailleurs permis de ne rien repousser comme de ne rien admettre sans vérification. Il a beaucoup emprunté, d'ailleurs aux savants de l'Allemagne, à M. Henlé surtout. L'ouvrage est accompagné de neuf belles planches.

M. VELPEAU offre aussi, au nom de l'auteur, M. GUERASI, professeur à l'université de Turin, les trois premières livraisons d'un *Traité d'Obstétrique*.

Cet ouvrage, dit M. Velpeau, paraît tout à fait à la hauteur de la science, mais il convient d'en attendre la terminaison pour s'en former une opinion exacte et pour en déterminer la valeur réelle.

PHYSIOLOGIE. — *Sur les fonctions des vaisseaux chylifères et des veines*, par M. A. CHATIN (Extrait par l'auteur).

Si personne ne conteste l'absorption des éléments nutritifs par les vaisseaux chylifères, deux opinions partagent au contraire les savants sur le rôle de ce système de vaisseaux par rapport aux substances toxiques.

Suivant l'une de ces opinions, les chylifères absorberaient indifféremment toutes les substances déposées dans les cavités digestives.

D'un autre côté, les expériences de plusieurs physiologistes, et principalement celles de M. Magendie, conduisent à faire admettre que l'absorption des substances nuisibles à l'économie ne s'effectue que par le système veineux.

La perfection des procédés chimiques, qui nous permet de retrouver des quantités infiniment petites d'arsenic et d'antimoine en les engageant dans des combinaisons avec l'hydrogène, m'a porté à penser qu'on pourrait contribuer à amener une solution de ces questions au moyen d'expériences tentées avec ces corps.

• *Première expérience* — J'ai empoisonné huit chiens, en introduisant dans l'estomac de chacun d'eux 0^{gr},50 d'acide arsénieux mêlé à du lait, et en liant ensuite l'œsophage.

• Le sang de tous ces animaux, extrait tant du cœur que des gros vaisseaux, a été réuni et incinéré par le nitrate de potasse. Le produit de l'incinération a fourni, par l'appareil de Marsh, modifié suivant le précepte de l'Académie, un anneau et des taches d'arsenic, dont tous les caractères ont été constatés.

• Le chyle obtenu par l'incision des canaux thoraciques des huit chiens, réuni et traité comme l'avait été le sang, ne m'a pas fourni la plus légère trace d'arsenic.

Il n'est pas inutile de dire qu'afin d'obtenir une quantité plus considérable de fluides blancs, j'ai pressé la masse intestinale et le système chylifère abdominal de chaque chien pendant plus d'un quart d'heure, suivant le conseil donné par M. Magendie

Deuxieme experience — J'ai répété l'expérience précédente en substituant à l'acide arsenieux une quantité double de tartrate de potasse et d'antimoine, et faisant périr les chiens une heure après l'administration du poison par l'ouverture des caotides l'antimoine a été retrouvé dans le sang, et nullement dans le chyle

* *Troisieme experience* — 3 kilogrammes de sang, provenant de divers malades qui prenaient l'emetique à haute dose, m'ont donné une quantité tres-sensible d'antimoine

* Ces faits me paraissent prouver que les substances vénéneuses ne sont point absorbées par les vaisseaux conducteurs du chyle.

(CHIRURGIE — *Sur l'emploi des sections tendineuses et musculaires dans le traitement de certaines difformités*, par M. JULES GUERIN

(Renvoi à la Commission precedemment nommee)

L'Académie a reçu, dans sa dernière séance, une Lettre relative aux abus et aux dangers de la ténotomie, ou, entre autres allégations, on prétend que je fais la section des muscles dans la paralysie, et que plusieurs sujets admis pour cet objet dans les salles de mon service y auraient succombé

Relativement à la première allégation, je dirai qu'il ne m'est jamais arrivé de diviser des muscles pour remédier à des paralysies, comme tous ceux qui pratiquent la tenotomie, je divise des muscles rétractés et pas d'autres Si, chez quelques-uns des malades que j'ai opérés, il s'est trouvé en même temps des muscles rétractés et des muscles paralysés, ce n'est que par une méprise qu'on a pu croire que j'appliquais aux uns l'opération exclusivement réservée pour les autres Je ne pratique donc pas la ténotomie contre des paralysies

* Relativement à des malades qui seraient morts à l'hôpital, on a pu, par le laconisme de cette allégation, laisser croire qu'ils étaient morts dans mon service et des suites de mes opérations Le fait est qu'aucun malade n'est mort dans mes salles des suites du traitement orthopédique, et, pour être à cet égard beaucoup plus explicite que l'auteur de la Lettre, j'ajouterai que depuis que je pratique la ténotomie, soit en ville, soit à l'hôpital, je n'ai eu, sur plus de quatre mille opérations, à regretter la mort d'aucun malade

Ce résultat, contre lequel il ne s'élèvera aucun fait, est peut-être propre à rassurer les personnes dont l'opinion aurait été égarée par des allégations peu réfléchies ou des prétextes mal fondés

* Cette Lettre est renvoyée à la Commission chargée de faire le Rapport sur les résultats des sections sous-cutanées appliquées comme moyen orthopédique

M BELLINGERI prie l'Académie de vouloir bien lorsqu'elle s'occupera de la nomination d'un correspondant pour la Section d'Anatomie et de Physiologie, le comprendre dans le nombre des candidats présentés pour cette place

(Renvoi à la Section d'Anatomie et de Physiologie)

MM ROUSSEAU et SERAURIER, dont les recherches sur les *alterations des voies aériennes* ont été une seconde fois l'objet d'une mention honorable dans le Rapport sur le concours pour les prix de Médecine et de Chirurgie annoncent l'intention de poursuivre leur travail, et demandent l'autorisation de reprendre le Mémoire qu'ils avaient précédemment adressé, afin de pouvoir le reproduire sous une forme plus complète

Cette autorisation est accordée

M HOSBARD adresse une réclamation de priorité relativement aux moyens employés par MM Chailly et Godier pour le redressement des déviations latérales de la taille il s'attache à prouver que l'appareil qu'ils ont décrit dans un Mémoire lu le 29 janvier dernier ne diffère que par de très-légères modifications de celui qu'il emploie lui-même depuis fort longtemps et qu'il a fait connaître à l'Académie en 1835

Cette Lettre est renvoyée comme pièce à consulter à la Commission chargée de faire un Rapport sur le Mémoire de MM Chailly et Godier

M RAULIN présente quelques réflexions à l'appui des remarques qu'il avait faites précédemment, d'une part, sur un passage du Mémoire de M Fuster, relativement aux changements survenus dans le climat de la France, de l'autre, à une Note dans laquelle M Marcel de Serres a défendu l'opinion qu'il avait précédemment émise relativement au gisement de mercure annoncé dans le département de l'Aveyron

M GAGNAGE prie l'Académie de vouloir bien lui désigner des Commissaires

en présence desquels il fera les expériences nécessaires pour constater l'efficacité d'un procédé qu'il a imaginé pour la *desinfection des fosses d'aisance*

MM d'Arcet, Payen, Boussingault composeront cette Commission

M le général **DZEMBINSKI** adresse une réclamation de priorité relative ment au procédé proposé par M Halette, pour l'occlusion du tube pneuma tique dans les chemins de fer dits *chemins atmosphériques*. Cette réclamation est renvoyée à la Commission chargée de faire le Rapport sur le procédé de M Halette

M **JAUME SAINT HILAIRE** rappelle les tentatives qu'il a faites pour introduire et repandre en France la culture du *Polygonum tinctorum*, et soutient, contre l'opinion émise par M Boussingault dans un ouvrage présenté ré cemment à l'Académie, que c'est à lui, et non à M *Delille*, que sont dus les premiers essais en grand

M **BOUSSINGAULT** déclare que ce qu'il a dit relativement à la culture du *Polygonum tinctorum* est le résultat non de ses propres recherches, mais de celles d'un agronome en général très-bien informé sur de pareilles questions, de M *Vilmorin*, aujourd'hui correspondant de l'Académie pour la Section d'Économie rurale. D'ailleurs, du moment où il y a con testation, M. Boussingault examinera la chose par lui-même, et s'empres sera de rendre pleine justice à M Jaume Saint-Hilaire, s'il reconnaît que sa réclamation est fondée

M **PASSOT** écrit qu'il a adressé à l'Académie, dans sa séance du 19 février, le Rapport que M Lamé avait fait sur sa *turbine*, et demande que cette pièce soit renvoyée à la Commission du prix de Mécanique

L'Académie accepte le dépôt de trois *paquets cachetés* présentés par M **BONNET-HIGNOU**, par M **DUPRE** et par M **GAGNAGE**

La séance est levée à 5 heures

F

BULLETIN BIBLIOGRAPHIQUE

L'Académie a reçu, dans cette séance, les ouvrages dont voici les titres

Comptes rendus hebdomadaires des séances de l'Académie royale des Sciences,
1^{er} semestre 1844, n^{os} 8 et 9, in-4°

Annales de Chimie et de Physique, par MM GAY-LUSSAC, ARAGO, CHE-
VREUL, DUMAS, PELOUZE, BOUSSINGAULT et REGNAULT, 3^e série, tome X,
février 1844, in-8°

Annales des Sciences naturelles, décembre 1843 et janvier 1844, in 8°

Annales de la Chirurgie française et étrangère, février 1844, in-8°

*Cours élémentaire d'Histoire naturelle à l'usage des collèges et des maisons
d'éducation Botanique*, par M A DE JUSSIEU, 2^e partie *Organes et fonc-
tion de la reproduction, classification et familles*, 1 vol in 12

Annales forestières, tome III, janvier et février 1844, in-8°

Annales scientifiques, littéraires et industrielles de l'Auvergne, mai et juin
1843, in-8°

Recherches zoologiques sur le Système lymphatique des Reptiles, par M BA-
VIN (Extrait des *Annales d'Anatomie*) Broch in-8°

Idiologie des Animaux, par M PIERQUIN DE GEMBOUX, in-8°

*Mélanges photographiques, complément des nouvelles Instructions sur l'usage
du Dagguerréotype*, par M CH CHEVALLIER, in-8°

Observations et réflexions sur l'Intoxication miasmatique, par M BERTULUS
Montpellier, 1843, in-8°

*Type de chaque famille et des principaux genres des Plantes croissant sponta-
nément en France*, par M PLÈGE, 4^e livr, in 4°

Annales de Thérapeutique médicale et chirurgicale, n^o 12, in 8°

Mémorial — Revue encyclopédique, janvier 1844, in-8°

Discours sur l'Esprit positif, par M A COMTE, broch in-8°

Journal de Chirurgie, février 1844, in-8°

Le Technologiste, mars 1844, in 8°

Journal des Connaissances médicales pratiques et de Pharmacologie, février
1844 in-8°

Encyclographie médicale, février 1844, in-8°

Annales des Maladies de la Peau et de la Syphilis, février 1844, in-8°

Journal d'Agriculture pratique et de Jardinage, février 1844, in-8°

- Journal des Connaissances utiles*, février 1844, in-8°
Bibliothèque universelle de Genève, janvier 1844, in 8°
Histologie ou Anatomie de texture, par M AD BURGRAEVE Gand, 1843,
in 8° (Présenté par M VELPEAU)
Carte géologique de l'Angleterre et du pays de Galles, publiée sous les auspices
de la Société pour la diffusion des connaissances utiles, par M MURCHISSON
Proceedings Procès-verbaux de la Société royale de Londres, n° 57,
in-8°
Revised *Nouvelles Instructions pour l'usage des Observatoires magnétiques
et météorologiques préparées par la Commission de Physique et de Météorologie
de la Société royale de Londres* in-8°
Transactions *Transactions de la Société royale d'Edimbourg*, vol XV
part III, in-4°
Proceedings. *Procès verbaux de la Société royale d'Edimbourg*, n° 21
et 22, 1843
Proceedings *Procès verbaux de la Société royale d'Irlande*, n° 31 à 35,
1841
Quarterley Review *Revue trimestrielle*, septembre 1843 (n° CXLIV),
Londres, in-8°
Travels Through *Voyages dans les Alpes de la Savoie et dans d'autres par-
ties de la chaîne pennine avec des observations sur les phénomènes des Glaciers*
par M FORBES Edimbourg, 1843, in 8°, avec un plan de la mer de glace
Observations on . *Observations sur les jours de perturbations magnétiques
extraordinaires faites dans les observatoires magnétiques de la Grande Bretagne
et de ses colonies sous les auspices de l'Amirauté et de la direction de l'Artillerie
imprimées par ordre du gouvernement, sous la direction de M le colonel SABINE*
part I^{re}, 1840 et 1841 in-4°
, 4 Theory *Théorie de la structure du Ciel étoilé, comprenant l'explication
de la Voie lactée et des nébuleuses, fondée sur une nouvelle doctrine astrono-
mique, sans nom d'auteur* Londres, 1842, in 4°
Experimental *Expériences chimiques et agricoles, tendant à prouver que
le Carbone est un corps composé fabriqué par les plantes et décomposé par la pu-
tréfaction*, par M B RIGG Londres, 1844, in-8°
Notes *Notes sur le pays compris entre Bellary et Bangalore, et relatives
principalement à la Géologie*, par M NEWBOLD, 1 feuille in 8°
The London *Journal de Sciences et Magasin philosophique de Londres*,
Edimbourg et Dublin, août, septembre, octobre et novembre 1843, in-8°
The Athenæum Journal, juillet, août, septembre et octobre 1843, in-8°

Denkschrift . . Fête séculaire commémorative de la fondation de l'Université d'Erlangen, Discours présenté le 23-25 août 1843 au nom des Universités réunies de Halle et de Wittenberg, par M. le docteur SCHWEIGGER (Sur les Mystères de la nature, avec leur rapport à la littérature ancienne) Halle, 1843 in 4°

Præsidii et adjunctis præsidis Academiæ naturæ curiosorum Leopoldino Carolinæ Dissertationem de vi quam catalytici appellantur placent dicant R. P. D. I.-S. SCHWEIGGER, 1 feuille in 4°

Astronomische . Nouvelles astronomiques de M. SCHUMACKER n° 496, in-4°

Annalen Annales de l'Observatoire de Vienne publiées par MM. LIT. TROW et SCHAUB, XXII^e part Vienne, 1843 in-4°

Ausgewählte Choix de dessins d'Anatomie végétale, par M. H.-F. INCK, 4^e livr in fol .

Jahresbericht Rapport sur les travaux concernant la Physiologie végétale qui ont été faits dans l'année 1841, par le même in-8°

Zwölf. Douze propositions importantes relatives à la nécessité qu'il y a, dans un état bien ordonné, de faire concourir le développement physique avec le développement intellectuel, par M. WERNER Dresde, 1836, in 8°

Amona Recherches sur les meilleurs moyens pour développer les forces et perfectionner les formes du Corps féminin dans les limites permises par la nature par le même, 1837, in 8°

Medicinische Gymnastique médicale, par le même, 1838 in 8°

Die reinste. La plus pure source de la Joie du jeune âge, 330 jeux ou exercices destinés à développer le corps et l'esprit, par le même, 1843 in 8°

Die gymnastische Maison de sante gymnastico-orthopédique de Dessau, par le même, 1844, in 8°

Lezioni . Leçons théoriques et pratiques pour les Accouchements, par M. le professeur J.-G.-B. GHERSI Cagliari, in-8°

Gazette médicale de Paris, n° 8 et 9

Gazette des Hôpitaux, n° 21 à 26

L'Expérience, n° 348

L'Echo du Monde savant n° 13 à 17

Prospectus de la Revue synthétique, in-8°

OBSERVATIONS MÉTÉOROLOGIQUES. — FÉVRIER 1844.

JOUR	9 HEURES DU MATIN.			MIDI.			3 HEURES DU SOIR.			9 HEURES DU SOIR.			THERMOMÈTRE.		ÉTAT DU CIEL À MIDI.	VENT À MIDI.
	RAMON à 0°	TIÈRE ext.	MOYEN	RAMON à 0°	TIÈRE ext.	MOYEN	RAMON à 0°	TIÈRE ext.	MOYEN	RAMON à 0°	TIÈRE ext.	MOYEN	MAXIMA.	MINIMA.		
1	755,08	- 0,2		756,64	+ 1,0		757,61	+ 2,5		758,32	- 0,3		+ 2,8	- 1,0	Quelques nuages	O N O fort
2	747,98	- 2,0		744,04	+ 1,6		741,22	+ 1,2		741,50	- 0,4		- 0,2	- 2,8	Neige abondante	S S E fort
3	751,97	- 1,8		753,31	+ 1,5		753,85	+ 1,9		754,60	- 0,2		+ 2,8	- 2,8	Vapeurs	N E
4	753,12	+ 1,8		751,37	+ 2,3		749,03	+ 3,8		743,58	+ 0,2		+ 3,0	- 2,8	Pluie et neige	N O
5	743,37	+ 2,0		743,41	+ 2,3		741,56	+ 3,8		743,37	+ 1,6		+ 4,5	- 0,1	Quelques nuages	O S O
6	748,85	+ 0,6		748,85	+ 2,6		748,31	+ 2,5		746,62	+ 1,1		+ 4,8	- 1,5	Nuageux	S S O
7	743,56	+ 1,4		743,28	+ 3,0		743,03	+ 2,5		749,22	+ 5,6		+ 6,9	- 0,9	Brume	O S O
8	747,23	+ 1,6		747,23	+ 6,9		747,14	+ 2,5		745,65	+ 3,4		+ 8,0	- 3,7	Pluie	O S O
9	740,86	+ 4,7		739,24	+ 6,3		738,87	+ 2,6		740,61	+ 2,5		+ 7,5	- 2,0	Pluie par moments	S O O
10	741,14	+ 2,2		741,22	+ 3,1		743,81	+ 3,0		747,83	+ 1,4		+ 3,9	- 2,0	Couvert	S O O
11	753,08	+ 1,4		752,11	+ 2,8		752,54	+ 3,4		753,65	- 0,4		+ 4,9	- 0,2	Tres nuageux	O N O
12	750,06	+ 1,8		756,83	- 1,8		756,02	- 1,4		758,58	- 0,1		- 1,0	- 0,2	Couvert	O N O
13	757,15	- 1,0		757,27	- 0,6		757,16	+ 1,3		759,33	- 0,8		+ 1,7	- 1,2	Couvert	N N E
14	759,08	- 2,2		759,22	- 1,1		758,69	+ 1,6		760,23	- 0,0		+ 2,0	- 2,9	Beau	N N
15	759,45	- 0,5		759,30	+ 2,9		758,73	+ 4,2		760,00	- 0,0		+ 4,8	- 4,8	Pluie	N S
16	761,15	+ 1,9		762,23	+ 2,3		762,77	+ 3,3		764,37	+ 1,6		+ 3,9	- 1,8	Couvert	S S
17	763,69	- 1,1		762,97	+ 1,6		761,84	+ 2,2		761,70	- 0,7		+ 3,7	- 3,5	Couvert	S S
18	758,20	- 1,6		757,27	+ 0,3		755,58	+ 2,0		753,85	- 0,4		+ 3,2	- 3,7	Pluie	S S E fort
19	756,38	- 4,5		748,33	+ 7,0		746,07	+ 4,1		747,20	+ 4,5		+ 8,8	- 0,5	Nuageux	O N O
20	753,23	- 4,6		753,61	+ 7,4		753,74	+ 4,1		755,29	- 1,0		+ 4,8	- 0,9	Beau	S S E
21	748,13	+ 0,9		744,97	+ 1,3		742,34	+ 2,6		740,32	+ 7,1		+ 7,7	- 2,9	Pluie par moments	S S O
22	739,10	+ 4,9		739,17	+ 6,1		739,66	+ 6,1		744,71	- 0,0		+ 8,0	- 4,3	Beau	S S O
23	736,63	+ 0,6		736,55	+ 2,4		734,84	+ 2,9		747,60	+ 5,9		+ 3,5	- 2,7	Pluie continue	O fort
24	738,98	+ 0,6		740,48	+ 7,7		740,48	+ 7,7		748,53	+ 5,9		+ 11,8	- 2,6	Couvert	N N O
25	751,22	+ 8,6		750,33	+ 9,0		747,24	+ 10,5		749,50	+ 9,9		+ 10,1	- 3,0	Couvert	O fort
26	732,58	+ 6,8		730,00	+ 6,9		727,24	+ 7,7		731,59	+ 5,2		+ 2,1	- 0,2	Couvert	N N O
27	730,20	+ 3,8		726,59	+ 6,5		721,68	+ 7,3		725,28	+ 3,4		+ 7,8	- 0,7	Couvert	O N O
28	750,65	+ 3,8		751,21	+ 8,6		751,48	+ 7,3		759,28	+ 3,4		+ 9,9	- 2,0	Couvert	O N O
29	750,60	+ 7,2		750,19	+ 8,6		750,62	+ 8,6		748,90	+ 5,5					
1	747,11	+ 1,3		746,83	+ 2,9		746,44	+ 3,4		746,36	+ 1,5		+ 4,4	- 0,1	Moy du 1 ^{er} au 10	Plein en conditions
2	752,02	+ 0,2		756,05	+ 2,0		750,32	+ 2,9		757,16	+ 1,1		+ 3,7	- 1,8	Moy du 11 au 20	Cour
3	740,22	+ 4,7		744,82	+ 5,7		744,26	+ 6,1		744,48	+ 4,2		+ 8,0	- 1,3	Moy du 21 au 29	Terr
	749,96	+ 2,0		749,70	+ 3,5		749,17	+ 4,0		749,49	+ 1,8		+ 5,3	- 0,2	Moyenne du mois	+ 2,6

COMPTE RENDU

DES SÉANCES.

DE L'ACADÉMIE DES SCIENCES.

SÉANCE DU JUNDI 11 MARS 1844

PRÉSIDENCE DE M CHARLES DUPIN

NOMINATIONS

L'Académie procède, par la voie du scrutin, à la nomination de diverses Commissions qui seront chargées de l'examen des pièces adressées aux concours pour les prix à décerner dans la prochaine séance publique

Grand prix des Sciences physiques Question concernant le *développement du fœtus chez les oiseaux et les reptiles* Commissaires, MM Serres, de Blainville, Flourens, Velpeau, Dumeril

Grand prix des Sciences physiques Question concernant le *mécanisme de la production de la voix chez l'homme* Commissaires, MM Babinet, Magendie, Flourens, Pouillet, de Blainville

Grand prix des Sciences physiques Question concernant la *structure de l'organe de la voix chez l'homme et chez les animaux mammifères* Commissaires, MM de Blainville, Serres, Flourens, Magendie, Dumeril

Prix de Médecine et de Chirurgie, de la fondation Montyon Commissaires, MM Andral, Velpeau, Roux, Rayet, Dumeril, Serres, de Blainville, Bieschet, Magendie

Sur la proposition de M Arago, l'Académie charge une Commission de faire des recherches relatives à l'action que l'eau pourrait exercer

sur le platine travaillé par le procédé de M *Jeannety*. Ces expériences auront pour objet de faire connaître s'il sera possible de déterminer, au moyen de l'immersion dans l'eau la pesanteur spécifique des étalons du kilogramme.

L'Commission se composera de MM Thenard Berthier, Arago, Chevalier Dumas Pelouze et Regnault.

MEMOIRES PRESENTES

HYDRAULIQUE. — *Sur la variation du volume des eaux fournies par le puits artésien de l'abatton de Grenelle*, Note de M F LEFORT ingénieur des ponts et chaussées attaché au service des eaux de Paris.

(Commissaires, MM Poncet Piobert Morin.)

Après le tunage en tôle galvanisée du puits artésien de Grenelle le champignon de la colonne ascensionnelle avait été élevé à 31^m,12 au-dessus du sol de l'abatton, ou à la cote 33,29 du nivellement général de Paris. Quand on fut décidé à conduire les eaux au bassin de l'Estiapiade il devint nécessaire de relever le champignon de 1^m,98 ou de le placer à la cote 31^m,31.

Pour faciliter le travail on a enlevé, le 17 du mois d'août 1843 la plaque pleine qui formait la tubulure située au niveau du sol de l'abatton, et on a établi l'écoulement au bas de la colonne. Le 19 au matin, l'eau, d'abord très-limpide, était devenue extrêmement sale, à 10 heures l'écoulement avait presque cessé. Le 20, il y avait un peu d'augmentation mais le produit n'était encore que de 10 pouces (de fontainier) environ. Le 21 l'eau était limpide, et (au dire du bulletin de service) avait repris son cours habituel.

Le 16 septembre, les travaux pour la consolidation et le relevement de l'échafaud, et pour la distribution des eaux, étant terminés, on a fait monter l'eau dans la cuvette supérieure nouvellement installée. Le produit a été trouvé de 55 pouces environ.

Le 16 novembre, l'eau s'est un peu troublée le fontainier de service a nettoyé la cuvette deux fois dans la journée. Par suite de ce soin, la cuvette ne s'est pas abaissée et n'a pas fait décrocher la soupape de la conduite de distribution. Le trouble a été tout à fait accidentel, et n'a pas donné lieu à des remarques sur le décroissement du produit, que plusieurs jaugeages avaient déjà fixé de 53 à 55 pouces.

* Dans la nuit du 23 au 24 décembre, les eaux ont charrié des matières

argileuses en grande abondance, la cuvette s'est abaissée et a fait décroître la soupape (1) Le 24 au soir l'eau était claire

Peu de temps après on a commencé à observer une diminution dans le volume des eaux du puits, le service de la distribution se faisait avec peine Le 29 janvier 1844 on constatait 27 pouces à la cuvette le 25, 24 pouces seulement.

Des jaugeages faits les jours suivants ayant donné des volumes qui variaient de 23 à 25 pouces j'ai proposé dans un Rapport à la date du 1^{er} février, d'ouvrir le robinet placé au bas de la colonne montante Cette proposition était motivée comme il suit

La réduction paraissant tenir à un engorgement dans la partie inférieure du tube, l'ingénieur sousigné pense qu'il y a lieu d'établir un écoulement temporaire à fleur du sol par l'ouverture du robinet vanné situé à ce niveau L'augmentation de pression déterminera sans aucun doute un accroissement de vitesse dans le tube et par suite la sortie des matières qui opposent en ce moment une grande résistance au mouvement de l'eau

Cette opinion ayant été partagée par les membres de la Commission réunis le 11 février à l'abbaye de Clignancourt j'ai commencé le 12 l'ouverture du robinet, et, après avoir opéré progressivement de jour en jour j'ai fini d'ouvrir en plein le 20 du même mois

Les circonstances qui ont accompagné cette manœuvre sont signalées dans un journal d'observations quotidiennes J'en extrais les résultats les plus saillants

Pendant le temps mis à abaisser l'eau dans le tube jusqu'au niveau du sol de l'abbatoir c'est-à-dire du 12 au 20 février les variations de volume ont été peu importantes de 23 à 28 pouces en nombres ronds

Dans la feuille de dessin annexée à cette Note j'ai représenté graphiquement les observations relatives au débit du puits et à la hauteur de l'eau au-dessus de l'orifice d'écoulement

• L'eau a été presque constamment limpide L'alteration dans la couleur n'a été bien notable qu'un seul jour et pendant une heure seulement

Des oscillations dont l'amplitude s'est élevée jusqu'à 5 mètres ont eu lieu dans la colonne, sans avoir été provoqués par la manœuvre du robinet

(1) Cette circonstance a fait l'objet d'une Note insérée aux *Comptes rendus* séance du 8 janvier 1844

Elles paraissent tenir principalement à des engorgements et à des dégorgements successifs de l'orifice très-petit, ménagé pour l'écoulement il est clair d'ailleurs que cette cause n'est pas unique, je la crois principale

Des croûtes de glace se sont formées successivement au sommet du champignon et le long des parois du tube Elles provenaient évidemment de la congélation de la vapeur d'eau

Le 21 février à 6 heures du matin, le robinet-vanne étant ouvert en plein, l'eau est arrivée très-trois et très-abondante

Le maximum du débit (90 à 92 pouces) paraît avoir été atteint le même jour à 4 heures

Le 22 février à minuit, l'eau s'est éclaircie, et elle n'a été de nouveau notablement troublée que le 24, de 2 heures à 2^h 30^m de l'après-midi

Le 25, la Commission a été réunie à Labritton Je lui ai présenté

1° Un résumé du journal des observations quotidiennes

2° La représentation graphique des jaugeages faits sur les volumes élevés à différentes hauteurs au-dessus du sol de Labritton, à des époques assez éloignées les unes des autres, dans des conditions très-diverses de tirage, et généralement en eaux sales

Je n'avais eu alors à m'occuper du puits artésien que d'une manière très-accidentelle Je n'ai fait aucun de ces jaugeages Les résultats m'ont été communiqués par M. Mulot En reproduisant graphiquement ces observations j'ai eu seulement pour but d'en conserver la mémoire

3° La représentation graphique des jaugeages faits du 12 au 20 février

4° Une explication du peu d'accroissement du produit pendant l'abaissement de la colonne d'eau dans le tube supérieur à l'orifice d'écoulement

Cette explication repose sur l'hypothèse, qui semble justifiée par les faits, d'une obstruction assez étendue dans la partie inférieure du tube, et sur la forme de la fonction de la vitesse qui représente très-approximativement la résistance que la matière du tube oppose au mouvement de l'eau

Le cube des matières amenées dans les journées des 21 et 22 février est de 17^m 80 Ce cube est supérieur au vide des tubes, il est donc positif que la totalité des matières n'était pas logée dans ces tubes au moment où le dégorgement a commencé à avoir lieu, d'un autre côté, on ne peut douter qu'une partie ne fût engagée, car l'argile, entraînée dans l'origine, se présentait sous la forme de galets allongés, forme dont la persistance semble ne pouvoir être expliquée que par un mouvement oscillatoire assez prolongé dans l'intérieur des tubes

» Il est assez facile de se rendre compte de la possibilité d'une agglomération à la suite de ce mouvement oscillatoire, il suffit pour cela de considérer la manière dont les diamètres des tubes se succèdent à partir du fond. Le dernier tuyau, qui n'est autre que le tube primitif de retenue, a $0^m,17$ de diamètre, le tuyau qui lui est immédiatement supérieur n'a qu'un diamètre de $0^m,14$. La vitesse est donc moindre dans le premier tube que dans le dernier, et, à la jonction, il y a dans le tube inférieur un espace annulaire dans lequel l'eau participe très-peu au mouvement de translation du reste de la masse liquide. Là a dû se former le noyau de l'obstruction.

» La conséquence immédiate de l'engorgement a été une augmentation dans les frottements éprouvés par le liquide en mouvement, c'est-à-dire que le tube engorgé a fonctionné comme un tube de même longueur et de moindre diamètre.

» Ceci établi, écrivons l'équation fondamentale du mouvement permettant à cet effet, soient

p la pression supportée par l'eau à l'extrémité du tube inférieur, pression rapportée au mètre superficiel,

p_0 la pression barométrique à l'extrémité de la colonne ascendante,

π le poids du mètre cube d'eau,

H la hauteur des tubes depuis le point le plus bas jusqu'à l'orifice d'écoulement établi au niveau du sol,

h la hauteur variable de la colonne d'eau au-dessus de cet orifice d'écoulement,

l la longueur d'un des tuyaux qui composent le tube,

d son diamètre,

u la vitesse de l'eau dans ce tuyau,

u_x la vitesse de l'eau dans les tubes de plus petit diamètre que ceux qui les précèdent,

u_y la vitesse de l'eau dans les tubes de plus grand diamètre que ceux qui les précèdent,

g l'accélération imprimée aux corps graves par la pesanteur,

α l'inverse du coefficient de réduction de la hauteur réelle à laquelle est due la vitesse dans les ajutages cylindriques,

a, b les coefficients constants de la première et de la deuxième puissance de la vitesse dans la fonction binôme qui représente très-approximative-

ment la résistance opposée au mouvement de l'eau par les tuyaux de conduite,

et d'après les principes de l'hydraulique,

$$\frac{P}{\sigma} = \frac{P_0}{\sigma} + H + h + \Sigma \frac{4l}{d} (au + bu^2) + \alpha \Sigma \frac{u_x^2}{2g} + \Sigma \frac{u^2}{u_1^2 - u^2},$$

tous les termes de cette formule représentant des hauteurs d'eau

$\frac{P}{\sigma}$ dépend de la hauteur des réservoirs qui alimentent la nappe souterraine des dimensions des canaux aquifères, etc. Cette quantité ne peut donc être déterminée à priori, c'est-à-dire indépendamment de la connaissance des circonstances du mouvement de l'eau dans les tubes ascensionnels, mais on peut prévoir que si le bassin alimentaire est très-étendu, le volume d'eau débité faible et variant dans des limites assez resserrées $\frac{P}{\sigma}$ devra peu varier.

Pour qu'il en soit ainsi, il faut que

$$h + \Sigma \frac{4l}{d} (au + bu^2) + \alpha \Sigma \frac{u_x^2}{2g} + \Sigma \frac{u^2}{u_1^2 - u^2}$$

varie très-peu quand on fait varier h depuis 33^m,10 jusqu'à 0, et quand on donne à u , u_x , u_y de valeurs qui répondent aux produits compris entre 23 et 28 pouces.

Or, il est facile de voir qu'on satisfait à cette condition en supposant au tube inférieur un diamètre réel assez petit (0^m,04 à 0^m,05, au lieu de 0^m,17), résultant du fait d'une obstruction qui occuperait toute sa longueur.

Je n'ai du reste, en aucune façon la prétention de fixer exactement l'importance et l'étendue de l'obstruction. J'ai voulu seulement prouver que si l'un des tubes, et tout porte à penser que c'est le tube inférieur, a été obstrué sur une grande longueur, l'accroissement de produit a dû être très-faible, relativement à l'abaissement de la colonne d'eau au-dessus de l'orifice d'écoulement.

Le 25^e janvier, l'eau étant parfaitement limpide, et le produit paraissant avoir atteint le maximum dont il est susceptible, au niveau du sol de l'abat-toir, dans l'état actuel des couches souterraines, la Commission a été unanimement d'avis qu'il fallait faire remonter progressivement l'eau jusqu'à la cuvette supérieure.

Cette opération a été faite dans les journées des 26, 27 et 28 février, sans offrir d'autre circonstance nouvelle que des variations plus importantes et plus régulières dans les produits.

Le 28 février, à 5 heures de l'après-midi, on constatait 53^o,35 verses dans la cuvette supérieure, depuis cette époque jusqu'à ce jour, le produit n'a varié qu'entre 53 et 56 poncees. Les eaux, ont généralement conservé une limpidité parfaite, quoiqu'elles continuent à charrier accidentellement des sables, des argiles, et même des pyrites de fer.

Les pyrites paraissent former la base d'un filtre engagé dans les argiles, et superposé aux sables aquifères : c'est à elles sans doute qu'on doit et la limpidité des eaux et la réduction sur les produits anciennement observés aux saies.

PHYSIQUE DU GLOBE — *Liste des tremblements de terre ressentis en Europe et dans les parties adjacentes de l'Afrique et de l'Asie, pendant l'année 1843 par M. ALEXIS PERRAY*

Janvier

Le 15 janvier, vers 3 heures du matin, à Strasbourg, deux légères secousses plus sensibles en rase campagne.

Le 18 9^h 45^m du matin, à Kodjé Berie (Algérie) forte secousse. A 2 heures, une secousse à Alger. Depuis quelque temps, écrivait on alors, les tremblements de terre se renouvellent fréquemment dans le Gébel.

Le 21, 3^h 44^m du matin, à Inspruck (Autriche), légères secousses du sud-est au nord-ouest.

Le 29, 9 heures du matin, à Boigotaro (Etats de Parme), une forte secousse.

Dans le courant du mois, quelques secousses en Calabre.

Février

Le 7 février, à Torre di Passeri (Abruzzi ultérieure), secousse ondulatoire du nord-est durant 8 secondes. Immédiatement après, une autre secousse plus courte dans la direction opposée.

Le 11, en Dalmatie et sur les côtes voisines, plusieurs secousses.

Le 13, à Checchiara (Abruzzi ultérieure), une forte secousse. Depuis le 27 décembre, ce pays a éprouvé quatre tremblements de terre.

Le 18, vers 10 heures du soir, dans les environs de Leipsick, plusieurs secousses qui se sont renouvelées dans la nuit suivante. Elles étaient accompagnées d'un bruit semblable à celui que fait une voiture roulant sur un pont de bois. Plusieurs personnes sortirent de leurs maisons pour examiner l'état de l'atmosphère. Le ciel était très pur, de sorte qu'on ne pouvait attribuer à un orage les secousses et le bruit dont elles étaient accompagnées. La dernière surtout avait été si forte, que les maisons avaient été ébranlées, et qu'une foule de personnes en ont été recueillies.

Le 25, à Oban et Loch-gilp-head (Argylshire), plusieurs secousses.

Dans le courant du mois, plusieurs secousses avec météores ignes dans les provinces septentrionales de la Suède.

Mars

Le 3 mars, à Oban et Loch-gilp head (Argylshire), plusieurs secousses.

Le 3 encore, à minuit, à Malagat, une secousse assez légère.

Le 9, 8^h 20^m du matin, dans une grande partie du district nord-est de Manchester, une légère secousse avec roulement, comme si des murs s'étaient renversés. Le mouvement a paru concentré dans les montagnes qui séparent le Lancashire et le Yorkshire. On l'a particulièrement senti à Rochdale et dans la vallée de Todmorden. C'est le troisième tremblement de terre dans ce pays depuis trois ans, mais c'est le plus faible.

Le 17, de 5 heures à 1 heure moins 3 minutes, nouvelles secousses. Il faisait, dit-on, une chaleur étouffante une heure auparavant. Le baromètre n'a pas varié.

Le 17 encore, vers 1^h 30^m du matin, à Guernesey et à Jersey, plusieurs secousses avec bruit comme un roulement de voiture. On les a ressenties sur plusieurs points du département de la Manche, où un phare a été éteint par la commotion.

Le 25, 7^h 30^m du matin, à Bale (Suisse), une violente secousse. L'horizon était couvert, le temps nébuleux et le vent frais, le baromètre a baissé d'une ligne, la température est également devenue plus basse après. Quelques personnes assurent avoir ressenti dès la veille quelques légères secousses. Celle du 25 a été ressentie à Huningue, dans le grand-duché de Baden, où elle a été très forte. Sa direction était du sud-est au nord-ouest.

Le 28, 10^h 6^m du matin, à Lunéville (Meurthe), une secousse dans la partie la plus élevée de la ville.

Le 31, 3 heures du soir, à Castro-Villari (Calabre citérieure), trois secousses de 3 secondes chacune avec mouvement ondulatoire.

» Le même jour, vers 8^h 30^m du soir, à Bagneres, un bruit sourd a été suivi, dit-on, d'une secousse qui a jeté surtout l'épouvante. Dans cette journée, toute la ligne des Pyrénées était ravagée par un orage des plus violents.

Avril

Le 6 avril, vers 6 heures du matin, à Bois-le-Duc, secousses de l'est à l'ouest durant quelques secondes. On les a ressenties à la Haye, Grave, Breda, Weghel, dans le Lambouig et à Maestricht. Des sonnettes ont sonné, des portes se sont ouvertes. Même phénomène quarante ans auparavant (1804). Ces secousses se sont étendues jusqu'à Bruxelles, où l'on a remarqué des perturbations magnétiques du 5 au 7.

» Nuit du 8 au 9, quelques secousses en Suisse, principalement dans les environs de Genève, où M. Wattenmann a remarqué des perturbations magnétiques très-faibles.

» Le 21, dans l'après-midi, espèce de tremblement sous-marin dans la partie de la digue de la mer de Blockzyl. L'eau fut violemment agitée, et il se leva des jets d'eau lancés à 2 mètres de hauteur avec fracas, pendant 7 à 8 minutes. La surface est restée boueuse après le calme. Dans les deux jours précédents, on avait pris 500 kilogrammes d'anguilles.

» Le 24, après 10 heures du matin, à Borgotaro (États de Parme), légère secousse ondulatoire.

Mai

Le 2 mai au soir, à Giotta-a-Mare, delegation de Fermo (Italie), tremblement assez fort. Un rocher s'est détaché des montagnes qui s'étendent le long de la Via Apulitina. Plusieurs personnes ont péri.

» Le 9, à Louvic-Jonzon (Pyrénées), secousses horizontales dirigées de l'ouest à l'est.

Juin

» Le 13 juin, 1^h 40^m du soir, à Palerme (Sicile), une forte secousse de l'est à l'ouest.

» Le 14, 1^h 50^m du soir, à Palerme, quatre fortes secousses. Les trois premières ondulatoires eurent lieu du levant au couchant, d'après le séismographe, et la quatrième, encore plus sensible, fut saccadée (*succussoria*). La pendule de Mudge, située dans la salle de l'Instrument des Passages, s'arrêta. Le tout parut durer 9 secondes.

» Le 24, peu après 10 heures du soir, à Borgotaro et autres lieux du pays de Volterre (États de Parme), secousse très-sensible.

(396)

Le 18, 9^h 27^m du soir, à Domezain, canton de Saint-Palais, dans le pays basque secousse assez forte pour qu'on fût balance sur les chaises, même au lit de chambre Elle a duré 5 à 6 secondes On la ressentit aussi à Gabas et à Rudous dans la vallée d'Aspe, pendant 2 secondes

Le 18 encore entre 11 heures et minuit à Algues, deux secousses assez violentes Ondulation de vent vient

Juillet

Le 16 juillet dans les Pyrénées, une légère secousse suivie d'une chute de neige à Puy-pignan Laux-Bonnes Bayonne et au Canigou

Il est tombé de la neige aussi dans les environs d'Apt, près du mont Ventoux et dans quelques localités des Basses-Alpes

Le 25, 5^h 30^m du matin, à Temeswar (Hongrie) tremblement annonce par un balancement du sol accompagné d'un croulement souterrain semblable au tonnerre Il s'est fait sentir d'une manière plus forte encore, à 2 kilomètres du bouff, à la poudrière où des objets pesant un quintal ont été déplacés de quelques lignes La direction de l'oscillation était du nord nord-est au sud sud-ouest Il paraît que des maisons ont été renversées à Temeswar

Le même jour 5^h 37^m, à Glatz tremblement de 8 secondes, avec bruit pareil au tonnerre

On a ressenti une secousse à Eisenetz (Styrie) à peu près à la même époque

Le 28 4^h 15^m à Nantes (Loire Inférieure), léger tremblement de quelques secondes La tremulation très-sensible a été accompagnée d'un bruit semblable au roulement d'une lourde charrette

On lit dans *la Quotidienne* du 20 août Dans la traversée de Smyrne à Malte un bâtiment de guerre anglais a ressenti deux violentes secousses de tremblement de terre à 35 milles dans l'ouest de l'extrémité occidentale de Candie et toutes deux presque dans la même position elles étaient accompagnées d'un grand bruit semblable à un roulement venant du sud est et immédiatement au-dessous du navire On n'a pas trouvé fond au même instant par 160 brasses (292 mètres)

Août

Le 10 août, 10 heures et quelques minutes du soir, à Doinstchen, une violente secousse, les maisons ont été ébranlées pendant quelques minutes Ciel sombre air calme et humide, temps chaud Le baromètre était très élevé

Le meme jour, a 4 heures du soir il y avait a Bagnères de Luchon une trombe qui causa de grands ravages

Le 14, 20 minutes avant 5 heures du soir a Carlstadt, légères secousses accompagnées d'un roulement semblable au bruit du canon Les oscillations paraissaient venir du nord Le thermometre n'a pas changé L'air était calme et pur

Le 22, 3 heures et quelques minutes du matin puis a 11^h 15^m a Vénise, deux secousses de bas en haut

Septembre

Le 6 septembre, 9^h 20^m du matin, a Soult près de Saint Hippolyte Doubs), une forte secousse dans la direction du sud-est au nord ouest Au village, les meubles ont été dérangés et les habitants se sont sauvés dans la rue

Le 10 entre 5 et 6 heures du soir il y a eu une trombe d'eau a la ville, dans le département de la Meurthe

Le 13, on a ressenti des secousses dans le royaume de Naples

Du 11 au 14 a Raguse (Dalmatie) chaque jour deux ou trois secousses légères

Du 2 au 10 M Vossich observa a Zegna (Croatie), dans son cabinet météorologique des perturbations très notables de l'aiguille magnétique Le 11, a 7^h 11^m du matin il remarqua un affolement extraordinaire qui dura 36 minutes De semblables perturbations se renouvelèrent, le meme jour, a 11^h 49^m, pendant 27 minutes, a 5^h 2^m, pendant 22 minutes et à 6^h 30^m, pendant 44 minutes Il constata de faibles perturbations pendant les journées suivantes, mais suivant M Colla, elles furent très fortes a Fiume, Zara et Cattaro, durant les journées des 12, 13, 14, 15, 16 et 17 du meme mois

Le 14, par une alternative d'atmosphère calme et d'un vent frais du nord ouest, le jour fut beau et serin jusqu'à 10 heures, le thermometre indiquait 20 degrés Réaumur, le barometre 28^{po} 7^{li}, et l'hygrometre de Sauvure 96 degrés Ni dans l'atmosphère, ni parmi les animaux domestiques on ne remarquait aucun symptôme de derangements prochains dans l'air, lorsqu'a 4^h 57^m de l'après midi, une violente secousse du sol dans la direction du sud-ouest remplit les habitants d'effroi A cette première secousse qui dura 4 secondes, en succéda une autre plus violente encore qui dura 4 a 5 secondes, par un vent de sud ouest, et avec un bruit souterrain

A 5^h 20^m, nouveau tremblement plus faible, qui dura 3 secondes, puis encore, à 6^h et 6^h 25^m, nouvelles secousses assez fortes

Le sol resta calme jusqu'à minuit, et alors la population, qui avait quitté

la ville, sentia dans ses demeures. Mais à 1^h 28^m du matin, il se fit un mouvement d'oscillation très-violent dans la direction du sud-ouest, et toute la population s'enfuit de nouveau avec une agitation extrême. De nouvelles secousses eurent lieu encore à 1^h 27^m d'une manière légère, et à 1^h 34^m de l'après-midi, d'une manière très-violente et pendant 5 secondes. Celle-ci fut précédée d'une forte détonation et d'une baisse du baromètre pareille à celle de la veille et de 6 lignes à peu près. Un phénomène semblable fut observé à Zara, le même jour et à la même heure.

Les secousses (un nombre de 10 au moins dans les vingt quatre heures) ont eu lieu alternativement par ondulation et par soubresaut. Elles ont été, dit-on, moins fortes à Ragusa Vecchia qu'à Raguse, par contre, elles ont été plus violentes à Ombla, dans l'île de Giuppana, et surtout dans les contrées avoisinantes, et notamment dans l'Herzégovine.

Sur mer, à 6 milles des côtes, les pêcheurs n'ont ressenti aucune secousse, tandis que dans le port de Civitosa et dans la baie de Raguse la mer était très agitée. Ce tremblement a été ressenti à l'île de Curzola, où le baromètre a baissé de 7 lignes, très-fort à Spalato, le Port-Opai, Slano et Cattaro. Il n'y a pas pourtant cause de désastres. La première secousse a eu lieu à Cattaro, le 14, à 5^h du matin. Celles du soir paraissent avoir duré jusqu'à 8 secondes à Obizzo et à Almissa, où elles ont été violentes.

Dans toutes les localités, dit M. Colla, les secousses les plus fortes furent précédées par des détonations, des bruits souterrains, ou un sifflement dans l'air, comme en produirait le passage d'une troupe d'oiseaux. Parmi les phénomènes observés à Raguse et dans les environs, il faut signaler celui qui, selon la tradition, a accompagné dans ces pays chaque tremblement de terre, et en particulier celui qui détruisit Raguse en 1667. Il consistait en un nuage horizontal (connu sous la dénomination de *poutre*) qui s'étendait du sud-est au sud, et demeura visible depuis la première secousse du 14, jusqu'à 10 heures de la matinée suivante à la place où il avait paru primitivement, sans que le vent nord-est, qui souffla pendant tout ce temps, l'ait pu faire changer d'apparence. L'apparition de ce nuage n'a pas moins épouvanté les habitants que les secousses elles-mêmes, dont les effets ont été quelques murs lézardés, quelques murailles un peu affaissées.

Le 16, deux jours après le terrible phénomène, un météore singulier se fit voir dans le ciel à Cattaro, Lesina, Raguse même, ainsi que dans quelques lieux voisins. On aperçut, pendant 2 minutes environ, une flamme sphérique de diamètre apparent de 3 mètres, allant de l'est à l'ouest, qui jetait

une clarté semblable à celle du Soleil couchant; il était alors 2 heures du matin.

» Du 14 au 29 inclusivement, il y a eu à Raguse et sur la côte de Dalmatie de légères secousses *chaque jour*. On cite particulièrement celles des 15, 18, 21, 23, 24, 25 et 26, dans une Lettre datée du 29

Octobre

» Le 2, à midi, à Odessa, léger tremblement du nord au sud, pendant 3 secondes. Il n'a été sensible que dans les étages supérieurs. On l'a ressenti aussi dans la province de Bessarabie, en particulier dans la ville de Kischineff et dans la forteresse de Burder.

» Le 3, quelques secousses à Jassy.

» Le même jour, recrudescence du phénomène à Raguse, ou, comme nous l'avons dit plus haut, les secousses étaient quotidiennes. Les plus fortes ont eu lieu à 9^h 30^m du soir, et se sont étendues jusqu'à Trieste.

» Les 4, 5 et 6, à Pienza (Toscane), quelques secousses.

» Le 5, vers 9 heures du matin, à Chateauguon (Ille-et-Vilaine), une secousse de 2 secondes. Elle a été prise, par les personnes qui étaient dans les maisons, pour un fort coup de tonnerre, mais plusieurs laboureurs qui, dans ce moment, étaient aux champs, ont senti la terre trembler sous eux. De deux couvreurs, qui travaillaient sur l'une des petites tours du château, l'un a trebuché et s'est rattrapé à son échelle, croyant avoir été poussé par son camarade, tandis que celui-ci avait lui-même failli tomber.

» Le vendredi 6, vers 9^h 30^m du matin, une seconde secousse plus forte et de 40 secondes de durée. Le bruit pouvait être comparé à celui d'une voiture lourdement chargée qui eût marché du sud au nord. Elle a été ressentie sur les routes de Rennes, de Nantes et de Janzé.

» Le jeudi 5, à 10 heures du soir, et le lendemain, on en a ressenti sur plusieurs points du département.

» Le 7, 10^h 30^m du matin, à Raguse, nouvelle et violente secousse.

» Le 9, 1 heure du soir, et le 10, 5 heures du matin, nouvelles secousses.

» On remarque souvent encore, écrivait-on le 10, une légère oscillation quand on se tient tranquille et attentif. Après plusieurs jours de calme, il s'est élevé un *sirocco* accompagné de pluie. Le baromètre était à 27^{mo} 10^{li}, le thermomètre à 16°, 5 Reaumur.

» Dans les premières commotions d'octobre, dit M. Colla, on observa un abaissement insolite de la mer, et l'on remarqua que l'eau sulfureuse qui jaillit à la rive droite del Omba, exhalait une odeur insupportable, ce qui d'ordinaire

n a pris lieu. Quelques autres signes, que l'on tient pour de constants précurseurs d'un tremblement de terre, tels que l'inquiétude des animaux, l'agitation de la mer, la couleur des nuages, certaines vapeurs autour du soleil et de la lune etc., quelquefois se sont confirmés, mais en général ont manqué.

Dans la nuit du 9 au 10, tempeste et ouragan épouvantables à Venise, de paiement du Vai. Le dommage s'est étendu jusqu'à Nice.

Le 10, vers 5 heures du matin, une secousse de tremblement de terre se fit sentir, et c'est depuis ce moment que l'ouragan semble avoir diminué, pour ne cesser cependant que sur les 7 heures.

Le 10 encore, quelques secousses dans le royaume de Naples.

Le lendemain 11, à 1^h 30^m du matin, à Naples, une forte secousse, les toits mêmes ont été ébranlés, et les sonnettes mises en mouvement.

Les 16 et 17, à l'île de Rhodes quelques secousses.

Le 18, nouvelle secousse pendant 30 secondes, du sud au nord. Elle a été beaucoup plus violente à l'île de Kalki, voisine de l'île de Rhodes : des bâtiments y ont été renversés, une montagne s'est écroulée. Il paraît que les secousses s'y sont continuées encore quelques jours. Au phénomène se rapporte sans doute le passage suivant, tiré d'une lettre de Constantinople, écrite le 18.

L'île de Cebelisi a perdu près de 600 habitants par un tremblement de terre.

19, 20 et 21 octobre. — Tant que régnait le sirocco (lit-on dans une lettre datée de Riguse, le 21 du mois), tant que le ciel était couvert de nuages, l'air fort humide et le niveau de la mer élevé, on ne ressentit aucun tremblement de terre, et beaucoup de familles se disposaient à retourner à la ville. Mais lorsque le vent nord-ouest se calma, sans que la pluie, généralement souhaitée, fût venue, lorsque le ciel redevenait serein, l'air plus élastique et le niveau de la mer plus bas, les secousses reprirent, à la vérité d'une manière plus faible. C'est ainsi que l'on ressentit un léger choc, le 19, vers l'aube du jour, au moment où le vent changea de direction, puis une secousse à 10^h 45^m avant midi. Le 20, à 6^h 40^m du soir, nouveau choc de plus de 1 seconde, qui répandit quelque frayeur. Le 21, vers 1 heure après minuit, légère et courte commotion. Toutes les secousses sont saccadées, et se manifestent dans une direction du nord-ouest.

Le 24, 4 heures du matin, à Florence, deux secousses légères, la première a duré 7 secondes, avec mouvement ondulatoire. Air calme, mais chargé de nuages.

Le 25, 4^h 22^m du matin, à Parme, faible secousse ondulatoire de l'est-

sud-est à l'ouest nord-ouest Elle a dure 4 secondes, et a été précédée d'un bruit prolongé On l'a ressentie à Florence et à Genes

Le 26, vers 3^h32^m du matin, à Parme, nouvelle secousse, mais très-faible, dans la même direction Durant cette dernière nuit, atmosphère calme et orageuse, sillonnée d'éclairs continuels A Florence, pluie torrentielle dans la journée On a ressenti ces diverses secousses à Pise, Reggio, Bologne, Lucques, Livourne, l'istrie, Sienne On dit qu'elles ont été violentes dans les Apennins

Le même jour encore, 11^h 30^m du matin, à Erzeroum (Arménie turque) épouvantable secousse ondulatoire du sud au nord Des cheminées ont été renversées, quatre ou cinq personnes ont péri on a quitté la ville

Novembre

Le 12 novembre, à Gijón (Asturies), tremblement d'un peu plus de 1 seconde La mer était mauvaise, et le vent du nord soufflait avec violence Le phénomène est, dit-on, *usolite* dans ce pays, où l'on a craint que les mines de charbon de terre ne prissent feu

Le 17, 8^h 30^m du matin, à Hano (Autriche), deux secousses légères, 1 30 minutes d'intervalle, précédées d'un roulement souterrain A 11^h 45^m troisième secousse Le 18, 5 heures du matin, on a entendu un murmure sourd le ciel était couvert, l'air froid et agité Le 21, 6 heures et 7^h 45^m du soir, deux nouvelles secousses

Le même jour, 21 novembre, un peu avant 7 heures du soir, et 30 minutes après à Raguse (Dalmatie), deux secousses avec roulement sourd Une troisième encore dans la nuit

Dans le courant du mois, à Ryhill (Yorkshire), une secousse de 1 minute de durée, 35 minutes après, une nouvelle secousse suivie d'une troisième 10 minutes plus tard Rien n'a été renversé mais ce tremblement a été fort sensible

Décembre

Le 1^{er} décembre, 3^h 44^m du matin, à Slano (Dalmatie), fort bruit souterrain

Le même jour, 4^h 30^m du matin, à Raguse (Dalmatie), bruit ou tonnerre souterrain prolongé qui fut suivi d'abord d'une secousse très-violente, puis de plusieurs autres plus faibles

Le 8, 1 heure après midi, à Vienne, une secousse accompagnée d'un bruit semblable à celui produit par la chute d'une masse énorme l'empê-

latitude 7 degrés Réaumur, barometre a *beau fixe* Ces instruments n'ont éprouvé aucune variation sensible

Le 21, vers 10 heures du soir, à Giromagny, Rougegoutte (Haut-Rhin) et dans les environs, une assez forte secousse de 2 secondes Elle a été précédée d'une clarté si vive, qu'elle a effacé la lumière des chandelles

Vers la même heure, deux violentes detonations eurent lieu dans la région des Vosges Elles étaient accompagnées d'une vive lumière, les portes des maisons et les vitres ont été ébranlées dans les villages qui garnissent les vallées et la base des Vosges Cet ébranlement a été faible dans la plaine

A Colmar ce phénomène a été considéré par beaucoup de personnes comme un coup de tonnerre précédé d'un éclair, cependant on a reconnu que la clarté avait duré plus longtemps, qu'elle avait produit une espèce de scintillement dans le brouillard La secousse y a été faible, tandis qu'elle a été assez vive à Beigheim et dans d'autres communes au pied des Vosges

Dans la vallée de Munster, la lumière a embrasé tout l'horizon et a égalé celle du jour La secousse a été ressentie fortement

A Belfort la lumière a été vue, à travers le brouillard, du côté du nord, avec l'éclat et la couleur d'un éclair, on ne parle ni de bruit ni de secousse

Elle a aussi été observée en Suisse, à Delemont, avec cette circonstance qu'il y a eu deux éclairs correspondants aux deux detonations

Le 22, 4 heures moins quelques minutes de l'après midi, à Cherbourg, une secousse On s'en est à peine aperçu en ville mais elle a été très forte au quartier des Mielles et à Tourlaville On l'a ressentie à Saint-Malo à peu près à la même heure Plusieurs habitants de la commune de Patame ont affirmé que leurs maisons avaient été ébranlées

A Guénesey on a éprouvé deux secousses très fortes

De ce phénomène on peut rapprocher le fait suivant, extrait textuellement du bulletin de service du puits foie de Grenelle

Puits artésien — L'eau ayant monté une grande quantité de sable et de vase pendant la nuit du 23 au 24, la cuvette s'étant abaissée et avait fait fermer la soupape de distribution Le 24 au soir, l'eau était revenue claire et ne montait plus que très-peu de sable » (Communication de M Lefort à l'Académie des Sciences)

Cependant il est remarquable que des hommes qui travaillaient dans les mines de l'île de Paik, à plus de 130 mètres de profondeur, n'ont rien entendu, rien senti du choc, quoiqu'au-dessus de leurs têtes la commotion ait causé

de grandes alarmes. Le chauffeur de la machine à vapeur de ces mines a remarqué que le piston frappait avec une grande violence, et il pensait que le générateur était brisé. Le même jour, à Raguse (Dalmatie), deux nouvelles secousses.

» Le 24, vers 6 heures du soir, bruit subit et sourd auquel a succédé un choc violent. Le vent venait de l'ouest. Le ciel était serein.

» Le 25, à 6^h 35^m du matin, nouveau tremblement précédé d'un grand fracas qui a duré 5 secondes.

Ce catalogue nous présente pour l'année qui vient de s'écouler, sans y comprendre les nombreuses secousses ressenties en Dalmatie pendant les mois de septembre, octobre, novembre et décembre, près de soixante tremblements de terre qui peuvent être considérés comme des phénomènes distincts.

On en trouve en

Janvier	5	Avril	3	Juillet	3	Octobre	8
Février	4	Mai	2	Août	3	Novembre	3
Mars	2	Juin	4	Septembre	2	Décembre	3
Hiver	16	Printemps	9	Été	8	Automne	14

Il est remarquable que les six mois d'avril à septembre, même en y comprenant les secousses ressenties par un navire anglais dans la Méditerranée, fournissent environ le tiers des frus que présente l'année. Ce résultat est conforme à la loi déduite des Mémoires que j'ai eu l'honneur de présenter à l'Académie.

Remarquons encore que la moyenne annuelle des tremblements de terre, déduite des dix dernières années, n'est que de trente quatre, pour l'Europe et que 1841, l'année la plus féconde en commotions souterraines, n'en présente que cinquante et un.

GÉOLOGIE — *De l'influence de la pression dans les phénomènes géologico-chimiques*, par M. J. FOURNET.

(Commissaires, MM. Élie de Beaumont, Dufrenoy, Regnault.)

» L'influence de la pression sur les dissolutions et les combinaisons des gaz, joue un rôle si capital dans les phénomènes géologiques, qu'il est essentiel non-seulement de résumer les divers faits qui se sont produits sous son influence, mais encore de faire voir jusqu'à quel point elle modifie les prévisions déduites des expériences du laboratoire. Il est en effet assez ordinaire

de voir le chimiste, dont les opérations se font dans des appareils débouchés, fragiles ou perméables, se faire des idées très-fausSES sur les réactions qui doivent survenir quand des matières volatiles ou gazeuses sont emprisonnées et comprimées de toutes parts entre les cavités, les pores des roches, et quand des parois résistantes s'opposent invinciblement à toutes les fuites. De là, une partie des objections qu'ils elevent sans cesse contre les résultats auxquels arrivent les géologues. Mais il importe peu, car l'observation est un guide aussi sûr que l'expérience, l'une n'a que trop souvent succédé à l'autre, et ce n'est pas un des moindres services que la Géologie aura rendus à la science que d'y avoir introduit cette donnée, d'en avoir fait ressortir la puissance et d'en avoir développé enfin les conséquences.

Reprenons donc les faits à leur origine et suivons-en les déductions pas à pas.

Dès vers 1775, Strange avait trouvé de la pierre à chaux non calcinée sur le sommet de quelques basaltes des monts Euganéens. En 1784, Faujas observa aussi à Roche-Maure et à Villeneuve-de-Berg que le calcaire pouvait être saisi et ramolli par les lavés sans éprouver la décomposition qui survient ordinairement sous l'influence d'une haute température. Des faits analogues furent constatés depuis à Torre-del-Grieco, mais il restait à expliquer cette circonstance, et c'est en 1795 que Hutton émit les premières idées sur l'influence de la pression. Ses études sur les amygdaloides lui avaient démontré que le carbonate de chaux s'y présentait sous des conditions telles qu'il fallait nécessairement admettre la fusion de ce composé, mais, retenu longtemps par l'ignorance où l'on était de sa véritable nature, il ne fut mis hors d'embarras que par les découvertes de Black sur l'acide carbonique, et sur son affinité avec la base calcaire, son génie actif et pénétrant saisit immédiatement l'analogie qui existe entre cette combinaison et le carbonate de baryte, celui-ci, comme on le sait, retient son acide carbonique avec tant de force, qu'il peut éprouver la fusion sans se décomposer, pourquoi des lors le carbonate de chaux ne serait-il pas de même fusible, si un obstacle mécanique s'oppose à la séparation de l'acide d'avec la base?

Tel fut le principe fécond qui permit à Hutton d'étendre ses aperçus sur la formation de quelques roches et de la houille, et s'il se fût contenté d'expliquer par son secours certains phénomènes des filons, il fût resté dans le vrai, mais, comme la plupart des novateurs, il outrepassa le but en appliquant son idée mère aux tubercules siliceux de la craie, aux *Septaria*, au sel gemme aux bitumes des roches stratifiées, à la soudure des grains de sable quartzueux des grès, et enfin à la consolidation des couches calcaires en gé-

néral, en supposant que tous ces résultats aient été effectués sous l'influence des fortes pressions et des hautes températures qu'il attribuait aux profondeurs sous-marines

Cependant un pareil germe devait produire son fruit. Hall essaya de vérifier l'indication de Hutton en introduisant de la craie, des fragments de coquillages, du marbre, du spath calcaire pulvérisés dans des tubes de porcelaine qu'il exposa à la température de l'argent fondant (21 à 23 degrés wedgwood) sous une pression équivalente à environ huit atmosphères, la tentative réussit et son résultat fut une sorte de marbre blanc, cristallin, translucide susceptible de poli et indiquant par conséquent l'existence momentanée d'un état au moins pâteux, favorable à l'arrangement moléculaire en question

» Cette expérience était tellement capitale, qu'elle eût mérité d'être répétée avec toute l'authenticité que Lavoisier, Seguin et Vauquelin mirent à constater la synthèse de l'eau, elle aurait tenu les chimistes en garde contre leurs tranchantes assertions, et une plus vive impression les eût conduits à généraliser le fait. Cependant on ne la perdit pas de vue, car elle fut variée quant à la manière d'opérer, et les géologues étaient avertis

Bucholtz tassa environ 2 kilogrammes de craie pure et lavée dans un creuset qu'il couvrit d'une simple brique, au bout d'une demi-heure d'un coup de feu rouge-clair et rapide, il reconnut que le volume était diminué de $\frac{1}{3}$ et que les parties superficielles et celles qui se trouvaient en contact avec les parois étaient converties en chaux vive sur une épaisseur de 0^m,002. Au delà venait un produit à demi fondu, d'un blanc jaunâtre, très-dur et schistoïde, puis une partie centrale où les signes de la fusion étaient encore plus évidents. En faisant dissoudre ce produit dans l'acide muriatique on obtint $\frac{48}{100}$ d'acide carbonique, résultat très-peu différent de celui que les analyses les plus rigoureuses attribuent au calcaire

» Hausmann observa de son côté, dans les hauts fourneaux du Wermland, en Suède, des calcaires du creuset, dont le ramollissement était poussé à un tel degré, qu'une tige de fer y pénétrait avec la même facilité que dans de la neige; d'où il faut nécessairement conclure que des pressions, même très-faibles, suffisent pour s'opposer au dégagement des corps volatils combinés avec certaines bases fixes, fait que M. Gay-Lussac a établi d'une manière différente et tout aussi authentique à l'aide de considérations d'un autre ordre et basées sur les phénomènes de la distillation

» L'instantanéité du coup de feu influe encore sur le succès de l'opération, car Cassola, ayant exposé du calcaire compacte au jet de feu du chalumeau à gaz oxygène et hydrogène, le vit se convertir en calcaire grenu

dont les grains étaient rhomboédriques d'ailleurs les résultats suivants de Brewster, en démontrant que les dégagements ne sont pas également faciles dans tous les sens, feront peut-être présumer que certains groupements cristallins peuvent jusqu'à un certain point y mettre obstacle. Ainsi les globules d'acide carbonique émanent du carbonate de chaux chauffé, suivant des lignes parallèles à la petite diagonale, la flamme du chalumeau, dirigée sur la face latérale d'une lamelle de gypse, l'amène à l'état de fusion avec ébullition, mais si le dard porte sur la face du clivage principal, alors la vapeur aqueuse surmonte facilement les obstacles, et le gypse se déshydrate sans ébullition et sans fusion. Que l'on imagine maintenant des amoncellements irréguliers de cristaux comme c'est le cas pour les marbres saccharoïdes, ou pour d'autres masses subcristallines analogues et l'on aura nécessairement une foule de petites oblitérations locales dont les effets, ajoutés à ceux de la cohésion et de l'affinité pourraient contribuer à modérer l'action divellente du calorique.

Des résultats aussi bien établis devaient se prêter naturellement à l'explication de la formation des filons de calcaire éruptif, cependant l'annonce de la découverte de pareilles masses, faite en Toscane par M. Savi, trouva dans certains géologues français de notre temps, le même esprit d'incrédulité qui distinguait autrefois les werneriens quand on se hasardait à avancer que les basaltes étaient des produits volcaniques, tant il est vrai que l'opinion générale ne se laisse ramener à l'évidence qu'avec une excessive lenteur. Ceux-ci regardaient comme chimérique la classification d'une matière lithoïde au rang des matières fondues, par la raison que celles-ci devaient être vitreuses, ceux-là trouvaient que le calcaire est trop peu fusible, qu'il aurait dû se décomposer, et d'ailleurs la fausse idée de l'existence d'un calcaire primitif, cristallin et sédimentaire dominait en plein dans la science, en sorte que l'on cherchait à y rattacher les filons de la Toscane.

J'ai donc dû m'assurer de la réalité des découvertes de M. Savi, et, en 1838, je trouvai dans la partie jurassique des Alpes un vaste réceptacle de filons qui, par la variété de leur composition se pretent admirablement à tous les genres de recherche. Les résultats généraux de ces observations seront développés dans une autre occasion, n'ayant à m'occuper, pour le moment, que de la simple constatation du fait capital, savoir celui de l'existence d'un calcaire décidément plutonique. Il fallait pour cela découvrir des gîtes dans lesquels ce minéral était associé d'une manière intime avec des matières dont l'origine ne pouvait être contestée. Et quoi de plus essentiellement igné qu'un feldspath, ou une albite, ou un pyroxène ! Or les injections dont les gres

jurassiques du mont Cenis sont pour ainsi dire lardés, ne tarderent pas à m'offrir le genre d'association que je cherchais l'efeldspath, la chaux carbonatée, le quartz et le fer spathique y sont enchevêtrés l'un dans l'autre ils sont tellement contemporains, qu'ils se sont genés mutuellement dans leur développement cristallin, et les saillies de l'un sont imprimées sur l'autre des lors il ne me fut plus possible de demeurer davantage en suspens et je n'hésitai pas à ranger tous les gîtes alpins analogues dans la catégorie des masses éruptives, ainsi qu'on peut le voir dans un Mémoire sur la cristallisation des filons publié à cette époque .

Mais cette conviction que je venais seulement d'acquiescer, s'était déjà emparée de quelques autres observateurs car M Hrusmann avait dès 1818 fait connaître ses idées sur le mode de formation des filons de la Suède et de la Norvège, parce qu'il y avait trouvé des pyroxènes associés de la même manière aux calcaires et Léonhardt de son côté, signalait à peu près à la même époque que moi les remarquables phénomènes qu'il observa dans les filons de calcaire saccharoïde qui traversent la formation houillère de Wolfstein, dans la Bavière rhénane

• Rappelons maintenant que l'eau est très-voisine de l'acide carbonique tant par sa facile gazéification que parce qu'elle joue comme lui le rôle d'un acide faible elle l'est donc, en cette qualité, dans les hydrates ou plutôt dans les hydrosilicates zéolithiques si nombreux dans les roches éruptives telles que les porphyres quartzifères, les mélaphyres et les basaltes dont ils remplissent, en tout ou en partie les bulles et les cavités On peut donc appliquer à ceux-ci tout ce qui a été dit à l'occasion des carbonates, mais l'influence de la pression dans leur formation ayant déjà été établie dans un travail récent sur les porphyres, je dois me contenter de ce rapprochement, qu'il serait superflu de développer de nouveau

• L'histoire de la science offre souvent des particularités qui pourraient paraître bizarres si l'on ne savait pas que la grandeur de leur objet oblige les géologues à suivre des routes distinctes, en sorte qu'ils ne se rencontrent pas toujours dans le cours de leurs investigations Ainsi pendant qu'ils s'occupaient en discussions sur les zéolithes, il ne leur était guère venu à l'idée que les persulfures, les arsénio-sulfures et autres masses analogues étant aussi susceptibles de perdre une partie de leur soufre ou de leur arsenic par volatilisation, donnaient par là prise aux mêmes objections que les carbonates et les hydrosilicates Cependant ces pyrites abondent dans les filons que l'on est en droit de regarder comme autant de résultats de la fusion, et si elles ont conservé leur excès de gazolithe, c'est uniquement en vertu de la même

cause qui a maintenu l'eau et l'acide carbonique dans les combinaisons précédentes

Les expériences de Knox et de M Braconnot ont encore démontré l'existence des bitumes dans plusieurs minerais essentiellement plutoniques, et ce résultat est d'autant plus frappant que ces corps sont assez généralement décomposables en un produit charbonneux fixe et en parties gazeuses. Mais M Cagniard-Latour a prouvé aussi qu'ils sont stables quand il y a pression, et ayant introduit du bois dans un tube de verre qu'il chauffa au rouge, il obtint une fusion du ligneux telle que le résultat fut une matière bitumineuse avec une certaine quantité de gaz.

Ainsi donc l'existence d'une classe nombreuse de minerais dépend essentiellement de la pression, et déjà celle-ci prend une large part dans le cadre des phénomènes géologiques, mais son influence, envisagée sous le point de vue du jeu des affinités, offre une autre série de résultats bien plus dignes d'attention que les précédents et dont nous allons faire connaître les principaux effets, après avoir résumé les diverses notions qu'il importe d'avoir présentes à l'esprit.

On peut supposer que les affinités ne doivent pas être susceptibles d'éprouver des variations avec les températures, car étant une propriété de la matière, elles doivent par cela même être aussi invariables que les molécules. L'eau qui, à froid, déplace l'acide silicique des silicates, la déplace pareillement à chaud, pourvu que la pression maintienne les corps en présence. La même chose arrivera naturellement pour l'acide carbonique, qui est beaucoup plus énergique que l'eau, aussi les exemples de carbonates qui ont cristallisé en présence de la silice au milieu de masses portées à la température de la fusion, abondent dans la nature.

En second lieu, quand les affinités de deux corps sont à peu près les mêmes, l'intervention des masses suffit pour faire pencher la balance d'un côté ou de l'autre. Ainsi, dans le traitement de 1 atome de galène par 1 atome d'étain, le soufre se partage également entre ce métal et le plomb, en sorte qu'il reste un sulfure double et un alliage en parties proportionnelles égales; mais si le mélange était composé de 1 atome de galène pour 2 atomes d'étain, la galène serait desulfurée complètement et le produit se composerait du même alliage que précédemment avec un sulfure d'étain simple.

On admettra sans doute encore que la circonstance dans laquelle les affinités manifestent le mieux leur action est celle où les corps demeurent en contact. Quand, par exemple, des proportions convenables de plomb, de fer et de soufre, fondus réagissent de telle sorte que le fer s'empare de tout

le soufre, en laissant le plomb à l'état de liberté, c'est le fer qui possède la plus grande affinité pour le soufre. Mais en sera-t-il de même dans le cas où l'un des corps peut prendre l'état gazeux? c'est ce dont il est permis de douter, car l'intervention du calorique joue alors un rôle en changeant l'état d'aggrégation moléculaire, et le produit définitif peut être considéré comme celui de la résultante de deux forces, savoir, de l'affinité et de celle qui détermine l'expansion de la matière. Il faut donc pour évaluer dans ce cas l'affinité relative, obliger par un moyen quelconque le gaz à demeurer en contact intime avec le solide ou le liquide, et s'assurer si le résultat est encore le même. Or, la pression est ce moyen, et voyons ce qui en résultera relativement à certains corps dont les affinités pour l'oxygène diffèrent peu entre elles : tels sont le carbone, l'hydrogène et le soufre comparés soit entre eux, soit avec le fer et quelques autres métaux.

Cet énoncé pouvant paraître choquant, il importe encore d'entrer dans quelques détails préliminaires à cet égard.

On admet en chimie que l'oxyde de fer est réductible par le carbone, et ces corps sont rangés dans les tables des affinités fort loin l'un de l'autre, en vertu de cette supposition : mais cette classification, qui semble vraie d'après les résultats obtenus à l'aide des creusets brasques, n'en devient pas moins douteuse quand on étudie les phénomènes de plus près.

En effet, les anciennes expériences de Pott sur la combustion du fer, présentées depuis comme neuves par M. Bierley et répétées par M. Darcet, prouvent déjà que ce métal possède une telle affinité pour l'oxygène, qu'il brûle avec la plus énergique intensité quand, après avoir été échauffé au rouge-clair, il est soumis à l'action d'un bon soufflet de forge. La vivacité de cette combustion dépasse de beaucoup ce que l'on connaît de celle du carbone dans les mêmes circonstances, et ce résultat, déjà si frappant, est encore dépassé par ceux qui vont suivre.

M. Magnus a fait voir que du fer réduit, à la plus basse température possible, soit par l'effet d'un courant d'hydrogène, soit par la calcination de l'oxalate, se trouve dans un état de porosité analogue à celui du charbon provenant de la calcination des matières végétales, il jouit donc comme lui de la propriété de condenser le gaz dans ses pores, et, dans cet état de division extrême, la faible élévation de température qui résulte de cette condensation suffit pour lui faire prendre feu dès qu'on l'expose au contact de l'air. Il en est de même pour l'uran, le nickel et le cobalt surtout, si l'on favorise cet état de division par l'interposition de particules de glucine ou d'alumine. Ces métaux sont les seuls qui produisent ce phénomène, parce qu'ils sont aussi les

seuls qui réunissent les conditions nécessaires, savoir, une assez forte affinité pour l'oxygène, et la possibilité d'être réduits à des températures assez basses pour empêcher l'agglomération ainsi le cuivre qui remplit cette dernière condition ne satisfait déjà plus à la première.

Mettons maintenant ces effets en regard de ceux qui produisent le carbone. Ce corps est excessivement divisé dans le charbon de bois, dans le noir animal, dans le noir de fumée, enfin dans les masses triturées pour la fabrication de la poudre, et pourtant il ne s'enflamme pas alors spontanément au contact de l'air. Je me trompe, il peut, d'après les curieuses observations d'Aubert s'échauffer vers le centre jusqu'au point de sembler au bout d'environ vingt-quatre heures, quand, ayant acquis par des procédés particuliers un tel degré de division qu'il ressemble à un liquide onctueux, il est amoncelé dans des tonneaux. Son échauffement, d'abord très-lent, s'accélère ensuite, et il faut, pour déterminer l'ignition, une masse d'environ 80 kilog., car un poids moindre n'acquiescit qu'une température de 47 degrés. Mais que prouve ce fait quand on le met en regard du fer devenu pyrophorique sous le plus petit volume, si ce n'est qu'il faut pour le carbone une masse telle qu'elle puisse accumuler et conserver la chaleur acquise par la condensation, tandis qu'il suffit au métal de sa simple affinité pour produire cet effet et s'il ne s'allume pas spontanément dans les circonstances ordinaires, c'est uniquement à cause de son excessive cohésion.

Nous serions donc déjà en droit de conclure de ce rapprochement, que le fer est un corps plus oxydable que le carbone, si une objection ne se levait encore contre cette manière de voir. On peut en effet dire que le carbone est constamment refroidi par la formation de l'acide carbonique qui, dans le passage à l'état de gaz, rend latente une partie du calorique développé, tandis que le fer formant avec l'oxygène un produit fixe n'est pas soumis à la même influence réfrigérante. Il s'agit donc de trouver des résultats plus concluants, et c'est en cela que la Géologie va bientôt interposer son autorité. Mais passons d'abord à l'hydrogène.

* Ce gaz est regardé, avec raison, comme possédant une moins grande affinité pour l'oxygène que le carbone, car les charbons incandescents décomposent l'eau avec formation d'hydrogène, on remarquera d'ailleurs que, suivant M. de Saussure fils, l'oxyde de carbone n'est point détruit, tandis que, d'après M. Berzelius, il le serait imparfaitement, quand, mêlé avec l'hydrogène, il traverse un tube de verre chauffé au blanc, incertitude qui prouve au moins une très grande égalité de force. Il reste donc maintenant à voir si ce

gazolithe est plus ou moins oxydable que le fer, afin d'achever de lever les doutes sur l'ordre de classification

L'eau n'oxyde pas le fer à la température ordinaire, car la rouille ne se produit sous son influence que par l'absorption d'une première quantité d'oxygène atmosphérique. L'eau cède son oxygène au fer en présence de l'acide sulfurique, mais la pression de quelques centimètres du liquide suffit aussi pour arrêter toute action.

M. Gay-Lussac a démontré qu'à une température plus élevée l'eau sous la forme d'un courant de vapeur, détermine la formation de l'oxyde noir de fer et qu'à une température identique, ce même oxyde est réduit par le gaz hydrogène. Il explique ce résultat d'après la loi de Berthollet, par la réaction des masses, en disant que l'efficacité des affinités dépend et du degré de l'affinité même, et de la quantité des corps mis en jeu, d'où il résulte que ces oxydations et réductions peuvent avoir lieu, parce que les produits gazeux de l'opération sont continuellement enlevés, et ne contiennent plus l'affinité de la masse qui succède. Ce même chimiste paraît encore admettre que les choses se passeraient différemment si l'on opérait en vase clos ou le gaz produit ne serait pas remplacé par du gaz nouveau, et qu'alors l'oxydation et la réduction, toujours partielles, s'arrêteraient quand d'une part l'hydrogène ou la vapeur d'eau, et, de l'autre, le fer métallique ou oxyde se trouveraient dans un rapport tel, qu'ils pussent se fuir en équilibre. Voilà ce que suppose la Chimie actuelle. Quant à nous, ajoutons qu'il serait permis de comparer les actions résultantes à celles qui se passent entre l'étain, le plomb et le soufre, telles qu'elles ont été exposées précédemment et faisons en outre ressortir jusqu'à quel point ces données tendent à indiquer une identité d'énergie entre l'hydrogène et le fer.

Il s'agit actuellement de voir si la Géologie introduira pas de nouvelles lumières dans la question.

Klaproth et Vauquelin ont reconnu que certains basaltes contiennent du carbone en même temps qu'une grande quantité d'oxyde de fer libre ou à l'état de silicate, et M. Gay-Lussac fait à cet égard l'objection que le carbone aurait dû réduire au moins une partie de l'oxyde de fer, en se convertissant lui-même en acide carbonique. Il se base sur ce qu'un minerai fusible contenant même moins de dix centièmes d'oxyde de fer, en laisse réduire une partie notable, ainsi que Klaproth, M. Gueniveau et M. Berthier l'ont démontré, soit directement, soit par l'analyse des laitiers des hauts fourneaux, dans lesquels il ne reste pas plus de deux à trois centièmes d'oxyde de fer. Or, les basaltes en contenant jusqu'à vingt-cinq centièmes, il n'est pas probable

qu'il puisse exister du carbone en présence d'une aussi grande quantité de cet oxyde sans qu'il y ait réduction. Cependant celle-ci n'a pas lieu, de nombreuses analyses sont venues démontrer que les oxydes existent dans les basaltes à côté du carbone et des hydrocarbures, et cela parce que la pression s'opposant au développement des composés volatils, les choses demeurent dans l'état le plus conforme aux simples affinités. On expliquera encore de la même manière comment il arrive que, dans les filons des environs d'Alendal en Norvège, et dans ceux de la Suède en général, le graphite, l'anthracite et les bitumes se trouvent en contact ou en association avec le fer oxydulé, bien que, d'après les intéressantes observations de M. Hausmann, de M. Hisinger et de M. d'Aubière, ces masses soient essentiellement plutoniques. Enfin, on concevra pourquoi les bitumes ou les hydrocarbures divers ont pu se trouver simplement dissous dans certains amphiboles et pyroxènes, ainsi que dans une série de roches plus ou moins ferrugineuses, dont on trouve l'énumération dans les travaux de Knox et de M. Braconnot.

En résumé, les résultats précédents nous portent à conclure que le fer avec le nickel, le cobalt, l'uranium, le manganèse et les métaux terreux et alcalins doivent, selon toute probabilité, être rangés en tête des combustibles et il sera sans doute piquant de voir un jour reculer de beaucoup le carbone et l'hydrogène, ces réductifs par excellence des chimistes et des métallurgistes, en prenant pour point de départ, d'un nouveau système de classification des forces, l'invariabilité des molécules ou celle des forces qui les animent dans le cas de l'égalité des masses, la plupart des autres circonstances sur lesquelles on s'est basé jusqu'à ce jour n'étant que des effets plus ou moins complexes.

Les affinités du soufre pour l'oxygène paraissent être voisines de celles du carbone et de l'hydrogène, ainsi les acides sulfureux et sulfurique sont réduits, par le carbone, en oxyde et sulfure de carbone, tandis que l'hydrogène et l'acide sulfureux donnent de l'eau, du soufre et, dans certains cas, de l'acide sulfhydrique. Tous les sulfates de métaux réductibles sont décomposés par le carbone de manière à former des sulfures, tandis que l'hydrogène est incapable d'en réduire un certain nombre, ou bien produit avec d'autres de l'eau et du gaz sulfureux, ou bien des oxysulfures, ou enfin des sulfures, et quelquefois du métal avec formation de gaz sulfhydrique, etc. Ces affinités expliquent donc encore comment il arrive que le caoutchouc fossile se trouve implanté sur le sulfate de baryte des filons plutoniques de galène du Derbyshire, sans qu'il y ait formation de sulfure de barium.

Pour compléter, autant que possible, ces détails chimiques, il reste à

ajouter quelques autres résultats géologiques de nature à confirmer ou à généraliser les aperçus précédents

Le carbonate de chaux, mis en contact avec le carbone se décompose avec formation d'oxyde de carbone gazeux, et par conséquent susceptible d'obéir facilement à l'action expansive du calorique cependant le graphite contenu dans le calcaire plutonique du Baientz nous démontre que de pareilles réactions n'ont nullement lieu dans les masses du domaine de la Géologie

Le soufre étant un corps très oxydable et de plus doué d'une très grande affinité pour le fer il semblerait que dans les cas où une surabondance de persulfure de fer se trouve en contact avec un protoxyde ou un peroxyde, il a dû céder à ces oxydes son excès de soufre le résultat de cette réaction serait donc indépendamment du gaz sulfureux du persulfure de fer ou même si l'excès est suffisant, une combinaison de persulfure avec le protosulfure c'est-à-dire une pyrite magnétique Cependant les choses ne se sont pas passées ainsi dans les filons en général le protosulfure est une véritable ruée dans celui de Traverselle la combinaison magnétique se montre très clair-semée et le persulfure y existe librement au milieu des masses de fer oxydulé les cristaux de l'un sont même quelquefois enrobés dans ceux de l'autre

Si l'acide sulfureux avait pu se former dans les filons plutoniques aux dépens de l'oxygène des oxydes voisins, on ne verrait pas non plus des pyrites ferreuses ou cuivreuses enchevêtrées dans des silicates ferugineux tels que les chlorites, les amphiboles les yamites etc La silice eût été certainement déplacée par cet acide, l'excès de soufre se serait porté sur le fer et l'on devrait trouver à côté les uns des autres simplement du protosulfure et du quartz mais les beaux filons de Campiglia en Toscane, de Traverselle en Piémont, et de Chemin en Valais, où les circonstances étaient éminemment favorables pour ce genre de réaction, ne fournissent pas la moindre preuve de sa possibilité d'où il suit que la pression s'oppose à la formation des composés gazeux, même dans les cas qui paraîtraient devoir être les plus favorables d'après l'expérience des laboratoires

On verra sans doute avec surprise la simplicité avec laquelle les résultats précédents expliquent le petit nombre de corps qui jouent un rôle dans la composition des filons Les acides si nombreux que nous enfantons péniblement chaque jour à l'aide de réactions complexes, en sont exclus, et si l'est permis de s'exprimer ainsi, de tous ces composés on n'y trouve que ceux qui sont doués d'une constitution robuste, parce qu'ils sont le vrai pro-

duit des affinités réduites à elles memes, les autres, plus instables, se résolvent en leurs constituants : aussi l'eau, les bitumes, l'acide carbonique, l'acide silicique, l'acide sulfurique, les oxydes, les fluorures, les sulfures, les sulfates, les carbonates, les silicates et les hydrosilicates, composent presque tout l'assortiment des reactifs et des produits du grand laboratoire souterrain, et pourtant, qui ne ressent à la vue des combinaisons obtenues avec une telle simplicité de moyens, une admiration de beaucoup supérieure à la stupéfaction qu'engendre l'entassement confus des matériaux de la chimie perfectionnée de nos jours !

* La pression agit encore d'une manière indépendante des affinités en produisant des effets quelquefois opposés entre eux, ainsi elle peut être favorable ou défavorable à la dissolution, probablement suivant le degré de compressibilité des corps. C'est ce que Perkins a essayé de démontrer à l'aide des expériences suivantes :

Une émulsion formée par agitation de l'huile de bergamotte avec l'alcool, soumise à une pression de 100 atmosphères, est devenue d'une transparence parfaite : d'où l'on doit conclure que la dissolution était devenue complète.

Un tube de verre fermé à un bout, rempli d'acide acétique pur, et soumis à la même pression, a présenté, dans les $\frac{2}{3}$ supérieurs de sa longueur, des cristaux d'acide acétique très-forts, susceptibles de se conserver longtemps au contact de l'air : la partie inférieure du liquide ne se composait plus que d'acide acétique très-faible.

M. Beudant a aussi fait voir qu'on peut obtenir des cristaux plus gros qu'à l'ordinaire, en faisant usage d'un long tube à la partie inférieure duquel est adapté un matras, le tout étant rempli par la dissolution, il en résulte une pression suffisante pour produire le développement en question.

* Quoique l'expérience de Perkins sur l'acide acétique puisse laisser quelque chose à désirer, ces données n'en sont pas moins applicables à la géologie, il suffit, en effet, de rappeler succinctement qu'il arrive, dans plusieurs filons de la Saxe du Hartz, que des minéraux qui s'étaient rencontrés abondamment et en très-gros cristaux à une certaine profondeur ont diminué de volume à mesure que la profondeur augmentait, et qu'ils ont fini par disparaître complètement, cependant ce résultat peut être complexe et devoir de plusieurs causes : mais, tout en hésitant sur le choix, les expériences précédentes n'en prouvent pas moins que la pression doit être mentionnée au nombre de celles qui ont pu agir.

* Or, si la pression joue un rôle si capital dans tous les phénomènes tant

chimiques que mécaniques de filons, que dire de leur formation par volatilisation et condensation des métaux et des métalloïdes? Sans doute on peut attribuer ce mode d'origine à certains effets produits dans des crevasses entr'ouvertes, mais vouloir faire de la vaporisation la base d'une théorie générale c'est là une de ces erreurs contre lesquelles on ne saurait trop s'élever, non-seulement parce qu'elles sont en contradiction manifeste avec les faits mais encore parce qu'elles ont déjà donné lieu à de préjudiciables dépenses dont nous nous abstenons de parler.

(CHIMIE APPLIQUÉE — *Nouvelle Note sur le flint-glass et le crown-glass fabriqués à la verrerie de Choisy-le-Roi*, par M. BONTÉNTS

(Commissaires, MM. Biot, Arago, Mathieu, Dumas, Regnault.)

Le 27 janvier 1840, j'ai eu l'honneur de lire à l'Académie un Mémoire sur la fabrication du flint-glass et du crown glass. J'annonçais qu'après plusieurs années de travaux je pensais avoir résolu toutes les difficultés de cette fabrication, et que j'étais prêt à fournir aux opticiens des disques de flint glass et de crown glass de 40 50 et même 60 centimètres de diamètre.

Depuis quatre ans cette fabrication n'est pas restée stationnaire entre mes mains : toutes les opérations ont pris un degré de certitude et de régularité qui ne laissent plus jamais de doutes sur le succès d'une fonte de flint glass ou de crown-glass. Les vingt-deux fontes que j'ai faites en 1843 ont toutes réussi et ont produit 4 000 kilogrammes de flint-glass et crown glass que j'ai livrés aux opticiens. Les demandes qui me sont faites pour la France, l'Angleterre et l'Allemagne, et auxquelles j'étais loin de pouvoir suffire avec un four, m'ont déterminé à établir un four de plus pour cette fabrication et porteront à 8 000 kilogrammes environ le produit de l'année 1844.

Je présenterai à l'exposition des produits de l'industrie qui se préparent des disques de flint-glass et de crown glass de dimensions de beaucoup supérieures à tout ce qui a jamais été fait, mais le jury ne peut, pendant les deux mois que dure l'exposition se livrer à des travaux d'expériences de la nature de celles qu'exige l'examen de cette matière à tous égards, d'ailleurs je désire que les travaux de la Commission de l'Académie précédent, s'il est possible le Rapport qui sera fait sur l'exposition. Il est en outre, plusieurs points sur lesquels l'autorité des décisions de cette Commission doit fixer plusieurs incertitudes des opticiens. Ainsi par exemple quelques opticiens

semblent preferer que le flint glass ait une teinte légèrement jaune, d'autre part presque tous recommandent de ne pas faire le crown-glass blanc le crown glass verdâtre corrige mieux, disent ils, l'aberration de réfrangibilité, et donne plus de netteté aux images Jusqu'à ce que l'Académie ait sanctionné cette assertion, je croirai qu'à travers du flint et du crown blanc, il y a moins de perte de lumière, et que l'achromatisme doit être produit d'une manière complète si les courbes ont été bien calculées Cependant, si MM les Commissaires de l'Académie jugent aussi qu'il faut fabriquer des produits moins parfaits, c'est à dire moins blancs, je m'y conformerai d'autant plus facilement Il n'y a que pour les daguerréotypes que les opticiens ont tenu à avoir des matières blanches, mais si l'on faut des matières blanches pour cet instrument si délicat, si précis, ne doit il pas en être de même pour les lunettes?

Quelques opticiens m'ont dit aussi que certain crown-glass que je leur avais fourni était parfaitement pur, mais trop léger, j'aurais cru que cette faible densité rendait encore plus facile la correction des aberrations Cette question se complique de la différence des pouvoirs dispersifs dans des matières ayant même densité et mérite, je pense, aussi d'être examinée par la Commission appelée à élucider les travaux des opticiens

MM les Commissaires pourront d'autant plus facilement se livrer à l'examen de mon travail que tous les mois je fais deux fontes à deux fours et qu'ainsi je fais à la fois ou deux fontes de flint glass, ou une fonte de flint-glass et une fonte de crown glass ou deux fontes de crown-glass Je pourrai varier les compositions suivant les indications de ces messieurs et les expériences auxquelles ils désireront se livrer sur les changements qu'amènent les différences de composition dans la réfraction et la dispersion des verres Je ferai connaître les modifications que l'expérience m'a conduit à faire dans les opérations de la fonte du flint-glass et du crown glass dont j'avais donné la description dans mon Mémoire en 1840, et dans le *Bulletin de la Société d'Encouragement*, car il importe que la fabrication d'un produit si utile à la science ne soit plus exposée à rester dans les voies d'essais cette considération doit l'emporter sur des motifs d'intérêt personnel

Pour montrer des aujourd'hui des échantillons de ma fabrication, j'ai l'honneur de présenter à l'Académie

Un disque de flint-glass de 38 centimètres de diamètre,

Trois disques de crown-glass de 38 centimètres de diamètre,

Un disque de flint-glass de 41 centimètres de diamètre;

Un disque de flint-glass de 50 centimètres de diamètre,

L'un de ces disques de crown-glass de 38 centimètres a été poli dans les ateliers de M Lerebours, les autres ont été travaillés dans les ateliers de M Buron, de qui j'ai tout à fait approuvé le conseil de ne livrer de grands disques qu'après avoir préalablement poli les deux grandes surfaces, ce qui permet de juger bien plus sûrement la matière qu'au moyen des facettes sur la tranche du disque qui, quelque multipliées qu'elles soient, peuvent laisser encore échapper des défauts importants qui ne se trouvent pas dans les axes des facettes, ce polissage se fait, du reste, très facilement par les moyens mécaniques dont dispose M Buron. J'ai préparé d'autres disques de flint glass et de crown glass de 55 centimètres de diamètre dont j'ai pu apprécier la limpidité avant de les ramollir, mais qui ne sont pas encore polis, et dont MM les Commissaires rendront compte à l'Académie. Dans de telles dimensions j'espère que la pureté des matières, jointe au travail habile de nos opticiens, pourront produire des instruments dioptriques d'un effet plus sûr que celui des gigantesques télescopes à miroir d'une construction et d'une conservation si délicates.

Je prends la liberté de présenter aussi à l'Académie une série d'échantillons des verres de couleur employés dans les instruments d'Astronomie et de Photographie, pour qu'il soit constaté que l'on trouve à la verrerie de Choisy-le-Roi tous les verres qui peuvent être utiles dans ces divers instruments.

PHYSIQUE — *Appareils pour les anneaux colorés à centre noir ou blanc,*
par M. SOLEIL

(Commissaires, MM. Arago, Babinet, Regnault.)

M. Young avait fait des anneaux à centre blanc en interposant de l'huile de sassafras entre deux surfaces fortement pressées de flint-glass et de crown-glass.

« Pour jeter un jour complet sur les conséquences de cette expérience il fallait montrer que le centre de ces anneaux redevient noir lorsque le liquide interposé a plus de réfringence que le flint et le crown. J'ai pensé que je ferais une chose utile en donnant aux physiciens les moyens de répéter ces expériences.

L'appareil que j'ai l'honneur de soumettre à l'Académie, et dont je dois l'idée à M. Arago, est destiné à exécuter facilement cette belle expérience. Il se compose d'un prisme en flint-glass, dont la base convexe appartient à une sphère d'environ 12,7 de rayon. Cette base repose sur une lame de crown-

glass parfaitement plane, le tout est reçu dans un cadre de cuivre, et deux vis de pression, agissant par l'intermédiaire d'un coussin en cuivre sur la tête émoussée du prisme, amènent au contact les deux surfaces de verre.

Lorsque l'on mouille la surface de crown avec un liquide qui, comme l'eau, a moins de réfringence que les deux verres, les anneaux produits ont un centre noir, car il y a perte d'une demi-ondulation à la première surface du liquide.

Si, au contraire, on interpose un liquide plus réfringent que les deux verres, tel que l'*huile de Cassia*(1), le centre des anneaux produits est encore noir, mais ici la perte d'ondulation se fait à la seconde surface du liquide.

Supposons maintenant que l'on introduise entre les deux verres un liquide moins dense que le flint-glass du prisme, mais plus dense que le crown glass de la plaque inférieure. Les anneaux produits auront un *centre blanc*. Dans ce cas, facile à réaliser avec l'*huile essentielle de gerofle*, les rayons réfléchis à la première surface de la couche liquide éprouveront un changement de phase, mais les rayons réfléchis à la seconde surface subiront un changement tout à fait semblable, en sorte que les uns et les autres venant à se rencontrer après la réflexion, n'auront pas cessé de s'accorder. Ils ajouteront au lieu de s'entre-détruire, et produiront ainsi un *centre blanc* au lieu d'un *centre noir* dans les anneaux. Il est presque superflu de dire que, dans les deux cas, ceux-ci seront teints de couleurs complémentaires.

» J'ai construit, d'après les conseils de M. Binet, un autre appareil que je présente aussi à l'Académie. Cet appareil diffère du précédent, en ce que la plaque plane, au lieu d'être simple, est formée de deux parties égales l'une de flint glass comme le prisme, et l'autre de crown-glass. En interposant de l'huile de gerofle entre le prisme et la double plaque, on obtient des anneaux dont la portion correspondante à la lame de crown est à *centre blanc*, tandis que l'autre moitié, celle qui correspond à la plaque de flint, est à *centre noir*. On aperçoit aussi l'inégalité de diamètre et la différence de teintes des deux systèmes.

« On aurait pu craindre que l'imperfection du travail des deux plaques ne leur fit simuler la production du double système, sans qu'il y eût aucun liquide interposé, car, dans la formation ordinaire des anneaux colorés, on a fréquemment observé que l'apparition de la tache centrale noire est pre-

(1) Je dois à l'extrême obligeance de M. Arago l'*huile de Cassia* qui m'a servi pour mes appareils, j'en avais cherché en vain dans le commerce.

cedée de celle d'une tache blanche, résultant de ce que la lame d'air au centre a encore un excès d'épaisseur. Les expériences faites avec mes appareils au cours de M. Regnault ont dissipé complètement ces craintes.

En projetant les anneaux sur un écran, ce qui s'exécute avec la plus grande facilité, on voit que, sous la même incidence, la partie du champ qui contient les demi-anneaux à centre noir est beaucoup plus illuminée que celle qu'occupent les demi-anneaux à centre blanc.

Je terminerai cette Note en faisant remarquer que le *flint de Guinand* est un peu trop réfringent pour pouvoir être employé à la confection de mes appareils, j'ai dû faire usage du flint ancien, ou, à défaut de celui-là, du flint de Choisy-le-Roi, quant au crown, celui de Saint Gobain m'a donné de très beaux résultats.

MÉCANIQUE APPLIQUÉE — *Sur un ballon à enveloppe en cuivre lamine*
par M. MARRY MONGE (l'extrait par l'auteur)

(Commissaires, MM. Gay-Lussac, Arago, Pouillet, Poncelet, Dumas)

Quand on considère l'aérostation dans son acception la plus large, c'est à dire dans l'hypothèse d'une navigation aérienne capable de rendre les mêmes services que la marine, on voit surgir mille difficultés que le calcul est loin d'indiquer comme insolubles.

Parmi ces difficultés, il en est une qui semble dominer toutes les autres, et qui arrête tout d'abord, c'est celle-ci : Quelle est la substance capable de faire une enveloppe aérostatique en état de résister, comme nos navires, aux intempéries des saisons pendant un séjour prolongé de dix ou quinze ans dans l'air extérieur ? Il n'y a point de navigation aérienne possible, au point de vue d'utilité d'où nous la considérons, tant que cette première difficulté ne sera pas vaincue. Or, la soie, la baudruche, en général les tissus et les peaux, sont incapables de présenter la résistance suffisante.

En examinant les métaux sous le rapport de leurs densités, leur souplesse lamelleuse et leur ténacité, le cuivre semble convenir. Un jésuite, le P. Lana, en 1670, et Guyton-Morveau, en 1784, ont parlé de la possibilité d'un ballon de métal. Il s'agit donc de réaliser cette idée et d'étudier la manière dont se comportera le cuivre dans cette circonstance, mais, auparavant, il importe de voir quelles sont les conséquences d'une enveloppe métallique.

1^{re} Elle ne peut subir les variations de volume qui ont lieu en montant et descendant, par les pertes de gaz des orifices inférieur et supérieur, le

metal serait détérioré il y a donc nécessité de se soumettre à l'*invariabilité de volume*,

2° Mais l'invariabilité de volume ne peut s'obtenir pendant l'ascension et la descente qu'en supprimant les pertes de gaz des orifices intérieurs et supérieurs, il y aura donc une pression intérieure qui ne saurait dépasser 1 atmosphère

C'est ce nouveau genre d'aérostation que j'appelle *a basse pression*, par imitation de ce qui se passe dans les arts mécaniques, où les machines sont dites *a basse pression* quand leur pression ne dépasse pas 2 atmosphères

Aérostation a basse pression

L'aérostation a basse pression conduit à la recherche des trois problèmes suivants

1° Quelle est la hauteur qu'un ballon d'une capacité et d'une force de métal données peut atteindre sans crever ?

2° Quelle est la force nécessaire à une enveloppe de métal pour une hauteur et une capacité données ?

3° Cette hauteur étant connue quelle est la force ascensionnelle du ballon ou c'est-à-dire le poids dont on peut le charger ?

Je donne deux formules que j'appelle *deronautiques*, au moyen desquelles connaissant la hauteur thermométrique, barométrique et manométrique au moment de la fermeture de l'appareil on peut en conclure la force ascensionnelle la pression intérieure et la hauteur qu'atteindra le ballon à un instant donné, en y introduisant les hauteurs qui indiquent le thermomètre et le baromètre à cet instant. J'indique l'usage que l'aéronaute devra faire de ces formules les avantages de l'aérostation à basse pression sur l'aérostation ordinaire à égalité de pression et le moyen économique de monter et descendre qu'aura l'aérostàt à basse pression dans la force naturelle de la *variation de température*

» Ceci étant posé, je passe à la construction du ballon

» Je construis une carcasse sphérique de 10 mètres de diamètre, tournant sur son axe horizontal les fuseaux, taillés sur un patron en plâtre, sont soudés sur la carcasse à mesure qu'elle tourne, j'extrait les bois de cette carcasse à l'achèvement du ballon, par une ouverture de 1^m,50, et je soutiens l'enveloppe pendant cette opération, à l'aide d'une insufflation d'air donnée par un ventilateur

Je soulève le ballon à 2 metres de terre et lui fais faire en l'air un quart de revolution, de maniere à ce que l'axe, d'horizontal devienne vertical, je passe en dessous un filet sphérique que je suspends aux parois de l'atelier, et dans ce filet bien consolidé je laisse descendre et reposer le ballon plein d'air

C'est ainsi suspendu dans son filet, à 2 metres de terre, qu'on le voit maintenant, dans l'atelier de construction, *impasse du Maine*, n° 10, pres la *barrière de ce nom*, ou M Dupuis Delcourt, qui doit faire une ascension incessamment, s'est chargé de le faire voir et de donner les explications necessaires

Pour le remplir de gaz, j'emploierai le procede indiqué par Guyton-Morveau, je ferai arriver l'hydrogene a la partie supérieure par un tuyau A, et je recevrai l'air sortant dans un ballon mesureur, dont le volume est dans un rapport connu avec le premier. Quand tout l'air sera sorti, le ballon sera plein d'hydrogene et prêt à partir

J'ai fait cette expérience en petit. J'ai rempli de gaz un ballon de baudruche de 1 metre de diametre par ce procédé, j'ai constaté ce qu'il portait. Je l'ai vide et rempli de nouveau par le procédé ordinaire, c'est à dire en introduisant l'hydrogene directement dans le ballon aplati. Il portait exactement le meme poids dans les deux cas, donc le gaz est également pur par les deux procedes

Le ballon pese	400 ^k ,00
L'hydrogene qu'il renfermera (la capacite du ballon etant de 523 ^m °,6 et la densité du gaz 0 ^k ,1 le metre cube)	52 ^k ,36
Total	452 ^k ,36
Les 523 ^m °,6 d'air (à 1 ^k ,3 le metre cube) pèsent	680 ^k ,68
Retranchant les 452 ^k ,36 ci dessus	452 ^k ,36
Il reste, pour <i>différence ou force ascensionnelle du ballon nu</i>	228 ^k ,32
La nacelle, le filet et l'aeronaute pèsent	130 ^k ,00
Il reste, pour <i>force ascensionnelle nette</i>	98 ^k ,32

MÉCANIQUE APPLIQUÉE — *Mémoire sur une nouvelle theorie des voûtes,*
par M FADRE

(Commissaires, MM Poncelet, Probert, Lamé)

GÉOMÉTRIE — *Note sur les formules relatives à l'attraction des polyèdres,*
par M. D'ESTROUVOIS

(Renvoi à la Commission précédemment nommée pour un Mémoire de
MM. Hossard et Rozet)

GÉOMÉTRIE — *Mémoire sur les polygones étoilés,* par M. BELLEVILLE, en-
seigne de vaisseau (transmis par M. le Ministre de la Marine)

(Commissaires, MM. Poinsoy, Cauchy)

MÉCANIQUE APPLIQUÉE — *Note sur un nouveau mode de fermeture pro-
posé pour le tube pneumatique des chemins de fer à pression atmosphé-
rique,* par M. GAXON

(Renvoi à la Commission chargée de l'examen du Mémoire de M. Halletti)

ZOOLOGIE — *Histoire des Phrynéides, Scorpionides, Solpugides, Phalan-
gides et Acarides,* par M. GERVAIS

Le Mémoire destiné à faire partie de l'*Histoire naturelle des insectes
apteres* de M. Walkenaer, est déjà imprimé, mais non encore publié

(Commissaires, MM. Duméril de Blainville, Milne Edwards)

M. JONEAU adresse la description et la figure d'une nouvelle passerelle,
construite d'après le système de fermes en fer et en fonte qu'il avait pré-
cédemment soumis au jugement de l'Académie

(Renvoi à la Commission déjà nommée)

M. GAGNAGE adresse une nouvelle Note sur un procédé pour la conser-
vation des corps destinés aux études anatomiques, et sur les modifications
qui permettent d'appliquer ce procédé à l'embaumement

(Renvoi à la Commission déjà nommée pour diverses communications rela-
tives au même sujet)

M. GAGNAGE demande de nouveau qu'une Commission soit chargée d'exa-
miner le procédé qu'il a imaginé pour la désinfection des fosses d'aisance,
procédé qui a été l'objet d'un brevet d'invention dont il envoie copie

M. DELAU prie l'Académie de vouloir bien compléter la Commission

qui a été chargée de l'examen de son Mémoire sur les corps introduits ou formés dans l'oreille moyenne, en nommant un nouveau Commissaire à la place de M. Breschet, dont l'absence paraît devoir se prolonger — M. Serres est désigné à cet effet

M. MORIN remplacera feu M. Coriolis dans la Commission chargée de l'examen d'un Mémoire de M. REISCH sur l'action de la vapeur

CORRESPONDANCE

M. DE JUSSIEU fait hommage à l'Académie de la deuxième et dernière livraison de sa « *Monographie des Malpighiacees* » (Voir au Bulletin bibliographique)

M. le DIRECTEUR GÉNÉRAL DE LA NAVIGATION DE LA SEINE adresse le Tableau des hauteurs de la rivière observées dans Paris au pont de la Tournelle pour chaque jour de l'année 1843

PHYSIOLOGIE — *Extrait du Rapport de la première classe de l'Institut royal des Pays-Bas, sur les qualités nutritives de la gélatine, présenté le 22 avril 1843 à Son Excellence le Ministre de l'Intérieur* (traduit et communiqué par M. VROLIK)

Votre Excellence ayant invité l'Institut, par sa Lettre du 28 juin 1842 à lui présenter un Rapport sur cette question *la gélatine peut-elle être considérée comme aliment utile et agréable pour l'homme* la première classe a chargé ses membres, MM. Vrolik, S. Swart et J.-G. S. Van Breda, de lui fournir les faits qui pourraient la mettre en état de satisfaire au desir de Votre Excellence. En donnant le résumé de ses travaux, la classe a l'honneur de remplir la tâche qui lui fut imposée (1)

On sait que les résultats obtenus par les membres de la Commission nommée au sein de l'Académie des Sciences, à Paris, ont été si défavorables pour les qualités nutritives de la gélatine, qu'on en a conclu, à juste titre que, prise isolément, elle ne nourrit nullement. Mais ces savants n'ont pas

(1) Dans le Rapport original se trouve ici, comme introduction, l'historique de tout ce qui se rapporte à la question de la gélatine. Nous avons cru devoir l'omettre dans la traduction française, puisque cette introduction ne renferme rien qui ne soit universellement connu en France.

décide si, en l'ajoutant à d'autres substances alimentaires, on n'augmente pas la force nutritive de celles-ci en donnant un bon véhicule aux éléments dont elles se composent. Le professeur Bergsma, dont le Mémoire paraît avoir provoqué la mission de Votre Excellence, a jugé que la gélatine a véritablement cette propriété, et la première classe de l'Institut a été appelée à vérifier les bases sur lesquelles cette opinion favorable pourrait être fondée. Elle a jugé que des faits positifs pourraient seuls résoudre cette question et conséquemment elle a autorisé MM. les Commissaires à faire à ses frais toutes les expériences qui pourraient servir à éclaircir ce point encore douteux. Le résumé de leurs travaux démontrera à Votre Excellence qu'ils n'ont pas eu besoin de répéter toutes les expériences faites avec tant de soin par les académiciens français. Il est suffisamment prouvé par ces expériences et par celles qu'avait faites antérieurement M. Magendie que ni les principes organiques non azotés ni ceux qui contiennent de l'azote, ne peuvent fournir un bon aliment si on les prend seuls, sans qu'ils soient mêlés à d'autres substances. Il est d'un plus grand intérêt de déterminer si la gélatine qui appartient aux principes organiques azotés, quoique incapable par elle-même de nourrir l'homme, pourrait, mêlée à d'autres aliments, augmenter leur force nutritive et devenir par là une addition utile et désirable pour eux. L'Académie des Sciences de Paris laissa cette question indécise, après s'être occupée pendant dix ans de ces recherches. Par conséquent, l'Institut néerlandais se trouva chargé de la tâche honorable de la résoudre autant que possible. Après quelques préparations préliminaires, MM. les Commissaires firent depuis le 9 décembre 1842 jusqu'au 15 juin 1843, une série d'expériences qui ne leur paraissent pas être dénuées d'intérêt.

On s'est servi de gélatine tirée des os d'après la manière que M. Bergsma a projetée dans son Mémoire, à l'aide d'un appareil dont M. Darcet a donné le modèle, et que M. Bergsma a eu la bonté de céder à la classe. On a utilisé des os ayant déjà servi à des préparations culinaires, et par conséquent tout à fait libres de parties molles. Brûlés en petits fragments, ils furent exposés pendant quelques jours et chaque jour pendant sept à huit heures, à l'action de la vapeur. On eut soin, chaque fois que les os avaient été exposés pendant deux heures ou deux heures et demie à la vapeur, de recueillir l'eau gélatineuse, et de la faire évaporer dans un vase d'étain jusqu'à la consistance requise pour la faire coaguler par le refroidissement sous forme de gelée.

Lorsque les expériences ont exigé une plus grande quantité de gélatine que celle qui pouvait être fournie par l'appareil, on s'est servi d'une matière étamée, dite papinienne, à légère tension de vapeur. Celle-ci donnait, lors-

qu'on ménageait la chaleur d'une manière convenable, une gélatine qui ne différait pas en apparence de celle produite par l'appareil, pourvu qu'on eût soin de ne pas trop éprouver les os et de prendre garde que des débris de matière inorganique des os ne se mêlassent pas à la gélatine.

Les caractères apparents de la gélatine produite de ces deux manières sont 1° une saveur fade qui même lorsque la gélatine est encore toute fraîche, est peu agréable, et ne s'améliore pas beaucoup en y ajoutant du sel, 2° une odeur analogue peu intense, s'augmentant pendant l'évaporation de l'eau gélatineuse, et ne pouvant être indiquée que comme désagréable, 3° une consistance semi pellucide avec une très grande disposition à se putréfier. L'évaporation d'une petite quantité, par exemple de 20 grammes a fait apprécier la proportion de la substance gélatineuse sèche et solide. Elle eut lieu tant par le bain-marie que par la chaleur d'une étuve. Comme les résultats de ces deux manières d'agir furent les mêmes on se servit plus tard seulement de l'étuve. La proportion de la gélatine sèche fut pendant les premières semaines de $\frac{10}{100}$ quelquefois plus quelquefois moins. Plus tard on a donné un peu plus de consistance à la gélatine, de sorte que la proportion de la substance solide a varié de $\frac{10}{100}$ à $\frac{2}{100}$, et que l'on peut prendre, comme terme moyen, $\frac{15}{100}$.

Des chiens furent nourris avec cette gélatine, qu'on avait soin de leur donner pure et fraîche dans un enclos bien éclairé, aéré et fermé à clef, que l'administration du jardin zoologique d'Amsterdam avait mis à la disposition de la classe. On a eu soin de n'admettre auprès de ces chiens personne que MM. les Commissaires et le gardien. En premier lieu, on fit, comme terme de comparaison, une expérience avec trois chiens dont l'un reçut 0,250 de gélatine d'os, le second 0,125 de pain de seigle ordinaire, et le troisième 0,125 de pain avec 0,125 de gélatine d'os. Pendant les deux premiers jours, le premier chien a mangé avidement la gélatine, qu'il a délaissée alors, de sorte qu'après deux jours d'attente, pendant lesquels il n'a pas touché à la gélatine, on a cru devoir y ajouter 0,125 de pain. Le tableau ci-joint fera mieux ressortir tous ces détails, et démontrera qu'après une semaine, le chien, qu'on avait premièrement nourri avec 0,250 de gélatine, et, après son jeûne volontaire de deux jours, avec 0,125 de gélatine et 0,125 de pain, avait perdu 0,75 de son poids que le second chien, auquel on avait donné 0,125 de pain, avait perdu 1 kil, et que le troisième chien, qui, dès le commencement, avait été nourri de 0,125 de pain avec 0,125 de gélatine, avait aussi perdu 0,75. Ce résultat prouve que les chiens auxquels on avait donné 0,125

(426)

de pain avec de la gélatine avaient presque perdu autant de poids que celui qui n'avait été nourri que de 0,125 de pain

Premier chien

DATES	NOURRITURE	POIDS	OBSERVATIONS
1842 9 decemb	Gelatine 0,250	6,75	
10	<i>Idem</i>	"	
11	<i>Idem</i>	"	Il a délaissé sa gelatine du jour precedent
12	<i>Idem</i>	"	Il n a pas touche à la gelatine
	<i>Idem</i>	"	
13	Pain 0,125	"	On a ajouté 0,125 de pain à la gelatine
	Gelatine 0,125	6,00	Il avait mangé le pain et laisse la gelatine,
14	Pain 0,125		dont on diminue pour cela la quantité
15	<i>Idem</i>	"	
16	<i>Idem</i>	6,00	

Deuxieme chien

DATES	NOURRITURE	POIDS
1842 9 decembre à 16 decembre	Pain 0,125	9,25
16 decembre	<i>Idem</i>	8,25

Troisieme chien

1842 9 decembre à 16 decembre	Gelatine 0,125	8,00
	Pain 0,125	
	<i>Idem</i>	7,25
16 decembre		

Mais comme on pourrait attribuer cette diminution de poids à une trop grande parcimonie dans la distribution de la gélatine, les Commissaires ont résolu de répéter la même expérience avec 0,187 au lieu de 0,125 pour ration de chaque jour

Par conséquent, le premier chien reçut 0,125 de pain avec 0,187 de gélatine,

» Le second chien, 0,125 de pain,

» Le troisième chien, 0,125 de pain avec 0,187 de gélatine. Mais après deux jours, on jugea que cette quantité de gélatine devait être portée à 0,250.

Le résultat, après huit jours, a été que le premier chien a conservé son poids, mais que les deux autres ont perdu chacun 0,50

» Ainsi, il est prouvé que le troisième chien, auquel on avait donné précédemment 0,187, et puis 0,250 de gélatine en sus de 0,125 de pain, avait perdu tout autant de son poids que le second chien, dont la ration ne consistait qu'en 0,125 de pain. Il semblait donc que l'addition de cette gélatine n'avait pas augmenté la faculté nourrissante du pain de seigle. Mais comme il était possible que ce résultat pût se modifier par un emploi plus prolongé de la gélatine, on continua la même expérience

» Le résultat se trouve dans le tableau ci-joint

	DATE	NOURRITURE	POIDS
1 ^{er} Chien	24 décembre	Pain 0,125	6,00
		Gélatine 0,250	
	31 décembre	<i>Idem</i>	5,50
2 ^{me} Chien	24 décembre	Pain 0,125	7,75
	31 décembre	<i>Idem</i>	7,75
3 ^{me} Chien.	24 décembre	Pain 0,125	6,75
		Gélatine 0,250	
	31 décembre	<i>Idem</i>	6,50

Par conséquent, les chiens qui avaient reçu 0,250 de gélatine avec 0,125 de pain montraient chacun, après huit jours, une diminution de poids, tandis que le poids du chien auquel on avait donné seulement 0,125 de pain n'avait subi aucun changement. Frappés de ce résultat inattendu, les Commissaires continuèrent la même expérience encore pendant huit jours

	DATES	NOURRITURES	POIDS
1 ^{er} Chien	31 decembre	Pain 0,125 Gelatine 0,250	5,50
	7 janvier	<i>Idem</i>	5,00
2 ^{me} Chien	31 decembre	Pain 0,125	7,75
	7 janvier	<i>Idem</i>	6,75
3 ^{me} Chien	31 decembre	Pain 0,125 Gelatine 0,250	6 50
	7 janvier	<i>Idem</i>	6,00

• Donc les chiens continuèrent à diminuer en poids, à peu près tous dans la même proportion en raison de leur poids primitif, comme le tableau ci-joint le démontre

	1 ^{er} CHIEN	2 ^{me} CHIEN	3 ^{me} CHIEN
Poids primitif	6,75	9,25	8,00
Diminution du poids	1 ^{re} semaine 0,75	1,00	0 75
	2 ^{me} semaine 0,00	0,50	0,50
	3 ^{me} semaine 0 50	0,00	0,25
	4 ^{me} semaine 0,50	1 00	0,50
Par conséquent en quatre semaines	1,75	2,50	2,00
Diminution relative	0,259	0,270	0,250

L'aspect général des chiens indiquant qu'ils ne recevaient pas la nourriture qui leur était due Il était par conséquent nécessaire de rétablir leur force, et on leur distribua pendant huit jours la pitance ordinaire des chiens du jardin zoologique, consistant en un mélange de pain de crétons, de son et de pelures de pommes de terre cuites L'expérience a montré que les chiens

se trouvent très-bien de cette nourriture, à laquelle nous conservons le nom de *pitance de chien*, qu'elle a dans le susdit établissement. Après l'emploi d'une semaine, chaque chien avait gagné 1 kilogramme en poids. Alors on les remit à la gélatine, toutefois en augmentant encore la dose, de sorte qu'on en donna le premier jour 0,375, et les jours suivants, 0,500. Après une semaine, le résultat fut

	DATES	NOURRITURE	POIDS
1 ^{er} Chien	13 janvier	Pain 0,125	6,75
		Gélatine 0,375	
	14 à 20 janvier	Pain 0,125	5,50
		Gélatine 0,500	
2 nd Chien	20 janvier	<i>Idem</i>	5,50
	13 janvier	Pain 0,125	7,75
	13 à 20 janvier	<i>Idem</i>	"
	20 janvier	<i>Idem</i>	6,75
3 rd Chien	13 janvier	Pain 0,125	7,00
	14 à 20 janvier	Gélatine 0,375	"
		Pain 0,125	
		Gélatine 0,500	
	20 janvier	<i>Idem</i>	6,00

Ce résultat remarquable apprend que dans cette semaine chaque chien a perdu environ 1 kilogramme de son poids, que l'addition journalière, premièrement de 0,375, et puis de 0,500 de gélatine, n'a produit aucune différence, et que, par conséquent, cette diminution a eu lieu, tant pour ceux qui ont eu du pain et de la gélatine, que pour celui qui n'a été nourri que de 0,125 de pain.

» Tout cela semble prouver qu'on a raison de se défier de la gélatine comme nourriture, la Commission a cependant cru ne pas devoir s'en tenir là. Elle fut surprise de voir que le second chien, qui n'avait reçu que 0,125 de pain, n'avait pas perdu plus que les deux autres chiens auxquels on avait ajouté une grande quantité de substance animale. Elle voulut savoir si l'on

obtiendrait un autre résultat en ajoutant aux 0,125 de pain, dont il avait été nourri pendant tout ce temps, les 0,5 de gélatine qu'on avait précédemment données aux autres chiens. Ainsi ils furent nourris tous les trois, pendant huit jours, de 0,125 de pain avec 0,500 de gélatine, le résultat fut qu'après ce temps, leur poids était resté le même, de sorte que l'addition des 0,500 de gélatine ne paraît avoir fait aucun bien au second chien. On doubla alors la quantité de la gélatine, et, comme point de comparaison, on nourrit les deux autres chiens de pain et de viande en moindres quantités. Le résultat, après une semaine, fut

	DATES	NOURRITURE	POIDS
1 ^{er} Chien	31 janvier	Viande 0,500	5,50
		Pain 0,125	
	8 février	Idem	5,75
2 ^{me} Chien	31 janvier	Gélatine 1,000	6,50
		Pain 0,125	
	8 février	Idem	6,50
3 ^{me} Chien	31 janvier	Viande 0,250	6,00
		Pain 0,125	
	8 février	Idem	6,50

Ainsi, malgré une dose assez forte de gélatine, le second chien n'a rien gagné en poids, tandis que le premier chien, en ne recevant que la moitié de la dose en viande crue, et le troisième chien, en ne recevant que le quart, ont gagné chacun en poids. Il y aurait de quoi s'étonner que le premier chien, qui a eu une plus grande ration de viande, a moins gagné que le troisième, si l'on n'avait pas remarqué qu'il commençait à souffrir d'une maladie de la peau, assez fréquente chez les animaux qui sont mal nourris. Comme cette maladie devait rendre les résultats ultérieurs incertains, on ne s'est plus servi de lui, mais on répéta l'expérience pour les deux autres chiens, quoique en sens inverse.

	DATES	NOURRITURE	POIDS
2 ^{me} Chien	8 février	Viande 0,500	6,50
		Pain 0,125	
	15 février	Viande 0,500	7,25
		Pain 0,125	
3 ^{me} Chien	8 février	Gelatine 1,000	6,50
	15 février	Pain 0,125	6,50
		Idem	

Donc le second chien, recevant, au lieu de 1,000 de gélatine, 0,500 de viande, augmenta, dans le cours d'une semaine, de 0,75 en poids, tandis que le troisième chien, recevant quatre fois plus de gélatine qu'il n'avait eu de viande, même en moindre dose, resta dans le même état. Ainsi il n'y a pas de doute que la viande, même en moindre dose, donne une nourriture que l'on cherche en vain dans la gélatine. Mais puisque d'après l'opinion de quelques physiologistes, il est nécessaire d'ajouter de la graisse aux aliments des carnivores, on a voulu s'assurer si, en l'ajoutant à la gélatine celle-ci deviendrait plus nutritive. On obtint le résultat suivant :

	DATES	NOURRITURE	POIDS
2 ^{me} Chien	17 février	Pain 0,125	7,50
		Gelatine 1,000	
		Graisse 0,062	
	25 février	Idem	7,00
3 ^{me} Chien	17 février	Pain 0,125	6,75
	25 février	Graisse 0,062	
		Idem	6,50

Par conséquent le résultat ne fut pas plus favorable que les autres pour

la gélatine, car le chien auquel on avait donné 1 kilogramme de gélatine en sus de sa ration de pain et de graisse avait plus perdu que le chien qui ne reçut qu' du pain et de la graisse. Enfin on voulut voir si, en ajoutant la gélatine à la pitance ordinaire des chiens, décrite ci dessus, on obtiendrait un résultat plus favorable. Par conséquent on donna à un chien 1 kilogramme de cette pitance avec 0,750 de gélatine, et à un autre, seulement 1 kilogramme de pitance de chien. Le premier gagna, depuis le 27 février jusqu'au 6 mars, 1,20, l'autre, 0,25. Mais on ne peut pas avoir une grande confiance en ce résultat, puisque ces chiens, dérangés par ces changements continuels de nourriture, tomberent malades. Il était cependant d'un trop grand intérêt de rechercher si la gélatine aurait alors quelque valeur pour que l'on ne se fût pressé pas de faire une nouvelle série d'expériences. M. Westerman, membre du conseil d'administration du jardin zoologique, céda deux grands chiens de la ménagerie à la Commission, l'un pesant 15, l'autre 17 kilogrammes. Du 16 au 24 mars, ils furent nourris avec 1 kilogramme de ladite pitance de chien, et pendant ce temps ils n'ont rien perdu de leur poids, de sorte qu'elle paraissait être une bonne ration pour eux. On la réduisit à la moitié, par conséquent à 0,50 de pitance de chien, et on continua cette diète du 24 mars jusqu'au 7 avril, il fut prouvé alors que chaque chien avait perdu de son poids, le premier 1, le second 2 kilogrammes. Puis on se demanda si la gélatine pourrait remplacer la nourriture qu'on avait soustraite au chien, et on obtint le résultat suivant

	DATE	NOURRITURE	POIDS
1 ^{er} Chien	7 avril	Pitance du chien 0,500 Gélatine 1,000	14 lbs
	24 avril	Idem	12
2 nd Chien	7 avril	Pitance du chien 0,500	15
	24 avril	Idem	13

Chaque chien avait donc perdu 2 kilogrammes, et l'addition journalière de 1 kilogramme de gélatine à la ration parcimonieuse de pitance de chien ne paraît avoir été d'aucune utilité.

On remplaça alors la gélatine par 0,500 de la nourriture ordinaire, qu'on augmenta d'autant pour le second chien. Le résultat fut :

	DATES	NOURRITURE	POIDS
1 ^{er} Chien.....	24 avril...	Pitance de chien... 1 lb	12 lbs
	5 mai...	<i>Idem.</i>	13 "
2 nd Chien.....	24 avril...	Pitance de chien... 1	13
	5 mai...	<i>Idem.</i>	14

Ainsi, dans cet espace de temps, une ration plus forte de pitance de chien avait eu pour conséquence de faire augmenter les deux chiens également en poids. Du 5 au 23 mai, on continua avec la même nourriture, et on vit accroître le poids du premier chien de 2 kilogrammes, et du second chien de 1 kilogramme. Par conséquent il fut prouvé que la double quantité de gélatine n'était pas suffisante pour remplacer ce qu'on avait ôté à la pitance des chiens.

Il ne sera pas difficile de tirer des conclusions de ces expériences elles s'offrent d'elles-mêmes. La gélatine n'a aucune propriété nourrissante lorsqu'on la prend isolément, et n'en reçoit pas si on la combine avec d'autres substances. On pourrait objecter que le nombre des expériences n'est pas assez grand pour en pouvoir déduire cette conséquence, mais les résultats sont tellement positifs et concordants, que la classe croit pouvoir adopter la conclusion qui en a été tirée.

Pour ce qui se rapporte à la proportion de la gélatine dans les *potages* dits *économiques* que l'on distribue aux pauvres, on doit avoir égard tant à la force nutritive presque imperceptible de la gélatine que l'on retire des os qu'à la minime portion qui s'en trouve dans chaque potage. Dans l'établissement d'Utrecht, 100 kilogrammes d'os sont exposés pendant quatre jours et nuits à la vapeur. L'eau gélatinense qu'on en retire suffit à 4 800 portions de potage, dont chacune équivaut à 1^{litre},25 (*). Par conséquent chaque litre

(*) Ces 100 kilogrammes sont contenus dans quatre cylindres; pendant une préparation assidue de potage, on vide chaque jour un de ces cylindres, dans lequel ces os se sont trouvés pendant quatre jours, et on le remplit d'os frais. On prépare chaque jour 1 200 portions

de potage contient la substance gélatineuse de $0^{\text{ml}},0167$ d'os. Cependant on ne peut guère évaluer la substance gélatineuse sèche que l'on acquiert à plus d'un sixième du poids des os; ainsi, l'on a $0^{\text{ml}},0028$ de substance solide sur chaque litre ou $0^{\text{ml}},0035$, c'est-à-dire $3^{\text{r}},5$ sur chaque portion de potage, ce qui fait certainement une très-petite quantité. A Harlem on emploie 16 kilogrammes d'os pour 1 000 portions de potage, dont chaque ne contient par conséquent pas plus de $0^{\text{ml}},00266$ ou environ $2^{\text{r}},5$ de substance gélatine sèche.

» On peut facilement prouver qu'il est à peu près impossible de tirer plus qu'un sixième du poids des os en substance gélatineuse sèche lorsqu'on opère en grand. Les os préparés pour l'opération contiennent un peu plus qu'un quatrième de leur poids en eau. Les trois autres quarts sont composés, d'après l'analyse de M. Berzelius, pour deux quarts, de substance non organique, et pour un quart, de substance organique qui, pour une petite partie, est insoluble dans l'eau. Ensuite, les os ne peuvent jamais être complètement épuisés, mais ils retiennent toujours une petite quantité de substance organique soluble. A cause de toutes ces pertes, il sera nécessaire de réduire le quart à un sixième. La proportion de l'eau a été déterminée par une expérience dans laquelle 500 grammes de fragments d'os, suffisamment lavés et desséchés, ont été exposés à une température qui a varié de 75° à 105° degrés centigrades aussi longtemps qu'on pouvait constater la diminution en poids; la perte du poids équivalait à 135 grammes. On a confirmé la même chose encore d'une autre manière. 4 kilogrammes d'os ont été traités dans l'appareil à vapeur jusqu'à ce que le fluide gélatineux devint aqueux, et ne fournit après l'évaporation qu'une minime quantité de gélatine. On a acquis par là, en tout, $6^{\text{ml}},56$ de gélatine, que l'on peut considérer comme contenant, terme moyen, $0^{\text{ml}},10$ de substance gélatineuse sèche. Car, puisqu'on retirait pendant ces cinquante heures ce fluide gélatineux vingt fois, et qu'on le faisait évaporer pour en former une gelée, on peut lui appliquer le terme moyen de la gélatine qui se produisit dans ce temps, puisqu'on avait soin de lui donner

de potage. Telles sont, au moins, les indications que reçoit un des Commissaires, lors de sa visite à l'établissement d'Utrecht. D'après la brochure de M. Bergsma, la substance gélatineuse de 100 kilogrammes d'os serait distribuée sur 5 200 litres, au lieu de 6 000 litres. Cette différence est de trop peu de valeur pour modifier les résultats que l'on vient de mentionner. Elle est peut-être la conséquence d'une distribution un peu plus large de potages au moment de la visite qu'un des Commissaires fit à l'établissement, qu'au moment où la brochure fut imprimée.

toujours la même consistance et qu'on avait l'habitude de déterminer fréquemment la proportion de la substance sèche par le desséchement. On a acquis de la même manière de 1 kilogramme des exposé à cinq reprises chaque fois de huit heures à la vapeur dans la marmite papinnienne, 1^{kg} 282 de gélatine d'une égale consistance. Une autre fois on fit durer l'action de l'eau et de la vapeur un peu moins longtemps et on eut de 1^{kg} 50 los que 1^{kg} 614 de gélatine.


Ainsi il est suffisamment prouvé que la quantité de substance gélatineuse solide est très petite dans chaque portion de soi-disant potage économique, et par conséquent on ne saurait nier que même si elle s'y trouvait la force nutritive se perdrait tout à fait dans une telle masse d'eau. Cependant l'on aurait tort de dire que ces potages sont inutiles : ils donnent un aliment nourrissant et sain non par la quantité minime de gélatine qui s'y trouve, mais par le riz, les pois, les légumes ou les pommes de terre que l'on y ajoute. Peut-être on voudrait en conclure qu'on pourrait augmenter leur propriété nourrissante en y ajoutant une plus grande quantité de gélatine ; cependant l'on aurait tort car d'après les expériences des Commissaires il est suffisamment prouvé que même à plus forte dose la gélatine ne nourrit pas et qu'elle fait naître un dégoût insurmontable si elle est donnée isolément. Après cela on pourrait demander s'il est utile de continuer à faire entrer la gélatine dans les potages pour les pauvres quand il est suffisamment démontré qu'elle n'a aucune force nourrissante. Il est évident qu'on ne peut que donner une réponse négative à cette question. A vrai dire il n'y a pas de danger pour la santé à attendre de son emploi. Mais pourquoi continuerait-on à l'extraire d'une manière si dispendieuse, des os ? à quoi servent tous ces appareils compliqués ? pourquoi cet emploi inutile de combustible ? ne ferait-on pas mieux de remplacer ces potages par un autre mets plus nourrissant ? La classe ne croit pas être appelée à s'expliquer sur ces questions d'une nature tout administrative ; cependant elle ne peut laisser ignorer que quelques-unes d'elles ont déjà reçu leur réponse dans l'emploi pratique. Dans l'hôpital des Israélites allemands d'Amsterdam, on est revenu de l'emploi de la gélatine pour la confection des potages, l'expérience a prouvé que les malades en étaient mal nourris. On se sert maintenant de viande et l'on trouve dans cet emploi un double avantage : celui de donner un mets plus nourrissant aux malades et moins coûteux pour l'hospice. La classe se flatte d'avoir considéré la question sous tous ses points de vue, et d'avoir satisfait au désir de Votre Excellence.

CHIMIE — *Sur les acides amides et chloramides* (Extrait d'une Lettre
de M AUG LAURENT)

J'ai l'honneur de vous adresser il y a quelques mois une théorie sur une nouvelle classe d'acides que j'ai nommés *acides amides chloramides fluoramides* etc

Je faisais voir que lorsqu'un acide anhydre combine avec l'ammoniaque anhydre il se forme d'abord un acide intermédiaire qui hydraté puis il s'y ajoute une nouvelle quantité d'ammoniaque anhydre qui vient former un sel d'ammonium

Les formules suivantes suffisent pour faire comprendre cette théorie



On pourrait faire une objection à cette théorie c'est que jusqu'à ce jour on n'a pas vu le seul de ces acides amides ou chloramides dont j'admets l'existence

Je viens d'en obtenir un que l'on peut combiner non seulement avec l'ammoniaque, mais avec toutes les bases on peut même l'obtenir libre

J'ai fait voir que lorsque l'on traite l'isatine par l'ammoniaque il se forme plusieurs composés parmi lesquels se trouve un nouvel acide que j'ai nommé *imasatique*. Mais il est si difficile de le préparer à l'aide du procédé que j'ai indiqué qu'il m'a été impossible de m'en procurer une quantité suffisante pour déterminer son poids atomique


Le procédé suivant permet de l'obtenir avec la plus grande facilité

On dissout de l'isatinat de potasse dans l'alcool puis on y verse du sulfate d'ammoniaque il se dépose du sulfate de potasse et il se forme de l'isatinat d'ammoniaque On concentre ce dernier et avant qu'il soit desséché, il perd 1 atome d'eau et se métamorphose en un demi-atome d'imasatate d'ammoniaque

Pour en retirer l'acide imasatique il suffit d'y verser de l'acide chlorhydrique


» Sa composition se représente par un atome double d'isatine plus 1 atome

d'ammoniaque



L'isatine doit être considérée comme un acide anhydre, lorsqu'on la met en présence de l'ammoniaque, son atome double, puis elle absorbe comme les acides anhydres les chlorures, etc., 2 atomes d'ammoniaque, dont l'un sert à former l'acide de l'isatine imide ou l'acide imisatique tandis que le second se combine avec cet acide pour constituer un sel d'ammonium.

Toutes les formules de cet acide et de ses sels doivent donc renfermer l'ammoniaque à l'état d'amide



L'imisate d'ammoniaque évapore plus fortement perd encore 2 atomes d'eau et donne de l'imasatine.

L'acide imisatique et ses sels, soumis à l'ébullition sous l'influence des acides perdent l'imide à l'état d'ammoniaque et régénèrent l'isatine. C'est-à-dire que, dans cette circonstance, la réaction est entièrement semblable à celle qu'offrent les combinaisons des acides et chlorures anhydres avec l'ammoniaque, lorsqu'on les met en présence de l'eau et d'un acide.

La combinaison qui paraissait rentrer le plus difficilement dans cette théorie est le sulfammon, découvert par M. Henri Rose.

Sa formule d'après les dernières analyses de M. Jacquelain peut se représenter par




Voici comment il faut interpréter sa formation.

4 équivalents d'acide sulfurique anhydre se réunissent pour absorber 2 équivalents d'ammoniaque (2 équivalents se réunissent pour absorber 1 équivalent d'ammoniaque), et forment un acide amide qui n'a pas été encore isolé et dont la formule doit être




Cet acide absorbe ensuite un troisième équivalent d'ammoniaque pour former un sel d'ammonium neutre, ou le sulfammon,



Le sulfammon, sous l'influence de la baryte, donne naissance à un acide analogue au sel précédent et dont l'acide n'a pas été isolé

Sa formule doit être



« J'espère pouvoir donner, dans un prochain Mémoire, des exemples d'acides chloramides libres (*)

Permettez-moi, monsieur le Président de relever une erreur très-grave dans laquelle est tombé M. Leblanc, lorsqu'il a présenté à l'Académie son travail sur les éthers acétiques chlorés. Il termine son Mémoire en disant que ses expériences viennent confirmer les hautes vues que M. Dumas a introduites dans la science.

Il y a six ou sept ans que j'ai prédit les résultats que M. Leblanc vient d'obtenir. Ces vues, que j'ai développées en partie dans mon Mémoire sur le chloroacétate de méthyle, ont été repoussées par M. Dumas devant l'Académie. Il a dit qu'il était déraisonnable d'attribuer la même constitution à l'acétate de méthyle et à son dérivé chloré, et par conséquent à l'acétate d'éthyle et à ses dérivés chlorés.

M. Dumas témoigne le désir que la Lettre de M. Laurent soit imprimée tout entière dans le *Compte rendu*.

Il n'ajoutera rien à ce que les chimistes savent au sujet des substitutions, question si souvent débattue devant l'Académie, en répétant que M. Laurent dont les nombreuses découvertes ont tant contribué à fonder cette théorie avait adopté l'opinion que le chlore joue le même rôle que l'hydrogène avant que l'expérience eût prononcé sur ce point. En tout cas, il se fait un devoir de le rappeler.

PHYSIQUE DU GLOBE — *Sur les observations de marées faites à Alger* (Lettre de M. CHAZALLON à M. Arago)

Dans un discours, prononcé à la Chambre des Députés en 1837, vous faites parfaitement sentir la nécessité de remplacer les observateurs des ma-

(*) La conséquence à tirer de ces expériences, c'est que les acides amides et chloramides formés avec de l'ammoniaque ne renferment pas d'ammoniaque, et que, par conséquent, les acides hydratés ne renferment pas d'eau.

rées par des machines qui noteraient elles memes les diverses phases du mouvement de la mer, et donneraient une serie non interrompue d'observations

Conformement aux idées que vous aviez émises, je me suis efforcé de remplacer, à Alger, un mode vicieux d'observation des marées par un mode plus convenable, et, grace au concours de M l'ingénieur en chef Poirel, il m'a été possible d'y installer un maréometre qui fonctionne depuis le mois de mai 1843. Je n'ai pas encore reçu copie des observations, mais je vois avec plaisir, par le *Compte rendu* de la séance du 5 février 1844, que M Aimé plus heureux que moi n pu profiter des données recueillies par le maréometre. Je regrette seulement que dans l'extrait de son *Mémoire* (*Comptes rendus*, tome XVIII page 222), M. Aimé fasse intervenir mon nom pour faire je ne sais combien de réclamations de priorité en sa faveur.

Veillez donc me permettre, monsieur, de vous soumettre à ce sujet quelques réflexions.

En 1842 je vous adressai, sous forme de Lettre, une simple Note sur les observations que j'avais fait faire à Toulon en 1841 (et non un *Mémoire* sur les marées de la Méditerranée, ainsi que le dit M. Aimé). Vous vous rappelez peut-être même, monsieur, que, lorsque j'eus l'honneur de vous remettre cette Note qui fut insérée dans les *Comptes rendus* (t. XV, p. 567) vous signalâtes à mon attention les travaux de Toaldo sur les marées de Venise. Cet auteur discute en effet les observations faites par l'architecte Tamazza, et dit (*Transactions philosophiques*, tome I & VII, page 147)

Æstus enim maris, ut alibi, ita Venetus, regitur a motu Lunæ, puis Toaldo donne deux Tables intitulées, l'une *Æstus medius ratione situs Lunæ*, l'autre, *Æstus maris secundum 12 signa Zodiaci*.

Après une opinion aussi explicite, j'eusse été ridicule si j'avais pu songer à lui attribuer la découverte de l'influence luni-solaire, je savais d'ailleurs que de Lalande avait reconnu cette influence relativement aux marées de Toulon.

M. Aimé suppose, mais ne démontre pas l'influence du Soleil. Ainsi pour trouver la marée solaire, il se contente de diviser la marée lunaire par le coefficient 2,35.

Pourquoi employer le coefficient 2,35 plutôt que le coefficient 10, que les marées d'Ostende ont donné, en 1836, à M. Mailly?

Le chiffre 2,35, obtenu par Laplace (*Mécanique céleste*, tome V page 206) n'exprime nullement le rapport de la marée lunaire à la marée solaire.

Au sujet de sa réclamation de priorité, M. Aime cite une Note (insérée page 106, dans un Mémoire de M. Pouel) qu'il aurait dû reproduire textuellement, car l'intercalation des mots *treize fois et demie* la modifie complètement. Voici le texte de cette Note :

M. Aime a reconnu que la mer monte quand le baromètre baisse, et réciproquement de sorte que les variations observées pour les niveaux de la mer sont, à peu de chose près, *égales à celles* observées pour le baromètre, mais de signe contraire.

J'ai souligné les mots où l'intercalation a eu lieu. Au reste, en 1804, Schulten a signalé et mesuré l'effet de l'influence barométrique, et j'ai montré, dans l'*Annuaire des Mares* pour 1839, que cette influence devait être générale.

M. Aimé parle, pages 221 et 222, de sa méthode pour corriger les effets dus à l'action lunaire. Le défaut d'espace ne lui a pas permis, probablement, de dire que cette méthode appartient à M. Antonio Nobile, qui en a fait usage dans son Mémoire sur les marées de Naples. Cette méthode est bien sujette à quelques petites difficultés, mais, sans doute, M. Aime y aura eu égard.

Enfin, M. Aime termine l'extrait de son Mémoire en critiquant, p. 223, les conséquences que j'ai déduites des observations que j'avais fait faire à Toulon, et s'exprime ainsi relativement à la marée diurne dont j'ai signalé l'existence :

Je ferai remarquer que M. Chazallon n'a pas tenu compte des effets produits par les brises, car il aurait vu qu'elles seules déterminent la variation diurne qu'il a observée, et non l'action lunaire.

Il y a peut-être quelque témérité à prétendre voir d'Alger, et sans avoir fait une seule observation à Toulon, comment le phénomène des marées se comporte ou doit se comporter dans ce dernier port.

MÉTÉOROLOGIE — *Sur l'antagonisme qui existe entre les lois qui régissent la variation diurne et l'oscillation mensuelle moyenne du baromètre, en France*, lettre de M. CH. MARTIN à M. Aiago.

Les oscillations barométriques peuvent être étudiées sous deux points de vue principaux : 1° la variation diurne, 2° les oscillations mensuelles, c'est-à-dire la différence qui existe entre le minimum et le maximum du baromètre dans chaque mois. La différence moyenne des douze mois, conclue d'un certain nombre d'années, se nomme *l'oscillation mensuelle moyenne*.

Si l'on compare entre elles la variation diurne du baromètre et l'oscillation mensuelle moyenne, on trouve un antagonisme complet entre les lois qui les régissent ainsi l'amplitude de la variation diurne va en diminuant de l'équateur vers le pôle elle est de 1^m 16 à Toulouse et seulement de 0^m 80 à Strasbourg. L'amplitude de l'oscillation mensuelle moyenne va au contraire en augmentant de l'équateur au pôle ainsi à Alais elle est de 17^m 95 à Strasbourg de 22^m 81. L'amplitude de la variation diurne diminue à mesure qu'on s'approche de l'Occident ainsi que vous l'avez fait voir le premier (*Comptes rendus de l'Académie des Sciences* tome XIII page 637 1841) L'amplitude de l'oscillation mensuelle moyenne est au contraire plus grande sur les côtes que dans l'intérieur des terres. On peut s'en assurer en étudiant comparativement dans les villes de l'est et du littoral de la France qui sont placées sensiblement sous le même parallèle ainsi qu'on le voit dans le tableau suivant

Oscillation mensuelle moyenne

RÉGION CONTINENTALE		RÉGION Océanique	
	mm		mm
Cusset (Allier)	20 30	La Rochelle	23 17
Dijon	18 97	Nantes	22 79
Strasbourg	22 81	Paris	24 49
Metz	20 80	Rouen	23 91

Cet antagonisme entre la variation diurne et l'oscillation mensuelle se maintient si l'on compare en France les oscillations du baromètre avec les oscillations correspondantes du thermomètre. Ainsi la variation diurne de la pression se lie à la variation diurne de la température. L'amplitude de l'une et de l'autre diminue à mesure qu'on se rapproche des côtes. Mais il n'existe aucun rapport entre les oscillations mensuelles du baromètre et les oscillations correspondantes du thermomètre. En effet, nous avons vu que l'amplitude de l'oscillation barométrique mensuelle moyenne allait en augmentant quand on se rapproche des côtes de France. L'oscillation thermométrique correspondante va au contraire en diminuant, comme le prouve le tableau suivant

Oscillation thermometrique mensuelle moyenne

Mulhouse	21°,40 cent
Strasbourg	18,82
Dijon	18,00
Paris	20,88
Nantes	15,80
La Rochelle	16,10

L'exception que Paris semble faire dans cette serie n'est qu'apparente, elle provient de ce qu'à l'Observatoire on obtient, à l'aide du thermétrographe, les maxima et les minima vrais, tandis que, dans les autres villes, on n'a lu que les maxima et les minima des heures d'observation, qui souvent meme ne sont pas heureusement choisies sous ce point de vue

Si l'on compare entre elles les oscillations barometriques et thermometriques dans un meme lieu et pendant les memes mois, on voit qu'il n'existe aucune relation entre elles, ni dans les mois pris isolement, ni dans les moyennes de plusieurs années. Ainsi, à une forte oscillation thermometrique correspond une faible oscillation barometrique, et l'inverse. Il y a plus, c'est en hiver que l'oscillation thermometrique mensuelle moyenne est la plus faible à Paris et à Strasbourg, et c'est dans cette meme saison que l'oscillation barometrique est la plus forte. Le tableau suivant met cette verité dans tout son jour.

	PARIS (1833 à 1842)		STRASBOURG (1815 à 1824)	
	OSCILLATION		OSCILLATION	
	barometrique	thermometrique	barometrique	thermometrique
Hiver	30,33	19,23	30,21	17,78
Printemps	23,20	21,33	24,23	20,59
Été	17,71	22,55	14,33	19,05
Automne	26,72	20,42	22,46	17,87
Année	24,49	20,88	22,81	18,82

Si l'on admet que les variations diurnes du baromètre dépendent des

variations diurnes de la température, on comprendra pourquoi il existe un rapport entre la marche des deux instruments. Suivant M. Kaemtz, les grandes oscillations barométriques sont un effet de la différence qui existe entre la température du lieu où se trouve le baromètre et celle des *régions voisines*. On voit des lors qu'il n'y a aucun rapport nécessaire entre les oscillations mensuelles du baromètre et du thermomètre dans un même lieu. Mais cette explication ne me paraît pas solidement établie sur l'observation et l'expérience. Il me suffit donc d'avoir signalé quelques-unes des lois qui régissent en France les oscillations barométriques et thermométriques, sans chercher à les rattacher à une théorie générale.

PHYSIQUE. — *Nouvelles expériences d'électricité animale* (Extrait d'une Lettre de M. MATTEUCCI à M. Dumas)

Dans toutes mes recherches précédentes, je n'étais jamais parvenu à faire des piles d'animaux vivants *à sang chaud*, et ce n'est qu'avec le raisonnement que j'avais conclu que le courant musculaire dont les signes persistent d'autant plus que l'animal est plus bas dans l'échelle, devait être au contraire proportionnellement plus fort en raison de sa place dans la même échelle. L'expérience a confirmé cette conclusion.

Avec beaucoup de soins et de peines je suis parvenu à faire une pile de cinq pigeons vivants : les deux cuisses étaient coincées sur chaque pigeon, et une petite portion de la surface musculaire d'une des cuisses était à découvert. Vous vous rappelez très bien la disposition des expériences et je crois inutile d'entrer dans de plus amples détails. La surface du muscle est à découvert dans une des cuisses, l'intérieur du muscle est à découvert sur l'autre cuisse. J'ai obtenu à mon galvanomètre, dans la première expérience, 15 degrés d'un courant toujours dirigé, dans l'animal, de l'intérieur du muscle à la surface. Ce courant a diminué rapidement, et à la troisième expérience quelques minutes après, il n'était plus que de 6 degrés, toujours dans le même sens.

Le sang épanché et coagulé est une des causes de la diminution : si on l'enlève, le courant augmente de quelques degrés. La plus grande difficulté est de tenir en contact les parties et j'y réussis, ou avec des pinces en bois, ou avec des ligatures.

Une expérience de comparaison avec cinq grenouilles également disposées, a donné 10 degrés. Le courant, comme nous le savons, est pourtant plus persistant. Notez bien que la résistance du circuit est, avec les pigeons, au moins quatre fois plus grande qu'avec les grenouilles. Le courant

electrique musculaire augmente donc d'intensité avec le degré que les animaux occupent dans l'échelle, ce qui prouve encore mieux son origine chimique ou plus exactement sa liaison avec les actions chimiques de la nutrition et de la transformation des tissus en contact avec le sang arteriel

« Si ma santé me le permettait, je tenterais avec cette pile de découvrir mieux que je n'avais pu le faire, les rapports entre le courant musculaire et la contraction, l'état du sang

J'ajouterai encore une belle expérience que j'ai faite dans mes leçons sur les phénomènes physico-chimiques des corps vivants. J'ai rempli à moitié d'oxygène les poumons d'un agneau, après en avoir extrait l'air, et j'ai lié la trachée, j'ai introduit ces poumons dans une cloche pleine d'acide carbonique. Après dix minutes, les poumons étaient remplis, enflés et serraient la cloche. J'ai trouvé que l'air des poumons contenait $\frac{2}{3}$ d'oxygène et $\frac{1}{3}$ d'acide carbonique. L'air de la cloche se composait de $\frac{1}{4}$ d'oxygène et de $\frac{3}{4}$ d'acide carbonique. On fait très-bien cette expérience avec le gésier d'un poulet. Si le gésier est desséché d'avance, les deux gaz se mélangent, mais le gésier ne se gonfle pas. Il paraît que deux choses arrivent dans le premier cas : les deux gaz se changent, et puis l'eau se charge d'acide carbonique qui s'exhale à l'intérieur suivant les lois connues.

Il me semble que le phénomène dernièrement observé par M. Marianni avec les bulles de savon est du même genre. L'acide carbonique entre gonfle la bulle, mais par cette raison le poids reste le même étant dans l'acide carbonique la couche liquide qui se charge d'acide carbonique augmente de poids et est ainsi forcée de descendre.

M. E. DE GROTE écrit de Saint-Petersbourg qu'il est parvenu à obtenir du test de l'écrevisse commune la matière colorante qui donne à ce test, après la cuisson, la belle teinte rouge que tout le monde connaît. Le test pulvérisé et desséché à l'air est traité par la potasse caustique puis soumis à l'action de la chaleur jusqu'à ce que la liqueur ait pris une couleur orangée. On filtre, on ajoute un excès d'acide chlorhydrique, puis on chauffe de nouveau. Au bout d'un certain temps, la matière colorante se sépare sous forme de flocons d'un rouge foncé : cette matière est soluble dans l'alcool, quelques essais faits pour l'appliquer sur la lame ont assez bien réussi.

M. GARNIER adresse une Note sur un appareil qui, selon lui, permettrait aux ouvriers chargés d'exécuter des travaux sous l'eau, d'agir avec la même liberté de mouvements et la même sécurité qu'à la surface du sol.

M. DURAND adresse de Bordeaux une nouvelle Note relative a diverses questions de physique générale, elle fait suite a ses précédentes communications

MM VALLE et BARRESWIL adressent un *paquet cacheté* L'Académie en accepte le dépôt.

A 4 heures trois quarts l'Académie se forme en comité secret

COMITE SECRET.

M. ROUX, au nom de la Section de Médecine et de Chirurgie, présente la liste suivante de candidats pour la place de correspondant vacante par suite du décès de M *Astley Cooper*

- | | |
|------------------------|---------------|
| 1° M. Brodie | a Londres, |
| 2° M. Mott (Valentine) | à New-York, |
| 3° M. Dieffenbach. | a Berlin, |
| 4° M. Chéhus | a Heidelberg, |
| 5° M. Stromeyer | a Munich, |
| 6° M. Riberi. | a Turin. |

Les titres de ces divers candidats sont discutés L'élection aura lieu dans la prochaine séance. MM. les membres en seront prévenus par lettres a domicile.

M. ISIDORE GEOFFROY-SAINT-HILAIRE présente, au nom de la Section d'Anatomie et de Zoologie, la double liste suivante de candidats, pour la place de correspondant vacante par suite du décès de M *Jacobson*

Zoologistes

- | | |
|--|------------|
| 1° M. Ch. Bonaparte, prince de Camino, | à Rome, |
| 2° M. Nilsson. | a Lund; |
| 3° { M Kirby | à Londres, |
| { M Mac-Leay | à Londres, |
| 4° { M. E. Deslongchamps. | à Caen, |
| { M. Goldfuss. | à Bonn; |
| 5° { M. Dujardin. | à Rennes, |
| { M. Macquart. | à Lille. |

Anatomistes

1 ^o	M Muller	à Berlin,
2 ^o	M Carus	à Dresde,
3 ^o	{ M de Baer M Rathke	à Saint-Pétersbourg, à Kœnigsberg,
4 ^o	{ M Delle Chiaie M Valentin	à Naples, à Berne

Les titres de ces candidats sont discutés. L'élection aura lieu dans la prochaine séance. MM les membres en seront prévenus par lettres à domicile.

La séance est levée à 6 heures un quart

A

ERRATA

(Séance du 4 mars 1844)

Page 353, ligne 20. « Commission qui sera chargée de l'examen des pièces adressées au concours pour le grand prix des Sciences mathématiques, année 1844 lues année 1843

Même numéro, page 371 ligne 23, *ajoutez* le nom de M. AL. BRONNIART à celui des membres de la Commission chargée de l'examen du Mémoire de M. Barral sur la fauence pour poêles et pour cheminées

BULLETIN BIBLIOGRAPHIQUE

L'Académie a reçu, dans cette séance les ouvrages dont voici les titres

Comptes rendus hebdomadaires des séances de l'Académie royale des Sciences
1^{er} semestre 1844 n° 10 in-4°

Bulletin de l'Académie royale de Médecine, t IX, n° 9 et 10 in-8°

Monographie des Malpighiées ou Exposition des caractères de cette famille de plantes des genres et espèces qui la composent accompagnée de 23 planches, par M DE JUSSIEU, deuxième et dernière partie 1841 in-4

Annales maritimes et coloniales, février 1844, in 8°

Des Eaux potables à distribuer pour l'usage des particuliers et le service public
Rapport présenté au Conseil municipal de la ville de Lyon par M TIERME 1843, in-4°

Théorie de l'Œil par M VALLÉE, 2^e livr, in-8°

Bulletin de la Société industrielle de Mulhouse n° 83, in 8°

La Comptabilité est une science exacte — Théorie générale d'une Comptabilité de commerce par M COFFY, broch in 8°

Dictionnaire universel d'Histoire naturelle, tome IV, 45^e livr, in 8°

Journal de Pharmacie et de Chimie, mars 1844 in-8°

Annales de la propagation de la Foi, mars 1844, in 8°

Journal de Médecine, mars 1844, in-8°

La Clinique vétérinaire, mars 1844, in 8°

Dissertation historique et scientifique sur la Trinité égyptienne, précédée d'un coup d'œil sur l'histoire des documents pour servir à l'histoire du Magnétisme animal et d'un essai de Bibliographie magnétique, par M IDJIEZ Bruxelles, 1844, in-16

Astronomische Nouvelles astronomiques de M SCHUMACKER, n° 497, in-4°

Bericht über Analyse des Mémoires lus à l'Académie des Sciences de Berlin, et destinés à la publication, novembre et décembre 1843, in 8°

Replique de M A FUBINIERI à M B BIZIO, relativement à la *Pourpre des anciens* (Extrait des *Annales des Sciences du royaume Lombardo-Vénitien* pour l'année 1844) in-4°

Di alcuni *Sur quelques principes de Mécanique moléculaire qui se dé-
duisent de l'expérience, sur leurs applications, et sur l'endosmose de M. DUTRO-*
CHET, par M. FUSINIERI, 1^{re}, 2^e et 3^e Mémoire, in-4^o

Gazette médicale de Paris, n^o 10

Gazette des Hôpitaux, n^{os} 27 à 29

L'Expérience, n^o 349

L'Echo du Monde savant, n^{os} 18 et 19

COMPTE RENDU

DES SÉANCES

DE L'ACADÉMIE DES SCIENCES.

SEANCE DU LUNDI 18 MARS 1844.

PRÉSIDENCE DE M. CHARLES DUPIN.

MÉMOIRES ET COMMUNICATIONS

DES MEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE L'ACADÉMIE

ÉLECTRO-CHIMIE. — *De la précipitation des métaux par d'autres métaux; par M. BROQUEL.*

CHAPITRE PREMIER.

Considérations générales

« Dans les deux précédents Mémoires, je me suis attaché à exposer les principes généraux à l'aide desquels on parvient à déposer électro-chimiquement les oxydes sur les métaux, en couches plus ou moins minces, d'où résultent des couleurs analogues à celles des lames minces de Newton; j'ai cherché également à résoudre toutes les questions techniques qui s'y rapportent, afin que, immédiatement et sans difficulté, l'industrie pût se servir de ce nouveau mode de coloration; j'ai donné en outre un vernis très-puissant, à l'aide duquel on préserve de toute altération les couleurs produites, à l'exception du bleu du premier et du second ordre. Une seule difficulté arrêtait, c'est celle de la coloration des grandes surfaces de cuivre; mais j'ai reconnu depuis qu'on la lève facilement en se servant d'un appareil dont le nombre de couples

et l'étendue des surfaces de chaque élément sont en rapport avec l'étendue des surfaces à colorer. Dès l'instant que je fus parvenu au but que je me proposais, je me suis occupé de résoudre la même question à l'égard des dépôts de tous les métaux sur différents métaux, en m'appuyant sur un principe général facile à mettre en pratique. Celui qui m'a paru le mieux convenir est l'immersion à une température élevée dans une dissolution neutre d'un double chlorure métallique et alcalin, en aidant quelquefois de l'action voltaïque. Dans le Mémoire que j'ai l'honneur de présenter à l'Académie sont consignés les résultats généraux auxquels je suis parvenu, en examinant seulement la question sous le point de vue scientifique, remettant à la traiter à une autre époque sous le point de vue industriel, parce que les applications exigent une foule de recherches, de détails minutieux, qu'une longue pratique peut seule faire acquérir.

La précipitation des métaux de leur dissolution respective par d'autres métaux plus oxydables a été mise à profit pour les besoins des arts depuis les temps les plus reculés. Cette question est aussi d'une grande importance pour la Chimie générale, soit que le métal précipité se trouve à l'état pulvérulent, soit qu'il adhère avec plus ou moins de force sur le métal précipitant. Je vais l'envisager sous le point de vue le plus général, afin d'essayer de remonter aux causes qui président à la précipitation des métaux.

« Les rapports qui lient les affinités aux forces électriques sont si bien établis, qu'il est possible, en s'appuyant sur les données fournies par l'électrochimie, de faire naître dans une foule de cas, au moyen des forces électriques les affinités qui, sans elles, ne se seraient pas manifestées. Mais avant d'entrer en matière, j'indiquerai succinctement l'usage que faisaient les anciens des précipités métalliques.

« Depuis un grand nombre de siècles on connaissait la dorure sur métaux, les statuettes et bronzes trouvés dans les tombeaux d'Égypte en sont une preuve manifeste. Si dans d'autres contrées moins favorisées par le climat, on rencontre très-peu de statues dorées, il faut l'attribuer à une altération plus ou moins rapide provenant du contact de l'or et du bronze. À une époque bien postérieure, dans le Bas-Empire, on frappait des monnaies de fer ou de cuivre recouvertes d'argent. Au rapport de Pline, on dorait le cuivre par l'intermédiaire du mercure, le cuivre était étamé et argenté pour le préserver de toute altération, art dont ce célèbre naturaliste attribue la découverte aux Gaulois, qui en faisaient un tel usage, que les Bituriges argentèrent leurs chariots, litères et autres objets d'un emploi journalier. Argenter le cuivre, on le conçoit, l'opération était simple, mais il

n en est pas de même du fer, qui exige une double opération. Vitruve signale la dorure de l'argent et du cuivre au moyen du mercure. Zozime, auteur profane du ^v^e siècle, fait mention de la précipitation du cuivre sur le fer, opération dans laquelle le cuivre reparait avec son aspect métallique. Mille ans après, Paracelse nous apprend que, pour décomposer une dissolution d'argent, il suffit de plonger dans la dissolution une lame de cuivre sur laquelle l'argent métallique se dépose. Bernard de Palissy, dans son *Traité des métaux et de l'alchimie*, nous apprend que l'on était parvenu à dorer et argenter le fer par immersion, en plongeant dans une dissolution très-limpide qu'il n'a pas fait connaître, une lame de fer prenait aussitôt l'aspect de l'or ou de l'argent, suivant la nature de la dissolution. Boyle enfin rapporte que, pour dorer le fer au moyen de l'amalgame d'or, on commence par plonger ce métal dans une dissolution chaude de sulfate de cuivre. le cuivre précipité sert à fixer l'or au moyen du mercure, enfin on argente le cuivre et le laiton au moyen du chlorure d'argent.

• Bien d'autres documents que je ne rapporte pas ici, prouvent donc que l'application métallique pour préserver les métaux oxydables des influences atmosphériques, ou leur donner l'aspect des métaux précieux, était pratiquée depuis bien des siècles, et qu'il est à croire même que le procédé à l'aide duquel on dorait immédiatement le fer ainsi que le cuivre a été perdu, puis retrouvé.

Sans entrer dans l'examen historique de tout ce qui a été fait relativement à l'application des métaux sur d'autres métaux depuis l'établissement de la chimie moderne, je me bornerai à dire que l'intervention de l'électricité dans cette application constitue une nouvelle ère, à l'établissement de laquelle ont concouru plusieurs physiciens et industriels. Parmi les premiers, on doit distinguer M. de la Rive, parmi les seconds, M. Elkington, qui a découvert la propriété que possèdent les dissolutions d'amalgame alcalin, de dorer, à la température de l'ébullition, les objets en cuivre parfaitement décapés qu'on y plonge, c'est lui aussi qui a trouvé que les mêmes dissolutions, et en général les dissolutions d'or alcalines, servaient à dorer électrochimiquement avec l'appareil simple. Ce n'est que plus tard que M. de Ruolz fit usage de ces dissolutions et d'autres analogues, et donna l'extension non-seulement à la dorure électro-chimique, mais encore à l'argenture, et à l'application de quelques métaux sur le cuivre, le fer, et même l'étain. Ce développement inattendu, donné aux applications de la pile, repose, comme on le voit, sur l'emploi *exclusif* des dissolutions alcalines. C'est donc dans ces dissolutions que réside le principe dominant de la dorure et de l'argenture qui

préoccupent aujourd'hui l'industrie. On conçoit, jusqu'à un certain point, d'où peuvent provenir les propriétés des dissolutions alcalines. Quand M. Payen observa que le fer, plongé dans une dissolution de potasse caustique en certaine proportion, était préservé de toute alteration, on crut d'abord que cet effet était dû à ce que la dissolution ne renfermait pas assez d'eau pour que le métal fut oxydé. Mais ce chimiste ayant démontré que la dissolution préservatrice renfermait autant d'air qu'une autre dans laquelle le fer était promptement oxydé, on dut en conclure que l'alcali exerçait dans cette circonstance une influence due à son contact avec le fer.

En examinant les effets électriques produits dans le contact de la dissolution et du fer, on reconnut qu'il existait une action chimique excessivement lente, et d'une nature particulière, puisque les deux corps en présence ne prenaient chacun une charge d'électricité qu'autant que le circuit était resté ouvert pendant quelques instants.

» La potasse exerçait donc là, par son contact avec le fer, une influence inconnue qui empêchait le fer d'être oxydé aux dépens de l'oxygène de l'air contenu dans la dissolution.

En rapprochant ce fait de la propriété des dissolutions alcalines métalliques, servant, soit à la dorure électro-chimique, soit à la dorure par immersion, de cet autre fait que certaines dissolutions non alcalines ne peuvent servir dans les mêmes circonstances, à opérer des dépôts adhérents d'or, d'argent ou de cuivre sur différents métaux qu'on y plonge, on est porté à croire que les dissolutions alcalines, réagissant moins vivement sur les métaux, permettent aux molécules de se grouper selon les lois de la cristallisation, ou, du moins, de manière à s'agréger entre elles.

Tel est le grand avantage que l'on retire des dissolutions alcalines, mais il faut avouer aussi qu'elles ne remplissent pas toujours le but que l'on se propose, comme celle de platine en est un exemple, puisqu'on n'a pu encore déposer sur le cuivre qu'une couche excessivement mince de ce métal, sans pouvoir y faire adhérer les dépôts subséquents. C'est pour ce motif que le platine n'est pas encore en usage dans l'industrie.

Telles sont les considérations que j'ai cru devoir présenter avant d'exposer le résultat de mes recherches touchant la précipitation des métaux de dissolutions neutres par d'autres métaux, sans adhérence ou avec adhérence, en employant ou non le concours de l'action chimique de l'électricité.

De la precipitation de leurs dissolutions au moyen du zinc, de quelques uns des metaux considerés jusqu'ici comme irreductibles

Le principe a l'aide duquel on ramene immédiatement à l'état métallique certains métaux en dissolution est connu depuis longtemps. Il suffit de plonger dans la dissolution un métal plus oxydable que celui qui est en combinaison. Il se substitue alors à sa place en proportions atomiques. C'est ainsi qu'on décompose une dissolution de cuivre, d'or, d'argent, etc., avec le zinc, le fer, etc. Le dépôt forme sur la surface du métal précipitant est tantôt pulvérulent, tantôt plus ou moins adhérent, suivant la densité de la dissolution, la température et diverses circonstances, parmi lesquelles on met en première ligne le contact avec le métal précipitant, d'où résulte un couple voltaïque dont l'action est souvent déterminante. On en a un exemple dans l'étamage des épingle de laiton, qui, plongées dans un bain convenable d'étain ne se recouvrent d'une couche de ce dernier métal qu'autant qu'elles sont mises en contact avec un morceau d'étain.

Tous les effets de ce genre sont dus en partie aux affinités, en partie aux effets électro-chimiques qui en sont la conséquence. Ce concours de l'affinité et de l'électricité doit donc toujours être pris en considération dans les recherches relatives à la réduction immédiate des métaux.

Les faits nouveaux que j'ai l'honneur de faire connaître aujourd'hui à l'Académie prouveront la justesse de mes observations à cet égard.

Je commencerai par donner, d'après notre confrère M. Thenard, le tableau de la réduction des dissolutions salines par les métaux.

SELS DONT LES DISSOLUTIONS SONT IRREDUCTIBLES PAR LES METAUX	SELS DONT LES DISSOLUTIONS SONT REDUCTIBLES PAR CERTAINS METAUX (*)
SELS DES DEUX PREMIERES SECTIONS	
Sels de manganèse	Sels d'étain
— de zinc	— d'arsenic
— de fer	— d'antimoine
— de cobalt	— de bismuth
— de nickel	— de plomb
— de chrome	— de cuivre (**)
— de titane	— de tellure
— d'urane	
— de cerium	
	Azotates de mercure
	Sels d'argent (***)
	— de palladium
	— de rhodium
	— de platine
	— d'or
	— d'osmium
	— d'iridium

Reduits par le zinc, le fer et tous ceux qui précèdent
 Reduits par le fer, le zinc et peut-être le manganèse
 Reduits par le fer, le zinc, le manganèse, le cobalt et tous ceux qui précèdent l'argent

(*) Pour que la réduction se fasse bien il faut que le sel rouille soit soluble
 (**) L'acétate de cuivre est réduit par le plomb
 (***) L'azotate d'argent est réduit par le cobalt

Les précipités signalés dans ce tableau sont tantôt pulvérulents, tantôt formes de parties plus ou moins cohérentes, tantôt ils adhèrent sur le métal précipitant. Les causes qui produisent ces différents états moléculaires dépendent de diverses circonstances dont les unes sont connues et les autres seront indiquées plus loin. Les métaux obtenus jusqu'ici à l'état de poudre noire sont l'antimoine, l'arsenic, l'osmium, le palladium, le rhodium et l'iridium, les autres sont formés de parties plus ou moins agglomérées et possèdent la plupart du temps l'éclat métallique, entre autres le plomb, le mercure, le cuivre et l'argent. On verra comment ces métaux peuvent être obtenus.

nus en couches tres-minces, avec l'aspect métallique, par simple immersion dans un bain métallique

Si l'on jette les yeux sur le tableau précédent, on voit dans la première colonne que les sels de manganèse, de zinc, de fer, de cobalt, de nickel, de chrome, de titane, d'urane et de cérium, sont regardés comme irréductibles par les métaux. Pourquoi a-t-on tiré cette conséquence? c'est qu'on a opéré surtout à l'égard du cobalt, du nickel et du fer dans des circonstances où la réaction du métal le plus oxydable sur les sels précédemment cités était trop faible pour que la réduction s'effectuât. Il serait, en effet, arrivé tout le contraire si l'on eût augmenté l'énergie de cette réaction à l'aide de la chaleur. Les faits suivants en fourniront la preuve, en même temps qu'ils donneront à la chimie de nouveaux moyens d'analyse, et peut-être à la métallurgie et à l'industrie des procédés qui pourront leur être de quelque utilité.

Pour montrer comment j'ai été conduit à la réduction en question, j'indiquerai la relation existant entre les forces électriques à l'aide desquelles on parvient à décomposer la plupart des sels précédemment cités, et les affinités en vertu desquelles on opère la même décomposition.

J'ai démontré, il y a plusieurs années, comment avec l'appareil électrochimique simple, dans lequel l'électricité était fournie soit par l'oxydation seule du zinc soit par la réaction l'une sur l'autre de deux dissolutions différentes séparées par un diaphragme, on parvenait à décomposer tous les sels, de manière à obtenir les métaux à l'état métallique, en cristaux, en lamelles ou en poussière. On pourrait donc, avec l'oxydation seule du zinc, dégager assez d'électricité pour que celle-ci, transformée en courant, eût une énergie suffisante pour opérer la décomposition des sels métalliques et la réduction des oxydes. Or les moindres corps étrangers, métalliques ou non, pourvu qu'ils soient conducteurs, adhérant à la surface du zinc, opèrent cette transformation. Il en est de même quand le zinc n'est pas pur. En effet, il a été démontré qu'un morceau de zinc du commerce qui renferme diverses substances est plus attaqué par les acides qu'un autre qui est chimiquement pur. Dans le premier cas, on reconnaît, à l'aide du multiplicateur et de deux pointes de platine en relation avec cet appareil que l'on promène sur la surface du zinc plongé dans de l'eau acidulée, que cette surface est parcourue dans tous les sens par une multitude de courants électriques, ce qui ne peut avoir lieu qu'autant qu'il se trouve à la surface du zinc des corps étrangers, alliages ou autres conducteurs de l'électricité. Tel est le principe simple qui m'a servi de point de départ dans les recherches dont j'expose aujourd'hui les

résultats. Le zinc devra donc être naturellement le corps précipitant, puisque c'est le métal producteur d'électricité par excellence.

Que se passe-t-il quand on plonge un morceau de zinc bien décapé dans une dissolution d'un sel métallique à la température ordinaire? Ce métal, qu'il décompose ou non le sel, réagit avant tout sur l'eau et s'oxyde aux dépens de son oxygène, et l'hydrogène devient libre. Il en résulte un dégagement d'électricité par suite duquel le métal prend l'électricité négative et le liquide l'électricité positive, mais, à l'aide des particules d'alliage ou autres corps étrangers conducteurs, ces deux électricités constituent un courant dont l'action rend le métal plus oxydable, ou du moins les parties non recouvertes de corps étrangers, d'où résulte une nouvelle énergie dans l'oxydation tandis que l'hydrogène vient en aide à la réduction des oxydes métalliques qui se trouvent dans la dissolution, mais si à cette action électro-chimique, ou plutôt à cette multitude d'actions électro-chimiques dont on démontre l'existence à l'aide des aiguilles en platine on ajoute les affinités de l'oxygène et de l'acide ou des corps se comportant comme tels, plus fortes pour le zinc que pour le métal dissous, et, en outre, l'action de la chaleur qu'on a négligée jusqu'ici, on a alors réuni toutes les conditions les plus favorables pour obtenir des dépôts métalliques. Avec un accroissement de chaleur l'oxydation est plus forte parce que le liquide devient meilleur conducteur de l'électricité, et que le courant ayant plus d'intensité, son action décomposante se trouve augmentée. Il ne faut donc jamais perdre de vue que la précipitation des métaux, au moyen d'un métal plus oxydable plongé dans leur dissolution, est un phénomène en partie chimique et en partie électro-chimique. J'ajouterai encore que, lors même qu'il n'y aurait pas de corps étrangers, alliages ou autres, adhérant à la surface du métal précipitant, celui-ci en contact avec l'eau, l'acide, du sel, l'oxyde métallique c'est-à-dire l'oxygène et le métal, on trouverait là réunies toutes les conditions qui peuvent constituer des effets de contact.

» Telles sont les considérations qui m'ont conduit à la réduction, au moyen du zinc, de plusieurs des dissolutions regardées jusqu'ici comme irréductibles, ainsi qu'à la précipitation avec adhérence de presque tous les métaux non alcalins sur d'autres métaux.

» M. Capitaine (*Annales de Chimie et de Physique*, 3^e série, t. II, p. 126) avait déjà montré que si l'on plongeait un morceau de zinc dans une dissolution aussi neutre que possible de proto-chlorure de fer, le zinc, au bout de peu de temps, était devenu magnétique, et qu'en prolongeant suffisamment l'opération à la température ordinaire, il se recouvrait d'une masse mame-

l'ongue de fer qui en se précipitant entraînait du zinc il vit en même temps qu'il se dégageait des bulles d'hydrogène. Pour obtenir du fer exempt de zinc il souda une lame de zinc à une lame de cuivre bien découpée, cette dernière se recouvrit d'une couche de fer qui se détacha aisément en plongeant la lame. Le fer avait une couleur blanc-bleuâtre jouissant de l'éclat métallique, particulièrement sur la surface adhérente au cuivre. Cette expérience revient à celle qui m'a servi à réduire le fer et à l'obtenir dans le même état c'est-à-dire à l'état de cristaux de tubercules ou de lames. La différence dans les deux méthodes consiste en ce que dans la mienne le couple cuivre et zinc est séparé par ses deux extrémités libres au moyen d'un diaphragme perméable en argile ou autre substance séparant la dissolution de fer de la dissolution d'eau salée dans laquelle plonge le zinc. Cette disposition est plus avantageuse que celle de M. Capitaine par la raison que l'on n'a pas à craindre que le fer en se déposant sur le cuivre ne s'allie au zinc qui se dissout en même temps que le sel de fer est décomposé. Cette disposition permet donc d'obtenir du fer parfaitement pur.

Quoi qu'il en soit, l'expérience de M. Capitaine a prouvé qu'avec une lame de zinc plongée dans une dissolution de protochlorure de fer à la température ordinaire on parvenait avec le temps à décomposer ce sel et à obtenir le fer à l'état métallique. Mais une dissolution quelconque de fer comme on le verra dans laquelle le métal est à l'état de protoxyde éprouve les mêmes effets de la part du zinc pourvu que l'on opère à une température convenable.

» Dans mes expériences sur le traitement électro-chimique des métaux j'avais reconnu qu'en portant la température de la solution d'eau salée à son maximum de concentration, à la température de 50 à 80 degrés le courant électrique acquerrait une intensité qui permettait de vaincre des affinités qui n'avaient pu l'être à la température ordinaire. Cet accroissement dans l'action électro-chimique pouvait être attribué à deux causes la première à une réaction chimique plus forte de la solution sur le zinc la seconde à une meilleure conductibilité de la solution, car on sait que les liquides, à l'opposé des solides deviennent meilleurs conducteurs à mesure qu'on les chauffe probablement parce que la chaleur en diminuant la force d'aggrégation de leurs molécules, permet au courant d'agir plus efficacement. Dans les expériences suivantes, j'ai pris en considération cette influence de la chaleur pour arriver à la décomposition immédiate de quelques sels métalliques qui n'avaient pu l'être avec réduction de l'oxyde, ou séparation immédiate du chlore du métal.

Appliquons ceci aux chlorures de cobalt ou de nickel les résultats étant les mêmes que pour d'autres sels de ces métaux

On prend quelques grammes de chlorure de cobalt que l'on dissout dans l'eau et on porte la température à celle de l'ébullition, on projette dedans du zinc très pur en excès en poussière provenant de la pulvérisation du métal chauffé à une température convenable, ou bien du zinc obtenu par la décomposition électro-chimique d'un sel de ce métal il y a aussitôt une assez vive effervescence par suite de la réaction du zinc sur l'eau et le chlorure il se dégage de l'hydrogène la couleur du zinc ne tarde pas à changer de grise quelle était elle devient noire Quelques minutes après on retire du feu la dissolution qui est devenue parfaitement incolore on lave et l'on sèche, on rassemble au fond de la capsule la maille ou la poussière métallique à laquelle on présente l'extrémité d'un barreau aimanté aussitôt elle est attirée et s'y attache Le chlorure a donc été décomposé et le cobalt amené à l'état métallique Si le zinc est en maille les parcelles sont recouvertes de cobalt et agissent individuellement sur la maille aimantée Quand la poussière est très-fine les parties sont également recouvertes de cobalt Pour enlever le zinc, on traite par l'acide acétique étendu de deux trois ou fois son volume d'eau, à la température ordinaire car avec l'acide sulfurique étendu le cobalt en raison de son grand état de division, est attaqué, comme on le voit par la coloration en rouge de la dissolution Le cobalt se trouve alors en poudre noire très-divisée prenant difficilement l'éclat métallique surtout si le zinc n'est pas pur Dans une expérience où j'ai opéré avec 4 grammes bien secs de chlorure de cobalt j'ai obtenu 1^{gr},26 de cobalt en poudre La théorie indiquait 1,36 Il faut dire aussi que je n'ai pas pris dans les lavages toutes les précautions pour éviter la perte du cobalt tenu en suspension dans le liquide puis l'acide acétique en avait dissous une petite quantité qui n'a pas été soumise à un nouveau traitement Même résultat avec le sulfate et probablement avec l'acetate de cobalt Si, au lieu d'opérer avec de la poussière de zinc, on prend un cylindre de ce métal, on trouve que l'arête circulaire de la base est recouverte de petits tubercules de cobalt que l'on peut enlever avec un instrument tranchant, la surface même se cobaltise

Les sels de nickel, traités de la même manière, m'ont conduit à des résultats semblables Le nickel a été obtenu dans le même temps à l'état métallique en poudre impalpable, attirable à l'aimant et possédant toutes les propriétés du nickel J'ai voulu voir jusqu'à quel point le procédé employé pourrait servir à isoler le cobalt ou le nickel du fer ou de quelques autres métaux avec

lequel il est combiné. J'ai pris 3 grammes d'oxyde de cobalt impur, retiré de la mine de manganèse cobaltifère de Nontron et qui renfermait de petites quantités d'oxyde de manganèse et de fer après avoir dissous cet oxyde dans l'acide chlorhydrique et avoir fait évaporer l'excès d'acide, j'ai traité par le zinc, comme il vient d'être dit. Le cobalt et le fer ont été réduits à l'état métallique, puis j'ai traité par l'acide acétique étendu qui a dissous le fer et l'oxyde de manganèse de manière que le cobalt obtenu était sensiblement pur si ce n'est qu'il se trouvait mélangé avec une très petite quantité de cuivre. Dans une autre expérience où le cobalt renfermait de la semie la poussière métallique a été mise dans l'ampoule d'un appareil à réduction au moyen du gaz hydrogène. On a fait chauffer l'ampoule en y faisant passer le hydrogène pour éviter l'oxydation du cobalt et la semie est alors volatilisée, on l'a recueillie sur les parois du tube de sorte que le cobalt était pratiquement pur. L'analyse chimique pour tirer parti du procédé de réduction que je viens d'indiquer pour obtenir promptement le cobalt et le nickel à l'état métallique en les séparant de plusieurs des métaux avec lesquels ils sont combinés dans la nature.

J'ajouterai encore quelque chose à ce procédé qui permet de retirer le zinc quand on n'a à sa disposition que des limailles. Lorsque celles-ci sont recouvertes de cobalt ou de nickel l'action réductrice du zinc devient alors très faible. Dans ce cas on décante on met le zinc dans un mortier d'agate et l'on broie afin de nettoyer les surfaces, on enlève par des lavages la poussière métallique et l'on commence à traiter la dissolution cobaltique en nettoyant de la même manière les surfaces. De cette façon on obtient après avoir laissé reposer les eaux de lavage de la poudre de cobalt ou de nickel qui ne renferme que peu de zinc que l'on enlève au moyen de l'acide acétique étendu. Quand on opère avec un cylindre de zinc, ce qui présente quelquefois de l'avantage on brosse de temps à autre la surface immergée pour enlever toute la matière pulvérulente déposée. Quand l'opération est terminée on gratte fortement la surface du zinc pour enlever toutes les parties pulvérulentes de cobalt que la brosse n'aurait pu détacher. Il faut pour le succès de l'expérience que le zinc soit aussi pur que possible surtout privé d'arsenic et de cuivre. S'il renfermait du fer il y aurait peu d'inconvénients.

Quand on opère vers 80 degrés, et même un peu au-dessous, l'action est alors moins tumultueuse. L'état de division du cobalt n'est plus aussi grand ainsi peut-on obtenir de petits tubercules qui prennent sous le brunissoir l'éclat métallique.

Il y a un moyen tout simple de faire réagir le zinc en poussière très-fine

sur une dissolution métallique, en y faisant concourir puissamment l'électricité dégagée dans la réaction. Il suffit, pour cela, d'opérer dans un vase de platine, dans ce cas, le zinc, le platine et la dissolution constituent un couple voltaïque. Le platine étant le pôle négatif, se trouve dans l'état le plus favorable pour ne pas être attaqué par les chlorures. Il ne le serait que dans le cas où l'on emploierait des sels acides ou des dissolutions dans la potasse. Hors ce cas, on n'a pas à craindre l'altération du platine. La seule difficulté serait que le métal déposé adhérerait au platine.

CHAPITRE SECOND

Du dépôt avec adhérence des métaux sur d'autres métaux

Dans le chapitre précédent je me suis attaché à décomposer immédiatement les sels de fer, de cobalt et de nickel au moyen du zinc, à une température voisine de l'ébullition, je vais montrer maintenant comment on peut faire adhérer sur différents métaux, non-seulement les précédents fer, nickel et cobalt, mais encore tous les autres non alcalins, à l'exception de trois ou quatre, en les plongeant à une température convenable dans une dissolution métallique aussi neutre que possible. La dorure électro-chimique ou celle par immersion du cuivre, s'opère, comme je l'ai déjà dit, avec des dissolutions alcalines, ou du moins en possédant la réaction. La première a la température ordinaire, la deuxième a celle de l'ébullition. La dorure sur d'autres métaux, outre quelques dispositions préparatoires, ainsi que l'argenture, le cobaltisage, le nickelisage exigent également l'emploi de dissolution de double cyanure ou d'autres dissolutions alcalines. Des lors, le caractère alcalin des dissolutions employées dans les procédés nouveaux est donc bien défini. Le but que je me propose est de démontrer que l'on peut obtenir les mêmes effets, sauf l'épaisseur que la pile seule peut donner, par des immersions dans des dissolutions neutres à la température de 60 à 100 degrés suivant les métaux, en s'aidant quelquefois du contact du zinc avec les métaux précipités. L'adhérence est d'autant plus grande que le décapage est plus brillant car on n'obtient jamais autant de solidité avec le mat, avec le décapage poli, la pièce sort du bain ayant un aspect très-brillant. Cette adhérence est telle que plusieurs dépôts métalliques supportent non-seulement le poli à la peau et au rouge d'Angleterre, mais encore celui du brunissoir d'acier. Le dépôt métallique, du reste, est analogue à celui d'or dans la dorure par immersion. C'est à dire que la couche de métal est excessivement mince, ce qui ne saurait être autrement, attendu que l'action réductrice du métal précipitant cesse aussitôt que sa surface est recouverte par le métal précipité.

Pour mettre de l'ordre dans l'expose des resultats que je vais présenter je parlerai de chaque métal en particulier du moins de ceux qui donnent les effets les mieux caractérisés, en commençant par les métaux électro-négatifs

Des dépôts métalliques avec adhérence, opérés par immersion sans l'aide du contact métallique

Du dépôt de platine ou platine

Composition de la liqueur — On prend une dissolution de chlorure de platine aussi neutre que possible, on verse dedans une solution concentrée de potasse pour opérer sa décomposition. On lave le précipité, d'abord avec un mélange d'alcool et d'eau, puis avec de l'alcool ordinaire pour enlever l'excédant d'alcali sans dissoudre de double chlorure ou du moins du mélange de double chlorure et de platinate de potasse. On a alors celui-ci parfaitement neutre, puisque sa solution dans l'eau distillée ne change pas la couleur du papier de tournesol rougi par un acide. Cette solution, étendue de deux ou trois fois son volume d'eau, sert à obtenir le platine, en opérant de la manière suivante. On élève sa température de 60 à 70 degrés au plus et on plonge dedans les objets parfaitement décapés. Ces objets deviennent d'abord ternes, s'éclaircissent peu à peu, deviennent brillants, et le platine est alors effectué. Une minute au plus suffit pour cette opération. On retire la pièce et on sèche à la sciure. Le platine déposé a un aspect blanc argenté brillant, pourvu que le décapage ait été convenable. Si l'immersion se prolongeait, la réaction de la dissolution continuerait, lentement à la vérité à travers les interstices moléculaires. La couche de platine déposée primitivement se détacherait çà et là. Si l'on opérant à 100 degrés, la réaction serait trop énergique, les molécules ne s'agrégeraient pas ou du moins s'agrégeraient imparfaitement. Au-dessous de 60 degrés, le dépôt deviendrait de moins en moins cohérent et finirait par devenir pulvérulent. Il faut bien se garder, pendant l'opération, de toucher la pièce avec un morceau de zinc, car elle deviendrait noire immédiatement. Il est indispensable d'opérer avec une dissolution parfaitement neutre, car, pour peu qu'elle manifeste la réaction alcaline, tous les effets décrits ne se produisent plus. Un léger excès d'acide, au contraire, ne paraît pas nuire sensiblement au succès de l'opération, il est indispensable de sécher à la sciure les pièces après décapage. En voici, je crois la raison. Le cuivre, après avoir été décapé par les acides, se recouvre, malgré les lavages, d'une couche d'oxyde excessivement mince. En séchant à la sciure, le flottement enlève cette légère couche d'oxyde, et la solution de

platine exerce l'action la plus efficace sur le cuivre. Il faut éviter aussi la présence du protoxyde de cuivre qu'on enlève avec l'acide acétique.

Desiant déterminer la quantité de platine déposée par decimetre carre j'ai fait les deux experiences suivantes :

1^{re} *Experience* — On a pris une lame de laiton carrée de 45 millimètres de côté après l'avoir platinée on l'a mise dans une capsule avec de l'acide nitrique tendu pour dissoudre le cuivre. On a obtenu ainsi une pellicule excessivement mince de platine qui rassemblée séchée et pesée a donné 0.0035 ce qui equivaut à 0^{re} 0086 par decimetre carre.

2^e *Experience* — Une lame de cuivre rouge de 50 millimetres de longueur sur 23 de largeur pesée, platinée puis pesée de nouveau a donné une difference de poids egale à 0^{re} 002. Le platine étant substitué au cuivre dans la proportion atomique on a en representant par p et p' les poids du cuivre perdu et du platine déposé

$$\frac{p}{p'} = \frac{p}{p'} = \frac{2}{98.84 : 31.71}$$

98.84 et 31.71 étant les poids atomiques du platine et du cuivre. On tire de ces deux equations

$$p = 3$$

On a d'après les essais de M. d'Arcet pour déterminer le titre de l'or dans la dorure par immersion on a

	Au mercure	Au trempo
Dorure maximum	0.0353	0.421
Dorure minimum	0.0274	

On voit par là que dans la première experience la quantité de platine déposée par decimetre carre est la quantité d'or déposée dans la dorure au minimum comme 86 : 274, c'est à dire qu'il y avait trois fois moins de platine que d'or déposé et cependant le platine se trouvait en couche uniforme et continue et que dans la deuxième ce rapport est comme 123 : 274, c'est à dire qu'il y avait un peu moins de moitié de platine que d'or déposé. Je ferai remarquer que dans cette expérience, la lame avait été séchée à la sciure.

On peut augmenter encore l'épaisseur du dépôt, mais on court le risque de diminuer l'adhérence. Je fais observer en outre, que celle-ci varie ainsi que l'épaisseur de la couche, avec la nature du laiton. C'est à l'industrie à rechercher les laisons qui se prêtent le mieux au platiné.

» Le platine a la pile, tel que le pratique M. de Ruolz avec une disso-

lution alcaline de platine, ne réunit pas encore la qualité requise, l'épaisseur la première couche, la couche déposée en premier lieu, est terne, elle adhère mais les dépôts subséquents sont pulvérulents parce que l'action électro-chimique employée ne réunit pas les conditions voulues pour que les molécules de platine s'agrègent avec celles déjà déposées. Or, comme la dissolution de platine en raison de sa nature est très étendue il faudrait employer un courant d'une très-faible intensité pour déterminer l'aggrégation des molécules, car j'ai démontré anciennement que plus une dissolution métallique est étendue, moins le courant doit avoir d'intensité, pour que les molécules métalliques se déposent sur l'électrode négatif avec adhérence ou de manière à cristalliser.

Quand on expose à l'air le cuivre platine sortant du bain sans le sécher et par conséquent encore humecté de la dissolution de platine chimique salée rapidement, et les lames platinées se recouvrent des couleurs bleues et violettes les plus brillantes.

J'ai fait quelques essais dans le but de savoir jusqu'à quel point le cuivre platine sauterait dans de l'eau renfermant du chlorure de sodium dans des proportions voulues pour former de l'eau de mer qui comme on le sait altère rapidement le cuivre. Au bout de peu de temps le cuivre platine se recouvrit d'un très léger nuage d'oxychlorure de cuivre annonçant une faible réaction de l'eau salée sur le cuivre, à travers les interstices du platine. Au bout de trois ou quatre jours, les pièces ont été retirées et présentaient encore l'éclat du platine.

» Le maillechort se platine parfaitement bien et prend même un assez beau brillant. Le fer ne se recouvre pas de platine sans une préparation préalable. J'ai employé avec avantage le platiné sur les médailles et bas-reliefs en cuivre rouge obtenus par la galvanoplastie, pour leur donner, en déposant sur leur surface des couches de peroxyde de plomb de divers degrés d'épaisseur, toutes les couleurs de bronze désirables et produire même des effets de couleur piquants qu'il serait bien difficile d'obtenir par tout autre procédé. Ce genre de bronze a l'avantage sur toute autre espèce de peinture, qu'elle ne dépose qu'une couche d'oxyde excessivement mince, qui ne saurait altérer en rien la finesse des traits des figures.

L'Académie pourra apprécier la valeur de mes assertions en jetant les yeux sur les diverses pièces, produits de la galvanoplastie, que j'ai l'honneur de lui présenter.

Je ferai observer enfin que, puisque le platiné de cuivre se revêt quand il est humecté à l'air, des belles couleurs bleues que l'on obtient dans les

premiers instants, quand on les soumet à l'action d'une dissolution de plomb au moyen de la potasse et de la pile, je ferai observer, dis-je, que les belles couleurs qui arrivent après sous l'influence de la pile, sont dues probablement, comme je l'ai déjà avancé, à la réaction d'un protoxyde de platine, d'une part, sur l'oxyde de plomb, de l'autre, sur l'oxyde de cuivre

Application du palladium

Ce que je viens de dire du platine dépose sur différents métaux s'applique en tout point au palladium, c'est à dire que pour recouvrir le cuivre le dernier métal, l'on forme un double chlorure neutre de palladium et de potassium, renfermant une proportion atomique de chaque chlorure, et on opère en se conformant aux mêmes indications

La pièce recouverte de palladium se montre avec l'aspect du platine, peut être un peu plus blanc, avec un brillant comparable, jusqu'à un certain point à celui de l'argent. La quantité de palladium déposée est sensiblement la même que celle de platine dans les expériences précédentes. Comme ce métal a très peu d'affinité pour l'oxygène, qu'il est susceptible de prendre un assez grand éclat, et que le dépôt a très-peu d'épaisseur, il pourrait être employé dans certaines circonstances, bien que son prix fût élevé. Les objets que j'ai mis sous les yeux de l'Académie pourront donner une idée de la beauté du cuivre recouvert de palladium

Dépôt d'iridium

Même mode d'opération que pour le précédent. Le dépôt d'iridium paraît semblable à celui du platine, sous le rapport de la quantité de métal déposée, de la couleur et de l'éclat, cependant le peu de pièces préparées m'a paru avoir un aspect brillant tirant sur l'acier

Dépôt de rhodium

Le rhodium dépose sur le cuivre rouge ou le laiton, en se conformant entièrement aux prescriptions indiquées, se comporte absolument comme le platine et les autres métaux qui l'accompagnent, les résultats sont absolument les mêmes. Quant à l'osmium, n'ayant pu me procurer un chlorure de ce métal, je n'ai pu en former des dépôts sur le cuivre, mais l'analogie porte à croire qu'il se serait déposé comme les autres métaux

Du dépôt d'or ou dorure

Jusqu'ici le mode d'expérimentation décrit précédemment n'a pu pro-

duire des effets aussi nets, à beaucoup près, que ceux obtenus avec le platine et les métaux qui l'accompagnent.

Du dépôt d'argent ou de l'argenté.

« L'argent se prête très-facilement au dépôt avec adhérence sur cuivre et d'autres métaux, en suivant la méthode générale. On sait que le chlorure d'argent est soluble dans une dissolution saturée de sel marin, mais en très-faible proportion, puisque la quantité d'argent unie au chlore ne représente que les $\frac{17}{10000}$ du poids du sel marin employé à la température de 10 degrés. Mais le pouvoir dissolvant augmente avec la température; car, aux environs de celle de l'ébullition, il est quatre fois plus considérable: on sait encore que, lorsque l'on met une lame de fer, de zinc ou de cuivre dans de l'eau saturée de chlorure d'argent, à la température ordinaire, le chlorure d'argent est décomposé, et l'argent se dépose en parties plus ou moins ténues et sans cohérence sur le métal. Les résultats que j'avais obtenus sur le platine et autres métaux me firent penser qu'à l'aide d'une température suffisante, et avec une solution saturée de chlorure d'argent et de sel marin, on parviendrait à faire adhérer l'argent sur le cuivre. Effectivement, à la température de 70 degrés environ, on obtient un argenté mat qui prend sous le brunissoir l'éclat métallique. En opérant à la température de l'ébullition, l'argenté tire sur le noir; il est donc nécessaire de se renfermer entre certaines limites de température, qui doivent varier suivant la nature des alliages de cuivre, si l'on veut obtenir un argenté réunissant les conditions voulues. Le titre du dépôt d'argent a été déterminé de la manière suivante: On a pris une lame de cuivre rouge de 50 millimètres de long sur 23 de large; cette lame, ayant été pesée avant et après l'immersion dans le bain, a présenté un excédant de poids égal à 0^m,003. Or, comme l'argent s'est substitué au cuivre en proportion atomique, on trouve, au moyen d'un calcul précédemment indiqué en parlant du platine, que l'argenté par immersion contient 0^m,0164 par décimètre carré. Le procédé que je viens de décrire, et qui est le résultat et l'application d'un principe général, a des rapports éloignés avec celui qui est employé dans quelques industries, et dont M. Dumas a donné une bonne description dans les *Annales de l'Industrie française et étrangère*, t. I^{er}, p. 311. Nous mettons ici ce procédé en regard de celui exposé précédemment: « Supposons que » l'on ait dissous, dit l'auteur, 1 once d'argent dans l'acide nitrique, et que » l'on ait précipité la dissolution au moyen de l'acide chlorhydrique ou du » sel marin, on lavera le chlorure d'argent et on le mêlera, encore humide,

» avec 4 livres de sel marin, 2 onces sel ammoniac, $\frac{1}{2}$ livre sel de verre, 2 onces de nitrate de potasse, 1 $\frac{1}{2}$ gros oxyde blanc d'arsenic et $\frac{1}{4}$ de livre de sulfate de fer; le mélange étant fait, on décape les pièces au moyen de l'acide nitrique; celui-ci doit être assez concentré : la pièce ne doit y séjourner que quelques instants, et dès qu'elle a pris une teinte dorée très-vive, on la retire et on la lave à grande eau. La pièce étant décapée, on met dans de l'eau bouillante une petite quantité du mélange précédent, tout se dissout; et alors si l'on plonge la pièce, elle se recouvre subitement d'une couche d'argent très-brillante et sans tache ni aspérités cristallines. La partie la plus remarquable de ce procédé se trouve dans l'emploi du chlorure d'argent; le sel ammoniac et le sel de verre, qui consistent presque entièrement en chlorure alcalin, ont pour objet de rendre le chlorure d'argent soluble dans l'eau, par sa transformation en chlorure double, qui est soluble. Si le chlorure d'argent n'était pas dissous, l'argent se déposerait sur le laiton sous forme d'une poudre grise, noirâtre même et toujours très-terne. Si l'on substituait au chlorure un sel soluble par lui-même, tel que le nitrate, le résultat serait encore plus mauvais. Il est probable que la quantité des chlorures alcalins est trop forte; mais cette circonstance est de peu d'intérêt. »

» Il paraît, d'après l'opinion de M. Dumas, que le sulfate de fer, en réagissant sur le nitrate de potasse et le sel marin, met en liberté une petite quantité d'acide nitrique et d'acide chlorhydrique, que produit un peu d'eau régale, destinée à ramener à l'état de chlorure blanc la portion de sous-chlorure violet, qui ne tarderait pas à se produire dans le mélange par l'action de la lumière. L'oxyde d'arsenic étant réduit en même temps que le chlorure d'argent, il se dépose donc sur le laiton un sous-arséniure d'argent. Si l'on ajoutait trop d'oxyde d'arsenic, l'argent prendrait un ton plombé. La crème de tartre n'a pour but que de décapier le laiton.

» En comparant cette méthode à celle que j'ai décrite, on trouve des différences fondamentales; j'opère avec une dissolution saturée de chlorure d'argent et de sel marin, à une température à peu près fixe, tandis que dans le procédé indiqué dans les *Annales de l'Industrie*, on se sert d'une dissolution, dans l'eau bouillante, d'une petite quantité d'un mélange de double chlorure d'argent et de soude, et de différents autres sels. Seulement, dans l'un et l'autre, il faut l'emploi de la chaleur; ensuite ma dissolution est neutre, l'autre est alcaline.

Dépôt de cuivre.

» Ce métal n'offre aucune difficulté pour être précipité avec adhérence

sur divers métaux en employant la dissolution de double chlorure en proportion définie. On savait, du reste, que pour cuivrer le fer, il suffit de plonger une lame de ce métal bien décapée pendant quelques instants dans une dissolution concentrée de sulfate de cuivre, ou bien de prolonger l'immersion dans une dissolution étendue. Pour obtenir le dépôt de cuivre sur des métaux peu oxydables, il faut toucher la pièce immergée dans la dissolution de double chlorure à une température convenable avec un morceau de zinc plongeant également dans la dissolution.

Des dépôts métalliques avec adhérence opérés par le coulant du zinc.

Dépôts d'antimoine.

» Le cuivre se recouvre avec la plus grande facilité d'antimoine en opérant avec la solution de double chlorure, à la température de 70 à 80 degrés. Le métal déposé a un aspect gris-violacé.

Dépôts de bismuth.

» Le bismuth se dépose avec assez de facilité sur les lames de cuivre, avec le contact du zinc toutefois. Le dépôt se présente avec un aspect blanc légèrement jaunâtre ; il est mat et ne prend le poli que sous l'action de la brosse et du rouge d'Angleterre.

Dépôts d'étain ou étamage.

» Le cuivre et le fer s'étament facilement dans le double chlorure de sodium et d'étain étendu à la température de 70 degrés. On obtient immédiatement le brillant et le mat; mais le contact du zinc est inévitable.

» Une fois la couche d'étain déposée sur le cuivre, si l'on maintient le contact du zinc, il se dépose bien de l'étain, mais qui n'adhère plus; ainsi les molécules subséquentes qui arrivent ne sont plus dans les conditions voulues pour s'agréger avec celles déjà déposées. L'étamage ainsi obtenu est satisfaisant, et peut être employé dans plusieurs industries.

Dépôts de plomb ou plombage.

» Le plombage du fer peut être obtenu directement en plongeant une lame de ce métal nouvellement décapée dans une solution d'acétate de plomb; mais si l'on veut opérer le dépôt sur le cuivre avec la solution de double chlorure, il faut employer le contact du zinc, attendu que le cuivre ne jouit pas de la propriété de décomposer les sels de plomb. Bien que ce métal se dépose sur le cuivre, qui n'a aucune action sur la dissolution de double

chlorure, néanmoins il n'est pas possible d'en recouvrir les métaux électro-négatifs à l'aide du contact du zinc. Cette particularité assez remarquable sera le sujet d'une discussion à la fin de ce Mémoire. Le plomb déposé n'a pas la couleur grisâtre que nous lui connaissons; quand il est en masse et que sa surface est avivée, il est blanchâtre.

Dépôts de nickel et de cobalt, ou nichelusage et cobaltusage

» Les expériences rapportées au commencement de ce Mémoire montrent que ces deux métaux doivent se déposer avec facilité sur le cuivre et même sur le fer, en raison de leur tendance à adhérer au zinc dans la décomposition de leurs sels à l'aide de la chaleur. La simple immersion du cuivre dans le double chlorure soit de cobalt, soit de nickel, suffit bien pour ramener ces deux métaux à l'état métallique; mais la couche de métal déposé a peu d'adhérence. En touchant avec un morceau de zinc effilé, le métal déposé devient brillant et très-adhérent; la couche y adhère assez fortement pour supporter le bruni, soit au rouge d'Angleterre et à la peau, soit au brunissoir.

» L'éclat est à peu près celui de l'argent. Il est difficile de distinguer à la couleur le nickel du cobalt. Les pièces recouvertes ne réagissent pas sur l'aiguille aimantée, même sur celle soustraite à l'action du magnétisme terrestre. Cet effet négatif ne peut provenir que de deux causes: ou le métal déposé est réparti en couche trop mince pour réagir sur l'aiguille aimantée, ou bien l'adhérence sur le cuivre constitue un alliage dans lequel les propriétés physiques du métal déposé sont modifiées. Une preuve que la couche est dans un état particulier, c'est que, bien que ses parties aient adhéré les unes aux autres par suite de leur action sur le cuivre, néanmoins les molécules qui arrivent, en employant le simple contact du zinc, ne peuvent plus s'agréger. L'action exercée par le cuivre modifierait donc les propriétés physiques du métal déposé. Le zinc ne doit toucher qu'en quelques points, car si la surface de contact a une certaine étendue, la pièce devient noire, surtout dans les environs du point de contact. C'est un motif pour éviter le contact immédiat du zinc; on y parvient en faisant communiquer celui-ci avec le cuivre par l'intermédiaire d'un fil de cuivre.

» Si l'on veut employer directement le contact, il faut toucher le revers de la surface que l'on veut recouvrir. J'ai dit que la couche métallique ne réagissait pas sur l'aiguille aimantée; mais on peut donner à la couche de métal déposé une épaisseur suffisante pour que la réaction soit bien manifeste. J'en parlerai quand je montrerai jusqu'à quel point il est possible de se

servir des dissolutions de double chlorure chauffée de 60 à 80 degrés pour augmenter l'épaisseur des dépôts.

» Je ferai remarquer encore que pour le nickel comme pour le cobalt, les effets de dépôt varient avec la nature du laiton; qu'il y en a qui donnent les effets les plus satisfaisants, tandis qu'il y en a d'autres qui résistent fortement au dépôt; ce sont ceux qui renferment une plus grande proportion de zinc. Quant au cuivre rouge, il est toujours employé avec avantage. Quand le cuivre ne se recouvre pas également, ce qui est dû à l'imperfection du décapage, il faut toucher toutes ces parties avec une pointe de zinc ou un morceau de zinc effilé; on obtient, par ce moyen, un dépôt uniforme. Pour le cobalt et pour le nickel, il faut opérer dans les conditions d'une température voisine de l'ébullition.

Dépôts de fer

» D'après ce que je viens de dire des métaux oxydables tels que les deux précédents, dans la précipitation avec adhérence, on concevra que le fer doit se comporter de la même manière, c'est-à-dire se déposer sur le cuivre et probablement sur d'autres métaux, par le contact du zinc. L'expérience a confirmé pleinement cette prévision. Le fer déposé sur le laiton affecte la couleur qui lui est propre.

Étamage du cuivre et du fer.

» Le cuivre et le fer se recouvrent facilement d'étain de manière à donner un bon étamage. On opère comme les autres métaux. C'est une des opérations les plus satisfaisantes.

De l'intervention des courants plus ou moins intenses pour opérer les dépôts métalliques.

» On a vu que la décomposition des doubles chlorures par immersion, à une température convenable, avec dépôt immédiat et adhérent du métal, pouvait s'opérer des deux manières, soit en plongeant seulement la lame de métal destinée à recevoir le dépôt dans une dissolution de double chlorure neutre à une température qui variait de 60 à 100 degrés ou aux environs, suivant la nature du métal, soit quand celui-ci n'était pas assez oxydable pour décomposer la solution, en s'aidant du contact du zinc. On conçoit parfaitement que si l'on veut employer l'action d'un appareil électro-chimique composé de plusieurs couples, afin de donner une épaisseur au dépôt métallique, les effets varieront dans ces deux cas. Dans le premier il pourra arriver, et c'est ce qu'on observe le plus fréquemment, que le métal servant d'électrode négatif ne soit pas rendu par l'action du courant assez électro-négatif pour que

la dissolution n'agisse pas sur lui. Dans ce cas, le contre-courant résultant de cette réaction l'emportera sur celui de la pile, et l'on obtiendra à peu près les mêmes effets que si le métal précipitant fût resté dans la solution. C'est ce qui arrive à l'égard du cuivre, par rapport à la dissolution de double chlorure de platine et de potasse, et des dissolutions de palladium, de rhodium, d'iridium, et de plusieurs autres. Il n'en est pas de même dans le second cas, attendu que le métal servant d'électrode négatif n'est pas attaqué par la dissolution, et se recouvre d'une couche métallique par le simple contact du zinc; il s'ensuit à fortiori que si l'on emploie, au lieu du courant résultant de ce contact, l'action provenant de plusieurs couples, le dépôt augmentera nécessairement d'épaisseur. C'est ce qu'on observe avec les dissolutions de cobalt, de nickel, d'antimoine, relativement au cuivre et à d'autres métaux sur lesquels les métaux qui entrent en dissolution se déposent avec adhérence par le contact seul du zinc. On a pris une lame de cuivre dont voici le poids et les principales dimensions :

Poids	17,150,
Longueur	50 millimètres,
Largeur	20 millimètres,
Surface en millimètres carrés. . .	1,150.

Cette lame, mise en relation avec le pôle négatif d'un appareil voltaïque composé de six couples et fonctionnant avec de l'eau légèrement acidulée par l'acide sulfurique, a été plongée dans une dissolution étendue de double chlorure de nickel et de sodium, semblable à celle dont on avait fait usage précédemment. Ce circuit a été fermé avec un fil de platine en relation avec le pôle positif. Cinq minutes après, la lame a été retirée de la dissolution, lavée, séchée et pesée; on a trouvé un accroissement de poids de 3 milligrammes. La lame agissait alors sur l'aiguille aimantée; remise de nouveau encore en expérience pendant cinq minutes, on a trouvé un nouvel accroissement de 4 milligrammes; en tout, pendant dix minutes, 7 milligrammes; ces 7 milligrammes étaient répartis sur une surface de 2300 millimètres carrés, c'est-à-dire qu'il y avait à peu près 3 centigrammes de nickel par décimètre carré. Les sels de cobalt ont donné sensiblement les mêmes résultats.

Le cuivre qui décompose, comme on sait, la dissolution de chlorure d'argent avec adhérence de la couche métallique, a été le sujet d'une expérience. Une lame de 50 millimètres de longueur et 23 de largeur a pris, sous l'influence du courant, 0^m,004, résultat qui annonce qu'il s'est déposé environ 0^m,016 par décimètre carré.

» Avec le cuivre rouge et une solution de double chlorure d'étain et de sodium, on a obtenu, pour une surface de 2300 millimètres carrés, un accroissement de poids de 8 milligrammes en dix minutes, ce qui donne $0^{\text{re}},0328$ d'étain par décimètre carré.

» Le fer ne s'est recouvert dans le même temps que de $0^{\text{re}},025$ d'étain.

Conclusions.

» Dans le procédé que je viens de décrire, il y a trois choses essentielles à considérer : la composition de la liqueur dans laquelle entrent un chlorure alcalin et un chlorure métallique en proportion atomique égale, la température de la dissolution, l'adhérence du métal précipité qui cesse d'avoir lieu quand la couche a une certaine épaisseur, bien qu'on l'aide de l'action voltaïque résultant du contact des pièces avec le zinc. Comment se fait-il qu'une double combinaison opère plus facilement la décomposition du sel métallique, avec adhérence du métal déposé, qu'en employant une dissolution métallique simple ? Pour répondre à cette question, il faut partir de ce point, que le chlorure métallique, étant combiné avec le chlorure alcalin, a perdu déjà une portion de ses affinités ; d'où il suit que son action étant moins forte sur le métal précipitant, les molécules du métal précipité ne se précipitent plus aussi tumultueusement que si l'on opérait avec la dissolution simple. En outre, les dissolutions de chlorure alcalin augmentent le pouvoir conducteur pour l'électricité des dissolutions métalliques ; ce qui contribue à donner encore une nouvelle énergie aux actions électro-chimiques.

» L'action de la chaleur a été déjà examinée au commencement de ce Mémoire ; je résumerai donc ici ce que j'en ai dit.

» L'accroissement de chaleur augmente le pouvoir conducteur et favorise la décomposition en dilatant les corps, et permet aux molécules déposées de s'introduire un peu plus profondément dans les interstices moléculaires.

» Les causes de l'adhérence, dans cette circonstance, sont les mêmes que celles qui président à la combinaison du métal précipitant avec le métal précipité ; la force d'agrégation propre aux molécules du métal précipité n'y contribue en rien, car les nouvelles molécules qui arrivent, quand la surface est recouverte, ne peuvent s'agréger entre elles. Ces causes sont tellement identiques avec celles qui produisent la combinaison, que, si la cohésion n'y mettait obstacle, cette combinaison s'effectuerait par la raison que les états électriques des éléments en présence sont les mêmes que si elle devait avoir lieu.

» Je me suis attaché dans ce Mémoire, comme l'Académie a pu le voir, à traiter, de la manière la plus générale, le dépôt d'un métal non alcalin

sur les métaux, en m'aidant quelquefois de l'action voltaïque. Cette question présente de l'intérêt, non-seulement sous le rapport des actions moléculaires, mais encore sous celui des applications aux arts; quant à l'intervention de l'action voltaïque, elle est souvent déterminable, comme on en a un exemple à l'égard du cuivre par rapport à la dissolution de cobalt, de nickel. Dans ce cas, le cuivre étant le pôle négatif, on aurait pu croire que l'action était uniquement produite par l'action chimique de l'électricité dégagée dans la réaction de la solution sur le zinc; mais le manque de cohérence des molécules de métal déposé, quand la couche a acquis une certaine épaisseur, montre évidemment que dans les premiers instants du dépôt, l'action du cuivre pour le cobalt ou le nickel, bien qu'existante, n'est pas assez forte pour décomposer la dissolution de ce dernier métal; elle suffit cependant pour l'opérer et produire un dépôt adhérent par le contact du zinc. Ce que je dis des dépôts de cobalt, de nickel, a également lieu à l'égard de l'antimoine, etc. C'est dans l'étude des phénomènes, de ce genre qu'on peut le mieux étudier les rapports si nombreux, si variés, si intéressants, qui lient les affinités et les forces électriques, rapports qu'on ne doit jamais perdre de vue dans toutes les opérations de chimie où trois corps sont en présence; car il peut en résulter, si l'on tire parti des effets électriques produits dans cette circonstance, une nouvelle énergie dans l'action des forces chimiques dont on ne faisait usage jadis que dans quelques cas particuliers, et qui aujourd'hui est mise à profit, dans les actions chimiques et les actions moléculaires en général, comme la chaleur, un des auxiliaires les plus importants des affinités.

Je terminerai enfin ce Mémoire en faisant remarquer que tous les faits qui y sont rapportés reposent sur un principe simple, c'est-à-dire l'emploi des doubles chlorures métalliques et alcalins parfaitement neutres à une température qui varie de 60 à 100 degrés. Ce principe est fécond en applications, puisqu'il s'étend à peu près à tous les sels métalliques non alcalins. Si je n'ai pu donner la loi qui lie tous les phénomènes, j'ai présenté du moins le principe général sur lequel elle repose; une loi enchaîne à la vérité les faits, et en dernière analyse les résume tous; mais le principe est le point de départ des recherches qui conduisent à sa découverte. L'étude des principes doit donc précéder celle des lois, ainsi c'est celle qui m'a préoccupé.

Dans un autre Mémoire j'examinerai l'action qu'éprouvent, dans les mêmes conditions où j'ai opéré, tous les métaux à l'égard des dissolutions de titane, de chrome et d'urane, ainsi que la formation des alliages avec ou sans l'influence du contact métallique.

PHYSIQUE. — *Observations simultanées faites à Paris et à Andilly, près Montmorency, pour rechercher la proportion d'acide carbonique contenue dans l'air atmosphérique ; par MM. BOUMINGAULT et LEWY.*

« Dans un travail qui a été communiqué par l'un de nous à l'Académie, il y a déjà quelques années, on a particulièrement insisté sur la nécessité d'entreprendre simultanément à la ville et à la campagne, une série d'expériences faites sur un volume d'air considérable, dans l'espoir de constater la légère différence qui doit nécessairement exister dans la proportion d'acide carbonique renfermée dans l'air des deux localités, différence qu'il n'avait pas été possible d'apprécier en opérant dans les circonstances ordinaires. C'est le résultat de ces observations simultanées que nous avons l'honneur de présenter à l'Académie.

« Un de nos appareils a été placé à Andilly, près Montmorency. Un appareil en tout semblable au précédent a fonctionné dans un des quartiers les plus peuplés et les moins aérés de Paris, au Collège de France. En choisissant d'ailleurs cette dernière localité, nous avions l'avantage de pouvoir nous servir d'instruments qui avaient été jaugés par M. Regnault et que notre confrère s'était empressé de mettre à notre entière disposition.

« Nous avons fait trois séries d'observations comprises entre le 29 septembre et le 20 octobre 1843. Dans chacune de ces séries on a opéré, à Paris et à la campagne, aux mêmes heures, sur environ 450 litres d'air, ce qui a permis de peser après chaque expérience près de 3 décigrammes d'acide carbonique. Les détails des observations sont réunis dans le tableau suivant.

Déterminations simultanées de l'acide carbonique contenu dans l'atmosphère, faites à Paris et à Andilly, près Montmorency.

DATE des observations à 4843	RECHES des observations.	CIRCUMSTANCES météorologiques.	VOLUME de l'air passé dans l'aspirateur.	TEMPÉRATURE de l'aspirateur.	BAROMÈTRE réduit à 0°	ACIDE carbonique pesé	VOLUME de l'air ramené à 0° et pression de 1000 m ³ 760, plus le volume de l'acide carbonique	ACIDE carbonique dans 1000 parties d'air en volume.	LOCALITÉ	L'ACIDE carbonique étant 100 dans l'air de Paris
29 septembre.	De 6 ^h à 8 ^h soir.	Pluie	litres 402,199	15°, 23	millim. 757,85	gram. 0,226	litres 373,5123	2,074	Paris.	100,00 (*)
30 idem.	De 6 ^h à 7 ^h 45 ^m	Pluie								
29 septembre.	De 6 ^h à 8 ^h soir.	Pluie	337,660	11,80	750,40	0,186	313,7941	2,092	Andilly.	100,60
30 idem.	De 6 ^h 30 ^m à 7 ^h	Pluie								
6 octobre.	De 6 ^h à 8 ^h soir.	Ciel découvert.	litres 517,113	18°, 58	millim. 754,03	gram. 0,306	litres 470,4522	3,264	Paris.	100,00
7 idem.	De 6 ^h à 6 ^h	Nuageux, pluie.								
8 idem.	De 6 ^h 15 ^m à 6 ^h 30 ^m	Couvert, averse.								
6 octobre.	De 7 ^h 45 ^m à 8 ^h soir.	Ciel découvert	580,775	15,90	746,00	0,314	512,9715	3,092	Andilly	94,15
7 idem.	De 6 ^h à 8 ^h 30 ^m	Nuageux; pluie.								
8 idem.	De 6 ^h à 6 ^h	Couvert, averse.								
18 octobre.	De 6 ^h 30 ^m à 8 ^h 30 ^m	Tête-nuageux.	litres 517,113	10°, 81	millim. 764,07	gram. 0,319	litres 464,1571	3,260	Paris	100,00
19 idem.	De 6 ^h 30 ^m à 8 ^h 15 ^m	Ciel découvert.								
20 idem.	De 6 ^h à 8 ^h 30 ^m	Brouillard; nuageux								
18 octobre.	De 6 ^h 30 ^m à 6 ^h soir.	Tête-nuageux.	540,460	7,10	756,30	0,207	519,9682	2,885	Andilly.	88,50
19 idem.	De 6 ^h à 6 ^h	Ciel découvert.								
20 idem.	De 6 ^h 30 ^m à 6 ^h	Brouillard; beau.								

(*) Il y a un léger doute sur l'exactitude de cette expérience

En réunissant les trois séries d'observations en une seule, on a

LOCALITÉS.	VOLUME d'air réduit à 0°, et pression 0 ^m ,76.	ACIDE CARBONIQUE		ACIDE CARBONIQUE, dans 10 000 volumes d'air	RAPPORTS.
		en poids	en volume.		
Paris... ..	lit. 1338,1216	gr 0,845	cc 426,8	3,190	100
Andilly.	1346,7638	0,797	402,5	2,989	94

» Il restait à examiner si la très-légère différence constatée, dans la proportion de l'acide carbonique contenue dans l'air de la ville et l'air de la campagne, était bien réelle; il fallait rechercher si l'exactitude de la méthode employée était telle qu'on puisse affirmer que dans 100 000 volumes d'air atmosphérique, il y avait tantôt 29,9 et tantôt 31,9 volumes de gaz acide carbonique.

» Dans le but d'évaluer la limite d'erreur du procédé, nous avons fait fonctionner simultanément deux appareils exactement semblables qui prenaient l'air à la même source. Ces observations comparatives ont été continuées pendant trois jours au Collège de France; en voici le résultat :

Observations simultanées faites au Collège de France avec deux appareils semblables.

DATES des expériences.	Nos des appa- reils.	RECORDS ET DUREE des observations.	VOLUME d'air passé dans l'inspira- teur	TEMPÉRAT. de l'inspira- teur	SARONÉT. à 0°	ACIDE carboniq. dosé.	VOLUME de l'air à 0°, et pression 0 ^m ,766, plus le volume de l'acide carboniq.	ACIDE carboniq. dans 10 000 parties d'air en volume.	DIFFÉRENCE entre les deux expé- riences.	L'ACIDE carbon obtenu dans l'appar- eil n° 1 étant 100.
7 novemb.	1.	De 12 ^h 15 ^m à 3 ^h 45 ^m	lit 114,914	12°,90	millim 756,73	gr 0,091	litres 107,665	4,263	0,080	100
Idem.	2	Idem.	119,494	12,10	Idem	0,093	112,178	4,183	Idem.	98,12
8	1	De 12 ^h à 6 ^h 30 ^m	114,914	12,57	748,69	0,080	106,600	2,936	0,075	100
Idem.	2	Idem.	119,494	12,05	Idem	0,083	111,175	2,961	Idem	97,44
9	1	De 12 ^h à 3 ^h 30 ^m	114,914	10,90	757,89	0,077	108,675	3,580	0,079	100
Idem. ...	2	Idem	119,494	10,50	Idem.	0,080	113,103	3,659	Idem	102,30

» On voit, en consultant ce tableau, que, dans ces observations simultanées faites sur l'air de la même localité, les résultats obtenus avec les deux appareils fonctionnant isolément ont présenté, tantôt dans un sens, tantôt dans l'autre sens, des différences qui n'ont pas atteint le $\frac{1}{100000}$ du volume de l'air sur lequel on expérimentait; de sorte qu'en représentant par 100, par exemple, l'acide carbonique dosé par l'appareil n° 1, l'acide carbonique dosé par l'appareil n° 2 a été 99 $\frac{1}{4}$. Or, comme dans les observations simultanées faites à Paris et à Andilly, nous avons trouvé pour l'acide carbonique atmosphérique le rapport de 100 à 94, nous concluons qu'à l'époque et dans les circonstances où nous avons opéré, l'air de la ville contenait réellement un peu plus d'acide carbonique qu'il ne s'en trouvait alors dans l'air de la campagne. »

M. AUGUSTIN CAUCHY présente à l'Académie la 25^e livraison des *Exercices d'Analyse et de Physique mathématique*.

M. AUGUSTIN CAUCHY présente aussi à l'Académie un exemplaire de l'ouvrage qu'il publie et qui a pour titre: *Considérations sur les ordres religieux, adressées aux amis des sciences*.

NOMINATIONS.

L'Académie procède, par la voie du scrutin, à la nomination d'un Correspondant pour la section de Médecine et de Chirurgie, en remplacement de feu M. Astley Cooper.

Au premier tour de scrutin, le nombre des votants étant de 43,

M. Brodie obtient.	39 suffrages
M. Dieffenbach.	2
M. Chelius.	1
M. Buffalini.	1

M. BRODIE, ayant réuni la majorité absolue des suffrages, est déclaré élu.

L'Académie procède ensuite, également par la voie du scrutin, à la nomination d'un Correspondant pour la section d'Anatomie et de Zoologie, en remplacement de feu M. Jacobson.

Au premier tour de scrutin, le nombre des votants étant de 51,

M. Ch. Bonaparte obtient.	30 suffrages.
M. Muller.	20
M. Carus.	1

M. CH. BONAPARTE, prince de Canino, ayant réuni la majorité absolue des suffrages, est déclaré élu.

L'Académie procède enfin, toujours par la voie du scrutin, à la nomination des Commissions suivantes :

Commission chargée de l'examen des pièces adressées au concours pour le *prix de Mécanique* : MM. Piobert, Poncelet, Morin, Gambey, Dupin.

Commission chargée de l'examen des pièces admises au concours pour le *prix de Physiologie expérimentale* de la fondation Montyon : Commissaires, MM. Flourens, de Blainville, Serres, Magendie, Duméril.

Commission chargée de décerner le *prix d'Astronomie* : Commissaires, MM. Arago, Mathieu, Laugier, Damoiseau, Mauvais.

MÉMOIRES LUS.

CHIRURGIE. — *Sur l'évacuation artificielle des débris des calculs urinaux et sur leur pulvérisation* ; par M. LEROY D'ÉTIOLLES

(Commissaires, MM. Serres, Roux, Velpeau.)

« Pendant les premiers temps qui ont suivi la naissance de la lithotritie, la coexistence d'une pierre et d'une rétention d'urine était considérée comme un empêchement à la réussite de cette opération. Dans un Mémoire que j'ai eu l'honneur de lire à l'Académie, le 5 mars 1832, j'ai montré l'erreur d'une telle appréhension, et aujourd'hui cette contre-indication n'existe plus pour personne. Les sondes évacuatrices que M. Heurtebise et moi avons présentées dans les séances des 27 février et 6 mars 1832, puis, un peu plus tard, les brise-pierres évacuateurs à cuillers, ont fourni les moyens d'extraire en totalité les débris des calculs tout aussi sûrement que lorsque la vessie conserve la faculté de les expulser spontanément avec l'urine.

« Quand on fait usage de ce dernier instrument, on trouve presque toujours que la pression ne suffit pas pour produire le rapprochement des branches, le tassement des débris dans les cuillers, et faciliter l'expulsion des portions faisant saillie latéralement ; lorsque la masse de détritus comprise entre les branches est tant soit peu volumineuse, il devient nécessaire de recourir à la percussion.

« Dans un travail précédemment présenté, j'ai examiné les avantages et les inconvénients des divers supports destinés à donner à l'instrument la fixité nécessaire à la percussion. J'ai fait voir que les mains des aides laissent trop de mobilité et donnent lieu à trop d'ébranlement ; que, d'une autre part, les étaux fixés à un lit, à une table, ne sont pas sans danger, et j'ai proposé de leur substituer un percuteur à détente. Dans l'instrument, tel que je l'avais

d'abord fait construire, le choc était produit par une vis rampante et une rainure droite faisant échappement. Lorsqu'on tourne la vis pour presser sur la pierre, et que la résistance est trop forte, la percussion intervient sans que le chirurgien ait besoin de s'en occuper et de rien changer à la manœuvre. C'est là un avantage sans doute, mais à côté duquel il y a des inconvénients. Ainsi les chocs, avec ce mécanisme, ne sont pas assez rapprochés; mais ce qui surtout est grave, c'est que, le mouvement de rotation par lequel la percussion est produite augmentant la pression qu'exerce la vis sur la pierre, il serait à craindre que la tension croissante du métal n'amenât la rupture de la portion courbe des branches. Il est possible d'éviter ce danger en détournant d'un demi-tour la vis de pression après quatre ou cinq chocs; mais c'est là une précaution que pourrait négliger un chirurgien peu habitué à pratiquer la lithotritie: j'ai donc préféré changer le mécanisme, et, tout en évitant un danger, j'ai trouvé l'avantage d'une action beaucoup plus rapide. La tension du ressort qui produit le choc est déterminée maintenant par un excentrique obéissant au mouvement alternatif d'une poignée. On pourrait objecter qu'ici encore c'est une vis qui sert à faire avancer le ressort; mais il est facile de voir que la différence est grande: la tension n'augmente plus à chaque coup, comme dans le premier instrument, et la vis ne presse sur l'extrémité de la branche mobile que juste autant qu'il faut pour faire avancer le ressort, et le tenir en rapport avec le point sur lequel il doit frapper. La vis n'agit comme moyen d'écrasement qu'à la volonté du chirurgien.

« Cet instrument à pression et à percussion indépendante me paraît remplir les conditions que je m'étais proposées; les applications que j'en ai faites m'ont confirmé dans cette persuasion. Toutefois j'en ai imaginé un autre encore qui agit seulement comme percuteur. La vis et l'érou brisé ont ici fait place à un double encliquetage et à une crémaillère destinés à empêcher le recul et à maintenir la plaque du ressort en rapport avec le bout de la branche mobile du brise-pierre. Pour tendre le ressort percuteur, j'ai conservé l'excentrique et l'inclinaison alternative, latérale de la poignée.

« Les cuillers d'un brise-pierre peuvent ramener au dehors jusqu'à 1 gramme de détritus dans leur cavité. Dans chaque séance, l'instrument peut être introduit et retiré plein, terme moyen, cinq à six fois; en sorte qu'une pierre de 10 grammes peut être détruite et enlevée dans deux séances.

« Il est facile de comprendre que ni l'extraction des débris de la pierre avec les cuillers, ni les sondes évacuatrices, ni les injections, ne peuvent entraîner immédiatement la totalité des morceaux qui sont produits dans une séance, il n'y a pas à cela d'inconvénients lorsque l'on fait l'évacuation ar-

tificielle pour suppléer au défaut de l'expulsion naturelle ; mais il n'en est plus de même lorsque l'on se propose de parer aux dangers de l'engagement des fragments dans l'urètre. Pour prévenir cet engagement, on est parfois obligé, dans l'intervalle des séances, de faire uriner le malade avec une sonde en gomme ; encore ne parvient-on pas toujours à empêcher que les puissantes contractions de la vessie ne poussent les fragments entre la sonde et le canal ; beaucoup de calculéux, d'ailleurs, ne peuvent pas garder la sonde à demeure, et la répétition fréquente des besoins d'uriner ne permet pas de songer à introduire la sonde chaque fois qu'ils se font sentir.

» J'ai été ramené vers l'idée de la pulvérisation par l'usure progressive. Les inconvénients des instruments droits et des forets m'étaient trop connus pour que je retombase dans cette voie si longtemps battue ; aussi le pulvérisateur auquel je me suis arrêté, quant à présent, est courbe : il y a quatre branches, glissant à coulisse comme celles du percuteur ; deux d'entre elles, disposées latéralement, ont un glissement indépendant du premier, elles ont en outre deux autres mouvements, l'un par lequel elles s'écartent et se rapprochent, l'autre qui les fait incliner à droite et à gauche au moyen d'une sorte d'articulation ginglimoidale double, semblable à celle du radius et du cubitus, mais plus bornée. Ces branches latérales ont pour objet de maintenir la pierre, et de présenter successivement tous les points de la longueur à l'action d'une scie contenue dans la cavité de la cuiller de l'une des branches du brise-pierre. J'ai fait exécuter, pour user et pulvériser les calculs, deux sortes de scie. les unes agissent par un mouvement de va et vient ; les autres, disposées en spirales dentées, obéissent à la rotation que leur imprime une manivelle ou un archet.

» J'ai aussi donné au brise-pierre articulé de Jacobson des dispositions qui le rendent propre à la pulvérisation des calculs par usure superficielle ainsi que le montrent les instruments que je place sous les yeux de l'Académie ; l'addition des branches latérales au brise-pierre articulé remonte à 1834, ainsi que je l'ai décrit dans le *Traité de Lithotripsie* publié en 1836. Mais le but n'était pas tout à fait le même ; la nouvelle destination que j'ai donnée depuis à cette addition la rendrait peut-être plus importante si la pulvérisation devenait une méthode usuelle et d'une application commune. Cependant je suis loin encore d'abandonner pour elle la méthode si simple et si puissante de l'écrasement ; je ne la propose maintenant que pour le cas exceptionnel dont j'ai parlé tout à l'heure. »

CHIRURGIE. — *Nouveaux documents pour servir à éclairer la question de la diathèse cancéreuse, et de l'utilité des opérations chirurgicales dans le traitement de cette maladie; par M. LEROY d'ÉTOILES.*

(Commissaires, MM. Serres, Roux, Velpeau.)

« De la discussion des nouveaux documents qu'il apporte, et de ceux qu'il avait précédemment présentés, l'auteur croit pouvoir déduire les conclusions suivantes

» 1°. L'extirpation n'arrête pas la marche du cancer;

» 2°. L'extirpation ne doit être employée comme méthode générale que pour le cancer de la peau et des lèvres,

» 3°. Il n'y a nécessité d'extirper le cancer des autres organes que dans le cas où des hémorragies produites par les ulcérations compromettraient la vie des malades. »

MÉMOIRES PRÉSENTÉS.

MÉDECINE. — *Nouvelles recherches sur la paralysie générale, sur ses caractères anatomiques, ses formes diverses, son siège et son traitement; par MM. V. FABRE et SC. PINEL.*

(Adressé pour le concours aux prix de Médecine et de Chirurgie de la fondation Montyon.)

Conformément à une disposition prise par l'Académie relativement aux ouvrages imprimés ou manuscrits adressés pour ce concours, MM. Fabre et Pinel signalent, dans une Note jointe à leur Mémoire, les faits qui leur semblent devoir attirer plus particulièrement l'attention des Commissaires. Ils présentent de plus, dans les termes suivants, les conclusions qui se déduisent de leurs observations personnelles.

« La paralysie générale se traduit par quatre formes d'altérations principales dans le cerveau : 1° par l'inflammation subaiguë de la substance corticale des corps striés; 2° par l'inflammation chronique des mêmes parties; 3° par l'hypertrophie active du cerveau, et surtout de la substance blanche présentant les singuliers phénomènes d'une phlegmasie tantôt aiguë, tantôt chronique, altération encore fort peu connue, et qui, dans ces cas, rentrerait dans les inflammations blanches de Narandel; 4° par l'atrophie aiguë ou chronique de quelques circonvolutions ou de toutes les circonvolutions du

cerveau, et, dans certains cas, par une espee de fonte générale de tout un lobe ou des deux lobes cérébraux »

CHIMIE APPLIQUÉE — *Mémoire sur l'assainissement des amphithéâtres de dissection et des établissements analogues, sur la conservation des pièces anatomiques et des objets d'histoire naturelle, enfin sur un nouveau procédé d'embaumement*, par M. **SUCQUET**

(Commissaires, MM. Roux, Regnault, Velpeau)

Le procédé de désinfection proposé par l'auteur repose, de même que son procédé d'embaumement, sur les propriétés antiputrides qu'il a reconnues dans le sulfate neutre de zinc. Ce produit, tel qu'on le rencontre aujourd'hui dans les officines, étant trop coûteux pour être employé communément dans les salles de dissection et autres établissements analogues, M. Sucquet a cherché les moyens de l'obtenir à bas prix, et il indique le mode de préparation qui lui a paru préférable. Le Mémoire contient l'exposition des expériences qui ont été faites pour constater l'action de ce sel sur les liquides et les solides animaux, et de quelques essais d'embaumement, sans injection des vaisseaux et sans ouverture des cavités chirurgicales au moyen de la seule macération du cadavre dans la solution saline.

M. **MAGENDIE**, au nom de la Commission du prix de Vaccine, soumet une difficulté qui s'est élevée par suite de cette circonstance, que quelques-uns des concurrents ont fait connaître leur nom tandis que d'autres l'ont placé sous pli cacheté. L'Académie décide que les Mémoires dont les auteurs se sont fait connaître ne seront point écartés du concours, la condition du secret du nom n'ayant pas été formellement exprimée dans le programme.

M. **ARAGO** fait remarquer que l'Académie a reçu, depuis peu, diverses communications relatives aux moyens d'occlusion proposés pour le tube pneumatique des chemins de fer à pression atmosphérique, et qu'aucune Commission n'a été chargée de les examiner. Par suite de cette remarque, une Commission, composée de MM. Arago, Poncelet, Morin, Seguiet et Lamé, est chargée de prendre connaissance du moyen proposé par M. *Hallete*, et des autres communications relatives à la même question, qui ont été faites ultérieurement.

CORRESPONDANCE

M le MINISTRE DE LA GUERRE accuse réception du supplément au Rapport fait par une Commission de l'Académie, sur l'opium récolté en Algérie par MM Simon et Hardy

PHYSIOLOGIE. — *Lettre de M D'ARCY à l'occasion des expériences faites en Hollande sur les propriétés nutritives de la gélatine*

Faisant partie de la Commission de la gélatine nommée par l'Académie, je crois qu'il est de mon devoir de laisser à cette Commission le soin d'apprécier la valeur du Rapport approuvé par l'Institut de Hollande, et que je viens de lire dans le dernier numéro de nos *Comptes rendus*. J'ai reçu de Hollande de nombreux renseignements qui suffiraient pour réfuter les conclusions de ce Rapport : je n'en fais pas usage ici, mais je demande qu'il me soit permis de protester contre l'impression que semble avoir produite la citation plusieurs fois répétée du nom de M le professeur Bergsma, dans le Rapport de M Vrolik. On a pu croire que M Bergsma avait coopéré au travail de la Commission de l'Institut de Hollande, et qu'il avait approuvé les conclusions défavorables du Rapport fait par cette Commission : on l'a dit positivement dans les journaux, et on a tiré de ce fait supposé les arguments les plus nuisibles à l'emploi de la gélatine dans les établissements publics où l'usage de cette substance alimentaire est adopté. Cependant je ne sache pas que M Bergsma soit membre de l'Institut hollandais et qu'il ait eu, en cette qualité, à coopérer au Rapport de M Vrolik, je vois qu'il n'est cité dans ce Rapport que comme ayant prêté un petit modèle d'appareil à la Commission hollandaise, et, ce qui est certain, c'est que toutes les Lettres, et particulièrement les plus récentes qui m'ont été adressées par M. Bergsma indiquent qu'il ne partage pas l'opinion de cette Commission, et qu'il blâme son travail, ainsi que les conclusions défavorables qu'elle en a tirées.

Je me suis hâté de prévenir M Bergsma de cet incident, et je ne doute pas qu'il ne proteste lui-même promptement et énergiquement contre le caractère de converti et d'opposant qu'on a voulu lui donner. Quant à moi, je me serais encore abstenu dans cette circonstance si je n'avais pas la triste expérience du mal que fut un article injuste et malveillant publié par les journaux, et si il ne m'avait paru indispensable de limiter le plus possible ce mal en n'attendant pas la réponse de M le professeur Bergsma pour rassurer les partisans de l'emploi alimentaire de la gélatine, au sujet du maintien de

l'établissement éminemment philanthropique qu'il dirige avec tant de talent et de succès

M FLOURENS présente, au nom des auteurs, MM BÉNIER et HARDY, le premier volume d'un ouvrage ayant pour titre *Traité élémentaire de Pathologie*. Ce premier volume contient les faits généraux de la pathologie, l'étude des causes, des symptômes, du diagnostic, du pronostic, envisagés d'une manière générale. Les auteurs examinent ensuite, appareil par appareil, la valeur diagnostique et pronostique des divers symptômes dont ces appareils peuvent être le siège.

L'ouvrage est renvoyé, conformément à l'intention des auteurs, à l'examen de la Commission des prix de Médecine et de Chirurgie.

M ANDRAL présente à l'Académie de la part de M le docteur ÉTIENNE DEMASY, médecin de l'asile des aliénés du département de la Sarthe un travail qu'il vient de publier sous le titre de *Recherches statistiques sur le suicide appliquées à l'hygiène publique et à la médecine légale*.

Ce travail dit M Andral est une étude du suicide faite pendant douze ans (de 1830 à 1841) dans l'arrondissement du Mans. Dans cet espace de temps, 87 suicides ont eu lieu dans cet arrondissement, le nombre des hommes qui se sont suicidés a été plus considérable que celui des femmes. 31. Pendant ces douze années, considérées collectivement, la moyenne a été de 1 suicide sur 1892 habitants. Dans les différents cantons de l'arrondissement, le suicide a été plus rare, là où le sol était plus fertile. Il a été plus fréquent dans les trimestres d'avril et de juillet que dans ceux de janvier et d'octobre. Son maximum de fréquence a eu lieu le lundi. Un beaucoup plus grand nombre d'individus se sont donné la mort le jour que la nuit. Les deux tiers des suicides ont eu lieu pendant la pleine lune. De seize à quatre vingt trois ans, il y a eu des suicides, mais en proportion différente. Ils ont été plus nombreux de trente à soixante ans; avant trente ans, ils devenaient plus communs à mesure qu'on s'approchait de cet âge, après soixante ans, ils allaient en diminuant de fréquence jusqu'à l'extrême vieillesse. Sur 77 individus chez lesquels on a pu apprécier la cause du suicide, 28 étaient aliénés, 26 avaient eu une vie déréglée ou criminelle, 13 avaient éprouvé divers chagrins, et 10 seulement avaient été en proie à des souffrances physiques.

M ARAGO demande que la Commission qui a été chargée de faire un Rapport sur les résultats scientifiques obtenus par la dernière expédition

envoyée dans le Nord de l'Europe, examine, le plus promptement possible, s'il serait utile que les observations de Bossekop fussent reprises et continuées, M. le Ministre de la Marine desirant connaître, sur ce point spécial, l'opinion de l'Académie

M. ALPH. DE CANDOLLE présente le VIII^e volume de l'ouvrage commence par son pere sous le titre de *Prodromus systematis naturalis Regni vegetabilis*. Il annonce que le IX^e volume est déjà sous presse

• Dans le volume qui vient de paraître, la famille considérable des Asclépiadées a été faite par M. DeCaisne, dont les travaux antérieurs sur ce groupe étaient bien connus des botanistes. Celle des Primulacées est de M. Duby, les Oleacées et Jasinées se trouvaient dans les manuscrits russes par Aug.-Pyr. de Candolle, enfin les Gentianacées, Myrsinacées, Ægicéracées, Theophrastacées, Sapotacées, Ebenacées, Styracacées et Apocynacées ont été faites par M. Alph. de Candolle lui-même. L'ensemble de toutes ces familles, en y comprenant le petit groupe des Leoniacées qui paraît devoir former aussi une famille, s'élève à trois mille cent quatre-vingt-seize espèces, dont six cent quatre-vingt-onze n'avaient pas été décrites. Sur trois cent cinquante genres, soixante-quinze sont nouveaux. L'accroissement de plus d'un cinquième n'a pas changé la proportion des genres aux espèces, qui est demeurée pour ces familles = 1/9. Il semble que cette proportion de neuf à dix espèces par genre est assez uniforme dans le règne végétal, et ne doit pas changer par suite des découvertes qui se font journellement. Si toutes les familles subissaient à la fois une élaboration semblable à celle qui a été faite pour ce volume du *Prodromus*, par le moyen des principaux herbiers de Paris et de Genève, on peut croire que le nombre total des espèces décrites s'élèverait subitement de quatre-vingt-dix mille à cent six ou cent dix mille environ, ce qui montre combien est grande la carrière ouverte aux botanistes.

• L'auteur donne un aperçu des familles dont il s'est occupé, principalement de celle des Apocynées. Il examine si les plantes de ce groupe ont des stipules, et comment les glandes quasi-stipulaires de leurs feuilles offrent des situations diverses. Il montre ces mêmes glandes subsistant dans le calice, même dans la corolle, et prenant l'aspect d'appendices très-constants pour chaque espèce. Il insiste sur l'estivation des lobes de la corolle, qui est contournée tantôt de droite à gauche, et tantôt de gauche à droite, avec un degré de fixité qui n'avait pas été remarqué suffisamment, et qui peut faire entrer ce caractère dans le nombre de ceux qui servent à distinguer les

genres. Il mentionne aussi les glandes du nectaire comme très-développées dans la moitié des genres de la famille, et pouvant se souder ou avorter de différentes manières. L'auteur examine la subdivision de la famille, et montre que celle adoptée par lui dans le *Prodromus* s'éloigne notablement des subdivisions proposées depuis quelques années, et se rapproche davantage de celle de A.-L. de Jussieu. Enfin il discute le degré d'affinité avec les familles voisines, spécialement avec celle des Loganiacées.

CHIRURGIE — *Note sur des extirpations de la rate et du corps thyroïde,*
par M. BARDELEBEN

J'ai publié, il y a deux ans, dans ma Thèse inaugurale, les résultats d'une suite d'expériences que j'avais faites dans le but de constater l'effet de l'extirpation de la rate et du corps thyroïde. Occupé depuis ce temps d'études pratiques, j'avais seulement répété l'opération sur des chiens et des chats, et ce n'est que l'été dernier, à Paris même, que j'ai pu réitérer presque toute la série de mes expériences. C'est à la bienveillance de M. Flourens que je dus de pouvoir poursuivre mes recherches, et c'est dans son laboratoire que j'ai travaillé.

* Voici les résultats de mes expériences.

1° Les animaux dont la rate a été extirpée se portent très-bien, et sans qu'il y ait une différence sensible entre eux et les animaux qui n'ont pas subi cette opération. C'est ce qui est prouvé déjà depuis longtemps par beaucoup d'expériences. On a pratiqué presque toujours l'opération sur des chiens. J'y ai soumis de plus, des chats, des lapins, des cochons d'Inde. Tous les lapins que j'ai opérés sont morts de péritonite, ce qui résulte de la situation profonde de la rate chez ces animaux. En partant de Paris, j'ai laissé dans le laboratoire de M. Flourens deux chats opérés à l'âge de deux semaines, et trois cochons d'Inde qui avaient supporté cette ablation sans que leur santé en fût aucunement altérée. Quant à la voracité que l'on a prétendu être la suite de l'extirpation de la rate, je ne l'ai jamais remarquée. Je n'ai jamais vu aucune trace de la régénération de la rate, que M. Meyer de Bonn prétend avoir observée.

2° Les animaux privés du corps thyroïde (chiens et lapins) ne diffèrent aucunement des autres, seulement l'un des lapins que j'ai opérés au Jardin du Roi présentait une augmentation considérable du désir vénérien, phénomène qui me semble d'autant plus digne d'attention, qu'un médecin français a avancé, il n'y a pas longtemps, que ce désir même s'efface tout à fait après l'extirpation du corps thyroïde.

3° L'animal privé de la rate et du corps thyroïde se porte néanmoins très-bien et il est impossible de trouver en lui aucun changement dans une fonction quelconque. Seulement, l'une et l'autre de ces opérations étant très-graves on réussira d'autant moins souvent à voir survivre le même animal à toutes les deux, que l'absence de l'un de ces organes semble déjà produire une disposition particulière aux épanchements aigus. Parmi les animaux que j'ai soumis à ces deux opérations, il n'y a qu'un seul chien qui les ait supportées.

Ce chien dont la rate fut extirpée le 10 juillet 1841, a subi l'extirpation du corps thyroïde (ou plutôt des corps thyroïdes) quatre semaines après cette première opération, et sauf une inflammation du tissu cellulaire du cou, à la suite de l'opération même il n'a présenté aucun symptôme morbide, jusqu'à ce jour même il se trouve tellement bien, qu'il est impossible de découvrir une différence entre lui et les autres chiens. Inutile de dire que c'est l'hypothèse de mon illustre maître, M. le professeur Tiedemann (suivant laquelle les glandes lymphatiques et le corps thyroïde se chargent de la fonction de la rate après l'ablation de cet organe) qui m'a amené à l'idée d'extirper le corps thyroïde des animaux déjà privés de la rate, pour faire remplir toutes les fonctions de cet organe par les glandes lymphatiques seules, qui par conséquent devraient grandir alors d'une manière plus prononcée.

4° Quoique j'aie déjà dit en général que je n'ai observé aucun changement dans les fonctions des animaux privés de l'un ou l'autre desdits organes, je dois cependant ajouter quelques mots sur le prétendu rapport de l'un et de l'autre avec les fonctions sexuelles. Quelques physiologistes ont avancé qu'après l'extirpation de la rate, le désir vénérien augmente, mais que ces animaux sont impuissants. Je n'ai pas observé, en général, que ce désir ait augmenté à la suite de l'opération et quant à l'impuissance, je pourrai présenter dans deux semaines les petits qu'une chienne va mettre bas, après n'avoir été couverte que par le chien qui a supporté les deux opérations. D'autres ont dit que le désir vénérien s'efface tout à fait dans les animaux privés du corps thyroïde. Mon chien prouve très-bien que ce n'est pas le cas, et si l'absence de cet organe avait une influence sur les fonctions sexuelles, ce serait plutôt l'opposé, comme nous l'avons vu chez le lapin dont j'ai parlé plus haut mais qui offre d'ailleurs le seul cas où j'aie observé un tel effet.

5° Quant au volume de la rate, je l'ai trouvé toujours plus grand chez les animaux qui avaient l'estomac bien rempli, que chez ceux qui l'avaient vide. Cette différence du volume n'est dépendante que de la quantité de sang qui se trouve dans la rate. »

ORGANOGENIE VÉGÉTALE — *Note sur l'organogénie de la fleur des Malvacees,*
par M P DUCHARTRE

J'ai entrepris une série d'observations sur l'organogénie de la fleur, et j'ai l'intention de soumettre successivement l'une après l'autre à ce genre de recherches les variations les plus importantes du type floral. Aujourd'hui, je crois devoir faire connaître à l'Académie les principaux résultats de mes travaux sur le développement de la fleur des Malvacées. Je me borne, pour le moment, à de simples résultats, parce que je ne me propose pas de rédiger encore mon travail définitif, et que, cependant, les faits qui me sont déjà acquis me semblent assez importants pour mériter d'être connus. Ces faits m'ont été fournis par l'étude microscopique de douze espèces différentes, pour la plupart desquelles j'ai suivi le bouton depuis sa première apparition jusqu'au moment où son tube staminal était développé, et où ses étamines enfermaient un pollen bien formé.

1° Le calice extérieur, ou le calicule, se montre le premier, et les bractées qui le constituent sont déjà bien indiquées que tout le reste de la fleur forme encore au-dessus de lui un simple globule déprimé et homogène.

2° Le calice propre ou intérieur paraît en second lieu, et, suivant la loi qui semble présider au développement des enveloppes florales à pièces soudées à leur base, il se montre d'abord à la base du globule floral sous la forme d'un petit bourrelet continu, dont le bord se relève bientôt en cinq petits festons indiquant chacun l'un des cinq sépales organiques.

3° Le globule central supérieur au calice s'élève en hauteur surtout vers sa circonférence, et bientôt il a pris la forme d'un cylindre court. Peu après, les bords de sa face supérieure se relèvent en cinq mamelons larges et peu saillants, alternes avec les sépales. Mais cet état est de très-courte durée chez la plupart des espèces, et presque aussitôt que ces cinq légers festons se sont montrés, on les voit se diviser chacun en deux mamelons qui ne tardent pas à se prononcer d'une manière très-sensible.

La fleur a donc déjà, dans cet état extrêmement jeune, cinq paires de mamelons alternes aux cinq sépales, ou, pour parler d'une manière plus conforme aux apparences, aux cinq divisions calicinales. Ces dix mamelons constituent autant d'étamines naissantes.

4° Pendant que se forment les cinq premières paires de mamelons staminaux, au-dessous de chacune de ces paires, sur le côté extérieur de la masse commune intérieure au calice, l'on voit se dessiner cinq petits replis distincts et même fort éloignés l'un de l'autre. Ces petits replis ne sont autre chose

que les pétales naissants Chacun deux est, comme je viens de l'indiquer, opposé à une paire d'étamines, et, par suite, alterne à une des cinq divisions calicinales D'abord remarquables par la largeur de leur base, ces jeunes pétales restent longtemps éloignés l'un de l'autre, ce n'est que fort tard que leur accroissement en largeur les rapproche, et qu'enfin il rejoint leurs bords l'un sur l'autre, de manière à dessiner leur estivation

» Ce fait nous montre que la corolle des Malvacées est formée de cinq pétales distincts et séparés, soit à leur première apparition, soit pendant une assez longue partie de leur existence

5° Ce que je viens de dire fait voir que l'apparition des dix premiers mamelons staminaux est un peu antérieure à celle des pétales, cependant la différence est assez faible pour que l'on puisse avancer sans erreur que ces deux verticilles sont, à très-peu de chose près, contemporains

6° Généralement, le développement de la corolle des Malvacées est très lent comparativement à celui de leurs étamines La masse staminale forme déjà un globule fermé et, chez les grandes espèces, long de quelques millimètres, que les pétales atteignent à peine le tiers ou la moitié de cette longueur C'est là le fait général, celui que l'on observe dans les fleurs à nombreuses étamines, mais chez celles à étamines assez peu nombreuses, les choses se passent autrement Dans ce dernier cas, j'ai vu constamment la corolle se développer beaucoup plus vite et dépasser même de bonne heure, en la recouvrant, la masse des organes sexuels Cette sorte de balancement entre le développement de l'un et de l'autre de ces deux verticilles floraux me paraît amener des conséquences importantes

7° Des l'instant où la fleur a son calice, sa corolle et son premier verticille d'étamines, tout l'intérêt se concentre sur ces derniers organes et sur leur développement Peu après que les dix premiers mamelons se sont dessinés l'on voit un deuxième verticille de dix nouveaux organes se former plus intérieurement, ces cinq nouvelles paires de jeunes étamines sont opposées aux premières Un troisième verticille se montre ensuite plus intérieurement que les deux premiers et en opposition avec eux, puis un quatrième, etc En même temps que de nouveaux mamelons se forment vers l'intérieur, la base commune de toutes ces jeunes étamines, ou le tube staminal, s'allonge, de telle sorte que les premières formées et les plus extérieures occupent le niveau le plus bas, de plus, chacun des cinq groupes formés par les paires opposées d'étamines se portant vers l'extérieur, il en résulte, pour l'ensemble de la masse staminale, la forme d'une sorte d'étoile

a cinq rayons dont chacun est terminé par un pétale et alterne avec une des divisions calicinales

8° Pendant que se fait ainsi la multiplication des étamines par production de paies de plus en plus intérieures, les mamelons staminaux extérieurs gagnent en largeur, bientôt une échancrure se montre dans leur milieu, et enfin chacun d'eux se choise en deux mamelons distincts et placés à côté l'un de l'autre. Ce phénomène remarquable gagne peu à peu tous les mamelons de l'extérieur à l'intérieur, et l'on finit par voir sur chacun des cinq rayons de la masse staminale, quatre séries de jeunes anthères ainsi dédoublées, s'étendant directement de la circonférence vers le centre, au lieu des deux files rayonnantes des mamelons que l'on y remarquait auparavant.

Ainsi, la multiplication des étamines chez les Malvacées a lieu 1° par production de verticilles concentriques et de plus en plus intérieurs 2° par choise ou dédoublement des jeunes anthères.

9° Il paraît même que, chez certaines espèces remarquables par le grand nombre de leurs étamines, il s'opère encore un autre mode de multiplication numérique par division des anthères déjà éniiformes, c'est du moins ce que j'ai bien vu l'été dernier chez le *Javatera trimestris*.

10° Le tube staminal est, en général, lisse à sa face interne, mais son orifice supérieur présente fréquemment des dentelures ordinaires et indépendantes des étamines. Ces dentelures sont le plus souvent au nombre de cinq, elles sont très-saillantes chez les boutons encore jeunes du *Pavonia cuneifolia*, elles se montrent même très-nettement chez certaines fleurs adultes, comme le montrent les Pl. XLII, XLVI, XLIX et I de la Flore du Brésil merid, chez les *Pavonia glechomoides* et *Rosa campestris*, les *Eugenia phlomidifolia* et *sulfurea*, on les retrouve aussi chez les *Hibiscus lunariifolius* et *hirtus* (WIGHT, Icon. Ind. orient., tab. 6, 41). Elles atteignent avec les cinq grands faisceaux ou rayons de la masse staminale, et par suite aussi, avec les pétales.

Si l'on admet, avec plusieurs botanistes célèbres, notamment avec MM. A. de Jussieu et Dunal, que l'androcée comprend 1° un verticille d'étamines opposées aux pétales, 2° un verticille de ces organes alternes à ces mêmes pétales, il sera facile de reconnaître ces deux verticilles dans le tube staminal des Malvacées, et, par suite, de déterminer la symétrie de leur fleur sur laquelle on n'a peut-être pas d'idée bien arrêtée.

Je me bornerai pour le moment à ces simples énoncés.

STATISTIQUE — *Sur les rapports des crimes dans les diverses classes de la société et à différents âges, Remarques adressées par M. FAYET à l'occasion d'un passage du Rapport sur le dernier concours pour le prix de Statistique*

Je viens de lire, dans le Rapport sur le concours de 1842 pour le prix de Statistique (*Comptes rendus*, t. XVIII, p. 317), une phrase relativement à laquelle je prends la liberté de présenter quelques éclaircissements, à cause de l'interprétation que le public pourrait lui donner, la voici :

Dans la comparaison que l'auteur (M. Fayet, professeur à Colmar) a faite, il s'est fondé sur des éléments évidemment incomplets et imparfaits, conduisant à cette conséquence qu'il y a, toute proportion gardée, avec les classes correspondantes de la société, *trois fois et demie plus de coupables lettrés que de coupables ne sachant ni lire ni écrire*, résultat qui ne nous semble nullement démontré, et qu'aucun document positif ne justifie (Rapport sur le n° 6 envoyé au concours, sous le titre d'*Essai sur la Statistique intellectuelle et morale de la France*)

Cette conséquence se trouve en effet indiquée dans les préliminaires de mon travail, p. 30, première partie mais, et c'est là l'objet spécial de ma réclamation, cette conséquence résulte non de mes propres recherches et des volumineux documents que j'ai compulsés mais des documents insérés dans le Rapport fut par M. Gillon, à la Chambre des Députés, sur le budget de l'Instruction publique, pour 1839, et c'est précisément parce que cette conséquence ne m'a pas *semblé mieux démontrée* qu'à messieurs les membres de la Commission, et que les documents qui lui servaient de base m'ont paru incomplets et imparfaits, que j'ai entrepris mes recherches. Ces recherches m'ont conduit à une conséquence beaucoup moins tranchée, du moins pour l'ensemble des crimes et pour ce qui concerne l'Instruction primaire, voici cette conséquence telle que je l'ai formulée à la p. 41 de la troisième partie, avec les chiffres proportionnels de la criminalité spécifique des trois classes intellectuelles de la société : de la classe *lettrée*, ou qui a reçu une instruction supérieure dans les collèges, les petits séminaires, les institutions ou les pensions, de la classe *instruite*, ou qui a reçu une instruction primaire quelconque, et de la classe *ignorante*, ou qui n'a reçu aucune instruction dans les écoles.

La classe lettrée a, pendant la période de dix ans, de 1828 à 1837, commis proportionnellement plus de crimes que la classe *instruite*, et la classe *instruite* plus que la classe *ignorante*.

Cette conclusion générale présente deux exceptions bien dignes d'être remarquées, et surtout d'être attentivement étudiées, de leur étude, en effet, peuvent ressortir de précieuses indications sur les causes

« La première de ces exceptions se rapporte aux accusés de moins de vingt et un ans, soit du sexe masculin, soit du sexe féminin, soit des deux sexes réunis, et la seconde aux accusés du sexe féminin, quel que soit leur âge »

Telle est la conclusion que j'ai induite de la statistique comparée de 1828 à 1837, les nouveaux documents officiels publiés de 1838 à 1841, et que j'ai analysés, m'ont conduit à la même conclusion et aux mêmes exceptions ce nouveau travail forme un supplément à mon premier travail et a aussi été remis à l'Académie

Mais dans le travail primitif, comme dans le supplément, qui sous ce rapport diffèrent peu, la criminalité des classes lettrées et instruites est loin d'être *trois fois et demie plus forte que celle de la classe ignorante*, ainsi qu'on pourrait le supposer d'après la phrase citée du Rapport de la Commission, les criminalités spécifiques des trois classes lettrée, instruite et ignorante, sont comme les nombres

158, 101 et 97 pour les crimes contre les personnes de 1828 à 1837
 193, 95 et 100 pour les crimes contre les propriétés de 1828 à 1837,
 169, 106 et 93 pour tous les crimes moins les vols et les faux, de 1828 à 1837
 116, 97 et 101 pour tous les crimes, de 1828 à 1837

Ainsi, en éliminant les vols plus particulièrement commis par les pauvres et les ignorants, et les faux spécialement commis par les classes lettrées et instruites, la criminalité de la classe lettrée surpasse la criminalité de la classe instruite d'environ un tiers, et la criminalité de la classe instruite surpasse celle de la classe ignorante d'environ un septième, ce qui est loin d'être *trois fois et demie*. Il est vrai que quand on adopte les chiffres des lettrés, des ignorants et des instruits donnés par M. de Morogues, on arrive à des résultats plus défavorables et que j'ai aussi donnés, mais qui ne doivent pas m'être imputés, puisque j'en ai indiqué la cause

« Au contraire, quand on considère les accusés de moins de vingt et un ans, ou les accusés du sexe féminin séparément, la criminalité spécifique des trois classes lettrée, instruite et ignorante est à peu près en raison inverse du degré d'instruction reçue, elle est comme les nombres

45	59 et 179 pour le sexe masculin,	} quand on considère les accusés âgés de moins de vingt et un ans
50	47 et 145 pour le sexe féminin	
44	56 et 171 pour les deux sexes réunis,	
75	73 et 112 pour les accusés du sexe féminin de tout âge	

Tels sont les résultats des comparaisons que j'ai faites, résultats qui sont pleinement confirmés par la statistique des quatre années de 1838 à 1841 et qui maintenant sont fondés sur un total de 105 740 accusés, dont l'état intellectuel a été constaté dans la période de quatorze ans, de 1828 à 1841. »

Remarques faites à l'occasion de cette Lettre par M. FRANÇOEUR, en qualité de rapporteur de la Commission du prix de Statistique

L'opinion de la Commission est que les documents employés par M. Fayet sont trop incomplets pour qu'on puisse en tirer aucune conclusion. Non-seulement il ne fait aucune distinction entre les délits des gens de la campagne et de ceux des villes, ce qui, dans le cas actuel, est d'une immense importance, mais, en outre, il est certain que le plus grand nombre des délits commis dans les champs, les bois et même les villages, ne sont pas connus des magistrats, soit parce que les maires, les curés et les gens de bien s'empressent par amour de la paix, d'arrêter les plaintes et de réconcilier les individus, soit parce que, lorsqu'il n'y a pas de partie civile, les procureurs du Roi pensent utile de ne pas exercer de poursuites judiciaires. Ainsi les chiffres cités par M. Fayet et accusés par les publications légales n'ont aucune précision, et ne peuvent servir de base statistique.

PHYSIQUE. — *Sur un nouvel appareil galvanométrique*, Note de M. DUJARDIN

Les physiciens ne possèdent pas encore un galvanomètre satisfaisant pour mesurer les courants électriques d'une grande intensité, tels que les courants des différents couples voltaïques. Voici, en quelques mots, la description sommaire d'un nouveau galvanomètre très-simple et surtout très-commode, que j'appelle *boussole galvanométrique*, et qui comblera la lacune que je viens de signaler.

La *boussole galvanométrique* consiste en une boussole ordinaire dont la boîte est en bois, et dans le fond de laquelle passe, dans une rainure rectiligne, pratiquée suivant le diamètre qui correspond aux zéros du cadran, un gros fil de cuivre nu, qui est suffisamment isolé par le bois qui l'entoure.

La sensibilité de cet instrument est très grande, surtout si l'on fait usage d'une aiguille de boussole très-mobile

Je construis mes aiguilles de *boussole galvanométrique* de la manière suivante je prends une aiguille à tricoter ou plutôt un morceau de ressort de pendule de largeur convenable et le plus mince possible, je détrempe sa partie moyenne en l'appliquant sur un fer rouge je donne à cette partie moyenne ainsi detrempée la forme d'une petite voûte ou arcade qui remplace la chape des aiguilles ordinaires je découpe l'aiguille en forme de losange je fiappe au sommet de la petite voûte ou arcade un coup de pointeau qui y creuse une petite cavité destinée à recevoir la pointe du pivot de suspension enfin j'amante l'aiguille et je l'équilibre de la manière ordinaire

Les aiguilles de boussole ainsi construites surpassent en sensibilité la plupart des aiguilles de boussole du commerce à chape de laiton

M. le professeur Delezenne de Lille qui s'occupe beaucoup de recherches sur l'électricité n'emploie plus, depuis longtemps, pour mesurer les courants électriques d'une grande intensité que la *boussole galvanométrique*

MM Joly et Lavocat adressent une addition à leur Note sur l'anatomie de la girafe Un examen nouveau de la tête osseuse de l'animal leur a fait reconnaître que les cornes latérales ne sont point un simple prolongement des frontaux mais constituent comme l'avait annoncé Cuvier des os distincts qui peuvent être séparés du reste du crâne La base de ces os est concave et tapissée par le périoste crânien qui semble se doubler pour en tapisser la face externe

M. Amussat dont les recherches sur les *blessures des vaisseaux sanguins* ont été mentionnées honorablement dans le dernier Rapport sur le concours pour le prix de Médecine et de Chirurgie, demande à reprendre ce travail, qu'il se propose de compléter

Cette demande donne lieu à une discussion dont le résultat est que l'autorisation en pareil cas ne peut être accordée qu'après avoir été soumise à l'approbation de la Commission qui a fait le Rapport

M. Aubert Roche prie l'Académie de hâter le travail de la Commission qui a été chargée de faire un Rapport sur diverses communications relatives à la question de la peste et des quarantaines

M. Serres membre de la Commission, fait connaître les causes qui ont retardé jusqu'ici le Rapport, causes dont quelques-unes ont été déjà écartées

MM. CHAILLY et GODIER écrivent que le principe sur lequel se fonde leur mode de traitement pour les *déviation de la taille* diffère notablement de celui qui sert de base à la méthode de M. Hossard, l'appareil qu'ils emploient diffère aussi, à plusieurs égards, de l'appareil imaginé par ce médecin.

M. DURAND adresse, de Bordeaux, une Note ayant pour titre : *Mécanisme terrestre*.

La séance est levée à 5 heures un quart.

F.

ERRATA.

(Séance du 11 mars 1844)

Page 392, ligne 4, au lieu de $+\Sigma \frac{u_x^2}{u_x - u_y}$, lisez $+\Sigma \frac{u_x^2 - u_y^2}{2g}$

BULLETIN BIBLIOGRAPHIQUE

L'Académie a reçu, dans cette séance, les ouvrages dont voici les titres :

Comptes rendus hebdomadaires des séances de l'Académie royale des Sciences, 1^{er} semestre 1844, n° 11; in-4°

Exercices d'Analyse et de Physique mathématique; par M. le baron A. CAUCHY, tome III, 1842; 25^e livr.; in-4°.

Considérations sur les Ordres religieux, adressées aux amis des sciences, par le même; in-8°.

Voyages de la Commission scientifique du Nord en Scandinavie, en Lapone, au Spitzberg et aux Feroe, sous la direction de M. GAIMARD, 16^e et 17^e livr.; in-fol.

Éléments de Pathologie médicale, par M. REQUIN; tome I^{er}; in-8°.

Traité élémentaire de Pathologie interne; par MM. HARDY et BÉRIER; t. I^{er}, in-8°.

Compendium de Médecine pratique; par MM. E. MONNET et L. FLEURY, tome V, 20^e livr., in-8°.

Recherches statistiques sur le Suicide, appliquées à l'Hygiène publique et à la Médecine légale; par M. E. DEMAZY; 1 vol. in-8°.

Abolition des Quarantaines de l'Autriche et de l'Angleterre — De la réforme des Quarantaines et des Lois sanitaires de la peste, par M AUBERT-ROCHE, brochure in-8°

Types de chaque famille et des principaux genres des Plantes croissant spontanément en France, par M PILE 5° livr in-4°

Annales de la Société d'Agriculture, Arts et Commerce du département de la Charente, tome XV, n° 1 à 5, in-8°

Histoire et Mémoires de l'Académie royale des Sciences, Inscriptions et Belles Lettres de Toulouse années 1839 1840 et 1841, in 8°

Actes de l'Académie royale des Sciences, Belles-Lettres et Arts de Bordeaux 4° année 3° trimestre, et 5° année, 1^{er} trimestre, in-8°

Actes de la Société linéenne du Bordelais, tome XII, 5° livr , in-8°

Mémoires et analyses des Travaux de la Société d'Agriculture, Commerce, Sciences et Arts de la ville du Mende département de la Lozère, 1841 et 1842 1 vol in-8°

Mémoires de la Société royale d'Agriculture, Sciences et Arts du département de Seine et Oise, publiés dans ses 41^e, 42^e et 43^e années, 3 broch in-8°

Bulletin trimestriel de la Société des Sciences, Belles-Lettres et Arts du département du Var, séant à Toulon, 10^e et 11^e années, 2 broch in-8°

Mémoires de la Société d'Agriculture, Sciences, Arts et Belles-Lettres du département de l'Aube, 1842, in 8°

Société d'Emulation du département du Jura, années 1841 et 1842, in-8°.

Recueil des Travaux de la Société médicale du département d'Indre-et-Loire, 1^{er} et 2^e trimestre 1843, in 8°

Société agricole, scientifique et littéraire des Pyrénées-Orientales, 1^{re} partie du 6^e vol , in-8°

Bulletin de la Société industrielle de l'arrondissement de Saint Etienne t XIX, 4^e a 6^e livr , in 8°

Société libre d'Emulation de Rouen — Rapport de la Commission des tissus, par M BRESSON, 1844, in 8°

Analyse chimique et comparée des Vins du département de la Gironde par M FAURÉ, pharmacien Bordeaux, 1844, in-8°

Bilan en perspective des Chemins de fer en France — Envahissement du travail national par le mécanisme, par M DAGNEAU-SYMONSLIN Dunkerque, in 8°

Annales médico-psychologiques, Journal de l'anatomie, de la physiologie et de la pathologie du Système nerveux, mai 1844, in-8°

Journal des Usines et des Brevets d'invention, février 1844, in-8°

Journal de la Société de Médecine pratique de Montpellier; mars 1844; in-8°.

Notice explicative de la Carte géognostique du Plateau tertiaire parisien; par M. RAULIN; broch. in-8°.

Journal des Connaissances médico-chirurgicales, mars 1844; in-8°.

Revue zoologique; 1844, n° 2; in-8°.

• *Journal des Découvertes en Médecine, Chirurgie, Pharmacie, etc.*; tome I^{er}; supplément à la 12^e livr.; in-4°.

L'Abeille médicale; mars 1844; in-8°.

Prodromus systematis naturalis Regni vegetabilis, sive Enumeratio contracta ordinum, generum, specierumque Plantarum huc usque cognitarum, etc.; auctore ALPHONSE DE CANDOLLE; pars octava, 1844, in-8°, chez FORTIN, MASSON et C^{ie}, libraires, place de l'École-de-Médecine, à Paris.

Report... *Rapport fait par le secrétaire d'État au département de la Marine au sénat des États-Unis sur deux inventions de M. T. EASTON, pour prévenir l'explosion des Machines à vapeur.*

Astronomische... Nouvelles astronomiques de M. SCHUMACKER; n° 498; in-4°.

Sulla rabbia... Recherches sur la Rage communiquée, par M. le docteur VENTURICCI. Florence, 1843; in-8°. (Renvoyé à M. MAGENDIE pour un rapport verbal.)

Gazette médicale de Paris; n° 11.

Gazette des Hôpitaux; n° 30 à 32.

L'Echo du Monde savant; n° 20 et 21.

L'Expérience; n° 346 à 350.

COMPTE RENDU

DES SÉANCES

DE L'ACADÉMIE DES SCIENCES.

SEANCE DU LUNDI 25^e MARS 1844

PRÉSIDENCE DE M CHARLES DUPIN

MEMOIRES ET COMMUNICATIONS

DES MEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE L'ACADÉMIE

M GAY-LUSSAC, qui assiste pour la première fois à la séance depuis l'accident qu'il a éprouvé, remercie l'Académie des marques d'intérêt qu'elle lui a données à cette occasion

M le PRÉSIDENT exprime à M Gay-Lussac la satisfaction que son prompt rétablissement cause à tous ses confrères

BOTANIQUE — *Monographie des Orchidées mexicaines, précédée de considérations générales sur la végétation du Mexique et sur les diverses stations où croissent les espèces d'Orchidées mexicaines, par MM A. RICHARD et H GALZOTTI, voyageur naturaliste, membre de l'Institut de Mexico, etc.*

« Parmi les diverses familles du règne végétal dont les nombreux individus font l'ornement des régions tropicales, il n'en est pas dont les formes soient plus variées et plus bizarres, la structure plus singulière, les couleurs plus vives que celle des Orchidées. Cette famille a des représentants dans tous les

climats, sous toutes les latitudes et presque à toutes les hauteurs où la végétation des plantes phanérogames peut se maintenir. Ainsi, au Mexique par exemple, nous observons des plantes de cette famille jusque sur le pic de l'Orizaba, à une hauteur de plus de 3500 mètres au-dessus du niveau de la mer, aussi bien que sur les pentes qui, comme autant de gradins successifs, descendent insensiblement jusqu'aux rivages de l'Océan; mais, comme nous allons le voir bientôt, les espèces d'Orchidées varient, à ces hauteurs différentes, comme elles se modifient suivant les diverses latitudes ou on les observe.

* Le Mexique est sans contredit la partie du monde la plus riche en Orchidées. Ce pays a été, dans ces derniers temps, visité par un grand nombre de voyageurs naturalistes, qui nous ont fait connaître les végétaux qui y croissent, surtout les Cactées et les Orchidées. Nul pays au monde n'en fournit dont les fleurs soient plus grandes, plus singulières dans leur forme et plus brillantes dans leurs couleurs; aussi sont-elles, pour la plupart, extrêmement recherchées dans les jardins botaniques et les collections des amateurs.

* Le travail que nous présentons aujourd'hui est une monographie à peu près complète des Orchidées mexicaines qui ont été apportées en Europe. Nous avons été extrêmement favorisés par les beaux matériaux que nous avons eus à notre disposition pour la rédaction de ce Mémoire. Nous citerons en première ligne les riches collections de M. H. Galeotti, notre collaborateur, qui, pendant un séjour de cinq années dans les diverses provinces du Mexique, a recueilli la plus grande quantité d'Orchidées qu'un voyageur ait jamais rapportée d'aucune autre partie du monde. Ce sont surtout ces plantes de M. Galeotti qui servent de base à notre travail. Nous avons puisé de grandes ressources dans les notes qui accompagnaient chacune de ces espèces et surtout dans des dessins en couleur exécutés au Mexique, par M. Galeotti, sur les plantes vivantes, à mesure qu'il les récoltait.

* M. Linden, jeune voyageur belge qui a également parcouru cette partie de l'Amérique, nous a fourni un nombre assez considérable d'espèces intéressantes accompagnées aussi, pour la plupart, de beaux dessins en couleur exécutés sur les lieux. Enfin nous avons trouvé, dans les diverses collections de Paris, entre autres dans les herbiers du Muséum d'Histoire naturelle et dans ceux de M. Benjamin Delessert, un grand nombre de belles espèces recueillies par MM. Ghiesbreght, Hartweg, Andrieux, etc.

* Les plantes de la famille des Orchidées sont aujourd'hui très-abondamment cultivées dans les serres des grands établissements publics et des amateurs. Le jardin botanique de la Faculté de Médecine en possède une collec-

tion très-riche. J'ai donc été à même d'en observer un grand nombre d'espères vivantes, circonstance extrêmement avantageuse, car tous les botanistes savent combien les plantes monocotylédonnées, et plus particulièrement les Orchidées, par la délicatesse de leur tissu, qui s'altère si facilement par la dessiccation, offrent d'obstacles à l'analyse botanique lorsqu'elles ont été desséchées. Cependant, avec de l'habitude, quand on connaît bien l'organisation de ces plantes, on peut aussi déterminer avec précision leur structure sur les individus desséchés.

• Les Orchidées ont été, dans ces derniers temps, l'objet de travaux très-importants. Peu de familles ont subi un accroissement plus rapide. Ainsi, pour ne parler ici que des genres, Linné, dans ses *Genera Plantarum* (1743), en comptait 9; Antoine-Laurent de Jussieu, en 1789, en a caractérisé 13, tandis que dans le *Genera*, publié de 1836 à 1840, M. Endlicher n'en a pas énuméré moins de 342. Un pareil accroissement des genres en annonce nécessairement un semblable dans le nombre des espèces, qui, approximativement, ne peut guère être évalué à moins de 3000, tandis que Linné en comptait à peine une centaine.

• Cette augmentation extraordinaire est plus particulièrement due aux beaux travaux que M. Lindley a publiés sur ce groupe de végétaux, soit dans le *Botanical Register*, soit et surtout dans ses *Genera and species of Orchideous plants*.

• Les travaux de cet ingénieux et habile observateur devront toujours servir de guide à tous ceux qui s'occuperont de cette famille. Aussi, pour rendre nos déterminations spécifiques plus certaines, avons-nous comparé toutes les espèces que nous avons décrites avec l'herbier même de M. Lindley. Cette comparaison a donné toute la certitude désirable à nos espèces, et a évité les doubles emplois que nous aurions inévitablement faits dans une foule de cas.

• Tout en partageant les idées de ce savant sur les modifications organiques qui doivent servir de base aux caractères distinctifs des genres, nous n'avons pas cru devoir adopter tous ceux qui ont été proposés par le savant botaniste de Londres. Quelques-uns des genres nous ont paru reposer sur des modifications trop légères et de trop peu d'importance; d'autres, par l'accroissement du nombre des espèces qui les composent, se sont insensiblement confondus avec les genres dont ils étaient le plus rapprochés. Il est résulté de là que nous avons plutôt diminué qu'augmenté le nombre des genres de cette famille. Le petit nombre de ceux que nous avons proposé d'établir ont pour base des matériaux tout à fait nouveaux, et non des démembrés de genres anciens; et encore sont-ils peu nombreux.

La source la meilleure des caractères des genres dans la famille des Orchidées, c'est, sans contredit, le pollen. Quand on étudie cette famille avec soin, on est frappé des variations extrêmes de cet organe, soit dans la texture, soit dans le nombre, soit dans la disposition et l'agencement des masses polliniques qui le constituent. Dans toutes les espèces d'un genre, quand il a été bien établi, le pollen offre constamment les mêmes caractères; mais des modifications analogues peuvent se présenter dans plusieurs genres voisins dans lesquels les parties constituantes de la fleur offrent des différences assez grandes pour autoriser leur séparation.

Quand nous disons que le pollen offre les mêmes caractères dans toutes les espèces d'un genre, nous n'entendons pas dire que cet organe soit identique sous tous les rapports; seulement les caractères fondamentaux, comme la texture, solide, pulvérulente ou textule, le nombre et l'arrangement des masses polliniques, sont les mêmes, mais la forme de la lamelle ou caudicule sur laquelle ces masses polliniques sont parfois attachées, la forme, la grandeur de la glande ou rétinacle qui termine la caudicule, pourront offrir des variations sans que le genre en soit moins naturel. Ainsi, par exemple, il est peu de genres où les espèces aient plus de rapport, de ressemblance entre elles que dans le genre *Oncidium*; cependant nous trouvons dans ce genre les masses polliniques tantôt appliquées sur une lamelle plane, étroite et comme linéaire, terminée par une glande peltée et généralement petite; tantôt, au contraire, cette lamelle est très-courte, mais très-large et arquée, sans apparence de glande terminale. Entre les espèces qui offrent l'une ou l'autre de ces deux modifications, il n'existe aucune différence sensible qui puisse l'indiquer à l'avance; et, au contraire, on remarque entre elles une analogie, qui les rapproche les unes des autres, malgré cette dissemblance. Nous pourrions faire la même remarque pour le genre *Maxillaria*, où nous observons deux modifications analogues dans la lamelle qui supporte les masses polliniques.

Nous avons cru devoir donner à la rédaction des phrases spécifiques un développement qu'elles n'ont pas présenté jusqu'ici, mais dont l'expérience nous a démontré l'indispensable nécessité. Ayant dû déterminer près de 500 espèces, et reconnaître si elles étaient déjà connues et décrites, ou si elles étaient nouvelles, nous avons souvent éprouvé une difficulté presque invincible pour arriver à cette détermination. Un grand nombre d'espèces dont nous saisissions au premier coup d'œil la différence, semblaient toutes s'adapter à la phrase d'une espèce déjà connue, phrase qui n'indiquait que des caractères empruntés à un trop petit nombre d'organes. Pour remédier à cet inconvénient, les phrases spécifiques que nous avons rédigées sont, en

quelque sorte, des descriptions abrégées, mais toujours comparatives, dans lesquelles nous mettons en relief les caractères les plus saillants que chaque organe présente dans les diverses espèces auxquelles ces phrases s'appliquent.

» Nous emprunterons à des notes manuscrites qui nous ont été communiquées par M. Galeotti, des considérations générales sur les caractères de la végétation, et particulièrement des Orchidées, dans les diverses parties du Mexique.

» Le Mexique est, comme on sait, un pays très-montueux, c'est en quelque sorte un vaste plateau dont les versants se dirigent, d'un côté, vers l'océan Pacifique, et, de l'autre, vers l'océan Atlantique. Quelques-unes des montagnes qui entrecoupent ces plaines élevées ont sur certains points une hauteur qui permet à la neige d'y séjourner pendant une grande partie de l'année. Quel vaste champ d'observations et de découvertes se déroule aux yeux de celui qui va étudier la nature dans ces régions tropicales, depuis les plages baignées par l'Océan, jusqu'aux sommités couvertes de neiges éternelles! Dans cette énorme échelle verticale de près de 4 000 mètres de hauteur absolue, chaque échelon de 4 à 500 mètres conduit l'observateur à des régions différentes, où la végétation se montre sous de nouvelles formes. Si l'on abaisse cette échelle de 2 ou 3 000 mètres de hauteur sur la surface continentale, ses échelons devront en quelque sorte se dilater chacun de plusieurs degrés de latitude pour arriver à des lignes correspondantes de végétation ou *isophytes*. Ainsi, la végétation des sommets élevés dans les régions tropicales revêtant les mêmes caractères que celle des contrées les plus éloignées de l'équateur, les stations les plus élevées de la vie végétale dans l'échelle verticale inter-tropicale trouveront leur ligne isophyte dans les régions polaires du globe.

» La coïncidence entre ces lignes isophytes et les lignes isothermes ne peut être constante. En effet, les influences locales, la nature géologique du terrain, la position et l'exposition topographiques, et une foule d'autres circonstances, modifient à l'infini les productions de la nature et changent beaucoup le facies de pays isothermes. Cependant il existe généralement un rapport intime entre les lignes isophytes et les lignes isothermes.

» Au Mexique comme dans les autres contrées intertropicales, on trouve des Orchidées partout où il règne une atmosphère suffisamment humide, où soufflent des vents faibles et variables, et surtout dans les localités où la présence des forêts entretient cette humidité abondante, agent indispensable de la végétation des plantes parasites. Quelques espèces auront besoin d'une température moyenne de 25 à 26 degrés centigrades, d'autres de 18 degrés,

quelques-unes s'accommoderont de 5 à 8 degrés centigrades. Ces différences dans leurs besoins de calorique caractérisent des zones ou stations orchidéennes qui se rattachent aux grandes zones ou régions naturelles et climatiques intertropicales. Jetons un coup d'œil rapide sur ces régions bien caractérisées; nous commencerons par les régions où la température moyenne est de 20 à 25 degrés centigrades, et de là nous nous élèverons successivement jusqu'aux contrées où la neige résiste pendant une grande partie de l'année.

1°. RÉGIONS CHAUDES,

» A. *Sous-région chaude de la côte.* — La végétation qui couvre les pentes de la cordillère depuis les plages de l'Océan jusqu'à une hauteur approximative de 1 000 mètres, présente un caractère assez uniforme. On n'y trouve guère que des mimosa épineux peu élevés, de hautes graminées, des bignonia arborescentes; cette région est triste et desséchée depuis la fin d'octobre jusqu'en juin. Quelques masses de verdure, espèces d'oasis, égayent çà et là ces solitudes brûlantes des côtes. Mais, par bonheur pour le naturaliste, cette surface stérile est découpée par de nombreux ravins dont la végétation vigoureuse et variée se distingue entièrement de celle de la plaine au milieu de laquelle serpente le ravin; ce sont deux sous-régions distinctes, l'une stérile, l'autre d'une grande fertilité, appartenant aux régions chaudes ou *tierra caliente* des indigènes.

» B. *Sous-région chaude des ravins.* — Dans les ravins on trouve des *Cecropia*, des bananiers à petits fruits, la canne à sucre, le riz, le *Castilleja elastica*, des *Zamia*, des *Begonia* variés, et parmi les Orchidées, le *Schomburgkia tibicinis*, les *Oncidium* à feuilles cylindriques et charnues. Aux environs même de la Vera-Cruz, dans les petits ravins creusés dans les dunes, le *Mormodes pardina* et le *Chrysus aurea* se cachent dans les endroits les plus sombres et les plus humides, tandis que les *Cyrtopodium* fixent leurs longs pseudobulbes sur les rochers basaltiques et semblent rechercher l'ardeur du soleil. A mesure que l'on se rapproche de la cordillère, ces ravins deviennent de plus en plus intéressants et riches en plantes curieuses. Les rochers, tantôt basaltiques (État de Vera-Cruz), tantôt calcaires (État de Tlaxcala), tantôt schisteux ou gneissiques (État d'Oaxaca), sont garnis de Palmiers nains (1), de belles Fougères (2), de *Ficus*, de *Cecropia*, de jolies Gesneria-

(1) *Chamodorea*.

(2) *Lycopodium circinale*, L.; *Aspidium terra*, Sw.; *A. hercynicum*, Willd.; *Adiantum villosum*, L.; *Polypodium corallifolium*, Martens et Galeotti; *Lygodium polymorphum*, Kunth.

cées (1), de hautes Graminées (2), d'une variété infinie de *Begonia* et d'*Echites* qui croissent par touffes serrées au bord des eaux, entremêlées d'*Orchidées* terrestres, telles que les *Habenaria spathacea*, Nob.; *H. diffusa*, Nob.; *H. lactiflora*, Nob.; *Ponthieva oblongifolia*, Nob.; *Spiranthes saccata*, Nob.

« Au milieu de ces arbustes élégants s'élèvent des arbres d'une haute stature appartenant aux familles des Légumineuses, des Sapotées, des Myrobalanées, des Malpighiacées, Méliacées, etc., sur lesquels croissent en parasites des *Pothos* de diverses formes, des *Begonia* volubiles et de nombreuses *Orchidées* épiphytes : *Stanhopea tigrina* et *saccata*, *Maxillaria aromatica*, *Epidendrum ancipiticaulon*, Nob.; *E. rigidum*, Sw.; *E. Candollei*, Lindl., etc.; le *Pleurothallis microphylla*, Nob.; les *Oncidium sphacelatum*, Lindl., et *stramineum*, Lindl., le *Celia Bauerana*, le *Galeottia grandiflora*, Nob., le *Ponera striata*, Lindl.

« Cette végétation si riche et si variée constitue une zone végétale bien différente de celle de la côte. Nous la distinguerons sous le nom de *région chaude tempérée des ravins*. Elle alterne avec les régions tempérées humides. Les régions situées entre 1 000 à 1 200 mètres de hauteur absolue présentent un mélange de plantes des régions chaudes humides et des régions d'une température beaucoup moins élevée. Ainsi déjà à la hauteur de 900 à 1 000 mètres apparaissent les chênes, tandis que les *Laurus persea*, qui plus bas présentaient de si grandes dimensions, cessent de se montrer, et le Sapotilier, le Papayer, les grandes espèces de figuiers, deviennent rares, tandis que les Fongères, les Rubiacées, les *Symplocos*, le *Lacpedea insignis*, le *Berberis tenuifolia* et les Gesneriacées se montrent en abondance.

2°. Régions tempérées.

« Nous diviserons la grande région tempérée du versant océanique de la cordillère orientale du Mexique en trois sous-régions, dont l'ensemble embrasse une zone située entre 900 et 1 800, ou même 2 000 mètres de hauteur absolue.

« *Première sous-région tempérée chaude*. — Elle est située sur les limites des régions chaudes, dont elle conserve un certain nombre des productions

(1) *Glossinia guttata*, Mart. et Galeotti; *Episcia rosea*, M. et G., *Michimenes grandiflora*, Seibert.

(2) *Pennisetum distachyum*, Rupr., qui atteint de 5 à 6 mètres.

végétales, offrant cependant en même temps beaucoup d'espèces que l'on retrouve jusqu'à plus de 2 000 mètres. Cette sous-région est surtout caractérisée par ses forêts de chênes de diverses espèces, par ses *Zamia*, par des *Gentianees*, le *Souroubea*, et dans la famille des Orchidées par de nombreuses espèces de *Stanhopea*, par le *Brassavola glauca*, le *Cyrtocentrum maculatum*, les *Epidendrum radiatum*, *Parkinsonianum*, etc., qui végètent sur l'écorce des chênes.

» Les *Cypripedium irapeanum*, l'*Habenaria spathacea*, Nob., *Corallorhiza mexicana*, Nob., croissent dans les forêts, à l'ombre des chênes, ou sur les rochers humides, tandis que les *Spiranthes aurantiaca*, *saccata* et *violacea*, Nob., le *Bletia coccinea*, préfèrent le sol des savanes, et se cachent en quelque sorte parmi les Graminées (1) touffues qui couvrent ces savanes.

» A cette sous-région appartiennent les environs de Xalapa (Coatepec, Mahuatlan, Gilotepec, Zacuapan, etc.), d'Orizaba, et la majeure partie de cette magnifique contrée qui s'étale sur le versant oriental de la cordillère d'Oaxaca, et porte le nom de *Chinantha*, etc. Les savanes étendues de cette sous-région sont caractérisées par des Malpighiacées, des Mimosées, des *Escobedia laevis*, etc. Le sol en est généralement aride, quoique exposé à de fréquentes pluies; çà et là, quelques groupes d'arbres plus élevés rompent l'uniformité de ces vastes solitudes.

» Deuxième sous-région tempérée, ou région des Fougères en arbres. — La deuxième sous-région est celle qui porte au Mexique le nom de *Templada*, terres fertiles et bienheureuses qui produisent presque naturellement tout ce qui peut être utile à l'homme pour satisfaire ses besoins. Cette sous-région occupe un échelon de 600 à 700 mètres de hauteur moyenne. Dans les États de Vera-Cruz, de Tamaulipas, elle commence à une élévation de 1 000 à 1 200 mètres, et finit vers 1 800 à 2 000 mètres; dans les États d'Oaxaca et de Tabasco, elle commence et finit à 200 mètres plus haut.

» Cette zone est surtout caractérisée par la présence des Fougères arborescentes, des Liquidambars et des *Stanhopea*. La température moyenne varie de 17 à 19 degrés centigrades. Sa fertilité est vraiment merveilleuse, et l'air y est d'une salubrité remarquable; une humidité constante y entretient une verdure perpétuelle. Rien de plus varié que les formes sous les-

(1) *Manisuris granulatis*, Sw.; *Elyonurus ciliatis*, H.-B. K.; *Andropogon anthistichoides*, Kunth.; *Panicum tybaticum*, etc.

quelles la végétation se montre dans ces heureuses contrées. C'est une sorte de jardin où à chaque pas le naturaliste éprouve les plus douces et les plus vives émotions en rencontrant des productions nouvelles. A chaque repli du terrain varie qu'il parcourt se présentent à lui de nouveaux paysages enrichis des végétaux les plus élégants. Ainsi Xalapa et ses forêts environnantes, San Andrés Huelmo, la colonie allemande de Mirador Chiconquaco, Totutla, et toute cette ceinture de forêts qui s'étend d'Ozizaba vers Villa Alta, Tonangua, Teotalcingo, Guichicori et les régions les plus rapprochées des frontières de la République guatémaltèque offriront toujours au botaniste les récoltes les plus riches en plantes intéressantes et surtout en Orchidées. Parmi ces dernières, nous citons presque toutes les espèces de *Stanhopea* découvertes jusqu'à présent et dont les magnifiques fleurs d'une odeur suave des couleurs les plus variées et les plus vives ont jusqu'à 2 décimètres de diamètre les *Trichopilia tortilis* Lindley, *T. Galeottiana*, Nob, les *Isochilus latibracteatus* Nob, *I. crassiflorus*, Nob, *I. Evelynia capitata*, Brown, les *Maxillaria Deppii*, *densa*, *hematochilum*, Nob, *cucullata*, Lindley, les *Epidendrum Lindenianum*, Nob, *glaucum*, *polypetalum*, *Candollei*, *discolor*, Nob, *nocturnum*, *rhynchophorum*, Nob, les *Oncidium ornithorhynchum*, *incisum*, les *Odontoglossum hastatum*, *maculatum*, Lindley, Nob, le *Stelis mucronata*, les *Pleurothallis microphylla* et *spatulata*, Nob, *Physisiphon ochraceum*, Nob, etc, enfin sur les rochers et aux pieds des arbres, se rencontrent les *Dichæa squarrosa* et *echinocarpa*, le *Galeoglossum Prescottioides*, Nob, le *Cranichis glandulosa*, Nob, et *Physurus brachyceras*, Nob, et plusieurs autres. Dans la même région le botaniste trouvera encore une foule d'espèces de *Begonia*, de *Daphne*, de *Citrosma* le *Duranta Xalapensis*, les *Symplocos coccinea* et *limoncella*, le *Choysia tenax*, les *Bejaria glabra*, *paniculata* et *æstuans*, le *Thibaudia laurifolia*, les *Clethra unifolia* et *macrophylla*, et beaucoup d'autres belles espèces de plusieurs autres familles.

Troisième sous-région tempérée, ou région de la salsepareille et du jalap

— L'importance de ces deux médicaments, qui abondent dans cette sous-région nous engage à les employer pour la caractériser. Elle alterne avec la précédente dont elle n'offre plus ni les Liquidambar ni les Fougères arborescentes. Parmi les Orchidées, disparaissent les *Trichopilia*, les *Catasetum* et les *Mormodes*, qui abondaient dans la région précédente. C'est à peine si l'on y voit encore quelques rares espèces de *Stanhopea*. Déjà commencent à se montrer certains végétaux des régions plus froides, comme des Pins, des Arbousiers, des Pyrolas, des Rosacées, etc. I es limites

de cette sous-région sont presque incertaines, elles varient entre 1 800 à 2 200 metres Les Orchidées les plus communes dans cette zone sont les *Epidendrum viscidum*, *lactiflorum*, Nob , *ligulatum*, *ledifolium*, Nob , *lineatum*, Nob , les *Barkeria Lyndleyana* et *Skinneri*, Nob Ces espèces croissent tantôt sur les chenes, tantôt sur les rochers calcaires ou volcaniques

Les versants de la cordillère occidentale du Mexique qui descendent vers l'océan Pacifique, et tout le massif montagneux qui s'en détache et se ramifie considérablement dans les départements de Michoacan, de Jalisco (Guadalajara), de Puebla, de Mexico et d'Oaxaca, offrent des régions tempérées fortement développées et occupant une grande étendue de terrain La flore de ces régions est, en général, différente de celle des régions tempérées de la branche orientale des cordillères mexicaines On n'y a pas encore trouvé de Liquidambars et très-peu de Fougères arborescentes Ce qui frappe surtout dans la végétation des forêts de la branche occidentale, ce sont ces nombreuses espèces de chenes qu'on y rencontre et qui souvent arrivent à des dimensions colossales Les Orchidées qui vivent sur les écorces de ces chenes, sont en général différentes de celles des versants orientaux les *Epidendrum cochleatum* et *radiatum* sont peut-être les seules espèces qui soient communes à l'une et à l'autre chaîne Les ravins humides d'Arumbaro abritent le *Cypripedium urapeanum*, qui y acquiert une taille plus élevée qu'aux environs de Xalapa Nous citerons, dans cette région, les *Bletia coccinea*, *secunda*, *campanulata*, les *Spiranthes aurantiaca*, l'*Habenaria lactiflora*, les *Oncidium Suttoni* et *Galeottianum*, l'*Epidendrum viscidum*, le *Malaxis myurus*, Nob , les *Maxillaria cucullata* et *variabilis*, le *Phrysosiphon carnatus*, l'*Isochilus linearis* Dans les États de Jalisco, le *Bletia reflexa*, le *Schomburgkia Galeottiana*, Nob , et l'*Habenaria lactiflora*, Nob Le *Loelia grandiflora*, qui appartient aux régions froides, descend parfois dans cette région, par exemple aux environs de Morelia

Les belles forêts et les rochers gneissiques et amphiboliques de Juquila, Iuchatengo, Zacatapec, dans l'État d'Oaxaca, nous ont procuré un grand nombre d'Orchidées nouvelles ou intéressantes Nous citerons, entre autres, les *Epidendrum pulchellum*, Nob , *ramosum*, *ledifolium*, Nob , *oppositifolium*, Nob , le *Gongora Galeottiana*, Nob , le *Loelia peduncularis*, Lindl , le *Bletia purpurata*, Nob , des *Stanhopea*, le *Malaxis Galeottiana*, Nob , les *Spiranthes pubens* et *orchnoides*, les *Habenaria adenantha*, Nob , *chlorantha*, Nob , le *Platanthera propinqua*, Nob , etc Le voyageur na

turaliste qui explorerait des régions tempérées encore si peu connues de la cordillère occidentale, surtout celles du montueux et pittoresque Michoacan, y trouverait, sans aucun doute, une foule de plantes curieuses et inconnues

Les principales localités orchidéennes des régions tempérées de la branche occidentale des cordillères sont surtout situées aux environs de Morelia (Yrapeo, Tzitzio, Zitacuaro, Arumbaro, Maravatio, etc), les rochers basaltiques et les chênes du joli village indien d'Uruapan offrent beaucoup de *Stanhopea*, d'*Odontoglossum*, de *Cypripedium irapeanum*, les forêts qui bordent le Rio-Grande de Lerma, près de Tepic, celles du plan de Barrancas sur la route de Guadalajara, présentent différentes espèces des genres *Loelia*, *Catasetum* et *Epidendrum*, etc, enfin, dans l'État d'Oaxaca, les forêts humides et sombres qui couvrent le sol gneissique de Juquila et Lacatepec sont fort riches en Orchidées

3° RÉGIONS TEMPÉRÉES CACTIÈRES

Les versants qui forment les parois de quelques plateaux mexicains, toutes les pentes qui descendent vers les plaines centrales, sont couverts d'une végétation entièrement différente de celle qui couvre les flancs humides de la cordillère La nature géologique du sol, la grande rarefaction de l'air, le peu de forêts, le grand rayonnement sur cette surface immense du grand plateau mexicain, la rareté des pluies, et par conséquent le manque de cours d'eau, sont autant de causes qui rendent raison de la stérilité presque générale des plaines et des différences si tranchées de la végétation

Cette région est fort pauvre en Orchidées On y trouve cà et là quelques espèces de *Loelia* et de *Spiranthes* Au contraire, elle abonde en Cactées aussi remarquables par la bizarrerie de leurs formes que souvent par l'éclat de leurs fleurs Le *Prosopis dulcis* et diverses Mimosées épineuses couvrent de grandes étendues de terrains dans les plaines du Baxia, de Guadalajara, de Tepic, de Tehuacan et d'Oaxaca, tandis que les Broméliacées à feuilles piquantes et des Agaves chargées d'aiguillons constituent presque uniquement la végétation du sol calcaire et schisteux de Zimapan, d'Izmitquilpan et de Mexutilan

4° RÉGIONS FROIDES

Des régions tempérées où dominent les Orchidées les plus variées en genres, les plus éclatantes par leurs couleurs, les plus agréables par leur odeur, et où la température moyenne ne descend pas au-dessous de 16 de-

grés centigrades, nous passons à des contrées qui bientôt rappelleront au voyageur européen l'air frais et pur et sous quelques rapports, la végétation des Alpes et des Pyrénées. Les régions froides alpines commencent à environ 100 à 200 mètres. À cette hauteur leurs productions se trouvent mêlées avec celles des régions tempérées. Mais vers 2000 à 2800 mètres la végétation se caractérise nettement. Les Pins, les Chenes, les Pyrolas, les Arbousiers, les *Arctostaphylos*, les Rosacées, etc., impriment un caractère tout spécial au paysage. Naturelle, quoique moins brillante dans ses productions, n'en offre pas moins, surtout dans les créations végétales, un ensemble des plus riches et des plus intéressants.

On peut diviser les régions froides de la cordillère en trois sous-régions : 1° l'inférieure, de 2000 à 2700 mètres, 2° la moyenne, de 2700 à 3300 ou 3500 mètres, 3° la supérieure s'étend de la précédente jusqu'aux limites supérieures de la végétation phanerogamique.

A. Sous région froide inférieure. — La première sous-région, ou l'inférieure, atteint avec les régions tempérées comme nous l'avons déjà dit. C'est ainsi qu'entre 1800 et 2500 mètres on trouve une certaine quantité de plantes qui montent jusque vers ces limites. Le *Chouya ternata*, H.-B. K. le *Clethra mexicana* D. C. le *Elaterium floribundum*, Mart. et Gal. le *Jobelia Hartwegii*, Benth. et *persicifolia*, H.-B. K. le *Siegesbeckia jorullensis*, H.-B. K. le *Cerasus apollini*, D. C. le *Cotoneaster luxifolia*, Mart. et Gal., le *Mespilus pubescens*, Kth., etc. Parmi les Orchidées, les *Spiranthes chlorocæformis*, Nob., *pubens*, Nob., les *Lælia purpuracea* et *albida*, le *Polystachya cerea* qui descend jusqu'à 1000 mètres, le *Isorchilus lineatus*, le *Epulendrum vitellinum*, etc. On ne trouve plus ni *Stanhopea*, ni *Cryptopodium*, ni *Acropera* ni *Oncidium* à feuilles charnues. Les Pins et les grandes espèces d'Arbousiers commencent à abonder.

À cette sous-région appartiennent les environs d'Oaxaca (pentes du cerro San Felipe), une partie de la Misteca Alta (Pinols, etc.) le cerro de la Virgen près de Juquila, à quelques lieues de l'Océan Pacifique, les environs de Solita district de Yaveza (Socorro, Castravana) les jolis bois de Llano-Verde, dans l'État d'Oaxaca, les environs de las Ogas, près de Xalapa, une partie du pic d'Orizaba, près du rancho de Torozinapa les flancs du Coffie de Perote, les montagnes près d'Orizaba, etc., dans l'État de Vera-Cruz, les environs de Morelia (Jesús del Monte), les monts d'Yrapeo, etc.

B. Sous-région froide moyenne. — La deuxième sous-région s'étend sur les deux chaînes des cordillères, depuis 2700 jusqu'à 3500 mètres. Elle est riche en Orchidées, et sur les flancs trachytiques du pic d'Orizaba on

trouve encore des plantes de cette famille à plus de 3300 metres de hauteur absolue, et, entre autres, notre *Habenaria prasina*. Cette sous-region, la *tierra fria* des indigenes, se caracterise par ses beaux Chenes, ses Pins elevés (*Pinus religiosa* et *teocote*) ses *Pyrola rotundifolia* et *Chimophila maculata*. Elle abonde en belles Fougees (1), en Fierées arborescentes (2), en Asclépiadées etc. Les Cucurbitacées sont représentées par le seul genre *Sicyos*, les Graminées augmentent comme la hauteur absolue (3). Entre 2800 à 3000 metres la culture du maïs disparaît. Les forêts abritent une foule de Renonculacées, de Labiées, de Gentianées, de Rosacées herbacées ou frutescentes, dans les endroits marécageux on trouve les *Eutoca* avec les *Ophioglossum* et les *Ombellifères*. Enfin, sur les pics élevés près d'Oaxaca et de Limapatin (au Cingundo), apparaissent quelques plantes grasses, *Mammillaria nitida* et *Mammillaria polychlora*, Scheidw. Il regne une humidité constante dans les forêts de cette sous-region, les décharges électriques y sont fréquentes et redoutables. La température moyenne varie de 10 à 15 degrés centigrades.

Les régions froides des deux branches de la cordillère abondent en Orchidées, dont plusieurs espèces leur sont communes. Les stations les plus riches sont situées entre 2500 et 2800 metres. Nous citons dans la cordillère orientale d'Oaxaca, l'*Epidendrum erubescens*, Batem., qui, jetant sur le tronc des chênes ses longs pseudobulbes, offre des tiges qui souvent acquièrent 10 et 12 metres de longueur, le *Pleurothallis aurica*, Nob., le *Coelia macrostachya*, Lindl., l'*Apophyllum spicatum*, l'*Epidendrum guttatum*, Nob., le *Malaxis myurus*, Nob., qui se plaint dans les endroits marécageux et offre de loin le port d'un plantain, le *Corallorhiza bulbosa*, Nob., les *Epidendrum virgatum* et *varicosum*, qui croissent par groupes sur les rochers porphyriques et calcaires, les jolis *Epidendries* arborescents, *Epidendrum ledifolium*, Nob., les *Govenia capitata* et *superba*, le *Spiranthes Ga*

(1) *Woodwardia spinulosa*, Kaulf., *Allosorus ciliatus* Presl., *Polypodium bicruratum*, Mart. et Gall., *affine*, Mart. et Gall., *Acrostichum Schiedei*, Schleg., *simplex*, Sw.

(2) *Arbutus floribunda*, Mart. et Gall., *laurina*, Mart. et Gall., *paniculata*, Mart. et Gall., *Mentha cwi*, D. C.

(3) Elles occupent de vastes espaces et forment des touffes énormes, surtout vers 3500 à 4000 metres. Il est à remarquer que les Graminées en grosses touffes ne se rencontrent guère au Mexique qu'aux deux extrémités de l'échelle, près des côtes de Vera-Cruz et de San Blas (*Epicampes mutica*, Rupr.), et sur le pic d'Orizaba, entre 3000 et 4000 mètres (*Agrostis Michauxii*, Trin., *Festuca fratercula*, Rupr.).

leottiana sur les rochers arides, le *Cattleya citrina*, le *Epidendrum ligulatum*, *arbusculum*, *prunosum*, Nob , *suyrinchifolium*, Nob , les *Odontoglossum coerulescens*, Nob , et *Galeottianum*, Nob , le *Oncidium granumifolium*, le *Alamania punicea*

Les forêts de chenes, et les rochers gneissiques et calcaires de la Mixteca et de la branche occidentale de la cordillère d'Oaxaca, nous présentent une flore orchidéenne également riche. Ainsi nous y remarquons le *Odontoglossum membranaceum*, les *Laelia albida* et *purpurea*, les *Epidendrum erubescens*, *guttatum*, Nob , *costatum*, Nob , *pulchellum*, Nob , *subulatifolium*, Nob , le *Pleurothallis mesophylla*, Nob , le *Spiranthes pubens*, Nob , les *Oncidium macropterum*, Nob , et *raiflorum* Nob , le *Bletia purpurata*, Nob , le *Habenaria acutiflora*, Nob

On trouve dans les forêts du Michoacan surtout aux environs de Morelia (cerro de Quinceo, bois de Jesus del Monte, Irapeo, etc), dans celles du pic de Tancitaro etc, une foule de belles Orchidées le *Spiranthes cinabarina*, Nob , le *Habenaria acutiflora*, Nob , le *Malaxis Galeottiana*, Nob , le *Alamania punicea*, enfin, la plupart des espèces décrites par la Llave et Lexarza

Les forêts des régions froides qui bordent le plateau central présentent aussi quelques espèces d'Orchidées le *Govenia superba*, le *Corallorhiza Mexicana*, le *Pleurothallis violacea*, etc

C Sous-région froide supérieure — Les derniers échelons de la végétation phanérogamique sont situés sur les sommets des montagnes les plus élevées. De 3 300 à 4 000 et 4 150 mètres, les sommets, telles que celles du Popocatepetl, de l'Iztaccihuatl, de Toluca, d'Orizaba, ou Citlaltépetl du Coffre de Perote, etc, présentent une région froide toute particulière où les Fougères, les Gentianées, les Renonculacées, les Colchicacées, les Synanthérées, les Graminées et les Conifères sont surtout abondantes. A une hauteur de 3 700 à 3 900 mètres, les Aunes et les Chênes disparaissent, les Pins deviennent rabougris et étalent leurs branches allongées à la surface du sol, vers 4 150 mètres au pic d'Orizaba, on voit des Genévriers formant çà et là de petits bouquets de verdure sur les rochers trachytiques. La nature est déjà bien chétive, bien pauvre dans ses productions végétales à cette hauteur. On ne trouve guère au pied des rocs élevés ou au bord des petits filets d'eau qui naissent un peu plus haut, du sein des neiges éternelles, que quelques petites Ombellifères, des *Cnicus*, des *Cacalia*, des Gentianes, le *Vaccinium gemmiflorum*, Kunth, l'*Allium fragrans*, Vent, le *Carex Galeot-*

tiana, C-A Meyer, le *Bromus subalpinus*, Rupr, le *Poa conglomerata* Rupr, le *Deyeuxia Orizabæ*, Rupr

A 4200 ou 4300 metres, dans les petites plaines de sable volcanique, au pied des glaciers, croissent de petites especes de *Castilleja* à fleurs d'un rouge vif, une ou deux especes de Synanthérées, deux especes de Cruciferes, le *Bromus lividus*, H B K, puis les Cryptogames abondent et couvrent les rochers tachytiques ce sont surtout des lichens qui se montrent les derniers, et suivent en quelque sorte la limite des neiges dans ses différents points

Le *Habenaria prasina*, Nob le *Platanthera nubigena*, Nob le *Spiranthes ochracea*, Nob, le *Malaxis gracilis*, Nob, le *Platanthera longifolia*, Nob, sont les dernières Orchidées qui bravent l'atmosphère froide et raree de ces sommets et ne disparaissent guère que vers 3800 à 3900 metres sur le pic d'Orizaba

Le *Odontoglossum nebulosum* et le *Cattleya citrina* se trouvent sur les cimes élevées du cerro de Capulalpan et du pic de San-Andrés à plus de 3200 metres Ce sont sans doute les especes épiphytes qui, au Mexique s'élèvent à une aussi grande hauteur Les *Odontoglossum membranaceum*, l'*Oncidium graminifolium*, les *Epidendrum virgatum* et *varicosum*, les *Govenia superba* et *capitata*, et l'*Alamania punicea* disparaissent vers 3000 metres

En jetant les yeux sur le résumé comparatif de la distribution des Orchidées dans chacune des grandes régions précédentes on remarquera que les régions froides le cèdent faiblement aux régions tempérées pour la variété, et à peine pour la beauté des especes

Nous terminerons ce travail par le tableau des genres nouveaux et des especes nouvelles décrits dans notre monographie, dont le précédent Mémoire n'est que l'introduction abrégée

TABEAU DES GENRES NOUVEAUX ET DES ESPÈCES NOUVELLES DÉCRITS DANS CETTE MONOGRAPHIE

I MALAXIDÉES

I *Pleurothallis Ghiesbreghtiana*, Nob — *P amana*, Nob — *P disticha*, Nob — *P dubia*, Nob — *P violacea*, Nob — *P mesophylla*, Nob — *P aurea*, Nob — *P polystachya*, Nob — *P congesta*, Nob — *P obscura*, Nob — *P alata*, Nob — *P microphylla*, Nob — *P trichopoda*, Nob — *P spatulata*, Nob

II *Physosiphon ochraceus*, Nob

III *Musdevallia Galeottiana*, Nob — *M Lindeniana*, Nob

IV *Stelis purpurascens*, Nob

V *Malaxis maianthemifolia*, Nob — *M elliptica*, Nob — *M ichthorkynca*, Nob — *M cochlearæfolia*, Nob — *M thlaspiiformis*, Nob — *M oblongifolia*, Nob — *M Lindeniana* Nob — *M Galeottiana*, Nob — *M monticola*, Nob

VI *Orallorkisa punctata*, Nob — *C bulbosa*, Nob — *C grandiflora*, Nob

2 APIDENDRÆ

VII *Epidendrum (Encyclium) Ghiesbreghtianum*, Nob — *E (Encyclium) luteo roseum* Nob — *E (Encyclium) distantiflorum*, Nob — *E (Encyclium) ensicaulon*, Nob — *F (Encyclium) sistrinchifolium*, Nob — *E (Encyclium) cinnamomeum*, Nob — *E (Encyclium) rhynchophorum*, Nob — *E (Encyclium) trivite*, Nob — *E (Encyclium) guttatum*, Nob — *E (Encyclium) brachiatum*, Nob — *E (Encyclium) prunosum*, Nob — *E (Diacrium) Lindenianum*, Nob — *E (Osmophytum) chondylobolbon*, Nob — *E (Osmophytum) marmoratum*, Nob — *F (Osmophytum) pulchellum*, Nob — *E oppositifolium*, Nob — *E (Amphigloium) Galeottianum*, Nob — *F (Eupidendrum) costatum*, Nob — *E (Eupidendrum) propinquum*, Nob — *F (Eupidendrum) icidifolium*, Nob — *E (Eupidendrum) subulatifolium*, Nob — *E (Eupidendrum) acutiflorum*, Nob — *E (Eupidendrum) scriptum*, Nob — *E (Eupidendrum) ensatum*, Nob — *E (Eupidendrum) longipetalum*, Nob — *E (Eupidendrum) discolor*, Nob — *E (Eupidendrum) lactiflorum*, Nob

VIII *Barkiera melanocaulon*, Nob

IX *Itocilus laubiactatus*, Nob — *I crassiflorus*, Nob — *I dubius* Nob

X *Brassia appendiculata*, Nob

XI *Schomburgkia Galeottiana*, Nob

XII *Lælia discolor*, Nob

XIII *Bletia purpurata*, Nob — *B lilacina*, Nob

XIV *Hexadesmia Lindeniana*, Nob

3 VANDEÆ

XV *Ornithocephalus mexicanus*, Nob

XVI *Clinhymenia*, Nob, genus novum — *C pallidiflora*, Nob

XVII *Maxillaria hæmatoglossa*, Nob — *M brachyglota*, Nob — *M Galeottiana*, Nob — *M Lindeniana*, Nob

XVIII *Galeottia*, Nob, genus novum — *G grandiflora*, Nob

XIX *Copenia alba*, Nob

XX *Gongora Galeottiana*, Nob

XXI *Peristera longiscapa*, Nob

XXII *Notylia orbicularis*, Nob

XXIII *Trichopilia Galeottiana*, Nob

XXIV *Isopais brevifolia*, Nob

XXV *Oncidium rariflorum*, Nob — *O Ghiesbreghtianum*, Nob — *O brevifolium*, Nob — *O macropterum*, Nob

XXVI *Odontoglossum erosum*, Nob — *O Galeottianum*, Nob — *O cærulescens*, Nob

XXVII *Ghiesbreghtia*, Nob, genus novum — *G mexicana*, Nob

XXVIII *Todaroa*, Nob, *genus novum* — *T micrantha*, Nob

XXIX *Polystachya minuta*, Nob

4 OPHRYDEES

XXX *Habenaria diffusa*, Nob — *H adenanta* Nob — *H lactiflora*, Nob — *H acutiflora*, Nob — *H alata* Nob — *H spathacea*, Nob — *H orizabensis*, Nob — *H brevilabiata* Nob — *H stricta*, Nob — *H virens*, Nob

XXXI *Platanthera nudigena*, Nob — *P longifolia*, Nob — *P Ghiesbreghtiana*, Nob

XXXII *Gymnadenia neottioides*, Nob — *G prasina*, Nob — *G propinqua*, Nob

5 NEOTTIEES

XXXIII *Ponthueva oblongifolia*, Nob

XXXIV *Cranichis sylvatica*, Nob — *C glandulosa*, Nob — *C subumbellata* Nob

XXXV *Prescottia macrorrhiza*, Nob — *P densiflora*, Nob — *P Lindeniana*, Nob

XXXVI *Galeoglossum*, Nob, *genus novum* — *G prescottioides*, Nob

XXXVII *Ocampoa*, Nob, *genus novum* — *O mexicana*, Nob

XXXVIII *Spiranthes sarcoglossa*, Nob — *S minutiflora*, Nob — *S transversalis*, Nob — *S seccata*, Nob — *S parasitica*, Nob — *S violacea*, Nob — *S luteo-alba*, Nob — *S Galotiana*, Nob — *S latifolia*, Nob — *S pauciflora*, Nob — *S hyemalis* Nob — *S columnaris*, Nob — *S ochracea*, Nob — *S pubens* Nob — *S lanuginosa*, Nob — *S chloraeformis* Nob

XXXIX *Physurus brachyurus*, Nob

GENERA NOVA, 6, SPECIES NOVAE, 132

BOTANIQUE — *Examen de quelques cas de monstruosites vegetales propres a eclairer la structure du pistil et l'origine des ovules*, par M ADOLPH BRONGNIART

« Il n'est presque aucun botaniste qui ne reconnaisse maintenant combien l'étude de ces aberrations de la structure habituelle qu'on désigne par le nom de monstruosité, jette souvent de lumière, soit sur l'organisation essentielle et fondamentale de certaines parties des végétaux, soit sur la structure particulière de quelques groupes de végétaux, c'est surtout dans l'étude de la fleur que l'examen des monstruosites peut souvent nous éclairer sur la nature réelle des divers organes, sur leurs rapports et sur l'analogie des diverses parties qui les constituent

• Il y a quelques années encore, l'opinion anciennement émise par Linné, puis par Goethe, Decandolle, etc, qui consistait à considérer les divers verticilles floraux comme formés d'organes appendiculaires analogues à des feuilles diversement modifiées, et la fleur tout entière comme comparable à un bourgeon, paraissait admise par presque tous les botanistes qui s'étaient

occupes de cette question, depuis lors, cependant, plusieurs physiologistes distingués ont pensé que des parties dépendantes, soit de l'axe floral lui-même, soit d'axes secondaires naissant de l'aisselle des organes appendiculaires, entraient dans la composition des divers organes de la fleur

Cette opinion a été particulièrement mise en avant pour les étamines et les placenta ou cordons pistillaires de l'ovaire

Je ne m'occuperai pas ici de la première de ces manières de voir, qui me paraît avoir été bien moins généralement admise, qu'un grand nombre de faits déduits, soit de l'organisation florale normale, soit de monstruosité bien connues, me semblent combattre victorieusement, et qu'on est même étonné de voir encore admise par plusieurs savants, depuis le beau Mémoire sur ce sujet de M Mohl

L'opinion qui considère les placenta et les ovules qu'ils supportent comme une partie distincte et indépendante de la feuille carpellaire, et comme une dépendance de l'axe floral continué entre les carpelles, ou comme des prolongements latéraux de cet axe soudés à ces feuilles carpellaires, a trouvé, au contraire beaucoup plus de partisans, tant parmi les botanistes étrangers qu'en France même Elle a été particulièrement soutenue récemment par notre savant collègue, M Auguste de Saint Hilaire, qui, dans sa *Morphologie*, admet complètement cette théorie, et lui a donné beaucoup de crédit en l'appuyant de son autorité (1)

Mais l'opinion contraire, qui considère les placenta, les faisceaux vasculaires qui les parcourent ou cordons pistillaires, et les ovules qu'ils supportent, comme des dépendances de l'organe appendiculaire ou feuille modifiée qui forme le carpelle conserve cependant pour plusieurs des botanistes les plus distingués de notre époque, et particulièrement M R Brown, qui a examiné cette question d'une manière spéciale dans plusieurs de ses savantes dissertations M Derandolle, qui s'est toujours exprimé de manière à prouver qu'il considérait le placenta comme une dépendance de la feuille carpellaire, enfin M Mohl, qui, dans le Mémoire cité ci-dessus, regarde toujours les ovules comme une production de la feuille ovarienne

Dans un tel partage d'opinions, il est utile de faire connaître les faits qui peuvent jeter du jour sur cette question En ne considérant que les pistils libres de toute adhérence avec les organes plus extérieurs de la fleur, on re-

(1) D'jà M Auguste de Saint Hilaire avait développé cette opinion dans son second Mémoire sur les resedacées, pages 11 et 21, et plus anciennement, M Achille Richard paraît avoir considéré le placenta de la même manière dans son Mémoire inédit sur les placenta pariétaux

connait généralement deux modifications principales dans les relations des parties qui constituent le pistil ou ces parties sont complètement indépendantes les unes des autres, et chaque fleur renferme un ou plusieurs pistils simples indépendants les uns des autres ou ces pistils simples, plus ou moins intimement réunis et soudés entre eux, forment un pistil composé constituant un seul corps central

Il est bien peu de botanistes qui, ayant étudié l'organisation du pistil dans un grand nombre de végétaux, n'acceptent cette analogie complète entre les pistils composés et les pistils simples soudés entre eux à divers degrés, et si l'on admet que dans les pistils composés, multiloculaires à placentation axile, les cordons vasculaires des placenta et les ovules sont des dépendances de l'axe, on est obligé de l'admettre dans les ovaires composés à placentation pariétale, comme ceux des pavots, des violettes ou des réséda, et enfin dans les pistils à carpelles complètement libres, comme ceux des légumineuses, des rosacées et des renonculacées, c'est une conséquence, du reste devant laquelle les partisans de cette doctrine n'ont pas reculé, et ils ont admis qu'un ou deux fuseaux vasculaires, simples ou ramifiés, dépendants de l'axe, s'accroient aux bords des feuilles carpellaires et y forment les placenta

Mais puisqu'ils ont été obligés, par la force de l'analogie d'étendre à toutes les organisations pistillaires la théorie qu'ils avaient admise d'abord dans les cas auxquels elle s'applique le plus facilement et où elle paraît même avoir quelque chose de séduisant, on reconnaît également que, si l'on démontre que dans les pistils simples et libres, les ovules sont une dépendance complète de la feuille carpellaire, la même conclusion devra s'appliquer à tous les pistils construits sur le même plan général et ne différant que par le degré et le mode de soudure de ces feuilles carpellaires. C'est pour cette démonstration que les déviations plus ou moins prononcées de la structure habituelle du pistil pourront nous fournir des faits concluants

Depuis longtemps on a observé des exemples nombreux de transformations des carpelles en feuilles, qui ne laissent aucun doute sur l'analogie de ces organes entre eux, et permettent d'admettre le terme de *feuille carpellaire* comme exprimant un fait réel et non pas une simple analogie. Dans beaucoup de cas, en effet, ces carpelles, devenus libres, ouverts et plus ou moins foliacés, sont en nombre égal et conservent exactement la position qu'ils présentent dans l'état normal, souvent même ils portent encore des ovules à peine modifiés sur leurs bords. Dans d'autres cas, ce sont des pistils simples et libres, développés à la place des étamines et résultant d'une trans-

formation complete ou incomplete de ces organes qui portent sur les bords d'une feuille carpellaire ouverte des ovules plus ou moins nombreux

Des exemples de ces diverses sortes de monstruosités ont été décrits et figures depuis longtemps, mais il est probable que les physiologistes qui considèrent les placenta comme des divisions de l'axe soudées au bord des carpelles ont aussi admis que dans ces feuilles carpellaires réellement foliacées et ouvertes les nervures qui portent les ovules étaient étrangères à ces feuilles, quoiqu'elles ne paraissent différer en rien d'une feuille ordinaire, ils pouvaient considérer, comme venant à l'appui de leur opinion, les cas fréquents où les pistils, devenus complètement foliacés, ne présentent plus aucunes traces d'ovules, c'est en effet ce que fait remarquer M. Auguste de Saint Hilaire à l'égard des pistils foliacés des merisiers à fleurs doubles (1)

Mais l'exemple que je me propose de faire connaître ici d'une manière plus spéciale n'est pas susceptible de ces interprétations, en effet, les carpelles offrant tous les degrés de transformations foliacées, montrent sur leurs bords des ovules, tantôt à peine différents des ovules normaux, tantôt passant insensiblement à l'état de *lobes latéraux* de la feuille carpellaire elle-même. C'est cette origine des ovules qui me paraît donner un intérêt particulier à cette monstruosité observée dans l'été de 1841, sur un pied de *Delphinium elatum* cultivé au Muséum d'Histoire naturelle de Paris, et dont la panicule entière offrait des fleurs fortement altérées dans leurs diverses parties. Leurs caractères essentiels étaient généralement les mêmes, et on peut les résumer ainsi : les cinq sépales ont perdu presque entièrement leur irrégularité, ils sont verts, quelquefois légèrement tinctés de violet en dedans, ils offrent une disposition quincunciale bien évidente, les trois externes sont semblables entre eux, et le supérieur ne présente aucune trace d'épée, les deux latéraux intérieurs sont plus grands, onguiculés, à limbe étalé, quelquefois tous les cinq sont presque égaux entre eux, il n'y a ni pétales, ni organes pétaloïdes, les étamines, toutes semblables entre elles, sont bien conformées, pareilles à celles des *Delphinium* ordinaires, et leurs anthères renferment du pollen, elles sont insérées sur la base de l'axe allongé qui porte plus haut les carpelles

• L'axe floral se prolonge au-dessus de l'insertion des étamines en une portion de tige nue dans une étendue plus ou moins grande, depuis quelques millimètres jusqu'à plus de 2 centimètres, à son sommet sont insérés les trois carpelles verticillés ou plutôt formant un tour de spirale très-court

(1) Second Mémoire sur les roséacées, page 21

Ces trois carpelles sont tantôt peu modifiés, leurs bords étant rapprochés et portant des ovules à peine altérés, tantôt, au contraire, ils sont ouverts, étalés surtout dans le bas, et d'apparence tout à fait foliacée. C'est sur ceux-ci qui se présentent ainsi sur un grand nombre de fleurs, qu'on voit clairement l'origine et le mode de formation des ovules. Mais avant d'étudier ce point essentiel, je ferai remarquer que dans un grand nombre de ces fleurs l'axe se prolonge au delà des feuilles carpellaires, se ramifie plus ou moins et porte de nouvelles fleurs offrant la même organisation que les précédentes, quant au calice et aux étamines, mais généralement dépourvues de pistils et dont l'axe ne se prolonge pas au delà des étamines.

Ainsi l'axe floral, après avoir produit les organes qui constituent la fleur normale du *Delphinium* en même nombre et dans la même position respective, mais profondément modifiés pour plusieurs d'entre eux, dans leur forme et leur structure propre, ne continue pas, en s'allongeant au delà de ces organes, à produire des feuilles carpellaires, en donnant à la fleur d'un *Delphinium* l'organisation pistillaire des renonculacées multicarpellées. La production des organes floraux, au contraire, cesse, et l'axe redevient un axe d'inflorescence portant une grappe de fleurs plus ou moins nombreuses.

Revenons maintenant à la structure des carpelles modifiés et à l'origine des ovules qu'ils supportent.

Quelques-unes de ces fleurs ont des carpelles peu différents de l'état normal, les bords sont rapprochés, légèrement écartés seulement vers le bas et portent sur chaque côté de la suture des ovules bien conformés. Ils ne diffèrent presque des carpelles ordinaires que par la réunion imparfaite des bords de la feuille carpellaire. D'autres sont étalés dans toute leur étendue et représentent une petite feuille trinervée, lobée sur ses côtes, à lobes ordinaires tridentés, tantôt étalés, tantôt recourbés. En dessus de ces deux cas, le premier nous présente un ovaire à peine modifié, le second une feuille petite, mais n'ayant de commun avec les carpelles que la position et rien dans ces dernières fleurs ne nous montre comment les ovules naissent de la feuille carpellaire, c'est ce qui a lieu le plus souvent dans les cas de pistils devenus foliacés, où les ovules ont en général complètement disparu.

Mais dans la plante qui nous occupe, le plus grand nombre des fleurs offrent des feuilles carpellaires intermédiaires entre ces deux états, formant vers leur sommet un ovaire clos par la jonction des feuilles carpellaires, portant des ovules à peine altérés, et présentant à leur partie inférieure une feuille dont les bords sont lobés, repliés en dedans, séparés les uns des autres et dépourvus d'ovules.

En examinant avec attention ces feuilles carpellaires, incomplètement modifiées, dont les deux bords sont rapprochés et soudés vers le haut, libres et écartés vers la base, on observe sur ces bords toutes les transitions entre les lobes linéaires et tridentés de la feuille, et les ovules eux-mêmes.

On voit que ces feuilles carpellaires sont parcourues par trois nervures longitudinales principales, l'une médiane, et deux autres latérales, que celles-ci correspondent aux bords mêmes de la feuille carpellaire, telle qu'elle existe dans les pistils non altérés, bords qui, par leur rapprochement, constituent la suture interne des carpelles, que la paroi de l'ovaire ne répond par conséquent, dans ces plantes, qu'à la partie du limbe de la feuille comprise entre la nervure médiane et les nervures latérales par de petites nervures anastomosées, que la partie de la feuille placée en dehors de ces nervures latérales principales ne concourt en rien à la formation des parois de l'ovaire, mais se transforme en ovules. Je dis qu'elle se transforme en ovules, parce qu'en effet il est évident, quand on considère cette feuille et les changements successifs des lobes, que chacun de ces lobes se transforme en un ovule. Ces lobes n'avortent pas, et des ovules ne naissent pas à côté d'eux, ou à leur place, mais on les voit diminuer, se courber, se replier sur eux-mêmes, de manière à constituer le funicule et la primine, ou membrane externe de l'ovule. On peut même facilement reconnaître que des trois dents que présente chacun de ces lobes, les latérales s'atrophient, la base du lobe se rétrécissant pour former le funicule très-court des ovules, tandis que la partie moyenne de chacun de ces lobes se creuse ou se recourbe en dessus et en dedans en forme de capuchon, pour constituer la primine. Quant au nucelle, il naît d'une sorte d'excroissance ou de mamelon cellulaire placé à la face supérieure, sur la nervure médiane de chaque lobe, un peu au-dessous de son sommet. Dans les lobes étalés, et ne participant pas à la formation des téguments ovulaires, le mamelon correspondant au nucelle est très-petit et entièrement à découvert sur la face supérieure légèrement recourbée du lobe foliacé. Sur les lobes dont le sommet présente déjà une cavité en forme de godet, le nucelle, ou très-peu développé, ou déjà plus grand, occupe le fond de cette sorte de godet qui correspond à la primine. Dans les lobes foliacés qui ont pris plus complètement la forme des ovules, l'ouverture de la cavité en forme de godet qui représente la cavité du tégument de l'ovule se rétrécit, et prend tout à fait l'aspect du micropyle, le nucelle est plus développé, et son sommet libre correspond à cette ouverture du tégument ovulaire, comme dans l'état normal. Enfin, l'ovule prend de plus en plus la forme et l'organisation de l'ovule ordinaire de cette plante.

* On ne saurait donc se refuser à admettre que, dans la plante qui nous occupe, les faisceaux vasculaires de chaque placenta, ou ce qu'on nomme souvent les cordons pistillaires, sont formés par les nervures latérales de la feuille carpellaire, que chaque ovule correspond à un lobe ou à une grande dentelure de cette feuille, et que son funicule, ainsi que le raphé jusqu'à la chalaze, est formé par la nervure médiane de ce lobe latéral, que le tégument extérieur, souvent vasculaire, de l'ovule, n'est autre chose que l'extrémité de ce lobe foliacé, replié sur lui-même, ou formant une sorte de capuchon, que le nucelle au contraire est une production nouvelle, un mamelon celluleux, qui se développe à la face supérieure de ce lobe de la feuille, et dans le fond de la cavité qu'il a formée.

On voit qu'il est absolument impossible de considérer ici le placenta et les ovules comme une production distincte de la feuille carpellaire, comme une position quelconque de l'axe principal ou d'un axe latéral qui se serait divisé en deux branches et soudé à chacun des bords de la feuille carpellaire ainsi que quelques auteurs ont voulu l'établir dans ces derniers temps.

Mais peut-on conclure de ce fait particulier la structure générale de l'ovaire? je le crois, au moins pour tous les cas où les placenta sont placés sur les bords ou sur la face interne de la feuille carpellaire, car il est évident que la structure de chacun des carpelles du *Delphinium* est exactement celle de tous les carpelles libres à placentation marginale, polyspermes ou monospermes, constituant les fruits qu'on désigne par les noms de *follicules* et de *gousses*, et la plupart des akènes provenant d'un carpelle simple.

On ne se refusera pas à reconnaître la même structure dans les pistils formés de plusieurs carpelles ayant chacun la même organisation, mais soudés entre eux et donnant naissance à un ovaire multiloculaire à placentation axile, car, par l'anatomie, on s'assure facilement de l'analogie complète qui existe, dans la plupart des cas, entre la structure de ces deux sortes de pistils, et du défaut très-fréquent d'adhérence des placenta entre eux dans la partie qui devrait répondre à la prolongation de l'axe, enfin les ovaires composés, à cavité unique et à placenta pariétaux, rentrent encore d'une manière bien claire dans la même organisation.

Je puis même citer ici un autre exemple de monstruosité qui montre la même origine des ovules dans une famille où l'ovaire semble, au premier abord, s'éloigner notablement de la structure la plus habituelle des ovaires composés, dans la famille des crucifères. Cette famille est une de celles dans lesquelles on a observé le plus fréquemment des transformations remarquables dans les organes de la fleur, et celle bien connue de la giroflée commune.

(*Cheiranthus cheiri*) à étamines transformées en carpelles simples, ouverts ou fermés, montre, de la manière la plus claire, les ovules naissant sur les bords des feuilles carpellaires

Mais celle que je désire faire connaître, et que j'ai observée sur la totalité des fleurs d'un pied de navet, offre les deux feuilles carpellaires composant la silique, tantôt dans leur état normal, tantôt très-développées, mais formant encore une silique presque vésiculeuse dans laquelle les ovules sont remplacés par de petites expansions foliacées, tantôt enfin remplacées par deux feuilles libres dépourvues d'ovules

Ce sont ces deux états et leurs intermédiaires qui m'ont paru surtout intéressants à étudier, pour voir jusqu'à quel point on pouvait, dans cette famille, attribuer les placenta à une formation axile ou du moins étrangère aux deux carpelles représentés par les valves, pour juger, en un mot, si l'on pouvait considérer la cloison et les placenta comme constituant des organes distincts des valves

Les siliques monstrueuses, renflées et presque vésiculeuses ont, au premier abord, l'organisation habituelle du pistil des crucifères, quoique très-différentes par leurs formes et leurs dimensions par leur long support et leur cloison étroite, de celles des *Brassica*

Cependant, en les ouvrant on voit qu'il n'existe plus de vraie cloison membraneuse, que les bords épais des carpelles sont rapprochés et en contact plus ou moins complet dans toute l'étendue, ou soudés seulement en partie les bords des deux carpelles différents ont au contraire, soudés très-intimement entre eux dans toute leur étendue, du moins dans la plupart des cas

On a donc un ovaire dont les sutures internes des carpelles se désunissent très-facilement. Les bords de ces carpelles donnent naissance à des lobes foliacés occupant la position des ovules, réfléchis dans l'intérieur des carpelles, se continuant entre eux par la base, disposés dans un même plan sauf les déviations résultant de torsions plus ou moins prononcées, divisés en deux ou trois dents aiguës et représentant fort bien un bord de feuille pinnatifide. Chacun de ces lobes est parcouru par une petite nervure, et ses subdivisions par des nervures secondaires. La connexion de ces petites folioles entre elles à leur base, leur position dans un même plan parallèle à l'axe de la silique, montre évidemment que ce ne sont pas autant de petites feuilles distinctes, mais des portions d'une seule feuille lobée. La juxtaposition de ce bord lobé avec le bord également lobé de l'autre feuille carpellaire, la réunion même des faisceaux vasculaires longitudinaux de chacun

d'eux en un seul faisceau médian, produit l'apparence d'une seule feuille pinnatifide appliquée à l'intérieur en dedans de la suture des feuilles carpellaires, et l'on pourrait croire que le pistil, quoique formé seulement d'organes appendiculaires, serait composé de quatre feuilles: deux formant les valves ou les parois de l'ovaire, et deux alternant avec celles-ci, et plus internes, formant les placenta; mais l'examen complet de cette monstruosité et de ses diverses modifications me paraît rendre cette supposition peu vraisemblable.

» Outre les parties que nous avons indiquées, on trouve toujours dans ces pistils deux petits rameaux cylindriques assez courts, terminés par des tubercules ou mamelons représentant de jeunes feuilles rudimentaires. Ces petits rameaux naissent de l'aisselle de chacune des feuilles carpellaires, et ne sont autre chose que leurs bourgeons axillaires, allongés sous forme d'un axe grêle. En outre du centre de l'ovaire, entre les deux carpelles et de la bave desunie de la cloison, s'élève souvent un axe cylindrique un peu plus fort, portant à son sommet de petites feuilles rudimentaires réunies en capitules; c'est évidemment la prolongation de l'axe même de la fleur. Ainsi tous les organes aviles qui peuvent se présenter dans un rameau portant deux feuilles opposées se trouvent dans l'intérieur de ce pistil, sans qu'aucun d'eux prenne part à la formation du placenta. Enfin, lorsque les feuilles carpellaires, dans leur état de transition à celui de feuilles libres et étalées, commencent à se désunir vers le haut, état qui ne se présente que sur un petit nombre de fleurs, on voit que les carpelles, soudés par le bas, offrent encore leurs lobes foliacés ovuliformes ils paraissent même alors dépendre plus complètement de ces feuilles carpellaires, et ne tendent nullement à constituer une seconde paire de feuilles indépendantes de celles-ci, et disposées en croix par rapport à elles. Il paraît donc très-probable que ces lobes sont une dépendance de chacune de ces feuilles carpellaires, et non les bords de deux feuilles carpellaires supplémentaires et plus intérieures. Il est remarquable cependant qu'à mesure que les feuilles carpellaires prennent plus complètement l'apparence foliacée, et deviennent complètement libres, toute trace de ces lobes latéraux qui remplacent les ovules disparaît, et les deux feuilles qui, sur un très-grand nombre de fleurs, représentent les feuilles carpellaires, sont ovales, très-entières, mais marquées de trois nervures longitudinales très-distinctes; leurs bords ne conservent donc rien de cette forme pinnatifide qu'ils ne paraissent présenter que lorsqu'ils prennent le caractère de placenta.

» On peut aussi remarquer que, dans ces pistils devenus ainsi complètement foliacés, on retrouve les deux petits rameaux axillaires et la prolonga-

tion de l'axe principal portant à son sommet, mais assez loin de l'insertion des feuilles carpellaires, soit un bourgeon composé de petites feuilles dont les plus externes forment une paire en croix avec celles des carpelles, soit plusieurs petits boutons de fleurs avortées.

» Ainsi, dans cette plante à carpelles intimement soudés, nous trouvons que les ovules sont aussi une dépendance et le résultat d'une modification des bords de la feuille analogue à celle que nous avons vue s'opérer sur les carpelles du *Delphinium*. Il est impossible, au contraire, de considérer le placenta comme une dépendance de l'axe principal ou des axes secondaires que nous retrouvons développés sous forme de petits rameaux et existant en même temps que les placenta.

» Il n'y a donc que les pistils à placenta central libre qui paraissent plus difficiles à ramener au même type, c'est-à-dire à des feuilles carpellaires soudées à placement marginale; mais à cet égard on doit remarquer que ces pistils sont formés d'après deux types bien distincts, celui des caryophyllées et des familles voisines, et celui des primulacées et des familles analogues. Là encore les cas de monstruosité viennent confirmer les différences qu'indique dans la composition de ces pistils leur structure normale.

» Ainsi le pistil des caryophyllées présente dans beaucoup de cas des cloisons qui persistent ou disparaissent à une époque plus ou moins avancée de son développement, et les placenta paraissent occuper, comme dans les pistils multiloculaires ordinaires, les bords des feuilles carpellaires rapprochées et soudées autour de l'axe idéal de la fleur. Un cas de monstruosité, d'une silénée (je crois de la saponaire), qui m'a été communiqué par M. Bravais, confirme cette supposition, car les carpelles sont devenus en partie libres et ouverts, et portent les ovules sur leurs bords.

» Au contraire, dans les primulacées il n'y a jamais de traces de cloisons; les ovules sont fixés sur un placenta presque globuleux, non divisible en faisceaux longitudinaux; et dans les cas assez fréquents de monstruosité observés sur des *Primula*, *Anagallis*, *Cortusa*, *Lysimachia*, on n'a jamais vu le pistil se transformer en feuilles carpellaires ovulifères; mais au contraire l'axe placentaire central, s'allongeant sous forme d'une colonne simple, porte des ovules plus ou moins modifiés qui passent à l'état d'autant de petites feuilles distinctes qu'il y a d'ovules.

» Ainsi, dans ce cas, le placenta paraîtrait réellement distinct des feuilles carpellaires et constitué par l'axe floral prolongé portant des petites feuilles disposées en verticilles ou en rosettes, et susceptibles de donner naissance à autant d'ovules. J'ai déjà montré cette transformation des ovules en petites

feuilles plus ou moins rudimentaires et repliées dans une monstruosité de la primevère de Chine, je puis en présenter un second exemple dans l'*Anagallis phanicea*, si ce n'est que tous les ovules sont remplacés par trois ou quatre verticilles de cinq petites feuilles ovales sessiles, bordées de poils glanduleux, mais ne présentant pas de passage à la forme des ovules

Il y aurait donc deux origines différentes pour les ovules l'une appartenant à une immense majorité des végétaux phanérogames, dans lesquels les ovules naîtraient du bord même des feuilles carpellaires et représenteraient des lobes ou dentelures de ces feuilles, l'autre, propre à un petit nombre de familles, telles que les primulacées, les myrtinées, les théophrastées et probablement les santalacées, dans lesquelles les ovules correspondraient à autant de feuilles distinctes portées sur la prolongation de l'axe floral »

NOMINATIONS.

M. le MINISTRE DE LA GUERRE invite l'Académie à désigner trois de ses membres pour faire partie du Conseil de perfectionnement de l'École Polytechnique, conformément à l'article 43 de l'ordonnance du 30 octobre 1832.

Les membres sortants, et qui peuvent être réélus, sont MM. Arago, Poinso et Thenard.

Avant qu'on ne procède au scrutin, M. ARAGO prend la parole pour annoncer qu'ayant eu à se prononcer dans une autre enceinte sur plusieurs des mesures qui pourront être soumises au Conseil de perfectionnement, mesures qui, suivant lui, sont loin d'être des améliorations, il demande à l'Académie de ne pas le désigner pour Commissaire, comme elle a eu la bienveillance de le faire jusqu'ici.

MM. Thenard, Poinso et Poncelet réunissent la majorité des suffrages Les deux membres qui obtiennent le plus de voix après eux sont MM. Liouville et Dupin. Dans le cas où M. Poncelet, qui n'est pas présent à la séance, ferait déjà, à un autre titre, partie du Conseil, M. Liouville y appartenant également, M. Dupin serait le troisième des Commissaires désignés par l'Académie.

MÉMOIRES PRÉSENTÉS.

GÉOLOGIE. — *Terrains diluviens sur le revers méridional des Alpes; par M. H. DE COLLENO.*

(Commissaires, MM. Al. Brongniart, Élie de Beaumont, Dufrénoy.)

« Parmi toutes les hypothèses qui ont été émises pour expliquer le trans-

port des blocs erratiques, il n'en est que deux qui comptent aujourd'hui des partisans sérieux. L'une de ces hypothèses, celle de Saussure et de MM. de Buch et Élie de Beaumont, admet que les blocs ont été entraînés par des courants d'eau d'une violence et d'une étendue immenses. MM. Agassiz, de Charpentier, Forbes, etc., pensent, au contraire, que le transport du terrain erratique est plus facile à expliquer en supposant que les glaciers ont occupé jadis toute l'étendue des vallées de toutes les chaînes des montagnes des zones tempérées. J'ai démontré dans un Mémoire présenté à l'Académie en 1843 (*Comptes rendus*, t. XVI, p. 134), que l'hypothèse glaciaire n'était point applicable au terrain erratique des Pyrénées, tandis que le phénomène diluvien pourrait réellement se répéter dans cette chaîne s'il venait à s'y produire un nouveau dégagement de chaleur analogue à celui qui dut accompagner l'apparition des ophites. J'ai cherché aujourd'hui à juger le mérite comparatif des deux hypothèses en les appliquant successivement à l'explication des phénomènes erratiques du revers méridional des Alpes, et particulièrement de la vallée de l'Adda, que M. Agassiz signale comme ayant été l'un des couloirs par lesquels débouchaient les grands glaciers qui s'étendaient jusqu'à la plaine du nord de l'Italie. Je me suis demandé, en premier lieu, si la fusion des glaces et des neiges des Alpes antédiluviennes pouvait avoir occasionné des courants d'eau capables de transporter les blocs erratiques que l'on trouve sur le mont San-Primo, à 800 mètres au-dessus du lac de Côme. Il est difficile que nous arrivions jamais à des données assez exactes sur la géographie physique de la période pliocène pour calculer rigoureusement quel devait être le volume des glaciers de cette période; mais nous pouvons du moins obtenir une certaine approximation en cherchant ce qui se passerait si les glaciers actuels venaient à fondre subitement par une cause quelconque. Les cimes qui entourent les sources de l'Adda et de ses affluents présentent, depuis le *Pizzo del Piombo* (au nord-ouest de Chiavenna) jusqu'au *Drey-Heeren-Spitz* (au sud-est de Bormio), un développement de 200 kilomètres environ, sur toute la longueur duquel on ne trouve qu'un petit nombre de cols inférieurs à la limite des neiges perpétuelles : parmi les glaciers qui descendent de ces hauteurs, la mer de glace du Bernina occupe à elle seule, d'après Ebel, une longueur de 16 lieues; il n'y a donc point d'exagération à supposer que l'ensemble des glaciers dont les eaux se versent dans l'Adda présente une surface totale de 48 lieues carrées, ou 35 kilomètres carrés, sur une épaisseur moyenne de 200 mètres. Or, la fusion d'une telle quantité de glace serait plus que suffisante pour remplir la vallée de l'Adda jusqu'au niveau des blocs erratiques du San-Primo. Dès lors, si

l'on suppose aux glaciers de la période pliocène une étendue approchant de celle des glaciers actuels, et si l'on admet, avec M. Élie de Beaumont, « que les neiges des hautes montagnes du système des Alpes occidentales aient été fondues en un instant par les gaz auxquels est attribuée l'origine des dolomies et des gypses, » et qu'en même temps, les glaciers fondant à leur base soient partis pour descendre vers le bas des vallées, il n'y aura rien d'impossible à ce que quelques-uns des blocs des moraines médianes de ces glaciers aient été charriés à la surface des eaux jusqu'au San-Primo. On comprendra aussi que la masse des eaux, retenue un instant par la barrière que lui présentait cette montagne, se soit déversée immédiatement après, par les vallées de l'Inco, du Lambro, de Como et de Lugano, pour transporter plus au sud les blocs moins volumineux que l'on rencontre sur les collines de la Brianza, et les cailloux roulés des plaines de la Lombardie.

» Au contraire, la distribution du terrain erratique de la vallée de l'Adda ne saurait être expliquée par l'existence d'un glacier qui se serait étendu jusqu'à la vallée du Pô. Il y a entre le lit de l'Adda à la Serra, et le fond du lac de Como à Bellagio, au pied du San-Primo, une différence de niveau de 116 mètres sur une distance de 111 kilomètres, il s'ensuit que le glacier qui aurait occupé toute la Valteline aurait dû se mouvoir depuis la Serra jusqu'à Bellagio, sur une pente de 0^m,01 par mètre, ou de 35', tandis qu'on ne connaît aujourd'hui aucun glacier qui avance sur une pente de beaucoup inférieure à 3 degrés. Que si l'on voulait faire abstraction de cette première impossibilité, et admettre, avec M. Agassiz, l'existence du grand glacier de la Valteline, on n'en rencontrerait pas moins à chaque pas des faits inexplicables. Ainsi on trouve un amas considérable de blocs granitiques dans le val d'Esino, vallon alpin très-sauvage qui s'ouvre à la rive orientale du lac de Como, à quelques minutes au nord de Varenna. Les cimes calcaires et dolomitiques qui dominent ce vallon vers le sud-est atteignent presque la limite des neiges perpétuelles, et, en effet, au mois de septembre 1843 on voyait encore des plaques de neige sur le revers septentrional du mont Codeno; il suffirait donc d'un abaissement de quelques degrés dans la température moyenne des Alpes pour que le vallon d'Esino fût envahi par les glaces, et par conséquent, si le glacier de la Valteline arrivait jadis jusqu'au San-Primo, il devait exister sur les pentes du mont Codeno un glacier arrivant jusqu'à Varenna. Ce dernier glacier se serait trouvé placé relativement à celui qui descendait des Alpes, comme le glacier du Tacul relativement à la mer de glace de Chamouny, ou bien comme le glacier du Lauteraar relativement à celui du Finsteraar : les fragments éboulés des crêtes du mont Co-

deno seraient descendus jusqu'à la vallée principale, et ils y auraient formé une moraine médiane à la rencontre du glacier venant des Alpes. Dans aucun cas les blocs de ce dernier glacier n'auraient pu remonter vers le mont Codeno. Or, je n'ai vu dans le val d'Esino que des blocs de roches feldspathiques et serpentineuses des Alpes de la Valteline.

On peut donc conclure que jamais les glaciers de la Valteline ne se sont étendus jusqu'au lac de Como; on peut conclure aussi que les blocs erratiques du revers méridional des Alpes, et les cailloux roulés de la vallée du Pô, ont été transportés à leurs positions actuelles par de grands courants provenant, suivant toute probabilité, de la fusion des glaciers antérieurs au dernier soulèvement des Alpes.

CHIMIE APPLIQUÉE. — *Note sur un nouveau procédé pour la fabrication des acétates de plomb et de cuivre; par M. MAIRE.*

Ce Mémoire est, conformément à la demande de l'auteur, compris dans le nombre des pièces qu'aura à examiner la Commission des prix concernant les Arts insalubres

CHIRURGIE — *Exposé des résultats obtenus dans quatorze opérations de lithotripsie; par M. BAUDELOQUE.*

(Renvoyé, conformément à la demande de l'auteur, à la Commission des prix de Médecine et de Chirurgie.)

PHYSIOLOGIE. — *Recherches sur la qualité électrique du sang; par M. DURAND; de Lunel.*

(Commissaires, MM. Becquerel, Velpeau, Rayer)

M. ARAGO met sous les yeux de l'Académie deux plaques de *flint-glass*, fabriquées par M. Guinant, plaques déjà polies et dont on peut apprécier la parfaite homogénéité. La plus grande est un disque de 55 centimètres de diamètre, et a été taillée dans un morceau beaucoup plus grand. M. Guinant présentera prochainement un disque de *crown-glass* de même grandeur que l'on s'occupe maintenant à polir. Des échantillons provenant du même morceau sont joints aux deux disques de *flint-glass*.

(Commission précédemment nommée.)

M. ARAGO présente également divers échantillons de bois d'yeuse de Corse, préparés par M. Werner au moyen d'un procédé de dessiccation qui

empêche le fendillement de ce bois, et le rend propre aux usages de l'ébénisterie. La finesse de son grain et la facilité avec laquelle il prend et conserve les teintes de bois plus précieux, l'auraient depuis longtemps fait employer dans la fabrication des meubles, si l'on avait su comment l'empêcher de se fendre en séchant; faute d'avoir trouvé ce moyen, on était réduit à ne l'employer que comme bois de chauffage, et même, en quelques lieux, on le brûlait seulement pour en faire de la potasse.

MM. Ad. Brongniart, de Gasparin, Payen prendront connaissance du procédé de M. Werner, et en feront l'objet d'un Rapport.

MM. BASTON frères adressent une Notice sur les modifications qu'ils ont fait subir à un *appareil électrique destiné à l'usage des médecins*, appareil qu'ils ont soumis précédemment au jugement de l'Académie, et sur lequel il n'a pas encore été fait de Rapport

(Renvoi à la Commission déjà nommée; M. Magendie y remplacera un membre que l'Académie a perdu depuis la première communication faite par MM. Breton.)

La famille de feu M. DALLERY réclame, en sa faveur, la priorité pour les *chaudieres à vapeur tubulaires*, pour les *mâts creux rentrant les uns dans les autres*, enfin pour l'*emploi des hélices comme propulseurs des navires*, trois inventions qui seraient décrites dans un brevet pris en 1803.

L'Académie décide qu'elle fera examiner les titres de priorité par une Commission composée de MM. Arago, Dupin, Poncelet et Morin.

M. DUPUIS-DALCOURT présente un Mémoire dans lequel il développe les idées qu'il a eues anciennement sur l'emploi des ballons métalliques pour soutirer l'électricité des nuages. M. Dupuis-Dalcourt donne à cet appareil le nom d'*électro-substracteur*.

(Renvoi à la Commission chargée de faire le Rapport sur un Mémoire de M. Marey-Monge, relatif aux ballons construits en lames de métal.)

M. CARTERON soumet au jugement de l'Académie une nouvelle *chaîne d'arpenteur* qui, sans être d'un emploi plus difficile que celle dont on fait ordinairement usage, doit, suivant lui, donner beaucoup plus d'exactitude aux résultats des opérations.

(Commissaires, MM. Mathien, Langier, Mauvais.)

M. SORHANI adresse une Notice sur un *manomètre* qu'il a imaginé; mais dont il n'a pas eu l'occasion de faire d'applications, et qu'il croit pouvoir être employé avec avantage pour mesurer la tension de la vapeur dans le cylindre.

(Commissaires, MM. Mathieu, Morin.)

M. AITIER soumet au jugement de l'Académie des échantillons de *charpie* préparée par un procédé mécanique et qui offrent les différents degrés de finesse que peuvent exiger les besoins variés de la chirurgie.

(Commissaires, MM. Roux, Velpeau.)

M. SCIPION adresse une Note sur un appareil dont il a conçu l'idée, et qu'il nomme *machine à air*.

M. Seguier est prié de prendre connaissance de cette Note, et de faire savoir à l'Académie si elle est de nature à devenir l'objet d'un Rapport.

CORRESPONDANCE.

M. DE GASPARIN fait hommage, au nom de l'auteur, M. E. JACQUERIN, d'un ouvrage ayant pour titre : *L'Agriculture de l'Allemagne, et les moyens d'améliorer celle de la France*.

M. ARAGO met sous les yeux de l'Académie une carte en relief de la France et de la Belgique, fabriquée par M. BAUER KELLER, au moyen d'un procédé de gaufrage qui permet de la donner à un prix très-modéré; cette carte est coloriée de manière à ce qu'on aperçoive au premier coup d'œil l'étendue des principaux bassins des rivières qui arrosent la France et la Belgique. L'auteur a fabriqué, suivant le même système, plusieurs autres cartes géographiques, et se propose d'appliquer son procédé à la construction de cartes géologiques.

ASTRONOMIE — *Éléments elliptiques de la comète de M. Faye*; Lettre de M. Goldschmidt à M. Arago.

« Vous m'avez fait l'honneur d'entretenir l'Académie des Sciences du premier essai que j'ai fait pour représenter par une ellipse le cours de la comète découverte par M. Faye. Ce premier calcul, fondé seulement sur un intervalle de quinze jours, donnait une orbite qui s'éloignait bientôt des observations ultérieures. Par cette raison, je calculai de nouveaux éléments d'après les observations de Paris des 24 et 26 novembre, et les observations de Berlin des 9 et 17 décembre de l'année passée. Ces éléments, que j'ai trouvés dans les premiers jours de janvier, ont été publiés dans le n° 495 des *Astronomische*

Nachrichten de M. Schumacher, et le n° 496 contient la comparaison de ces éléments avec toutes les observations parvenues jusqu'alors à ma connaissance. La marche assez régulière des différences montrait suffisamment que de nouveaux éléments représenteraient encore beaucoup mieux les observations, ainsi, quoique les éphémérides fondées sur les deuxièmes éléments fussent suffisantes pour retrouver la comète pendant toute la durée de son apparition, je ne pouvais pourtant résister au désir d'entreprendre un nouveau calcul fondé sur des positions fondamentales, en ayant égard à toutes les petites corrections. Déjà, au milieu de février, j'envoyai à M. Schumacher ces éléments et leur comparaison avec les observations, pour les publier dans les *Astronomische Nachrichten*, mais, ayant reçu depuis beaucoup de nouvelles observations, je profite de cette circonstance pour vous communiquer de plus amples détails sur ces troisièmes éléments, en vous priant de vouloir bien les présenter à l'Académie des Sciences, si vous les en croyez dignes.

* Les positions qui suivent forment la base de mes calculs

Temps moyen de Berlin	Ascension droite	Déclinaison de la comète
1843 Novembre 17,4	80° 36' 55",0	+ 5° 58' 50",0
Decembre 16,9	78 20 57,0	+ 3 22 35,0
1844 Janvier 10,4	77 6 54,0	+ 3 28 9,0

J'en ai déduit, dans les premiers jours du mois de février les éléments suivants

Passage au périhélie, 1843, octobre	17,51512	temps moyen de Berlin
Mouvement moyen sidéral diurne	479 8425	
Logarithme du demi-grand axe	0,5792721	
Excentricité	0,5541125	
Longitude du périhélie	49° 44' 57",9	} équinoxe moyen de janvier 1844
Longitude du nœud	209 26 7,8	
Inclinaison	11 21 28,4	

Ainsi on trouve facilement

Distance périhélie de la comète	1,6923773
Distance aphélie	5,8986733
Révolution sidérale	2700 ¹ ,884

Pour calculer les coordonnées héliocentriques de la comète par rapport à l'équateur, je me suis servi des formules

$$x = a \sin (t + A) + \alpha, \quad y = b \sin (t + B) + \beta, \quad z = c \sin (t + C) + \gamma,$$

α désignant l'anomalie excentrique, et les valeurs des quantités $a, A, \alpha, b, B, \beta, c, C, \gamma$ étant

			log a	A	α
Pour 1843	Novembre	12,4	0,5351087	134° 1 53 ,7	—1,3658704
1844	Mars	11,4	0,5351015	134 2 11 ,7	—1,3657325
			log b	B	β
1843	Novembre	12,4	0,5349526	53 5 1 ,8	—1,5183687
1844	Mars	11,4	0,5349584	53 5 18 ,2	—1,5184800
			log c	C	γ
1843	Novembre	12,4	9,9740905	74 9 10 ,1	—0,5021813
1844	Mars	11,4	9,9741136	74 9 33 ,4	—0,5022241

A l'aide de ces formules, et en faisant usage des lieux solaires tirés de l'*Annuaire astronomique* de M. Encke, j'ai calculé les lieux géocentriques de la comète que vous trouverez ci-joints. Ces éphémérides donnent l'ascension droite et la déclinaison de la comète de jour en jour pour $9^h 36^m$, temps moyen de Berlin. Le mouvement horaire est déduit en prenant $\frac{1}{8}$ de la différence entre la valeur de l'ascension droite et de la déclinaison du jour passé et du jour suivant. Le logarithme de la distance de la comète à la Terre s'y trouve calculé pour chaque quatrième jour. Au moyen de ces éphémérides, j'ai comparé les observations avec les éléments, et je vous envoie les résultats. J'ai donné le signe + aux excès des lieux calculés sur les observations. Cette comparaison étant déjà achevée, j'ai reçu encore trois observations faites à Berlin dans le mois de février. C'est seulement par cette raison que je les ai mises derrière les observations de Leyde, qui sont d'une date postérieure. L'ascension droite et la déclinaison qui répondent à ces dernières observations sont plus petites de près de 40 secondes que celles que j'ai déduites de mes éléments. J'attendais la publication de toutes les observations qu'on a faites avant d'entreprendre un nouveau calcul des éléments, et je compte beaucoup sur les observations ultérieures faites à l'Observatoire de Paris.

L'orbite correspondante à mes troisièmes éléments s'approche extrêmement de l'orbite de Jupiter, à 210 degrés de longitude. La plus petite distance de ces deux orbites s'élève ici à 0,1199 (la moyenne distance entre la Terre et le Soleil étant prise pour unité). La comète était à cet endroit, pour la dernière fois, le 23 décembre 1838, mais alors la longitude de Jupiter n'étant que $186^{\circ} 11'$, sa distance à la comète s'élevait à 2,254, et selon des calculs dans lesquels, il est vrai, je n'ai pas eu égard aux perturbations très-considérables que la comète éprouve de la part de Jupiter, les deux corps ne se trouverent jamais simultanément très-proches de cet endroit pendant les dix dernières révolutions de la comète. Pendant la dernière révolution, leur moindre distance fut 0,6474, ce qui eut lieu le 21 du mois de mai 1841, la longitude de la comète étant alors de $248^{\circ} 57'$.

Tableau comparatif des observations de la comète découverte par M. Faye, et des lieux calculés d'après ses troisième éléments elliptiques

DATES	DIFFÉRENCE en ascens droite	DIFFÉRENCE en décl. raison	LIEU de l'observation	DATES	DIFFÉRENCE en ascens droite	DIFFÉRENCE en décl. raison	LIEU de l'observation
1843				1845			
26 nov	+13 ^h 2	-11 ^h 8	Paris	15 dec	-0 ^h 2	+3 ^h 5	Berlin
26	-4 ^h 3	+0 ^h 3	Paris	16	+11 ^h 5	-3 ^h 3	Cambridge
27	-4 ^h 3	+1 ^h 4	Paris	17	-1 ^h 0	-3 ^h 3	Hambourg
28	-0 ^h 3	-15 ^h 1	Paris	18	-7 ^h 9	-41 ^h 3	Vienne
29	+6 ^h 0	+4 ^h 8	Cambridge	19	+9 ^h 9	-7 ^h 3	Genève
1 ^{er} dec	+3 ^h 0	-1 ^h 7	Paris	20	+9 ^h 1	-5 ^h 3	Padoue (Santini)
1 ^{er}	+1 ^h 1	-3 ^h 2	Hambourg	21	0 ^h 0	+2 ^h 8	Berlin
2	+2 ^h 1	+6 ^h 7	Altona	22	+25 ^h 2	+10 ^h 2	Padoue (Cont.)
3	+7 ^h 1	+0 ^h 5	Bonn	23	+9 ^h 8	-15 ^h 0	Padoue (Santini)
4	-4 ^h 6	-2 ^h 0	Paris	24	+7 ^h 5	-31 ^h 6	Padoue (Santini)
5	+10 ^h 4	+7 ^h 3	Genève	25	-16 ^h 7	-1 ^h 2	Padoue (Petropoli)
6	+11 ^h 2	+6 ^h 7	Altona	26	+0 ^h 6	-8 ^h 4	Padoue (Santini)
7	-10 ^h 0	+7 ^h 1	Cambridge	27	+6 ^h 7	-39 ^h 9	Padoue (Petropoli)
8	+4 ^h 5	-4 ^h 8	Cambridge	28	+3 ^h 8	-9	Bonn
9	-8 ^h 7	+1 ^h 2	Hambourg	1844			
10	+6 ^h 8	+11 ^h 2	Altona	31 janv	-4 ^h 9	+1 ^h 4	Berlin
11	+2 ^h 6	-0 ^h 5	Berlin	1 ^{er}	+3 ^h 3	-4 ^h 1	Genève
12	+9 ^h 4	+8 ^h 0	Altona (obs au mer)	2	-7 ^h 7	-23 ^h 2	Altona
13	-5 ^h 4	-5 ^h 4	Hambourg (obs au mer)	3	-3 ^h 1	-0 ^h 3	Gottweig
14	-2 ^h 3	+0 ^h 0	Vienne	4	-1 ^h 0	+3 ^h 8	Berlin
15	+9 ^h 8	-3 ^h 3	Manheim	5	+20 ^h 5	-18 ^h 4	Manheim
16	+7 ^h 4	-3 ^h 4	Hambourg	6	-7 ^h 0	+8 ^h 1	Berlin
17	+3 ^h 5	-3 ^h 6	Bonn	7	-2 ^h 5	-9 ^h 9	Manheim
18	+6 ^h 3	-2 ^h 7	Altona	8	-2 ^h 4	-7 ^h 9	Genève
19	+3 ^h 1	+0 ^h 6	Berlin	9	+0 ^h 7	-28 ^h 3	Gottweig
20	+8 ^h 6	-7 ^h 1	Altona (obs au mer)	10	-7 ^h 1	+6 ^h 0	Berlin
21	+1 ^h 0	-5 ^h 1	Bonn (obs au mer)	11	-2 ^h 2	-12 ^h 7	Manheim
22	+8 ^h 3	-27 ^h 7	Vienne	12	+3 ^h 5	-7 ^h 8	Genève
23	-2 ^h 3	-1 ^h 7	Bonn	13	-1 ^h 1	+4 ^h 6	Berlin
24	-6 ^h 8	-1 ^h 8	Paris	14	+10 ^h 8	-43 ^h 0	Manheim
25	-4 ^h 4	-8 ^h 3	Hambourg	15	-3 ^h 9	-7 ^h 5	Gottweig
26	+9 ^h 1	-5 ^h 9	Altona	16	-7 ^h 0	+0 ^h 9	Berlin
27	+7 ^h 2	-3 ^h 6	Altona (obs au mer)	17	+15 ^h 1	-44 ^h 8	Manheim
28	+16 ^h 9	-2 ^h 8	Manheim	18	-3 ^h 5	-8 ^h 6	Genève
29	-4 ^h 5	-18 ^h 7	Vienne	19	-3 ^h 5	-5 ^h 1	Genève
30	+28 ^h 0	-1 ^h 7	Padoue	20	-4 ^h 3	-5 ^h 5	Berlin
31	+0 ^h 8	-1 ^h 7	Bonn	21	-5 ^h 1	-5 ^h 5	Hambourg (obs doute)
1 ^{er} 1844	+7 ^h 6	-8 ^h 9	Hambourg	22	+4 ^h 7	-28 ^h 6	Hambourg
2	+7 ^h 0	-6 ^h 4	Altona	23	+1 ^h 5	-1 ^h 7	Berlin
3	-8 ^h 4	+4 ^h 4	Gottweig	24	+1 ^h 8	-6 ^h 9	Hambourg
4	+6 ^h 8	-4 ^h 3	Padoue (Santini)	25	+0 ^h 4	+0 ^h 0	Genève
5	-1 ^h 2	-9 ^h 8	Padoue (Cont.)	26	-6 ^h 4	-3 ^h 4	Hambourg
6	+5 ^h 5	+4 ^h 3	Berlin	27	+1 ^h 2	-3 ^h 4	Genève
7	+3 ^h 4	-20 ^h 4	Vienne	28	+9 ^h 7	+28 ^h 7	Leyde
8	+19 ^h 9	+3 ^h 5	Padoue (Santini)	29	+3 ^h 5	+44 ^h 3	Leyde
9	+32 ^h 3	-49 ^h 9	Padoue (Cont.)	30	+3 ^h 7	+9 ^h 2	Berlin
10	+2 ^h 4	-5 ^h 7	Vienne	31	+9 ^h 3	+40 ^h 6	Berlin
11	-4 ^h 4	-1 ^h 4	Padoue	1 ^{er} 1845	+8 ^h 9	+32 ^h 0	Berlin
12	+13 ^h 6	-2 ^h 6	Hambourg				
13	+4 ^h 2	+4 ^h 2	Hambourg (obs au mer)				
14	-3 ^h 4	-13 ^h 0	Hambourg				
15	-1 ^h 9	-9 ^h 0	Bonn				

M. F. SERRILLOSA adresse à M. Arago les observations de la grande comète de 1843, qu'il a faites à Buenos-Ayres, de concert avec M. Loria.

Il est donné communication, de la part de M. d'ARCET, de deux Lettres de M. BERGMA, d'Utrecht. Dans la première, adressée à un journaliste de Paris, on lit ce passage :

« Je n'ai pas changé d'opinion concernant l'utilité de la gélatine. Je la considère toujours comme une substance très-utile, et je me fonde sur une expérience de plusieurs années. J'ai vu distribuer journellement mille rations de soupe à la gélatine; j'ai vu les pauvres bien portants et satisfaits. En présence de ces résultats, les expérimentateurs qui crient contre les soupes après avoir tué des chiens, ne me feront pas changer d'opinion. » Dans la Lettre à M. d'Arcet, M. Bergma déclare : « Que ses opinions sont fondées sur d'intimes convictions, et que des observations nombreuses lui ont prouvé l'utilité de la gélatine comme substance alimentaire. »

M. GAY-LUSSAC, à l'occasion de cette communication et de celle qui avait été faite dans la séance précédente, remarque que l'Académie des Sciences ayant soulevé la première cette question, il serait à désirer qu'elle ne laissât pas à d'autres corps savants le soin d'en donner la solution; il demande si la Commission qui avait été chargée de faire des expériences à ce sujet, et qui a déjà communiqué, dans un Rapport fait en 1841, les premiers résultats de son travail, sera prochainement en mesure d'en donner la continuation

M. THENARD, président de la Commission, explique les obstacles qui ont retardé jusqu'ici le nouveau Rapport demandé; il annonce d'ailleurs l'intention de réunir, avant la prochaine séance, les membres de la Commission, afin de prendre, de concert avec eux, les mesures nécessaires pour la continuation des expériences dont le plan est déjà tracé, expériences auxquelles il désirerait que M. Dutrochet voulût bien s'associer.

Conformément à la demande de M. Thenard, M. Dutrochet fera dorénavant partie de la Commission de la gélatine.

MÉDECINS. — *Sur l'action thérapeutique de l'iodure de potassium dans le traitement des tremblements mercuriels et des maladies saturnines; Lettre de MM. N. GUILLON et L. MEUSENS.*

« L'Académie a bien voulu accepter le dépôt d'un billet cacheté que nous

lui avons adressé dans la séance du 9 octobre 1843 Ce billet contient le résultat d'expériences faites sur l'iodure de potassium employé contre les tremblements mercuriels

» Depuis cette époque, de nouvelles investigations nous ont autorisés à croire que l'emploi de la même substance pouvait être utile à tous les individus affectés de maladies saturnines Nous avons la certitude de la guérison de plusieurs malades Il ne nous reste plus qu'à désirer de nouvelles observations

Jusqu'à présent, nous avons administré l'iodure de potassium seul en laissant du reste les malades prendre, lorsqu'ils le peuvent, leur nourriture habituelle Nous portons successivement la dose du médicament jusqu'à 4 ou 6 grammes par jour 200 ou 300 grammes d'iodure nous ont paru suffire à un traitement complet

En donnant à nos recherches une certaine publicité par la communication que nous en faisons aujourd'hui nous n'avons d'autre but que de provoquer des expériences sur l'action d'un médicament tout à fait inoffensif, et nous osons espérer que l'Académie voudra bien nous prêter son appui dans une question qui intéresse un aussi grand nombre d'ouvriers Plus tard nous présenterons le détail de nos observations

M FLEURBAEUF se fait connaître comme auteur d'un Mémoire que l'Académie avait reçu dans la précédente séance et qui porte pour titre *Du Mécanisme terrestre* Ce Mémoire, qui n'était pas signé et n'était accompagné d'aucune Lettre d'envoi, avait été, d'après une ressemblance d'écriture attribuée à M Durand, de Bordeaux

M SIMONIN adresse une réclamation relative à un passage du dernier Rapport sur le concours pour les prix concernant les Arts insalubres M Simonin affirme qu'il emploie depuis longtemps dans sa fabrique de produits chimiques à la Poterie (Seine-Inférieure), le procédé d'épuration du soufre, procédé pour lequel une récompense a été accordée à M Lamy, qui en a pris connaissance dans la fabrique de la Poterie, ou il était employé

M BENOIT prie l'Académie de hâter le travail de la Commission qui a été chargée de faire un Rapport sur diverses Notes qu'il a successivement adressées, Notes relatives à des appareils destinés à marquer la hauteur des marées sans l'intervention d'un observateur

(Renvoi à la Commission précédemment nommée)

MM. GAGNAGE et REGNAULT demandent que le *procédé de désinfection* qu'ils ont soumis au jugement de l'Académie soit admis à concourir pour le prix concernant les Arts insalubres.

(Renvoi à la Commission des prix des Arts insalubres.)

MM FLAUAUT et NOISSETTE adressent un paquet cacheté. L'Académie en accepte le dépôt.

COMITE SECRET.

La Section de Géométrie, par l'organe de M. POINCARÉ, présente la liste suivante de candidats pour une place de Correspondant, vacante par suite du décès de M. Ivory.

En première ligne,

M. Hamilton, à Dublin,

En seconde ligne, et par ordre alphabétique,

MM Lebesgue, à Bordeaux,

Ostrogradsky, à Saint-Petersbourg,

Richelot, à Königsberg;

Steiner, à Berlin.

Les titres de ces candidats sont discutés. L'élection aura lieu dans la prochaine séance : MM les membres en seront prévenus par lettres à domicile.

La séance est levée à 6 heures.

A.

ERRATA.

(Séance du 18 mars 1864)

Page 481, ligne 10, *au lieu de sulfate neutre de zinc, lisez . chlorure neutre de zinc.*

Idem, lignes 16 et suivantes, *au lieu de « quelques essais d'embaumement, sans injection des vaisseaux et sans ouverture des cavités splanchniques, au moyen de la seule macération du cadavre dans la solution saline, » lisez : en entourant le corps de bandes imbibées de chlorure de zinc et en versant dans la bouche la quantité suffisante de ce liquide.*

BULLETIN BIBLIOGRAPHIQUE.

L'Académie a reçu, dans cette séance, les ouvrages dont voici les titres :

Comptes rendus hebdomadaires des séances de l'Académie royale des Sciences, 1^{er} semestre 1844; n° 12; in-4°.

Annales de Chimie et de Physique, par MM. GAY-LUSSAC, ARAGO, CHEVREUL, DUMAS, PELOUZE, BOUSSINGAULT et REGNAULT; 3^e série, tome X; mars 1844; in-8°.

Annales de la Chirurgie française et étrangère; mars 1844; in-8°

Bulletin de l'Académie royale de Médecine, mars 1844, in-8°.

Nouveau Manuel complet des Instruments d'Agriculture et de Jardinage, par M. BOITARD, 1 vol. in-8°.

Recherches et observations sur les causes des Maladies scrofuleuses; par M. LUGOL, 1 vol. in-8°.

Mémoire sur la Théorie des Marées; par M. C. DELAUNAY. (Extrait du *Journal des Mathématiques pures et appliquées*.) In-4°.

L'Agriculture de l'Allemagne, et les moyens d'améliorer celle de la France, par M. E. JACQUEMIN, 1843; 1 vol. in-8°.

Instruction pratique pour l'usage des nouvelles Tables graphiques donnant les superficies de déblai et de remblai des chemins vicinaux de 6 mètres de largeur avec fossés de 1 mètre; par M. L. LALANNE; $\frac{1}{4}$ de feuille in-8°, avec une Table graphique.

Bulletin bibliographique des Sciences médicales et des Sciences qui s'y rapportent; n° 4; octobre, novembre et décembre 1843, in-8°.

Annales des Maladies de la peau et de la Syphilis, par M. CAZENAVE; mars 1844, in-8°.

Journal des Connaissances médicales pratiques; mars 1844, in-8°.

Journal de Chirurgie; mars 1844, in-8°.

Annales d'Obstétrique, des Maladies des femmes et des enfants, publiées par M. ANDRIEUX DE BRIOUDE; 4^e année; janvier et février 1844; in-8°.

Philosophical... Transactions philosophiques de la Société royale de Londres, partie II^e; 1843; in-4°.

Proceedings... Procès-verbaux de la Société royale de Londres, n° 57 et 58; in-8°.

Address... Discours du marquis de Northampton, président de la Société royale, à la séance annuelle de la Société du 30 novembre 1843. Londres, 1843; in-8°.

Astronomical. . . Observations astronomiques faites à l'Observatoire de Cambridge, par M. J. CHALLIS, professeur d'Astronomie et de Physique expérimentale à l'Université de Cambridge; vol. XIII, années 1840 et 1841. Cambridge, 1844; in-4°.

Astronomical. . . Observations astronomiques faites à l'Observatoire royal d'Édimbourg; par M. T. HENDERSON, professeur d'Astronomie pratique à l'Université d'Édimbourg, et astronome royal pour l'Écosse; vol. V, année 1839 Édimbourg, 1842, in-4°.

The Athenæum; novembre 1843, et janvier et février 1844; in-4°.

Bericht uber . . . Analyse des Mémoires lus à l'Académie des Sciences de Berlin, et destinés à la publication; janvier 1844; in-8°.

Gazette médicale de Paris, n° 12.

Gazette des Hôpitaux; n° 33 à 35.

L'Écho du Monde savant; n° 22 et 23.

L'Expérience; n° 351.

COMPTE RENDU

DES SÉANCES

DE L'ACADÉMIE DES SCIENCES.

SÉANCE DU LUNDI 1^{er} AVRIL 1844

PRÉSIDENT DE M CHARLES DUPIN

MEMOIRES ET COMMUNICATIONS

DES MEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE L'ACADÉMIE

A l'occasion de la lecture du procès-verbal, M le **SECRÉTAIRE PERPETUEL** annonce que M *Dupin* a été désigné à M le Ministre de la Guerre comme l'un des trois membres nommés par l'Académie pour faire partie cette année du Conseil de perfectionnement de l'École Polytechnique, M *Poncelet* ayant fait savoir depuis la dernière séance, qu'il appartenait déjà à un autre titre à ce conseil.

PHYSIQUE — *Recherches sur la force élastique de la vapeur aqueuse,*
par M V REGNAULT

J'ai l'honneur de présenter à l'Académie les résultats d'expériences nombreuses que j'ai faites pour déterminer les tensions de la vapeur aqueuse entre les limites de température de -30 et de 150 degrés. Ces expériences font partie d'un travail très-étendu que j'ai entrepris, sur la demande de la Commission centrale des machines à vapeur, dans le but de déterminer expérimentalement les principaux éléments physiques qu'il est nécessaire de connaître dans le calcul théorique des machines à vapeur, savoir la tension

de la vapeur pour les diverses températures, la chaleur latente et la densité de la vapeur à saturation sous différentes pressions, les éléments de la détente, etc., etc. Ces recherches ont nécessité l'établissement d'appareils considérables, pour lesquels M. le Ministre des Travaux publics a bien voulu m'accorder un crédit spécial.

Les résultats que je présente aujourd'hui à l'Académie ne devaient être publiés que plus tard, je me proposais d'attendre que les expériences sur la force élastique de la vapeur dans les hautes températures fussent plus complètes, mais j'ai reçu ces jours derniers un Mémoire imprimé de M. Magnus de Berlin, qui renferme des recherches analogues, entre des limites de températures moins étendues. Cette circonstance me détermine à faire connaître aujourd'hui la première partie de mes expériences, me réservant de les compléter prochainement par les expériences faites sous de plus fortes pressions.

Je ne décrirai pas ici les méthodes très variées que j'ai employées dans mes recherches. Je ne m'arrêterai pas non plus à discuter la valeur des résultats numériques, le Mémoire complet que je dois publier sur cette matière devant paraître très prochainement dans les *Annales de Chimie et de Physique*. Je me bornerai à inscrire les principales séries d'expériences, en donnant les nombres tels qu'ils ont été donnés par l'observation.

TABLEAU N° 4

° SERIE				SERIE			
TEMPERATURES		Moy. no des tempé- ratures	Tens on	TEMPÉRAT. °		Moyenne des tempé- ratures	Tens on
l	o 8	th 7		l	8	l 7	
0 00	0 00	0 00	4 605	24 65	24 69	24 67	21 0
0 10	0 00	0 00	4 60	24 67	24 70	24 69	23
0 20	0 00	0	4 7	28 83	28 87	28 8	29 50
20 16	20 8	20 7	7 12	28 87	28 86	28 84	29 46
20 14	20 8	20 6	7 64	28 83	28 86	28 85	29 18
23 59	23 59	23 59	2 1	33 8	33 84	33 82	33 3
23 7	23 58	23 57	2 12	33 8	33 84	33 82	33
23 45	23 2	23 48	2 56	8 3	18 35	18 33	1 81
23 1	23 51	23 48	2 3	8 34	8 37	8 35	81
28 8	28 2	28 22	28 5	8 36	8 37	8 3	84
28 6	28 25	28 20	28	8 38	18 38	8 38	88
28 03	28 09	28 06	8 3	20 39	20 97	20 98	8 6
28 07	28	28 09	8 3	2 00	20 98	20 99	8 51
31 04	3 1	3 08	33 1	2 01	20 99	2 00	8 6
3 04	3 1	3 08	33 12	25 48	25 47	2 48	1 3
33 51	33 63	33 57	38 1	25 0	2 49	2 43	1 3
33 49	33 1	33 5	38 38	25 52	25 50	25 5	1 4
36 42	36 3	36 48	4 4	25 56	25 51	25 3	1 4
36 38	36 47	36 43	45 35	32 1	32 2	32 9	3 80
36 35	36 40	36 38	45 3	32 18	32 1	32 20	3 88
36 37	36 42	36 40	45 23	30 94	30 96	30 9	33 42
36 54	36 62	36 58	45 76	30 94	30 98	30 96	33 48
36 57	36 62	36 59	4 76	30 94	30 99	30 97	33 5
40 1	40 79	40 75	57 58	30 97	3 00	30 98	33 48
40 65	40 72	40 69	57 38	30 9	31 00	30 98	33 54
44 72	44 78	44 72	0 77	4 8	4 22	34 20	40 22
49 65	49 75	49 70	90 13	34 8	34 23	34 2	40 26
49 65	49 7	49 70	90 74	34 9	34 24	34 22	28
				37 22	37 25	37 23	47 50
				37 22	37 25	37 23	17 44
				37 22	37 25	37 23	47 46
				39 39	39 39	39 33	53 34
				39 37	39 4	39 39	53 36
				39 43	39 44	39 43	53 50
				39 44	39 46	39 45	53 76
19 81	19 83	19 82	17 26	42 58	42 63	42 61	63 22
19 82	19 84	9 83	1 2	42 57	42 60	62 60	63 14
19 82	19 85	9 83	17 2	42 56	42 61	42 59	63 26
22 68	22 73	22 70	20 56	42 57	42 63	42 60	63 26
22 69	22 73	22 71	20 58	16 49	6 50	16 50	14 05
22 70	22 74	22 72	20 56	16 50	16 52	16 52	14 09
24 65	24 68	24 67	23 07	16 54	6 55	16 54	14 07

SERIE			
0 00	0 00	0 00	4 65
0 00	0 00	0 00	4 1
0 00	0 00	0 00	4 65
19 81	19 83	19 82	17 26
19 82	19 84	9 83	1 2
19 82	19 85	9 83	17 2
22 68	22 73	22 70	20 56
22 69	22 73	22 71	20 58
22 70	22 74	22 72	20 56
24 65	24 68	24 67	23 07

TABLEAU N° 2

3 ^e SÉRIE		4 ^e SÉRIE		5 ^e SÉRIE		5 ^e SÉRIE	
TEMPÉRATURE th n° 7	Tensions	TEMPÉRATURE th n° 7	Tensions	TEMPÉRATURE th n° 7	Temps	TEMPÉRATURE th n° 7	Tensions
0 00	4 69	13 60	11 52	21 4	18 36	6 9	7,12
0 00	4 67	13 60	11 52	21 41	19 0	6 22	7 4
0 00	4 67	14 32	12 55	23 66	2 74	7 5	7 73
0 00	4 6	4 92	12 57	23 67	21 76	7 5	7 69
8 20	8 11	14 9	2 57	23 68	21 76	7 1	7 71
8 24	8 8	1 51	13 89	26 01	25 02		
8 27	8 20	16 55	3 9	26 02	25 07		
8 28	8 26	16 55	13 87	26 02	25 07		
9 00	8 58	16 55	13 9	28 80	29 44		
9 00	8 60	18 32	5 53	28 80	29 46		
9 0	8 (2)	18 32	15 61	31 95	35 27		
9 02	8 6	18 32	12 59	31 95	35 27		
9 04	8 68	20 51	17 81	34 79	4 29		
3 92	84	20 51	7 81	34 75	41 25		
3 92	1 86	20 51	17 80	34 72	4 23		
1 92	4	22 84	20 53	38 09	49 51		
6 34	13 82	22 84	20 53	38 09	49 59		
6 35	13 82	22 85	20 5	38 09	49 55		
6 36	13 82	9 98	9 07	40 28	55 73		
9 88	17 2	9 98	9 0	40 28	55 67		
9 88	17 21	9 98	9 07	40 25	5 5		
15 22	3 20	9 98	9 09	46 20	75 76		
1 61	3 22	17 25	14 77	46 24	75 66		
62	13 22	7 25	4 57	46 23	75 88		
62	3 24			5 33	98 29		
				5 33	98 23		
				58 62	133 05		
				58 54	38 81		
				8 49	138 25		
				21 08	8 66		
				21 08	18 61		
				21 08	18 62		
				8 79	8 41		
				8 9	8 44		
				8 79	8 46		
				4 32	6 32		
				4 33	6 30		
				4 34	6 28		
				4 34	6 54		
				4 07	6 54		
				5 00	6 56		
				6 15	7 06		
				6 1	10		

1 ^e SÉRIE		5 ^e SÉRIE	
0 00	4 59	9 3	9 03
0 00	4 59	9 73	9 05
0 00	4 59	1 64	10 27
6 70	7 27	1 62	10 13
6 72	7 27	13 56	0 23
6 74	7 2	3 56	11 62
6 77	7 33	5 56	1 60
7 39	7 66	5 58	13 18
7 41	7 64	7 67	13 16
0 1	7 1	7 67	5 07
10 11	9 3	17 68	15 13
10	9 15	17 68	5 05
17 60	1 51	9 36	16 71
3 60	11 56	9 35	16,70
		2 4	18 94

6 ^e SÉRIE	
0 00	4 58
0 00	4 55
0 00	4 54
0 00	4 6
0 00	4 58
0 00	1 56
0 00	4 58
11 49	9 96
11 52	9 97
54	10 04
1 54	10 02
13 84	1 06
13 84	1 70
13 85	11 70
14 01	1 81
14 06	1 82
14 06	1 85
14 06	3 76
14 06	7 83
19 2	6 34
19 2	6 40
19 3	6 44
15 03	3 36
5 24	3 37
18 10	5 32
18 09	5 32
8 11	5,32
20 28	7 59
20 23	7 56
20 25	7 52
20 29	17 56
20 29	17 64
20 29	17 63

TABLEAU N° 3

6 ^e SÉRIE		8 ^e SÉRIE			9 ^e SÉRIE		
TEMPÉRATURE th n° 7	Tensions	TEMPÉRATURES		Tensions	TEMPÉRATURES		Tensions
		th N	th n° 2		th N	th n° 2	
22 85	20 52	0 00		4 11	-23 00		0 66
22 85	20 58	-27		0 16	-23 71		0 57
22 86	20 56	-28 1		0 38	-23 51		0 50
22 88	20 1	-28 13		0 43	-22 27		0 61
25 1	21 25	-28 00		0 4	-22 0		0 61
25 56	21 22	-27 80		0 18	-20 49		0 76
2 56	24 13	-2 3		0 52	-20 28		0 72
28 4	28 2	-25 00		0 52	-18 78		0 9
28 13	28	-22 74		0 71	-18 9		0 89
30 30	3 9	-21 7		0 71	-7 32	-17 43	01
30 29	31 9	-21 6		0 71	-17 10	-17 14	1 04
32 43	36 6	-8 63		0 93	-1 36	-4 44	1 34
32 12	36 0	-8 41		0 98	-4 7	-4 26	1 38
32 38	36 00	-16 43		1 17	-12 53	-2 59	1 61
32 39	3 93	-16 15		1 15	-12 26	-12 32	1 63
36 3	44 34	-13 20		1 5	-10 60	-10 65	1 97
36 3	44 32	-10 17	-10 71	1 88	-0 47	-10 43	1 39
38 88	5 37	-10 23	-10 11	1 39	-7 81	-7 00	2 40
38 86	11 3	-7 8	-7 1	2 51	-7 14	-7 73	2 40
		-7 56	-7 9	2 49	-6 37	-6 38	2 71
		-5 51	-5 57	2 14	-6 39	-6 41	2 82
		-3 37	-5 43	2 06	-6 20	-6 24	2 83
		-3 72	-3 75	3 39	-4 87	-4 86	3 20
		-3 08	-3 75	3 41	-4 8	-4 84	3 20
					-3 64	-3 64	3 47
					-3 51	-3 52	3 52
					-2 16	-2 11	3 91
					-2 38	-2 40	3 85
7 ^e SÉRIE		9 ^e SÉRIE					
-0 37	4 48	0 00		4 51			
-69	1 70	0 00		4 54			
-8 1	2 39	0 00		4 54			
-4 61	3 13	0 00		4 58			
-7 82	2 46	0 00		4 58	+2 48		5 41
-2 43	3 8	0 00		4 58	+2 24		5 31
-0 83	4 34	0 00		4 57	+2 30		5 32
-30 29	0 13	0 00		4 56	+3 84		5 96
-28 13	0 47	0 00		0 27	+3 85		5 97
-23 95	0 53	0 00		0 28	+5 91		6 91
-19 41	0 88	0 00		0 29	+5 98		6 91
-6 83	1 1	-32 84		0 33	+7 96		7 94
-14 62	1 38	-32 78		0 12	+7 96		7 88
-2 75	1 62	-32 26		0 33	+7 96		7 92
		-30 67		0 34	+9 71		8 87
		-30 89		0 31	+9 70		8 87
		-30 46					
		-29 6					
		-23 23					

TABLEAU N° 4

10 ^e SÉRIE		11 ^e SÉRIE		17 ^e SÉRIE.		15 ^e SÉRIE	
TEMPÉRATUR	TENSION	TEMPÉRATUR	TENSION	TEMPÉRATUR	TENSION	TEMPÉRATUR	TENSION
0,00	1,54	93,64	601,97	47,06	79,09	99,75	750,96
0,00	4,54	94,85	628,63	46,96	79,53	110,67	1095,06
0,00	4,52	95,81	653,04	52,16	109,82	117,44	1364,84
0,00	4,54	96,76	676,18	52,48	104,79	119,25	1447,34
0,00	4,52	98,67	724,28	62,54	164,93	122,85	1618,72
0,00	4,54	100,18	765,11	62,75	169,32	126,17	1793,55
0,00	4,52			70,28	236,62	128,31	1909,25
0,00	4,50			70,60	239,78		
0,00	4,50			75,18	291,31		
0,00	4,54			75,32	293,12		
0,00	4,56			79,50	348,16		
0,00	4,53			82,80	397,74		
0,00	4,56			81,90	432,29		
0,00	4,54			90,68	539,51		
0,00	4,52			93,60	602,08		
0,00	4,52			96,76	676,29		
0,00	6,52			99,89	760,48		
th 107							
7,61	7,64						
9,93	8,94						
12,14	10,46						
16,42	13,60						
11 ^e SÉRIE.		12 ^e SÉRIE.		11 ^e SÉRIE		16 ^e SÉRIE	
41,74	59,46	42,87	64,13	99,83	751,61	121,15	1529,80
47,16	81,19	49,00	87,61	100,73	776,56	123,93	1669,78
62,03	163,04	53,48	109,61	105,08	904,60	128,44	1915,54
71,44	218,17	56,81	128,51	111,71	1131,47	130,18	2017,92
78,94	340,30	60,87	155,25	116,07	1302,30	131,53	2098,05
81,15	419,65	65,86	194,62	122,69	1601,05	133,25	2209,14
87,48	476,46	71,70	251,75	128,50	1925,34	135,66	2386,96
89,75	519,51	76,48	306,57	131,77	2095,58	137,06	2515,09
91,29	550,30	80,12	356,00	135,68	2373,22	138,90	2798,79
92,39	573,97	83,06	401,30	138,31	2561,62	138,70	2991,29
		86,66	462,30	140,94	2757,43	138,82	2966,89
		89,83	522,00	143,88	2995,27	141,57	2801,54
		92,18	569,77	145,66	3149,85	144,13	3010,12
		94,03	610,45	147,47	3306,77	145,75	3161,66
		95,75	651,42			148,25	3360,74
		96,81	677,89				
		98,73	747,11				
		100,17	765,20				
		91,08	547,98				
		94,15	614,93				
		96,50	668,65				
		97,90	679,50				
		97,43	692,57				
		98,40	717,83				
		99,07	734,76				
		99,58	748,88				

» Les températures sont évaluées par rapport au thermomètre à mercure. Je donnerai dans mon Mémoire les températures correspondantes du thermomètre à air, déduites des expériences comparatives faites sur les mêmes thermomètres à mercure qui ont servi dans les expériences de tension.

Des déterminations très-précises de la force élastique de la vapeur d'eau pour les températures peu inférieures à 100 degrés peuvent être obtenues en observant la température de l'ébullition de l'eau à différentes stations, en s'élevant sur une haute montagne. Plusieurs observations de cette nature ont déjà été publiées, mais elles n'inspirent pas une grande confiance, parce qu'il y a en général de l'incertitude sur l'exactitude du thermomètre employé. MM Bravais et Peltier ont bien voulu, à ma demande, faire quelques observations de cette espèce, dans une ascension qu'ils ont faite au Faulhorn pendant l'été de 1842. Le travail que ces physiciens m'ont remis est publié en entier dans le présent numéro des *Comptes rendus*, page 572.

Une autre série d'expériences a été faite au mois de décembre dernier par M Marié, professeur de physique au collège de Saint-Etienne, dans une ascension au mont Pila. Les résultats obtenus par M Marié s'accordent très-bien avec ceux que l'on déduit de mes expériences.

Les nombres obtenus par MM Bravais et Peltier présentent au contraire des différences assez grandes. Je ne vois, pour le moment, aucune manière d'expliquer cette anomalie. Il est à remarquer cependant que leur thermomètre a présenté des irrégularités très grandes dans la position de son zéro.

J'annoncerai à l'Académie que j'ai fait également un grand nombre d'expériences sur les forces élastiques de plusieurs liquides autres que l'eau, sur des dissolutions salines et sur des mélanges de liquides volatils. J'aurai l'honneur de lui communiquer les résultats de ces expériences dans un prochain Mémoire, dans lequel je me propose de traiter le phénomène sous un point de vue général.

Extrait d'une Lettre de M MARIÉ à M Regnault

Le 3 décembre 1843, le baromètre se trouvant à une hauteur inaccoutumée, je me rendis à Lyon, et je fus assez heureux pour y rencontrer une pression peu différente de la pression normale. Autant que je l'ai pu, j'ai toujours plongé mon thermomètre dans la glace fondante immédiatement après l'avoir placé dans l'eau bouillante. Cette précaution est nécessaire, ainsi que l'indiquent les résultats, parce que, outre les déplacements du zéro dus aux variations de température, il en existe d'autres sensibles, qu'il faut attribuer aux variations de pression.

Voici les résultats que j'ai obtenus

Lyon, laboratoire de la Faculté, 3 décembre 1843

$T = 45^{\circ},4$	$45^{\text{mm}},5$	$t = 14^{\circ},6$	$14,95$
$T = 8^{\circ},8$	$8,6$	$H = 75^{\text{mm}},2$	$758,713$

T, température de l'eau bouillante, T', de la glace fondante, t et H, ten-

pression et hauteur du mercure dans le baromètre. Les nombres de la 2^e colonne sont dus à une correction portant pour t et H sur la position des zéros.

$T = 459^{\circ},4$	$459,5$	$t = 14^{\circ},0$	$14,35$
$T = 8^{\circ},8$	$8,7$	$H = 759^{mm},15$	$758,663$

Lyon, Fourvières, au pied de la tour, 3 décembre

$T = 457^{\circ},3$	$457,4$	$T = 457^{\circ},35$	$457,45$
$T = 8^{\circ},85$	$8,75$	$T = 8^{\circ},9$	$8,8$
$t = 6^{\circ},00$	$6,35$	$t = 6^{\circ},1$	$6,45$
$H = 746^{mm},4$	$745,913$	$H = 746^{mm},4$	$745,913$

Saint Étienne, collège, 9 décembre

$T = 453^{\circ},8$	$453,9$	$T = 453^{\circ},8$	$453,9$
$T = 8^{\circ},9$	$8,8$	$T = 8^{\circ},9$	$8,8$
$t = 10^{\circ},8$	$11,15$	$t = 9^{\circ},8$	$10,15$
$H = 725^{mm},45$	$724,963$	$H = 725^{mm},15$	$724,663$

Barcelon, fabrique d'acier fondu, sur le Furens, 10 décembre

$T = 452^{\circ},6$	$452,7$
$H = 717^{mm},6$	$717,113$
$t = 4^{\circ},8$	$5,15$

Roche-Taillée, 10 décembre

$T = 449^{\circ},7$	$449,8$	$T = 449^{\circ},7$	$449,8$
$T = 8^{\circ},8$	$8,7$	$T' = 8^{\circ},9$	$8,8$
$t = 3^{\circ},2$	$3,55$	$t = 8^{\circ},5$	$8,85$
$H = 701^{mm},35$	$700,863$	$H = 701^{mm},80$	$701,313$

La Côte, maison sur le Furens, 11 décembre

$T = 445^{\circ},6$	$445,7$
$H = 680^{mm},85$	$680,363$
$t = 5^{\circ},6$	$5,95$

Bezac, 10 décembre

$T = 443^{\circ},5$	$443,6$	$T = 443^{\circ},45$	$443,55$
$T = 8^{\circ},7$	$8,6$	$T = 8^{\circ},7$	$8,6$
$t = 5^{\circ},8$	$6,15$	$t = 7^{\circ},6$	$7,95$
$H = 667^{mm},3$	$666,813$	$H = 667^{mm},25$	$666,763$

Ferme du Pila, 11 décembre

$T = 441^{\circ},6$	$441,7$	$T = 441^{\circ},6$	$441,7$
$T = 8^{\circ},7$	$8,6$	$T = 8^{\circ},65$	$8,55$
$t = 3^{\circ},2$	$3,55$	$t = 4^{\circ},0$	$4,35$
$H = 656^{mm},7$	$656,213$	$H = 656^{mm},6$	$656,113$

(545)

Sommet du Pila, 11 décembre.

$$T = 43^{\circ},5 \quad \dots 43,6$$

$$H = 646^{\text{mm}},55 \quad \dots 646,063$$

$$t = 0^{\circ},3 \quad \dots 0,65$$

« Je suis parti de la première observation pour calculer la valeur du degré exprimée en divisions de mon thermomètre (1). En supposant qu'une diminution de 27 millimètres de pression donne lieu à une diminution de 1 degré dans la température de l'ébullition de l'eau, la température de cette ébullition a été, à Lyon, dans le laboratoire de la Faculté, de

$$99^{\circ},8767$$

$$99,8782$$

$$\text{Moyenne} \dots 99,8774$$

$$\text{d'où} \dots 1^{\circ} = 4^{\circ},51355$$

« En divisant $T - T^{\circ}$ par 4,51355, j'ai obtenu les nombres renfermés dans la seconde colonne du tableau suivant; les nombres de la première colonne renferment les hauteurs correspondantes à zéro.

	mm	°
756,69	99,87
745,06	...	99,40
723,52	..	98,61
716,45	98,36
700,30	97,70
679,63	96,80
666,94	96,38
655,79	95,95
645,99	95,49

« A la suite de cette communication de M. Regnault, M. Biot met sous les yeux de l'Académie un travail mathématique, dans lequel il a eu des occasions fréquentes d'employer, comme exemples de calcul, des résultats obtenus par M. Regnault dans la série d'expériences dont ce physicien vient de parler. M. Biot discute, d'après ces épreuves, le degré relatif de précision que lui semblent présenter les résultats de M. Magnus comparés à ceux de M. Regnault, et il conclut que ces derniers offrent, sous ce rapport, une incontestable supériorité. »

(1) Le thermomètre avait été gradué et vérifié avec le plus grand soin par M. Marie, dans le laboratoire du Collège de France.

CHIMIE — *Observations critiques sur la théorie des phénomènes chimiques de la respiration; par M. GAY-LUSSAC*

Deux théories principales ont été proposées sur les phénomènes chimiques de la respiration.

• Dans l'une, longtemps adoptée par les chimistes et les physiologistes, la formation de l'acide carbonique et de l'eau, ainsi que la production de l'azote, ont lieu dans le poumon même, au contact de l'oxygène de l'air avec les vaisseaux capillaires sanguins

• Dans l'autre théorie, l'oxygène n'agit plus immédiatement dans le poumon sur le sang, il en est simplement absorbé, et les phénomènes chimiques auxquels il peut concourir se passent hors du poumon, dans le trajet circulatoire, et ce n'est qu'au retour du sang dans le poumon qu'il y verse les produits de l'oxygénation

• Cette dernière théorie, pressentie depuis longtemps, fortifiée et ébranlée tour à tour par quelques faits opposés, a enfin reçu cours dans la science depuis le dernier travail de M. Magnus sur la respiration (1), travail délicat et difficile qui a eu pour objet, en constatant la présence dans le sang de l'acide carbonique, de l'oxygène et de l'azote, de donner à la nouvelle théorie de la respiration une base solide qui lui avait manqué jusqu'à présent. A en juger par l'assentiment de quelques chimistes éminents, et par le silence de la critique, les recherches de M. Magnus semblent avoir fixé les opinions sur les phénomènes chimiques de la respiration, et ce n'est pas sans méfiance que je viens, pressé par les doutes qui se sont élevés dans mon esprit, soulever une discussion qui, du reste, n'a d'autre motif que l'intérêt de la vérité

M. Magnus a d'abord cherché à constater que le sang humain veineux contenait de l'acide carbonique. A cette fin, il a fait traverser le sang par un courant d'hydrogène qui, après avoir été desséché, cédait l'acide carbonique dont il s'était chargé à de la potasse dans l'appareil à boules de M. Liebig. Des expériences, qui ont duré chacune six heures, lui ont donné les résultats suivants

(1) *Annales de Chimie de Physique*, tome LXV, page 169

SANG HUMAIN VEINEUX	ACIDE CARBONIQUE.	OU POUR 100 de sang	ACIDE CARBONIQUE.
66,8	16,6	100	24,8
59,8	12,8	100	21,4
62,6	22,2	100	35,2

» Après vingt-quatre heures, temps au bout duquel le sang n'avait encore aucune odeur :

SANG HUMAIN VEINEUX	ACIDE CARBONIQUE.	OU POUR 100 de sang	ACIDE CARBONIQUE
66,8	24,9	100	37,2
59,8	23,9	100	40,0
62,6	34,0	100	54,0

» En remplaçant l'hydrogène par de l'air, de l'oxygène ou de l'azote, les résultats sont restés les mêmes.

» Je ne m'arrêterai pas à discuter ces résultats, qui prouvent d'ailleurs que le sang contient beaucoup d'acide carbonique; je ferai remarquer seulement qu'ils ne sont pas complets; car il aurait fallu soumettre aux mêmes épreuves le sang artériel qui, lui aussi, contient de l'acide carbonique. Il eût fallu également déterminer les quantités relatives d'oxygène et d'azote contenues dans chaque espèce de sang. Mais cette lacune importante ayant été remplie dans une autre série d'expériences de M. Magnus, en soumettant le sang au vide produit par la machine pneumatique, nous porterons particulièrement notre attention sur les divers résultats qu'il a obtenus dans ces nouvelles circonstances. Nous devons les accepter tels qu'il les a livrés à la publicité, et renvoyer pour les détails d'expérimentation au Mémoire même de M. Magnus. Le tableau suivant renferme tous ces résultats; nous nous sommes seulement permis de les disposer dans un autre ordre. Nous avons

réuni ensemble les résultats qui se rapportent au sang artériel, et séparément de ceux-ci les résultats obtenus avec le sang veineux. Enfin, comme toutes les expériences doivent inspirer la même confiance, et pour atténuer les différences qui pourraient exister d'une expérience à l'autre, nous avons pris la moyenne des résultats pour chaque espèce de sang, sans avoir égard à la nature diverse des animaux qui l'avaient fourni.

Sang artériel .

ORIGINE DU SANG	VOLUME du sang	ACIDE CARBONIQUE	OXYGÈNE	AZOTE
Sang artériel d'un cheval A	125 ^{cc}	5,4 ^{cc}	1,9 ^{cc}	2,5 ^{cc}
Sang artériel d'un cheval très-vieux, mais en bonne santé B	130	10,7	4,1	1,5
Le même sang B	122	7,0	2,2	1,0
Sang artériel d'un veau C	123	9,4	3,5	1,6
Le même sang C	108	7,0	3,0	2,6
	608	39,5	14,7	9,2
Ou, en ramenant à .00 le vol. du sang	100	6,4967	2,4178	1,5131

Sang veineux

Sang veineux du même cheval A, quatre jours après la prise du sang artériel .	205	8,8	2,3	1,1
Le même sang veineux A	195	10,0	2,5	1,7
Sang veineux du même vieux cheval B, recueilli trois jours après	170	12,4	2,5	4,0
Sang veineux du même veau C, re- cueilli quatre jours après .	153	10,2	1,8	1,3
Le même sang veineux C	140	6,1	1,0	0,6
	863	47,5	10,1	8,7
Ou en ramenant à 100 .	100	5,5041	1,1703	1,0081

Avant d'interpréter les résultats contenus dans ce tableau, il est neces-

saire d'exposer plus explicitement que nous ne l'avons fait en quoi consiste la nouvelle théorie.

» Elle admet que, dans l'acte de la respiration, l'oxygène de l'air est absorbé par le sang artériel dans le poumon; qu'il est ensuite entraîné dans le torrent de la circulation; que, dans ce trajet et par le travail secret des capillaires, une certaine quantité se combine, partie avec du carbone pour former de l'acide carbonique qui reste en dissolution dans le sang, partie avec de l'hydrogène pour former de l'eau. Le sang, ainsi chargé d'acide carbonique, et transformé en sang veineux, arrive dans le poumon où il abandonne à l'air son acide carbonique, reprend alors de l'oxygène et, redevenu sang artériel, commence une nouvelle révolution.

» Ainsi M. Magnus doit principalement prouver :

» 1°. Que le sang veineux doit contenir de l'acide carbonique et, au cas où le sang artériel en contiendrait aussi, plus que celui-ci,

» 2°. Que la différence des quantités d'acide carbonique de l'un à l'autre sang doit satisfaire aux exigences de la respiration,

» 3°. Que la quantité d'oxygène absorbée dans le poumon par le sang artériel et abandonnée ensuite dans le trajet de la circulation doit également satisfaire et à la production de l'acide carbonique et à celle de l'eau qui l'accompagne toujours dans l'acte de la respiration;

» 4°. Que le sang veineux doit contenir de l'azote et plus que le sang artériel, au cas où celui-ci en contiendrait aussi.

» Voyons donc si ces diverses conditions seront satisfaites par les expériences de M. Magnus.

» Les résultats renfermés dans le dernier tableau prouvent avec la dernière évidence que le sang artériel et le sang veineux contiennent chacun en dissolution de l'acide carbonique, de l'oxygène et de l'azote. C'est un fait acquis à la science si les expériences de M. Magnus sont incontestables. Mais en examinant les quantités relatives des gaz dans chaque espèce de sang, on y découvre bientôt des contradictions manifestes. Ainsi, tandis que 100 parties en volume de sang artériel ont produit 6,4967 d'acide carbonique, le sang veineux n'en a fourni que 5,5041. Et cependant les quantités relatives de l'acide, dans chaque sang, devraient être évidemment en sens contraire. Conséquemment, s'il n'existe pas quelque erreur inaperçue dans les résultats de M. Magnus, si moi-même je ne me fais pas quelque illusion, la nouvelle théorie de la respiration s'écoulerait avec la base essentielle qui vient à lui manquer; car cette théorie exige que le sang veineux contienne plus d'acide carbonique que de sang artériel, et les expériences mêmes de

M Magnus déposent du contraire, le sang artériel contient 18 pour 100 en plus d'acide carbonique que le sang veineux

Il est vrai que, par son procédé d'expérimentation, qui consiste, comme nous l'avons dit, à soumettre le sang à l'action du vide pour en dégager les gaz qu'il contient, M Magnus n'a peut-être pas retiré du sang le dixième de l'acide carbonique qu'il peut contenir, puisqu'en faisant passer de l'hydrogène dans du sang veineux, il en a obtenu jusqu'à 54 pour 100 d'acide carbonique. Mais on n'en doit pas moins admettre que les fractions d'acide carbonique obtenues par M Magnus doivent être proportionnelles aux quantités absolues contenues dans chaque espèce de sang, et que si, par le fait, elles ne l'étaient pas, il n'y aurait autre chose à en conclure, sinon que les expériences de M Magnus sont tout à fait incomplètes et qu'elles ne peuvent prêter aucun appui à la nouvelle théorie de la respiration.

La même difficulté que pour l'acide carbonique se présente à l'égard de l'azote, le sang artériel devrait en contenir moins que le sang veineux, et, d'après le tableau des résultats de M Magnus, il en contient moitié plus. On sait en effet qu'il se produit de l'azote dans l'acte de la respiration, et M Despretz a prouvé même que le volume s'en élève environ au quart de celui de l'acide carbonique. Les faits seraient donc encore ici formellement en opposition avec la théorie.

Les proportions de l'oxygène marchent seules dans un sens favorable pour chaque espèce de sang, car 100 parties de sang artériel en ont donné 24178, et le sang veineux 1,1763 seulement, ou presque moitié moins. Mais en présence des résultats négatifs que nous avons signalés pour l'acide carbonique et pour l'azote, on peut se demander quelle valeur doit rester à celui concernant l'oxygène. Nous l'accepterons cependant et nous allons en examiner les conséquences.

Il est d'abord évident que puisque l'acide carbonique est produit, pendant l'acte de la respiration, aux dépens de l'oxygène absorbé par le sang, il doit y avoir un certain rapport entre les volumes de ces deux fluides élastiques. Si par exemple, nous connaissions seulement le volume relatif de l'acide carbonique expiré dans un temps donné, nous saurions que le volume correspondant de l'oxygène absorbé doit au moins lui être égal, et cette condition ainsi établie, il serait facile de reconnaître si elle était satisfaite par les résultats directs de l'expérience. Malheureusement, ceux obtenus par M Magnus sur la quantité d'acide carbonique contenu dans le sang artériel et dans le sang veineux, s'infirmement réciproquement et n'ont absolument aucune valeur.

» A défaut donc de données positives qui devraient ressortir du travail que nous discutons, nous puiserons en dehors celles qui nous seront nécessaires, et nous ne pourrons mieux faire que de prendre les données qu'a adoptées M. Magnus. Ces données sont :

» 1°. Que, d'après H. Davy, un homme expire en une minute 13 pouces cubes d'acide carbonique;

» 2°. Que chaque pulsation du cœur fournit 1 once de sang, et qu'en en supposant 75 par minute, il passe 75 onces de sang, soit 115,7 pouces cubes dans le même espace de temps.

» Conséquemment, puisque 115,7 pouces cubes de sang en contiennent 13 d'acide carbonique, 100 de sang en contiendraient 11,23, quantité que pourrait très-bien fournir le sang, car M. Magnus admet, d'après ses expériences, qu'il en renferme bien plus de 20 pour 100.

» Maintenant, en supposant que le sang veineux abandonne 11,23 pour 100 de son volume d'acide carbonique, il est évident que, pour le produire, le sang artériel devait contenir au moins un égal volume d'oxygène, soit 11,23.

» De plus, comme dans l'acte de la respiration, sur 4 parties d'oxygène absorbé il y en a 3 qui se transforment en acide carbonique et 1 en eau, le sang aura dû prendre dans le poulmon non pas seulement 11,23 d'oxygène, mais bien $11,23 + \frac{11,23}{3} = 14,97$, quantité qui est seize fois plus considérable que celle 0,926 que pourrait prendre l'eau pure dans les mêmes circonstances, c'est-à-dire en présence de l'air atmosphérique, et qui s'élèverait à $14,97 \times \frac{100}{21} = 71,3$ si le sang était en contact, au lieu d'air, avec une atmosphère d'oxygène (1).

» Enfin, si l'on admet avec M. Magnus que le sang veineux, à son arrivée dans le poulmon, conserve à peu près la moitié de l'oxygène primitivement contenu dans le sang artériel, la quantité totale que celui-ci devrait en renfermer à sa sortie du poulmon serait, 1° de 14,97 destinés à former de l'acide carbonique et de l'eau, 2° de $\frac{14,97}{2}$ qui restent dans le sang veineux, c'est-à-dire, en somme, 22,45, ce qui supposerait que, en contact avec une atmosphère

(1) J'admets, d'après d'anciennes observations qui me sont communes avec mon illustre ami M. de Humboldt, que l'eau qui a été en contact avec l'air atmosphérique contient $\frac{1}{17}$ de son volume d'air composé de $\frac{1}{4}$ = 0,926 d'oxygène et de $\frac{3}{4}$ = 1,852 d'azote; d'où on conclut que 100 d'eau en contact avec l'oxygène en dissoudraient 4,41, et avec l'azote 2,34.

d'oxygène 100 de sang artériel pourraient prendre $22,45 \times \frac{100}{21} = 106,9$ de gaz ou plus que son volume. Assurément une telle solubilité de l'oxygène dans le sang, vingt quatre fois plus forte que pour l'eau, n'est pas impossible mais encoire aurait il fallu la prouver ou, du moins, la rendre vraisemblable. Je conviendrais, si l'on veut, que les données que j'ai adoptées après M. Magnus n'ont peut-être pas toute la certitude désirable, et qu'on peut à leur égard faire de larges concessions mais même en les altérant beaucoup, les objections tirées d'une solubilité si extraordinaire de l'oxygène dans le sang n'en auraient pas moins encoire une très grande force.

Ici, il est bien nécessaire de s'entendre sur l'idée qu'on doit se former de la réunion de l'oxygène avec le sang. A-t-elle lieu en vertu de l'affinité qui produit les combinaisons? est-ce simplement en vertu de celle qui préside aux dissolutions?

J'ai raisonné dans l'hypothèse d'une simple dissolution. M. Magnus l'a aussi adoptée et il ne pouvait faire autrement. Cela est évident pour l'acide carbonique et pour l'azote, car ces deux gaz devant se dégager du sang au contact de l'air dans le poumon, il fallait qu'ils n'y fussent retenus que par une force très faible, celle qui produit les dissolutions.

Quant à l'oxygène qui après avoir été absorbé par le sang, ne s'en dégage que sous forme d'acide carbonique il semble que M. Magnus aurait pu admettre qu'il se combine immédiatement et d'une manière intime avec le sang. Il aurait ainsi éludé la difficulté que nous avons signalée d'une aussi grande solubilité que celle à laquelle nous avons été conduit pour satisfaire aux exigences de la théorie. Mais voici pourquoi M. Magnus n'a pu avoir recours à l'affinité pour fixer l'oxygène dans le sang. On lui aurait demandé alors pourquoi l'oxygène fixe dans le sang en vertu d'une affinité chimique n'aurait pas immédiatement produit son effet final? pourquoi son action se serait divisée en deux temps, l'un dans le poumon, et l'autre hors du poumon dans les capillaires, pour produire finalement de l'acide carbonique et de l'eau? M. Magnus a compris une difficulté qui aurait eu pour conséquence de faire retomber dans l'ancienne théorie, et il ne pouvait l'éluider qu'en admettant que l'oxygène n'était absorbé par le sang que par une puissance de dissolution.

Après cette explication, il restera bien entendu que tous les gaz qui interviennent dans les phénomènes de la respiration, qu'ils soient absorbés par le sang ou qu'ils s'en dégagent, obéissent qu'à une simple force de dissolution, d'après les règles établies par Dalton.

Dans le but de mieux éclairer la question que nous occupons nous ferons

une nouvelle application avec des données en partie différentes de celles dont nous venons de faire usage

• D'après des expériences récentes de M Bourgeri, un homme adulte respirant librement, introduit à chaque inspiration un demi-litre d'air dans le poumon Il fait 15 inspirations semblables en une minute, et pendant ce même espace de temps le cœur fait 60 pulsations Supposons toujours, comme précédemment, qu'en une minute le cœur pousse 75 onces de sang dans le poumon, ou, ce qui revient sensiblement au même, 2^{lit},3 Enfin, admettons, d'après plusieurs observateurs, au nombre desquels je me place moi-même, que l'air expiré du poumon contient en moyenne 4 centièmes de son volume d'acide carbonique On sera conduit à cette conclusion que, puisque le volume d'air introduit dans le poumon en une minute est de 7^{lit},5, tandis que celui du sang qui le traverse dans le même temps est de 2^{lit},3 ou 3,26 fois plus petit, il faut, d'après la loi de Dalton et en admettant que le sang veineux dissout son volume d'acide carbonique, que pour qu'il puisse donner à l'air dans le poumon 4 centièmes de son volume d'acide carbonique, soit en somme 13 représentant 13 d'oxygène, il en renferme $(1 + 3,26) \times 4 = 17,0$ pour 100 de son propre volume C'est là le minimum d'acide carbonique que devrait contenir le sang veineux et comme le sang artériel en contient aussi, ce minimum serait la différence des quantités d'acide carbonique contenues dans chaque sang

Quant à l'oxygène nécessaire pour former les 13 centièmes de son volume d'acide carbonique que le sang veineux abandonne à l'air dans le poumon, il est bien évident que le sang artériel doit en absorber un pareil volume pour fournir à la production de l'acide carbonique et même un tiers en plus pour fournir à celle de l'eau Or les expériences de M Magnus sont bien loin de satisfaire à ces conditions

M Magnus semble croire que sa théorie est puissamment fortifiée par l'existence de l'acide carbonique dans le sang Il aurait raison si le sang veineux contenait décidément plus d'acide carbonique que le sang artériel, mais, dès que ce résultat est loin d'être constaté, la présence de l'acide carbonique dans les deux sangs ne prouverait autre chose qu'une solubilité pour ce gaz dont pourraient s'arranger toutes les théories

M Magnus explique, en grande partie au moins, le changement de couleur du sang veineux par la perte d'acide carbonique qu'il fait dans le poumon Deux raisons nous empêchent de partager cette opinion la première, qu'il n'est pas démontré que le sang veineux se débarrasse d'acide carbonique dans le poumon, la seconde, qu'en supposant que cela soit, la

quantité d'acide carbonique qu'il conserverait, d'après M. Magnus, serait tellement fautive par rapport à celle qu'il abandonnerait, qu'on ne pourrait plus expliquer par une petite quantité en moins un changement de couleur aussi remarquable.

Je ne veux pas pousser plus loin cette discussion. Tout incomplète qu'elle soit, elle me paraît démontrer que la théorie de la respiration soutenue par M. Magnus ne repose encore sur aucune base solide et qu'un nouvel examen des phénomènes chimiques de la respiration est devenu nécessaire. Je l'avoue, je n'aurais pas osé l'entreprendre seul, mais j'ai la satisfaction d'annoncer que mon illustre confrère, M. Magendie, veut bien s'y associer. De nos efforts réunis, nous espérons du moins, pourront sortir quelques résultats utiles pour une plus parfaite connaissance de l'importante fonction de la respiration.

« M. MAGENDIE dit qu'il vient tout récemment d'analyser comparative-ment le sang artériel et le sang veineux sous le rapport de l'acide carbonique qu'ils contiennent, il a trouvé, en agissant par déplacement, 0^{gr},066 pour 100 grammes de sang artériel, et 0^{gr},078 pour pareille quantité de sang veineux. Ce résultat vient à l'appui de ce que vient de dire M. Gay Lussac sur le désaccord qui existe entre les expériences et la théorie de M. Magnus, car si ce chiffre contredit le fait avancé par ce chimiste, sur la proportion plus grande d'acide carbonique dans le sang artériel comparé au sang veineux, il fournirait une preuve en faveur de sa théorie. »

ELECTRO-CHIMIE — *Addition au Mémoire sur la précipitation des métaux par d'autres métaux, par M. BROQUEL*

Sur l'argenture électro-chimique

Dans mon dernier Mémoire relatif à la précipitation des métaux avec adhérence, j'ai dit que si l'on voulait employer l'action d'un appareil voltaïque composé d'un certain nombre de couples pour donner de l'épaisseur au dépôt, les effets devaient varier, suivant que le métal était plus ou moins attaqué, qu'il pouvait arriver que si le métal précipitant était trop fortement électro-positif, le courant provenant de quelques couples ne fût pas suffisamment énergique pour le rendre assez électro-négatif, afin que la dissolution ne pût pas réagir directement sur lui, mais qu'il n'en était pas de même pour quelques métaux, comme le cuivre par exemple, à l'égard des doubles chlorures de cobalt et de nickel, lesquels exigent, pour être décomposés, le contact du zinc. Depuis la lecture de mon Mémoire, je me suis attaché à rechercher quels étaient les métaux qui jouissaient de

la propriété, avec la dissolution dont je faisais usage, de recevoir des dépôts métalliques d'une certaine épaisseur au moyen des appareils électro chimiques. J'ai commencé par les dépôts d'argent sur le cuivre particulièrement le laiton, et comme l'argenture préoccupe beaucoup aujourd'hui l'industrie, j'ai pensé qu'il serait agréable à l'Académie de connaître les résultats satisfaisants auxquels je suis parvenu. Voici la marche que j'ai adoptée à l'égard des pièces de laiton de bijouterie. Ces pièces, après avoir été dérochées et décapées brillant avec tout le soin possible, sont plongées pendant quelques minutes dans le bain bouillant de double chlorure d'argent et de sodium en solution concentrée aussi claire que possible. Aussitôt que la surface est argentée blanc mat, on la met en communication avec le pôle négatif d'un appareil composé de six à huit couples, en fermant le circuit avec une lame d'argent plongeant dans le même bain et en relation avec l'autre pôle, on laisse continuer l'action décomposante du courant pendant le temps nécessaire pour que le dépôt ait une épaisseur convenable, un quart d'heure suffit ordinairement, comme on le verra ci-après. Il faut avoir soin d'agiter la pièce pour éviter que le sel n'adhère pas à la surface. Il faut aussi que les pièces ne touchent pas au fond du vase qui pouvant se chauffer plus de temps à autre altérerait l'argenture. Cette précaution doit être encore prise par le motif que l'on réduirait le chlorure d'argent en excès et qui n'est pas dissous de sorte que la lame se recouvrirait d'argent métallique pulvérulent. L'opération terminée, on retire les pièces de l'eau, on lave et on sèche à la sciure. Si l'on opère en plein jour, il arrive fréquemment que la pièce jaunit sensiblement en la retirant du bain pour la laver et la sécher, ce qui ne peut être dû qu'à la formation d'une petite quantité de chlorure d'argent. On évite cet inconvénient en opérant, non pas dans l'obscurité, mais dans un demi-jour. Je dois indiquer une cause qui tend à altérer la beauté de l'argent lorsque l'on argente une pièce de cuivre par immersion, la solution prend nécessairement du chlorure de cuivre en échange du chlorure d'argent de sorte qu'après un certain temps, lorsqu'il y a une certaine quantité de cuivre dans la dissolution, le courant dépose non seulement de l'argent mais encore du cuivre. Il suffit, pour éviter cet inconvénient, d'avoir deux bains bouillants, l'un servant à l'immersion, l'autre à l'emploi de la pile.

» J'ai dit que l'on employait l'action de cinq ou six couples, mais si l'on s'aperçoit que le précipité n'a que peu ou point d'adhérence, il arrive qu'en diminuant le nombre on obtient une intensité de courant qui détermine l'aggrégation des molécules. On parvient quelquefois au même but en variant la température. On doit toujours en agir ainsi quand on opère sur

des alliages dont on ne connaît pas bien la composition. Si l'on remplace l'électrode en platine par un autre en argent, il n'est plus nécessaire d'employer autant de couples, par la raison que l'argent étant attaqué, l'électricité circule plus facilement. On y trouve encore l'avantage d'avoir toujours une solution au maximum de saturation de chlorure d'argent.

Voici les résultats de deux expériences qui montreront la quantité d'argent qui peut être déposée dans un temps donné avec quelques couples voltaïques seulement. On a pris une lame de laiton de 3 centimètres de long sur 1 de large, et présentant une superficie de 12 centimètres carrés; pesée avant et après l'opération, elle a donné une augmentation de poids de 2 milligrammes. La différence entre le poids de l'argent déposé et celui de cuivre enlevé était donc dans le rapport de 0^{re},016 par décimètre carré. Cette pièce a été soumise ensuite à l'action d'un courant provenant de neuf couples et pendant 10 minutes. L'augmentation de poids a été de 0^{re},005. Cette fois il n'y avait pas eu perte de cuivre comme la première, où l'on avait argenté par immersion. Il s'est donc déposé près de 0^{re},05 d'argent par décimètre carré.

On a fait une autre expérience avec une lame ayant 0^m,054 de long sur 0^m,026, présentant une superficie de 28 centimètres pour les deux faces. Après l'avoir argentée par immersion, on l'a soumise à l'action de neuf couples, en opérant dans les mêmes circonstances, de deux en deux minutes, la lame était retirée du bain, lavée, séchée et pesée. Voici les augmentations de poids obtenues dans sept expériences.

numéros des expériences	durée de l'immersion	poids de l'argent déposé
1	2 minutes	0 ^{re} ,011
2	2	0,013
3	2	0,008
4	2	0,010
5	2	0,009
6	2	0,008
7	2	0,007
Total ...		0,066

On voit par ces résultats que dans l'espace de 14 minutes, sur une surface de $28^{\circ},08$, il s'est déposé $0^{\text{r}},066$ d'argent, c'est à dire $0^{\text{r}},23$ par décimètre carre, d'où l'on conclut que la couche d'argent a $0^{\text{mm}},23$ d'épaisseur à la surface de la lame. Si l'on eût prolongé l'expérience, il est certain que l'épaisseur se serait augmentée en raison du temps. Si l'on jette les yeux sur le tableau, on voit que la quantité d'argent a été en diminuant, et qu'elle n'est pas proportionnelle au temps quand le courant a une force sensiblement constante. Je dois faire observer que la lame étant continuellement en mouvement dans le bain, tantôt au milieu tantôt sur les bords, il pouvait très bien se faire que la température ne fût pas partout la même, et que des lors l'action du courant ne fût pas identique dans tous les instants.

Pour m'assurer si les pièces argentées par la méthode que j'ai décrite réunissaient les qualités exigées par le commerce, j'ai prié M. Mourey de faire donner à ses ouvriers un certain nombre de pièces sans leur dire comment elles avaient été argentées, afin de les berner, et leur faire subir toutes les préparations d'usage. Ces pièces, comme l'Académie peut le voir, ont résisté à toutes les épreuves et préparations d'usage, entre autres l'espèce de mise en couleur de M. Mourey, laquelle consiste à tremper la pièce dans une dissolution de borate de soude, et à l'exposer ensuite à une température suffisante pour opérer la fusion aqueuse. Par ce moyen on dissout probablement le sous-chlorure et en général les sous-sels métalliques. Je dois faire remarquer que tous les alliages de cuivre ne se pretent pas aussi bien que le laiton de la bijouterie au mode d'argenture dont il est question, principalement ceux qui renferment une forte proportion de zinc, parce qu'alors cet alliage devient assez fortement électro-positif. Cet état pourrait être vaincu en employant un courant plus énergique que celui dont je me suis servi. On peut encore dans quelques cas, obtenir de bons résultats au moyen d'un expédient que je vais indiquer.

Lorsqu'un morceau de cuivre, parfaitement poli et décapé, est platiné par immersion, d'après les indications du Mémoire que j'ai lu à l'Académie il y a quinze jours, ce platine est très uniforme et a un beau brillant, mais si l'on touche la pièce avec les doigts humides, les parties touchées se recouvrent d'une couche très faible de couleur roussâtre, que l'eau acidulée par l'acide acétique enlève immédiatement, et la surface reprend son éclat. Cette couleur roussâtre ne peut provenir que de l'oxydation du cuivre par les interstices moléculaires de platine, car l'on sait que le dépôt de ce métal constitue un véritable réseau. L'oxydation du cuivre, dans ce cas, est d'autant plus rapide qu'il constitue

avec le platine un couple voltaïque, de sorte qu'il est plus attaqué que si ce contact n'avait pas lieu

J'ai pensé que si l'on plongeait du cuivre platiné dans une dissolution bouillante de sel marin et de chlorure d'argent qui sert à argenter, le cuivre devait être alors plus attaqué par le chlorure d'argent que s'il n'était pas en contact avec le platine. Il en résulte deux choses par l'action des couples voltaïques cuivre et platine : le chlorure d'argent est décomposé, l'argent se dépose sur le platine, et s'étend peu à peu au delà, de manière à remplir les interstices, il s'ensuit que quand la dissolution d'argent ne peut plus réagir sur le cuivre, parce que les interstices moléculaires sont fermes, l'action décomposante cesse, la pièce lavée et séchée n'éprouve plus ensuite aucune altération. L'argenture obtenue par immersion à l'aide de ce moyen offre une qualité essentielle, une forte adhérence, car elle supporte l'action du brunissoir.

La quantité de platine déposée est tellement minime, que l'industrie ne devra pas être arrêtée par l'opération préliminaire avant de l'argenter. Et en effet, quand on songe que par décimètre carré il ne se dépose pas 3 ou 4 centigrammes de platine, dont le prix est de moins de 1 franc le gramme, on voit que le centigramme ne revient qu'à 1 centime.

Ainsi, la dépense du platine pour argenter après platine ne doit pas augmenter. Certaines pièces de laiton, en raison de la quantité de zinc qu'elles renferment, ne peuvent pas être ou ne sont que difficilement argentées par immersion, et, dans ce cas, l'action d'un courant ne peut être employée, même à l'égard de certains laitons résistants. Dans ce cas, l'argenture après platine est apte à recevoir des dépôts ultérieurs d'argent par l'action d'un courant.

Les détails que je viens d'exposer dans cette Note suffiront aux personnes qui voudront s'occuper du dépôt d'argent sur laiton avec épaisseur.

CALCUL INTÉGRAL — *Mémoire sur les valeurs moyennes des fonctions,*
par M. AUGUSTIN CAUCHY

Soient

$$x = re^{p\sqrt{-1}}$$

une variable imaginaire dont r désigne le module, et

$$f(x)$$

une fonction réelle ou imaginaire de x qui reste continue par rapport à r et

à p , pour toutes les valeurs de r comprises entre deux limites données

$$r = r_1, \quad r = r_2.$$

Enfin, soit s la valeur moyenne de $f(x)$. On aura

$$(1) \quad s = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) dp;$$

et, en vertu d'un théorème que j'ai démontré dans la 9^e livraison des *Exercices d'Analyse*, cette valeur moyenne s restera la même pour toutes les valeurs du module r comprises entre les limites r_1 , r_2 . Mais il peut arriver que la valeur moyenne s de la fonction $f(x)$ vienne à varier quand on suppose précisément $r = r_1$ ou $r = r_2$. Entrons à ce sujet dans quelques détails.

Supposons d'abord, pour fixer les idées, que la fonction $f(x)$ devienne discontinue en devenant infinie, quand on y pose précisément

$$r = r_1,$$

et

$$x = x_1,$$

x_1 désignant tout à la fois une valeur particulière de x dont le module soit x_1 , et une racine simple de l'équation

$$(2) \quad \frac{1}{f(x)} = 0.$$

Alors, en vertu des principes du calcul des résidus, on aura, pour une valeur de r comprise entre les limites, $r = r_1$, $r = r_2$,

$$\int_{-\pi}^{\pi} f(r, e^{p\sqrt{-1}}) dp = \int_{-\pi}^{\pi} f(r, e^{p\sqrt{-1}}) dp - \pi \mathcal{E} \left(\frac{f(x)}{x} \right),$$

le signe \mathcal{E} étant relatif à la seule racine x_1 de l'équation

$$\frac{1}{f(x)} = 0.$$

En d'autres termes, on aura

$$\int_{-\pi}^{\pi} f(r, e^{p\sqrt{-1}}) dp = \int_{-\pi}^{\pi} f(r, e^{p\sqrt{-1}}) dp - \pi \mathcal{E} \left(\frac{1 - \frac{x_1}{x}}{x - x_1} \right) f(x).$$

Donc par suite, tandis que le module r passera d'une valeur plus grande que r_1 à la valeur r_1 , la valeur moyenne δ de la fonction $f(x)$ se trouvera diminuée de la moitié du résidu

$$(3) \quad \oint \frac{\left(1 - \frac{x_1}{x}\right) f(x)}{(x - x_1)}.$$

Ainsi, en particulier, si l'on prend

$$f(x) = \frac{1}{(x-1)(x-2)},$$

on verra la valeur moyenne de la fonction $f(x)$ se réduire, pour un module de x compris entre les limites

$$x = 1, \quad x = 2,$$

à la quantité $+\frac{1}{2}$, et pour le module 1 de x , à la quantité

$$1 - \frac{1}{2} \oint \frac{1}{x(x-1)(x-2)} = 1 - \frac{1}{2} = \frac{1}{2}.$$

Supposons en second lieu, que la fonction $f(x)$ devienne discontinue en devenant infinie quand on y pose

$$r = r_1,$$

et

$$x = x_1,$$

x_1 désignant tout à la fois une valeur particulière de x dont le module soit r_1 , et une racine simple de l'équation (2). Alors, en raisonnant toujours de la même manière, on prouvera que la valeur moyenne δ de la fonction $f(x)$ se trouve généralement augmentée de la moitié du résidu

$$(4) \quad \oint \frac{\left(1 - \frac{x_1}{x}\right) f(x)}{(x - x_1)},$$

tandis que le module r passe d'une valeur plus petite que r_1 à la valeur r_1 .

Nous avons supposé, dans ce qui précède, que x_1 ou x_1 représentait une racine simple de l'équation (2). Alors le résidu (3) ou (4) n'est autre chose

que la véritable valeur du produit

$$(5) \quad \left(1 - \frac{x}{x}\right) f(x),$$

correspondante à $x = x$, ou la véritable valeur du produit

$$(6) \quad \left(1 - \frac{x}{x}\right) f(x),$$

correspondante à $x = x$. Mais il peut arriver que, x étant une racine de l'équation (2), la valeur x de x rende, par suite, la fonction $f(x)$ infinie, et réduite en même temps à zéro le produit (5). C'est en effet ce qui aura lieu si l'on suppose, par exemple

$$(7) \quad f(x) = \frac{F(x)}{\left(1 - \frac{x}{x}\right)^{\mu}},$$

l'exposant μ étant réel et non supérieur à l'unité, et $F(x)$ désignant une fonction qui conserve une valeur finie pour $x = x$. Or comme, dans ce cas, le produit (5) s'évanouira pour $x = x$, il est naturel de penser qu'alors la valeur moyenne s de la fonction $f(x)$ restera invariable, tandis que le module r de x passera d'une valeur plus grande que r à la valeur r . Pour transformer cette conjecture en certitude, il suffit d'observer qu'à l'aide d'une intégration par parties, on tirera de la formule (1), jointe à la formule (7),

$$(8) \quad s = -\frac{1}{2\pi(1-\mu)x} \int_{-\pi}^{\pi} x \left(1 - \frac{x}{x}\right)^{1-\mu} D_x [x F(x)] d\varphi,$$

et que cette dernière valeur de s se réduit à une fonction de r qui reste généralement finie et varie par degrés insensibles, tandis que r varie entre les limites $r = r$, $r = r$, de manière à pouvoir même attendre la limite r .

Pareillement, si x est une racine de l'équation (2), mais non une racine simple, la valeur x de x pourra tout à la fois rendre la fonction $f(x)$ infinie et réduire à zéro le produit (6). C'est ce qui aura lieu, par exemple, si l'on suppose

$$(9) \quad f(x) = \frac{F(x)}{\left(1 - \frac{x}{x}\right)^{\frac{1}{\mu}}}$$

l'exposant ν étant réel, mais supérieur à l'unité, et $F(x)$ désignant une fonction qui conserve une valeur finie pour $x = x_r$. Or, comme dans ce cas le produit (6) s'évanouira pour $x = x_r$, il est naturel de penser qu'alors la valeur moyenne s de la fonction $f(x)$ restera invariable, tandis que le module r de x passera d'une limite plus petite que r_r à la valeur r_r . Pour transformer cette conjecture en certitude, il suffira d'observer qu'à l'aide d'une intégration par parties, on tirera de la formule (1), jointe à la formule (8),

$$(10) \quad s = \frac{x_r}{2\pi(1-\nu)} \int_{-\pi}^{\pi} x \left(1 - \frac{x}{x_r}\right)^{1-\nu} D_x \left[\frac{F(x)}{s} \right] dp,$$

et que cette dernière valeur de s se réduit à une fonction de r qui reste généralement finie et varie par degrés insensibles, tandis que r varie entre les limites $r = r_r$, $r = r_r$, de manière à pouvoir même atteindre la limite r_r .

» Lorsque la fonction $f(x)$ est de l'une des formes déterminées par les équations (7), (9), alors, en posant

$$(11) \quad y = r_r e^{\nu \sqrt{-1}}, \quad z = r_r e^{\nu \sqrt{-1}},$$

on trouve

$$(12) \quad f(x) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \frac{z}{z-x} f(z) dp - \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \frac{y}{y-x} f(y) dp,$$

non-seulement pour un module r de x compris entre les limites $r = r_r$, $r = r_r$, mais encore pour l'une des valeurs $r = r_r$, $r = r_r$. Si la fonction $f(x)$ était à la fois des deux formes déterminées par les formules (7) et (9), la formule (12) subsisterait pour $r = r_r$ et pour $r = r_r$. Admettons cette dernière hypothèse; alors on aura, même pour $r = r_r$ et pour $r = r_r$,

$$(13) \quad f(x) = a_0 + a_1 x + a_2 x^2 + \dots + a_{n-1} x^{n-1} + a_n x^n + \dots,$$

les valeurs de a et de a_n étant

$$(14) \quad \begin{cases} a_n = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} z^n f(z) dp, \\ a_{-n} = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} y^n f(y) dp. \end{cases}$$

Alors aussi les deux modules de la série qui représente le développement

de $f(x)$, et qui se prolonge indéfiniment dans les deux sens, seront

$$\frac{r_1}{r}, \quad \frac{r}{r_2},$$

et l'on déduira sans peine, des formules (14), deux limites supérieures aux modules des coefficients a_n et a_{-n} . Par suite, on déduira aisément des formules (13) et (14), deux limites supérieures aux modules des restes qu'on obtient quand on supprime, dans la série que renferme le second membre de la formule (13), les termes dans lesquels les puissances de x ou $\frac{1}{x}$ sont d'un degré supérieur à un nombre entier donné.

Il est bon d'observer que, sans altérer les valeurs de a_n , a_{-n} fournies par les équations (14), on pourra généralement y supposer les valeurs de y, z déterminées, non plus par les formules (11), mais par les suivantes

$$(15) \quad y = x, e^{p\sqrt{-1}}, \quad z = x, e^{p\sqrt{-1}}.$$

Considérons en particulier la valeur de a_{-n} fournie par la seconde des formules (14). Eu égard aux équations (7) et (15), cette formule donnera

$$a_{-n} = \frac{x^n}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} e^{np\sqrt{-1}} \frac{F(x, e^{p\sqrt{-1}})}{(1 - e^{-p\sqrt{-1}})^n} dp,$$

ou, ce qui revient au même,

$$a_{-n} = \frac{x^n}{2\pi} \int_0^\pi \left[\frac{e^{np\sqrt{-1}} F(x, e^{p\sqrt{-1}})}{(1 - e^{-p\sqrt{-1}})^n} + \frac{e^{-np\sqrt{-1}} F(x, e^{-p\sqrt{-1}})}{(1 - e^{p\sqrt{-1}})^n} \right] dp,$$

ou bien encore

$$(16) \quad a_{-n} = \frac{x^n}{\pi} \int_0^\pi \mathcal{Q} \frac{d\varphi}{\left(2 \sin \frac{\varphi}{2}\right)^n},$$

la valeur de \mathcal{Q} étant déterminée par l'équation

$$(17) \quad \begin{cases} 2\mathcal{Q} = e^{\left[n - \left(\frac{\pi}{2} - p\right)\right]\sqrt{-1}} F(x, e^{p\sqrt{-1}}) \\ \quad + e^{-\left[n - \left(\frac{\pi}{2} - p\right)\right]\sqrt{-1}} F(x, e^{-p\sqrt{-1}}). \end{cases}$$

Or, si l'on nomme P le module maximum maximum de l'expression

$$F(x, e^{p\sqrt{-1}}),$$

il est clair qu'en vertu de la formule (17), le module de l'expression imaginaire Φ sera inférieur à P, et qu'en vertu de la formule (16), le module de α_{-n} sera inférieur au produit

$$(18) \quad r^n P \int_0^\pi \frac{\Phi}{\left(2 \sin \frac{p}{2}\right)^k}.$$

Les principes que nous venons d'exposer peuvent être facilement appliqués à la détermination de limites supérieures aux restes de la série qu'on obtient quand on développe le rapport de l'unité à la distance mutuelle de deux planètes, suivant les puissances entières de l'anomalie excentrique, et même de l'anomalie moyenne. C'est ce que nous expliquerons dans un prochain article.

M. PAYEN, rapporteur de la Commission qui avait été chargée par la Société d'encouragement pour l'industrie nationale de rédiger des *Observations* sur le projet de loi relatif aux brevets d'invention, fait hommage à l'Académie d'un exemplaire de ces *Observations*, qui ont été adressées par la Société à MM. les membres de la Chambre des Députés. (Voir au *Bulletin bibliographique*.)

NOMINATIONS.

L'Académie procède par voie de scrutin à la nomination d'un correspondant pour la Section de Géométrie, en remplacement de M. Ivory.

Au premier tour de scrutin, le nombre des votants étant de 50,

M. Hamilton obtient.	39 suffrages,
M. Ostrogradski	5
M. Lebesgue.	2
M. Steiner.	2
M. Stern.	1

Il y a un billet blanc.

M. HAMILTON, ayant réuni la majorité absolue des suffrages, est déclaré élu.

M. MAGENDIN donne sa démission de membre de la Commission de la Gelatine; il fait connaître les motifs qui le portent à prendre cette détermination. Le même académicien expose son opinion sur la gelatine: il affirme

que cette substance est un simple produit chimique, et que dans aucun cas elle ne peut être considérée comme un aliment. »

• Après une discussion qui s'élève à ce sujet, et sur la remarque faite par un membre que le Président de la Commission, M. Thenard, n'est pas présent à la séance, M. Magendie consent à ce qu'il ne soit pas, pour le présent, donné suite à sa demande.

MÉMOIRES LUS.

CHIMIE. — *Sur de nouvelles combinaisons de l'indigo*; par M. AUG. LAURENT.

« Dans son Rapport annuel sur les progrès de la chimie, M. Berzelius, après avoir donné un résumé de ses recherches sur les métamorphoses de l'indigo, de la naphthaline et de l'essence d'estragon, revient encore sur le déplorable abus que je fais de mes travaux. Nous voyons, dit-il, de la manière la plus évidente, que le chlore ne joue jamais le rôle de l'hydrogène; car les combinaisons où il se substitue à l'hydrogène possèdent des propriétés complètement différentes de celles des combinaisons où l'hydrogène n'a pas été substitué. Or, la différence de ces propriétés est due précisément à ce que le chlore joue un rôle différent de celui que joue l'hydrogène.

• Pour m'excuser de revenir si souvent sur cette question, que l'on me permette d'en faire voir en peu de mots toute l'importance.

• Il ne s'agit pas de savoir si tel corps a de l'analogie avec tel autre, si le chlore doit être placé à côté de l'hydrogène (ce que je rejette complètement), mais bien de savoir si les chimistes doivent continuer à s'appuyer sur les théories de M. Berzelius, si les propriétés des corps composés dépendent seulement de l'état électro-positif et négatif de leurs composants; de savoir en un mot si dans les corps bruts, comme dans les êtres organisés, le nombre, la forme et l'arrangement ne sont pas aussi, si ce n'est plus, importants que la matière.

• La question ramenée à ce point de vue, je demanderai la permission de faire un résumé historique des solutions qui ont été proposées, avant d'exposer les nouveaux faits qui viennent la résoudre.

• Il y a huit ans que j'ai publié ces idées pour la première fois. Pendant trois ou quatre ans, j'ai travaillé seul pour les soutenir, malgré les critiques et les railleries qu'elles ont excitées, tant en France qu'en Allemagne. MM. Malaguti et Regnaud furent les premiers qui les adoptèrent, en parle. Jusqu'à M. Dumas les avait repoussés. Ce fut alors qu'il découvrit l'acide

chloracétique, dont j'avais annoncé l'existence et prévu la composition depuis longtemps

» Dans une séance récente, M. Dumas a bien voulu reconnaître que ces idées m'appartiennent; mais il prétend que c'est lui qui en a démontré la valeur par l'expérience.

» Il est bien difficile de croire que des idées si singulières, si opposées à l'expérience et aux théories acceptées par tous les chimistes, se soient présentées à mon esprit sans qu'aucune expérience les eût fait naître.

» Examinons donc les preuves de M. Dumas, et comparons-les à celles que j'ai données.

» M. Dumas a découvert l'acide chloracétique, rien de plus; il a comparé les métamorphoses de ce composé avec celles de l'acide acétique, et il en a conclu que ces deux acides ont la même constitution, et que dans l'un d'eux le chlore occupe la place et joue le rôle que l'hydrogène remplit dans l'autre.

» Voici l'unique expérience sur laquelle M. Dumas s'appuie pour soutenir que ces deux acides sont analogues :

» L'acide acétique donne, sous l'influence des bases, du gaz des marais;

» L'acide chloracétique donne, dans les mêmes circonstances, du chloroforme.

» Or, le gaz des marais et le chloroforme renferment le même nombre d'atomes, donc ils ont la même constitution; donc les acides qui leur ont donné naissance ont également la même constitution.

» Voilà les expériences, voilà les conclusions de M. Dumas.

» Je le demande à tous les chimistes, y a-t-il la plus légère analogie entre les propriétés du gaz des marais et celles du chloroforme? L'acide acétique ne ressemble-t-il pas plus à l'acide formique, ou butyrique, ou valériannique, qu'à l'acide chloracétique?

» Les preuves de M. Dumas sont tellement peu concluantes, qu'elles ont au contraire servi à combattre mes idées et à reculer l'époque de leur adoption.

» Voici les preuves que j'avais données quatre ans avant la découverte de l'acide chloracétique

» La naphthaline soumise à l'action du chlore ou du brome donne naissance au chloronaphtalase, èse, ise et ose, et à des composés bromés correspondants. Tous ces corps se ressemblent au plus haut degré, Tous sont instables par les alcalis, quelle que soit la quantité de chlore ou de brome qu'ils renferment; tous sont volatils sans décomposition.

» Ils peuvent se combiner avec 8 atomes de chlore ou de brome, et donner naissance à une nouvelle série de composés différents des précédents,

mais ils se ressemblent entre eux au plus haut degré. Tous ces acides aux alcalis 8 volumes d'acide hydrochlorique ou hydrobromique, tous, soumis à la distillation, se décomposent de la même manière en perdant 8 volumes d'acide hydrochlorique et en donnant naissance à des composés qui ont de l'analogie entre eux.

• J'ai annoncé que la liqueur des Hollandais donnerait naissance à deux séries de composés; j'ai indiqué le moyen de les préparer, leur composition, et les réactions fondamentales qu'ils pourraient offrir; j'ai prouvé moi-même en partie, par l'expérience, ce que j'avais. Plus tard M. Regnault a constaté par l'expérience que mes prévisions étaient parfaitement exactes. J'ai fait les acides chlorophénésique et chlorophénisique, et j'ai fait voir que, bien que ce dernier renferme, comme l'acide chloracétique, 6 atomes de chlore, il ne sature, néanmoins que 1 atome de base. Je passe sous silence mes travaux sur l'acétate de méthyle chloré, sur les séries chlorées des essences de térébenthine et de citron. Ce que je viens de dire suffit pour prouver qu'avec des composés chlorés qui ont la même constitution, j'ai obtenu, en les décomposant, d'autres corps chlorés qui ont également la même constitution et les mêmes propriétés, tandis que M. Dumas n'a obtenu avec les acides acétique et chloracétique que deux corps qui n'ont pas la plus légère analogie.

• Admettons pour un instant que les preuves que j'ai données pour appuyer mes idées n'étaient pas suffisantes pour convaincre les chimistes, celles de M. Dumas l'étant encore moins, je viens aujourd'hui présenter de nouvelles preuves si claires, si positives, que je suis convaincu que tous les chimistes adopteront la proposition suivante, et qu'ils n'hésiteront pas à m'en regarder comme l'inventeur et le démonstrateur. La voici

• Quoiqu'il n'y ait pas la plus légère analogie entre le chlore et l'hydrogène, quoique l'un de ces corps soit éminemment positif et l'autre négatif, on peut néanmoins les introduire indifféremment l'un ou l'autre, dans un grand nombre de composés, sans altérer sensiblement les propriétés fondamentales physiques et chimiques, de ces composés; d'où il résulte que le nombre, l'arrangement et la forme sont, dans certains cas, plus essentiels que la matière.

• Une partie des faits que je vais citer sont déjà connus; néanmoins je suis obligé de les rappeler, afin d'établir une comparaison entre deux séries de composés chlorés et non chlorés.

« Le tableau suivant me dispensera de toute réflexion. Les nouveaux composés et les nouvelles réactions sont marqués du signe (*).

	MATIERE	CHLORURE	NICHOLORE	BROMURE	VIOLURE
COMPOSITION	$C^{14}As^3 H^{11}O^4 + O^2$	$C^{14}As^3 H^{11}O^4 + O$	$C^{14}As^3 Cl^1 O^4 + O^2$	$H^1 O^4 + O^2$ $C^{14}As^3 B^1 O^4 + O^2$	$H^1 O^4 + O^2$ $C^{14}As^3 B^1 O^4 + O^2$
Propriétés Prisme orange, angle de 131° 16', soluble dans l'eau, alcool et l'éther, décolorations jaunes, volatilisé en partie sans décomposition, etc.					
Avec la potasse, on obtient d'abord un sel rouge violacé Composition	$(C^{14}C^{14}As^3 H^{11} KO^4 + O^2)$	H^1 Cl^1			
Le sel potassique rouge donne, avec le nitrate d'argent, de					
<i>l'acétate d'argent</i>	$(C^{14}C^{14}As^3 H^{11} Ag O^4 + O^2)$	H^1 Cl^1			
Propriétés Couleur lie de vin, granules microscopiques; donne un sublimé blanc par la distillation					
Le sel potassique rouge, versé dans une dissolution de nitrate d'argent ammoniacal, donne de					
<i>l'acétate d'argent ammoniacal</i>	$(C^{14}C^{14}As^3 H^{11} (Ag^1 O^4 + O^2))$	H^1 Cl^1			
Propriétés Couleur lie de vin, paillettes micacées, inclinées, donne un sublimé blanc par la distillation					
Ce sel potassique rouge n'a pas de stabilité, il devient en quelques instants jaune et se transforme, par l'absorption de 2 atomes d'eau, en					
<i>l'acétate de potasse</i> .	$C^{14}As^3 H^{11} KO^4$	H^1 Cl^1			
Propriétés Jaune; paillettes micacées, forme un sel d'argent soluble; traité par les acides, il donne de					
<i>l'acide tartrique</i>	$C^{14}As^3 H^{11} O^4$	H^1 Cl^1			
Propriétés Cet acide n'a pas de stabilité, il se convertit rapidement en iodure par la perte de 2 atomes d'oxygène.					

Nous. Par le signe (14), nous entendons que les propriétés et les réactions indiquées dans la première colonne s'appliquent aux composés chlorés et bromés.

	IMATIVE	CHLORÉE.	BICHLORÉE	BROMÉE	BIBROMÉE
<p>à 0. degré, soluble dans l'eau et l'alcool acide jaune coloré en violet par les acides sou- cr nitreux décomposé par l'ébullition avec les acides nitrique et ammoniacque.</p> <p>L'insaisissable d'ammoniaque, desséché complé- tement perd 1 atome d'eau et se transforme en</p> <p><i>Ac. insaisissable</i></p> <p><i>Prop. etc.</i> Substance jaune, pulverulente se dissout lentement dans l'eau et l'alcool bouil- lant en requérant l'insaisissable d'ammoniaque traitée par les acides concentrés elle se colore à froid en violet, et donne de l'acide insais- issable, à chaud, elle forme de l'insaisissable.</p> <p>(*) L'acide insaisissable traité par le brome perd (en doublant la formule) 10 atomes d'hy- drogène et ne s'échange que 6 atomes de brome il se forme de</p> <p><i>Indol brome</i></p> <p>Comme la substance on n'est pas équivalente il n'y a aucun rapport entre les propriétés de ce composé et celles de l'acide insaisissable. Il est jaune, neutre, inaltérable par les acides et par les alcalis</p>	<p>$C^{10}A^{10}H^{10}O^{10}Ad$</p>	<p>$(*) C^{10}A^{10}Cl^{10}O^{10}Ad$</p> <p>$Id$ Id Id Id Id Id</p>	<p>$* C^{10}A^{10}Cl^{10}O^{10}Ad$</p> <p>$Id$ Id Id Id Id Id</p>	<p>$(*) C^{10}A^{10}Br^{10}O^{10}Ad$</p> <p>$Id$ Id Id Id Id Id</p>	
	<p>$(*) C^{10}A^{10}H^{10}B^{10}O$</p>				

1. Isatine, soumise à l'action de l'ammoniaque, donne une douzaine de composés différents. J'ai déjà fait connaître la composition de quelques-uns. Voici la liste complète.

La chlorisatine et la dibromisatine paraissent donner une série analogue

	ISATINE	CHLORE	DICHLORÉE	BROMÉE
1. <i>Isatine d'ammonium</i> Dissolution rouge.	$(C^{12}A_2^1 H^1 H^1 A_1^1) O^1 + O^1$ <i>Id</i>	H^1 Cl^1 <i>Id</i>	H^1 Cl^1 <i>Id</i>	H^1 Br^1 <i>Id</i>
2. <i>Imésatine d'ammonium</i>	$C^{12}A_2^1 H^1 (H^1 A_2) O^1 + H^1 A_2$	Cl^1		
3 ^o <i>Imésatine</i> <i>Propriétés</i> Jaune pâle, cristallin en prismes, soluble dans l'alcool sous l'influence des acides et des bases, régénère l'isatine et l'ammoniaque.	$C^{12}A_2^1 H^1 O^1 + H^1 A_2$	H^1 Cl^1 <i>Id</i> <i>Id</i> <i>Id</i> <i>Id</i>	<i>Id</i> <i>Id</i> <i>Id</i> <i>Id</i> <i>Id</i> <i>Id</i>	
4 ^o <i>Imasatine</i> <i>Propriétés</i> Gris jaunâtre, grains cristallins, insoluble dans l'eau, l'alcool et l'éther, forme avec l'eau une dissolution presque incolore qui donne par les acides un précipité blanc volumineux soluble dans l'alcool et l'ammoniaque à l'état récent mais qui revient promptement à son état primitif (<i>masé né</i>), n. régénère pas l'isatine et l'ammoniaque sous l'influence des acides et des bases.	$(C^{12}A_2^1 H^{10} O^1 + H A_2)$	H Cl^1 <i>Id</i> <i>Id</i> <i>Id</i> <i>Id</i> <i>Id</i> <i>Id</i> <i>Id</i> <i>Id</i> <i>Id</i>		H^1 Br^1 <i>Id</i> <i>Id</i> <i>Id</i> <i>Id</i> <i>Id</i> <i>Id</i> <i>Id</i> <i>Id</i> <i>Id</i>
5 ^o <i>Amasatine</i> (voyez plus haut)				
6 ^o <i>Matière cristalline en paillettes jaunes</i>	(*)			
7 ^o <i>Matière cristalline en aiguilles orang</i>	(*)			
8 ^o <i>Matière jaune pulvérulente</i>	(*)			
9 ^o <i>Graisses rouges cristallins</i>	(*)			
10 ^o <i>Deux ou trois résines jaunes et brunes</i>	(*)			
11 ^o <i>Matière carminée</i>	(*)			(*)

Pour mieux concevoir la composition de la plupart de ces matières, triplons la formule de l'isatine et représentons-la par le symbole $I^1 + O^1$, on aura la série suivante

(572)

Im = l'imide HAs,

Ad = l'amide

<i>Isatine</i>	P + O*
<i>Imasatine</i>	P + Im*
6°	P + $\left\{ \begin{array}{l} \text{Im} \\ \text{O} \end{array} \right.$
<i>Imasatine</i>	I + $\left\{ \begin{array}{l} \text{Im} \\ \text{O} \end{array} \right.$
8°	P + $\left\{ \begin{array}{l} \text{Im} \\ \text{O} \end{array} \right.$
<i>Amasatine</i>	I + $\left\{ \begin{array}{l} \text{Ad} \\ \text{O} \end{array} \right.$
7°	P + $\left\{ \begin{array}{l} \text{Ad} \\ \text{Im} \\ \text{O} \end{array} \right.$

Après cette lecture M le PRÉSIDENT fut remarquer* que M *Dumas* dont le nom a été cité par M *Regnault* et qui aurait peut-être eu quelque remarque à faire à ce sujet, n'assistait pas à la séance

MEMOIRES PRESENTES

PHYSIQUE — *Observations faites dans les Alpes sur la température d'ébullition de l'eau*, par MM **PELTIER** et **BRAVAIS**

A l'époque de notre départ pour la Suisse au mois de juillet 1842 M le professeur Regnault nous engagea à faire quelques expériences sur le degré d'ébullition de l'eau à des hauteurs de plus en plus grandes au dessus du niveau de la mer, et en conservant l'eau et le thermomètre à la température de l'eau bouillante pendant tout le temps de l'expérience afin d'éviter l'erreur du déplacement du zéro

L'appareil que M Regnault nous confia est à peu près semblable à celui qu'il employa dans ses expériences sur la dilatacion des gaz (*Annales de Chimie et de Physique*, 3^e série t. IV p. 14) Il consistait en un cylindre en fer-blanc de 189 millimètres de diamètre et de 108 millimètres de hauteur ce cylindre était surmonté d'une cheminée cylindrique à double enveloppe dans laquelle devait circuler la vapeur d'eau. L'enveloppe intérieure avait un diamètre de 69 millimètres et une hauteur de 448 millimètres. Le diamètre et la hauteur de l'enveloppe extérieure étaient égaux respectivement à 95 millimètres et à 480 millimètres, un conduit droit long de

2 decimetres, était placé au bas de cette cheminée et servait à conduire la vapeur au dehors. Nous remplissons d'eau jusqu'au $\frac{9}{10}$ environ de sa hauteur le cylindre qui forme le fond de l'appareil et une lampe ordinaire d'esprit de-vin placée au-dessous était suffisante pour porter cette eau à l'ébullition. la vapeur s'élevait alors dans la cheminée, redescendait dans l'espace cylindrique annulaire qui sépare les deux enveloppes l'une de l'autre, et s'échappait libre en passant par le conduit que nous venons de mentionner.

Le thermomètre avec lequel ont été faites les observations nous fut aussi confié par M. Regnault. Cet instrument porte une graduation arbitraire de 800 divisions gravées sur le tube (chacune d'elles a 0^{mm} 6 de longueur). Comme nous le verrons bientôt le degré centigrade correspond à 1250 parties des divisions et $\frac{2}{3}$ de cette graduation. Lui y comprennent la cuvette qui est cylindrique. La longueur totale de l'instrument est de 636 millimètres. Le calibrage intérieur de l'instrument avait été fait avec un grand soin par M. Regnault lui-même. 1) Une Table construite par ce savant nous indiquait les petites corrections que devaient subir les lectures pour que les intervalles des divisions pussent être considérés comme correspondant à des parties du tube de capacité égale.

Au moment de l'expérience le thermomètre est placé verticalement et dans l'eau même de l'appareil. sa cuvette ne plonge pas dans l'eau bouillante mais dans la vapeur qui monte de cette dernière et comme les parois latérales sont elles-mêmes à la température de l'eau bouillante la cause de la vapeur qui circule dans l'enveloppe annulaire extérieure aucun rayonnement provenant de ces parois ne peut venir fausser les indications thermométriques (2). Le plateau cuculure qui termine supérieurement la cheminée est percé dans son centre d'un orifice par lequel le thermomètre peut être introduit ou retiré à volonté en glissant à frottement doux dans un bouchon de liège percé suivant son axe. Il faut avoir le soin d'introduire assez profondément le thermomètre pour que la portion de la colonne mercurielle qui n'est pas exposée à la température de l'intérieur de l'appareil, soit aussi petite que possible. Si on laissait à l'air une portion de colonne équivalente à plu-

1) Sur le mode de construction de ces thermomètres voyez le Mémoire de M. Pierre *Annales de Chimie et de Physique* 3^e série t. V page 428)

(2) On doit à M. Ruberg cette observation importante que la température de la vapeur de l'eau bouillante reste la même, soit que la source d'eau ne contienne que de l'eau pure et distillée soit qu'elle contienne des sels. Toutefois nous avons préféré choisir de l'eau aussi pure que possible.

vieus degrés centigrades, il en résulterait une erreur très-appreciable admettons que la différence entre les deux températures, intérieure et extérieure, soit de 85 degrés, à cette différence de température correspond un changement en volume égal à $\frac{85}{1116}$ ou à 0,015. Si donc la portion de colonne saillante hors de l'appareil valait 10 degrés centigrades de l'échelle du thermomètre, les lectures seraient trop faibles de 0°,15, et cette erreur, qui paraît minime au premier abord, équivaldrait à un changement de quatre millimètres dans la longueur de la colonne de mercure qui mesure la tension de la vapeur.

Il faut aussi prendre quelques précautions pour éviter les erreurs de *parallaxe* dans la lecture du thermomètre, dans ce but, nous nous assurons de la verticalité de l'axe du tube au moyen d'un fil-à-plomb, ensuite, pendant que l'un de nous approchait l'œil pour faire la lecture, le second observateur tendait un fil *horizontalement* entre ses mains et parallèlement au rayon visuel, suivant lequel visait le premier observateur. Il prévenait celui-ci, des que son œil était dans le plan horizontal passant par le fil et par le sommet de la colonne, dans ce moment même, l'observateur chargé de la lecture notait à quel point de l'échelle correspondait le haut du ménisque mercuriel, on pouvait estimer facilement de la sorte les dixièmes de chaque division de l'échelle. Nous nous sommes servis également d'un anneau curseur semblable à ceux des baromètres. Ce moyen a l'avantage de permettre d'opérer étant seul.

La faiblesse de la lampe ne permettait jamais à l'ébullition d'être très-vive et le courant de vapeur n'était pas assez rapide pour que l'on pût soupçonner une différence sensible de pression entre l'intérieur et l'extérieur de l'appareil. Du reste, nous l'avons constaté par l'expérience suivante. Pendant que l'eau était en ébullition et que le thermomètre était stationnaire, nous avons débouché l'orifice qui communiquait directement au réservoir d'eau bouillante, une seconde ouverture donnant dans l'espace annulaire fut également débouchée, et nous avons retiré l'alonge placée à la cheminée de la vapeur. Si la pression intérieure avait surpassé d'une quantité sensible la pression extérieure, on aurait eu un abaissement notable dans le thermomètre. La moyenne de cinq expériences a montré que la différence était si faible, que l'abaissement fut d'environ $\frac{1}{10}$ de degré centigrade. Cette quantité est de l'ordre de celles qu'il est permis de négliger.

Dans cette expérience, il faut avoir le soin de tenir le réservoir d'eau plein au $\frac{1}{10}$, car si l'espace vide était considérable, on aurait une différence de plusieurs divisions tenant à des causes faciles à déterminer.

» Le baromètre employé simultanément pour mesurer la pression extérieure était le baromètre 19 d'Ernst; son diamètre interne est de 7 millimètres. Ce baromètre a été comparé plusieurs fois avec le baromètre Fortin de M. Delcros à Paris (1). Sa dépression capillaire minutieusement mesurée a été trouvée égale à 0^{mm},67 vers le point 760 de son échelle et égale à 0^{mm},65 vers le point 560 de la même échelle (2). En outre, l'exactitude de l'échelle a été vérifiée dans toute l'étendue de ce parcours.

» Les observations que nous avons faites forment quatre groupes ou séries, chacun d'eux correspond à une journée différente. Avant l'observation, on déterminait la position du point zéro, en plaçant le thermomètre dans de la glace fondante. Non-seulement la boule, mais aussi la colonne entière étaient entourées d'une couche de glace de plus de 1 décimètre d'épaisseur; on plaçait ensuite le thermomètre dans l'appareil à ébullition, et dès que la vapeur formait un courant continu à l'issue du conduit d'échappement, l'on notait la lecture thermométrique. Chaque observateur observait deux fois à deux ou trois minutes d'intervalle, et l'on a toujours considéré la moyenne de ces quatre observations comme exprimant la véritable lecture. Dans la seconde série, les observations successives étaient faites à des stations de plus en plus basses à mesure que nous descendions du sommet du Faulhorn (montagne du canton de Berne) vers le lac Brienz. L'appareil était installé sur une botte portée par notre guide, de manière à ce que la lampe pût continuer à entretenir l'ébullition; toutefois, la cuvette du thermomètre appuyait alors contre le fond d'un petit sac en forme d'entonnoir qui était fixé dans l'intérieur du cylindre renfermant l'eau bouillante. C'est sans nul doute à cette précaution que nous devons la conservation de ce fragile instrument au milieu des chances de rupture qu'offrait un semblable voyage. Arrivés à la station prochaine, nous retirions le thermomètre de manière à ce que la cuvette se trouvât située au-dessus du niveau de l'eau et exposée seulement au contact de sa vapeur. L'ébullition a continué de la sorte pendant huit heures consécutives. Les observations du 10 octobre (quatrième série) comprennent aussi une période de huit heures, pendant lesquelles l'eau a été entretenue constamment bouillante,

(1) Voir les comparaisons barométriques faites dans le nord de l'Europe, par MM. Bravais et Martins (*Mémoires de l'Académie de Bruxelles*, tome XIV.)

(2) Ces dépressions ont été obtenues, soit par la Table à double entrée de M. Delcros (*Mémoires de l'Académie de Bruxelles*, tome XIV), soit par celle de M. Bravais (*Annales de Chimie et de Physique*, 3^e série, tome V, page 508).

et le thermomètre à la température d'environ 100 degrés. Nous dirons bientôt quel était le double but de cette dernière série.

» *Corrections des observations.* — Les résultats bruts des lectures barométriques et thermométriques ont dû subir différentes corrections que nous allons énumérer.

» Le baromètre a été corrigé de l'effet de la température propre de sa colonne mercurielle, température indiquée par un thermomètre qui était enchâssé dans sa monture, de telle sorte que sa cuvette était en contact avec le tube barométrique. Comme les observations exigeaient un certain laps de temps, le baromètre, même dans la série ambulante du 6 août, restait exposé au contact de l'air ambiant pendant une demi-heure au moins; cet intervalle était suffisant pour que l'équilibre de chaleur s'établît dans les diverses parties de la monture.

» On a tenu note de la correction constante qu'exigeaient les lectures du baromètre 1g. Cette correction renferme la correction capillaire, les erreurs de l'échelle, etc. Elle peut être considérée comme parfaitement connue d'après les comparaisons faites à Paris avant et après le voyage par le commandant Delcros.

» On a toujours noté les petites différences de niveau qui pouvaient exister entre la cuvette du baromètre et la surface supérieure de l'eau dans la chaudière. Du reste, cette correction a toujours été négligeable.

» Une correction plus importante dépend de la variation de la pesanteur dans les différents lieux. Le mercure, dont le poids mesure la force du ressort de la vapeur, pèse moins sur le sommet d'une haute montagne qu'au bord de la mer, et sur le bord de celle-ci, le poids varie aussi avec la latitude. Nous avons pris pour terme de comparaison la pesanteur g , que l'on observe au niveau de l'Océan, et sous le 45° degré de latitude. Pour tout autre point de la surface terrestre, soient l la latitude, h la hauteur au-dessus de la mer, et R le rayon du globe, on sait que la pesanteur correspondante est égale à

$$g(1 - 0,00259 \cos 2l) \left(1 - \frac{5h}{4R}\right) \quad (*)$$

» Si la pesanteur diminue, la colonne qui contre-balance par son poids le ressort de la vapeur doit s'allonger dans un rapport inverse; les lectures deviennent trop fortes, il faut leur appliquer une correction négative. En

(*) Voir le *Traité de Mécanique* de Poisson, 2^e édit., t. I^{er}, p. 493. Nous avons remplacé le facteur $1 - \frac{5h}{4R}$ par le facteur $1 - \frac{3h}{2R}$.

général si H est la hauteur observée du baromètre, la véritable hauteur dégagée des effets de la variation de la pesanteur terrestre sera

$$H \left(1 - 0.00259 \cos 2l - \frac{5}{4} \frac{l}{R} \right),$$

et représentera la lecture barométrique qui aurait mesuré la tension de cette vapeur au niveau de la mer et sous le 45° degré de latitude. Les latitudes et altitudes de nos observations figurent dans le tableau général de nos observations. La correction à ce double élément est de + 0^{mm} 25 dans une station de Paris elle est de - 0^{mm} 28 sur le Faulhorn. La différence dépasse 1 demi millimètre.

La première correction à faire aux lectures thermométriques nous était indiquée par la petite Table que M. Regnault nous avait communiquée. Table dont le but était de convertir les divisions d'égal longueur en des divisions d'égal volume.

La seconde correction est relative à l'effet de la pression extérieure sur la cavité des thermomètres. Des observations encore inédites de notre ami commun M. Martins prouvent que la pression d'une atmosphère (760 millimètres de mercure) comprime une boule de verre vide d'air de manière à diminuer sa capacité de $\frac{1}{18850}$ de millimètre. Si cette boule est la boule d'un thermomètre à mercure la colonne est allongée par le seul effet de la pression extérieure d'une quantité égale à 0^o 15 de son échelle centigrade puisque le degré vaut $\frac{1}{8850}$ du volume total (1). Tant que le thermomètre est soumis à des pressions de l'air peu différentes de 760 millimètres cette correction est constante et l'on peut se dispenser d'y avoir égard mais lorsque la pression extérieure devient égale à 504 millimètres, comme cela a lieu sur le Faulhorn la diminution de la pression abaisse de 0^o 04 le sommet de la colonne. Cette quantité ne saurait être négligée. Nous verrons bientôt que le degré centigrade correspond à 5^d 625 de notre échelle, donc une pression de 760 millimètres produit un déplacement de 0^d 7,84 dans le haut de la colonne. La correction correspondante à la pression 760 millimètres étant nulle la correction relative à la pression H du baromètre sera

$$+ 0^d 7,84 \times \frac{760 - H}{760}$$

(1) Ce résultat a été obtenu par des expériences de température soit marine et en comparant entre elles les indications de thermomètres à minima dont les uns étaient garantis de la pression ambiante tandis que les autres ne l'étaient pas.

* Si sur un thermomètre à divisions arbitraires, on marque la position du point zéro et du point 100 degrés, on sait que ces positions changent à la longue, il est donc nécessaire de tenir compte de ces variations, mais nous connaissons trop mal leurs lois pour que ces corrections puissent être faites avec une complète certitude, en conséquence, nous n'avons pas cru devoir les introduire dans le tableau qui va suivre; mais toutes les autres déjà mentionnées ont été appliquées préalablement aux nombres que renferment les tableaux

TABLEAU I

EPOQUE	LIEU	LATITUDE	ALTITUDE	THERMOMETRE	BAROMETRE	CIRCONSTANCES
1 ^{re} Serie 3 août 1842				autres à vis ses	à vis ses	
9 ^h 0 ^m mat	Auberge du Faulhorn	46°40	2674	104,88 N F	534,10	Neige bien pure
Midi	<i>Id</i>	"	"	620,71 E B	554,45	
5 ^h 0 ^m soir	<i>Id</i>	"	"	104,26 N F	"	Neige bien pure
2 ^e Serie 6 août 1842						
6 ^h 25 ^m mat	Auberge du Faulhorn	46 40	2674	(104 66) N F	556,90	Neige bien pure
8 ^h 10 ^m	<i>Id</i>	"	"	621,46 E B	556,02	
10 ^h 48 ^m	En plein air	46 41	2234	630,27 E B	587,73	
11 ^h 40 ^m	Un chalet	46 41	1830	637,73 E B	618,76	
1 ^h 8 ^m soir	Un deuxième chalet	46 42	1328	646,87 E B.	654,01	Les rayons pâles et affaiblis du soleil
2 ^h 0 ^m	Dans la forêt	46 43	960	652,89 E B	682,04	trappent le barom.
4 ^h 30 ^m	Auberge du Griesbach	46 43	663	658 14 E B	705,60	
	<i>Id</i>	"	"	103,31 N F	705 60	Neige bien pure
3 ^e Serie 30 sept. 1842						
2 ^h 50 ^m soir	Cabinet à Paris	48 50	50	106,37 G F	761,00	Glace pure
3 ^h 30 ^m	<i>Id</i>	"	"	670,11 E B	760 28	
4 ^h 5 ^m	<i>Id</i>	"	"	105,76 G F	761,00	Glace pure.
4 ^e Serie 10 oct. 1842						
11 ^h 0 ^m mat	Cabinet à Paris	48 51	65	105,30 G F	767,40	Glace pas très pure
11 ^h 20 ^m	<i>Id</i>	"	"	671,12 E B	767,28	
1 ^h 25 ^m soir	<i>Id</i>	"	"	671,10 E B	766,85	
3 ^h 35 ^m	<i>Id</i>	"	"	670,98 E B	766,20	
4 ^h 53 ^m	<i>Id</i>	"	"	670,94 E B	765,74	
6 ^h 30 ^m	<i>Id</i>	"	"	670,97 E B	765,68	
7 ^h 20 ^m	<i>Id</i>	"	"	670,92 E B	765,62	
8 ^h 20 ^m	<i>Id</i>	"	"	103 88 G F	765,60	Glace pas très pure

Les premières colonnes de ce tableau donnent le jour, l'heure et le lieu de l'observation, les deux suivantes, la latitude du lieu et sa hauteur au-dessus de la mer. Puis viennent les lectures corrigées du thermomètre de M. Regnault. Les initiales N F, G F, signifient que le thermomètre était placé dans la neige fondante, les initiales E B indiquent qu'il était exposé à la vapeur de l'eau bouillante. La colonne suivante donne la hauteur barométrique corrigée d'après les indications précédentes, à la dernière colonne figurent les remarques relatives à chaque observation.

Une seule fois, le 6 août, avant l'observation, l'on a omis de vérifier la position du point zéro au commencement de la série, ainsi le nombre 104^d 66 n'est pas un résultat d'observations directes, il est intercalé dans cette série pour combler une lacune qui sans lui existerait dans notre tableau. Nous dirons bientôt pourquoi nous avons cru devoir adopter ce nombre 104 66 comme représentant la position au point zéro à cette époque.

Pour pouvoir traduire les lectures du thermomètre en degrés centigrades, nous avons maintenant un double problème à résoudre : à quelle division de l'échelle correspond le point 0 degré ? à quelle division correspond le point 100 degrés ?

Si l'on détermine sur un thermomètre le point de la glace fondante, si l'on porte ensuite le thermomètre à la température de 100 degrés, et que l'on vérifie de nouveau la position du point zéro, cette position n'est plus la même que la première fois, on trouve que le zéro s'est abaissé (1). Si l'on abandonne le thermomètre à lui-même, après l'avoir retiré de la glace fondante, ce même point remontera lentement, reviendra à sa hauteur première, et pourra même la dépasser. Ces variations diverses sont indiquées par le tableau précédent. Il existe cependant une exception à la règle que nous venons de signaler, puis que le point zéro s'est abaissé dans l'intervalle de temps compris entre le 30 septembre et le 10 octobre, mais peut-être cette anomalie provient-elle de l'impureté de la glace employée pendant les expériences de cette dernière journée.

Il importerait beaucoup de savoir comment varie le point 100 degrés pendant que le point 0 degré se déplace le long de l'échelle, nos expériences ne sont pas suffisantes pour résoudre complètement cette question, mais il est probable que les deux déplacements sont parallèles l'un à l'autre, et que ces deux points montent et descendent ensemble, de telle sorte que l'intervalle linéaire qui les sépare sur l'échelle thermométrique reste constant.

(1) *Annales de Chimie et de Physique*

L'égalité de la distance de ces deux points 0 degré et 100 degrés est plus constante lorsqu'on observe d'abord le point d'ébullition, et qu'on place ensuite le thermomètre dans la glace fondante. Si l'on met un temps égal entre la lecture à 100 degrés et celle du 0 degré dans la glace fondante, la contraction sera à peu près la même, et donnera un résultat notablement identique. Il n'en peut être de même si le temps est un élément de la contraction ne pouvant apprécier la quantité qui lui appartient, et qui se trouve détruite par la température de l'ébullition, le point de départ à 0 degré est incertain, ou du moins est plus variable qu'en le prenant après l'ébullition, comme le démontrent les résultats de M. Pierre (*Ann. de Chim. et de Phys.*, t. V 3^e série, p. 446-448). Quoi qu'il en soit, comme ce point de la science n'est point encore parfaitement élucidé, nous donnerons dans le troisième tableau la tension de la vapeur d'après l'étendue de l'échelle donnée par le zéro pris avant le point d'ébullition, et d'après l'étendue de l'échelle donnée par le zéro pris après. Si l'on place un tel thermomètre dans la vapeur de l'eau bouillante, sous la pression de 760 millimètres, il indiquera la division T , puis place dans la glace fondante, il indiquera t ; d'après notre hypothèse, $T - t$ doit être constant dans toutes les expériences subséquentes faites dans des circonstances pareilles. En général, si l'on mesure la température x dont la lecture donne θ , la glace fondante donnant t , cette température x sera donnée par la proportion

$$x : 100 \text{ degrés} :: \theta - t : T - t$$

Ainsi par exemple, dans la première série d'observations on pourra déterminer la température x de l'eau qui bout sous la pression de 554^{mm},45 par la proportion

$$x : 100 \text{ degrés} :: 620^{\text{div}} , 71 - 104^{\text{div}} , 26 :: \text{intervalle constant } T - t$$

La position du point zéro n'a pas été vérifiée au commencement des observations du 6 août, pour y suppléer, nous remarquerons que dans la quatrième série, après une ébullition de huit heures à une température voisine de 100 degrés, le zéro s'est abaissé de 105^{div},30 à 103^{div},88, c'est-à-dire de 1^{div},42, nous en avons conclu que, dans la deuxième série, après une ébullition de huit heures sous la température de 95 degrés, le zéro avait dû s'abaisser de 1^{div},35, or la position du zéro a été mesurée à la fin de la série, elle correspondait à 103^{div},31. La somme de ces deux nombres nous a donné 104^{div},66.

Nous avons pareillement dû consulter la série d'observations du 10 octobre pour connaître l'effet d'une ébullition prolongée sur la position du point 100 degrés. Malheureusement, d'un bout à l'autre de cette série, la

pression de l'air n'est pas restée parfaitement constante, mais nous avons pu ramener toutes les lectures à la pression fixe de 766 millimètres. Nos observations montrent, en effet, que les lectures thermométriques augmentent vers 100 degrés de 0^{div} , 18 pour chaque millimètre de plus dans la colonne barométrique qui mesure la tension de la vapeur. Nous avons trouvé ainsi

TABLEAU II

10 OCTOBRE	THERMOMETRE
1 ^{re} observation	à 1000 } Moyennes
2 ^e idem	670,89 } 670,92
3 ^e idem	670,95 } 670,97
4 ^e idem	670,94 } 670,99
5 ^e idem	670,99 } 671,01
6 ^e idem	671,03 } 670,99

Le déplacement du point fixe d'ébullition sous la pression de 766 millimètres a donc été très faible, sa marche a été ascendante et a suivi probablement la série 0^{div} , 00, + 0^{div} , 02, + 0^{div} , 04, + 0^{div} , 06, + 0^{div} , 08, + 0^{div} , 10. Cette marche ascendante a dû se retrouver dans les observations toutes paires du 6 août, en conséquence, nous changerons la lecture 630^{div} , 27 en 630^{div} , 27 - 0^{div} , 02 = 630^{div} , 25. Nous changerons de même 637^{div} , 73 en 637^{div} , 69, et ainsi de suite.

La troisième série nous donne l'intervalle $T - t$, il suffit de changer la pression de 766^{mm} , 28 en 760 millimètres, et de diminuer la lecture 670^{div} , 11, d'après le rapport de 0^{div} , 18 à 1 millimètre on aura alors $T - t = 670^{\text{div}}$, 06 - 105^{div} , 76 = 564^{div} , 30, et par conséquent $1^{\circ} = 5^{\text{div}}$, 43. Nous avons actuellement tous les éléments nécessaires pour déterminer les températures x au moyen des intervalles $\theta - t$. Le tableau suivant met en regard ces températures avec les tensions correspondantes. Une troisième colonne donne ces pressions telles qu'on les conclurait de la Table de M. Biot (1), les différences entre l'observation et le calcul sont inscrites dans une dernière colonne.

(1) Additions à la *Connaissance des Temps* pour 1844

TABLEAU III.

Tension de la vapeur.

TENSION d'après nos observations.	DÉGRÉS de l'échelle du zéro pris avant le point d'ébullition	TENSION d'après la Table de M Biot.	DIFFÉRENCE.	DÉGRÉS de l'échelle du zéro pris après le point d'ébullition	TENSION d'après la Table de M Biot	DIFFÉRENCE
554,3	91,54	557,4	+ 3,1	91,52	557,00	+ 2,70
556,8	91,71	560,9	+ 4,1	91,82	563,22	+ 6,42
587,6	93,27	594,6	+ 7,0	93,38	597,03	+ 9,43
616,6	94,59	624,4	+ 7,8	94,70	626,95	+ 10,35
653,9	96,21	662,7	+ 8,8	96,32	665,37	+ 11,47
682,0	97,28	689,0	+ 7,0	97,39	691,75	+ 9,75
705,6	98,21	712,7	+ 7,1	98,35	716,31	+ 10,71
760,0	100,00	760,0	0,0	100,00	760,00	0,00

» Si nous avons comparé ces mêmes pressions avec celles que fournit la formule du docteur Ure, les différences eussent été, en général, dans le même sens, et cependant moins considérables (1).

» Que conclure de ces différences, de ces anomalies? C'est que de telles observations devront être répétées, que les nouvelles expériences devront être basées sur une connaissance plus parfaite encore des lois du déplacement des points fixes, si toutefois il est possible de saisir quelque irrégularité parmi ces variations incessantes (2); enfin qu'il faudra multiplier les expériences et en varier les circonstances. Peut-être saurons-nous plus tard que nos observations auraient dû être comparées et combinées entre elles d'après

(1) La loi qu'a donnée le docteur Ure, dans les *Transactions philosophiques* pour 1818, peut se représenter à fort peu près par la formule

$$\log. F = 2,88081 - 0,015862 (100 - t) - 0,00005727 (100 - t)^2,$$

F étant la tension de la vapeur en millimètres, et t étant la température en degrés centigrades.

(2) Peut-être parviendrait-on à diminuer ces variations en faisant passer très-lentement le thermomètre de 0 degré à 100 degrés, et de 100 degrés à 0 degré; car il est fort possible que les changements trop brusques occasionnent dans le verre quelque chose d'analogue aux effets de la trempe, et des dispositions moléculaires qui rappellent de loin celles des *larmes hawaïques*.

des principes différents, c'est pour rendre possible leur révision ultérieure que nous avons cru devoir indiquer dans le plus grand détail et nos résultats bruts et les corrections auxquelles nous les avons soumis .

MÉDECINE VÉGÉTALE — *Recherches sur les cryptogames qui constituent la maladie contagieuse du cuir chevelu décrite sous le nom de Teigne tondante (Mahon), Herpes tonsurans (Cazenave), par M. GRUBY*

(Commission nommée pour une communication du même auteur sur le *Porrigio decalvans*)

Sur la nature, le siège et le développement de la teigne tondante, ou de la rizo phyto alopecie

Depuis que j'ai eu l'honneur de communiquer à l'Académie mes recherches sur la nature végétale de la phyto alopecie (*Porrigio decalvans*), je n'ai pas cessé de continuer mes expériences sur les maladies contagieuses dont la nature nous est inconnue, et notamment sur celles qui attaquent le cuir chevelu. Parmi ces maladies il en est une que sa nature contagieuse et l'opiniâtreté qu'elle oppose aux divers traitements à l'aide desquels on a cherché jusqu'ici à la combattre signalent à l'attention des pathologistes. Je veux parler de la *teigne tondante* de M. Mahon, ou *Herpes tonsurans* de M. Cazenave affection caractérisée par la chute partielle des cheveux et la formation sur les lieux dégarnis, de plaques arrondies couvertes de petites écailles blanchâtres et de petites aspérités analogues à ce qu'on appelle vulgairement *la chair de poule*.

Lorsqu'on examine avec attention sous le microscope les fragments de cheveux provenant de la teigne tondante, on reconnaît que tout leur tissu est rempli de cryptogames, et que les cheveux sont encore couverts de leurs écailles épidermiques, lorsque leur intérieur est déjà plein de sporules.

Les sporules de ces cryptogames sont ordinairement rondes, quelquefois ovales transparentes, incolores, leur surface est lisse, à l'intérieur elles ne contiennent qu'une substance homogène. Leur diamètre varie de 2 à 6 et de 4 à 8 millièmes de millimètre.

Ces cryptogames prennent naissance dans l'intérieur de la racine des cheveux sous la forme d'un groupe de sporules rondes, de ces sporules naissent peu à peu des filaments articulés en chapelet qui, en se développant, rampent dans l'intérieur du tissu des cheveux, parallèlement à leur axe longitudinal, en montant en ligne droite. À mesure que le cheveu pousse, les cryptogames qu'il renferme dans l'intérieur de son tissu poussent également,

et jusqu'à ce qu'il sorte de son follicule. La quantité de sporules est tellement augmentée qu'elle remplit complètement l'intérieur du cheveu dont le tissu normal n'est presque plus reconnaissable.

Changements qu'éprouvent les cheveux par suite du développement des cryptogames

Pour bien apprécier les changements qu'éprouvent les cheveux dans la teigne tondante, il ne suffit pas d'étudier les fragments qui garnissent ordinairement les plaques de cuir chevelu à l'endroit où la maladie est bien développée, mais il faut aussi étudier les cheveux qui ne sont pas encore totalement envahis par les cryptogames et qui ne sont même pas encore cassés. Alors on voit que l'intérieur des racines seul est devenu opaque et garni de sporules, tandis que le reste des cheveux est entier et complètement normal.

A mesure que le cryptogame se développe dans la partie dermatique des cheveux, celle-ci devient de plus en plus opaque. A mesure que les cryptogames remplissent le tissu du cheveu, celui-ci devient gris, opaque, perd de son élasticité et de sa cohésion, son tissu est tellement ramolli que le moindre frottement suffit pour le briser. Il augmente en diamètre sans, d'ailleurs, discontinuer de pousser.

Ordinairement les cheveux se cassent à 2 ou 3 millimètres au-dessus de la peau, jamais en ligne nette et ils laissent des inégalités imitant des aspects de filaments.

Il arrive quelquefois que les cheveux se cassent avant d'être sortis de leurs follicules, et alors la ouverture qui devrait leur donner issue est occupée par la matière sébacée qui se trouve au contact de l'air. Cette matière pousse par le cheveu qui continue à croître, forme en se soulevant, une petite saillie semi-transparente dans laquelle les cheveux malades, ramollis, s'engagent et s'entortillent de telle sorte que cette petite élévation, composée de matière sébacée enduite de cellules d'épiderme desséchées, d'un à trois cheveux malades différemment courbés et remplis de sporules, offre l'aspect d'une substance opaline, et c'est peut-être pour cela qu'elle a été regardée comme une vésicule, ou comme du pus desséché.

Les mêmes élévations, jointes à celles qui résultent du gonflement des cheveux, gonflement qui a lieu même dans leur partie dermatique, offrent l'aspect de chair de poule que l'on rencontre dans cette maladie.

A mesure que les cryptogames cessent de se développer dans l'intérieur de la substance des cheveux, ceux-ci deviennent de plus en plus trans-

parents, moins grisâtres, plus fermes, et le diamètre en devient de plus en plus mince, jusqu'à ce que l'état normal soit complètement rétabli.

» Les cryptogames qui constituent la teigne tondante diffèrent tellement de ceux qui constituent la phyto-alopécie, qu'il est impossible de confondre ces deux maladies. Leur siège même, leur développement et le rapport qu'ils offrent avec le tissu des cheveux, diffèrent également de celui de la phyto-alopécie.

» D'abord les cryptogames de la teigne tondante ne sont formés que de sporules en chapelet, rarement on voit des sporules allongées imitant des branches.

» Les cryptogames de la phyto-alopécie, au contraire, ont de nombreuses branches courbées, ondulées, et les sporules placées à leur côté.

» Dans la teigne tondante, les sporules sont grandes, leur diamètre varie de 2 à 6 sur 4 à 8 millièmes de millimètre

» Les sporules des cryptogames de la phyto-alopécie, au contraire, sont extrêmement petites; leur diamètre n'est que de 1 à 5 millièmes de millimètre, et c'est aussi pour cela que je les ai appelées *Microsporon*.

» Dans la teigne tondante, les sporules remplissent l'intérieur des cheveux, tandis que leur surface externe est peu changée.

» Les sporules de *Microsporon Audouini*, au contraire, sont placées à la surface externe des cheveux, et forment une véritable gaine autour d'eux.

» Les cryptogames de la teigne tondante prennent naissance et se développent dans la racine des cheveux.

» Le *Microsporon Audouini*, au contraire, se développe à la surface externe des cheveux, en dehors des follicules.

» Ces caractères sont tellement constants dans la teigne tondante, qu'il n'y a pas un seul cheveu malade dans cette affection qui ne les présente

» La teigne tondante résulte uniquement du développement des cryptogames que nous avons déjà décrits, et elle mérite par conséquent d'être classée parmi les maladies dues à des parasites végétaux, à côté de la *phyto-alopécie*, de la *mentagrophite*, de la *porrigophite* et de l'*aphiophite*.

» Et pour distinguer la teigne tondante de la phyto-alopécie, je propose de donner à cette dernière la dénomination de *rizo-phyto-alopécie*. »

MÉDECINE VÉGÉTALE. — *Note sur des plantes cryptogamiques se développant en grande masse dans l'estomac d'une malade atteinte, depuis huit ans, de difficulté dans la déglutition des aliments, soit liquides, soit solides, par M. GRANT.*

(Commission précédemment nommée.)

« On sait que les membranes muqueuses de l'homme et des animaux sont parfois plus ou moins envahies par des plantes parasites, ainsi que l'ont constaté MM. Berg, Hanovre, Langenbeck, Rayer, Rousseau et nous-même enfin, notamment dans le cas du *muguet* des enfants qui paraît, comme nous l'avons démontré, n'être qu'une agglomération de trichosporum. Notre présente communication aura pour objet des plantes parasites qui végètent dans l'estomac.

« La malade dont il est question ici, madame R^{***}, âgée de trente-trois ans, est d'un tempérament sanguin et nerveux. A l'âge de vingt-six ans, après de violents chagrins, elle commença par éprouver une difficulté de déglutition qu'elle rapportait à l'extrémité supérieure de l'œsophage. Peu à peu, la difficulté de faire descendre les aliments s'étendit jusqu'à la partie inférieure de l'œsophage, et il s'y joignit l'impossibilité de retenir les aliments et les boissons après leur descente dans l'estomac; depuis cette époque, c'est-à-dire depuis 1840, la malade a commencé à rendre ce qu'elle prenait, rejetant, dans certains cas, toute la quantité d'aliments contenue dans l'estomac. Les vomissements, qui se sont répétés quelquefois jusqu'au nombre de six dans un jour, s'effectuaient sans le moindre effort, ni malaise, ni douleur. La nature des aliments n'exerçait aucune influence sur eux; la seule sensation que la malade a constamment éprouvée consistait en de fortes douleurs.

Etat actuel de la malade.

« La malade a maigri depuis le commencement de la maladie jusqu'à ce jour; elle est pâle, elle éprouve une très-grande difficulté à faire descendre les aliments et les boissons; une cuillerée d'aliment liquide ou solide, par exemple, descend avec facilité jusqu'à la partie inférieure de l'œsophage, et de là elle ne peut la faire passer dans l'estomac que par de grands efforts se manifestant par quatre ou cinq profondes respirations. Une fois cet aliment descendu, elle peut en prendre d'autres, mais toujours avec la même difficulté, elle vomit une ou plusieurs fois par jour sans effort ni douleur, mais quelquefois elle reste plusieurs jours sans rien rejeter. Elle vomit

même a volonté, sans le moindre effort. En dormant, les aliments remontent et lui sortent quelquefois par le nez, principalement si elle est couchée sur le côté gauche. La malade a toujours envie de manger. Tous ces symptômes sont accompagnés de fortes aigreurs continuelles. La matière vomie renferme, outre de la salive, des mucosités et des restes d'aliments en partie digérés, une très-grande quantité de fragments blancs dans lesquels on reconnaît de véritables plantes cryptogamiques.

« Ces fragments anguleux variant de 4 à 8 millimètres sur 1 millimètre d'épaisseur, examinés au microscope, ne présentent qu'une agglomération de sporules rondes ou ovales, quelquefois rangées en chapelet. Ces sporules ont un diamètre qui varie de $\frac{1}{4}$ à 9 millièmes de millimètre; elles sont transparentes, rondes, quelquefois un peu ovales; leur surface est parfaitement lisse; à l'intérieur on remarque seulement une substance transparente, homogène. Quelquefois on voit naître, à la surface des grandes sporules, d'autres sporules plus petites, ce qui rappelle la formation des cryptogames du ferment.

« Après avoir constaté la présence continue de ces cryptogames dans les matières vomies, il me restait à déterminer

- « 1°. Si les cryptogames entrent dans l'estomac avec les aliments;
- « 2°. S'ils se développent spontanément pendant la digestion aux dépens des aliments, comme les cryptogames de la fermentation,
- « 3°. Ou s'ils se développent indépendamment des aliments sur les parois de la membrane muqueuse de l'œsophage ou de l'estomac lui-même.

« 1°. J'ai examiné attentivement pendant plusieurs jours tous les aliments que prenait la malade, et je me suis assuré qu'ils étaient frais et qu'ils ne contenaient aucun cryptogame. Deux heures après les avoir pris, elle en a vomé en ma présence une partie dans laquelle j'ai pu distinguer les fragments blancs que j'ai décrits plus haut, et l'examen microscopique a démontré leur véritable composition végétale.

« 2°. Les cryptogames se développent-ils dans l'estomac? Pour arriver à la solution de cette question, la malade a jeûné pendant douze heures; ensuite elle a bu un verre d'eau alcaline qu'elle a rendu volontairement quelques minutes après. L'eau vomie ne contenait qu'un peu de mucosité et quelques fragments de cryptogames. La même expérience répétée plusieurs fois a donné toujours les mêmes résultats. De là nous pouvons conclure qu'il y a dans l'estomac de la malade des cryptogames qui n'ont aucun rapport avec les aliments.

« 3°. Pour savoir si les cryptogames envahissent les parois de l'estomac ou seulement l'œsophage, j'ai laissé jeûner la malade pendant dix-huit

heures, ensuite j'ai préparé une sonde œsophagienne, de 8 millimètres de diamètre, portant dans son intérieur un petit morceau d'éponge fixé à un mandrin. J'ai introduit cette sonde avec facilité dans l'intérieur de l'estomac ; je faisais sortir l'éponge hors de la sonde à l'aide du mandrin pour qu'elle touchât la paroi stomacale. Je la tournai ensuite autour de son axe, et je la retirai dans l'intérieur de la sonde. L'éponge retirée rapporta un peu de mucosité, des fragments blanchâtres, sans aucune trace d'aliments.

» Ces fragments, examinés au microscope, ont été reconnus n'être composés que de sporules. La même expérience, répétée pour l'œsophage seul, a montré des cryptogames dans le tiers inférieur.

» Après m'être convaincu que ces cryptogames ont leur siège dans les parois de l'estomac et le tiers inférieur de l'œsophage, je voulus déterminer le genre auquel ils appartenaient, mais, comme jusqu'à présent je n'ai pu me procurer que des sporules et des fragments de filaments, il me fut impossible de remplir cette tâche. Toutefois ces sporules n'ont point d'analogie avec ceux du trichosporum du muguet.

» Il paraît que la quantité des cryptogames varie suivant certaines circonstances inconnues jusqu'à ce jour.

» L'alimentation avec des substances végétales paraît accélérer leur développement, la boisson alcaline et l'eau-de-vie paraissent diminuer la production végétale.

» J'aurai l'honneur de communiquer à l'Académie les résultats de mes observations ultérieures »

MÉDECINE. — *Mémoire sur l'éléphantiasis des Grecs, régnant depuis un demi-siècle endémiquement dans une des parties littorales de la Norvège, et notamment dans les provinces de Christiansand, Bergen et Trondhjem, par M. D.-C. DANIELSEN.* (Extrait)

(Commissaires, MM. Magendie, Serres, Flourens.)

» L'éléphantiasis des Grecs, la lèpre des anciens, qui existait déjà du temps de Moïse, et qui ensuite se répandit en Grèce, en Italie, en France, en Allemagne et dans la Scandinavie, sévit de nos jours dans la Norvège avec plus d'intensité et de fréquence que jamais. Sur 200 000 habitants, 1 200 en sont atteints.

» Nommé médecin de l'hôpital Saint-Georges, à Bergen en Norvège, et spécialement chargé par le Gouvernement d'étudier l'éléphantiasis des Grecs, j'ai eu, pendant cinq années de pratique, de nombreuses occasions d'observer

ver cette maladie dans son origine, son développement, sa marche, et dans ses produits pathologiques après la mort.

» J'ai l'honneur de vous soumettre les résultats de mes recherches dans un exposé succinct, tout en me réservant de publier plus tard, avec une monographie étendue de cette maladie, sa description détaillée, et des recherches microscopiques et chimiques sur les liquides et les tissus affectés.

» L'éléphantiasis des Grecs, qui se manifeste sur la portion de la côte occidentale de la Norvège, comprise entre les 60° et 70° degrés de latitude, parmi les classes les plus pauvres de la population, est une maladie héréditaire, qui cependant ne s'attaque pas à tous les individus de la même famille, et qui, du reste, n'est pas contagieuse. Son invasion est déterminée par des circonstances extérieures accidentelles. Il est à remarquer que l'intensité de cette maladie augmente avec le nombre de générations qu'elle parcourt. L'éléphantiasis, celui du moins qui revêt la forme tuberculeuse, se développe déjà chez le fœtus, et nous l'avons observé chez un garçon nouvellement né. Il peut aussi être contracté par un individu sain et né de parents sains, vivant sous l'influence de conditions qui favorisent le développement de l'éléphantiasis, comme les vêtements humides et malpropres, un logement étroit et malsain, les brouillards épais du pays, une mauvaise nourriture, et les autres suites de la pauvreté.

» L'éléphantiasis des Grecs se montre chez nous sous deux formes : l'*éléphantiasis tuberculeux* et l'*éléphantiasis anesthète*. Les deux formes se compliquent non-seulement entre elles, mais encore avec d'autres maladies de la peau, telles que l'eczème impétigineux, la gale, le prurigo, le lichen, le pityriasis, et c'est sans doute de cette complication que l'on a pris occasion d'établir une troisième forme qui, dans la réalité, n'existe pas.

Autopsie.

» Dans le grand nombre d'autopsies que nous avons eu l'occasion de faire de l'éléphantiasis tuberculeux, nous avons trouvé dans le derme, aussi bien que dans le tissu cellulaire, une masse dure, jaunâtre et granulée, qui semble détruire la structure de la peau et du tissu cellulaire. Cette altération se trouve également dans les parois des veines sous-cutanées, et cela à un tel degré, que la veine basilique, par exemple, peut égaler l'épaisseur du doigt. On remarque des altérations semblables dans les yeux, dans le larynx, dans la trachée et les bronches, dans la plèvre, dans le foie, dans la rate, dans la matrice et dans tous les intestins, mais, chose remarquable, les poumons en sont ordinairement exempts.

» Quelques autopsies seulement de l'éléphantiasis anesthète nous ont montré la peau en quelques endroits très-atrophiée, le tissu cellulaire sous-cutané et les muscles presque entièrement détruits, et quelques tendons fortement rétractés, les autres organes étaient dans un état parfaitement normal.

» Les moyens curatifs opposés jusqu'ici à cette affreuse maladie ont très-mal réussi. Une fois développée, elle tend, sans qu'on puisse l'arrêter, vers une terminaison ordinairement funeste.

» Tâcher de découvrir sa vraie nature, afin de pouvoir ensuite la combattre, tel sera désormais l'objet continuuel de mes efforts. »

PHYSIOLOGIE — *Suite à de précédentes recherches concernant la théorie de la fécondation chez les mammifères, par M. POUCHET.* (Extrait par l'auteur.)

(Renvoyé, conformément à la demande de l'auteur, à la Commission des prix de Médecine et de Chirurgie.)

» Voici, en résumé, ce que je crois avoir démontré, soit dans mon livre intitulé *Théorie positive de la fécondation*, soit dans le Mémoire que je présente aujourd'hui à l'Académie des Sciences.

» Je pense avoir donné une théorie positive de la fécondation des mammifères, en prouvant, le premier, que chez ces animaux les œufs se développent dans les vésicules de Graaf et qu'ils en sont expulsés sans le concours du mâle, puisque cet acte s'opère à des époques déterminées et facilement appréciables.

» C'est en suivant, de moment en moment, et en figurant avec exactitude toutes les phases du développement des vésicules de Graaf et de l'expulsion de l'œuf, que j'ai démontré le phénomène dont il est question.

» J'ai prouvé, si je ne me trompe, que la fécondation n'a lieu que quand le passage des ovules dans le canal sexuel coïncide avec la présence du fluide qui doit lui arriver. Mon Mémoire contient des notions précises sur l'origine, la formation et le développement des corps jaunes, question naguère encore si controversée, je prouve qu'ils sont dus à l'accroissement diamétral des vésicules qui forment la membrane propre, accroissement par lequel ces vésicules, qui n'ont d'abord que $\frac{1}{100}$ de millimètre, acquièrent rapidement $\frac{6}{100}$ à $\frac{7}{100}$ de millimètre.

» Dans ce travail, qui est accompagné de près de trois cents dessins, je me suis attaché à fixer et à figurer avec précision le lieu qu'occupe l'ovule à la surface de la membrane propre de la vésicule de Graaf des mam-

mifères, et les procédés par lesquels il se trouve expulsé de cette même vesicule.

» Pour arriver à la démonstration du phénomène de la fécondation, j'ai dû m'occuper du chemin que parcourt le fluide séminal des mammifères dans les organes génitaux des femelles. D'après des expériences faites avec le plus grand soin, et prenant les plus minutieuses précautions pour qu'il ne s'introduise point de causes d'erreurs, en m'appuyant, soit sur huit à neuf cents observations qui me sont propres, soit sur l'insucces qu'a eu dans mes mains la *prétendue* expérience de Nuck, je crois pouvoir affirmer que le fluide séminal ne parvient jamais à l'ovaire dans les cas normaux. Selon moi, il ne s'avance même qu'à une fort petite distance dans les trompes, et quelquefois même il n'y entre nullement. Chez la lapine, sur laquelle ces canaux offrent de 160 à 210 millimètres de longueur, il ne se trouve jamais un seul zoospermie au delà des 20 premiers millimètres ; souvent il n'en existe que dans les 5 premiers, et parfois même on n'y en rencontre aucun.

» Dans mon Mémoire, je crois aussi avoir jeté quelque lumière sur la structure des zoospermes de l'homme et de quelques animaux

» Le travail auquel je me suis livré me paraît de nature à jeter du jour non-seulement sur des questions importantes pour la physiologie, mais encore sur quelques-unes de celles qui concernent l'économie agricole. La théorie de la fécondation étant mieux connue, on pourrait en profiter avec avantage pour la propagation des races des animaux domestiques qui forment une si grande partie de notre richesse territoriale. »

» M. ISIDORE GEOFFROY-SAINT-HILAIRE rappelle qu'une discussion de priorité s'est élevée entre quelques observateurs, à l'égard des résultats des recherches de M. Pouchet sur la fécondation chez les mammifères. M. Isid. Geoffroy, dont le témoignage, lors de cette discussion, avait été invoqué par M. Pouchet, mais qui se trouvait alors absent, saisit cette occasion de déclarer, sans toutefois se porter juge de la question de priorité, que M. Pouchet lui a en effet communiqué, il y a près de deux ans, les faits et les idées que ce savant zoologiste a consignés depuis dans sa *Théorie positive de la fécondation des mammifères*. »

» M. MACANDIE, au nom de M. ROUSSEAU, chimiste bien connu de l'Académie, présente un modèle d'un nouveau filtre que l'auteur se propose d'offrir gratuitement à la ville de Paris, à ses établissements de bienfaisance et particulièrement à l'Hôtel-Dieu, dont l'appareil de filtrage devient tellement

dispendieux, qu'il ne serait plus possible de continuer à s'en servir, et qui, d'ailleurs, ne fournit qu'une fraction de l'eau nécessaire aux besoins de l'hôpital. Le filtre de M. Rousseau présente plusieurs avantages sur les filtres en usage aujourd'hui. L'auteur désire que ces avantages soient vérifiés par une Commission de l'Académie. »

(Renvoi à la Commission qui a fait le Rapport sur l'appareil de filtrage de M. Fonvielle.)

M. NACHET soumet au jugement de l'Académie une *loupe composée* qui donne un grossissement de quatorze fois, avec une longueur focale de 32 millimètres, et en conservant l'achromatisme. Si l'on n'emploie que la première lentille, le grossissement est de sept fois et la longueur focale de 14 millimètres.

(Commissaires, MM. Adolphe Brongniart, Babinet.)

M. DUPONT, de Lunel, adresse une Note destinée à servir de supplément à son *Mémoire sur la qualité électrique du sang*.

(Renvoi à la Commission précédemment nommée.)

M. DELPON soumet au jugement de l'Académie une Note sur un *moyen destiné à prévenir l'explosion des chaudières à vapeur*.

(Renvoi à la Commission précédemment nommée pour diverses communications relatives au même sujet.)

M. CHEROT prie l'Académie de vouloir bien désigner une Commission à l'examen de laquelle il soumettra un procédé particulier qu'il emploie pour l'impression des toiles destinées pour la peinture à l'huile, ainsi que plusieurs autres inventions également relatives à l'art de la peinture.

(Commissaires, MM. Chevreul, d'Arcet, Pelouze.)

MM. BOURGIER et JACON, qui poursuivent la publication de leur grand ouvrage d'anatomie, demandent que cet ouvrage soit admis à concourir pour les prix de Médecine et de Chirurgie. Ils espèrent que l'Académie, qui a déjà accordé son suffrage à cette publication, relativement à l'utilité dont elle peut être pour l'exercice de la médecine opératoire, voudra bien la considérer de nouveau dans ses rapports avec la Physiologie, l'Anatomie pathologique et la Thérapeutique.

(Renvoi à la Commission des prix de Médecine et de Chirurgie.)

CORRESPONDANCE

M ORFILA adresse à l'Académie une Note qu'il vient de publier et dans laquelle il combat le système de la *localisation des poisons*. M Orfila espère que l'Académie voudra bien renvoyer comme pièce à consulter, cet opuscule à la Commission chargée de l'examen de divers Mémoires ou la même question se trouve agitée.

(Renvoi à la Commission de l'arsenic)

CHIMIE — *Sur une opération de laryngotomie pratiquée dans un cas de polype du larynx* (Extrait d'une Lettre de M EHRLMANN professeur d'Anatomie à la Faculté de Strasbourg)

Le diagnostic difficile de cette maladie avait été parfaitement établi par M le D^r Schmitt, qui m'avait fait appeler en consultation avec M le D^r Aronsohn, médecin consultant du Roi. J'ai excisé le corps étranger qui s'était développé sur l'une des cordes vocales et la malade femme d'une trentaine d'années se trouve aujourd'hui sixième jour de l'opération dans l'état le plus satisfaisant. La présence de l'excroissance fibro-celluleuse engagée entre les lèvres de la glotte avait déterminé des accidents très graves et nécessité de prompts secours car la suffocation était imminente et l'angoisse extrême.

Ingeant l'incision de la trachée-artere indispensable pour rétablir d'abord la respiration, je la fis aussitôt et plaçai une canule à demeure dans le conduit aérien, sauf à procéder plus tard à l'extirpation du polype fixé dans l'intérieur du larynx. Le surlendemain, alors que le calus était parfaitement établi, et que la respiration se faisait en toute liberté par la voie artificielle, j'exécutai mon projet et aidé par mes deux collègues je parvins heureusement à faire l'ablation du corps étranger, en rasant avec le bistouri toute la longueur du ligament inférieur gauche de la glotte, après avoir saisi, à l'aide de pinces, l'excroissance devenue visible par l'écartement des deux moitiés du cartilage thyroïde divisé.

Cette opération, que je crois la première qu'on ait pratiquée dans un cas semblable, a parfaitement réussi. Aujourd'hui, sixième jour, la malade est dans un état très satisfaisant.

À la Lettre est joint un dessin représentant, de grandeur naturelle et en couleur, l'excroissance qui a nécessité cette opération.

CHIMIE APPLIQUÉE — *Sur un moyen d'obtenir par les temps les plus humides de belles épreuves photographiques*

M DESBORDEAUX écrit qu'ayant reconnu l'extrême difficulté pour ne pas dire l'impossibilité absolue, d'obtenir par un temps humide de belles épreuves photographiques il a pensé que l'on pourrait écarter cette cause d'insuccès en desséchant artificiellement l'air de l'intérieur de l'appareil. En effet en introduisant dans la boîte où la plaque iodée reçoit l'action de la lumière une substance qui absorbe très énergiquement l'humidité, il est parvenu à avoir de très bonnes épreuves dans des jours où en négligeant cette précaution, les images photographiques étaient toutes d'un ton grisâtre. L'acétate de potasse est la première substance qu'il a employée à cet effet mais le chlorure de calcium lui a depuis également bien réussi.

M Desbordaoux a trouvé utile de placer aussi une de ces deux substances dans la boîte à mercure. Il dit, en outre, avoir reconnu que les taches noires qui souvent défigurent des épreuves belles d'ailleurs tiennent presque toujours à des traces d'humidité laissées sur les plaques par le coton dont on s'est servi pour les essuyer, et il recommande en conséquence de conserver ces plaques dans une boîte bien fermée, au fond de laquelle on aura placé un sel deliquescent.

M PEDRONI adresse de Bordeaux une Note sur les *restes fossiles de poissons qui se trouvent dans le département de la Gironde*. Les espèces auxquelles ces débris appartiennent, et parmi lesquelles il y en a deux qu'il considère comme nouvelles, sont au nombre de vingt-trois, qui se répartissent en neuf genres.

M SOULEYET demande qu'un Mémoire sur *l'anatomie et la physiologie des Mollusques*, qu'il avait adressé dans la séance du 2 octobre 1843, soit admis à concourir pour le prix de Physiologie expérimentale.

(Renvoi à la Commission du prix de Physiologie.)

M FOURCAULT demande que divers Mémoires qu'il avait adressés pour le concours aux prix de Médecine, et qu'il croit n'avoir pas été examinés par la Commission, soient admis de nouveau à concourir.

Cette demande est renvoyée à l'examen de la Commission des prix de Médecine et de Chirurgie.

M. FAURÉ prie l'Académie de se faire rendre compte d'un ouvrage qu'il vient de faire paraître sur l'analyse comparée des vins du département de la Gironde.

L'Académie ne peut accéder à cette demande qui est contraire à une décision qu'elle a prise relativement aux ouvrages publiés en France et écrits en français.

M. ROUGET DE LISLE demande à reprendre des échantillons de laine teinte en cochenille, qu'il avait présentés en même temps qu'un Mémoire sur la teinture, Mémoire sur lequel il n'a pas été fait de Rapport.

M. CHOPINEAUX écrit relativement à une Note qu'il dit avoir adressée au mois de février dernier, et qui n'est point parvenue à l'Académie

L'Académie accepte le dépôt de deux *paquets cachetés*, présentés, l'un par M. DÉJARDIN, l'autre par M. GAULTIER DE CLAUERY.

La séance est levée à 5 heures.

F

ERRATA.

(Séance du 25 mars 1844.)

Page 518, ligne 11, *après* nervures latérales, *ajoutez* et parcourues.

Page 523, ligne 10, au lieu de *myrtinées*, lisez *myrsinées*.

Page 523, ligne 27, dans le cas où M. Poncelet, qui n'est pas présent à la séance, serait déjà... etc., lisez dans le cas où M. Poncelet, qui n'est pas présent à la séance, apparten-
drat déjà, à un autre titre, au Conseil de perfectionnement, M. Dupin serait le troisième
des Commissaires désignés par l'Académie, puisque M. Liouville a été nommé par le Conseil
d'administration de l'École.

Page 526, ligne 17, au lieu de « *Opérations de lithotripsie*; par M. BAUDLOQUEZ, »
lisez « *Opérations de céphalotripsie*; par M. BAUDLOQUEZ.

BULLETIN BIBLIOGRAPHIQUE

L'Académie a reçu, dans cette séance, les ouvrages dont voici les titres

Comptes rendus hebdomadaires des séances de l'Académie royale des Sciences
1^{er} semestre 1844 n° 13, in-4°

Annales des Sciences naturelles, février 1844, in 8°

Illustrationes Plantarum orientalium, par MM le comte JAUBERT et SPACH
10^e livr., in-4

Traité complet de l'Anatomie de l'homme, comprenant la Médecine opératoire, par M BOURGERY, avec planches lithographiées d'après nature par M N -II JACOB, 4 vol in fol

Précis analytique des Travaux de l'Académie royale des Sciences Belles Lettres et Arts de Rouen, pendant l'année 1843, in 8°

Mémoire sur le Traitement de quelques affections de la Matrice par l'emploi du Cataplasme aqueux de seigle ergoté, par M ARNAL, in-8° (Adresse pour le concours aux prix de Médecine et de Chirurgie)

Quelques mots à MM les Directeurs du chemin de fer de Paris à Versailles (rive gauche) par M le marquis de JOUFFROY, broch in 8°

Encyclographie médicale, mars 1844, in 8°

Annales de la Société royale d'Horticulture de Paris, février 1844, in 8°

La Clinique vétérinaire, avril 1844, in 8°

Le Mémorial — Revue encyclopédique des Sciences, février 1844 in 8°

Le Technologiste, avril 1844, in 8°

Journal des Connaissances utiles mars 1844, in-8°

Gazette médicale de Dyon et de la Bourgogne, mars 1844, in-8°

Réflexions sur l'instruction que reçoivent les Capitaines de la marine du Commerce par M ARTUR, $\frac{1}{2}$ feuille in 4°

Bibliothèque universelle de Genève, février 1844, in 8°

Proceedings . Procès-verbaux de l'Académie des Sciences naturelles de Philadelphie, nos 30 à 33, in 8°

Astronomische Nouvelles astronomiques de M SCHUMACKER, n 499, in-4°

Gazette médicale de Paris, n° 13

Gazette des Hôpitaux, nos 36 à 38

L'Echo du Monde savant, nos 24 et 25

L'Expérience, n° 352, in-8°

COMPTE RENDU

DES SÉANCES

DE L'ACADÉMIE DES SCIENCES.

SÉANCE DU LUNDI 8 AVRIL 1844.

PRÉSIDENTE DE M. CHARLES DUPIN.

MÉMOIRES ET COMMUNICATIONS

DES MEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE L'ACADÉMIE.

PHYSIOLOGIE VÉGÉTALE. — *Troisièmes Notes relatives à la protestation faite dans la séance du 12 juin 1843, à la suite de la lecture du Mémoire de M. de Mirbel, ayant pour titre : Recherches anatomiques et physiologiques sur quelques végétaux monocotylés; par M. CHARLES GAUDICHAUD.*

« J'ai cherché à prouver, par des faits j'espère suffisants, que les végétaux monocotylés s'accroissent en hauteur par la superposition des mérithalles tigellaires d'individus ou phytons distincts, ayant leur organisation et leurs fonctions propres; que ces phytons sont agencés symétriquement les uns sur les autres, et en partie les uns dans les autres, au moyen de tissus radicaux qui les greffent naturellement ensemble, et que le végétal complexe qui en résulte alors est soumis à des fonctions générales nouvelles qui résultent de l'ensemble des fonctions partielles, mais modifiées, des mérithalles tigellaires persistants et privés de leurs appendices foliacés.

» N'est-il pas évident, pour tous les esprits, que les mérithalles tigellaires ou persistants, dès qu'ils sont privés de leurs mérithalles pétiolaires et limbaire,

ou autrement dit de leurs feuilles, ont perdu une partie de leurs fonctions primitives et en ont acquis de nouvelles

Tous les physiologistes, même ceux qui sont le plus opposés à la théorie des meristhales, m'accorderont certainement ce principe, qui, d'ailleurs, sera démontré plus tard dans ma Physiologie. Je ne le donne ici par anticipation que pour l'intelligence de mes Notes, en faisant remarquer, une fois encore, que nous ne pourrions faire de la physiologie, dans la véritable acception de ce mot, que lorsque les principes de l'organographie seront bien nettes, bien connus (1)

Envisageons donc ici, autant que nous le pourrons, tous les faits sous le seul point de vue organographique, en abordant les principes de la physiologie qu'autant qu'ils deviendront indispensables

Qu'est-ce donc, dans l'origine, qu'un végétal monocotyle, par exemple un Dittier ?

C'est une cellule animée qui produit un embryon ou un bourgeon

Un embryon, tous les botanistes le savent aujourd'hui, est un bourgeon libre isolé, indépendant

(et embryon, ou phyton primitif, est un individu distinct ayant son organisation et ses fonctions à part)

Le premier individu en produit bientôt un second, le second un troisième, le troisième un quatrième, et ainsi de suite pendant toute la vie du végétal

De même que l'embryon a son organisation et ses fonctions normales particulières, de même les individus qui naîtront de lui, et de tous ceux qui lui succéderont, auront les leurs à part, c'est-à-dire modifiées selon leur degré de développement et leur âge par la greffe immédiate et permanente du second sur le premier, du troisième sur le second, et successivement pour tous les autres

Le premier individu, l'embryon, puise les principes de son existence des corps extérieurs, c'est-à-dire de l'eau, de l'air, de la lumière, de la chaleur et, avant tout, de son péricarpe lorsque ce corps existe, péricarpe qui se lactifie et se résorbe, le second est alimenté par le premier, le troisième par le second et le premier, le quatrième par les trois autres, ainsi que

(1) Je prie l'Académie de me pardonner toutes ces redites indispensables, et celles que je ferai forcément encore dans mes Notes, jusqu'à ce que ma doctrine organographique soit adoptée.

par les éléments précités, d'où il résulte, lorsque ces phytons sont entièrement développés, que le premier est très-faible le second un peu plus fort, le troisième plus fort encore, et que tous ceux qui leur succèdent sont de plus en plus vigoureux et complexes dans leur composition, et conséquemment dans leurs fonctions, jusqu'à la feuille normale qui possède le plus haut degré d'organisation.

D'après les théories anciennes c'était par le dédoublement des vaisseaux du premier individu que se formait le système vasculaire du second et successivement pour tous les autres.

Le système vasculaire du second individu était donc composé d'une partie de celui du premier.

Mais si l'organisation vasculaire du second individu est plus complexe que celle du premier, ce n'est donc pas une partie des vaisseaux du premier qui forme le système vasculaire du second.

En admettant même que tous les vaisseaux d'un embryon passent dans la feuille primordiale celle-ci n'auroit jamais que l'organisation de l'embryon.

Cette théorie est je crois justement abandonnée aujourd'hui.

D'après celle qui vous a été présentée le 12 juin dernier ce serait naturellement de la périphérie interne de l'embryon que partiraient les vaisseaux de la feuille primordiale.

Ici nous allons trouver les mêmes difficultés.

En effet, que deviendra cette théorie si nous vous prouvons par un grand nombre de faits que la feuille primordiale est généralement plus avancée en organisation que la feuille embryonnaire, et que, par exemple la quatrième ou cinquième feuille renferme presque toujours un plus grand nombre de vaisseaux que les trois ou quatre premières? si nous vous démontrons encore, par les mêmes faits, que non seulement la feuille cotylédonaire n'envoie rien de vasculaire à la feuille primordiale, mais que dans beaucoup de cas, celle-ci non plus n'envoie rien de haut en bas à la feuille cotylédonaire, qui alors n'a qu'une existence éphémère?

Dans ce cas, la première feuille, n'étant pas fortifiée et en quelque sorte vivifiée par la seconde, cesse promptement d'exister.

N'est-ce donc pas une preuve manifeste de la vitalité individuelle des phytons?

Nous ferons naturellement l'application de ce principe aux causes de l'accroissement des tiges, des feuilles, des fruits, etc., et nous l'étendrons jusqu'aux fleurs et autres parties fugaces des végétaux. Nous en ferons même,

des aujourd'hui l'application aux tiges des *Vellosia*, qui, ne recevant presque rien des feuilles qui en terminent les rameaux, restent toujours très grêles, par la raison toute simple que les vaisseaux radiculaires des feuilles qui auraient produit l'accroissement en largeur de ces tiges se portent, des en naissant à l'extérieur du périlyle, et descendent ainsi à l'état de racines tout le long des rameaux, des branches et du tronc jusque dans le sol. La feuille primordiale (la première après l'embryon) reçoit sans doute la vie et la nourriture de l'embryon mais rien autre chose. La feuille primordiale, à son tour, donne la vie et la principale nourriture à la feuille secondaire et il en est ainsi de la feuille secondaire relativement à la feuille tertiaire, etc.

Ce qui prouve bien encore l'indépendance des phytons c'est que, dans beaucoup de cas, l'embryon, après avoir formé sa feuille primordiale, meurt ordinairement si celle-ci n'établit, de haut en bas, aucuns rapports organiques avec lui. Presque toutes les germinations des graminées nous le prouvent (1).

Mais si la feuille primordiale et toutes celles qui s'engendrent successivement par elle envoient leurs prolongements radiculaires sur le cotylédon, ce qui arrive dans la pluralité des cas, celui-ci persiste et fait naturellement partie de la tige. Autrement il en est exclu.

Tous ceux qui ont étudié la germination des graminées, comme d'ailleurs de beaucoup d'autres monocotylés savent bien que non-seulement l'embryon mais aussi la feuille primordiale, n'ont en général qu'une existence éphémère, et que la tige réelle ne part le plus souvent que de la feuille secondaire c'est-à-dire la troisième en comptant le cotylédon.

Dans ce cas, toute la vitalité du jeune végétal se réfugie au sommet dans le troisième individu ou phyton.

Faites maintenant l'application de ce principe à la vie des végétaux, et vous aurez la preuve que ces êtres ne perpétuent leur existence que par la vie particulière des individus qui, selon le climat, se forment annuellement ou d'une manière incessante à leurs extrémités, et que c'est cette vitalité qui se repand de haut en bas sur tout le végétal qui lui donne la faculté de traverser des siècles. Ce principe nous conduira tout naturellement encore à l'explication de la faiblesse de vitalité des plantes herbacées et autres.

Faites développer, par des moyens aujourd'hui très connus, des bourgeons d'une plante dite herbacée ou annuelle, mettez cette plante dans

(1) Voyez GAUDICHAUD, *Organographie*, Pl. IV, fig. 6, 7, 8, 9.

des conditions favorables de chaleur et d'humidité, et vous la convertirez en plante vivace. Ce procédé d'horticulture est connu de temps immémorial.

» La vie active des végétaux, cette vie qui produit l'accroissement et les fonctions générales, réside donc dans les individus ou phytons, et non dans le végétal tout entier, privé de bourgeons.

Celui-ci peut vivre encore, mais seulement d'un reste de vie active, d'une sorte de vie lente, en un mot d'une vie cellulaire qui ne lui permet de former que des cellules et tout au plus d'en animer quelques unes.

Coupez transversalement une tige de monocotylée, et elle périra promptement, si elle ne lui reste pas assez de force ou de vitalité pour animer quelques cellules et les convertir en bourgeons.

» Si elle est encore assez vive pour produire des bourgeons, elle reprendra immédiatement toute sa vigueur première, parce que la vitalité des bourgeons se répandra aussitôt dans tout le reste du végétal.

Mais si vous enlevez les bourgeons au fur et à mesure qu'ils se produisent, la plante ne tardera pas à cesser de vivre, tandis que les bourgeons détachés de ce végétal, mis en terre et tenus dans des conditions favorables, végéteront avec force et rapidité.

Une vieille plante ne vit donc plus que de la vitalité des individus qu'elle engendre.

La vie est, sans nul doute, un principe unique, mais ses manifestations nous autorisent à la diviser, comme nous l'avons déjà fait dans notre Organogénie, en vie lente ou cellulaire, et en vie active ou phytienne. L'une et l'autre, dans certaines circonstances, peuvent durer très-longtemps.

Ces notions abrégées de physiologie étaient indispensables ici pour l'intelligence de mes Notes.

Maintenant je reviens à mon sujet.

Tous les individus ou phytons se forment les uns dans les autres, les uns sur les autres, les uns par les autres, et ont chacun son organisation à part, son système vasculaire à part, ses fonctions à part, et, avant tout, sa vie à part.

Je démontrerai facilement, dans ma Physiologie, que la vie générale du végétal est secondaire et dépendante.

Qu'est-ce donc maintenant pour nous qu'un bourgeon?

» C'est encore une cellule animée et plus ou moins complètement constituée en phyton.

» C'est toujours un être distinct, qui naît tout gréffé sur une partie quelcon-

que d'un végétal, sur un fragment de végétal comme sur un végétal entier (1), dont après avoir reçu la vie, il reçoit encore la première et la principale nourriture. Mais je le réitère, c'est un être à part, qui a son organisation à lui, ses fonctions propres, et qui vit bien plus de sa vie particulière que de la vie générale du végétal ou du lambeau de végétal d'où il procède et qui lui sert d'appui ou de terrain.

J'ai donné, dans mon *Organogénie*, de nombreux exemples à l'appui de cette vérité, et je suis aujourd'hui en mesure d'en fournir beaucoup d'autres.

Ici comme partout, du premier individu il en naît un second, du second un troisième, et, toujours de la même manière, un nombre plus ou moins grand, selon le groupe et la durée du végétal.

En général, ces individus restent un certain temps, ou toujours, enrobés les uns dans les autres, au moins par leur base vaginale, d'où résulte ce que les botanistes nomment un bourgeon, une bulbe, une gemme, un œil, un bouton, un turion, etc.

Conservons ces noms, messieurs, puisqu'ils sont généralement admis, mais changeons leur signification.

Ne considérons plus le bourgeon quelconque comme un individu distinct mais comme un assemblage d'individus qui ont chacun son âge, son organisation, ses fonctions, sa vie, et dont les fonctions réunies forment un centre d'actions vivifiantes qui s'étendent progressivement de haut en bas sur tout le reste du végétal.

Le végétal vit donc beaucoup plus de la vitalité des individus qu'il engendre et nourrit, que ces individus ne vivent de la sienne.

Ce principe, qu'à dessein je vous rappelle sans cesse, paraîtra paradoxal à quelques personnes, mais en y réfléchissant bien, elles finiront par l'adopter.

D'ailleurs je vous fournirai de nombreuses et belles preuves à l'appui de cette vérité, dès que je pourrai aborder les faits généraux encore si peu connus et si mystérieux de la physiologie.

Par un procédé fort simple, et que je ferai connaître prochainement, je puis avec toute facilité me procurer, même par milliers, les cellules animées et primordiales des bourgeons adventifs.

Disons pourtant qu'il est beaucoup plus simple et plus facile d'aller les

(1) Voyez GAUDICHAUD *Organogénie*, *Comptes rendus de l'Académie des Sciences*, t. XIV, p. 974.

chercher au centre des bourgeons qui, eux, ne manquent jamais. En effet chaque bourgeon, quel que soit son degré de développement, est toujours terminé, au centre, par une cellule.

Des que, dans nos climats, la végétation commence, la cellule située au centre et au sommet organique du bourgeon s'anime. Cette cellule fait naturellement partie du tissu au sein duquel elle est située, et ce tissu appartient, quelque court et réduit qu'il soit, au méristhème tigellane de l'individu très petit qui la précède dans l'organisation.

Que forme cette cellule en s'animent (1)? une petite masse particulière de tissu cellulaire naissant qui reste fixée ou greffée, par sa partie inférieure, à celle qui lui a donné naissance et dont elle ne diffère, au bout d'un certain temps, que par la ténuité et la plus grande transparence de ses jeunes cellules.

Les cellules de la masse médullaire ambiante sont jeunes aussi, et en général peu distinctes, surtout dans les monocotylées, où tout le centre du bourgeon est diaphane, mais elles se dessinent très nettement dans les dicotylées, par exemple dans le Tilleul, où le tissu médullaire est légèrement opaque et colore, tandis que la cellule bourgeonnienne est incolore et diaphane.

En se développant, cette cellule bourgeonnienne forme un petit corps hémisphérique qui, s'il naît au centre d'un bourgeon, soulève les appendices foliacés produits par le développement des cellules précédentes, arrivées à l'état de phytons, comme la cellule qui s'anime à dans son centre soulève et bientôt le sien.

Cet appendice foliacé de chaque phyton a toujours une ouverture plus ou moins distincte vers son sommet, comme chaque embryon (2) et chaque

(1) Foyes GAUDICHAUD, *Organogenie, Comptes rendus*, tome XIV, page 973

(2) Foyes GAUDICHAUD, *Organographie*, Pl. IV, fig. 2 A, Pl. V, fig. 2, 13 A — *Idem*, *Voyage de la Bonite*, Pl. LXII, fig. 16, 17, 18, 19 — Ad de Jussieu, *Annales des Sciences naturelles*, 2^e série, tome XI, page 345 *Voyage de la Bonite*, Pl. LIX, *Lavistona Martii*

Fig. 7 Coupe verticale de la partie inférieure grossie d'un embryon, dans laquelle on voit une partie de l'embryon et sa cavité, une feuille primordiale perforée sur le côté, une feuille secondaire perforée au sommet, une feuille ternaire également perforée au sommet, enfin la cellule bourgeonnienne arrondie à la base.

Fig. 10 Coupe verticale des feuilles secondaires et ternaires, et la cellule bourgeonnienne à la base et au centre.

Fig. 11 La même figure entière.

Ces parties, figurées depuis 1842, n'étaient pas destinées à ce travail.

ovule ont la leur. C'est par cette ouverture que la seconde feuille sort de la première ou du cotylédon, que la troisième sort de la seconde, comme toutes les autres sortent de celles qui les auront précédées dans l'organisation (1)

Ici la cellule qui s'organise en ovule, la cellule qui s'organise en embryon, la cellule qui commence un bourgeon, comme toutes les cellules qui se trouvent au sommet et au centre des embryons, des bourgeons ou dans l'aisselle de leurs appendices foliacés, conséquemment dans l'aisselle de toutes les feuilles, forment toujours, dans les monocotylées, des individus distincts qui s'organisent normalement pour les fonctions qu'ils sont appelés à remplir.

Le premier individu constitué en produit un second dans son centre, celui-ci souleve la partie petiololaire du premier, les troisième, quatrième, cinquième, etc., en font autant, de là résulte ce que nous nommons un bourgeon, bourgeon qui est composé de petits cônes emboîtés les uns dans les autres, et au centre desquels on trouve toujours la cellule productrice destinée à perpétuer le végétal.

Maintenant que l'axe médullaire du végétal comme celui du dernier phytome forme, dans lequel s'anime toujours la cellule axifère, soit conique, comme cela a lieu le plus ordinairement, qu'il soit horizontal (2), concave ou fortement déprimé dans le centre, comme cela existe dans les grands Dattiers, le phénomène n'en sera pas moins toujours le même et de la plus grande simplicité.

Les Dattiers sont rares et difficiles à se procurer, mais il n'en est pas de même des embryons de cet arbre, puisque chaque fruit porte le sien et que les dattes abondent dans le commerce.

Or, je soutiens qu'un embryon de Dattier est un véritable bourgeon naissant, de tout point comparable à un bourgeon adventif qui n'aurait encore la forme que ses deux ou trois premiers individus, dont le premier serait le cotylédon, le second une feuille primordiale, et le troisième la cellule animée, ce qui, la forme du cotylédon à part, représente aussi très-exactement les trois dernières parties centrales d'un bourgeon ordinaire.

J'ai fait un grand nombre d'analyses de bourgeons de monocotylées, particulièrement de Palmiers, mon Organographie en fait foi (3), mais j'avoue

(1) Voyez GAUDICHAUD, *Organographie*, Pl I, fig 3 d, Pl III, fig 4, a, b, c d, Pl IV, fig 2, h.

(2) *Ibid* id Pl III, fig 3, s Pl IV, fig 5 a.

(3) *Ibid* id Pl I, fig 8, 9, Pl III, fig 3, 10, Pl IV, fig 5.

que je ne me serais jamais basé de à aller chercher la cellule animée dans le centre du bourgeon d'un très-gros arbre de cette famille

C'est toujours sur de jeunes bourgeons et sur des embryons que j'ai opéré

» Là, les difficultés sont moindres ce qui n'empêche pas qu'elles soient encore fort grandes Aussi, déclaré-je franchement que, malgré mon assez grande habitude des expériences, je n'ai pas sacrifié moins de cinq à dix bourgeons et embryons de chaque espèce avant d'arriver à la cellule animée qui en forme le centre et le sommet

Cette cellule animée, dans un Palmier séculaire comme dans l'embryon le plus réduit, n'a que les dimensions d'un point géométrique Elle s'anime au centre du dernier phytone ébauché, et celui-ci n'est bien visible qu'à l'aide du microscope

» Je n'aurais donc jamais entrepris la tâche d'aller chercher cette cellule dans un vieux Palmier si M. de Mirbel, par son Mémoire, ne m'en avait imposé l'obligation

On vous dira, dès qu'on sera revenu à l'idée ancienne (car en observant mieux on y reviendra) que ce n'est pas une cellule qui s'anime pour former une feuille, mais bien une masse cellulaire particulière, engendrée par la masse cellulaire ou moelle générale du végétal

Là, encore, sera naturellement cachée la funeste question du cambium

Dès que cette objection me sera faite, je la combattrai avec des faits

En attendant, messieurs, attaquons-la avec les seules armes du raisonnement

Vous savez à présent que les deux ou trois premières feuilles d'un bourgeon naissant de monocotylée, comme les deux ou trois dernières ou centrales d'un bourgeon ancien, ce qui est, organogéniquement parlant, la même chose, n'ont que les dimensions d'un point géométrique, de la tête d'une très petite épingle si vous le voulez

Faites, par la pensée, une coupe verticale par l'axe de ce bourgeon, et voyez à quoi se réduira la masse cellulaire renfermée dans les deux premières ou dernières feuilles qui le composent Ce sera, pour tous les esprits, le plus petit point qu'on puisse imaginer Or, je soutiens que ce petit point est primitivement une cellule dans laquelle s'organise un nouvel individu, dont les tissus, uniquement cellulaires, restent greffés aux tissus, également cellulaires, au sein desquels elle a pris naissance

» Je soutiens que les premiers rudiments vasculaires de cet individu se formeront en lui, et par sa seule puissance organogénique, qu'ils existeront

en lui, avant d'avoir établi aucun rapport avec les vaisseaux de formation antérieurs du stipe, et que ce ne sera que lorsqu'il aura acquis un certain degré d'organisation, que son système vasculaire particulier, et jusque-là isolé, suivra d'une façon quelconque au système vasculaire général du végétal.

Et, d'après cela, je soutiens encore que tous les vaisseaux d'une feuille de Palmier, cette feuille eût-elle 6 mètres et plus de longueur, appartiendront à l'individu vasculaire, au phytton, avant d'avoir aucune connexion directe avec les autres tissus vasculaires du stipe que les tissus vasculaires destinés à lier la feuille au stipe se formeront tous de haut en bas, et qu'il en descendra dans le stipe presque autant qu'il s'en formera dans la feuille pendant tout le temps de sa croissance.

Je n'ai encore décrit les vaisseaux radiculaires qu'à partir de la base des méristhales tigellaires de tous les individus ou phyttons. Je n'avais alors qu'un but à atteindre, et je me réservais de démontrer, dans mes nouvelles études organogéniques et anatomiques, que ces vaisseaux existent dans les phyttons avant de communiquer avec les tiges qu'ils sont quelquefois tout formes, solidifiés et très-nombreux dans les phyttons, alors qu'ils ne sont encore qu'à l'état d'ébrûche tendres et rares à leur base.

Je prouverai facilement qu'un grand nombre de productions végétales fugaces, telles que des étamines, des pétales, des disques ou nectaires, des ovules, etc., qui n'ont ordinairement pas la faculté d'en former, n'envoient aucuns prolongements radiculaires sur les tiges, et qu'ils en envoient des qu'ils s'en développent en eux. Toutes les parties des fleurs, des fruits, certaines écailles, nous le prouveront encore.

Personne, je pense, ne s'aviserait de supposer que toutes les fibres ligneuses d'un brou de coco passent par le léger point d'attache qui unit ce fruit à la panicule. Il en sera ainsi de toutes les autres productions, des feuilles elles-mêmes, qui n'envoient pas toujours tous leurs prolongements ligneux dans le stipe.

J'ai fait de vains efforts pour me procurer des Dattiers de haute taille, mais j'en ai reçu un grand nombre de jeunes, dont le plus âgé n'avait, je pense, guère plus de dix à douze ans.

J'ai étudié une partie de ces Palmiers, et dans tous j'ai rencontré la cellule centrale, et jamais les fentes signalées par M. de Miébel.

Le Palmier de dix à douze ans, qui n'avait pourtant pas moins de 15 à 20 centimètres de diamètre intérieur, m'a offert de très-grandes difficultés.

Comment, en effet, atteindre exactement, par une coupe verticale faite

par l'axe d'un arbre de ce diamètre, et à travers tant de tissus divers généralement très durs à la circonférence, à une cellule microscopique tendre, molle et presque fluide? C'était réellement, pour moi, un véritable problème

» Voici comment je l'ai résolu, ou plutôt comment j'ai cherché à le résoudre

» J'ai scié longitudinalement le Palmier, un peu en dehors du centre, de manière à laisser le bourgeon central entier sur l'une des moitiés de cet arbre

» Avec des instruments tranchants, j'ai dégarni les parties latérales, dans le but de mettre ce bourgeon en relief, afin de l'étudier plus commodément

Mais, en dégarnissant ce bourgeon des tissus latéraux qui l'enveloppaient, je détruisais tous les rapports qui existaient entre le centre et la circonférence de mon Palmier, et perdais ainsi l'une des observations essentielles que je voulais faire. Les difficultés me paraissant trop grandes, insurmontables même, pour moi, désireux avant tout d'étudier le bourgeon, je pris le sage parti de l'enlever avec toute la masse charnue qui en formait la base et le contour. Une fois maître du bourgeon, il m'a été facile de l'étudier complètement jusqu'à la cellule bourgeonnienne, et de constater que, dans un Palmier de cet âge, il n'y a encore rien de semblable à ce qui a été décrit par M. de Mirbel, et qu'au contraire tout se passe exactement comme dans les autres monocotylées

Ainsi donc, pour moi, la loi du développement des monocotylées n'admet pas une seule exception, même en y comprenant les Dattiers jeunes. Viennent les vieux maintenant, et, si je puis m'en procurer un, j'espère bien qu'il ne fera pas mentir la nature, et qu'il nous offrira, à de légères modifications près peut-être, exactement les mêmes caractères

» Permettez-moi donc, messieurs, de redire encore une fois cette grande vérité. Il n'y a qu'un seul mode de développement pour tous les végétaux vasculaires, malgré les grandes différences organiques qui existent entre leurs types divers

» Cependant, n'ayant pu me procurer encore un Dattier de 18^m,60 de hauteur, je ne puis dire d'une manière absolue que le fait organogénique observé par M. de Mirbel sur un Dattier de cet âge et de cette dimension n'existe pas, mais ce que je puis dire et ce que j'assure avec une profonde conviction, c'est que le phénomène, en tant que fait normal, est physiologiquement impossible.

Si les choses se passaient, dans le premier développement des feuilles, comme M de Mirbel l'indique, si une *fente* se formait dans le tissu utriculaire qui compose le centre et le sommet du Palmier, si la petite *lame* cellulaire qui en résulte se soulevait en *ampoule*, si cette *ampoule* se détachait à sa base dans une grande partie de sa circonférence, si elle se relevait ensuite de manière à former un *cuilleron*, et si ce *cuilleron* ou limbe futur ne tenait plus au végétal que par le lambeau pétioleaire persistant, ou *isthme*, la partie vaginale de la feuille se développerait donc secondairement et viendrait plus tard se relier au pétiole. Jamais messieurs, jamais phénomène semblable n'a eu lieu dans le règne végétal !

J'affirme au contraire que cette partie vaginale, et qui forme la base de la feuille, se développe toujours la première, qu'elle reste fixée au végétal par toute sa base, pendant le temps que la feuille met à se développer, et souvent même jusqu'au moment de sa chute, et que le pétiole et le limbe n'en sont que les prolongements naturels.

Donc, si le fait qu'on a si minutieusement décrit existe réellement, ce que nous ne pouvons maintenant révoquer en doute, puisque nous n'avons pas vu de hauts Palmiers, ne le considérons plus, messieurs, que comme une anomalie, un accident, ou, si vous le voulez, comme une erreur de la nature, et nullement comme le type normal du développement des feuilles dans les végétaux monocotylés.

Nous avons étudié, sous ce rapport, les phénomènes du développement des monocotylées dans des embryons naissants, dans des embryons en repos et tels qu'on les trouve dans les fruits mûrs, dans des germinations de tous les âges, dans des Palmiers de un à dix ou douze ans, et partout nous avons trouvé les mêmes causes et les mêmes effets (1).

Nous avons donc de fortes raisons de croire que les causes qui ont produit un stipe de 2 ou 3 mètres de hauteur sont les mêmes que celles qui le porteront à 15 ou 20.

Ces causes, maintenant, nous sont connues, et puisqu'elles sont partout les mêmes, cherchons-les surtout dans les embryons, où nous trouve-

(1) J'ai étudié, dans mes voyages, les bourgeons de très grands Palmiers, tels que Cocotiers, Areuiers, *Chamærops* etc., mais je dois avouer que mes recherches ont été faites dans une autre direction.

Toutefois je déclare n'avoir jamais rien trouvé de semblable à ce qui a été décrit par M. de Mirbel.

ions à la fois les sources de l'organographie, de l'organogénie et de la physiologie

L'étude de l'embryon du Dattier est aujourd'hui, pour moi, l'expérience du monde la plus facile à faire

» Pour cela, il suffit de choisir les dattes les plus mûres, d'en retirer l'osselet, et de le mettre à macérer dans l'eau l'espace de huit ou dix jours, en ayant chaque jour le soin de changer l'eau, afin d'éviter la fermentation

» Par ce moyen, non-seulement on tuméfie l'embryon, qui alors remplit hermétiquement la loge qu'il occupe dans l'osselet ou périsperme, mais on ramollit aussi considérablement celui-ci, qui est naturellement très-dur et de nature cornée

Cette opération faite, on retire ces petites noix de l'eau, on les essue fortement pour les débarrasser d'une sorte de matière mucilagineuse qui les enveloppe. L'embryon ainsi tuméfié est long de 1^{mm},50 à 2 millimètres, et large de 0^{mm},50 à 1 millimètre. Il est situé à peu près au milieu de la longueur et sur la partie arrondie et dorsale du périsperme, ou il est couché horizontalement. Sa forme est à peu près cylindrique, un peu déprimée, élargie et oblique au sommet. Ce sommet dorsal est tourné vers la partie supérieure du fruit.

Pour en étudier l'organisation, il faut le dégager de son périsperme, en ayant soin d'en laisser une légère couche dessus, c'est-à-dire en formant de cet embryon enveloppé de périsperme un petit corps quadrilatère qu'il est alors très-facile de diviser, au moyen d'un instrument à tranchant très-fin, en lames extrêmement minces.

L'embryon, ainsi soutenu de toutes parts par la couche légère de périsperme qui l'encadre, se coupe alors en tous sens avec la plus grande facilité. On pose successivement ces lamelles sur le porte-objet d'un microscope, on les lave pour les débarrasser d'une matière lactescente ou huileuse qui les im-pregne, et on les soumet à l'observation.

» Dans les coupes transversales, on distingue nettement le nombre et la symétrie des faisceaux vasculaires naissants.

» On voit, par exemple, que ces faisceaux, au nombre de six à neuf, et qui tendent à se dédoubler, partent de la base du méristhème tigellaire, et qu'ils n'ont alors aucune communication avec le mamelon radiculaire.

Dans des tranches faites successivement de bas en haut, on observe qu'au-dessus du méristhème tigellaire, qui est très-court, ces traces vasculaires se ramifient en montant, et se portent de plus en plus vers la cuconférence, de

façon que vers le sommet du limbe, ils sont presque superficiels et très-nombreux (1)

Il est je pense, inutile de dire que les coupes longitudinales conduisent aux mêmes résultats

Je demande pardon à l'Académie d'entrer ainsi dans les minutieux détails de ce procédé d'analyse. Je me serais abstenu, si je ne le croyais d'une absolue nécessité

En indiquant les moyens de faire ces expériences tous les observateurs, et fort heureusement ils sont nombreux aujourd'hui, pourront facilement arriver aux résultats que je viens de décrire, et constater l'un des faits les plus importants de l'organographie et de la physiologie. Sans ces moyens, l'étude de l'embryon des monocotylées, spécialement des Palmiers, est extrêmement difficile, sinon impossible

Il est donc aussi important, selon moi, de faire connaître les procédés qui mènent aux faits, que les faits eux-mêmes

S'autoriser d'un fait unique ou très rare dans la nature et presque impossible à trouver pour fonder une doctrine scientifique quelconque, est selon moi très nuisible à la science et à la vérité

La science ne se fait pas par un seul homme, elle exige le concours de toutes les intelligences. Elle appelle surtout la vérification et le contrôle sans lesquels elle ne peut réellement pas exister

N'employons donc jamais que des matériaux aussi nombreux que faciles à se procurer

« Les dattes sont communes. chaque fruit porte son embryon. Tout le monde peut donc s'assurer de l'exactitude du fait que je viens de signaler

Je reviens encore et je m'appesantis sur cet sujet, messieurs, parce qu'il est de la plus haute importance

En effet, si l'observation prouve que l'embryon, ce petit être isolé, n'est primitivement composé que de tissus cellulaires, et que ces tissus, par le seul effet de leur action physiologique, engendrent des tissus vasculaires, que ces tissus vasculaires commencent dans le méristhale tigellaire, puis dans les méristhalles pétiole et limbaire, qu'ils sont tout formés, ou au moins fortement ébauchés dans toutes les parties méristhaliennes avant de se montrer

(1) Voyez GAUDICHAUD, *Organographie*, Pl. I, fig. 13, f. Dans cet embryon, on ne voit que les vaisseaux pétiole-limbaires. Ceux du méristhale tigellaire sont plus au centre, et ne peuvent se voir par transparence

dans le mamelon radiculaire l'analogie seule vous prouvera qu'il doit en être ainsi pour l'organisation de tous les autres individus, quels qu'ils soient, que produira le végétal

Ce fait, messieurs, je le reitere, est capital et digne de vos méditations

J'y suis revenu déjà plusieurs fois, et je compte y revenir encore, parce que, selon moi, il est la clef de l'organographie végétale, et que lui seul résume la théorie des méristhalles que je défends, et infirme toutes les autres

Si, je le redis encore, l'anatomie vous démontre qu'un embryon est primitivement une masse cellulaire isolée, que des tissus vasculaires y apparaissent plus tard sans venir du dehors, qu'ils s'y organisent successivement de toutes pièces, d'éléments, vous serez bien forcés d'admettre, au moins par analogie, que le même phénomène organogénique a lieu pour tous les autres individus ou phytons que produira le végétal

Dans le cas contraire, il vous faudra supposer que la nature emploie un procédé organogénique particulier pour les embryons, un pour les jeunes Palmiers, un pour les vieux, etc, ce qui vous conduira au désordre le plus complet et tout cela, parce qu'on ne veut pas admettre l'individualité des phytons. Mais on y viendra, messieurs, et on y viendra forcément, dès qu'on voudra faire de l'organogénie, de l'organographie et surtout de la physiologie rationnelles, car, je le dis avec confiance, la théorie phytomienne ou des méristhalles est l'ancre de salut de cette partie de la science

On prétend que c'est dans les Palmiers séculaires qu'il faut aller chercher les causes organogéniques des développements, moi, au contraire, je soutiens que c'est dans les bourgeons et dans les embryons naissants et les plus réduits

L'embryon, pris à l'état où il se trouve dans les dattes mûres, n'a pas son système vasculaire entièrement formé, mais seulement tracé ou ébauché, et l'on voit de la manière la plus claire que ce système vasculaire qui s'accroît de plus en plus, part de la base du méristhalle tigellaire, tout court qu'il est, s'étend de proche en proche vers le sommet du cotyledon, et que la base radiculaire n'offre encore aucune trace de vaisseaux

Ce n'est que plus tard, dans les premiers actes de la germination, que ces traces vasculaires des méristhalles deviendront primitivement des trachées, et plus tard encore, qu'on verra partir de la base du méristhalle tigellaire des traces de vaisseaux d'une autre nature qui se dirigeront de haut en bas, en convergeant vers le centre du mamelon de la radicule

Ces dernières traces vasculaires deviendront bientôt de véritables tissus

radiculaire qui se formeront et se solidifieront de haut en bas. Les vaisseaux qui partent de la base du méristhale tigellaire et s'étendent jusqu'au sommet du cotylédon caractérisent le système ascendant ou méristhalien, ceux qui partent de la base du même méristhale, et descendent dans la radicule, caractérisent le système descendant ou radicaire (1). Ceux-ci, qui sont essentiellement de formation secondaire, s'organisent-ils à partir de la base des méristhalles tigellaires, ou descendent-ils des feuilles et ne sont-ils que les prolongements ligneux qui apparaissent dans ces organes après les trachées?

C'est un point que nous avons déjà implicitement abordé et que nous éclaircirons plus tard dans notre Anatomie végétale.

Bornons nous, pour aujourd'hui, à constater 1° que le système ascendant ou trachéen part en montant de la base du méristhale tigellaire, qu'il est engendré par la seule puissance organogénique de l'embryon, qu'il se crée dans un embryon végétal, comme les systèmes nerveux, vasculaires, osseux, etc., dans un embryon animal, et que, dans l'origine, il n'a aucune communication avec la radicule, 2° que le système radicaire part, en descendant, de la même base tigellaire, et qu'il a une organisation essentiellement différente du système méristhalien primitif.

Maintenant, supposons plusieurs embryons greffés les uns au-dessus des autres et se développant les uns après les autres ou simultanément. Chacun après avoir engendré son système ascendant, engendrera son système descendant ou radicaire.

Le premier, ou inférieur, formera sa radicule ou racine propre (2).

Cette racine, comme nous venons de le dire, est composée de vaisseaux particuliers qui descendent dans un mamelon cellulaire.

Le second, qui sera situé au sommet du premier, aura aussi sa radicule. Or les vaisseaux de cette radicule, au lieu de former une racine particulière (ce qui arrive dans quelques cas) (3), descendront dans le méristhale tigellaire du premier embryon comme ils seraient descendus dans leur mamelon radicaire naturel. Arrivés à la base du méristhale tigellaire du premier embryon, ces vaisseaux radiculaires du second pénétreront dans la racine du premier, si, par exemple, cet embryon est de la nature du *Dracæna*, ou

(1) L'organisation de ces deux systèmes paraît subir quelques rares exceptions, dès qu'elles seront vérifiées et constatées, nous nous empresserons de les signaler. Ces exceptions ou modifications, si elles sont réelles, ne sauraient attendre une loi aussi complètement générale.

(2) Foyes GAUDICHAUD, *Organographie*, Pl. I, fig. 2, c.

(3) *Ibid.*, id., Pl. I, fig. 2, i, k.

bien ils formeront une seconde racine ce qui se voit plus ordinairement dans les monocotylées

Ce qui arrive pour le second embryon relativement au premier, arrivera pour le troisième, relativement au second et au premier et successivement. En sorte que, si nous supposons que les embryons superposés soient au nombre de quatre, nous trouverons ordinairement quatre racines à la base du premier (1)

Faites actuellement l'application de ces principes au développement d'un bourgeon quelconque, et vous aurez l'idée la plus exacte qu'on puisse se faire du végétal

Cette digression ne doit pas nous empêcher de continuer l'étude de l'embryon en repos du Dattier

Vers le cinquième inférieur de la longueur de l'embryon c'est à dire au sommet et au centre du méristhème tigellaire, se trouve une petite cavité hémisphérique, du sommet de laquelle part un léger sillon qui se dirige obliquement de bas en haut vers la partie antérieure du cotylédon

C'est ce sillon, qui alors est plus apparent que réel, qui deviendra la concavité du pétiole embryonnaire (2)

La cavité renferme un petit corps de même forme qui en remplit exactement la capacité et tend à l'agrandir en en poussant de bas en haut le sommet

Ce corps, dans certains embryons encore jeunes, est la cellule primordiale du bourgeon cotylédonaire, c'est à dire celle qui doit former la première feuille de la plumule

• Dans d'autres embryons plus avancés, cette feuille primordiale est constituée, légèrement perforée, régulièrement ou irrégulièrement vers le sommet, et renferme la cellule animée secondaire, c'est à dire celle qui doit former la troisième feuille en comptant le cotylédon. Je crois avoir vu (à la vérité dans un seul embryon de Dattier) la cellule animée de la feuille tertiaire ou quatrième en comptant le cotylédon. Mais je n'oserais affirmer le fait, tout probable qu'il est, n'en ayant pas retrouvé depuis

• Le phénomène des premiers développements se montre donc partout le même, dans les embryons en repos, dans les embryons en germination, dans le bourgeon normal qui termine les stipes, comme dans tous ceux qui

(1) *Foyes GAUDICHAUD, Organographie*, Pl III, fig 4, f, g h i

(2) *Ibid*, id, Pl IV, fig 2 h, fig 5 h

peuvent se développer naturellement sur n'importe quelle partie vivante de ce Palmier

Ce qui se passe dans le Dattier sous ce rapport a également lieu dans toutes les monocotylées que j'ai été à même d'observer

Les formes extérieures sont parfois différentes mais les développements intérieurs sont exactement les mêmes. Cette loi organogénique ne souffre pas d'exceptions

J'ai récemment reçu de la Provence un Dattier qui n'avait pas moins de 125 à 150 bourgeons de tous les âges sur la base de son stipe. J'en ai étudié un grand nombre, et tous m'ont offert les caractères que je viens de décrire dans les embryons, c'est-à-dire une cellule animée située au centre des plus jeunes feuilles

Maintenant que dans le bourgeon d'un Dattier de 18^m,60 de hauteur, et de 25 à 30 cent de diamètre ou l'accroissement en largeur peut être plus rapide que l'accroissement en hauteur de l'axe médullaire, les jeunes feuilles du centre soient moins coniques que dans un jeune bourgeon de la même plante, cela est très possible et peut s'expliquer mais sans rien changer à la nature et à l'ordre de succession des individus. Le phénomène peut être modifié mais jamais change. Cela ne se peut pas

Le système vasculaire qui s'organise dans chaque phyton est formé de vaisseaux de plusieurs sortes de trachées d'abord, ainsi que je l'ai précédemment dit

Les tissus qui composent ces vaisseaux sont de même nature dans les trois merithalles ou dans ce que j'ai nommé le système ascendant. Système qui, je l'ai vu encore, est fort distinct du système descendant

Les feuilles proprement dites (les merithalles pétiolaires et limbaires) se détachent et tombent dès qu'elles ont accompli leurs fonctions physiologiques. Il ne reste donc plus de l'individu ou phyton que le méristhalle tigellaire (très-court dans le Dattier), qui produit l'accroissement en hauteur de la tige (1) et dont l'action physiologique a changé

Les faisceaux vasculaires qui le composent sont donc plus ou moins longs plus ou moins nombreux, plus ou moins forts, et toujours en rapport avec le degré d'organisation de l'individu ou phyton dont il était en quelque sorte le corps. De la base du premier individu part la radicule, dont les vaisseaux se forment de haut en bas. De la base du second partent des vais

(1) Voyez GAUDICHAUD, *Organographie*, Pl I, fig 1 et 6

seaux radiculaires isolés qui descendent parallèlement aux vaisseaux méritalliens du premier, en les croisant de différentes manières, de haut en bas, du centre vers la circonférence

Les choses se passent ainsi pour tous les autres (1), tant que dure le végétal

Les vaisseaux radiculaires de chaque feuille se réunissent ordinairement à la base du premier individu, pour composer leur racine (une ou plusieurs)

La racine du second individu est donc située au-dessus de celle du premier, celle du troisième au-dessus de celle du second, etc (2) de là les nombreuses racines qu'on observe à la base des Palmiers en général, du Dattier en particulier, de là aussi celles de l'*Allium Porrum*, qui sont greles et tres-nombreuses, et qui, pour cela, ont reçu le nom de racines chevelues (3)

La tige d'une plante monocotylée est donc composée de méritallies tegellaires tres-variables en organisation et en longueur, superposées et diversement agencées les uns sur les autres, les uns dans les autres, et qui forment son accroissement en hauteur, et de tissus radiculaires, qui partent de la base de chacun de ces méritallies et qui descendent en croisant d'une manière plus ou moins oblique, du sommet à la base du tronc ou stipe, les faisceaux méritalliens immédiatement situés au-dessous d'eux, pour former, avec les tissus cellulaires divers, l'accroissement en largeur

Les tissus radiculaires s'échappent généralement en racines (4)

Les phénomènes d'évolution de la tige des monocotylées sont tres-variables

(1) Voyez GAUDICHAUD, *Organographie*, Pl II, Pl VII, fig 41, 42, 44, Pl VIII fig 3, 4, 5, 6, Pl IX, fig 2, 5, Pl X, fig 2, Pl XI, fig 14, Pl XII, fig 1, 15, 16

(2) *Ibid*, *id*, Pl I, fig 2, Pl III fig 4, Pl IV, fig 5, 5 6, 7, 8, 9, 14, 15, Pl VII fig 11, 18, 20, 36, Pl IX, fig 1, 2, 3, 5

(3) *Ibid*, *id*, Pl IX, fig 1, 2, 3, 5

(4) Les tissus radiculaires des Palmiers passent-ils tous dans les racines? Je ne le pense pas Il est, je crois, impossible de vérifier ce fait

Ce qui est positif, c'est qu'on en voit un certain nombre se devier en tout ou en partie de leur route abandonner en quelque sorte les faisceaux sur lesquels ils rampaient, se diriger vers les racines et y entrer Chemin faisant, ils se rencontrent, se greffent et souvent se convertissent en vaisseaux tres-enflés Arrivés au mamelon radiculaire, qui est souvent fort étroit, ils se séparent de nouveau pour y pénétrer, peut-être à leur état primitif de simplicité.

On peut cependant les réduire tous à deux modes

1 Les monocotylées à mérithalles tigellaires très courts, ou autrement dit à feuilles imbriquées,

2 Les monocotylées à mérithalles tigellaires allongés

Presque tous les exemples des unes et des autres sont connus

Qu'il me soit permis toutefois d'en citer quelques-uns

1 Les monocotylées à mérithalles tigellaires très-courts, à feuilles imbriquées et reposant en quelque sorte les unes sur les autres, sont très-nombreuses. Les Cocotiers, les Dattiers, les *Chamærops*, les *Xanthorrhæa*, les Iliacées bulbeuses, sont de ce nombre. Mais, pour être courts, ces mérithalles tigellaires n'en existent pas moins

Il suffit de jeter un coup d'œil sur les fig 2 et 5 de la Pl IX de mon Organographie pour s'en convaincre, quoique cet exemple soit pris sur un des végétaux les plus réduits du groupe des monocotylées

Ces figures représentent le fait dans l'*Allium Porrum*, la plante monocotyle la plus commune de France, sur laquelle conséquemment tous les observateurs pourront en vérifier l'exactitude (1)

Dans cette plante, le croisement des tissus radiculaires avec les vaisseaux mérithalliens se fait presque à angle droit

Chaque végétal monocotyle, comme je l'ai dit précédemment, offre son mode particulier

Ce que j'ai dit aussi dans mes premières Notes du *Xanthorrhæa* suffit également pour faire comprendre l'analogie d'organisation qui existe entre ce végétal et l'*Allium Porrum*

Les Pl VIII et IX de mon Organographie le démontreront mieux encore

Mais si les mérithalles tigellaires sont peu visibles et trop souvent obscurcies dans les monocotylées de la première division, si leurs tissus vasculaires divers entrecroisés, serrés, et en quelque sorte confondus, forment un lacis inextricable et dont on ne peut dans quelques cas se rendre compte que par la pensée, il n'en est pas ainsi dans les *Areca*, *Caryota*, *Bambusa*, *Saccharum* et toutes les autres graminées, et surtout dans les *Calamus*, de la famille des Palmiers (2), où ils ont souvent plus de 1 mètre de longueur. Ces végétaux et mille autres encore, forment la seconde division

(1) J'ai indiqué dans mon Organographie le moyen de faire cette expérience

(2) Le Jonc à cannes

Dans ces plantes, le croisement des vaisseaux radiculaires avec les vaisseaux méristhaliens quoique plus éloigné ne s'en fait pas moins toujours d'après la loi générale que j'ai établie. On peut en voir des exemples dans la *Pl VIII*, fig 4 et dans la *Pl X* fig 2 de mon *Organographie*.

Pour se faire une idée assez exacte de l'évolution de ces plantes il faut se rappeler d'abord que les individus qui les composent et qui s'organisent au contact dans le bourgeon se développent ensuite à peu près comme les tubes d'une longue vue dont les pièces seraient arrêtées les unes dans les autres à différents degrés.

Supposez, en effet, une longue vue composée d'un grand nombre de tubes et fermée c'est à dire ayant les cylindres qui la composent rentrés les uns dans les autres, et vous aurez l'image d'un végétal monocotylé de la première division (1).

Supposez maintenant tous les tubes plus ou moins ouverts et elle vous représentera un végétal monocotylé de la seconde division.

Si vous supposez encore qu'au lieu d'être formée de tubes entiers continus elle soit composée d'une grande quantité de faisceaux de fils, variables en nombre de différents calibres régulièrement et verticalement disposés en cylindres que ces fils sont élastiques à des degrés divers et plus ou moins allongés vous aurez sans contredit la meilleure idée qu'on puisse se former du développement en hauteur du système vasculaire des monocotylées comme aussi des dicotylées.

Pour compléter ces comparaisons vous n'aurez plus qu'à supposer une feuille c'est à dire un pétiole et un limbe fixes au sommet de chaque tube cylindrique et des vaisseaux radiculaires partant de leurs bases arrêtées traversant en partie du centre à la circonférence et de haut en bas les cylindres inférieurs pénétrant diversement selon les groupes ou les genres dans les articulations ou arêtes y formant quelques circonvolutions en sortant ensuite pour continuer leur marche descendante sur les cylindres et les articulations inférieurs et vous aurez encore une idée vraie de l'organisation d'un végétal monocotylé de l'une ou de l'autre division (2).

Enfin pour en finir avec mes suppositions admettez encore que tous les tubes d'une lunette soient ouverts c'est-à-dire retirés les uns des autres

(1) Cette supposition qui donne une très bonne idée du phénomène de l'enchevêtrement des individus ne doit pas être prise à la lettre. On sait très bien que les individus ne sont pas entièrement renfermés les uns dans les autres.

(2) Voyez GAUDICHAUD *Organographie* Pl VIII fig 4, Pl X fig 2, Pl XIV fig 11.

jusqu'à leur point d'arrêt, et que, par une force quelconque, ils se soient développés en tous sens de manière à avoir à peu près les mêmes dimensions en longueur et en largeur, et vous aurez l'image des gaminées, d'une canne à sucie, d'un roseau, d'un bambou.

Le bambou, dont j'ai déjà parlé, est un exemple remarquable que je recommande à l'attention des hommes qui, avec moi, cherchent la vérité.

Tout Paris a pu voir, dans nos serres, avec quelle rapidité croît ce végétal.

Plusieurs bourgeons coniques, hauts de 15 à 30 centimètres, et larges de 6 à 10, partent de son rhizome.

Si l'on étudie l'un de ces bourgeons, on voit qu'il est composé d'une sorte de petite tige à mérithalles très courts, et de feuilles roulées en cornets, emboîtées, au contact, les unes dans les autres.

Dès que ce bourgeon est arrivé à un certain degré d'organisation et de force, il commence son évolution. On sait combien elle est rapide.

Examinez maintenant ce chancre gigantesque et vous le trouverez composé de 70 à 100 individus (1), dont les mérithalles tigellaires distincts ont de 10 à 50 centimètres de longueur, et de 6 à 10 centimètres de largeur, et sont surmontés chacun de sa feuille réduite à l'état de pétiole engainant, ayant bien plutôt l'air d'une stipule que d'une feuille (2).

Ces feuilles, en effet, sont réduites à des mérithalles pétiolaires imparfaits, quoique larges et engainants, au sommet desquels on observe pourtant quelquefois une petite languette produite par le mérithalle limbaire avorté. Dans l'espèce du *Museum*, le limbe est lancéolé et assez grand. Il avorte dans quelques espèces.

* Ces 70 ou 100 individus ont le même aspect (3), la même forme, la même organisation, et conséquemment des fonctions semblables.

J'insiste sur ce dernier point surtout, parce que je dois y revenir dans ma Physiologie, en parlant de la canne à sucre, du maïs, etc., et de la saccharification, phénomène sur lequel j'aurai, je pense, d'utiles renseignements à fournir.

Arrivés à un certain degré d'évolution, ces mérithalles tigellaires ces-

(1) Dans nos serres ils n'en ont jamais que de 40 à 50.

(2) En cet état, le bambou réalise jusqu'à un certain point la supposition que j'ai faite des embryons superposés.

(3) Elles ne sont jamais très-vertes.

sent de croître en tous sens, leurs feuilles achevent de remplir leurs fonctions organisatrices, puis elles se détachent peu à peu et tombent, laissant à nu leurs mérithalles tigellaires. Cette chute des feuilles est plus ou moins prompte, et généralement relative au degré de croissance des bourgeons axillaires. Chaque feuille a le sien.

Ces bourgeons donnent naissance à des rameaux qui sont généralement greles et formés de feuilles étroites et vertes. Dans la plupart des espèces, les fleurs ne paraissent que la seconde année ou plus tard.

Si ce végétal ne produisait pas de bourgeons axillaires, il ne tarderait pas à mourir, ainsi que le font nos plus humbles graminées après avoir accompli les fonctions physiologiques d'accroissement de chacun des individus qui le composent, il serait annuel. Mais, en donnant des bourgeons qui forment des feuilles vertes, et celles-ci des rameaux, non-seulement il devient bisannuel et jusqu'à un certain point vivace, mais il peut encore accroître assez notablement le diamètre de son chaume par la descension des tissus radiculaires des feuilles qui composent ses rameaux.

» Dans les plantes de ce groupe, le croisement des vaisseaux des différents systèmes se fait à l'articulation même, ainsi qu'on en trouve la preuve dans les fig. 1 à 9 de la Pl. X de mon Organographie, et dans la Pl. VIII, fig. 4, du même ouvrage.

» Mais comme je l'ai déjà dit plusieurs fois, chaque plante des deux divisions générales a, pour ainsi dire sous ce rapport, sa modification particulière.

» Ces modifications organiques se lient peut-être avec les causes qui produisent les classes, les familles, les genres et les espèces, etc., ainsi que les fonctions, les sécrétions.

Des considérations sur ce sujet seraient déplacées ici, j'y reviendrai dans un autre moment.

Mais, je pense, suffisamment prouvé, par les exemples fournis par le *Dracæna*, que les tiges de ces végétaux monocotyles s'accroissent en diamètre par l'âge et le temps, c'est-à-dire en raison directe du nombre de feuilles et conséquemment de tissus radiculaires qu'ils produisent. S'il fallait le prouver mieux, toujours par des faits, je n'aurais qu'à citer les *Dracæna draco* de nos séries, qui n'ont encore que 2^m,50 de hauteur et 45 centimètres de circonférence, et les comparer au Dragonnier de la même espèce, qui croît aux îles Canaries, qui, lui, n'a pas moins de 30 mètres de hauteur et de 15 mètres de circonférence. On sait que cet arbre est creux et qu'un indigène en a fait son habitation.

Eh bien, je soutiens, et je prouverai que tous les végétaux monocotylédones vivaces, les Dattiers comme les autres grossissent par le temps et par les mêmes causes

Ces causes sont très variables sans doute, toutes n'ont pas été convenablement étudiées peu sont bien connues mais elles n'en sont pas moins évidentes pour cela

Cet accroissement est moins sensible il est vrai dans les Palmiers à tiges simples, à bourgeons terminaux, surtout chez ceux qui souffrent par l'action des climats des terrains et de beaucoup d'autres causes que nous aborderons dans notre Mémoire sur le Dattier mais nous prouverons, par des exemples de toute nature qu'ils sont soumis à la loi générale des développements

Nous démontrons aussi que tous, même ceux qui ont des méristhalles allongées sont très sensiblement coniques

Les Palmiers des serres du Muséum et ceux de nos collections phytologiques nous en fourniront d'ailleurs de nombreux exemples

Les *Xanthorrhoea*, qui ont aussi un bourgeon terminal et dont l'organisation est très analogue à celle des Palmiers, sont aussi visiblement coniques

Leur accroissement en diamètre est considérable Il suffira de jeter un coup d'œil sur les deux tronçons de cet arbre que j'ai déposés dans les collections phytologiques du Muséum pour en avoir la preuve

En effet, ces tiges qui proviennent de deux individus de la même espèce ont l'une qui est encore jeune 30 centimètres de circonférence l'autre, plus avancée en âge, 60 et plus

Si l'accroissement en diamètre des végétaux monocotylés à tiges simples et à bourgeons terminaux est généralement peu sensible, il n'en est pas ainsi de ceux qui sont rameux et conséquemment multibourgeonnés Les *Dracaena* déjà cités, les Pandanées et les Palmiers rameux eux mêmes, ne laissent aucun doute à ce sujet

Mais j'aborderai ces questions et toutes celles qui ont été soulevées dans le Mémoire de M. de Mirbel en répondant à ce travail

J'ai, dans mes secondes Notes, fixé l'attention de l'Académie sur la curieuse organisation des *Pourretia* et autres broméliacées, des *Kingia* et des *Vellovia* j'apporte aujourd'hui deux jeunes rameaux de la dernière plante dont l'un a été disséqué par macération dans l'alcool

Tout le monde comprendra maintenant le curieux mode d'accroissement en diamètre de ces végétaux, accroissement qui n'a guère lieu que par l'adjonction des racines qui, chaque année, se forment, comme les feuilles, au

sommet des rameaux, descendent sur les grosses branches, de celles-ci dans le tronc et du tronc dans le sol

On vous a dit que, dans les Palmiers âgés, la vie active et génératrice se réfugie vers les deux extrémités »

Je combattrai cette allégation avec des faits fournis par de nombreux Palmiers, et particulièrement par des *Sagueius* ou *Arenga*, des *Chamædorea*, même par des Dattiers, spécialement par ceux qui croissent sur les bords du Nil

J'ai l'honneur de montrer à l'Académie un petit Palmier de la Guyane, du genre *Chamædorea*, qui m'a été donné par M. le Prieur, pharmacien en chef de la marine à Cayenne

D'après cet habile voyageur, presque toutes les tiges de ce Palmier qui croît dans les forêts humides, sont couvertes du haut jusqu'en bas, non seulement de racines pendantes, mais encore de bourgeons dont les racines sont également aériennes

Ce Palmier, tout petit qu'il est, est certainement très-âgé, et prouve que si la vitalité ne se manifeste pas ordinairement le long du stipe des monocotylées, elle n'y existe pas moins. On comprendra que, puisque cette vitalité se conserve dans un stipe d'une aussi faible dimension, elle doit à plus forte raison, se maintenir avec énergie dans un très-gros stipe de Dattier tout chargé d'humidité

Enfin je prouverai que, si cette vie active ne se montre pas sur le stipe des Dattiers de l'Algérie, cela tient à des causes locales, puisqu'elle est très-évidente sur ceux qui croissent sur les bords du Nil. Tous les voyageurs ont remarqué l'extrême différence qui existe entre les Dattiers de cette dernière localité et de certaines oasis arrosées, et ceux qui végètent péniblement dans les sables brûlants du désert

Les causes, ici comme partout, nous donneront l'explication des effets

Je ne terminerai pas ces Notes sans prier l'Académie de vouloir bien remarquer que, si je lui ai souvent présenté les mêmes faits, chaque fois je les lui ai montrés sous un nouvel aspect, sous une forme différente, ou au moins avec de plus grands développements, et que tous, pour peu qu'ils soient régulièrement observés et bien interprétés, viennent se ranger naturellement dans la théorie des méristhales, et justifier la doctrine phytologique que je défends

CHIMIE — *Note sur la fabrication du sucre, par M DUMAS*

Depuis quelque temps on parlait beaucoup d'un nouveau perfectionnement tres remarquable apporte a la fabrication du sucre indigene par M Schuzenbach, et mis en pratique dans quelques usines du département du Nord. J'ai désiré me rendre compte des résultats qu'il avait fournis. Je me suis donc rendu, ces jours derniers, a Valenciennes, ou j'ai pu voir les procédés de M Schuzenbach, installés sur une large echelle, chez MM Hargnignies, Blanquet et C^{ie}, qu'on trouve toujours aux premiers rangs quand il s'agit de perfectionner notre fabrication indigene.

Grace aux details que ces messieurs m'ont donnés, grace a la confiance de M Schuzenbach, qui a voulu déposer entre mes mains une description complete et détaillée de ses procédés avec l'indication des principes qui l'ont dirigé, j'ai pu me former une opinion sur les questions délicates qui vont necessairement être soulevées, et j'ai cru qu'il était de mon devoir d'en entretenir l'Académie, qui renferme les juges a la fois les plus éclairés sur ces matieres, et les mieux placés pour faire prévaloir les droits de la vérité.

Voici les faits.

M Schuzenbach, par des observations tres-fines sur les causes de l'altération qu'éprouvent les dissolutions de sucre dans l'eau, est parvenu à découvrir des procédés tres-simples qui permettent de retrouver, sous forme de cristaux, a moins de 1 centieme pres, tout le sucre cristallisable que renferme une dissolution.

De plus, quand on a reproduit ce sucre en cristaux, il suffit, pour le rendre incolore, de le soumettre a un lavage systématique avec des dissolutions de sucre faites a froid a l'aide des appareils imaginés par M Schuzenbach, ces lavages se font avec une grande facilité, et, loin de diminuer, la proportion de sucre soumise au lavage augmente notablement de poids.

Enfin, par une dissolution et une cristallisation très faciles alors, M Schuzenbach convertit en sucre royal la totalité de ce sucre ainsi purifié.

C'est ainsi que cet habile industriel est parvenu a retirer de la variété de sucre qu'on nomme *bonne quatrième*, au moins 80 p 100 et quelquefois 90 p 100 de sucre royal. Les membres de la Commission qui fut chargée, il y a quelques années, par M le Ministre du Commerce, de fixer le rendement des sucres au raffinage, et notre illustre confrere M Thenard en particulier, avaient donc tout à fait raison quand ils soutenaient, contre l'assertion de nos raffineurs, qu'en travaillant bien, on devait retirer de 100 kilogrammes de sucre brut au moins 75 kilogrammes de sucre raffiné.

Ces procédés de raffinage sont mis en pratique dans un assez grand nombre de raffineries

D'autre part M Schuzenbach a reconnu que le jus de betterave, une fois amené à 30 degrés de Baumé, peut fournir en grand, par ses procédés exactement tout le sucre cristallisable qu'on en retire par l'analyse chimique la plus soignée

Ces procédés ont été mis en pratique sur une large échelle pendant le cours de cette campagne, dans la fabrique de Tirlemont, en Belgique et avec quelques modifications que le défaut d'appareils rendait nécessaires dans les usines de MM Harpignies Blanquet et C^e, Harpignies Delunay et C^e Ieroi, Hamon, etc

» Par tout, le succès a été d'autant plus complet qu'on a pu se rapprocher davantage du procédé imaginé par M Schuzenbach et que l'état du matériel n'a pas forcé de s'en cloigner trop

A Tirlemont par exemple où l'on a opéré sur 10 millions de livres de betteraves on a retiré environ 5,5 de sucre royal pour 100 de betteraves. On estime qu'en raison des circonstances, peu favorables cette année, on n'aurait pas retiré plus de sucre brut. D'ailleurs les frais de fabrication sont demeurés les mêmes que par le passé.

» Chez M Blanquet, on a produit cette année, 30 000 pains de sucre semblables à ceux que je dépose sur le bureau de l'Académie. Ils ont été amenés à l'état qu'on désigne sous le nom de *sucre tape*, le temps n'ayant pas permis d'organiser le matériel nécessaire, en formes de tôle vernie.

Les principes sur lesquels M Schuzenbach fonde sa nouvelle méthode d'extraction ont donc pour résultat de rendre pleinement praticable une pensée qu'on aurait pu craindre de voir demeurer longtemps encore dans le domaine de la théorie pure, car, il ne sort maintenant des usines qui travaillent d'après ces principes, que deux produits savoir du sucre en pain parfaitement blanc, et de la mélasse tellement épuisée qu'elle ne peut plus servir qu'à la distillation. Toutes les qualités intermédiaires ont disparu, et le rendement loin d'en souffrir, a sensiblement augmenté.

» Ces résultats ont été obtenus d'une manière tout à fait indépendante de l'ancien procédé de dessiccation de la betterave que M Schuzenbach a le premier mis en pratique sur une grande échelle. Mais, d'après les observations que sa longue expérience lui a permis de faire, cet habile industriel a reconnu que la dessiccation n'était praticable avec succès que sur les betteraves récoltées dans des terrains sablonneux, stériles ou peu productifs, lesquels fournissent bien moins de récolte que les terres si riches du département du Nord,

par exemple mais qui donnent une racine dont le jus n'est pour ainsi dire que de l'eau sucrée très-facile à exploiter. Ces betteraves desséchées se conservent sans altération.

Il n'en est pas ainsi des betteraves qu'on récolte dans les parties de la France qui se sont le plus spécialement occupées de cette fabrication. Du reste M. Schuzenbach a mis à ma disposition tous les renseignements relatifs à la méthode de travail par la dessiccation, qui a été pratiquée sans interruption par un grand nombre d'usines du nord de l'Europe depuis quelques années, et qui par exemple, cette année même, l'a été dans une seule usine de la Hongrie sur 30 millions de livres de betteraves desséchées la même usine ayant traité en outre 30 millions de livres de betteraves fraîches par les méthodes ordinaires.

On voit que les procédés de M. Schuzenbach nous donnent le moyen d'extraire sans perte aucune tout le sucre qui se trouve encore dans le jus de betterave amené à 30 degrés de Baume. Si on n'en retire alors que 5 à 6 pour 100 du poids de la betterave qui en renfermait réellement 8 ou 10 pour 100 il faut en conclure que ce sont les opérations précédentes qui détruisent ou qui altèrent la portion de sucre qu'on ne retrouve pas.

L'attention des chimistes devra donc se porter tout entière sur les altérations que le jus de betterave éprouve au moment du rapage et par la dessiccation, et aussi sur les moyens de conserver au noir animal toutes ses qualités on doit en supprimer l'emploi qui, à raison des impuretés dont il se charge, doit avoir de graves inconvénients.

A l'aide de quelques perfectionnements possibles et faciles dans cette partie du travail, la fabrication du sucre de betterave se placera au rang des industries chimiques les plus parfaites car toute la partie du travail que M. Schuzenbach vient de remanier offre maintenant le modèle d'une application sûre des principes de la science à la pratique des ateliers.

Maintenant on est bien forcé de conclure de ces nouveaux faits que la législation des sucres laisse bien des lacunes, car, d'après la base d'évaluation des qualités pour le prélèvement des droits sur les sucres, on est conduit au résultat fâcheux dont je viens d'être témoin dans une des principales usines du département du Nord, où l'on fait de beau sucre blanc par le procédé de M. Schuzenbach, et où on le pile ensuite pour y mêler 10 pour 100 de melle afin de le ramener au type de la bonne quatrième. Si on ne pratiquait pas cette opération, on y perdrait, à cause de la surtaxe exagérée qu'il faudrait payer au fisc.

ASTRONOMIE — *Nouveau Mémoire sur le calcul des inégalités des mouvements planétaires, par M AUGUSTIN CAUCHY*

On sait que le calcul des inégalités des mouvements planétaires a pour base le développement de la fonction perturbatrice en une série de termes proportionnels aux puissances entières, positives nulles et négatives, des exponentielles trigonometriques dont les arguments sont les anomalies moyennes des planetes. On sait encoie que dans la fonction perturbatrice la partie dont le developpement offre des difficultes sérieuses, est la partie reciproquement proportionnelle a la distance mutuelle des deux planetes que l'on considere. Or, en s'appuyant sur une remarque faite dans un precedant Memoire (voir la p 318 du t XIII des *Comptes rendus*) et relative à certaines propriétés des fonctions entieres et réelles des sinus et cosinus d'un meme angle, on peut aisement developper le rapport de l'unité à la distance de deux planetes en une série de termes proportionnels aux puissances de l'exponentielle trigonometrique qui a pour argument l'une des anomalies excentriques et meme l'une des anomalies moyennes. Cette simple observation sert de fondement à la méthode nouvelle que je propose pour le calcul des inegalités des mouvements planétaires et qui me parait offrir des avantages assez considerables pour mériter de fixer un moment l'attention des géometres. Je me bornerai d'ailleurs à donner dans ce Memoire une idee générale de mes nouvelles recherches, que je reproduirai avec plus de details dans les *Exercices d'Analyse et de Physique mathématique*.

Le premier paragraphe du Memoire sera relatif à des notions preliminaires. Il aura pour objet la décomposition d'une fonction réelle et entiere des sinus et cosinus d'un même angle en facteurs simples dont chacun soit linéaire par rapport à l'exponentielle trigonometrique qui offre un argument égal, au signe près, à l'angle donné. Dans le second paragraphe, je montrerai comment on peut decomposer en facteurs de cette espèce le carre de la distance mutuelle de deux planetes. Enfin, dans les paragraphes suivants, je développerai en série le rapport de l'unité à cette même distance.

§ 1^{er} — *Décomposition d'une fonction réelle et entiere des sinus et cosinus d'un même angle en facteurs simples*

Soit

$$(1) \quad u = f(\cos p, \sin p)$$

une fonction réelle du sinus et du cosinus de l'angle p si l'on pose

(626)

$$\operatorname{tang} \frac{p}{2} = t,$$

on aura

$$(2) \quad u = f\left(\frac{1-t^2}{1+t}, \frac{2t}{1+t^2}\right),$$

et, comme en consequence u sera encore une fonction réelle de t , l'équation

$$(3) \quad u = 0,$$

résolue par rapport à t , ne pourra offrir une racine imaginaire et finie de la forme

$$t = \rho e^{\varphi \sqrt{-1}},$$

ρ designant une quantité positive, et φ un arc réel, sans offrir une seconde racine imaginaire conjuguée à la première, et de la forme

$$t = \rho e^{-\varphi \sqrt{-1}}$$

Soit maintenant

$$s = e^{p \sqrt{-1}} = \frac{1+t \sqrt{-1}}{1-t \sqrt{-1}}$$

On aura encore

$$(4) \quad u = f\left(\frac{s+\frac{1}{s}}{2}, \frac{s-\frac{1}{s}}{2\sqrt{-1}}\right),$$

et, à deux valeurs de t , de la forme

$$(5) \quad t = \rho e^{\varphi \sqrt{-1}}, \quad t = \rho e^{-\varphi \sqrt{-1}},$$

correspondront deux valeurs de s , de la forme

$$s = \frac{1 + \rho e^{\varphi \sqrt{-1}} \sqrt{-1}}{1 - \rho e^{\varphi \sqrt{-1}} \sqrt{-1}}, \quad s = \frac{1 + \rho e^{-\varphi \sqrt{-1}} \sqrt{-1}}{1 - \rho e^{-\varphi \sqrt{-1}} \sqrt{-1}}$$

Où, comme l'une de ces deux valeurs de s , et l'inverse de l'autre, seront évidemment deux expressions imaginaires conjuguées, elles pourront être réduites aux formes

$$(6) \quad s = a e^{\alpha \sqrt{-1}}, \quad s = \frac{1}{a} e^{\alpha \sqrt{-1}},$$

a designant une quantité positive et α un arc réel

(627)

» Si l'angle φ se réduisait à zéro ou à π , alors la valeur de t fournie par chacune des équations (5) se réduirait à la valeur réelle

$$t = \pm \rho,$$

qui pourrait être une racine simple de l'équation (3); et à cette racine correspondrait une seule valeur de s déterminée par la formule

$$(7) \quad s = e^{\alpha\sqrt{-1}},$$

le module a se trouvant réduit à l'unité.

» De ces remarques on déduit généralement la proposition suivante.

» 1^{re} *Théorème*. Étant donnée une fonction réelle u des sinus et des cosinus de l'angle p , si l'on pose

$$s = e^{p\sqrt{-1}},$$

les racines finies de l'équation

$$u = 0,$$

résolue par rapport à s , seront ou des racines dont les modules se réduiront à l'unité, ou des racines qui, prises deux à deux, offriront, avec un même argument, deux modules inverses l'un de l'autre. En d'autres termes, les racines finies de l'équation

$$u = 0$$

seront de la forme

$$s = e^{\alpha\sqrt{-1}},$$

ou, prises deux à deux, elles seront de la forme

$$s = ae^{\alpha\sqrt{-1}}, \quad s = \frac{1}{a}e^{\alpha\sqrt{-1}},$$

a désignant une quantité positive et α un arc réel.

» Il est bon d'observer que des deux modules $a, \frac{1}{a}$, le premier, a , peut être supposé le plus petit, et qu'alors on a nécessairement

$$(8) \quad a < 1.$$

» Concevons à présent que u représente une fonction entière des sinus et cosinus de l'angle p , et nommons m le degré de cette fonction par rap-

port à ces sinus et cosinus. En vertu de l'équation (4), u sera évidemment de la forme

$$(9) \quad u = \frac{s}{s^m},$$

s désignant une fonction entière de s , du degré $2m$; et, en vertu du théorème 1^{er}, s sera le produit d'une constante réelle ou imaginaire par des facteurs linéaires dont chacun sera de la forme

$$s - e^{\alpha\sqrt{-1}},$$

ou par des facteurs linéaires qui, pris deux à deux, seront de la forme

$$(10) \quad s - ae^{\alpha\sqrt{-1}}, \quad s - \frac{1}{a}e^{\alpha\sqrt{-1}}$$

Si u ne peut s'évanouir pour aucune valeur de s dont le module soit l'unité, ou, ce qui revient au même, pour aucune valeur réelle de l'angle p , tous les facteurs linéaires seront de la forme (10); et comme l'on a identiquement

$$\frac{1}{s} \left(s - ae^{\alpha\sqrt{-1}} \right) \left(s - \frac{1}{a}e^{\alpha\sqrt{-1}} \right) = -\frac{e^{\alpha\sqrt{-1}}}{a} \left(1 - ase^{-\alpha\sqrt{-1}} \right) \left(1 - \frac{a}{s}e^{\alpha\sqrt{-1}} \right),$$

il est clair que, dans l'hypothèse admise, la fonction u sera le produit d'une certaine constante k par des facteurs qui, pris deux à deux, seront de la forme

$$(11) \quad 1 - ase^{-\alpha\sqrt{-1}}, \quad 1 - \frac{a}{s}e^{\alpha\sqrt{-1}}.$$

On aura donc alors

$$(12) \quad u = k \left(1 - ase^{-\alpha\sqrt{-1}} \right) \left(1 - \frac{a}{s}e^{\alpha\sqrt{-1}} \right) \left(1 - bse^{-\beta\sqrt{-1}} \right) \left(1 - \frac{b}{s}e^{\beta\sqrt{-1}} \right),$$

a, b, \dots désignant des modules inférieurs à l'unité, et α, β, \dots des arcs réels. D'ailleurs, en vertu de l'équation

$$s = e^{p\sqrt{-1}},$$

tout produit de la forme

$$\left(1 - ase^{-\alpha\sqrt{-1}} \right) \left(1 - \frac{a}{s}e^{\alpha\sqrt{-1}} \right)$$

se réduit à un trinôme de la forme

$$1 - 2a \cos(p - \alpha) + a^2,$$

et par conséquent à une quantité qui ne peut être que positive ou nulle, pour une valeur réelle de l'angle p . Donc, si la quantité u reste positive pour toutes les valeurs réelles de p , la constante k renfermée dans le second membre de l'équation (12) devra elle-même être positive. On peut donc énoncer la proposition suivante

2° *Théorème.* Si une fonction réelle et entière u des sinus et cosinus d'un certain angle p reste positive pour toutes les valeurs réelles de cet angle, et si l'on prend d'ailleurs

$$s = e^{p\sqrt{-1}},$$

on aura

$$u = k \left(1 - a s e^{-\alpha\sqrt{-1}}\right) \left(1 - \frac{a}{s} e^{\alpha\sqrt{-1}}\right) \left(1 - b s e^{-\beta\sqrt{-1}}\right) \left(1 - \frac{b}{s} e^{\beta\sqrt{-1}}\right) \dots,$$

a, b, \dots désignant des nombres inférieurs à l'unité, k une quantité positive, et α, β, \dots des arcs réels.

Supposons, pour fixer les idées,

$$(13) \quad u = A + 2\mathfrak{A} \cos p + 2\mathcal{C} \sin p,$$

$A, \mathfrak{A}, \mathcal{C}$ étant des coefficients réels dont le premier soit positif et vérifie la condition

$$(14) \quad A^2 > 4(\mathfrak{A}^2 + \mathcal{C}^2).$$

Alors, pour des valeurs réelles de l'angle p , la valeur de u sera toujours positive; et en posant

$$s = e^{p\sqrt{-1}},$$

on trouvera

$$\cos p = \frac{s + \frac{1}{s}}{2}, \quad \sin p = \frac{s - \frac{1}{s}}{2\sqrt{-1}},$$

par conséquent

$$(15) \quad u = A + (\mathfrak{A} - \mathcal{C}\sqrt{-1})s + (\mathfrak{A} + \mathcal{C}\sqrt{-1})\frac{1}{s}.$$

Alors aussi l'équation (12) sera réduite à

$$(16) \quad u = k \left(1 - a s e^{-\alpha \sqrt{-1}} \right) \left(1 - \frac{a}{s} e^{\alpha \sqrt{-1}} \right).$$

Or, des formules (15), (16) comparées entre elles on tirera

$$(17) \quad \begin{aligned} k(1+a^2) &= \mathfrak{A}, \\ k &= \frac{\mathfrak{A}}{1-a^2}, \end{aligned}$$

et par suite la formule (16) pourra être réduite à

$$(18) \quad u = \frac{\mathfrak{A}}{1+a^2} \left(1 - a s e^{-\alpha \sqrt{-1}} \right) \left(1 - \frac{a}{s} e^{\alpha \sqrt{-1}} \right)$$

Ainsi l'on peut énoncer la proposition suivante.

» 3^e *Théorème*. Nommons u une fonction réelle et linéaire de $\cos p$ et de $\sin p$, qui conserve une valeur positive pour toutes les valeurs réelles de p , en sorte qu'on ait

$$u = \mathfrak{A} + 2\mathfrak{B} \cos p + 2\mathfrak{C} \sin p,$$

$\mathfrak{A}, \mathfrak{B}, \mathfrak{C}$ désignant trois coefficients réels dont le premier soit positif et vérifie la condition

$$\mathfrak{A}^2 > 4(\mathfrak{B}^2 + \mathfrak{C}^2).$$

On aura encore

$$u = \frac{\mathfrak{A}}{1+a^2} \left(1 - a s e^{-\alpha \sqrt{-1}} \right) \left(1 - \frac{a}{s} e^{\alpha \sqrt{-1}} \right),$$

a désignant un nombre inférieur à l'unité, et α un arc réel.

» *Corollaire*. Pour déterminer a et α , il suffit d'observer que la comparaison des formules (15), (16) fournit, avec l'équation (17), les deux suivantes

$$-k a e^{-\alpha \sqrt{-1}} = \mathfrak{B} - \mathfrak{C} \sqrt{-1}, \quad -k a e^{\alpha \sqrt{-1}} = \mathfrak{B} + \mathfrak{C} \sqrt{-1},$$

desquelles on tire non-seulement

$$e^{\alpha \sqrt{-1}} = -\frac{\mathfrak{B} + \mathfrak{C} \sqrt{-1}}{(\mathfrak{B}^2 + \mathfrak{C}^2)^{\frac{1}{2}}},$$

et par suite

$$(19) \quad \cos \alpha = -\frac{\mathfrak{A}}{(\mathfrak{A}^2 + \mathfrak{C}^2)^{\frac{1}{2}}}, \quad \sin \alpha = -\frac{\mathfrak{C}}{(\mathfrak{A}^2 + \mathfrak{C}^2)^{\frac{1}{2}}}.$$

mais encore

$$ka = (\mathfrak{A}^2 + \mathfrak{C}^2)^{\frac{1}{2}},$$

et par suite, eu égard à l'équation (17),

$$(20) \quad a + \frac{1}{a} = \frac{\mathfrak{A}}{(\mathfrak{A}^2 + \mathfrak{C}^2)^{\frac{1}{2}}}.$$

Comme, eu égard à la condition (14), le second membre de la formule (20) surpasse le nombre 2, il est clair que cette formule fournira, ainsi qu'on devait s'y attendre, une valeur réelle de a .

» Supposons maintenant

$$(21) \quad u = \mathfrak{A} + 2\mathfrak{A} \cos p + 2\mathfrak{C} \sin p + k\mathfrak{O} \cos^2 p,$$

\mathfrak{A} , \mathfrak{A} , \mathfrak{C} , \mathfrak{O} étant des coefficients réels, tellement choisis que la fonction u conserve toujours une valeur positive. Alors, en prenant

$$s = e^{p\sqrt{-1}},$$

on aura

$$(22) \quad u = \mathfrak{A} + (\mathfrak{A} - \mathfrak{C}\sqrt{-1})s + (\mathfrak{A} + \mathfrak{C}\sqrt{-1})\frac{1}{s} + \mathfrak{O}\left(s + \frac{1}{s}\right)^2;$$

et l'équation (12) deviendra

$$(23) \quad u = k\left(1 - ase^{-\alpha\sqrt{-1}}\right)\left(1 - \frac{a}{s}e^{\alpha\sqrt{-1}}\right)\left(1 - bse^{-\beta\sqrt{-1}}\right)\left(1 - \frac{b}{s}e^{\beta\sqrt{-1}}\right),$$

a , b désignant des nombres inférieurs à l'unité, k une quantité positive, et α , β deux arcs réels. Or, des formules (22), (23) comparées entre elles, on tirera

$$(24) \quad \mathfrak{O} = kabe^{-(\alpha+\beta)\sqrt{-1}} = kabe^{(\alpha+\beta)\sqrt{-1}}.$$

» Si le coefficient \mathfrak{O} est positif, la formule (24) donnera

$$kab = \mathfrak{O}, \quad k = \frac{\mathfrak{O}}{ab},$$

(63a)

et

$$e^{(\alpha+\epsilon)\sqrt{-1}} = 1,$$

ou, ce qui revient au même,

$$e^{\epsilon\sqrt{-1}} = e^{-\alpha\sqrt{-1}}.$$

Donc alors la formule (23) sera réduite à

$$(25) \quad u = \frac{\Omega}{ab} \left(1 - a s e^{-\alpha\sqrt{-1}}\right) \left(1 - \frac{a}{s} e^{\alpha\sqrt{-1}}\right) \left(1 - b s e^{\alpha\sqrt{-1}}\right) \left(1 - \frac{b}{s} e^{-\alpha\sqrt{-1}}\right).$$

Ainsi l'on peut énoncer la proposition suivante.

4^e *Théorème.* Soit

$$u = \lambda + 2\mu \cos p + 2\epsilon \sin p + 4\Omega \cos^2 p,$$

$\lambda, \mu, \epsilon, \Omega$ désignant quatre coefficients dont le dernier Ω soit positif. Si la valeur précédente de u reste elle-même positive pour toutes les valeurs réelles de l'angle p , on aura

$$u = \frac{\Omega}{ab} \left(1 - a s e^{-\alpha\sqrt{-1}}\right) \left(1 - \frac{a}{s} e^{\alpha\sqrt{-1}}\right) \left(1 - b s e^{\alpha\sqrt{-1}}\right) \left(1 - \frac{b}{s} e^{-\alpha\sqrt{-1}}\right),$$

a, b désignant des modules inférieurs à l'unité, et α un arc réel.

» *Corollaire.* Si, dans l'hypothèse admise, on pose

$$(26) \quad a = a e^{\alpha\sqrt{-1}}, \quad b = \frac{1}{a} e^{\alpha\sqrt{-1}}, \quad c = b e^{-\alpha\sqrt{-1}}, \quad d = \frac{1}{b} e^{\alpha\sqrt{-1}},$$

les quatre lettres

$$a, b, c, d$$

représenteront les quatre racines finies de l'équation

$$u = 0,$$

qui, en vertu de la formule (22), deviendra

$$(27) \quad \Omega (s^2 + 1)^2 + (\mu - \epsilon \sqrt{-1}) s^2 + \lambda s^2 + (\mu + \epsilon \sqrt{-1}) s = 0,$$

ou

$$(28) \quad s^4 + \frac{\mu - \epsilon \sqrt{-1}}{\Omega} s^2 + \left(2 + \frac{\lambda}{\Omega}\right) s^2 + \frac{\mu + \epsilon \sqrt{-1}}{\Omega} s + 1 = 0.$$

Ajoutons que l'on pourra déterminer ces quatre racines, soit en appliquant à la résolution de l'équation (27) l'une des méthodes connues, soit en opérant comme il suit.

» En vertu des formules (26), les trois sommes

$$a\delta + c\beta, \quad ac + \delta\beta, \quad c\delta + \delta c$$

se réduiront évidemment aux trois suivantes

$$2 \cos \alpha, \quad ab + \frac{1}{ab}, \quad \frac{a}{b} + \frac{b}{a}.$$

Donc ces trois dernières sommes seront les trois racines réelles d'une équation auxiliaire qu'il est facile de former. En résolvant cette équation auxiliaire et posant pour abréger

$$(29) \quad \begin{cases} \lambda = \frac{1}{3} \left(2 + \frac{1}{\Omega} \right), & \rho = \left[\frac{1}{3} \left(\lambda^3 + 4 - \frac{\Omega^3 + \Theta^3}{\Omega^3} \right) \right]^{\frac{1}{3}}, \\ \cos \varphi = \frac{1}{\rho} \left[\lambda^3 - \frac{1}{3} \lambda \left(8 + \frac{\Omega^3 + \Theta^3}{\Omega^3} \right) + \frac{\Omega^3 - \Theta^3}{\Omega^3} \right], \end{cases}$$

on reconnaîtra que, pour obtenir les trois sommes

$$(30) \quad 2 \cos \alpha, \quad \frac{a}{b} + \frac{b}{a}, \quad ab + \frac{1}{ab},$$

il suffit de ranger par ordre de grandeurs les trois quantités

$$(31) \quad \lambda + 2\rho \cos \frac{\varphi}{3}, \quad \lambda + 2\rho \cos \frac{\varphi - 2\pi}{3}, \quad \lambda + 2\rho \cos \frac{\varphi + 2\pi}{3}.$$

D'ailleurs, les sommes (30) étant connues, on en déduira sans peine les valeurs de

$$\alpha, \quad \frac{a}{b}, \quad ab,$$

et par suite les valeurs de a et b .

§ II. — *Sur la distance mutuelle de deux planètes, considérées comme fonction des exponentielles trigonométriques qui ont pour arguments les anomalies moyennes*

» Nommons m, m' les masses de deux planètes,

v leur distance mutuelle,

δ leur distance apparente, vue du centre du Soleil,

i l'inclinaison de leurs orbites.

Soient de plus, pour la planète m , et au bout du temps t ,

r la distance au centre du Soleil,

p la longitude, ,

ψ l'anomalie excentrique.

Enfin soient, dans l'orbite elliptique de la planète m ,

a le demi-grand axe,

ε l'excentricité,

ϖ la longitude du périhélie,

Π la distance apparente du périhélie à la ligne d'intersection des orbites elliptiques de m et de m' . On aura

$$(1) \quad r = a(1 - \varepsilon \cos \psi),$$

$$(2) \quad \cos(p - \varpi) = \frac{\cos \psi - \varepsilon}{1 - \varepsilon \cos \psi}, \quad \sin(p - \varpi) = \frac{(1 - \varepsilon^2)^{\frac{1}{2}} \sin \psi}{1 - \varepsilon \cos \psi},$$

et, si l'on accentue chacune des lettres

$$r, p, \psi, a, \varepsilon, \varpi, \Pi,$$

quand on passe de la planète m à la planète m' , on aura encore

$$(3) \quad v^2 = r^2 - 2rr' \cos \vartheta + r'^2,$$

$$(4) \quad \cos \vartheta = \mu \cos(p - \varpi + \Pi - p' + \varpi' - \Pi') + \nu \cos(p - \varpi + \Pi + p' - \varpi' + \Pi'),$$

les valeurs de μ , ν étant

$$\mu = \cos^2 \frac{1}{2}, \quad \nu = \sin^2 \frac{1}{2}$$

D'ailleurs, on tirera évidemment de la formule (4)

$$\begin{aligned} \cos \vartheta = & [\mu \cos(p' - \varpi' + \Pi' - \Pi) + \nu \cos(p' - \varpi' + \Pi' + \Pi)] \cos(p - \varpi) \\ & + [\mu \sin(p' - \varpi' + \Pi' - \Pi) - \nu \sin(p' - \varpi' + \Pi' + \Pi)] \sin(p - \varpi), \end{aligned}$$

et d' cette dernière, combinée avec les formules (1) et (2),

$$\begin{aligned} \frac{r}{a} \cos \vartheta = & [\mu \cos(p' - \varpi' + \Pi' - \Pi) + \nu \cos(p' - \varpi' + \Pi' + \Pi)] (\cos \psi - \varepsilon) \\ & + [\mu \sin(p' - \varpi' + \Pi' - \Pi) - \nu \sin(p' - \varpi' + \Pi' + \Pi)] (1 - \varepsilon^2)^{\frac{1}{2}} \sin \psi. \end{aligned}$$

Donc, eu égard à l'équation (1), la formule (3) donnera

$$(5) \quad v^2 = \mathcal{A} + 2\mathcal{B} \cos \psi + 2\mathcal{C} \sin \psi + 4\mathcal{D} \cos^2 \psi,$$

les valeurs de \mathcal{A} , \mathcal{B} , \mathcal{C} , \mathcal{D} étant déterminées par les formules

$$(6) \quad \begin{cases} \mathcal{A} = a^2 + 2asr' [\mu \cos(p' - \varpi' + \Pi' - \Pi) + \nu \cos(p' - \varpi' + \Pi' + \Pi)] + r'^2, \\ \mathcal{B} = -[\mu \cos(p' - \varpi' + \Pi' - \Pi) + \nu \cos(p' - \varpi' + \Pi' + \Pi)] ar' - a^2 \varepsilon, \\ \mathcal{C} = -[\mu \sin(p' - \varpi' + \Pi' - \Pi) - \nu \sin(p' - \varpi' + \Pi' + \Pi)] (1 - \varepsilon^2)^{\frac{1}{2}} ar', \\ \mathcal{D} = \frac{1}{4} a^2 \varepsilon^2. \end{cases}$$

Il est bon d'observer que, deux planètes ne devant jamais se rencontrer, leur distance mutuelle v ne devra jamais s'évanouir. Donc la valeur de v^2 , déterminée par la formule (5), devra conserver une valeur positive pour toutes les valeurs réelles de l'angle ψ .

Si l'on supposait

$$(7) \quad \varepsilon = 0,$$

on aurait, par suite,

$$\mathcal{D} = 0,$$

et l'équation (5) se trouverait réduite à

$$(8) \quad r^2 = \mathcal{A} + 2\mathcal{B} \cos \psi + 2\mathcal{C} \sin \psi,$$

les valeurs de \mathcal{A} , \mathcal{B} , \mathcal{C} étant

$$(9) \quad \begin{cases} \mathcal{A} = a^2 + r'^2, \\ \mathcal{B} = -[\mu \cos(p' - \varpi' + \Pi' - \Pi) + \nu \cos(p' - \varpi' + \Pi' + \Pi)] ar', \\ \mathcal{C} = -[\mu \sin(p' - \varpi' + \Pi' - \Pi) - \nu \sin(p' - \varpi' + \Pi' + \Pi)] ar'. \end{cases}$$

Alors aussi, en posant

$$s = e^{\frac{1}{2} \sqrt{-1}},$$

et ayant égard au théorème 3 du § I^{er}, on trouverait

$$(10) \quad r^2 = k \left(1 - a s e^{-\alpha \sqrt{-1}} \right) \left(1 - \frac{a}{s} e^{\alpha \sqrt{-1}} \right),$$

a désignant un nombre inférieur à l'unité, α un arc réel, et k une quantité

positive liée au nombre a par la formule

$$(11) \quad k = \frac{v_0}{1 + a^2},$$

D'ailleurs le nombre a , et l'exponentielle trigonométrique $e^{\kappa\sqrt{-1}}$, se trouveraient déterminés par les deux équations

$$(12) \quad a + \frac{1}{a} = \frac{v_0}{(v_0^2 + e^2)^{\frac{1}{2}}},$$

$$(13) \quad e^{\kappa\sqrt{-1}} = -\frac{v_0 + e\sqrt{-1}}{(v_0^2 + e^2)^{\frac{1}{2}}},$$

dont la dernière entraîne les formules

$$(14) \quad \cos \alpha = -\frac{v_0}{(v_0^2 + e^2)^{\frac{1}{2}}}, \quad \sin \alpha = -\frac{e}{(v_0^2 + e^2)^{\frac{1}{2}}},$$

$$(15) \quad \tan \alpha = \frac{e}{v_0}.$$

Ajoutons qu'en vertu des équations (9), jointes à la formule

$$\mu + \nu = 1,$$

on aurait

$$v_0^2 + e^2 = [\mu^2 + 2\mu\nu \cos 2(p' - \varpi' + \Pi') + \nu^2] a^2 r'^2,$$

ou, ce qui revient au même,

$$v_0^2 + e^2 = [1 - 4\mu\nu \sin^2(p' - \varpi' + \Pi')] a^2 r'^2,$$

et qu'en conséquence, les formules (12), (13), (15) donneraient

$$(16) \quad a + \frac{1}{a} = \frac{\frac{a}{r'} + \frac{r'}{a}}{\sqrt{1 - 4\mu\nu \sin^2(p' - \varpi' + \Pi')}},$$

$$(17) \quad e^{\kappa\sqrt{-1}} = \frac{\mu e^{(p' - \varpi' + \Pi')\sqrt{-1}} + \nu e^{-(p' - \varpi' + \Pi')\sqrt{-1}}}{\sqrt{1 - 4\mu\nu \sin^2(p' - \varpi' + \Pi')}} e^{-\Pi\sqrt{-1}},$$

$$(18) \quad \tan \alpha = \frac{\mu \sin(p' - \varpi' + \Pi' - \Pi) - \nu \sin(p' - \varpi' + \Pi' + \Pi)}{\mu \cos(p' - \varpi' + \Pi' - \Pi) + \nu \cos(p' - \varpi' + \Pi' + \Pi)}.$$

Observons enfin qu'on vérifie les formules (17) et (18) en prenant

$$(19) \quad \alpha = \gamma - \Pi$$

et supposant l'angle γ lié à l'angle $p - \pi + \Pi$ par l'équation

$$(20) \quad \text{tang } \gamma = (\mu - \nu) \text{ tang}(p - \pi + \Pi')$$

Si l'excentricité ε cesse de s'évanouir, alors, en posant toujours

$$s = e^{\psi\sqrt{-1}},$$

et ayant égard au théorème 4 du § I^{er}, on trouvera

$$(21) \quad v^2 = k \left(1 - a s e^{-\alpha\sqrt{-1}}\right) \left(1 - \frac{a}{r} e^{\alpha\sqrt{-1}}\right) \left(1 - b s e^{\alpha\sqrt{-1}}\right) \left(1 - \frac{b}{s} e^{-\alpha\sqrt{-1}}\right)$$

la valeur de k étant

$$(22) \quad k = \frac{a}{ab},$$

σ désignant un arc réel, et les lettres a, b représentant deux modules inférieurs à l'unité, qui pourront être déterminés, avec l'arc α , par le moyen des formules établies dans le § I^{er}

§ III — *Méthode nouvelle à l'aide de laquelle le rapport de l'unité à la tangente de deux planètes peut être développée en une série ordonnée suivant les puissances entières de l'anomalie excentrique, ou de l'anomalie moyenne de l'une d'entre elles*

Soient toujours r la distance mutuelle des deux planètes m, m' , ψ l'anomalie excentrique de la planète m , et s l'exponentielle trigonométrique qui a pour argument l'angle ψ , en sorte qu'on ait

$$s = e^{\psi\sqrt{-1}}$$

Si l'excentricité de l'orbite elliptique de la planète m se réduit à zéro, alors on aura

$$(1) \quad v^2 = k \left(1 - a s e^{-\alpha\sqrt{-1}}\right) \left(1 - \frac{a}{r} e^{\alpha\sqrt{-1}}\right),$$

α désignant un arc réel, et k, a , deux quantités positives, dont la dernière

sera inférieure à l'unité. On trouvera, par suite,

$$(2) \quad \frac{1}{v} = k^{-\frac{1}{2}} \left(1 - a s e^{-\alpha \sqrt{-1}}\right)^{-\frac{1}{2}} \left(1 - \frac{a}{s} e^{\alpha \sqrt{-1}}\right)^{-\frac{1}{2}}$$

Or, en vertu de l'équation (2), la fonction de s représentée par le rapport $\frac{1}{v}$, et sa dérivée, resteront continues par rapport à la variable s , pour tout module de cette variable compris entre les limites

$$a, \quad \frac{1}{a},$$

qui rendront à la fois ces deux fonctions discontinues et infinies. Donc, par suite, pour tout module de s renfermé entre les limites $a, \frac{1}{a}$, le rapport

$$\frac{1}{v}$$

sera développable, suivant les puissances entières positives, nulles et négatives de s , en une série dont les deux modules se réduiront à ceux des deux expressions

$$as, \quad \frac{a}{s}.$$

Pour obtenir cette série, il suffira évidemment de multiplier par $k^{-\frac{1}{2}}$ les divers termes de celle qui représentera le développement du rapport

$$(3) \quad \frac{k^{\frac{1}{2}}}{v} = \left(1 - a s e^{-\alpha \sqrt{-1}}\right)^{-\frac{1}{2}} \left(1 - \frac{a}{s} e^{\alpha \sqrt{-1}}\right)^{-\frac{1}{2}}$$

Or, en supposant le module de s compris entre les limites $a, \frac{1}{a}$, on aura

$$\begin{aligned} \left(1 - a s e^{-\alpha \sqrt{-1}}\right)^{-\frac{1}{2}} &= 1 + \frac{1}{2} a s e^{-\alpha \sqrt{-1}} + \frac{1 \cdot 3}{2 \cdot 4} a^2 s^2 e^{-2\alpha \sqrt{-1}} + \dots, \\ \left(1 - \frac{a}{s} e^{\alpha \sqrt{-1}}\right)^{-\frac{1}{2}} &= 1 + \frac{1}{2} \frac{a}{s} e^{\alpha \sqrt{-1}} + \frac{1 \cdot 3}{2 \cdot 4} \frac{a^2}{s^2} e^{2\alpha \sqrt{-1}} + \dots, \end{aligned}$$

et par suite

$$(4) \quad \frac{k^{\frac{1}{2}}}{v} = 1 + A_1 \left(s e^{-\alpha \sqrt{-1}} + \frac{1}{s} e^{\alpha \sqrt{-1}}\right) + A_2 \left(s^2 e^{-2\alpha \sqrt{-1}} + \frac{1}{s^2} e^{2\alpha \sqrt{-1}}\right) + \dots$$

la valeur générale de A_n étant

$$(5) \quad A_n = \frac{1.3..(2n-1)}{2.4..2n} a^n \left(1 + \frac{1.2n+1}{2.2n+2} a^2 + \frac{1.3}{2.4} \frac{2n+1}{2n+2} \frac{2n+3}{2n+4} a^4 + \dots \right)$$

Donc, pour obtenir le développement de $\frac{1}{v}$ en une série ordonnée suivant les puissances entières de s , il suffira d'avoir construit des tables qui fournissent les diverses valeurs de

$$A_1, A_2, A_3, \dots,$$

correspondantes aux diverses valeurs de la constante a

» Nous avons supposé, jusqu'ici, que l'excentricité de l'orbite elliptique de la planète m s'évanouissait. Si cette excentricité ne s'évanouissait pas, alors, au lieu des formules (1), (2), (3), on obtiendrait des équations de la forme

$$(6) \quad v^3 = k \left(1 - a s e^{-\pi \sqrt{-1}} \right) \left(1 - \frac{a}{s} e^{\pi \sqrt{-1}} \right) \left(1 - b s e^{\pi \sqrt{-1}} \right) \left(1 - \frac{b}{s} e^{-\pi \sqrt{-1}} \right),$$

$$(7) \quad \frac{1}{v} = k^{-\frac{1}{3}} \left(1 - a s e^{-\pi \sqrt{-1}} \right)^{-\frac{1}{3}} \left(1 - \frac{a}{s} e^{\pi \sqrt{-1}} \right)^{-\frac{1}{3}} \left(1 - b s e^{\pi \sqrt{-1}} \right)^{-\frac{1}{3}} \left(1 - \frac{b}{s} e^{-\pi \sqrt{-1}} \right)^{-\frac{1}{3}},$$

$$(8) \quad \frac{k^{\frac{1}{3}}}{v} = \left(1 - a s e^{-\pi \sqrt{-1}} \right)^{-\frac{1}{3}} \left(1 - \frac{a}{s} e^{\pi \sqrt{-1}} \right)^{-\frac{1}{3}} \left(1 - b s e^{\pi \sqrt{-1}} \right)^{-\frac{1}{3}} \left(1 - \frac{b}{s} e^{-\pi \sqrt{-1}} \right)^{-\frac{1}{3}},$$

et en supposant

$$(9) \quad b < a < 1,$$

on reconnaîtrait que $\frac{1}{v}$ est encore, pour tout module de s compris entre les limites

$$a, \quad \frac{1}{a},$$

développable, suivant les puissances entières de s , en une série dont les deux modules sont ceux des expressions

$$as, \quad \frac{a}{s}.$$

De plus, en nommant B_n ce que devient A_n quand on remplace a par b , on

tirerait de la formule (8)

$$(10) \quad \left\{ \frac{k^{\frac{1}{v}}}{v} = \left[1 + A_1 \left(s e^{-\alpha \sqrt{-1}} + \frac{1}{s} e^{\alpha \sqrt{-1}} \right) + \dots \right] \left[1 + B_1 \left(s e^{\alpha \sqrt{-1}} + \frac{1}{s} e^{-\alpha \sqrt{-1}} \right) + \dots \right] \right\},$$

ou, ce qui revient au même,

$$(11) \quad \left\{ \begin{aligned} \frac{k^{\frac{1}{v}}}{v} &= \mathcal{Q} + \mathcal{Q}_1 \left(s + \frac{1}{s} \right) + \mathcal{Q}_2 \left(s^2 + \frac{1}{s^2} \right) + \dots \\ &- \left[\mathcal{Q}_1 \left(s - \frac{1}{s} \right) + \mathcal{Q}_2 \left(s^2 - \frac{1}{s^2} \right) + \dots \right] \sqrt{-1}, \end{aligned} \right.$$

les valeurs de $\mathcal{Q}^n, \mathcal{Q}_1^n$ étant

$$(12) \quad \left\{ \begin{aligned} \mathcal{Q}_n &= .. A_{n-1} B_1 \cos(n-2)\alpha + A_n \cos n\alpha + A_{n+1} B_1 \cos(n+2)\alpha + \dots \\ \mathcal{Q}_1^n &= .. A_{n-1} B_1 \sin(n-2)\alpha + A_n \sin n\alpha + A_{n+1} B_1 \sin(n+2)\alpha + \dots \end{aligned} \right.$$

Donc, pour obtenir le développement de $\frac{1}{v}$ suivant les puissances entières de s , il suffira généralement de recourir aux tables de sinus et cosinus et à celles qui fourniraient les diverses valeurs des transcendentes

$$A_1, A_2, \dots,$$

ou plutôt de leurs logarithmes.

" Soit maintenant

$$T$$

l'anomalie moyenne de la planète m . On aura, en nommant ϵ l'excentricité,

$$(13) \quad \psi - \epsilon \sin \psi = T;$$

et, par suite, si l'on prend

$$(14) \quad s = e^{T \sqrt{-1}},$$

on aura

$$(15) \quad s = s e^{-\frac{\epsilon}{2} \left(1 - \frac{1}{s^2} \right)}.$$

Cela posé, après avoir développé le rapport $\frac{1}{s}$ suivant les puissances entières de s , pour développer le même rapport suivant les puissances entières de s , il suffira évidemment de tirer de l'équation (15) ou, ce qui revient au même, de l'équation (13), les développements de s^n et de s^{-n} en séries ordonnées suivant les puissances entières de s . On y parviendra facilement à l'aide de la série de Lagrange, si le module de ε ne dépasse pas la valeur

$$0,662742\dots,$$

pour laquelle l'équation

$$(16) \quad \psi - \varepsilon \sin \psi = 0,$$

résolue par rapport à ψ , acquiert deux racines égales, et se vérifie en même temps que l'équation dérivée

$$(17) \quad 1 - \varepsilon \cos \psi = 0.$$

Cette condition étant supposée remplie, si d'ailleurs un certain facteur $f(\psi)$ de l'anomalie excentrique ψ reste continu par rapport à cette anomalie, tant que le module de ε ne s'élève pas au-dessus de la limite

$$0,662742\dots,$$

on aura, en vertu de la formule de Lagrange,

$$(18) \quad f(\psi) = f(T) + \frac{1}{1} f'(T) \sin T + \frac{\varepsilon^2}{1.2} D_T [f'(T) \sin^2 T] + \dots$$

Si maintenant on pose

$$f(\psi) = e^{h\sqrt{-1}} = s^h,$$

h désignant une quantité entière positive ou négative, et, par suite,

$$f(T) = e^{hT\sqrt{-1}} = s^h,$$

$$f'(T) = h e^{hT\sqrt{-1}} \sqrt{-1} = h s^h \sqrt{-1},$$

la formule (18), jointe à l'équation

$$\sin T = \frac{s - \frac{1}{s}}{2\sqrt{-1}},$$

donnera

$$(19) \quad s^A = s^A + h \left(\frac{t}{2} \right) s^A \left(s - \frac{1}{s} \right) - h \left(\frac{t}{2} \right)^2 D_T \left[s^A \left(s - \frac{1}{s} \right)^2 \right] \sqrt{-1} - \text{etc.}$$

Or, la formule (19), jointe à l'équation (14), de laquelle on tire

$$(20) \quad D_T s^A = h s^A \sqrt{-1},$$

fournira, pour valeur de s^A , un développement de la forme

$$(21) \quad \begin{cases} s^A = H_0 s^A + H_1 s^{A+1} + H_2 s^{A+2} + \dots \\ \quad \quad \quad + H_{-1} s^{A-1} + H_{-2} s^{A-2} + \dots, \end{cases}$$

les valeurs de H_n et H_{-n} étant déterminées par le système des équations

$$(22) \quad H_n = \frac{h}{h+n} F(h+n, n), \quad H_{-n} = (-1)^n \frac{h}{h-n} F(h-n, n),$$

dans lesquelles on suppose la fonction $F(h, n)$ déterminée par la formule

$$(23) \quad F(h, n) = \frac{\left(\frac{ht}{2} \right)^n}{1.2 \dots n} \left[1 - \frac{\left(\frac{ht}{2} \right)^1}{1.(n+1)} + \frac{\left(\frac{ht}{2} \right)^2}{1.2.(n+1)(n+2)} - \text{etc.} \right]$$

On peut, au reste, arriver directement aux formules (22), (23) en partant de l'équation (21), de laquelle on tire

$$H_n = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} s^{-(h+n)} s^A dT,$$

ou, ce qui revient au même,

$$H_n = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} e^{-(h+n)T\sqrt{-1}} e^{h\psi\sqrt{-1}} dT,$$

puis, en intégrant par parties,

$$H_n = \frac{h}{h+n} \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} e^{-(h+n)T\sqrt{-1}} e^{h\psi\sqrt{-1}} d\psi,$$

ou, ce qui revient au même,

$$(24) \quad H_n = \frac{h}{h+n} \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} e^{-n\psi\sqrt{-1}} e^{(h+n)\epsilon \sin\psi\sqrt{-1}} d\psi.$$

Or, de la formule (24), qui subsiste dans le cas même où l'on remplace n par $-n$, on déduira immédiatement les valeurs de H_n, H_{-n} fournies par les équations (22) jointes à la formule (23); et, pour y parvenir, il suffira de développer suivant les puissances ascendantes de ϵ l'exponentielle

$$e^{(h \pm n)\epsilon \sin\psi\sqrt{-1}}$$

« Observons encore que MM. Bessel et Jacobi ont déjà considéré les transcendentes auxquelles se réduisent les coefficients représentés ci-dessus par H_n, H_{-n} , et que les valeurs numériques de ces coefficients sont même fournies par des Tables qu'a construites M. Bessel.

« Après avoir développé $\frac{1}{\psi}$ suivant les puissances entières de l'exponentielle

$$s = e^{T\sqrt{-1}},$$

on pourra développer encore les coefficients des diverses puissances de s suivant les puissances entières de l'exponentielle

$$s' = e^{T'\sqrt{-1}}.$$

On peut d'ailleurs appliquer à ce dernier problème ou une méthode d'interpolation, comme l'a proposé M. Leverrier, ou une méthode analytique, comme nous l'expliquerons plus en détail dans un autre Mémoire. »

RAPPORTS.

Au nom d'une Commission dont il était le président, M. THIÉRY fait la déclaration suivante :

« M. Dien ayant revendiqué la découverte du photomètre dont M. Donné s'était servi dans ses expériences sur le lait; et M. Donné ayant demandé que

son photometre et celui de M Dien fussent soumis à l'examen de la Commission à laquelle ses Mémoires avaient été renvoyés la Commission s'est réunie et après avoir entendu MM Dien et Donne elle a reconnu que les deux photometres étaient fondés sur le même principe que celui de M Quekett qui se trouve décrit dans le Traité de M Herschel sur la lumière, et qu'ils n'en différeraient que par de très-légers changements propres à chaque instrument

M Dien se proposait d'appliquer son photometre à la mesure de l'intensité de la lumière des étoiles M Donne a appliqué le sien à mesurer les qualités du lait

C'est donc dans ces applications que peut consister le mérite des observations qu'ils auront faites

Après avoir entendu la déclaration de M Thenaid, le SECRÉTAIRE PERPETUEL rappelle que les deux contradictions de MM Dien et Donne avaient soulevé une question de veracité M Arago comprend très-bien que la Commission n'ait pas voulu laborer, mais il doit avouer à l'Académie que M Dien a adressé une Lettre dans laquelle les sentiments de ce laborieux géographe sont exprimés en termes catégoriques M Arago donne lecture des passages suivants de la Lettre de M Dien

Ne deviant point le sujet sur lequel porteront les conclusions du Rapport je crois devoir faire connaître à l'Académie des Sciences qu'il ne s'agit pas pour moi d'amour-propre ou d'intérêt mais bien d'une question d'honneur

Je viens, en conséquence, offrir de prouver à la Commission que *M Donne a vu mon photomètre et qu'il en a fait usage avec moi*

BOTANIQUE — Rapport sur un Mémoire de M MONTAGNE intitulé Quelques observations touchant la structure et la fructification des genres *Ctenodus*, *Delsea* et *Lenomandia* de la famille des Floridées

Commissaires, MM de Jussieu Richard, Ad Brongniart rapporteurs)

La végétation sous-marine, par la spécialité des formes qu'elle présente, formes appartenant presque toutes à une des classes les plus nombreuses de la cryptogamie, celle des Algues, constitue un des phénomènes les plus curieux de la distribution géographique des végétaux

Ainsi, tandis que sous les eaux douces on trouve des Algues, des Mousses, des Characées, des Maraliacées parmi les cryptogames, des mono

cotylédones et des dicotylédones appartenant à diverses familles parmi les phanérogames, les eaux de la mer, au contraire, ne nourrissent que des plantes des diverses familles de la classe des Algues et quelques plantes monocotylédones anormales de la tribu des Zostérées

» Mais cette grande classe des Algues quoique fort naturelle dans son ensemble, et se distinguant facilement des autres groupes de plantes cryptogames, présente cependant une telle variété d'organisation, qu'elle fournira encore pendant longtemps matière aux investigations des botanistes, soit qu'ils étudient les phénomènes si curieux du développement et de la reproduction des espèces qui vivent dans les eaux douces soit qu'ils dirigent leurs recherches sur les espèces marines, qui, malheureusement, ne peuvent dans beaucoup de cas, être soumises à l'observation qu'à l'état de dessiccation

» Depuis vingt à trente ans cette étude des Algues a fait des progrès rapides et surtout dans ces dernières années, de nombreuses recherches anatomiques ont donné beaucoup plus de précision à nos connaissances, soit sur l'organisation intime et sur le mode de reproduction de ces végétaux, soit sur les principes de leur classification. Mais il reste encore bien des points à éclaircir, bien des genres imparfaitement connus à étudier dans les parties les plus délicates de leur organisation, avant qu'on puisse admettre avec une entière confiance les généralités auxquelles paraissent conduire les travaux d'ensemble entrepris jusqu'à présent. On ne saurait donc qu'approuver les savants qui se livrent à ces travaux particuliers, et qui préparent ainsi des matériaux plus parfaits pour l'histoire du règne végétal.

Le Mémoire de M. Montagne, que vous avez renvoyé à notre examen est dans ce cas il a pour but de faire connaître, aussi complètement que le permettent les matériaux contenus dans les collections, quelques Algues déjà anciennement décrites, mais d'une manière superficielle, par divers auteurs, de fixer exactement leurs caractères génériques et leur nomenclature, et d'indiquer les différences d'organisation qu'elles présentent relativement à d'autres plantes mieux connues de la même famille.

Les observations sur le genre *Delusea* de Lamouroux et sur le nouveau genre *Lenormandia*, quoique faisant bien connaître la structure des frondes et des organes reproducteurs de ces Algues peu connues et méritant sous ce rapport l'intérêt des algologues, n'ajoutent rien d'essentiel à nos connaissances sur l'ensemble de l'organisation de ces végétaux. Il n'en est pas de même des recherches de M. Montagne sur le genre *Ctenodus*, fondé sur une Algue de la Nouvelle-Hollande, décrite anciennement par Turner sous le nom de *Fu-*

cus Billardieri, et qui présente un mode de fructification différent, sous quelques rapports, de ceux déjà observés dans la même famille

En effet, d'après les observations de M. Montagne, dont nous avons constaté avec lui l'exactitude, cette plante présente une combinaison insolite de caractères. Elle offre, comme les Fucacées, des conceptacles creux, groupés dans de petits rameaux renflés, et tapissés à l'intérieur de filaments et de sporanges grêles et cylindriques, libres et convergeant vers le centre de la cavité de ces conceptacles, mais ces sporanges, comme dans les Floridées ou Choristosporées, renferment quatre spores ou corps reproducteurs disposés en série longitudinale, tandis que dans les Fucacées ou Aplosporiées chaque sporange ne renferme qu'une seule spore. Il y a donc dans cette plante une disposition des sporanges analogue à celle des Fucacées jointe au mode de formation des spores des Floridées, famille dans laquelle le genre *Ctenodus* avait déjà été placé d'après les caractères généraux de structure et de coloration de ses frondes et la disposition de ses fructifications. Ce fait, du reste, confirme l'opinion émise par un des botanistes qui ont fait faire le plus de progrès à nos connaissances sur la fructification des Algues dans ces derniers temps, M. Decaisne, qui considère ce mode de formation des spores isolées ou réunies par quatre dans chaque sporange, comme la base d'une des divisions du premier ordre établie parmi les Algues, et la fructification tétrasporique ou quaternée, comme la fructification normale et caractéristique des Floridées et de plusieurs autres familles, qu'il désigne par cette raison sous le nom général de *Choristosporées*.

• Cette importance du mode de formation des spores, comparée à la disposition des sporanges ou utrículos qui les renferment, montre que, dans les Algues comme dans les autres végétaux, plus les caractères sont liés intimement avec les embryons ou corps reproducteurs, plus ils acquièrent d'importance. Ainsi, dans ces cryptogames les spores sont réellement des embryons nus qui s'échappent des utrículos dans lesquels ils se sont formés pour se développer isolément, et leur mode de formation dans ces utrículos a plus d'importance pour établir des rapports naturels que la disposition de ces cellules ou utrículos entre elles et avec le reste du végétal.

M. Montagne, par l'observation de cette plante intéressante, a donc fait connaître une nouvelle disposition des sporanges dans la division des Algues choristosporées, et confirmé, en même temps, par là l'importance des caractères déduits du mode de formation des spores dans ces végétaux.

Nous pensons que ce nouveau travail de M. Montagne est digne de l'ap-

probation de l'Académie, qui doit engager l'auteur à poursuivre ses recherches sur les genres obscurs et peu connus de la même famille. »

Les conclusions de ce Rapport sont adoptées.

BOTANIQUE.— *Rapport sur un tableau des limites de la végétation de quelques plantes sur le versant occidental du Canigou, présenté par M. Armand Massot.*

(Commissaires, MM. Boussingault, Ad. Brongniart rapporteur.)

» L'Académie nous a chargés, M. Boussingault et moi, d'examiner un tableau qui lui a été adressé par M. Massot, de Perpignan, et qui donne les hauteurs, au-dessus du niveau de la mer, des limites supérieures et inférieures d'habitation de beaucoup des espèces qui constituent la végétation remarquable du Canigou, extrémité orientale de la chaîne des Pyrénées.

» Ce tableau offre d'autant plus d'intérêt pour la géographie botanique, qu'il donne les limites d'habitation de beaucoup de plantes qui n'avaient pas généralement attiré l'attention, et qui, quoique moins frappantes au premier abord que les grands arbres ou quelques espèces cultivées qui couvrent de grandes surfaces, contribuent cependant, par leur réunion, à donner à chaque niveau son aspect de végétation particulier.

» Après avoir énuméré quarante-deux espèces qu'il a observées sur le sommet de cette montagne, à 2785 mètres d'élévation, l'auteur indique les limites inférieures de plusieurs de ces espèces et les limites supérieures d'autres plantes qui n'atteignent pas cette hauteur.

» Enfin plusieurs espèces sont fixées entre des limites inférieures et supérieures assez rapprochées, et ne croissent ni vers la base de la montagne, ni jusqu'à son sommet.

» On est frappé, en étudiant ce tableau, de l'inégalité d'étendue des zones des diverses espèces, de sorte que quelques-unes ne croissent que dans des conditions très-peu différentes; d'autres, au contraire, acceptent des climats très-divers. c'est ce qu'on observe, du reste, également pour les différences de latitude. Ainsi, parmi les plantes qui croissent sur le sommet de la montagne, M. Massot en cite deux : les *Potentilla nivalis* et *Saxifraga oppositifolia*, qui cessent de croître à 135 mètres au-dessous (à 2650 mètres au-dessus de la mer), tandis que le *Gentiana verna* et le *Luzula spicata*, qui croissent sur ce même sommet, ne cessent de se trouver sur la pente de la montagne qu'à des niveaux très-inférieurs, la première à 1322 mètres, et la seconde à

987 metres, ayant ainsi, l'une, une zone d habitation de 1450 metres, et l'autre, une zone de 1800 metres

Il serait intéressant de pouvoir étendre cette comparaison à la plupart des plantes qui croissent sur cette montagne, mais, pour plusieurs d'entre elles, les éléments manquent encore ainsi, sur les quarante-deux espèces observées par M. Massot sur le sommet du Canigou il n'y en a que douze dont ce naturaliste nous indique les limites inférieures

• Il serait à désirer que l'auteur de ce travail pût dresser un catalogue aussi complet que possible des plantes qui croissent sur cette montagne, qu'il pût fixer, pour chacune d'entre elles, la limite inférieure et la limite supérieure de sa croissance et qu'il embrassât dans ses recherches les différents versants de la montagne, de manière à déterminer l'influence de l'exposition sur les limites de ces diverses plantes

Nous croyons aussi devoir l'engager à étendre ses observations jusqu'à la limite de la culture de l'olivier, et même, s'il le peut, à joindre à son catalogue la liste des plantes propres à cette région, de manière à reconnaître quelles sont les plantes de la région des oliviers qui, dans cette contrée, pénètrent dans la région des vignes, et quels sont les rapports entre la flore de cette région des vignes et celle de la France moyenne et septentrionale

Nous ne trouvons pas indiquée sur ce tableau la limite des chênes, il est cependant vraisemblable qu'indépendamment du chêne vert et du chêne liège, qui doivent croître dans la région des oliviers et dont la limite supérieure serait intéressante à déterminer on doit plus haut rencontrer les chênes à feuilles caduques, dont il serait essentiel de fixer les limites supérieures et inférieures et de bien déterminer les espèces

En général, il serait à désirer que la limite de tous les arbres fût bien fixée sur les divers versants, et que ceux qui croissent habituellement dans les Pyrénées mais qui semblent manquer sur cette montagne, fussent indiqués d'une manière spéciale, les limites des arbres étant celles qui se reconnaissent le mieux et qui, par cette raison, se prêtent avec le plus de certitude à la comparaison dans les diverses contrées

En signalant ces lacunes, notre intention n'est que de prouver l'intérêt qu'aurait pour la géographie botanique une étude bien complète de la distribution des plantes sur une montagne aussi favorable à cette étude que le Canigou qui, par son isolement, ses expositions diverses, sa hauteur, deviendrait un des éléments les plus importants dans l'examen général de la distribution géographique des végétaux en Europe

• Nous ajouterons que, pour qu'un travail de ce genre eût toute la certi-

tude désirable, il faudrait que l'auteur pût recueillir et adresser à l'Académie des échantillons de toutes les espèces dont il fixerait les limites, et même des échantillons pris dans leur zone moyenne d'habitation et à leurs deux limites, échantillons qui seraient nécessaires pour bien fixer les espèces qu'il a observées et les différences qu'elles peuvent présenter dans les diverses zones où elles croissent.

Le tableau des limites d'habitation de diverses plantes, tel que M. Massot l'a adressé à l'Académie, renferme déjà un grand nombre de faits précieux pour la géographie botanique; il est à désirer qu'il puisse l'étendre et le compléter, et nous proposons à l'Académie, en donnant son approbation à ce travail, d'engager l'auteur à poursuivre ses observations sur ce sujet et à lui en faire connaître les résultats.

Les conclusions de ce Rapport sont adoptées.

ENTOMOLOGIE — *Rapport sur un travail de M. GENVAIS concernant l'histoire des Phrynéides, Scorpionides, Solpugides, Phalangides et Acarides*

(Commissaires, MM. de Blainville, Milne Edwards, Duméril rapporteur.)

• Nous avons été chargés par l'Académie d'examiner un travail de M. GENVAIS destiné à faire suite et une grande partie du 3^e volume de l'*Histoire naturelle des insectes aptères* que publie notre confrère M. le baron Walckenaer.

L'ordre des Aptères, comme on le sait, comprend beaucoup d'insectes très-différents pour la structure, les mœurs et même par les transformations, à tel point que plusieurs naturalistes, considérant cet ordre comme tout à fait artificiel, ont cru devoir le partager en plusieurs autres réellement distincts et qu'ils ont même proposé d'en former des classes pour y répartir les genres et les soumettre à une coordination plus naturelle, ne comptant alors parmi les insectes sans ailes que les espèces munies de six pattes seulement avec deux antennes. Cependant, parmi ces insectes hexapodes, il y a de très-grandes dissemblances. Les uns, en effet, ne subissent pas de métamorphoses évidentes, tels sont la plupart des parasites que M. Walckenaer nomme *épizoïques*, tandis que d'autres, telles que les puces, éprouvent réellement trois transformations, et que les Némoures, comme les Forbicines, ne peuvent être rapprochés d'aucun insecte aptère à six pattes. Les deux familles qui sont toujours privées d'ailes, et qui ont plus de six pattes, forment en effet des divisions fort naturelles, cependant il est très-difficile de leur assigner des caractères de classes d'après leur structure. Ainsi, les Myriapodes qui ont

deux antennes et qu'on a nommés les *Dicères*, par opposition aux espèces nombreuses qui n'en ont jamais, ou les *Aceres*, différent excessivement entre eux dans toute leur économie, comme on peut s'en convaincre en nommant les *Scolopendres* et les *Iules*.

De même chez les *Arachnides* ou les *Aceres*, le seul défaut des antennes et le nombre des pattes, qui varie même dans l'un des groupes, ne peuvent offrir des caractères de classe, car le mode de respiration et de génération n'est pas le même dans toutes les espèces. On s'est donc un peu trop hâté, selon nous, d'établir ces distinctions, aussi MM. Walckenaer et Gervais ne les ont-ils pas adoptées car ils ont laissé parmi les insectes aptères tous les groupes établis par Linné et la plupart de ses disciples.

M. Gervais, dans le travail qu'il a séparément entrepris, fait connaître, de la manière la plus complète, cinq des divisions indiquées par M. Walckenaer parmi les insectes sans ailes et sans antennes, la première, celle des *Ara-néides*, ayant été traitée par notre savant confrère. Les cinq autres divisions correspondent aux genres principaux, des *Phrynes*, des *Scorpions*, des *Sol-pugres*, des *Faucheurs* et des *Cirons* qui composent autant d'ordres distincts. Tous ressemblent aux *Arachnides*, parce qu'ils n'ont pas d'antennes, que leur tête n'est pas distincte du corselet, et parce que, sous leur dernière forme, ils n'ont constamment que huit pattes.

Il nous serait difficile de suivre l'auteur dans les descriptions méthodiques qu'il en a faites, il nous suffira de dire que son mode d'exposition est constamment le même et très-régulier, et par cela très-propre à la comparaison systématique, l'un des plus grands mérites des ouvrages de cette nature consacrés à la détermination des espèces.

• Les *Phryneides*, dont les mandibules sont garnies d'un seul crochet mobile ou analogues à celles des *Araignées*, diffèrent de celles-ci parce que la paire antérieure de leurs pattes ressemble à des antennes. Ce groupe ne renferme qu'un seul genre, lequel lui-même ne réunit que neuf espèces, toutes originaires des climats les plus chauds de l'Amérique et des Indes. Leur organisation a été moins étudiée que celle des genres qui suivent. Cependant les descriptions en sont complètes et la synonymie très-érudite.

• Les *Scorpionides*, dont les mandibules forment une sorte de pince à deux branches, ont l'abdomen sessile, quoique composé de segments distincts. Ce groupe est beaucoup plus connu dans sa structure, ses mœurs et ses habitudes. L'auteur en présente l'histoire abrégée. Il cite les sources dans lesquelles il a puisé, et ces documents sont parfaitement analysés. Cette famille est partagée en trois genres principaux : les *Télyphones*, les *Scorpions* qui

sont distribués en plusieurs sous genres, et les Chélifères, et cent vingt-cinq espèces y sont décrites avec soin

» Les *Solpugides* ou Galéodes ressemblent aux Scorpions, avec cette particularité que leur ventre est distinct du corselet par un étranglement, et que leur respiration s'opère par des trachées et non dans des bourses dites pulmonaires, ce groupe réunit quatorze espèces, toutes exotiques et des climats les plus chauds

» Les *Phalangides* sont encore analogues aux Scorpions, mais leur abdomen n'est pas formé de pièces articulées mobiles et ils ont des trachées deux tribus partagent cette famille dans l'une, les Gonyleptes, les pattes sont inégales et les palpes épineux dans l'autre, les Phalangés, les pattes sont à peu près de même longueur et les palpes lisses Ces groupes renferment un grand nombre d'espèces décrites pour la première fois, elles sont partagées en sous genres, dont celui des Faucheurs en comprend trente-huit

» Les *Acarides*, qui correspondent aux Mites ou aux *Acarus* des auteurs, diffèrent de tous les insectes aptères et sans antennes, par la forme et par la structure de leur bouche, dont les pièces sont contenues dans une gaine qui les enveloppe Ce groupe, qui comprend plus de trois cents espèces se trouve décrit avec les plus grands détails, l'auteur en ayant fait depuis longtemps une étude tout à fait particulière beaucoup de faits y sont réunis en corps de doctrine, et un assez grand nombre sont propres à l'auteur Cette partie de l'ouvrage a exigé un travail considérable, pour en donner une idée, nous dirons que le seul genre Trombidie comprend la description de soixante six espèces, les Hydrachnes, soixante-sept, les Gammases, quarante-huit, les Ixodes, cinquante, les Oribates, vingt-deux, les Ciron ou Tyroglyphes, vingt-sept, et les Sarcoptes, tels que le Ciron de la gale plus de trente espèces

Cette analyse rapide de l'ouvrage soumis comme manuscrit au jugement de l'Académie, prouve que l'auteur, M. Gervais, est parfaitement instruit de tout ce qui a été écrit et observé sur ces animaux, qu'il a fait lui-même beaucoup de recherches et quelques découvertes qui seront publiées pour la première fois, ce qui est à désirer dans l'intérêt de la science zoologique »

MEMOIRES LUS

CHIMIE — *Memoire sur les combinaisons du phosphore avec l'hydrogène,*
 par M PAUL TREMARD, préparateur de chimie au Collège de France
 (Extrait)

(Commissaires, MM Gay-Lussac, Pelouze, Regnault)

En étudiant les combinaisons de l'hydrogène et du phosphore, je suis arrivé à des résultats dont quelques uns me paraissent dignes d'attention, et que je me contenterai d'exposer, aujourd'hui, d'une manière sommaire

I Il existe au moins trois phosphures d'hydrogène l'un solide, l'autre liquide et le troisième gazeux. Le phosphure solide contient moins d'hydrogène que celui qui est liquide, et celui-ci moins que celui qui est gazeux

II Le phosphure d'hydrogène solide, signalé par M. Leverrier, s'obtient par divers procédés mais surtout en faisant passer du gaz hydrogène phosphoré spontanément inflammable, dans l'acide chlorhydrique concentré, filtrant la liqueur, lavant le précipité à l'eau froide, et desséchant rapidement la matière sous la machine pneumatique

M. Leverrier, qui se l'est procuré par d'autres moyens, l'a trouvé formé de 1 équivalent de phosphore et de 1 équivalent d'hydrogène, selon moi il serait composé de 2 équivalents de phosphore et de 1 équivalent d'hydrogène

III Le phosphure d'hydrogène gazeux est le gaz hydrogène phosphore non spontanément inflammable. Il se prépare facilement et s'obtient parfaitement pur, en projetant du phosphure de calcium dans de l'acide chlorhydrique presque fumant au moyen d'un tube vertical plongeant dans le liquide acide. En même temps que le gaz prend naissance, il se produit une grande quantité d'une matière jaune, qui paraît être du phosphure d'hydrogène solide

Lorsqu'au lieu d'acide, on n'emploie que l'eau pour la préparation du gaz hydrogène phosphoré, celui-ci, comme l'on sait, est toujours spontanément inflammable, mais il n'est jamais pur, il contient toujours du gaz hydrogène, dont la quantité s'accroît avec la durée de l'expérience, et néanmoins la quantité réelle de gaz hydrogène phosphoré est plus grande que sous l'influence de l'acide

Ces différences tiennent à ce qu'avec l'eau seule il se fait un hypophosphite, et à ce que le phosphure d'hydrogène solide, produit d'abord, se

décompose ensuite; tandis qu'avec l'acide, il n'y a pas ou presque pas d'acide hypophosphoreux formé, et qu'il y a au contraire formation de beaucoup de phosphure d'hydrogène solide. Aussi la quantité d'hydrogène libre est-elle toujours en raison directe de celle de l'acide hypophosphoreux, et en raison inverse du phosphure d'hydrogène solide.

» IV. Le gaz hydrogène phosphoré spontanément inflammable perd son inflammabilité lorsqu'on le met en contact avec le protochlorure de phosphore, les acides chlorhydrique, bromhydrique; abandonné à lui-même, il perd peu à peu cette propriété; la lumière hâte singulièrement sa décomposition; dans tous les cas, il laisse déposer du phosphure d'hydrogène solide et passe à l'état de gaz hydrogène phosphoré non spontanément inflammable aussi ce dernier gaz résiste-t-il à l'action de tous les agents qui précèdent.

» V. Mais, de tous les phénomènes que j'ai observés, les plus remarquables sont ceux dont il me reste à parler.

» J'avais vu qu'en projetant peu à peu dans de l'acide chlorhydrique très-faible du phosphore de calcium mêlé de phosphate de chaux, qui dans la réaction ne joue aucun rôle, il se déposait quelquefois une matière poisseuse qui, par le contact de l'air, prenait feu tout à coup, et qui ne pouvait être que du phosphure d'hydrogène.

» Je savais que le gaz hydrogène phosphoré spontanément inflammable perdait son inflammabilité à la lumière solaire, qu'il donnait lieu alors à un très-faible dépôt de phosphure d'hydrogène solide et se transformait en gaz hydrogène phosphoré ordinaire.

» Je savais également qu'il ne fallait que quelques bulles de gaz hydrogène phosphoré spontanément inflammable pour communiquer cette propriété à plus d'un litre de gaz hydrogène phosphoré qui ne l'était pas, ou même à du gaz hydrogène pur.

» Je savais enfin que le gaz hydrogène phosphoré spontanément inflammable renfermait une très-grande quantité de gaz qui ne l'était pas.

» Guidé par toutes ces observations, je fus porté à croire que la cause de l'inflammabilité spontanée du gaz hydrogène phosphoré pouvait dépendre d'une très-petite quantité de matière très-inflammable, que cette matière pouvait être liquide à la température ordinaire et communiquer la propriété de s'enflammer au gaz hydrogène phosphoré qui ne l'avait pas, en s'y réduisant en vapeur, dans des proportions fort minimes.

» En conséquence, je fis passer plusieurs litres de gaz hydrogène phosphoré

spontanément inflammable dans des tubes de verre recourbés en U et refroidis à -20 degrés, en ayant soin en même temps de chauffer légèrement l'appareil qui produisait le gaz, et je fus assez heureux pour voir se condenser bientôt un liquide incolore, d'une limpidité parfaite, qui possédait toutes les propriétés que supposaient mes premiers aperçus; c'était évidemment le phosphure d'hydrogène que je cherchais.

» Ce phosphure est liquide au-dessous de $+10$ degrés, sa tension est considérable; il est sans couleur et transparent comme l'eau quand il est pur. Aussitôt qu'il a le contact de l'air, il s'enflamme vivement et brûle avec une lumière blanche très-intense, en donnant lieu à des fumées épaisses. Exposé dans un tube recourbé à la lumière solaire, il se transforme rapidement en gaz hydrogène phosphoré spontanément inflammable et en phosphore d'hydrogène solide.

» Lorsqu'on le soustrait à la lumière et qu'il est soumis à une température d'environ 15 degrés, il semble se gazéifier sans éprouver de décomposition.

» La plus petite quantité de ce liquide rend spontanément inflammable le gaz hydrogène phosphoré qui ne l'est pas et le gaz hydrogène lui-même. Il est probable qu'il communiquerait la même propriété à tous les autres gaz combustibles.

» Le gaz hydrogène phosphoré rendu ainsi spontanément inflammable ressemble complètement au gaz hydrogène phosphoré, qui l'est naturellement.

» Les acides chlorhydrique, bromhydrique, le protochlorure de phosphore décomposent tout à coup le phosphure d'hydrogène liquide, et le transforment en phosphore d'hydrogène solide et en gaz hydrogène phosphoré non spontanément inflammable.

» Il serait très-dangereux de conserver le phosphure d'hydrogène liquide dans des tubes fermés et exposés même à la lumière diffuse. ils pourraient éclater. Ces tubes doivent être bien fermés et enterrés complètement dans du sable pour les soustraire à la lumière.

» Je n'ai point encore analysé le phosphure d'hydrogène liquide; je crois, d'après l'action qu'exerce sur lui la lumière solaire, que sa composition diffère de celle du gaz hydrogène phosphoré non inflammable; et, s'il en était ainsi, il serait plus hydrogéné que le phosphure solide et moins que le phosphure gazeux.

» A la vérité, M. Rose, qui a une si grande autorité en chimie, a établi par des expériences dont je ne conteste point l'exactitude, que les gaz hy-

drogènes phosphorés inflammables et non inflammables donnaient les mêmes résultats à l'analyse; mais ces résultats n'auraient rien d'extraordinaire, puisqu'il ne faut pour ainsi dire que des traces de phosphore d'hydrogène liquide pour rendre spontanément inflammable celui qui ne l'est pas.

» Au reste, je vais chercher à déterminer sa composition par des expériences directes; quoique liquide et inflammable spontanément, il ne serait pas impossible qu'il fût isomère avec le gaz phosphoré, qui ne s'enflamme qu'à une température élevée.

» Dans tous les cas, si je ne me trompé, il sera facile de se rendre compte désormais de tous les phénomènes que présentent les gaz hydrogènes phosphorés, et sur l'interprétation desquels il restait tant de vague, tant d'incertitude dans l'esprit des chimistes, même les plus distingués.

» En terminant la lecture de cette Note, je dois dire que dans toutes mes expériences, je me suis toujours servi de phosphore de calcium préparé dans un appareil particulier, en faisant passer un grand excès de phosphore à travers la chaux pure, préalablement portée à une très-haute température. On se procure ainsi très-facilement beaucoup de phosphore de calcium mêlé seulement de phosphate de chaux.

» Je me propose de continuer mes recherches, et si j'obtiens des résultats nouveaux dignes d'être présentés à l'Académie, je m'empresserai de les soumettre à son jugement. »

MÉMOIRES PRÉSENTÉS.

ENTOMOLOGIE. — *Recherches sur les transformations des appendices dans les Articulés; par M. BRULLÉ.* (Extrait par l'auteur)

(Commissaires, MM. Isidore Geoffroy-Saint-Hilaire, Milne Edwards.)

» Il y a deux sortes de transformations ou de métamorphoses dans les appendices des Articulés; les unes sont réelles, les autres figurées. Les transformations réelles sont celles qui se présentent aux différents âges d'un Articulé, surtout dans certaines classes où elles sont plus marquées, et les lois que suivent ces transformations sont tout à fait dignes d'intérêt. Les transformations prises dans un sens figuré sont celles qui se présentent lorsque l'on considère un même appendice dans les différents groupes d'animaux articulés. On voit alors que la patte d'un de ces animaux correspond à la ma-

choire d'un autre, ou sa mâchoire à une mandibule, etc. Ce dernier cas est celui des parties appendiculaires de certains végétaux, les phanérogames, qui se transforment par la culture, comme on le sait, de manière à se simplifier complètement, ou qui, parfois, se présentent sous une apparence mixte, en participant aux caractères de deux organes différents. Il en résulte, pour les végétaux comme pour les Articules, que leurs parties appendiculaires sont essentiellement toutes de la même nature, et c'est assurément une chose remarquable que l'existence de ce phénomène des transformations dans les animaux et dans les végétaux.

En suivant la série des développements dans les appendices des Articules, on reconnaît d'abord que les appendices se modifient par les progrès de l'âge chez un même individu, comme ils semblent se modifier par les progrès de l'organisation dans les individus d'espèces différentes. Ainsi les pattes sont la forme la plus simple des appendices, celle à laquelle succède tantôt la forme d'antennes, tantôt celle de mâchoires plus ou moins compliquées. Mais les phénomènes ne s'arrêtent pas là. On voit, en outre, que les appendices se montrent d'autant plus tôt sur un Article que leur structure doit être plus complexe, ou autrement, qu'ils apparaissent d'autant plus tard qu'ils ont moins de transformations à subir. On peut donc juger du degré d'importance, ou du moins de complication d'un appendice par l'époque même à laquelle il se manifeste.

La structure des appendices en général donne, en outre, l'explication de certains cas de monstruosité tels sont ceux que l'on appelle monstruosités par scission. On voit, en effet, que ces monstruosités reproduisent par accident, à l'égard de certains appendices ordinairement simples, un mode d'organisation qui est l'état normal de quelques autres appendices. Ainsi les mâchoires sont toujours formées de plusieurs parties situées l'une à côté de l'autre, ou autrement, elles sont toujours partagées en deux ou trois branches. Les pattes de certains Crustacés offrent aussi cette disposition ainsi que leurs antennes. Au contraire, les pattes des insectes et leurs antennes sont ordinairement simples. Or, il arrive quelquefois que ces appendices se montrent ramifiés et reproduisent ainsi, dans ces cas d'anomalie apparente, la disposition normale de l'appendice en général.

À l'égard des transformations prises dans un sens figuré, on sait que M. Savigny a fort bien démontré que les pièces de la bouche des insectes suceurs sont exactement de la même nature que les mêmes pièces des insectes broyeur. De plus, le même savant a émis l'opinion que la levre inférieure

des insectes était formée d'une paire de mâchoires réunies. De son côté, M. Oken était arrivé au même résultat. En poursuivant cette idée, il était permis de supposer que la levre supérieure elle-même était aussi formée d'une paire de mâchoires, c'est ce que vérifie l'examen de la levre de certains insectes. De plus, on en peut dire autant des pièces appelées *hypopharynx* et *épipharynx*. Voilà donc toutes les parties de la bouche des insectes ramenées à l'unité de composition.

Si l'on considère les pièces de la bouche sous le rapport des éléments qui les constituent, on peut facilement démontrer cette même unité de composition. M. Burmeister a cherché, dans ces derniers temps, les pièces élémentaires des mâchoires dans la levre inférieure. On les retrouve également dans les mandibules, mais seulement chez quelques espèces car, en général, elles sont intimement réunies. Il est même certaines mandibules qui ne le cèdent pas aux mâchoires en complication, telles sont celles des insectes et des Scolopendres. On arrive par cet examen à reconnaître que l'appendice le plus complexe est situé diversement dans les Articulés. Ainsi, dans les insectes, c'est celui qui porte le nom de *mâchoires*, dans les Crustacés, c'est un des pieds-mâchoires, dans les Myriapodes, ce sont les mandibules, auxquelles même il faudrait peut-être appliquer désormais la dénomination de *mâchoires*.

Depuis un certain nombre d'années on a donné des noms aux différentes pièces de la mâchoire de certains Articulés, les insectes coléoptères. Il restait à rechercher les mêmes pièces dans les mâchoires des autres insectes et dans celles des Arachnides, des Myriapodes et des Crustacés. En poursuivant cette recherche, on arrive par degrés à reconnaître en quoi consiste la mâchoire la plus simple, savoir celle des insectes suceurs. On passe ainsi de la mâchoire des Coléoptères à celle plus simple des Orthoptères et des Neuroptères, puis à celle des Hyménoptères, qui conduit à reconnaître en quoi consiste la mâchoire si allongée des Lépidoptères. Dans cette mâchoire, l'hypertrophie d'un des éléments annihile en quelque sorte les autres, et en se réunissant à celle du côté opposé pour constituer une véritable trompe, elle nous offre l'exemple d'une levre transitoire, c'est-à-dire qu'il n'y a plus qu'un pas à faire pour arriver à une levre permanente, dans laquelle les deux moitiés sont définitivement réunies.

En résumé, les observations qui précèdent démontrent irrévocablement cette belle loi énoncée depuis quelques années, que *tous les appendices de la partie inférieure du corps des Articulés sont essentiellement analogues*, ce qui démontre à la fois et les détails de la structure de ces appendices et les

diverses transformations par lesquelles passe un même appendice pour arriver de la forme la plus simple à la forme la plus composée. »

PHYSIOLOGIE. — *Observations sur l'action du sucre dans l'alimentation des granivores ; par M. LETELLIER.*

(Commission précédemment nommée pour l'examen d'un Mémoire de M. Chossat.)

Les conclusions que tire M. Letellier des expériences exposées dans son Mémoire, sont :

« 1°. Que le sucre de canne ne favorise pas la production de la graisse (le sucre de lait paraît encore plus défavorable) ;

« 2°. Que le beurre et probablement aussi les autres matières grasses, ne sont pas mis en réserve par l'économie, quand ils sont donnés comme unique aliment,

« 3°. Qu'un aliment insuffisant prolonge la vie et diminue les pertes journalières, pourvu qu'il ne soit pas ingéré à des doses trop élevées. »

CHIMIE. — *Sur la réduction partielle du bioxyde de cuivre par la chaleur, et sur le nouvel oxyde qui en résulte ; par MM. FAVRE et MAUMENÉ*

Il résulte des expériences exposées dans ce Mémoire, que le bioxyde de cuivre se décompose à une température qui est à peu près celle de la fusion du cuivre. Il se fond alors en perdant les huit centièmes de son poids d'oxygène, et se transforme en un corps qui doit être représenté par la formule $\text{Cu}^{\text{I}}\text{O}^{\text{I}}$. Ce nouvel oxyde peut aisément se distinguer, même par ses propriétés physiques, du corps qui lui a donné naissance. Sa surface présente une couleur noire, parce qu'il absorbe de l'oxygène en reprenant la forme solide. mais sa cassure est rougeâtre, et quand on le réduit en poudre, il devient presque aussi rouge que le protoxyde du même métal. Il est dur et cassant.

« L'importance du rôle que joue le bioxyde de cuivre dans les laboratoires nous a porté, disent MM. Favre et Maumené, à faire connaître l'existence de ce nouvel oxyde avant même d'avoir terminé les recherches qui nous ont conduits à le découvrir. Dans les analyses minérales où l'on avait coutume de doser le cuivre à l'état de bioxyde, on obtenait rarement des résultats parfaitement concordants, parce qu'il était rare qu'on évitât un commencement de décomposition par la chaleur : en agissant sur le nouvel

oxyde $\text{Cu}^1 \text{O}^1$ obtenu par la fusion du bioxyde, on évitera toute incertitude à cet égard. »

Le temps ne permettant pas de donner lecture de la correspondance, M. le **SECRÉTAIRE PERPÉTUEL** se borne à annoncer la réception d'un *paquet cacheté*, adressé par M. **BRETON**.

L'Académie en accepte le dépôt.

La séance est levée à 5 heures-un quart.

A.

ERRATA.

(Séance du 1^{er} avril 1844)

Page 575, ligne 6, (o), *lisez* (2).

Page 576, ligne 15, 1g, *lisez* 19.

Même page, ligne 31, 9(1— etc, *lisez* g(1— etc

Page 577, ligne 18, $\frac{1}{1111}$ de millimètre, *effacez* de millimètre.

Page 590, ligne 13, *au lieu de* Commission des prix de Médecine et de Chirurgie, *lisez* Commission des prix de Physiologie expérimentale

Page 592, ligne 13, M DUPONT, de Lunel, *lisez* M DURAND, de Lunel

BULLETIN BIBLIOGRAPHIQUE

L'Académie a reçu, dans cette séance, les ouvrages dont voici les titres

Comptes rendus hebdomadaires des séances de l'Académie royale des Sciences, 1^{er} semestre 1844; n° 14, in-4°.

Annales de Chimie et de Physique, par MM. GAY-LUSSAC, ÀRAGO, CHEVREUL, DUMAS, PELOUZE, BOUSSINGAULT et REGNAULT; 3^e série, tome X, avril 1844; in-8°.

Bulletin de l'Académie royale de Médecine; mars 1844, in-8°.

Annales maritimes et coloniales; mars 1844; in-8°.

Sur une mâchoire de Girafe fossile, découverte à Issoudun (Indre); Note de M. DUVERNOY; broch. in-8°.

Administration des Douanes. — Tarif officiel des Douanes de France, mars 1844, in-8°.

Rapport sur l'Hydrothérapie, adressé à M. le Ministre de la Guerre, après un voyage fait en Allemagne, par M. SCOUTETTEN, 2^e édit., in-8°.

Équations de l'équilibre d'un Corps solide, déduites du principe des vitesses virtuelles, par M. YVON-VILLARCEAU, $\frac{1}{2}$ feuille in-8°.

Du travail des Pierres de toute nature par procédés mécaniques à l'aide des moteurs les plus économiques, par MM. WILBIEN et LÉGRIS; autographié, in-8°.

Dictionnaire universel d'Histoire naturelle; tome IV, 46^e livr.; in-8°.

Journal de Pharmacie et de Chimie; avril 1844, in-8°.

Société royale et centrale d'Agriculture. — Bulletin des séances, tome IV, n° 4; in-8°.

Journal de Chimie médicale; avril 1844, in-8°.

Journal des Connaissances médico-chirurgicales; avril 1844; in-8°.

Journal d'Agriculture pratique et de Jardinage; mars 1844; in-8°.

Journal de Médecine, avril 1844; in-8°.

Annales de Thérapeutique, n° 1; avril 1844; in-8°.

Bulletin du Musée de l'Industrie, par M. JOBARD; 4^e livr. Bruxelles; in-8°.

Traité théorique et pratique de la fabrication du Fer, avec un exposé des améliorations dont elle est susceptible, principalement en Belgique; par M. VALERIUS; II^e partie, 1 vol. in-8°, et planches in-4°.

Proceedings... Procès-verbaux de l'Académie royale d'Irlande pour l'année 1842; III^e partie. Dublin, 1844; in-8°.

(661)

Considerazioni . . . Considérations logico-médicales regardant plus particulièrement la Phthisie, par M. E. CUSIERI. Palerme, 1839; in-8°.

Gazette médicale de Paris; n° 14.

Gazette des Hôpitaux; n° 39 à 41

L'Écho du Monde savant; n° 26 et 27.

L'Expérience; n° 353, in-8°.

Article omis dans le Bulletin bibliographique du 1^{er} avril 1844.

Observations adressées par la Société d'Encouragement pour l'industrie nationale à MM. les Membres de la Chambre des Députés sur le Projet de loi relatif aux Brevets d'invention; par M. PAYEN, broch in-4°

OBSERVATIONS MÉTÉOROLOGIQUES. — MAR 1844.

JOURS du MOIS	9 HEURES DU MATIN			MIDI			3 HEURES DU SOIR			9 HEURES DU SOIR			THERMOMÈTRE		ÉTAT DU CIEL À MIDI	VENTS À MIDI
	BAROM. à 0°	THERM. CÉL.	BEAUF.	BAROM. à 0°	THERM. CÉL.	BEAUF.	BAROM. à 0°	THERM. CÉL.	BEAUF.	BAROM. à 0°	THERM. CÉL.	BEAUF.	MAXIMA	MINIMA		
1	745,26	+10,16		746,81	+11,0		748,28	+10,3		749,54	+7,3		+12,1	+4,9	Tres-augueux	O
2	750,04	+9,2		750,47	+10,8		750,29	+10,8		750,01	+7,7		+11,4	+6,0	Tres-augueux	S O fort
3	749,45	+9,3		749,35	+10,4		748,96	+11,0		749,68	+7,7		+12,1	+6,8	Tres-augueux	S O
4	747,98	+6,4		750,71	+8,9		753,21	+7,7		746,06	+4,9		+6,9	+3,1	Couvert	O
5	751,90	+4,7		752,56	+5,4		752,71	+2,1		752,66	+3,2		+6,9	+3,3	Couvert	E
6	749,98	+2,2		748,84	+5,2		748,63	+5,4		750,21	+1,5		+6,7	+1,0	Couvert	E E
7	748,88	+2,6		757,73	+5,2		757,90	+6,1		750,21	+2,0		+6,7	+1,0	Couvert	N E
8	752,33	+1,2		763,25	+3,2		763,25	+3,2		754,85	+1,2		+8,0	+0,5	Beau	N E
9	754,47	+5,0		763,34	+6,6		761,55	+7,6		759,70	+7,2		+8,0	+2,9	Beau	S O
10	754,47	+7,2		755,37	+8,9		750,47	+8,6		750,34	+4,0		+11,9	+6,7	Couvert	S O
11	758,78	+3,0		755,37	+8,1		751,59	+8,6		748,89	+3,2		+10,2	+1,0	Plue continue	S O fort
12	748,88	+7,0		748,33	+6,1		747,39	+7,0		748,89	+5,7		+8,2	+5,8	Quelques éclaircies	O fort
13	756,61	+4,5		756,61	+7,8		757,33	+3,7		757,93	+5,8		+7,3	+2,5	Nuageux	O fort
14	756,61	+4,5		756,61	+7,8		754,66	+8,1		753,16	+5,8		+8,4	+1,2	Couvert	O fort
15	749,43	+7,7		748,57	+10,0		747,83	+10,0		746,96	+5,4		+10,3	+3,8	Quelques nuages	S O
16	749,43	+9,8		744,71	+12,4		744,38	+13,8		746,14	+10,0		+11,7	+7,0	Couvert	S E
17	748,36	+4,6		749,63	+11,0		750,27	+10,6		750,99	+9,4		+10,7	+4,0	Couvert	N E
18	751,34	+2,8		751,14	+3,8		757,07	+4,5		753,51	+3,5		+10,7	+2,0	Couvert	N E
19	751,51	+2,8		757,87	+5,7		746,18	+6,4		747,52	+3,1		+8,4	+1,7	Couvert	S O
20	751,04	+4,6		748,86	+4,4		756,96	+5,5		758,13	+2,1		+8,4	+0,9	Nuageux	N N O
21	755,05	+2,0		757,54	+7,2		751,58	+7,8		749,32	+5,1		+9,0	+0,9	Nuageux	S S O
22	755,25	+3,9		748,33	+6,6		748,47	+7,8		749,73	+4,9		+9,0	+3,0	Couvert	S S O
23	751,61	+6,1		751,75	+9,5		750,92	+10,2		751,12	+8,4		+11,0	+0,0	Quelques éclaircies	S S O
24	751,68	+8,6		751,14	+10,6		750,33	+11,4		749,05	+10,9		+12,7	+8,0	Couvert	S S O
25	750,98	+9,1		758,42	+12,0		752,60	+11,1		755,34	+9,3		+12,0	+9,0	Couvert	S S O
26	756,95	+10,5		758,12	+12,0		758,07	+12,4		750,30	+10,4		+12,6	+8,2	Couvert	O N O
27	759,44	+9,3		758,00	+11,0		763,85	+12,7		765,18	+10,0		+12,8	+9,8	Couvert	O
28	762,44	+9,6		762,56	+8,8		766,60	+13,0		765,81	+8,8		+13,9	+6,2	Nuageux	N E fort
29	762,77	+6,6		762,56	+8,8		761,80	+11,2		762,47	+8,0		+12,1	+3,7	Beau	N E fort
30	762,77	+9,4		761,62	+13,4		760,84	+14,8		761,13	+12,6		+15,7	+3,7	Beau	E S E
31	754,15	+6,5		753,81	+8,4		753,28	+9,0		754,42	+6,3		+10,1	+3,7	Beau	E S E
1	752,56	+5,8		752,31	+7,5		752,17	+7,8		754,68	+4,6		+9,0	+3,2	Moy du 1 ^{er} au 10	Prix en continué
2	752,36	+6,1		751,72	+8,0		750,71	+8,3		751,17	+5,8		+9,6	+3,3	Moy du 11 au 20	Cour 4,597
3	757,10	+7,4		757,08	+9,6		756,61	+10,6		757,15	+8,2		+11,6	+4,5	Moy du 21 au 31	Terr 4,008
															Moyenne du mois	+ 6,9

COMPTE RENDU

DES SÉANCES

DE L'ACADEMIE DES SCIENCES.

SÉANCE DU LUNDI 15 AVRIL 1844

PRÉSIDENCE DE M CHARLES DUPIN

MEMOIRES ET COMMUNICATIONS

DES MEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE L'ACADÉMIE

CHIMIE — *Note sur l'extraction du sucre de betteraves, par M PAYEN*

Ma position comme professeur de chimie appliquée, m'impose l'obligation d'approfondir et de discuter publiquement les questions théoriques et pratiques qui intéressent nos grandes industries chaque année, soit à l'École centrale, soit au Conservatoire des Arts et Métiers, je m'efforce de faire convenablement apprécier les progrès dus à l'active intelligence de nos fabricants

Si l'opinion que j'ai émise, cette année même sur l'état actuel et l'avenir des sucreries indigènes et coloniales me semble avoir quelque valeur c'est qu'elle résume la pensée de manufacturiers habiles c'est qu'elle a reçu leur assentiment D'ailleurs en publiant à ce sujet, une Note très-intéressante dans le dernier *Compte rendu*, M Dumas, notre savant confrère, appelait la controverse sur les questions importantes et délicates que sa communication allait soulever l'Académie admettait donc, je l'espère, qu'il était de mon devoir de les aborder ici

Je me hâte de le dire, les ingénieuses observations de M Schuzenbach sur la cristallisation, lors même qu'elles introduiraient une idée nouvelle dans le clairçage et pourraient constituer une invention lors même qu'elles permettraient d'obtenir autant de sucre blanc et pur qu'on obtenait de sucre brut par les procédés connus, ce qui me paraît douteux, ces observations, dis-je déduites sans doute de l'idée émise par M Thenard sur l'emploi des solutions saturées de sucre, de la pratique du clairçage et de la méthode des cristallisoirs de M Crespel-Delisse, ne me semblent comparables à aucune des grandes inventions apportées par l'industrie française dans l'extraction du sucre indigène et la fabrication coloniale inventions auxquelles sont dus, 1° le charbon dos, 2° le noir en grains 3° la révivification, 4° la concentration à double effet dans le vide, 5° le moulage des sucres granulés, je crois pouvoir en appeler à M Dumas lui-même

Avec ces inventions et leurs nouveaux perfectionnements, avec les procédés de cristallisation et de clairçage qui sont du domaine public, on peut et l'on doit obtenir le sucre cristallisé, à l'état blanc et pur telle fut, en effet, la conclusion d'un Rapport que je fis sur le procédé de M Periaud et le sucre obtenu en pains par cette méthode ne devait, dans aucune circonstance, subir un mélange de 10 pour 100 de mélasse, comme cela est arrivé au sucre de M Schuzenbach

« Ainsi donc M Schuzenbach ne me semble pas pouvoir revendiquer la plus large part dans les perfectionnements de l'extraction du sucre le temps nous apprendra s'il peut, à bon droit, réclamer l'honneur d'une invention utile et réelle le temps qui, dans les applications surtout, fait souvent justice d'espérances trop brillantes

Trois exemples fort remarquables trouveront ici leur place toute naturelle Dix années entières s'étaient écoulées en grandes expériences, en améliorations successives, relativement au procédé de la macération et des virements, apportant à la fin de chaque campagne une conviction plus ferme dans l'esprit de son célèbre inventeur sur les avantages d'une méthode capable de fournir les 95 centièmes du jus de la betterave, cependant les rapporteurs des concours aux Sociétés centrale d'Agriculture et d'Encouragement doutaient toujours Aujourd'hui le doute n'est plus permis, car ce procédé depuis l'année dernière, a disparu de toutes les usines qui l'avaient adopté

Un appareil des plus ingénieux et des plus recommandés, qui, fonctionnant d'une manière continue, donnait à froid, sans pression, par un simple lavage spontané, méthodique, 90 pour 100 du jus de la pulpe, s'est

éclipse après avoir accru les dépenses et diminué les produits des établissements qui l'ont employé

Il a fallu moins de temps mais de plus lourds sacrifices pour juger impraticable en France la méthode de dessiccation des betteraves due à M Schutzenbach, et qui promettait bien plus encore que son système actuel de cristallisation

Je pourrais rappeler vingt autres conceptions hardies que du moins leurs auteurs ont appliquées à leurs risques et périls mais j'en ai dit assez pour justifier les réserves que j'ai faites, les conseils que j'ai donnés d'attendre prudemment, ne fût-ce qu'afin de vérifier si l'on ne posséderait pas déjà l'équivalent de l'invention offerte

En terminant, je prie l'Académie de me permettre de présenter ici les conditions de succès que je crois les plus importantes pour l'extraction économique du sucre indigène

1° Assolement, culture et emploi des pulpes abaissant à 12 ou 13 fr la valeur intrinsèque de 1 000 kilogrammes de jus

• 2° Ralentissement de moitié de la vitesse des poussoirs mécaniques et augmentation du nombre des rapes afin de mieux diviser le tissu des betteraves dans le même temps,

• 3° Pression plus graduelle et plus énergique en augmentant le nombre des presses hydrauliques,

4° Emploi de quantités plus considérables de noir en grains, à l'aide de filtres ayant une capacité trois fois plus grande

5° Perfectionnement, réalisé des appareils Degrand Derosne et Cail qui permette de diminuer encore la température de l'évaporation à l'aide d'un *vide* plus avancé,

6° Revivification du noir en grains par les procédés récemment perfectionnés,

7° Préparation des cristaux les plus convenables pour le clairçage, en employant les meilleurs procédés usuels ou la modification ajoutée par M Schutzenbach,

• 8° Clairçage méthodique dans les carres de M Schutzenbach ou mieux encore dans les trémies à faux fonds, les formes garnies de sable ou de tamis, ou les filtres Dumont,

9° Moulage des cristaux parfaitement épurés

• On comprendra sans peine qu'en opérant ainsi, on n'exporte loin des exploitations rurales que du sucre sensiblement pur directement applicable à la consommation que laissant, d'ailleurs, pour la nourriture des animaux

et l'engrais des terres les feuilles, pulpes, mélasses, ecumes et dépôts, on augmente la masse des fumiers et la puissance du sol

• De tels résultats sont bien dignes de l'attention des législateurs, ils nous portent à former, avec M Dumas, des vœux sincères pour que les entraves qui s'opposent encore à l'épuration des sucres disparaissent définitivement de nos lois

M DUMAS, sans comprendre le but des remarques communiquées à l'Académie par M Payen, se borne à faire observer que les fabricants de Valenciennes l'ont prévenu dans tous ses vœux, car

1° Tout le monde connaît leur habileté comme cultivateurs et fermiers,

2° Il y a longtemps qu'ils ont diminué de moitié la vitesse du rapage en doublant le nombre de leurs râpes, ce qui leur fournit des pulpes bien mieux divisées

3° Ils pressent beaucoup mieux et avec addition d'eau, d'après mon conseil, et ils ont obtenu de bons résultats de cette addition,

• 4° Leurs filtres à nou ont maintenant 3 metres de hauteur, ce qui paraît difficile à dépasser

• 5° Ils emploient les appareils Degrand, Desrosne et Gail avec tout leur perfectionnement,

6° Ils revivifient leur nou dans des fours tout nouvellement introduits, continus, et qu'on doit supposer les meilleurs

En un mot, ils pratiquent depuis longtemps ce que M Payen leur conseille aujourd'hui en ce qui concerne les opérations qui amènent le jus de betteraves à 30 degrés de l'aréomètre

Je n'avais point à parler de tous ces procédés, bien connus d'ailleurs, puisque c'est à 30 degrés que M Schutzenbach prend le jus de betteraves pour le soumettre à son nouveau système de cristallisation et de clairçage. Ce système repose sur une vue scientifique qui m'a paru neuve, les observations de M Payen n'ont rien changé à ma conviction. Je laisse à M Schutzenbach le soin de prouver qu'il n'a pas doté l'industrie sucrière d'une vue aussi stérile que M Payen le suppose ou le craint

Du reste, comme M Payen adopte dans ses paragraphes 7, 8 et 9 la méthode de travail de M Schutzenbach tout en rejetant ses appareils, la question ainsi limitée toucherait à des intérêts privés auxquels j'ai voulu toute ma vie demeurer étranger

En tout cas, et pour me résumer, les fabricants de Valenciennes dont j'ai visité les usines font depuis six mois ce que M Payen vient leur conseiller

aujourd'hui j'ajoute que M. Schutzenbach a introduit dans la fabrication du sucre un principe scientifique que je regarde comme nouveau, et qui ne peut être confondu avec toutes les idées incomplètes qu'on en rapproche après coup.

M. PAYEN répond que son unique but a été précisément de présenter un état, que M. Dumas lui-même reconnaît exact et complet des grandes améliorations imaginées par nos manufacturiers et constructeurs d'appareils, améliorations bien plus importantes que la modification proposée par M. Schutzenbach et qui ne sont pas encore toutes introduites dans le plus grand nombre de nos sucreries.

ICHTHYOLOGIE. — *Observations pour servir à la connaissance du développement de la Poecilia de Surinam (Poecilia Surinamensis Val.) précédées d'une esquisse historique des principaux travaux sur le développement des poissons aux deux premières époques de la vie, par M. DUVERNOY*

PREMIÈRE PARTIE. — *Esquisse historique*

Le développement et les métamorphoses des corps organisés en général et des animaux en particulier sont devenus depuis quelques années une des parties les plus cultivées de leur histoire naturelle, surtout le développement dans l'œuf qui comprend l'ovogénie et l'embryogénie.

Beaucoup de naturalistes et de physiologistes distingués s'en sont occupés, les uns ont saisi avec habileté l'occasion d'observer qui se présentait inopinément à leurs regards, les autres l'ont fait naître avec plus ou moins de sagacité et de suite.

Les poissons, et surtout les poissons osseux ovipares, se prêtent particulièrement plus que toute autre classe à ce genre d'observations. On peut féconder leurs œufs artificiellement et suivre immédiatement les changements produits par la formation du germe, que vient de peupler la fécondation.

Les œufs des poissons sont bien préférables, pour l'étude de ces premiers changements, à ceux des oiseaux, à cause du temps plus ou moins long qui s'écoule toujours, chez ceux-ci, entre la fécondation et la ponte. Voilà sans doute pourquoi on n'a pu jusqu'à présent y découvrir le singulier phénomène du vitellus dont MM. Prevost et Dumas ont fait connaître pour la première fois, dès 1824, toute la suite et les détails dans l'œuf de la grenouille, au grand étonnement des physiologistes, qui ont pu

remarquer depuis lors, que le premier trait en avait déjà été observé et figuré par Swamerdam (1)

Les membranes de l'œuf des poissons conservent de la transparence on peut observer, à travers la sérosité albumineuse que renferme leur chœlion tout ce qui se passe à la périphérie du vitellus La peau de l'embryon ou du fœtus reste également transparente, et permet d'étudier les premiers linéaments de l'organisme et ses complications successives

Au contraire, la peau des *Batraciens*, qui se colore immédiatement et s'organise ou se matérialise beaucoup plus tôt, rend les observations d'organogénie, chez ceux-ci, bien plus difficiles, malgré la faculté que l'on a de les étudier immédiatement après une fécondation artificielle ou naturelle

Enfin, dans l'analyse des phénomènes concernant l'ovogénie des poissons, l'esprit est dégagé de toutes les questions qui se sont élevées, dans ces derniers temps, sur l'origine et les rapports de l'amnios, ou sur le développement de l'allantoïde On sait que ces enveloppes du fœtus n'existent pas chez les vertèbres pourvus de branchies durant la première ou les premières époques de leur vie, ainsi que M Dutrochet l'a reconnu des 1814, et que Cuvier le confirmait en 1815, dans le Rapport si remarquable qu'il fit à cette Académie, au sujet du travail fondamental de notre savant collègue *sur les enveloppes du fœtus*, et dans le Mémoire particulier *sur l'œuf des mammifères*, qu'il publia à la suite de ce Rapport

• Dans l'histoire des découvertes faites, durant le siècle actuel, sur l'ovogénie des vertébrés il est aussi nécessaire de remonter à celles que renferment ces travaux, qu'il est indispensable, pour être juste, de reconnaître que tous ceux d'embryogénie ou d'organogénie publiés depuis 1806, surtout d'*organogénie humaine*, ont eu pour base fondamentale, et pour point de départ, les *fragments sur le développement du fœtus humain*, publiés à Halle, cette même année 1806, par M F Meckel, devenu depuis si célèbre, fragments dont la plupart des observations avaient été faites au Jardin des Plantes, dans le laboratoire de Cuvier J'avais moi-même suivi journellement ces observations, ainsi que l'exprime l'auteur dans sa préface, avec le double intérêt de la science et de l'amitié

Ce n'est pas, comme on le voit, des aujourd'hui que je me suis occupé de ce sujet du développement et des métamorphoses

(1) *Biblia Naturæ*, Pl XLVIII, fig 7 et 8 On doit à M de Baer les observations les plus détaillées sur ce phénomène (*Archives de M J Müller* pour 1834, p 481 et suivantes, et Pl XI)

» Dans une Note écrite le 27 novembre 1827, que je conserve, Cuvier me le recommande pour la nouvelle édition des Leçons que nous devons faire ensemble

» C'est pour comprendre dans mon dernier volume de cette nouvelle édition, qui paraîtra cette année, je l'espère du moins, l'histoire du développement et des métamorphoses de tout le règne animal, que j'en ai fait le sujet particulier de mes Leçons au Collège de France

» Le Mémoire que je prends la liberté de communiquer à l'Académie est un des résultats de cet enseignement

La plupart des faits nouveaux qu'il renferme ont déjà été démontrés à mes auditeurs, dans mes Leçons du mois de juin de l'année dernière

De nouvelles observations faites cet hiver m'ont permis de les confirmer et de les étendre

J'avais pour guide, dans ces recherches, de récents travaux dont je demande la permission à l'Académie de lui esquisser, dans cette partie historique, le principal mérite scientifique, c'est-à-dire de lui indiquer les progrès réels, suivant moi, qu'ils ont fait faire à la science

Je parlerai surtout de ceux qui comprennent l'embryogénie complète d'une espèce, je veux dire le développement dans l'œuf jusqu'à l'éclosion, et même le développement hors de l'œuf, durant la seconde époque de la vie

Je suivrai l'ordre chronologique pour cet exposé succinct, qui ne sera qu'une simple indication des progrès successifs de la science

1° Le premier Mémoire où le sujet intéressant du développement des poissons ait été traité dans toute son étendue, c'est-à-dire sous toutes ses faces principales, est celui sur *la génération chez le sechot ou le chabot de rivière* (Cottus gobio, CUV), il est de 1830 (1) L'auteur, bien connu de l'Académie, M. Prevôt, de Genève, y pénètre dans toutes les questions que cette matière du développement devait embrasser, pour arriver, par leur solution, à des propositions scientifiques On y reconnaît tous les caractères du beau travail sur la génération, publié en commun avec M. Dumas des 1824, et dont l'influence sur les progrès que cette partie de la physiologie des animaux a faits dans ces derniers temps, a été on ne peut plus sensible

M. Prevôt est le premier, si je ne me trompe, qui ait réussi à produire la fécondation artificielle dans cette classe, il en décrit les phénomènes préliminaires, analogues à ceux observés par lui et par M. Dumas, pour la fécon-

(1) *Mémoires de la Société de Physique de Genève*, t. XIX, et *Annales des Sciences naturelles*, t. XIX, Paris, 1830

dition de œufs de Batraciens, je veux parler de ces courants d'absorption qui portent les spermatozoïdes à la périphérie de l'œuf

Voici les principales phases du développement de ce poisson observées par M. Pivôl

C'est au milieu de la cicatricule (le *blastoderme*) que se montrent les premiers linéaments du fœtus, sous la forme d'un trait renflé à l'une des extrémités et effilé à l'extrémité opposée

Lorsque le fœtus a 0^m,001, on distingue les cercles des yeux et la trace de la moelle épinière. A cette époque, la cicatricule (le *blastoderme*) s'est étendue. Elle s'avance peu à peu et finit par envelopper entièrement le vitellus mais elle ne présente encore aucun vaisseau

Chez le fœtus de 0^m,003, les rudiments du système osseux se dessinent

Le cœur est encore un boyau presque droit, à chaque extrémité duquel est un renflement

Lorsque le fœtus a de 0^m,005 à 0^m,006 de long, on peut reconnaître presque toutes les parties de l'animal parfait

2° Une année plus tard, en 1831, ont paru des planches de M. Carus, sur le développement des animaux

Toutes les figures des Planches IV et V du troisième cahier concernent le développement d'une espèce de *Cyprin* (presumée le *Cyprinus dobula* ou le meunier)

La suite de ces figures, au nombre de vingt quatre, et leur explication, est un exposé très-intéressant des observations de M. Carus, suivies avec soin durant plusieurs mois, observations qui comprennent le développement aux deux premières époques de la vie

Ce que cet exposé renferme de plus nouveau concerne le développement du système vasculaire sanguin

L'auteur y démontre (page 17) 1° Que la formation de la plupart des parties du corps de l'embryon précède de beaucoup les courants du système vasculaire, qui se dirigent plus tard vers ces parties,

2° Que les courants du sang (qui est d'abord incolore) à travers la substance à peine solidifiée de l'embryon n'ont pas, dans le principe, de limites cylindriques ou de parois vasculaires viables,

3° Que le développement du système vasculaire se fait en arcs successifs ou qui sortent, pour ainsi dire, les uns des autres, de telle manière que le sang prenant son cours dans les arcs nouveaux, le premier arc formé s'oblitére dans la partie moyenne, et successivement

C'est ainsi que le système sanguin croît par suite de nœuds, comme une

plante noueuse, à travers l'organisme qui lui est préexistant, et ce n'est qu'après son complet développement qu'il est employé à la nutrition et à l'agrandissement des parties.

» 3°. En 1833 ont paru (aussi en langue allemande, comme le texte de M. Carus dont nous venons de parler) les observations les plus détaillées sur le développement de la *Blennie vivipare* faites par M. Rathke (1).

» Le développement dans l'œuf, suivant ce physiologiste distingué, ou notre première époque de la vie, ne dure, chez ce poisson pêché dans la Baltique, que trois semaines environ, et se termine, par l'éclosion, à la fin de septembre.

» La mise-bas n'a lieu cependant que dans les premiers jours de janvier

» C'est dans l'oviducte incubateur que le petit poisson éclôt et qu'il continue de se développer durant les trois mois et plus de la seconde époque de sa vie, se nourrissant d'un reste de vitellus et du fluide albumineux qui l'entoure et que transsudent les parois de l'oviducte. Le chorion, qui disparaît assez promptement après l'éclosion, sert peut-être aussi, suivant M. Rathke, à cette alimentation intérieure.

» On trouve, dans ce beau travail, les détails les plus circonstanciés d'embryogénie et d'organogénie; entre autres, sur les métamorphoses du cœur, sur la circulation qui s'établit à la surface du vitellus, dont les vaisseaux afférents sont une branche de la veine mésentérique et se comporte comme une veine porte vitelline, qui aura pour antagoniste, dans la suite du développement, la veine porte hépatique.

» Nous signalerons encore les métamorphoses du *canal alimentaire*, et le développement du *foie* comme annexe de ce canal; celui de l'encéphale et l'apparition tardive du *cervelet*, déjà démontrée par M. Serres, dès 1820, pour tous les animaux vertébrés, dans son grand travail couronné par l'Académie, sur l'*anatomie comparative du cerveau de ces animaux*.

» L'observation peut-être la plus piquante, comprise dans cette intéressante monographie de M. Rathke, est celle concernant la préexistence des ovules dans les *foetus femelles*, qu'il a reconnus dans les lames proligères de l'ovaire à la fin de la seconde époque de la vie, ou de sa seconde période de développement, et conséquemment avant la mise-bas.

» 4°. Les *Transactions philosophiques* de la Société royale de Londres pour 1834 renferment des observations intéressantes de M. John Davy sur la

(1) *Mémoires sur le développement de l'homme et des animaux*, par M. le docteur H. RATHKE, 2^e partie, avec planches; Leipsick, 1833.

generation et le développement de plusieurs especes de *torpilles* de la Méditerranée. Elles concernent principalement les phases du développement des branchies externes et celles d'accroissement et de diminution de la vessie ombilico-vitelline.

M. John Davy y donne trois Tables relatives au nombre des œufs, à leur poids, à celui des fœtus au commencement et à la fin de leur développement.

L'observation la plus nouvelle de ce travail est le développement tardif de l'organe électrique, qui change la forme première étroite et allongée du fœtus, dans la forme singulièrement élargie, ronde et plate que l'on connaît à la torpille.

C'est dans ce Mémoire que M. John Davy fait connaître les cœurs accessoires qu'il a vus dans ce poisson, et qui sont semblables à ceux que j'avais découverts, des 1809, dans la Chimère de la Méditerranée.

5° Six années après M. Prevôt, de Genève (en 1836), M. Rusconi (1) tenta avec succès la fécondation artificielle. Il réussit parfaitement sur des œufs de *tanche* et d'*ablette*, et démontra que le développement de l'embryon peut avoir lieu sans replacer ces œufs dans l'eau courante, après les avoir fécondés, comme M. Prevôt l'avait cru nécessaire.

M. Rusconi observe, dans le développement de la *tanche*, que les enveloppes extérieures de l'œuf (la coque et le chorion) se séparent de la membrane vitelline au moment où cet œuf tombe dans l'eau, et qu'il y a, à l'instant même, absorption de ce liquide.

Il est le premier qui ait remarqué que, peu après la fécondation, l'œuf perdait sa sphéricité, qu'il se développait une petite sphère sur la grande, et que *cette vessie du germe*, dont il n'a pas déterminé la véritable nature, se sillonnait à la manière du vitellus des Batraciens.

Il a vu ces sillons se produire et se multiplier dans une progression géométrique et disparaître au bout de quelques heures, et il en a suivi les apparitions rapides et successives.

6° En 1837, M. Rathke faisait connaître, encore en langue allemande (2), des fragments sur le développement de plusieurs espèces de *syngnathes* qu'il avait observées sur les bords de la mer Noire.

Ce développement a lieu dans une poche sous-caudale que les uns attribuent à la mère, les autres au sexe mâle.

(1) *Annales des Sciences naturelles*, 2^e série, t. V, p. 300, et *Archives de Muller*, 1836, Pl. XIII et p. 278. L'original de ce travail a paru en italien dans le t. LXXIX de la *Bibl. ital.*

(2) *Für Morphologie Reisebemerkungen aus Taurnen*, von H. RATHKE, Riga und Leipzig, 1837, Vierte Abhandlung. Über die Entwicklung der Syngnathen, p. 152 à 178 et Pl. V.

» Les jeunes syngnathes y passent les deux premières époques de la vie, comme les jeunes de la blennie vivipare dans l'oviducte de leur mère.

» Ces fragments comprennent beaucoup moins de détails que la *Mono-graphie sur la blennie*.

» Nous signalerons ceux sur le développement de la poche incubatrice, sur celui des diverses parties de l'encéphale, du foie et de la vessie natatoire, ces deux derniers comme annexes du canal alimentaire; ceux enfin sur le développement des principaux vaisseaux et des différentes parties du cœur, dont le bulbe artériel ne commence à se montrer qu'à la fin de la seconde époque de la vie, et conséquemment après l'éclosion.

» 7°. C'est ici le lieu de rappeler la découverte de M. Ekstroem, déjà annoncée en 1831 par ce naturaliste suédois, à l'Académie des Sciences de Stockholm, que ce ne sont pas les femelles, mais les mâles qui sont pourvus de la poche incubatrice.

» M. Ekstroem donne les détails les plus circonstanciés sur cette singulière gestation dans le *Syngnathus acus*.

» La ponte a lieu en avril. Les œufs sont introduits par la femelle dans la poche sous-caudale du mâle, qui se ferme immédiatement et dans laquelle pénètre la liqueur fécondante. Au mois de juillet, les petits sont assez forts pour en sortir et suivre leur père à la nage; mais ils rentrent dans leur poche au moindre danger, comme les petits des Didelphes.

» Le même naturaliste a observé que le *Syngnathus ophidion* manque de cette poche, et que les œufs étaient fixés sous le ventre du mâle sur trois ou quatre rangs et en quinconce.

» En 1833, M. Retzius confirmait, à cette même Académie des Sciences de Stockholm, par d'intéressants détails anatomiques, le fait singulièrement exceptionnel de la gestation des syngnathes.

» Quoiqu'on en ait connu un autre exemple sinon semblable, du moins analogue, chez le *crapaud accoucheur*, la première annonce de ce fait n'avait rencontré, pour ainsi dire, que des incrédules, malgré la confiance méritée qu'on a généralement dans les auteurs de cette découverte. Mais en 1841, M. Siebold est venu ajouter le poids de son autorité à celles des deux premiers observateurs, par un grand nombre d'observations faites sur six espèces de syngnathes ou d'hippocâmpes étudiées au moment du frai ou de la gestation, sur les bords de la mer Adriatique (1).

(1) *Mémoires de l'Académie des Sciences de Stockholm* pour 1833, publiés en 1834, avec 90.

» Cependant M. Rathke affirmait, en 1840 (1), que le *Syngnathus æquoreus*, qui porte, dit-il, ses œufs sous le ventre, comme le *Syngnathus ophiodon*, et qui n'a pas de poche sous-caudale, est soumis à la règle universelle. Il a reconnu des ovules de différentes grandeurs dans les ovaires, ayant leur vésicule germinative, chez un individu dont le ventre était garni extérieurement d'œufs en incubation.

» Qu'en conclure, sinon que les deux espèces précédentes, démembrées très-judicieusement des *Syngnathes propres*, par M. Risso, qui en a fait son genre *Scyphius*, diffèrent pour leur gestation, comme pour leurs caractères extérieurs, de ces dernières espèces?

» 8°. Dans la même année 1837, les libraires éditeurs de l'ouvrage si remarquable de M. de Baer, *Sur le développement des animaux* (écrit en langue allemande), en faisaient paraître la seconde partie (2).

» Elle comprend, dans moins de vingt pages in-4°, tout ce qui concerne le développement des poissons, dont l'histoire est faite principalement d'après deux espèces de Cyprins (les *Cyprinus bluea* et *erythrophthalmus*).

» Nous y avons surtout remarqué l'aperçu très-intéressant que les reins primordiaux des poissons ne sont pas des organes transitoires, comme les corps de Wolff des animaux supérieurs, mais des organes permanents.

» 9°. Le Mémoire de M. Filippi, sur le développement du *Gobie fluviatile*, qui date de 1841, est venu ajouter une espèce de plus dans l'histoire du développement des poissons (3).

» La forme très-oblongue et presque en navette de l'œuf de ce poisson, après sa chute dans l'eau et l'absorption de ce liquide, tandis que le vitellus conserve sa figure à peu près sphérique, est très-singulière dans cette espèce. M. Filippi n'a pu saisir que les derniers instants du sillonnement.

» Selon cet auteur, le fœtus du *Gobie fluviatile* exécuterait une sorte de pirouette, après notre sixième période, de manière que la tête, qui était en haut, se trouve en bas et la queue en haut, durant tout le reste du développement.

une planche représentant, entre autres, la gestation sous-abdominale du *Syngnathus ophiodon*.

(1) *Archives de J. Muller* pour 1840, page 145.

(2) *Ueber Entwicklungsgeschichte der Thiere zweiter Theil*, etc., 2^e édition. Koenigsberg, 1837.

(3) Memoria sullo Sviluppo del chiozzo d'acqua dolce (*Gobius fluviatilis*) del dottor Filippo de Filippi. Milano, 1841.

• Mais il n'a pu y reconnaître de véritable rotation, telle que MM. de Baer et Rusconi l'avaient observée, le premier dans la *brème* et le second dans le *brochet*.

• Il est à regretter que M. Filippi ait ajouté aux observations positives des faits, plusieurs explications qui sont insoutenables, entre autres, celle que le vitellus est le foie préexistant.

• 10°. L'année 1842 a produit un ouvrage fondamental sur le sujet dont j'esquisse l'histoire, je veux parler de la publication de M. Vogt ayant pour objet la *Palée* (*Corregonus palæa*, Cuv.) de la grande famille des Salmones. Quoique l'allemand soit la langue maternelle de l'auteur, il a écrit cet ouvrage en français, parce qu'il devait faire partie de l'histoire naturelle des *poissons d'eau douce*, dont notre collègue, M. Agassiz, son maître et son ami, a commencé la publication, il y a déjà plusieurs années.

• M. Vogt a opéré avec succès la fécondation artificielle sur les œufs de ce poisson, dont le développement lent (il dure de soixante à quatre-vingts jours) lui a donné l'occasion d'en observer avec détail les phénomènes successifs.

• Dans ses études d'organogénie, cet observateur habile est parti d'un point de vue élevé, sur lequel les progrès tout récents de la science devaient nécessairement le placer. Les travaux de M. Schwan, sur le développement cellulaire des tissus animaux, l'ont conduit à étudier avec beaucoup de soin et de détails, sous ce rapport, le développement de la *Palée*. Cette publication se distingue d'ailleurs par les observations multipliées qu'elle renferme; par l'exposition méthodique des faits; par les questions importantes de physiologie générale que l'auteur y traite; par les déductions logiques qu'il tire des faits observés, ainsi que par les remarques critiques et indépendantes que ses observations lui donnent l'occasion de faire sur les opinions de ses prédécesseurs les plus renommés dans cette carrière.

• Le développement successif du cœur et des vaisseaux, et les premiers indices de la circulation du sang, lui font penser, avec MM. Magendie et Poirseulle, que tout mouvement circulatoire part de l'impulsion que le sang reçoit du cœur.

• Relativement à la vésicule germinative, il croit pouvoir affirmer, avec M. Barry, que les taches germinatives sont des cellules qui constituent les premiers éléments organiques de l'embryon.

• Le blastoderme ne se compose, suivant M. Vogt, que de deux lames distinctes, une externe et l'autre interne, entre lesquelles il n'a pu reconnaître, chez les poissons, un feuillet intermédiaire, qui pourrait être considéré comme feuillet vasculaire.

« Les vaisseaux se forment, chez ces animaux, des éléments cellulaires de toutes les parties du corps qui en sont pourvues

La circulation ne s'y établit qu'à notre huitième période du développement. Jusque-là, la nutrition est uniquement cellulaire, comme l'avait déjà dit M. Cuvier.

La rotation du vitellus ou de l'embryon, que l'on regardait comme produite par des courants d'absorption et d'exhalation, est due, suivant M. Vogt, à des cellules d'épithélium à cils vibratiles.

Je puis ajouter, à ce sujet, mon témoignage à celui de cet auteur. Des observations que je viens de faire sur le développement de la *grenouille rousse* m'ont démontré la justesse de cette vue, sur la cause du singulier phénomène de rotation de l'embryon (1).

11°. Si je fais mention, après l'ouvrage qui précède d'un Mémoire de M. de Quatrefages sur les *embryons des syngnathes*, communiqué à l'Académie dans sa séance du 30 mai 1842, et d'une Note lue dans la séance du 14 août 1843, sur les embryons des *Blennies*, c'est non-seulement à cause de l'époque où le premier travail a paru, mais encore parce que l'auteur s'est élevé simultanément au même point de vue que M. Vogt, dans ses recherches sur la structure

(1) Cette rotation est régulière, nous l'avons d'abord observée au microscope sur des embryons placés entre deux verres qui aplatisaient un peu l'œuf, et dont le développement était celui indiqué par Rusconi à la cinquante-deuxième heure (son n° 17) elle était interne et semblait un glissement de tout le corps couche de côté, autour d'un axe qui le traversait dans son milieu et qui serait perpendiculaire à sa colonne vertébrale. Il a fallu cinq à six minutes à l'embryon pour exécuter un circuit complet. Un grossissement de 350 diamètres nous a montré à la surface du corps, sur toute sa ligne de profil des cils vibratiles innombrables. Leurs extrémités formaient comme le bord d'une fourrure dont les poils exécuteraient des mouvements réguliers, avec une rapidité extraordinaire.

Après ma Leçon du mercredi 27 mars, j'ai rendu mes auditeurs témoins de ce phénomène si remarquable.

Le 3 avril je l'ai de nouveau observé, mais seulement à la loupe et sur des embryons plus avancés dont le développement était celui indiqué par Rusconi, à la quatre-vingt-unième heure (n° 10).

La rotation était beaucoup moins lente que dans nos premières observations. J'ai vu l'animal exécuter quatorze circuits en cinq minutes. Sa position était aussi très différente : il tournait le ventre dirigé en bas et le dos en haut, et tout le corps dans une ligne oblique et non horizontale, de manière que la tête était plus élevée que la queue, qui était repliée à droite ou à gauche. Par-ci par-là l'animal exécutait des mouvements de flexion de tout son corps, qui suspendaient la rotation; mais elle recommençait quand les contractions musculaires avaient cessé.

intime des tissus. Les stries transversales qu'il a reconnues dans la fibre musculaire des foetus de *syngnathes* caractérisent notre dixième période, et montrent que les foetus observés étaient très-près de leur éclosion. L'absence de fente choroidale à l'œil en est encore une preuve.

» L'auteur a représenté dans une très-belle figure tout le système sanguin existant à cette époque.

» Il a vu, comme M. Rathke, que les vaisseaux afférents du sac vitello-ombilical proviennent de la veine mésentérique.

» Dans ce degré de développement, les deux observateurs sont encore d'accord sur la position l'une devant l'autre des chambres du cœur, l'oreillette et le ventricule. Mais M. Rathke a distingué deux veines caves postérieures comme deux antérieures; M. de Quatrefages n'a vu qu'une veine cave postérieure. Toutes se réunissent, suivant M. Rathke, et tous les auteurs qui se sont occupés de l'anatomie des poissons et de leur développement, dans un sinus qui précède l'oreillette.

» Ce sinus, pris pour l'oreillette, est beaucoup plus considérable dans le *Scyphius ophidion* que celui des *syngnathes* propres observés par M. Rathke. Si la détermination des parties du cœur que je donne ici est exacte, comme je le pense, il n'existait pas encore de bulbe artériel dans les foetus observés par M. de Quatrefages.

» La branche artérielle qui porte le sang directement à la tête est précisément celle bien reconnue par ses prédécesseurs, dans les autres développements (1), laquelle partira de la racine antérieure de l'aorte, lorsque les branchies seront développées.

» L'auteur insiste de nouveau sur cette circonstance dans ce qu'il a pu observer chez de jeunes blennies prêtes à éclore.

» M. de Quatrefages a trouvé quelques traces de la substance vitelline dans l'intestin : preuve que le sac vitellin communiquait encore avec le canal intestinal, ainsi que semble l'indiquer la figure qu'il en a publiée. Cette observation infirme, avec beaucoup d'autres, l'opinion de M. Filippi, que cette communication n'a jamais lieu. Il faut méconnaître, pour soutenir cette opinion, les rapports de formation et de continuité du sac vitellin interne avec l'intestin ou la peau intérieure; ils sont aussi évidents que ceux du sac vitellin externe, ou du sac ombilical, avec la peau extérieure ou le derme.

» 12°. Dans la même année 1842 a paru un travail extrêmement intéressant

(1) Voir de BAER, sur le développement des animaux, t. II, p. 300.

sur l'ovologie des Sélaciens en général, par M. J. Müller; mais plus particulièrement sur celle d'une espèce connue d'Aristote, que l'auteur détermine pour la première fois dans ce travail; c'est l'émissole lisse (*Galeos levis*, J. M.), qu'il nomme ainsi pour le distinguer de l'émissole vulgaire, avec lequel les naturalistes systématiques le confondaient.

» Ce Mémoire comprend, entre autres, la description la plus circonstanciée d'un placenta vitellin, et d'un placenta utérin qui permet au fœtus de la première espèce de se nourrir à la manière des mammifères, dont le placenta ne diffère de celui-ci que parce qu'il est allantoïdien.

» Cette singulière circonstance, entrevue et très-exactement déterminée, sous le rapport de l'adhérence vitelline, par G. Cuvier, chez les fœtus de requin, n'avait pas échappé à la pénétration du génie d'Aristote, mais seulement sous le rapport de l'adhérence de l'œuf ou de son placenta en général; et, parmi les anatomistes modernes, Stenon avait eu le bonheur de découvrir de nouveau cette adhérence de l'œuf aux parois de l'oviducte, sans déterminer davantage par quelle partie elle se faisait, et sans savoir qu'Aristote l'avait déjà connue. Il était réservé au physiologiste célèbre de Berlin, d'en apprécier tous les détails et la nature, et de montrer que l'espèce qui avait été observée par Aristote, comme par Stenon, avait été confondue avec l'émissole vulgaire, dont le fœtus ne contracte aucune adhérence avec les parois de l'oviducte incubateur, et rentre dans la règle générale des ovipares ordinaires.

» Ces différences dans l'ovogénie des deux espèces du même genre, qui se ressemblent tellement qu'il était facile de les confondre, montrent, il me le semble du moins, que, chez les vertébrés ovo-vivipares, la présence ou l'absence d'un placenta, indiquant un développement nutritif plus ou moins avancé, plus ou moins intime entre la mère et le fœtus, n'est pas un caractère différentiel important.

» Le même ouvrage renferme des détails intéressants sur les branchies externes de certains sélaciens.

» Rudolphi, dès 1817, écrivait d'Italie à M. Linck, qu'il avait reconnu la nature de ces organes transitoires. Il avait été conduit à cette juste détermination par les indications de l'abbé Chinghen, communiquées à Meckel dès 1815, et d'après lesquelles ce naturaliste italien supposait que l'espèce de squalé, distinguée par Bloch sous le nom de *Fimbriatus*, était précisément un fœtus ayant encore ses branchies externes.

» 13°. Nous devons à feu Leuckart une *Monographie* intéressante sur ces organes. MM. Rathke, Retzius et J. Müller ont fait connaître ceux qui sont

suspendus aux évents. Ce dernier a de plus observé qu'un certain nombre de squales qui sont privés d'évents, à l'âge adulte, en sont pourvus dans ce premier âge de la vie et que ces organes sont conséquemment transitoires pour ces memes especes

Il résulte de cette esquisse que malgré les facilites que l'on peut avoir de se procurer du fiai de poisson et de fi conder leurs œufs artificiellement, et les avantages que l'on peut tirer, pour les observations, de la composition de l'œuf de ces animaux un tres-petit nombre d'especes ont été suivies jusqu'à present, dans toutes ou meme dans une partie des phases de leur developpement

Ces reflexions m'ont encouragé à communiquer à l'Académie les fragments qui composent la seconde partie de ce Mémoire

M D'OMALUS D'HALLOY, en faisant hommage à l'Académie d'un exemplaire de sa Note *Sur les races humaines* (voir au *Bulletin bibliographique*) donne, dans les termes suivants une analyse de cet opuscule

Je me suis en premier lieu, attaché à montrer, dans cette Note, que les *caracteres naturels*, tels que la forme et la couleur, doivent primer, pour le classement des modifications du genre humain, sur le langage, la filiation historique et les autres considérations *sociales*. Je fais voir ensuite que l'application de ce principe porte à retirer les Indous et les Abyssiniens de la race blanche pour les réunir à la race brune, qui se trouve ainsi composée de trois groupes geographiques, respectivement sepaies par la mer d'Oman et par le golfe de Bengale. D'un autre côté je termine en faisant remarquer la tendance continuelle au développement que présentent les variétés les plus blanches du genre humain, tandis que les races colorées, ainsi que les variétés les moins claires de la race blanche, sont dans un état stationnaire ou rétrograde, d'où l'on dirait que, malgré la stabilité qui caractérise maintenant la nature organique, il se passe encore un phénomène analogue à celui que nous révèle l'étude paleontologique du globe terrestre, où nous voyons successivement paraître des especes de plus en plus perfectionnées, de maniere que les poissons ont précédé les reptiles, que les reptiles ont précédé les mammiferes didelphes, que les mammiferes didelphes ont précédé les mammiferes monodelphes, et que l'homme n'a paru que pour couronner la série.

NOMINATIONS

L'Académie, sur l'invitation de M le MINISTRE DES TRAVAUX PUBLICS, désigne, par voie de scrutin, trois de ses membres pour faire partie du jury appelé à

juge les piéces de concours produites par MM les éléves de l'École royale des Ponts et Chaussées MM Duhamel, Fouville et Dufrénoy obtiennent la majorité des suffrages

L'Académie procède ensuite également par la voie du scrutin, à la nomination de la Commission chargée de l'examen des piéces adressées au concours pour le prix concernant les *Arts insalubres* Commissaires MM Payen, Duméril Pelouze Rayer Thenard

MEMOIRES LUS

PHYSIQUE — *De l'action que les belemnites exercent sur la lumière polarisée, par M JAMIN* (Extrait par l'auteur)

(Commissaires, MM Biot Regnault)

Quand on examine la structure intérieure des belemnites on la trouve toujours constituée par un groupement régulier de cristaux de spath réunis l'un à l'autre par des facettes de jonction très visibles la substance tout entière présente un aspect fibreux, et, dans chaque partie du fossile l'axe des cristaux coïncide avec la direction des fibres

Une semblable disposition devait nécessairement présenter des phénomènes optiques plus ou moins compliqués, dépendant à la fois de l'état cristallin de la masse et de la discontinuité produite dans son intérieur par les faces de réunion des fibres

Après avoir disposé dans un appareil ordinaire, un rayon polarisé verticalement et reçu ce rayon sur un prisme de Nicol de manière à l'éteindre complètement, j'ai interposé dans le trajet une lame mince de belemnite taillée perpendiculairement à l'axe cette lame a présenté l'aspect suivant du centre partent quatre secteurs égaux dont deux sont verticaux, deux autres horizontaux ils sont presque complètement noirs, et constituent une croix de Malte très-régulière, les branches de cette croix sont séparées par des espaces éclairés, inclinés de 45 degrés à droite et à gauche du plan de polarisation primitif

Quand on fait tourner progressivement le prisme de Nicol, la croix noire tourne dans le même sens, mais avec une vitesse moitié moindre, de sorte que si l'analyseur a été incliné de 90 degrés, chaque branche de la croix obscure a marché de 45 degrés, en même temps l'obscurité est devenue de moins en moins grande, et la croix noire de moins en moins apparente Mais si l'on fait marcher l'analyseur jusqu'à 180 degrés, la croix continue sa rotation jusqu'à 90 degrés, et repasse en sens inverse par les mêmes variations d'intensité

• Toutes les circonstances de cette expérience sont données exactement par la formule connue

$$I = \cos^2 \alpha \sin^2 (\omega - \alpha) + \sin^2 \alpha \cos^2 (\omega - \alpha)$$

J'ai soumis à un examen semblable une lame mince taillée dans la direction même de l'axe

En faisant tomber sur cette lame un mince faisceau de lumière polarisé verticalement, et en recevant directement dans l'œil la lumière émergente, on remarque les phénomènes suivants

Si l'axe est horizontal, la lumière ne le traverse pas, et il paraît très-obscur ; si l'axe est vertical, il apparaît comme une ligne brillante très-éclairée, et la lumière transmise est polarisée verticalement ; enfin, pour toute autre position, il laisse passer des rayons toujours polarisés parallèlement à sa direction

Il se présente donc suivant cette ligne un phénomène absolument semblable à celui qui a été signalé dans une tourmaline parallèle à l'axe

À droite et à gauche de son axe la lame de bélemnite présente des effets analogues, mais en sens inverse

L'axe étant vertical et lumineux on distingue à droite et à gauche deux bandes obscures, larges de 3 ou 4 millimètres, le maximum de leur obscurité est placé contre l'axe lui-même, et elles s'éclaircissent peu à peu dans les parties les plus rapprochées du contour extérieur

En faisant tourner la lame de 90 degrés, l'axe est alors obscur, et l'espace occupé précédemment par les bandes noires laisse passer une lumière très-abondante ; il y a donc encore dans ces parties une action analogue à celle d'une tourmaline, mais qui serait placée perpendiculairement à celle représentant l'action de l'axe lui-même

• On peut résumer cette expérience en disant que, suivant l'axe, il n'y a de transmis que les rayons polarisés parallèlement à sa direction, tandis que les parties voisines éteignent cette lumière et ne sont traversées que par les rayons polarisés perpendiculairement à l'axe

En étudiant attentivement la structure de ces lames on rend facilement compte des faits précédents, les petites facettes de jonction dont j'ai parlé sont autant de plans sur lesquels la lumière se réfléchit dans l'intérieur de la lame, et ces réflexions nombreuses éteignent complètement le rayon incident dans les cas où nous avons reconnu que la lame paraissait obscure

CHIRURGIE — *Recherches sur quelques points d'anatomie pathologique de la trompe d'Eustache, et sur la surdité qui en peut résulter*
par M BONNAFONT

(Commissaires MM Andril Rayer Velpeau)

Les considérations que nous venons d'exposer dit l'auteur en terminant son Mémoire nous paraissent conduire aux conclusions suivantes

1° Que la membrane qui tapisse la trompe d'Eustache n'est pas de même nature que celle qui recouvre les parois de la caisse

2° Que cette différence est démontrée 1° par l'absence des cryptes dans la membrane de la cavité du tympan tandis qu'elles sont nombreuses dans celle de la trompe 2° par les changements pathologiques qu'elles éprouvent et que l'observation a pu faire constater

3° Que cette différence d'organisation doit en entraîner nécessairement une dans la nature des affections qui y établissent leur siège d'où la distinction importante des maladies de la trompe d'avec celles de la cavité du tympan ainsi que dans le mode de traitement qu'elles réclament

4° Que les insufflations gazeuses de toute espèce généralement employées ont le plus souvent peu d'efficacité pour le traitement de ces cophoses puisque dans aucun cas elles ne peuvent rien contre les rétrécissements de la trompe

5° Que dans le cas de rétrécissement de ce conduit le seul traitement rationnel et capable d'amener des résultats satisfaisants consiste à l'attaquer à l'aide des mêmes moyens que la pratique a consacrés contre les affections de même genre des autres conduits muqueux je dois dire seulement que la méthode par dilatation m'a constamment réussi pour surmonter les rétrécissements les plus rebelles, et que dans aucun cas je n'ai eu besoin de recourir à la cauterisation

6° Que la cauterisation ne doit être employée qu'avec la plus grande réserve si toutefois il est des rétrécissements qui exigent impérieusement son emploi ce que nous n'avons pas encore rencontré dans notre nombreuse pratique

CHIMIE — *Recherches sur l'uranium, deuxième Mémoire, par*
M Eug PRIGOT (Extrait par l'auteur)

(Commission précédemment nommée)

Le Mémoire que je sou mets aujourd'hui au jugement de l'Académie forme la suite des *recherches sur l'uranium*, que j'ai publiées en 1842 J'ai

démontré, dans ce premier travail, que l'urane, qu'on avait considéré jusqu'à cette époque comme un corps simple, est un oxyde métallique, j'en ai séparé le nouveau métal, l'*uranium*. Appelant l'attention des chimistes sur les propriétés anormales de cet oxyde, j'ai pensé que la manière la plus simple de les interpréter consiste à attribuer à ce corps deux rôles distincts : tantôt base énergique, il s'unit aux acides, et il donne naissance aux sels verts de protoxyde d'uranium ; tantôt, agissant comme un radical simple ou composé, il se combine avec le chlore, avec le soufre, et avec les autres métalloïdes, de manière à produire des composés ternaires doués de toutes les propriétés des chlorures, des sulfures et des autres corps binaires formés par l'union des métaux avec les métalloïdes. J'ai donné au protoxyde d'uranium, quand il offre ce caractère de radical, le nom d'*uranyle*.

Les propriétés du peroxyde d'uranium m'ont surtout conduit à considérer comme très-vraisemblable et presque nécessaire cette interprétation des faits. Cet oxyde, dont la composition est représentée par la formule U^2O^2 , est la base des sels jaunes uraniques qui contiennent l'oxyde et l'acide unis équivalent, ces sels sont, par conséquent, tribasiques d'après leur composition. Néanmoins, ils offrent, d'une manière incontestable, l'ensemble des caractères physiques et chimiques qui appartiennent aux sels neutres. Cette anomalie oblige à révoquer en doute la valeur et la généralité des lois relatives à la composition des sels, ou bien à attribuer au peroxyde d'uranium une constitution particulière. Il me a semblé que ce dernier parti étant le plus sage, il conduit à considérer cet oxyde comme l'équivalent d'un oxyde à un atome d'oxygène. Dans cette hypothèse, il devient $(U^2O^2)O$, et il correspond au chlorure d'uranyle $(U^2O^2)Cl$, les deux atomes d'oxygène de l'uranyle ne contribuant pas à sa capacité de saturation, il forme des sels neutres, à tous égards, en s'unissant avec un équivalent d'acide.

Mes recherches sur l'uranium ayant reçu un assentiment presque unanime, et ayant été confirmées par les divers travaux qui ont été faits ultérieurement sur ce métal, je serais peut-être en droit de considérer leurs résultats comme acquis à la science s'ils n'avaient pas été vivement critiqués par M. Berzelius. Dans ses Rapports annuels sur les progrès de la chimie, l'illustre secrétaire perpétuel de l'Académie des Sciences de Stockholm révoque en doute l'exactitude du nombre 750 qui exprime, d'après mes expériences, le poids atomique de l'uranium. Il conteste au protoxyde d'uranium le rôle de radical que je lui attribue. Il nie que l'oxyde uranique jouisse d'aucune propriété exceptionnelle, selon lui, l'uranium imite le fer dans ses

combinaisons et de même que le peroxyde de ce dernier métal il donne naissance à des sels basiques solubles dans l'eau

Il a justifié définitivement avec laquelle chacun de nous reçoit les observations critiquées de M. Berzelius m'a fait un devoir de poursuivre mes recherches sur l'uranium et de soumettre à de nouvelles épreuves les opinions que j'ai mises sur la nature des composés de ce métal

Mais proposant de revenir prochainement sur la question du poids atomique de l'uranium je ferai seulement remarquer que le nombre 800 que M. Berzelius considère comme plus exact que celui que j'ai adopté et qui est le déduit d'un petit nombre d'expériences faites anciennement sur l'oxydation de l'urane (protoxyde d'uranium) ne saurait être admis car il est en désaccord avec les analyses très nombreuses des sels et des oxydes uraniques faites par M. Ebelmen qui a été conduit au nombre 742,8 par M. Rammelsberg qui adopte le nombre 750 et lui-même que j'ai proposé enfin par M. Werthmann qui est arrivé au nombre 740,5. Il est donc très vraisemblable que le véritable nombre se trouve compris entre 740 et 750

M. Berzelius s'est décidé à admettre que le protoxyde d'uranium gisse comme un radical parce que dit-il ce corps est une base salifiable. J'avoue que je croyais avoir répondu d'avance à cette objection en n'attribuant pas ce double rôle au même corps j'ai supposé en effet que l'oxyde des sels verts présente une autre constitution moléculaire que l'uranyle il est possible au je dit que bien qu'ils aient la même composition pondérale ils soient l'un par rapport à l'autre ce que est le gaz méthylène au gaz oléfiant que leur état de condensation soit différent. Les fonctions si diverses que les éléments de l'ammoniaque et du cyanogène acceptent dans les composés auxquels ils donnent naissance ne fournissent-elles pas des exemples non contestables de modifications moléculaires du même ordre?


Quant aux sels uraniques, M. Berzelius admet sans aucune hésitation que l'oxyde uranique produit de préférence avec les acides des *sels basiques solubles*, et qu'il donne lieu à des sels doubles avec les sels neutres d'autres bases, il assure que d'autres oxydes se comportent comme lui. Il n'aurait peut-être pas été inutile de citer ces oxydes je n'en connais aucun qui, comme l'oxyde uranique forme des sels basiques solubles, cristallisables, doués de toutes les propriétés des sels neutres, le plus souvent à l'exclusion de tout autre composé salin du même acide, car il faut remarquer que en ayant gardé exclusivement à la composition des sels uraniques, on est conduit à admettre que leur oxyde, qui forme un si grand nombre de sels tribasiques est impropre à fournir aucun sel neutre cependant, pour tous les chimistes

la neutralité est l'état le plus stable et le plus habituel des composés salins

A la vérité M Berzelius admet l'existence de trois sulfates uraniques savoir,




Ce dernier prend naissance, d'après lui, quand on fait cristalliser $SO^2 \ U^2O^2$ dans l'acide sulfurique concentré et il constitue le sel neutre. Il n'a vainement tenté de le produire en opérant dans les circonstances indiquées par M Berzelius, j'ai obtenu un sel très acide dont la composition est



Ce sel fournit par conséquent un nouvel argument en faveur du rôle du radical que j'attribue au protoxyde d'uranium il est l'équivalent du bisulfate de potasse $2SO^2, KO \ HO$


Cette manière de faire accorder la composition des sels uraniques avec leurs propriétés est rendue plus nécessaire encore par l'existence des sels qui suivent je les ai choisis à dessein dans les genres les plus complexes et les mieux connus

Sulfométhylate uranique On prépare ce sel en décomposant le sulfate d'uranyle $SO^2 \ U^2O^2 \ 3HO$ par le sulfométhylate de baryte en évaporant dans le vide la liqueur obtenue par double décomposition, elle fournit des cristaux en larges feuillets d'une extrême déliquescence. L'analyse de ce sel conduit à la formule suivante



Cette composition paraît résoudre la question de l'état de saturation des sels uraniques car on ne connaît pas de sulfométhylates basiques en outre, la propriété que possède la liqueur obtenue par double décomposition de cristalliser tout entière en donnant le sel dont je viens de présenter la composition et de précipiter les sels de baryte dès qu'elle contient une plus forte proportion d'acide sulfurique prouve que l'existence d'un autre sulfométhylate n'est pas admissible, même à l'état de dissolution

Tartrate uranique En mettant en contact des poids égaux d'oxyde uranique et d'acide tartrique dissous dans l'eau on obtient une liqueur jaune qui fournit par la concentration un dépôt cristallin de tartrate uranique. L'eau-mère froide abandonnée à l'évaporation spontanée, donne des cristaux qui contiennent une plus grande proportion d'eau, leur composition est représentée par la formule




Ce sel perd 6 équivalents d'eau quand il est desséché à 120 degrés lorsqu'il est posé dans une liqueur bouillante, il ne les contient point.


Il y a même tenté de lui enlever une plus forte proportion d'eau en le chauffant au delà de 200 degrés.

Tartrate double d'uranyle et d'antimoine ou émetique uranique. Ce remarquable se précipite à l'état gélatineux quand on mêle deux dissolutions froides l'une d'azotate uranique l'autre d'émetique ordinaire avec le temps ce dépôt devient cristallin des liqueurs bouillantes et étendues ne fournissent aucun précipité immédiat et les cristaux se forment d'une manière lente par le refroidissement ils sont soyeux peu solubles dans l'eau froide et légèrement efflorescents.

L'analyse exécutée un grand nombre de fois et dans des circonstances diverses conduit à la formule suivante



Dans le vide sec il perd 7 équivalents d'eau à 200 degrés il en laisse de 1,4 et encore 1/2, et il devient



L'acide tartrique s'y trouve par conséquent au même état que dans l'émetique ordinaire desséché à 200 degrés d'après les analyses de MM. Duméril et Stas.

Ainsi dans l'émetique uranique l'oxyde $\text{U}^{\text{O}}\text{O}^{\text{O}}$ remplace la potasse de l'émetique ordinaire. Je n'espère pas rencontrer un fait plus concluant en faveur de la constitution que j'attribue à cet oxyde.

L'existence de ce sel conduit en outre, à une autre conséquence importante on peut ce me semble admettre par induction que la constitution de l'oxyde uranique n'est pas aussi exceptionnelle qu'on pouvait d'abord le supposer en l'étendant en effet au protoxyde d'antimoine, et en considérant ce corps comme un monoxyde, $(\text{Sb}^{\text{O}}\text{O}^{\text{O}})\text{O}$ on fait accorder la composition de l'émetique ordinaire avec ses propriétés, jusqu'ici fort embarrassantes, car elles sont celles d'un composé neutre, quoique ce composé soit basique par sa composition. Cette manière d'interpréter les faits introduit une simplicité attendue dans le mode de représenter les tartrates, puisque l'émetique ordinaire devient le sel correspondant au tartrate neutre de potasse et à la crème de tartre, l'émetique desséché étant $\text{C}^{\text{H}}\text{O}^{\text{O}}\text{O}, \text{KO}, (\text{Sb}^{\text{O}}\text{O}^{\text{O}})\text{O}$.

La même simplicité se conserve si l'on veut considérer l'émetique comme un sel double ou si l'on admet que l'hydrogène est remplacé, dans

les matières organiques et dans les acides, par des métaux ou par des radicaux composés, cette théorie, que Davy et Dulong ont les premiers mise en avant, et que les tendances actuelles de la chimie organique rendent si plausible, n'est applicable aux tartrates qu'autant qu'on admet que U^3O^3 et Sb^3O^3 remplacent 1 équivalent d'hydrogène, de potassium ou de tout autre métal, ce n'est pas là un des moindres arguments à faire valoir pour justifier les radicaux dont je propose l'adoption.

En considérant le protoxyde d'antimoine comme formé de $(Sb^3O^3)O$, la poudre d'Algaroth, $2Sb^2O^3 + Sb^3Cl^3$, devient $(Sb^3O^3)Cl$, elle correspond au chlorure d'uranyle $(U^3O^3)Cl$.

Enfin le protoxyde de bismuth appartient probablement à cette même série d'oxydes, qui diffèrent du peroxyde de fer, de l'alumine, du protoxyde de chrome, etc. en ce qu'ils forment contrairement à ces derniers des sels neutres en se unissant avec 1 seul équivalent d'acide. L'azotate de bismuth est en effet, $AzO^3, Bi^3O^3 \cdot 3H^2O$.

En résumé, les lois générales de la composition des sels étant ainsi mises en défaut, il semble qu'on ne puisse les conserver dans leur intégrité qu'en admettant l'existence des radicaux oxydés dont l'oxyde uranique offre un si remarquable exemple.

MEMOIRES PRESENTES

HELMINTHOLOGIE — *Deuxième Note sur l'altération vermineuse du sang des chiens par l'hématozoaire du genre filaire, par MM GARNY et DELAFOND (Extrait)*

(Commission précédemment nommée)

Depuis la communication que nous avons eu l'honneur de faire à l'Académie, le 30 janvier 1843, sur la découverte de la filaire du sang du chien, nous avons examiné le sang de deux cent cinquante chiens de race, d'âge et de sexes différents, et nous n'y avons rencontré que cinq fois la filaire, c'est-à-dire dans 1 cas sur 50.

Nos recherches nous ont fait, en outre, reconnaître

- 1° Que les chiens qui ont le sang vermineux jouissent, d'ailleurs, d'une très bonne santé et conservent toutes leurs facultés instinctives,
- 2° Que le sang de ces animaux est plus rouge et plus séreux que dans l'état ordinaire,
- 3° Que l'alimentation exclusive pendant quinze jours des chiens à sang vermineux, soit avec de la graisse, soit avec de la viande, soit avec des pommes

de terre soit avec du pain, de même que la diète absolue d'aliments et de boissons pendant le même laps de temps le repos prolongé, l'exercice jusqu'à l'assaut le plus extrême, les émissions sanguines épuisantes n'influent en quoi que ce soit sur le nombre, la forme et les mouvements des filaires.

1° Que 2 décilitres de sang vermineux defibriné ayant été transfusés dans les vaisseaux de trois chiens à sang non vermineux, le sang de ces animaux n'a offert des filaires que pendant huit jours,

2° Que 1 litre de sang vermineux defibriné, maintenu à la température du corps et injecté dans les vaisseaux d'un chien à sang non vermineux a donné des filaires au sang de ce chien, sans altérer sa santé, et que, depuis sept mois, ce sang est resté vermineux jusqu'à ce jour,

6° Que le sang vermineux, defibriné et injecté dans les veines de grenouilles à sang vermineux et non vermineux a donné des filaires au sang de ces animaux pendant huit jours mais que ces hématozoaires ont disparu aussitôt que les globules du sang du chien ont été altérés décomposés et ont disparu des vaisseaux de ces batraciens.

7° Que la filaire déposée vivante dans les cavités des sereuses et dans le tissu cellulaire ne peut continuer à vivre dans ces deux nouvelles conditions.

8° Que la filaire du sang du chien ne se rencontre point dans les matières excrémentielles et les humeurs telles que l'urine, la salive, la bile, l'humeur aqueuse, le corps hyaloïde, le fluide céphalo-rachidien et le pus secreté par des plaies,

9° Que le chyle pris dans les chylifères du mésentère et dans le canal thoracique, la lymphe recueillie dans les principaux troncs lymphatiques du corps, ne présentent pas de filaires.

10° Que ces vers n'existent pas non plus dans les tissus simples ou composés de l'organisme,

11° Que la filaire du sang du chien naît et se développe dans le sang de cet animal sans que, jusqu'à ce jour, elle ait abandonné ce liquide dans aucune raison de l'immunité, et qu'il est permis de dire, quant à présent, que la filaire du sang du chien n'éprouve point de migrations analogues à celles qu'on admet pour les filaires qui vivent dans le sang des grenouilles.

CHIRURGIEN → *Mémoire sur les tumeurs éburnées du sein*, par M. LESAUVAZE
(Extrait)

(Commissaires, MM. Andral, Rayer)

Sous le nom de *cancer éburné*, le professeur Alibert a désigné des tu-

meurs qui apparaissent dans le sein de la femme, et n'ont, avec les autres affections dont cet organe est si souvent le siège, aucune analogie de symptômes, de terminaison et de structure. Bien distinctes des productions qui se forment par simple exhalation celluleuse, et s'accroissent en écartant seulement et en comprimant les organes qui les avoisinent, les tumeurs éburnées de même que le squirre se développent aux dépens du tissu cellulaire et s'accroissent en envahissant successivement celui qui les entoure, mais à ce caractère commun il s'en adjoint bientôt d'autres qui les différencient, et le principal c'est, comme l'a dit Alibert, que cette maladie *ne manifeste aucune ulcération*, c'est-à-dire qu'elle n'éprouve jamais l'inflammation ulcéreuse qui transforme si souvent le squirre en cancer.

J'avais recueilli et communiqué au savant professeur l'observation qu'il a consignée dans sa *Nosologie naturelle*, et d'après laquelle il a établi son genre *cancer éburné*, mais il était difficile, d'après un fait isolé, d'établir les caractères génériques de la maladie, aussi les particularités contenues dans quatre nouveaux faits que je rapporte dans mon Mémoire servent à rectifier quelques-unes des idées émises par Alibert, en même temps qu'elles mettent hors de doute que les tumeurs éburnées n'ont avec le cancer aucune analogie, que conséquemment leur dénomination était tout à fait impropre.

Jamais je n'ai reconnu d'affection semblable dans d'autres organes, aussi le professeur Alibert, qui a prétendu avoir rencontré son cancer éburné sur des hommes, ou en d'autres parties que le sein, n'a cité aucun fait à l'appui de son assertion, et il est permis de penser que quelques apparences en auraient imposé au savant observateur.

C'est surtout avec le squirre que cette maladie a pu être confondue. Comme lui, elle s'empare du tissu cellulaire, l'envahit par une sorte d'attraction, le concentre sur lui-même, le solidifie en quelque sorte et lui fait subir une transformation toute spéciale, mais on distinguera toujours l'éburnation du squirre par la dureté de son tissu, sa surface uniformément arrondie, l'absence de douleur au centre de son foyer, et le défaut de tendance à la suppuration. Relativement à ce dernier point, il est peut-être nécessaire de joindre aux faits rapportés dans mon Mémoire quelques mots d'explication. Nous voyons en effet, dans la troisième observation, une ulcération assez étendue occuper la surface même du sein induré, mais elle a été étrangère à la marche de la maladie. Survenue à la suite d'une inflammation de la peau qui s'était terminée par le sphacèle, elle conserve le même aspect, ne suppure pas, et cet état stationnaire contraste avec les transformations successives que revêtent les ulcères cancéreux. De même si, dans la cinquième observation,

nous trouvons un vaste ulcère évidemment cancéreux, nous le voyons relégué en dehors de la masse éburnée, elle lui a tracé une limite qu'il n'a pu franchir et s'est étendu sur toute une région qui n'avait reçu aucune atteinte de l'affection première et il est survenu à la suite d'applications répétées d'un caustique.

L'insensibilité qu'offre la tumeur éburnée est un de ses caractères spéciaux. Elle doit à son peu de sensibilité de neveiller aucune inquiétude tant qu'elle reste confinée dans le sein. C'est seulement lorsque la maladie se propage vers l'aisselle et le cou que la compression exercée sur le plexus nerveux axillaire et cervical y éveille des douleurs souvent très-vives. La même action, agissant sur les ganglions et vaisseaux lymphatiques de l'aisselle, produit bientôt un engorgement de tout le membre qui devient parfois monstrueux, mais il reste à l'état d'infiltration cellulaire, et ne revêt point les caractères de l'induration, comme Alibert semblait l'indiquer. C'est à ce moment que les accidents marchent avec rapidité. L'oppression toujours croissante, d'une part, de l'autre le trouble des fonctions digestives viennent révéler à l'intérieur la marche prompte des phénomènes qui résultent de l'alération imprimée aux membranes séreuses.

On concevra facilement que la thérapeutique d'une maladie si peu connue est entièrement à faire. L'emploi de quelques médicaments dont l'essai a été bien incomplètement tenté ne pouvait éclairer sur les moyens capables d'enrayer les développements d'accidents qui, jusqu'à ce moment ont toujours marché avec une désespérante régularité.

PHYSIOLOGIE — *Nouvelle Note sur la question de localisation des poisons* par M. ORFILA

(Commission précédemment nommée.)

Permettez-moi d'attirer encore une fois l'attention de l'Académie sur la localisation des poisons et de lui rappeler certains faits qui mettront la Commission à même de juger la question en parfaite connaissance de cause.

1° J'avais établi dans mon premier Mémoire sur l'arsenic, publié en janvier 1839, que le sang tiré de la veine d'un chien empoisonné, depuis 1^h 25", par de l'acide arsénieux, contenait une quantité notable d'arsenic (voyez l'expérience 5^e, page 14).

M. Chatin a annoncé, en février dernier, à l'Académie des Sciences, qu'il avait extrait de l'arsenic et de l'antimoine en traitant le sang qu'il avait pu recueillir sur les cadavres de huit chiens empoisonnés par une préparation

arsenicale ou antimoniale et qu'il avait également obtenu de l'antimoine en analysant 3 kilogrammes de sang fourni par des malades soumis à l'action de l'émétique à haute dose. Quel a dû être mon étonnement en lisant, dans le *Compte rendu* de la séance de l'Académie du 29 janvier dernier, le passage suivant d'une Note de MM. Flandin et Danger : *Quel que soit le moment où l'on saigne un animal empoisonné par un composé métallique, on ne retrouve pas l'élément toxique dans le sang*. À cela je me bornerai à répondre que je suis prêt à montrer à la Commission que cette assertion est complètement inexacte.

2° On lit encore dans la même Note : *que jusqu'ici, dans les expertises judiciaires, c'est dans le sang et dans le cœur qu'on s'est plus particulièrement attaché à rechercher les substances toxiques*. Cette assertion est pour le moins aussi inexacte que la précédente : en effet, on ne pourrait pas citer une seule expertise où l'on n'ait opéré que sur le sang et sur le cœur lorsque l'on avait à sa disposition le foie ou quelques autres organes. Je dirai plus : c'est que je ne connais pas de cas médico-légal où les recherches aient uniquement porté sur le sang et sur le cœur.

3° Dans une Lettre qu'il vient de publier, M. Flandin, pour mieux faire ressortir les droits qu'il croit avoir à la découverte de ce fait important, a invoqué que les poisons se trouvent en quantité beaucoup plus considérable dans le foie que dans les autres organes, prétend que dans ses expériences de laboratoire, j'analysais d'ordinaire, dans une seule et même opération, le foie, la rate, les poumons, les reins et le cœur. S'il en était ainsi je serais malvenu à revendiquer pour moi l'idée mère dont il s'agit : mais cette assertion n'est pas plus exacte que les autres : ainsi que je viens de le prouver en citant quelques passages de celles de mes publications que mon confrère invoque à l'appui de son opinion.

Les Expériences 6°, 10°, 16° et 17° de mon premier Mémoire sur l'arsenic établissent positivement que j'ai agi séparément sur chacun des principaux organes. L'Expérience 16°, notamment, fournit une preuve incontestable de l'exactitude du fait que j'avance : *On y lit en effet : Le cerveau contenait à peine de l'arsenic, il y en avait un peu plus dans les poumons, le cœur et les reins en renfermaient davantage et à peu près autant l'un que l'autre. Le foie et la rate en donnaient encore plus que les autres viscères*.

Mais c'est surtout dans mon travail sur l'antimoine, lu à l'Académie le 10 mars 1840, que le fait dont il s'agit est consigné de manière à ne laisser aucun doute. Sur six expériences décrites dans ce Mémoire cinq ont été faites en traitant les organes séparément (voyez Expériences 3°, 5°, 6°, 7° et 8°

et je suis arrivé à cette conséquence, que le *foie* et les reins contiennent beaucoup plus d'intime que les autres organes (voyez Conclusion 6^e, page 147)

Je ne terminerai pas cette Lettre sans répondre au reproche qui m'est fait par M. Huidin de considérer le corps de l'homme comme une éponge qui absorbe passivement. J'avoue qu'à cet égard j'adopte entièrement la théorie de l'absorption de MM. Foderl et Magendie.

PHYSIOLOGIE. — *De la localisation des poisons*. Note de MM. DANGEA et FLANDIN en réponse à un opuscule adressé à l'Académie des Sciences par M. Orfila. (Extrait.)

(Commission précédemment nommée.)

M. Orfila vient d'adresser à l'Académie un opuscule sur la localisation des poisons et nous prie, sur quelques points, des opinions qui ne sont pas les nôtres. Qu'il nous soit permis d'y répondre ici en quelques mots.

Nous n'avons jamais contesté à M. Orfila qu'il ait dit ni même qu'il ait été le premier à dire que le foie contient une plus grande quantité des poisons absorbés que les autres organes; mais ce que nous lui contesterons, c'est d'avoir saisi la véritable explication de ce fait physiologique, c'est d'avoir vu ce que nous avons constaté plus tard, que, selon la nature des substances toxiques absorbées, on doit les chercher dans certains organes à l'exclusion de certains autres: c'est enfin que, relativement à l'élimination des poisons, elle a lieu pour telles substances par les reins, tandis que, pour le cuivre par exemple, elle ne s'opère nullement par cette voie d'excrétion.

Jusqu'au jour où nous avons lu devant l'Académie notre Mémoire sur le cuivre (24 juillet 1843), M. Orfila ne doutait pas que l'urine des animaux empoisonnés par le cuivre ne dût contenir des traces de ce poison. Voici en effet la conclusion du premier paragraphe de son Mémoire sur le cuivre (*Mémoires de l'Académie de Médecine*, t. VIII, p. 542).

Ces expériences prouvent qu'en traitant par l'eau bouillante le *foie*, la *rate*, les *reins*, les *poumons* et le *cœur* des chiens empoisonnés par l'acétate ou par le sulfate de cuivre introduits dans l'estomac ou appliqués sur le tissu cellulaire sous-cutané, on en sépare du cuivre, soit que l'on procède à l'analyse quelque temps après la mort, soit que l'on tue les animaux et que l'on agisse sur ces organes retirés à l'instant même des cavités où ils sont contenus.

Mais il faut nous hâter d'ajouter que M. Orfila trouvait du cuivre dans les mêmes organes de l'homme à l'état sain, ainsi qu'on le voit par cette conclusion du second paragraphe de son Mémoire (*même Recueil*, p. 549).

Le foie, la rate, les reins, le canal digestif, les poumons et le cœur de l'homme réunis, épuisés par l'eau bouillante desséchés et carbonisés comme il vient d'être dit, donnent au contraire une très-petite quantité du cuivre normalement qu'ils renferment mais la majeure partie de ce métal reste dans le charbon et ne peut être obtenue que par l'incinération.

Si ce n'est pas abuser de l'attention de l'Académie nous lui demandons la permission de répondre à un reproche de contradiction que nous fait M. Orfila. Il dit dans son opuscule

Quel dut être mon étonnement lorsqu'en juin 1842 je vis MM. Flandin et Danger venir lire à l'Académie des Sciences une Note dans laquelle ils annonçaient qu'ils avaient trouvé que l'on retrouve plus spécialement l'antimoine dans le foie, et qu'il n'existe pas dans les poumons dans les tissus musculaire et osseux, quoiqu'ils eussent dit dans le corps de leur Mémoire qu'ils avaient découvert ce métal par exception il est vrai dans ces mêmes tissus.

Cette contradiction n'empêcha pas ces expérimentateurs d'ajouter que le fait de la localisation des poisons est une donnée précieuse pour la médecine légale.

La contradiction que nous reproche M. Orfila n'est pas réelle. Veut-on avoir dans quel cas exceptionnel nous avons trouvé de l'antimoine dans les poumons? Alors seulement que nous avons pratiqué sur les animaux soumis à nos expériences, la ligature de l'œsophage. Que prouve notre fait exceptionnel qui en liant l'œsophage aux animaux on intervertit l'ordre des fonctions physiologiques et que, relativement à l'absorption, il ne faut rien conclure d'expériences ainsi faites.

Enfin, M. Orfila demande quel est le sens que nous attribuons au mot *localisation*.

On ne peut concevoir, dit-il, la localisation des poisons que de deux manières ou bien on entend que tel poison se porte sur un organe donné ou il reste sans varier sensiblement dans les autres organes, ou bien qu'il est rejeté tantôt par une voie, tantôt par une autre dans l'un et l'autre cas, il semble qu'il y ait prédilection pour un organe.

Or, dans l'un et l'autre cas, M. Orfila revendique pour lui ou pour d'autres (Fodera, Herring, Tiedmann, Gmelin et M. Magendie) la priorité de cette découverte, et voici la part qu'il nous fait. MM. Flandin et Danger ne peuvent revendiquer dans cette question autre chose que la nouvelle et inexacte signification donnée par eux au mot *localisation*, lequel, d'après sa véritable acception, n'est aucunement applicable au système qu'ils ont imaginé.

Nous espérons n'avoir rien imaginé, mais avoir constaté les faits suivants que nous avons crus nouveaux, et que nous avons présentés comme tels à l'Académie.

1° De quelque manière qu'on empoisonne un chien par l'antimoine, on ne retrouve plus le métal dans ses poumons, non plus que dans le cœur, le cerveau, les muscles et les os. L'empoisonnement eût-il été produit par les organes de la respiration au moyen du gaz hydrogène antimoniqué, c'est toujours spécifiquement dans le *foie*, la *rate*, les *reins* et les *urines* qu'on retrouve le poison,

2° Dans les cas d'empoisonnement par le cuivre, on ne retrouve ce métal ni dans le cœur et les poumons, ni dans le système nerveux, ni dans les muscles et les os, non plus que dans les reins et les urines. On le rencontre dans le *foie*, la *rate* et le *tube intestinal*,

3° Dans les cas d'empoisonnement par le plomb, on retrouve cet élément toxique dans le *foie*, la *rate*, les *reins*, l'*urine* et les *poumons*, mais non dans le cœur, ni dans les systèmes nerveux, musculaire et osseux. »

CHIMIE — *Note sur de nouveaux moyens de constater la nature des taches obtenues avec l'appareil de Marsh, par M. DURAND*

(Commission de l'arsenic)

CHIMIE APPLIQUÉE — *Sur les inconvénients auxquels expose l'emploi des substances vénéneuses dont on fait usage dans divers procédés d'embaumement, par M. LORRIS DU VAL*

(Commission de l'arsenic)

L'auteur de cette Note fait remarquer que, du moment où des substances vénéneuses seraient employées en grande proportion dans la conservation des cadavres, il deviendrait bien difficile que l'on continuât à apporter dans la fabrication de ces substances et dans leur débit, les précautions qui observent aujourd'hui et dont l'administration fait un devoir, il en résulterait nécessairement qu'on aurait à craindre à la fois les accidents causés par la malveillance et ceux dont la négligence serait l'unique cause. Une autre considération qui devrait faire bannir cette application des poisons minéraux, considération sur laquelle un journal judiciaire a déjà appelé l'attention, c'est que si de pareils procédés d'embaumement devenaient communs, ils pourraient offrir à des criminels un moyen d'échapper à la justice comment parviendrait-on en effet à constater un empoisonnement par

l'arsenic et, ensuite, sous prétexte d'embaumer le mort, on avait injecté dans ses veines ou introduit dans ses cavités splinchniques une solution arsenicale.

CHIRURGIE — *Memoire sur la valvule réelle de l'Orthopedie et spécialement de la Myotomie rachidienne dans le traitement des deviations laterales de l'épine, par M MALGAIGNI.*

(Commission précédemment nommée)

L'auteur dans ce Mémoire, s'est proposé de prouver que les succès qu'on avait annoncés comme obtenus au moyen de la myotomie musculaire n'ont pu être que passagers. Il rend compte de cet effet de l'état actuel des sujets qui ont été soumis à ce mode de traitement, à l'hôpital des Enfants malades depuis le 1^{er} août 1839 jusqu'au 1^{er} juillet 1843. Suivant lui de vingt quatre individus restés à Paris pas un seul n'a été complètement guéri, et six seulement ont éprouvé d'une manière durable des améliorations partielles.

PHYSIQUE — *Sur la chaleur produite par les combinaisons chimiques* (premier Mémoire par MM FAVRE et SILBERMANN

(Commissaires, MM Dumas, Pouillet, Regnault)

Les auteurs ont trouvé pour la chaleur dégagée par la combustion d'un gramme d'hydrogène, 34188 degrés nombre qui diffère peu de celui qui avait obtenu Dulong.

CHIMIE — *Note sur la fermentation acétique, par M BLONDEAU DE CAROLLES*

(Commissaires MM Dumas, Pelouze, Regnault)

L'auteur rend compte d'une expérience dans laquelle il a vu le sucre de canne se transformer immédiatement, sous l'influence du caséum en acide acétique, sans rien perdre et sans rien absorber.

ANALYSE MATHÉMATIQUE — *Sur la généralisation de certains theoremes de mécanique analytique données par Lagrange et Huyghens, par M BARRET*

Ce Mémoire, qui est destiné à faire suite à un précédent travail de l'auteur sur les « perturbations dans le mouvement des comètes dues à la résistance de l'éther, est renvoyé à l'examen de la Commission déjà nommée.

ZOOLOGIE — *Description d'une moule d'eau douce nouvelle ou décrite jusqu'à présent d'une manière imparfaite, par M JUDAS*

L'auteur pense que l'espèce qui a fait l'objet de son étude pourrait être rapportée à la moule polymorphe, mais dans ce cas la description de cette dernière serait inexacte en un point qu'il signale et ne ferait point mention d'un caractère important sur lequel il appelle l'attention

(Commissaires, MM de Blainville Al Brongniart Milne Edwards)

MÉCANIQUE APPLIQUÉE — *Description et figure d'une machine à draguer présentant des modifications nouvelles, par M COCHEAUX*

(Commissaires MM Poncellet Piobert Moine)

MÉCANIQUE APPLIQUÉE — *Supplément à un précédent Mémoire sur une pompe désignée sous le nom de pompe vannetaise, par MM DOLLET LEBOT et ROILLAT*

(Commission précédemment nommée)

MÉTÉOROLOGIE — *Mémoire sur l'hydrophtisie et le pian par M COURHAUT*

(Commissaires, MM Magendie Serres Vulpéau)

MM DONNE et FOUCAULT soumettent au jugement de l'Académie un appareil de leur invention destiné aux démonstrations microscopiques

(Commissaires MM Pouillet Dumas, Regnault)

CORRESPONDANCE

M le DIRECTEUR DE L'ADMINISTRATION DES DOUANES a lu le tarif officiel des douanes de France qui a été approuvé, le 22 mars dernier par **M le Ministre des Finances**

ANALYSE MATHÉMATIQUE — *Formule pour la résolution de l'équation auxiliaire de degré m , relative à l'équation $x^p = 1$, en supposant $p = m\alpha + 1$ et p premier, par M V-A LEBESGUE, professeur à la Faculté des Sciences de Bordeaux*

L'illustre auteur des *Recherches arithmétiques* a fait voir qu'en prenant

ω a ω les racines de l'équation

$$x^{p-1} + x^{p-2} + \dots + x + 1 = 0,$$

d'une manière convenable, on formait m sommes $\mathcal{Y}_0, \mathcal{Y}_1, \mathcal{Y}_2, \dots, \mathcal{Y}_{m-1}$, racines d'une équation de degré m , dont la résolution pouvait se déduire de celle d'une équation à deux termes

$$t^m = P + Q\sqrt{-1} \text{ (Recherches arithmétiques, n. 360)}$$

Dans le tome V des *Comptes rendus des séances de l'Académie des Sciences*, page 722, j'ai donné la formule de l'équation auxiliaire, savoir

$$p(\mathcal{Y}^m - \sigma_1 \mathcal{Y}^{m-1} + \sigma_2 \mathcal{Y}^{m-2} - \dots \pm \sigma_m) - (\mathcal{Y} - \omega)^n = 0,$$

j'aurais dû ajouter qu'en posant

$$\bar{\omega} = 1 + m\mathcal{Y},$$

l'équation auxiliaire prenant la forme suivante

$$p(x^1 - \epsilon_1 x^{m-1} + \epsilon_2 x^{m-2} - \dots \pm \epsilon_n) - (x - p)^1 = 0[*],$$

où ϵ représente le nombre de solutions d'une suite de congruences à t termes

$$\rho^a x^n + \rho^b \mathcal{Y}^m + \dots + \rho^k n^n \equiv 0 \pmod{p},$$

ρ étant une racine primitive de p , et $\rho^a, \rho^b, \rho^c, \dots, \rho^k$ des nombres différents pris dans la suite $\rho^0, \rho^1, \dots, \rho^{m-1}$

* Je vais donner ici la règle générale pour trouver l'équation

$$t^m = P + Q\sqrt{-1},$$

et par suite, les racines de l'équation auxiliaire, en fonction de nombres (a, b, \dots, g) , ce symbole représentant le nombre de solutions de la congruence

$$\rho^a x^m + \rho^b \mathcal{Y}^m + \dots + \rho^g u^n + \rho^k \equiv 0 \pmod{p},$$

[*] Ou bien encore

$$x^m - pB_1 x^{m-1} + pB_2 x^{m-2} - \dots \pm pB_m = 0,$$

B_1, B_2, \dots, B_m étant entiers

quand on prend pour x^n, y^m , u^m des résidus de $m^{\text{ième}}$ puissance plus petits que p et autres que zéro

Comme j'ai donné dans mes *Recherches sur les nombres*, des formules qui permettent la détermination des nombres (a, b, c) à celle des nombres (a, b, c) et comme j'ai montré que ceux-ci étaient déterminés par des congruences de forme $m^2 x \equiv k \pmod{p}$, j'ai donc ramené aux équations indéterminées du premier degré la résolution des équations auxiliaires

Une conséquence de cette théorie, c'est que pour les troisième et quatrième degrés on pourrait aussi employer les équations

$$4p = a^2 + 17b^2, \quad p = a^2 + 4b^2$$

Pour le cinquième degré (*Théorie des nombres*, tome II, troisième édition) la solution analogue exigeait l'emploi de deux équations indéterminées et serait beaucoup plus longue que celle qui emploie les congruences $m^2 x \equiv k \pmod{p}$. Il en est de même à plus forte raison, des degrés supérieurs et il n'y aurait plus d'unité dans le mode de solutions si pour ces degrés on suivait la marche de Legendre relativement aux troisième, quatrième et cinquième degrés.

Voici le moyen d'obtenir l'équation

$$t = P + Q\sqrt{-1}$$

Soit α une racine de l'équation $x^n = 1$, on la prendra primitive, c'est-à-dire telle que la suite $1, \alpha, \alpha^2, \dots, \alpha^{n-1}$ contienne toutes les racines de l'équation $x^n = 1$. On posera

$$t = [y_0 + \alpha^k y_1 + \alpha^{2k} y_2 + \dots + \alpha^{n-1k} y_{m-1}] = \sum_{i=0}^{m-1} \frac{1 \cdot 2 \cdot 3 \dots m}{a_i \times 1 \cdot 2 \cdot 3 \dots a_m} y_i y_1 y_2 \dots y_n \alpha^{k(a_i + 2a_2 + 3a_3 + \dots + m \cdot 1 a_m)}$$

(1) Cette équation, où l'on suppose

$$a_0 + a_1 + a_2 + \dots + a_{m-1} = m,$$

revient à

$$t = \frac{1}{m} \sum_{i=0}^{m-1} \frac{1 \cdot 2 \cdot 3 \dots m}{a_i \times 1 \cdot 2 \cdot 3 \dots a_m} (a_0, a_1, a_2, \dots, a_{m-1}) \alpha^{k(a_i + 2a_2 + 3a_3 + \dots + m \cdot 1 a_m)}$$

(2) Cela résulte de ce que si les nombres a, b, c, \dots, g sont en nombre 1 , on a

$$p(a, b, \dots, g) = \sigma^{t-1} + \left(\begin{matrix} \mathcal{Y}_a \mathcal{Y}_b & \mathcal{Y}_g + \mathcal{Y}_{a+} \mathcal{Y}_{b+} & \mathcal{Y}_{g+} + \\ & + \mathcal{Y}_{a+n} \mathcal{Y}_{b+} & \dots & \mathcal{Y}_{g+m-1} \end{matrix} \right) \\ = \sigma^{t-1} + \Sigma \mathcal{Y}_a \mathcal{Y}_b \dots \mathcal{Y}_g$$

On a simplifié la valeur de t_i^* en rassemblant les termes formant des périodes telles que $\Sigma \mathcal{Y}_a \mathcal{Y}_b \dots \mathcal{Y}_g$. Le nombre σ disparaît du résultat.

L'équation fondamentale qui donne

$$\Sigma \mathcal{Y}_a \mathcal{Y}_b \dots \mathcal{Y}_g = p(a, b, \dots, g) - \sigma^t$$

se déduit immédiatement de la multiplication au moyen d'un lemme très simple. On pourrait y arriver aussi, mais moins directement par d'autres moyens.

Ainsi la quantité $P + Q\sqrt{-1}$ se présente sous la forme $\varphi(\alpha^k)$ et il en résulte pour \mathcal{Y}_i ,

$$1 + m\mathcal{Y} = \alpha \sqrt{\varphi(\alpha)} + \alpha^2 \sqrt{\varphi(\alpha^2)} + \dots + \alpha^{n-1} \sqrt{\varphi(\alpha^{n-1})}$$

Comme il y a $m-1$ radicaux de forme $\sqrt{}$ il y a m^m valeurs on leve l'ambiguïté en se servant des produits $v_k = t_k(t_1)^{n-k}$ qui ne changent point par les permutations tournantes de $\mathcal{Y}_0, \mathcal{Y}_1, \mathcal{Y}_2, \dots, \mathcal{Y}_{n-1}$. On obtient la formule

$$1 + m\mathcal{Y} = \alpha t_1 + \alpha^2 \frac{v_1}{t_1^n} + \alpha^3 \frac{v_2}{t_1^t} + \dots + \alpha^{n-1} \frac{v_{n-1}}{t_1^t}$$

ou il n'y a plus qu'un seul radical $\sqrt{\varphi(\alpha)} = t_1$. A la détermination près du nombre t_0 ce calcul est entièrement celui de M. GOURSAT.

Cette solution sera développée dans un Mémoire que je ferai précéder d'une courte introduction où je résumerai d'une manière simplifiée les règles que j'ai données pour le calcul des nombres (a, b, \dots, g) , qui comme on le voit conduisent à la résolution générale de l'équation auxiliaire de degré m , qui se présente dans la théorie de l'équation $x^{m^2+1} = 1$. Je développerai les formules pour les cas de $m = 2, 3, 4, 5$. Ces exemples dissiperont l'obscurité que peut encore présenter l'expression générale de t_i^* .

M. DUMAS présente, au nom de M. MALAPERT, professeur à l'École préparatoire de Médecine de Poitiers, des cristaux de sulfate de magnésie et de sulfate de soude, qui offrent des particularités dignes d'attention.

1° Des cristaux de sulfate de magnésie obtenus à l'aide d'une dissolution marquant 36 à 37 degrés de l'aréomètre de Baume et cristallisant à l'air libre dans une capsule ouverte. Ces cristaux sont en lamelles qui simulent des rhomboèdres.

2° Des cristaux de sulfate de magnésie obtenus avec une dissolution marquant 36 à 37 degrés de l'aréomètre, et cristallisant dans des flacons fermés. Ces cristaux sont des prismes longs, optiques et coulés remarquables par leur opacité et leurs inflexions, ils sont formés de cristaux courts et de lamelles qui s'y joignent sous des angles plus ou moins aigus.

3° Des cristaux de sulfate de soude opaques obtenus dans une circonstance très-curieuse. Ils sont formés en effet dans le vide, et alors ils étaient transparents; mais en rendant l'air ces cristaux deviennent subitement opaques. M. Mulipert attribue ce phénomène à une modification que ces cristaux éprouvent sous l'influence de la chaleur développée au moment où l'air qui rentre presse sur le liquide. Cependant il se pourrait que le choc de l'air rentrant déterminât les ruptures qui ont amené cette opacité du cristal.

Quoi qu'il en soit je me suis assuré, par des expériences déjà faites par M. Mulipert, mais qu'il m'avait pu de répéter, que le sulfate de magnésie opaque contient exactement autant d'eau que le sulfate transparent ordinaire; il n'est donc, d'après M. Mulipert, du sulfate de soude opaque.

CHIMIE. — Sur l'albumine soluble, par M. ADOLPHE WURZ.

L'albumine animale se rencontre presque toujours dans des liquides et dans des charges en outre de différents sels. On a pensé qu'elle ne devait sa solubilité dans l'eau qu'à la présence de ces matériaux inorganiques. Telle est l'opinion émise par M. Scheerer (1). Toutefois les expériences sur lesquelles cette opinion est fondée ne sont pas à l'abri de toute objection (2) et les conclusions qu'on en a tirées se trouvent complètement infirmées par les faits que je vais exposer dans le courant de ce travail. Il m'a été en effet très-aisé de séparer l'albumine des principes étrangers qui l'accompagnent sans altérer sa solubilité dans l'eau. Voici le procédé que j'emploie pour préparer de l'albumine pure.

Un blanc d'œuf délayé dans deux fois son volume d'eau est passé à travers un linge pour déchirer les cellules. Dans la liqueur filtrée on verse un

(1) *Ann. de Chimie et Pharm.* tome XI, p. 1.

(2) *Beitzehus Jahresber.* 1842, p. 543.

peu de sous-acetate de plomb, qui y détermine un abondant précipité. Il faut éviter d'ajouter un excès de sel plombique car le précipité s'y dissoudrait. Le lavage étant opéré, on délave la masse dans l'eau de manière à en faire une bouillie, et l'on y fait passer un courant d'acide carbonique.

La liqueur, d'abord épaisse ne tarde pas à perdre sa consistance au même temps qu'il se forme une mousse abondante. L'albuminate de plomb est décomposé par l'acide carbonique; il se forme du carbonate de plomb qui reste en suspension, et l'albumine devenue libre, se dissout dans l'eau. On filtre sur du papier lavé à l'acide pour séparer un dépôt albumineux sur lequel je reviendrai plus tard. L'albumine qui a passé à travers le filtre n'est pas encore pure; elle contient des traces d'oxyde de plomb; on y verse quelques gouttes d'hydrogène sulfure. La liqueur brunit, mais reste transparente, car le sulfure de plomb ne se précipite pas. Pour le séparer on chauffe avec précaution à une température de 60 degrés jusqu'à ce que la liqueur devienne trouble; les premiers flocons d'albumine entraînent tout le sulfure de plomb en se précipitant. La liqueur devenue incolore après une nouvelle filtration est évaporée dans de larges capsules à une température de 45 degrés. Le résidu constitue l'albumine soluble et étêt de piment.

La solution d'albumine dans l'eau pure et l'albumine coagulée présentent une faible réaction acide. Si l'on met de l'albumine coagulée en digestion à une douce chaleur, avec du carbonate ou du bicarbonate de soude elle se combine à de la soude en déplaçant l'acide carbonique. En effet si au bout de quelque temps on recueille la matière sur un filtre, et qu'on la soumette à des lavages longtemps prolongés, on la trouve complètement neutre sur papier de tournesol; mais, à l'incinération, elle laisse un résidu fortement alcalin.

M. Hirschauer a également constaté cette réaction acide sur l'albumine précipitée par l'acide sulfurique et purifiée par de longs lavages.

D'un autre côté, MM. Jones et Rochleder ont prouvé que la caséine et la légumine parfaitement pures rougissaient faiblement la teinture de tournesol.

Si l'on chauffe une solution d'albumine pure à 59° 5, elle commence à devenir trouble; de 61 à 63 degrés, il se forme des flocons dans la liqueur, et à une température un peu supérieure le tout se prend en masse. On le voit la solution d'albumine pure se comporte exactement comme le blanc d'œuf.

J'ai mis le plus grand soin à vérifier et à indiquer toutes ces propriétés de l'albumine pure dans le but de constater son identité avec la matière

qui existe dans le blanc d'œuf. Il me reste à indiquer les résultats que m'ont donnés les analyses de plusieurs échantillons d'albumine pure.

On tire de ces nombres, pour la composition de l'albumine soluble

	II	III
Carbone	52,88	52,70
Hydrogène	7,19	7,06
Azote	15,55	15,55
Oxygène etc	24,38	24,69
	100,00	100,00

Pour l'albumine insoluble, nous avons

	B	D
	Échantillon traité par l'éther	
Carbone	52,92	52,87
Hydrogène	7,15	7,23
Azote	15,65	
Oxygène etc	24,28	
	100,00	

On voit que la composition de l'albumine purifiée par le procédé qui a été décrit plus haut est constante. Les analyses s'accordent du reste avec celles qui ont été publiées par MM. Dumas et Cahours.

J'ai également essayé de purifier l'albumine du sérum, mais le précipité qui forme le sous-réactif de plomb dans le sérum du sang n'est que très incomplètement décomposé par l'acide carbonique, et ne fournit que des liqueurs albumineux extrêmement peu chargés. J'ai dû renoncer, par conséquent, à ce procédé de purification.

CHIMIE — Sur l'hydride de cuivre par M. ADOLPHE WURTZ (Extrait)

En examinant l'action de l'acide hypophosphoreux sur les sels de cuivre, j'ai reconnu, dans certaines circonstances, la formation d'un hydride de cuivre qui possède tous les caractères d'un composé défini. On peut préparer ce corps de la manière suivante :

On fait dissoudre 1 partie d'hypophosphite de baryte dans l'eau et l'on en précipite complètement la baryte par l'acide sulfurique, on ajoute à la liqueur filtrée 0,8 de sulfate de cuivre en solution concentrée. Le mélange est chauffé doucement à une température qui ne doit pas dépasser 70 degrés. La liqueur prend une teinte verte, puis il se forme un précipité d'abord jaune, mais qui se fonce de plus en plus, jusqu'à présenter la couleur du

kermes A ce point de l'opération, on remarque souvent un degagement de petites bulles d'hydrogene il faut alors refroidir brusquement le ballon On filtre la liqueur refroidie et on lave le dépôt avec de l'eau privée d'air et dans une atmosphere d'acide carbonique Il ne reste plus qu'à sécher la matiere en comprimant le filtre entre des feuilles de papier joseph

L'hydrure de cuivre sec s'enflamme dans le chlore avec production de vapeurs epaisses qui se condensent en flocons de chlorure cuivreux On observe également cette incandescence en le projetant dans le brome

L'acide chlorhydrique exerce sur l'hydrure de cuivre une action tres-remarquable Avec un acide concentré il se produit meme a froid une vive effervescence d'hydrogene et il se forme du chlorure cuivreux Si l'on n'a pas employe un trop grand excès d'acide, ce sel cristallise en partie en petites paillettes qu'on distingue facilement au milieu d'un faible résidu de cuivre Par l'addition d'un peu d'eau la liqueur devient laiteuse Elle presente d'ailleurs tous les caracteres des sels cuivreux D'apres cela il est évident que l'hydrure de cuivre et l'acide chlorhydrique sont l'un et l'autre décomposés J'ai constaté ce fait par des expériences directes, en décomposant l'hydrure de cuivre d'une part par la chaleur seule et de l'autre par l'acide chlorhydrique Dans le second cas, j'ai obtenu pour une quantité égale de matiere sensiblement un volume double de gaz hydrogene On sait que l'acide chlorhydrique n'attaque le cuivre qu'avec une extreme difficulté et la presence de l'hydrogene loin de favoriser la réaction devrait d'apres les lois de l'affinité y ajouter un nouvel obstacle La decomposition de l'hydrure de cuivre par l'acide chlorhydrique paraît donc s'effectuer en vertu d'une action de contact

Dans quatre analyses faites sur des échantillons différents j'ai obtenu les nombres suivants

	I	II	III	IV
Cuivre	98 780	98 785	98 779	98 771
Hydrogene	1 220	1,215	1,221	1 229
	100 000	100,000	100 000	100,000

	Calcul	
	C ^u H	Cu ^u H ⁱ
Cuivre	98,446	98,830
Hydrogene (*)	1,554	1,170
	100,000	100,000

(*) H = 12 5

En prenant pour base les analyses précédentes on trouve que, dans l'hydrure de cuivre le cuivre est combiné à environ 1200 fois son volume d'hydrogène

(CHIMIE) — *Sur la transformation de la fibrine en acide butyrique*
par M. Ad. WURTZ

Si l'on abandonne la fibrine à l'air pendant les chaleurs de l'été elle se liquéfie complètement au bout de huit jours. Le liquide répand une odeur de fromage pourri et se coagule par la chaleur. Cette dernière propriété est due à l'albumine qu'elle contient et qu'on peut isoler facilement en précipitant la liqueur étendue d'eau et filtrée par le sous-acétate de plomb lavant le dépôt et le décomposant par un courant d'acide carbonique. On obtient ainsi une dissolution coagulable par la chaleur qui présente tous les caractères de l'albumine. Les autres produits de cette putréfaction sont l'acide carbonique, l'acide acétique, l'acide butyrique et l'ammoniaque.

Pour isoler l'acide butyrique j'ai étendu le liquide provenant de la putréfaction de la fibrine de deux fois son volume d'eau. J'ai chauffé la liqueur et j'y ai ajouté de l'acide sulfurique en léger excès. L'albumine précipitée a été séparée par le filtre et la liqueur claire a été distillée jusqu'à la moitié de son volume. Le produit de la distillation rougissait fortement la teinture de tournesol, je l'ai neutralisée par le carbonate de plomb et j'ai évaporé la solution. À un certain degré de concentration de la liqueur il s'en est séparé du butyrate de plomb sous forme d'une huile épaisse qui s'est prise en une masse molle et visqueuse par le refroidissement de la liqueur. Celle-ci a été filtrée, évaporée à siccité puis redissoute dans l'alcool. La solution alcoolique ayant été mélangée avec de l'eau s'est troublée et a laissé déposer une nouvelle quantité de butyrate de plomb présentant les caractères que je viens d'indiquer. Ce sel a été redissous dans l'alcool faible et décomposé par une quantité suffisante de potasse caustique. Le liquide filtré a été évaporé près de la siccité puis traité par l'acide phosphorique concentré qui a séparé de la liqueur une couche huileuse qu'on a enlevée pour la soumettre à la distillation. Le point d'ébullition de l'acide s'est élevé rapidement de 130 jusqu'au delà de 160 degrés et le produit de la distillation, tout à fait incolore, présentait tous les caractères de l'acide butyrique.

La putréfaction n'est pas la seule voie par laquelle la fibrine se transforme en un corps gras volatil. J'ai observé qu'en chauffant au bain d'huile aux températures de 160 à 180 degrés, de la fibrine pure avec de la chaux

(705)

potassée il se forme une petite quantité d'un acide gras volatil qui reste en combinaison avec la potasse tandis qu'il se dégage de l'ammoniaque et d'autres produits volatils. Il est facile d'extraire l'acide gras volatil du résidu, en dissolvant celui-ci dans l'eau, sursaturant par l'acide phosphorique et soumettant la liqueur à la distillation. Le produit distillé est neutralisé par un alcali évapore et le résidu est traité par l'acide phosphorique sucré qui en sépare une couche huileuse facile à reconnaître pour un acide gras volatil. Cet acide présente les propriétés de l'acide butyrique, toutefois je n'ai pas encore constaté par l'analyse son identité avec ce dernier acide.

CHIMIE — *Recherches sur l'huile essentielle de sassafras*, par
M. SAINT-ÉVRE

« L'huile du commerce, extraite du bois du *Laurus sassafras*, se présente sous la forme d'un liquide légèrement coloré en jaune, d'une saveur âcre et d'une odeur qui rappelle celle du fenouil. Sa densité est de 1,09 à la température de 10 degrés. Soumise à la distillation, elle commence à dégager des vapeurs vers 115 degrés centigrades. Le point d'ébullition s'élève ensuite rapidement à 228 degrés centigrades, où il reste stationnaire jusqu'à ce que la majeure partie du liquide ait disparu.

Cette huile ainsi préparée, soumise à l'analyse élémentaire, a donné les résultats suivants :

C	54	72,0
H	5	6,6
O	16	21,4
	<hr/> 75	<hr/> 100,0

Mais comme en faisant agir le brome sur l'essence on obtient un produit cristallisé, et que l'analyse de ce produit préparé avec la même huile présentait de grandes discordances dans la détermination des éléments constituants, il devenait probable qu'on opérait sur un mélange de deux huiles, et par suite nécessaire de les séparer, d'ailleurs en faisant passer dans l'essence distillée un courant de gaz ammoniac pur et sec, on obtient un liquide exempt d'azote, susceptible de cristalliser, par le froid et l'évaporation spontanée en prismes assez volumineux. L'analyse de ces derniers cristaux donne les résultats suivants :

C	73,03	73,30
H	6,15	6,22
O	20,82	20,48
Al	0,00	0,00
	<hr/> 100,00	<hr/> 100,00

En voyant le charbon s'élever de cette manière et l'absence de l'azote, j'ai cru devoir soumettre l'huile à un froid plus intense en la plaçant dans un mélange formé de 12 parties de glace, 5 de sel marin et 5 de nitrate d'ammoniaque. On la voit d'abord s'opacifier, et en l'abandonnant à elle-même dans le mélange réfrigérant, on trouve, au bout de cinq ou six heures, le vase qui la renferme tapissé de cristaux volumineux n'occupant pas moins de $\frac{1}{2}$ centimètre cube de volume et d'une blancheur parfaite, on les comprime rapidement entre des doubles de papier buvard, on les fait fondre et cristalliser une seconde fois par le même moyen et le produit est alors prêt pour l'analyse.

Ces cristaux, analysés avec le plus grand soin, ont donné les résultats suivants

C ^u	60	74,07
H ^u	5	6,17
O ^u	16	19,76
	<hr/> 81	<hr/> 100,00

Action du brome

En versant avec les précautions ordinaires une quantité convenable de brome sur l'essence de sassafras, on a une réaction assez violente, il se dégage d'abondantes vapeurs d'acide hydriobromique, et au moment où elles cessent l'huile se solidifie tout à coup et se prend en une masse cristalline.

Ces cristaux correspondent à la formule de substitution $C^{80}_{Br^1}O^3$, qui donne

C ^u	60	15,42
H ^u	1	0,25
Br ^u	312	80,20
O	16	4,13
	<hr/> 389	<hr/> 100,00

MÉDECINE — *Aperçu théorique sur la cause de la maladie désignée sous le nom de diabète ou de glucosurie, par M L MIALHE*

* Il résulte de mes recherches que toutes les substances alimentaires hydrocarbonées, telles que le sucre de raisin, la gomme d'amidon ou dextrine, etc., ne peuvent éprouver le phénomène de l'assimilation qu'après avoir été transformées par les alcalis du sang en de nouveaux produits au nombre desquels figure un corps doué d'un pouvoir desoxygénant très-énergique, et tel, qu'il réduit aisément le peroxyde de plomb en protoxyde. Les sels de peroxyde de fer en sels de protoxyde, les sels de bioxyde de cuivre en sels de protoxyde, et même en cuivre métallique, etc.

De ce qui précède découle une conséquence forcée, c'est que les sujets chez qui la décomposition chimique précitée a lieu lors de l'ingestion des matières sucrées ou amilacées dans l'économie, ne sauraient avoir du sucre dans leurs excréments rennales. Or c'est la l'état normal de l'homme tandis que, chez le diabétique, cette importante décomposition ne saurait avoir lieu.

Le régime purement animal, usité comme agent curatif de l'affection diabétique, ne constitue qu'un traitement purement palliatif, et ce n'est que par l'emploi simultané des sudorifiques et des préparations alcalines bien entendues qu'il est permis d'espérer pouvoir arriver à maîtriser la cause première du mal.

A l'occasion de la communication précédente, M PELOUZE fut remarqué que MM Bernard et Barreswil ont observé que le sucre injecté dans le sang, passe, sans modification, dans les urines tandis qu'on ne le retrouve plus lorsqu'il a été dissous préalablement dans le suc gastrique.

Cette double observation a été consignée dans la Thèse de doctorat de M Bernard (7 décembre 1843)

ÉCONOMIE RURALE — *Sur l'introduction en France de la culture du Polygonum tinctorium* (Extrait d'une lettre de M DELILE à M Boussingault)

La prétention de M Jaume Saint-Hilaire d'avoir introduit en France la culture du *Polygonum tinctorium* est plus que hasardee, elle est inexacte et au moins très-exagérée.

Les premières graines de *Polygonum* distribuées en France ont été reçues de M Fischer, directeur du Jardin botanique impérial de Saint-Petersbourg, et sont parvenues, au Jardin de Montpellier comme au Jardin des

Plantes de Paris en 1835. Je fus favorisé par le climat, et l'année suivante je pus envoyer au Jardin des Plantes de Paris, par l'entremise duquel j'avais reçu les graines de M. Fischer, *des graines récoltées ici*, tandis qu'elles *avaient accidentellement manqué* à Paris. J'en envoyai également à M. Vilmoren. Voilà l'histoire de l'introduction du *Polygonum* telle que j'ai eu l'occasion de la rappeler comme fait à l'appui de l'utilité des jardins botaniques réclamant pour le jardin que je dirige depuis vingt-trois ans, ce qui lui appartient, la multiplication, le succès de cette culture ainsi que de plusieurs autres.

M. Jaume Saint-Hilaire dit qu'il a tenté, avant moi, d'introduire en France la culture du *Polygonum tinctorium* qu'il établit, donc la preuve que la plante a été cultivée par lui avant l'époque à laquelle je l'ai obtenue moi-même des graines dues à la bienveillance de M. Fischer! A-t-il seulement l'intention d'avoir le premier crédit? rappelle sur cette plante l'attention des agronomes français il lui restera à prouver qu'il a devancé à cet égard, M. Desfontaines qui, de l'époque où l'herbier de Loureiro arriva de Lisbonne exprima et fit partager à plusieurs botanistes, parmi lesquels je puis me compter le desir de voir cet utile végétal se propager en France.

Quant à la question de grande culture, je dus qu'à Montpellier, MM. Chapelier et Loly ont trouvé la plante assez abondamment pour en avoir fait la matière des travaux qu'ils ont publiés, et M. Vilmoren a une des premières parts, in disputable, à sa grande culture du *Polygonum* des légumes qui en établissent la vogue puis un grand nombre de amateurs se sont approvisionnés de graines chez lui.

ELECTRO-CHIMIE — Application des métaux sur les métaux

M. Levol rappelle les résultats des expériences qu'il a faites sur ce sujet il y a plusieurs années, résultats qui se trouvent exposés dans un Mémoire publié en 1837 (*Annales de Chimie et de Physique*, 2^e série, t. LXV, p. 285). Il revendique, pour plusieurs de ces faits, la priorité sur M. Becquerel.

Voici dit M. Levol, comment je m'expliquais, dans ce Mémoire, relativement à l'application de l'antimoine sur le cuivre. L'antimoine peut être précipité sur le cuivre en contact avec l'étain et il s'y applique, *non comme sur ce métal, sous forme d'une poussière noire qu'un léger frottement peut enlever, mais avec tout son éclat métallique, et il y reste adhérent comme un étamage*.

Relativement à l'étamage, c'est encore la même chose (Voir page 3 de ma Note).

Enfin, pour le *dépôt de cuivre sur des métaux peu oxydables*, j'avais donné également le moyen de l'obtenir, et d'une manière plus simple encore qu'on ne la propose depuis .

A la suite de cette communication, M **BEQUEREL** annonce pour la prochaine séance une réponse qu'il fera après avoir pris connaissance du Mémoire cité par M **Levol**.

CHIRURGIE — *Nouvelle communication relative à une opération de laryngotomie pratiquée dans un cas de polype du larynx, par M **EHRMANN***

La personne qui a été le sujet de notre première communication dit M **Ehrmann**, est aujourd'hui complètement guérie, et sans qu'aucun accident soit survenu pendant le temps nécessaire à la réunion des organes divisés. Depuis le vingt-et-unième jour de l'opération il ne passe plus d'air par l'ouverture faite au canal trachéal et aujourd'hui, 16 avril, la plaie des teguments est entièrement cicatrisée. Il est évident qu'il ne laisse rien à désirer et tout annonce le retour à une santé parfaite.

M **Roux** fait quelques remarques à propos du fait dont il est donné connaissance à l'Académie par M **Ehrmann** de Strasbourg.

Il ne retracte pas, dit-il, les courts éloges que j'ai donnés au cas dont il s'agit lors de la première communication qui nous en a été faite. Je me plains au contraire, à en ajouter de nouveaux aujourd'hui. M **Ehrmann** peut justement se féliciter lui-même et l'Académie peut le féliciter aussi du beau succès qu'il a obtenu et en mon particulier je suis fort desirieux de connaître tous les détails de ce cas dans lequel il a eu la lourde hardiesse d'aller à la recherche d'une végétation polypeuse développée dans l'intérieur du larynx, en pratiquant l'ouverture des voies aériennes et d'enlever cette tumeur qui mettait obstacle à la respiration, je le suis surtout de savoir sur quels phénomènes M **Ehrmann** a pu asseoir un diagnostic tant soit peu positif chose fort difficile en pareille circonstance. Si je ne me trompe pas, c'est la première fois que la laryngotomie a été pratiquée comme moyen de faire l'excision d'un polype des voies aériennes, et il est heureux que le succès ait couronné l'entreprise. Ce n'est pas que ce cas n'ait été prévu et ce n'est pas qu'on n'ait déjà indiqué les polypes parmi les affections du larynx qui peuvent exiger la laryngotomie ou la trachéotomie, et dans lesquelles l'ouverture des voies aériennes peut être indiquée pour éloigner une cause de suffocation toujours menaçante, mais on a presque toujours été arrêté, jusqu'à présent par

les difficultés du diagnostic, et par la crainte d'entreprendre une opération qui pourrait être inutile. Heureusement, autant les productions polypeuses sont communes dans certaines cavités pourvues intérieurement, comme le larynx l'anneau muqueux et où heureusement aussi elles sont attrapables avec facilité, autant elles sont rares dans les voies aériennes. Probablement d'autres exemples ont été recueillis, et font partie de la grande collection de faits qu'enregistre chaque jour l'Anatomie pathologique, mais ceux qui sont le mieux connus, ceux que la Chirurgie invoque le plus habituellement, et avec le plus de confiance, sont les trois cas qui ont été laissés par Desault. L'un de ces trois cas lui avait été communiqué par un de ses amis, les deux autres lui étaient particuliers, et, si ma mémoire me sert bien en ce moment, dans l'un des deux la tumeur polypeuse du larynx avait été trouvée par hasard sur un cadavre, et dans l'autre, où l'on avait soupçonné pendant la vie la cause d'une suffocation sans cesse renaissante, où qui se reproduit bien souvent, aucune opération ne fut pratiquée, ce fut après la mort, qui eut lieu dans un accès de dyspnée, et par une sorte d'apoplexie que l'affection du larynx fut constatée.

MUSIQUE. — Sur les anneaux colorés produits dans un solide transparent limité par une surface plane combinée avec une surface courbe, par
M. A. MATTHIESSEN

M. Matthiessen, d'Altona, en étudiant l'effet de ses chambres claires présentées à l'Académie le 10 mai 1843, a remarqué qu'en regardant, à la distance de la vue distincte, par la surface qui ne transmet aucune image on aperçoit une série d'anneaux à centre noir, comme les anneaux ordinaires vus par réflexion. Il met sous les yeux de l'Académie plusieurs prismes de ses chambres claires, qui tous présentent le même phénomène.

Les deux surfaces qui produisent l'effet en question sont, dans un des prismes soumis à l'Académie, 1° une base courbe, travaillée sur une sphère de 18 millimètres de rayon, et 2° une face plane très-oblique à la face courbe, et qui, dans le profil transversal du prisme fait avec la tangente à l'arc au point d'intersection, un angle de 80 degrés. On regarde à la distance de la vue distincte par la face plane oblique à la face sphérique. La lumière entre par la face plane et, après s'être réfléchi sur la face sphérique, elle revient à l'œil en traversant de nouveau la face plane. Les anneaux colorés apparaissent alors sur la surface sphérique.

M GAROT, qui avait adressé, en 1842, une Note sur des *essieux de sûreté* destinés aux voitures employées sur les chemins de fer, prie l'Académie de hâter le travail de la Commission chargée de l'examen de cette Note

(Renvoi à la Commission des chemins de fer)

M LOBELL prie l'Académie de vouloir bien se faire rendre compte d'un opuscule qu'il lui adressera prochainement, et qui contient l'exposé de ses idées sur une nouvelle *Cosmogonie basée uniquement sur l'attraction*. Si, comme les expressions de l'auteur semblent l'indiquer, ce travail est imprimé, l'Académie ne pourra, d'après ses réglemens, le renvoyer à l'examen d'une Commission

M JAFFARD adresse, en date des 12 mars et 3 avril, deux Lettres sur le *système du monde*

M LIOUVILLE est prié de prendre connaissance de ces Lettres et de faire savoir à l'Académie si elles sont de nature à devenir l'objet d'un Rapport

L'Académie accepte le dépôt de *deux paquets cachetés* présentés, l'un par M CHEVALLIER, l'autre par M LECOQ.

La séance est levée à 5 heures et demie

F

ERRATA.

(Séance du 1^{er} avril 1844)

Page 564, ligne 8, au lieu de de l'anomalie excentrique, lisez de l'excentricité tri-gonométrique qui a pour argument l'anomalie excentrique.

Ibid, ligne 9, au lieu de même de, lisez même

(Séance du 8 avril)

Page 630, ligne 5, au lieu de $\frac{b}{1-a^2}$, lisez $\frac{b}{1+a^2}$

Page 633, ligne 5, au lieu de $cd + bc$, lisez $ab + bc$

Ibid, ligne 11, au lieu de λ^2 , lisez $3\lambda^2$

Page 635, lignes 17 et 25, au lieu de r^2 , lisez r^3

Page 636, ligne 2, au lieu de $\frac{b}{1+a^2}$, lisez $\frac{b}{1+a}$

Ibid, ligne 16, au lieu de b , lisez b

Ibid, ligne 17, au lieu de $\frac{a}{r'} + \frac{r'}{a}$, lisez $\frac{a}{r'} + \frac{r}{a}$

Page 641, ligne 13, au lieu de un certain facteur, lisez une certaine fonction

Ibid, ligne 14, au lieu de continu, lisez continue

BULLETIN BIBLIOGRAPHIQUE

L'Académie a reçu, dans cette séance, les ouvrages dont voici les titres

Comptes rendus hebdomadaires des séances de l'Académie royale des Sciences
1^{er} semestre 1844, n° 15, in-4°

Annales des Sciences naturelles, mars 1844, in-8°

Traité des Maladies chirurgicales et des opérations qui leur conviennent, par
M. le baron P. BOYER, tome 1^{er}, in-8° (Offert par le fils de l'auteur)

Traité complet de l'Hypochondrie, par M. BRACHET, 1 vol in-8°

Dysenteries coliques noirâtres ou peu connues, par M. J. MACQUART, tome II
III^e partie in-8°

Types de chaque famille et des principaux genres des Plantes croissant spontanément en France, par M. PLEU, 6^e livr., in-4°

Considérations anatomico-physiologiques et historiques sur le Cœur du Chili
par M. ACKERMANN, broch. in-4°

De la localisation des Poissons — Note adressée à l'Académie des Sciences
le 8 avril 1844, par MM. DANGEUR et FIANDIN, en réponse à un article de
M. ORULLA (Extrait de la Revue scientifique et industrielle) in-8°

Note sur le Traitement ammoniacal des Phthysies, Asthmes, Catarrhes etc par
M. A. GRIMAUD, d'Angers, $\frac{1}{2}$ de feuille in-8°

La Comptabilité est une science exacte, par M. COFFY, broch. in-8°

Journal d'Agriculture pratique et de Jardinage, avril 1844, in-8°

Journal de la Société de Médecine pratique de Montpellier, avril 1844,
in-8°

Journal des Usines, mars 1844, in-8°

Revue zoologique, 1844, n° 3, in-8°

De la Ténonomie appliquée au traitement des Luxations et des Fractures, par
M. DE LA VACHERIE Bruxelles, 1843, in-8°

Mémoire et observations sur quelques Maladies des Os maxillaires, par le
même, in-8°

De la Gangrène de la bouche avec nécrose des Os maxillaires, par le même,
in-8°

*Bulletin de la classe des Sciences historiques, philologiques et politiques de
l'Académie impériale des Sciences de Saint-Petersbourg*, tome I, nos 1 à 19,
in-4°

Bulletin de la classe physico-mathématique de l'Académie impériale des Sciences de Saint Pétersbourg, tome II, n^{os} 1 à 19, in-4°

Compte rendu de l'Académie impériale des Sciences de Saint-Pétersbourg pour l'année 1842, par M. FUS, broch. in-8°

Astronomische Nouvelles astronomiques de M. SCHUMACKER n^o 500 in-4°

Beicht über Rapport sur les travaux de la Société des Naturalistes de Bale d'août 1840 à juillet 1842 Bale, 1843, tome V du *Recueil*, in-8°

Über die Sur la théorie des Glaciers, par M. P. MERRIAN (Extrait du précédent ouvrage) in-8

Annalen Annales de Meteorologie et de Magnétisme terrestre publiées par M. LAMONT année 1843 6^e et 7^e numéros Munich, 1843 in-8°

L'Abeille médicale, n^o 4, in-8°

Gazette médicale de Paris, n^o 15

Gazette des Hôpitaux, n^{os} 42 à 44

L'Echo du Monde savant n^{os} 28 et 29



COMPTE RENDU

DES SÉANCES

DE L'ACADEMIE DES SCIENCES.

SÉANCE DU LUNDI 22 AVRIL 1844

PRÉSIDENCE DE M. ÉLIE DE BEAUMONT

MEMOIRES ET COMMUNICATIONS

DES MEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE L'ACADÉMIE

ÉLECTRO-CHIMIE — *Note de M. BECQUEREL relative à la réclamation faite par M. Levol dans la séance précédente*

Dans la séance de lundi dernier, M. Levol a adressé à l'Académie une Lettre dans laquelle il revendique la priorité pour la découverte des principaux faits exposés dans mon Mémoire sur la précipitation avec adhérence des métaux par d'autres métaux, en se plaignant en même temps, avec assez d'amertume de ce que je n'avais pas mentionné son travail dans l'historique. Si M. Levol eût pris la peine de lire attentivement mon Mémoire et de consulter les travaux de Wollaston, il eût vu la différence existant entre mes expériences et les siennes, et ne m'eût pas adressé des reproches aussi peu fondés.

Pour le prouver, je vais rappeler succinctement les faits observés par lui, et les mettre en parallèle avec ceux consignés dans mon Mémoire. Il sera facile, par ce moyen, d'en faire la comparaison et d'en tirer telle induction qu'on jugera convenable. Dans les *Annales de Chimie et de Physique*, tome LXV, page 285, se trouve une Note de M. Levol ayant pour titre *Observations sur les*

phenomenes qui accompagnent la precipitation d'un metal a l'etat metallique par un autre, en presence d'un troisieme metal n'exerçant pas d'action chimique etc. Voici les principaux faits indiqués dans cette Note. Si l'on pré-

cipite dans un vase de platine une dissolution cuivreuse par du fer, de manière à éviter tout contact entre le platine et le fer, la reduction du cuivre s'effectue sur ce dernier metal absolument comme dans les vases non metalliques mais si au lieu d'opérer ainsi, on met en contact, ne fût-ce qu'en un seul point, le platine et le fer, le cuivre redut se partage alors sur ces deux metaux, de telle sorte que toute la surface de platine en contact avec la dissolution cuivreuse se trouve parfaitement cuivrée, surtout si la liqueur a été acidulée. Memes effets avec les dissolutions d'or.

L'intimoinc peut être precipité sur le cuivre en contact avec le tain et il s'y applique, non comme sur le metal sous forme d'une poussière noire qu'un léger frottement peut enlever mais avec tout son éclat metallique et il y reste adhérent comme un mélange.

Je n'ai point essayé d'autres métaux, mais il est à croire que plusieurs donneront lieu à des réactions analogues, je me suis seulement assuré que parmi les sels metalliques inreductibles par voie humide, dans les circonstances ordinaires ceux de cobalt et de nickel, mis en contact avec le platine et le fer, ne se reduisent pas non plus dans cette nouvelle circonstance.

La position du fer pendant la precipitation, toutes choses égales d'ailleurs, n'est nullement indifférente relativement à la repartition du cuivre. En variant de diverses manieres les expériences, j'avais remarqué que les résultats, concordants lorsque j'y plongeais le fer horizontalement cessaient de l'être lorsque, faisant l'expérience double, j'avais placé dans l'une le fer horizontalement et verticalement, ou à peu près, dans l'autre. Dans le premier cas j'avais constamment plus de cuivre sur le platine moins de fer dissous, et du retard dans la precipitation complete. Je pensai que ces variations pouvaient résulter de l'aimantation acquise par le fer placé verticalement, et pour chercher si, en effet, elle avait quelque influence sur la decomposition du sel, je plongeai, dans cette position un barreau de fer doux dans un tube de verre contenant une dissolution de sulfate de cuivre neutre, et je le bouchai, aucun degagement de gaz ne venant alors agiter la liqueur, je vis que la decomposition commençait vers les deux extrémités du barreau, en avançant progressivement jusque vers sa partie moyenne, les deux extrémités et cette partie agissaient d'ailleurs, sur une aiguille aimantée comme les deux pôles et la ligne neutre d'un

aimant, et les pôles changeaient par le renversement à la manière ordinaire. L'effet de cette aimantation parut donc être d'augmenter l'énergie de l'action chimique et, par conséquent de diminuer la proportion du cuivre déposé sur la platine.

J'ai rapporté textuellement les principaux passages de la Note de M. Iévol afin que la question étant posée nettement on pût suivre plus facilement la discussion à laquelle je vais me livrer.

M. Iévol commence par dire qu'il ne pense pas qu'il soit inutile de faire mention de ce qui se passe quand on plonge dans une dissolution métallique un métal étranger à celui qu'elle renferme en présence d'un troisième métal en contact avec lui et ne pouvant exercer par lui-même aucune action chimique sur la dissolution. Elle est la base de son argumentation pour réclamer la priorité des faits consignés dans mon *Mémoire*. Or cette base n'a pas été trouvée par lui elle est dans le domaine public depuis longtemps. L'étamage des « pingles » de l'uton qui exige le contact d'un morceau d'étain pour s'effectuer en est un exemple frappant : ne sait-on pas aussi qu'en touchant avec un fil d'argent une lame de zinc plongeant dans de l'eau acidulée par l'acide sulfurique ou l'acide chlorhydrique l'hydrogène se porte sur le fil Wollaston, vers 1802 (*Annales de Chimie et de Physique* t. XVI) n'avait-il pas fait des expériences absolument semblables à celles de M. Iévol ? En effet il dit (p. 47) : « Si une dissolution contient du cuivre, il sera précipité par une lame de fer et paraitra à la surface rien n'aura lieu avec l'argent simplement plongé dans la dissolution mais dès que les deux métaux sont mis en contact l'argent se recouvre d'une couche de cuivre ». D'un autre côté les nombreuses expériences électro-chimiques que j'ai faites pour la reproduction de substances naturelles, bien avant que M. Iévol ne se fût occupé de cette question, n'ont-elles pas démontré en même temps qu'avec deux métaux en contact, l'un oxydable et l'autre peu ou point oxydable on parvenait à décomposer presque toutes les dissolutions métalliques avec cristallisation des métaux dissous et adhérence sur les lames négatives des cristaux formés ? Ne dit-on pas aussi que lorsqu'une dissolution cuivreuse est décomposée par le moyen du fer il y a action voltaïque en raison du contact de la première molécule de cuivre déposée avec le fer laquelle action donne une nouvelle énergie à toute décomposition ultérieure ? J'ajouterai encore ceci : Des les premiers temps de la découverte de la dorure par immersion ne dorait-on pas les pièces d'argent en les touchant dans le bain d'or avec un fil de fer ? Enfin, en chimie, n'emploie-t-on pas, dans une foule de cas, le contact métallique pour faciliter la décomposition des sels métalliques, dans

la dissolution desquels plonge un autre métal. Ainsi donc le principe réclamé par M. Levor comme lui appartenant, ainsi que ses applications dans des cas analogues et je puis même dire semblables à ceux où il l'a appliqué, étaient dans le domaine public bien avant 1837, époque où parut la Note de M. Levor dans les *Annales de Chimie et de Physique*. J'ai à signaler en outre une erreur assez grave qui se trouve dans cette Note. Il y est dit que lorsqu'on plonge dans une dissolution cuivreuse acidulée un cylindre ou une lame de fer toujours en contact avec le platine, la quantité de cuivre précipité varie suivant que le cylindre ou la lame est placée horizontalement ou verticalement. Dans le premier cas il y a plus de cuivre précipité sur le platine que dans le second. Moins de fer dissous et du retard dans la précipitation complète. En variant les expériences, M. Levor crut trouver la cause de la différence dans l'aimantation sous l'influence terrestre, laquelle suivant lui augmente l'énergie de l'action chimique. Cette conséquence est fautive. Le magnétisme n'est pour rien dans la différence observée, car il n'influe pas sur l'énergie de l'action électro-chimique, toutes les expériences faites jusqu'ici pour déterminer cette influence n'ayant donné que des résultats négatifs. Cette différence est due tout simplement à ce que, quand la lame de fer est horizontale, les surfaces métalliques étant plus rapprochées que lorsqu'elle est dans une position verticale, les courants électriques circulent en plus grande quantité par conséquent l'action décomposante de ces courants doit être plus considérable.

Je vais rappeler maintenant succinctement ce qui se trouve dans mon Mémoire. Je me suis attaché à mettre en évidence les propriétés que possèdent les doubles chlorures métalliques et alcalins parfaitement neutres à la température de 60 à 100 degrés, suivant la nature des métaux sans contact métallique ou aidés dans quelques cas de ce contact, d'être décomposés par différents métaux qu'on y plonge avec précipitation et adhérence des métaux tenus en dissolution. C'est à l'aide de ce principe que je suis parvenu à recouvrir immédiatement, sans contact métallique, le cuivre et différents métaux de platine, de palladium, de rhodium, d'iridium, d'argent, etc., chose qui n'avait pas été faite à l'égard des métaux électro-négatifs. De ce côté, M. Levor n'a donc rien à réclamer. Je me suis servi, à la vérité, du contact métallique pour cobaltiser et nickéliser le cuivre, résultat qu'il n'a pu obtenir avec les dissolutions, comme il le déclare lui-même dans sa Note. Quant à la dorure du platine, ne m'en étant pas occupé, je n'ai point à en parler, mais il n'en est pas de même des dépôts d'étain et d'antimoine sur cuivre, avec adhérence, que je n'ai ob-

tenus avec les doubles chlorures, comme M I evol avec des dissolutions simples, qu'en employant le contact métallique du zinc ou de l'étain. Ce contact, pour l'étamage, est en usage depuis bien longtemps dans l'industrie, ainsi M I evol n'a rien là à réclamer pour son emploi. Il reste donc à parler du dépôt d'antimoine sur cuivre qu'il signale en effet avoir moi. Ce fait a peu d'importance en lui même, et je ne l'ai cité à la suite de plusieurs autres, que comme un exemple du principe général que j'avais établi. Il est tout naturel que, dans un cas semblable, quelques faits isolés viennent se grouper à côté de ceux qui découlent de ce principe. Au surplus si je me fusse rappelé les expériences de M I evol très-certainement je les aurais mentionnées dans l'historique qui se trouve en tête de mon Mémoire. D'après cette discussion, il est bien évident que si M I evol eût lu attentivement mon Mémoire et qu'il eût pris connaissance des faits publiés antérieurement à sa Note, il ne m'aurait pas adressé les reproches consignés dans la Notice lue à la dernière séance.

Je profiterai de cette discussion pour mentionner quelques faits relatifs à l'argenture du maillechort que j'ai observés depuis la publication de mon Mémoire. Quand on plonge cet alliage dans une solution bouillante, saturée de chlorure d'argent et de chlorure de sodium, il se blanchit, et l'argent déposé ne tarde pas à se détacher, mais il n'en est plus ainsi quand on emploie l'action de quelques couples voltaïques, pour opérer, de concert avec l'alliage la décomposition du chlorure d'argent. Dans ce cas l'alliage étant moins électro-positif, agit moins tumultueusement et l'argent adhère alors plus fortement. On peut, au moyen d'immersions successives, lavant et séchant chaque fois à la sciure, augmenter la couche d'argent déposée. Dans une expérience où j'ai opéré avec une lame de maillechort de 51 millimètres de longueur sur 20 millimètres de largeur, j'ai déposé 0^{gr},02 d'argent ou environ 0^{gr},2 par décimètre carré. La couche d'argent est matte elle prend le poli au rouge d'Angleterre, mais elle ne résiste pas au brunissoir. En plongeant les lames à plusieurs reprises, l'argent se détache en lamelles, ce qui est une conséquence de ce que l'argenture ne résiste pas à l'action du brunissoir.

» Avec quelques précautions le fer peut être argenté, mais sans qu'il soit possible de donner de l'épaisseur, au moyen de la pile, à la couche d'argent déposée. Une des précautions à prendre est que l'immersion ne soit que de très-courte durée, même en aidant de l'action voltaïque. Je crois cependant qu'on pourrait arriver à rendre ce métal assez électro-négatif pour que la couche d'argent eût de l'épaisseur et qu'elle adhérerait. »

ICHTHYOLOGIE — *Observations pour servir à la connaissance du développement des Pœcilies*, par M. DUVERNOY (1)

DEUXIÈME PARTIE

Cette seconde partie comprend mes propres observations pour servir à la connaissance du développement des *Pœcilies*.

Elle est divisée en vingt paragraphes.

Dans le § I je détermine l'espèce observée dont je n'ai pu étudier que deux degrés très-avancés du développement. J'y fais cependant pressentir l'intérêt que l'étude de ces deux degrés peut avoir, en les comparant avec le développement correspondant d'autres poissons et avec l'organisme de l'adulte.

Je montre, dans le § II, que le lieu d'incubation de ces fœtus est le même, et qu'ils s'y développent dans le même calice qui a servi au développement de l'ovule, au milieu d'ovules de différentes grandeurs pour les portées suivantes.

Le § III traite des degrés de développement des fœtus observés, et fait connaître que, chez les plus avancés, il y a un tel progrès dans l'organisme, qu'il a été indiqué jusqu'à présent chez d'autres poissons qu'à la seconde époque de la vie, c'est-à-dire après l'éclosion.

Je rappelle, dans le § IV, ma division de la vie en cinq époques, et j'expose les caractères des dix périodes dans lesquelles je sous-divise la première époque.

Le § V traite des enveloppes du fœtus et de sa position dans l'œuf.

Je décris, dans le § VI, la forme générale du corps du fœtus aux degrés de développement observés, et je compare ses proportions à celle de l'adulte.

Les §§ VII et VIII font connaître ce que j'ai pu distinguer du système nerveux central et des principaux organes des sens ou du système nerveux périphérique.

Je montre enfin, dans le § VII, la grande proportion des tubercules optiques en rapport avec celle des yeux, et le développement tardif du cervelet (déjà signalé par M. Serres, en 1829, dans son grand travail couronné par l'Académie, sur l'anatomie comparative du cerveau dans les quatre classes des animaux vertébrés).

(1) Voir la première partie, ou l'*Esquisse historique* dans le *Compte rendu* de la séance précédente du 15 avril 1844, p. 667 et suiv.

• Local conserve longtemps sa fente choroidale, et complete tard ses enveloppes, par la solidification de la plus extérieure la sclérotique. Chez nos fœtus les plus avancés, le développement de cette dernière membrane a enfin comblé la solution de continuité qui subsiste encore dans les fœtus moins avancés.

L'oreille interne, seule partie de l'appareil de l'audition qui existe chez les poissons, ne nous a montré qu'une simple poche pyriforme avec l'origine des canaux semi-circulaires.

Le § IX traite du développement du squelette. J'y signale entre autres, le progrès, dans cette voie de l'axe vertébral mais en même temps le retard dans le développement et la solidification de la face et des parties latérales et supérieures du crâne.

Le § X est une suite du précédent. J'y traite plus particulièrement des nageoires et j'y montre que la ceinture thoracique et les nageoires pectorales qu'elle supporte ont un développement très-avancé qu'il en est de même de la nageoire caudale que le développement des nageoires dorsale et anale, qui déjà ont remplacé, avec la caudale, la nageoire transitoire dite embryonnaire est également remarquable. Ces nageoires ont déjà leurs rayons et ces rayons sont assez résistants et en même nombre que chez l'adulte, mais leur composition est différente.

Le développement des muscles fait le sujet du § XI. J'ai pu reconnaître les séries de cellules qui composent les fibres musculaires, dans une partie seulement des grands muscles latéraux. Ce progrès dans l'organisation intime caractérise notre neuvième période.

Le § XII traite du cœur et des vaisseaux sanguins. Le premier a déjà son ventricule placé à côté de l'oreillette. Le tronc artériel qui en sort ne montre pas encore de bulbe. On sait que celui-ci ne se développe que tard. L'oreillette et le sinus des veines caves et vitellines sont considérables.

Je décris dans les §§ XIII et XIV le développement des lames branchiales de l'opercule et des rayons branchiostéges. Tandis que ceux-ci sont assez solidifiés pour montrer de l'élasticité et que l'opercule, recouvrant complètement les branchies, chez nos fœtus les plus avancés, montrait déjà un vernis argenté, les lames branchiales commençaient seulement à germer, en petit nombre, sur deux rangs alternatifs.

• Les §§ XV et XVI traitent du canal alimentaire abdominal et du foie. J'y montre l'extrême brièveté de ce canal dans le moindre des degrés de développement observés, comparé à la longueur de celui de l'adulte. J'y fais remarquer son allongement sensible dans le degré le plus avancé.

Le tissu du foie n'est encore qu'une agglomération de vésicules transparentes de différentes grandeurs, dont plusieurs montrent par leur lésion les unes aux autres par des tubes extrêmement fins

• J'expose dans le § XVII que la vessie natatoire est, comme le foie une annexe du tube alimentaire et qu'elle a dans cette espèce, pour l'état foetal seulement, un canal de communication avec l'intestin, qui démontre ce rapport. Sa forme, très différente de celle de l'adulte, est très remarquable, son développement assez avancé à cette première époque de la vie, n'avait pas encore été signalé chez les autres poissons

L'appareil de prehension des aliments, de mastication et de déglutition des *Poecilichthys adultes* et de leurs fœtus fait le sujet du § XVIII. J'y montre, entre autres, que les dents intermaxillaires et mandibulaires de l'adulte ne forment pas seulement cette simple rangée de dents coniques et crochues saillantes au bord externe des mâchoires décrites dans les ouvrages systématiques, mais qu'il y en a en dedans de la bouche, plusieurs autres rangées de coniques séparées des externes par une bande étroite et une qu'il existe de plus au pharynx en haut et en bas des plaques subcartilagineuses, hérissées de très-petites dents ayant entre leur couronne et leur racine, une articulation qui les rend mobiles

Sous le rapport des dents, nos fœtus nous ont montré un développement extraordinaire, puisque nous y avons constaté l'existence de ces organes, qui ne se montrent, et seulement en germe, qu'à la seconde époque de la vie chez les autres poissons dont le développement est connu

Dans le § XIX, je traite du développement des reins et de la vessie urinaire. J'ai trouvé celle-ci très développée, ce qui est encore une circonstance particulière de l'organogénie des fœtus de *Poecilichthys*

Enfin je montre dans le § XX sur les téguments, qu'ils commencent à se colorer d'un pigment noirâtre qui apparaît par petites taches, et que quelques points brillants argentés semblent annoncer le premier développement des écailles, mais qui ne sont encore reconnaissables ni par leur forme, ni par leur disposition régulière. Les écailles ne se montrent généralement chez les jeunes poissons qu'à la troisième époque de la vie

• Il résulte donc, en général, de cette étude du développement des *Poecilichthys*

1° Qu'il a lieu dans l'ovaire et dans le même calice qui a servi au développement de l'ovule,

2° Que la fécondation de cet ovule a dû s'opérer à travers ce calice,

3° Que c'est aussi dans cette poche de l'ovaire que l'œuf s'est complété

par la formation du chorion et de la séreuse albumineuse dans laquelle le vitellus et le germe doivent se mouvoir en liberté

4° Que le degré avancé de développement auquel les fœtus des Poecilies parviennent dans l'ovaire et dans les enveloppes de l'œuf, et conséquemment durant la première époque de la vie n'avait pas encore été observé chez les autres poissons,

• 5° Que les Poecilies adultes ont des dents pharyngiennes articulées et mobiles dont on ne connaît pas d'autre exemple, quoiqu'il soit probable que ce n'est pas l'unique, puisque deux autres genres de poissons osseux, les Schals (*synodontis*) de la famille des *Siluroides*, et les *Salaria* de la famille des *Blennies* ont aussi des dents mobiles, mais pu un autre mécanisme

Chacun des vingt paragraphes que je viens d'analyser est divisé en deux parties la première, souvent la plus étendue est un exposé critique de l'état actuel de la science, sur le sujet particulier traité dans ce paragraphe

Cet exposé historique qui complète l'esquisse générale de la première division de ce Mémoire devient ainsi la pierre de touche, pour juger facilement de la valeur et de l'intérêt de mes propres observations soit comme nouvelles soit comme servant à confirmer les faits déjà connus Elles sont le sujet de la seconde partie de ces mêmes paragraphes

MÉCANIQUE APPLIQUÉE — *Épreuves supportées par des canons des fabriques de MM Renette et Gastine et de M Albert Bernard, Note de M SEGURA*

• Une louable émulation s'est emparée des artistes qui fabriquent les canons de fusils

Déjà nous avons eu l'honneur de vous signaler de remarquables résultats obtenus par MM Renette et Gastine et par M Léopold Bernard

Nous vous demandons encore aujourd'hui la permission de vous entretenir un instant des épreuves nouvelles que ces canonniers ont fait subir aux produits de leur fabrication

Nous vous présentons d'abord deux canons confectionnés par le procédé inventé par MM Renette et Gastine, c'est-à-dire des canons composés de deux rubans triangulaires roulés en hélice et superposés de façon à ce que le sommet du triangle d'un des rubans coïncide avec la rencontre des arêtes de la base de l'autre

Le premier des deux canons que nous plaçons sous vos yeux, est long de 71 centimètres et du poids de 840 grammes, il a subi successivement des

charges de 20, 30, 40, 50 grammes de poudre, et de 114, 171, 228, 285 grammes de plomb, il a enfin résisté à la charge énorme de 60 grammes de poudre non tassée, et de 320 grammes de plomb de chasse n° 4, c'est-à-dire à quinze charges ordinaires.

Le second canon, de la même longueur et du même poids que le premier, après avoir supporté des charges composées de 20 et de 40 grammes de poudre avec quatre et sept balles, a subi comme dernière épreuve une charge de 50 grammes de poudre et de huit balles de plomb. De telles charges, qui occupaient dans le premier canon 43 centimètres de hauteur et 34 dans le second, n'ont fait éprouver à ces deux canons que de légères ondulations et une minime courbure à l'extrémité de l'un d'eux. Nous déposons avec ces deux canons le procès verbal des épreuves, attestées par de nombreux témoins, parmi lesquels nous citerons un nom que l'Académie entend toujours avec bonheur, alors même qu'il lui rappelle une perte douloureuse, celui du frère de M. Savart.

Les épreuves auxquelles M. Albert Bernard a soumis les canons d'acier fondu, d'acier corroyé, d'acier allié de $\frac{1}{15}$ de fer façonnés dans ses ateliers sont également bien dignes d'être citées.

Un premier canon d'acier corroyé de 72 centimètres de long, du poids de 832 grammes, après avoir supporté des charges de 20, 30, 40 grammes de poudre, et de 120, 180 et 240 grammes de plomb, n'a cédé que sous une charge de 50 grammes de poudre et de 300 grammes de plomb, avec addition de 6 centimètres de terre au bout du canon.

Un second canon de même longueur, du poids de 822 grammes, en acier fondu, n'a cédé, après des épreuves progressives, que sous une charge de 60 grammes de poudre et 360 grammes de plomb, cette charge occupait 57 centimètres de la longueur du canon.

» D'autres canons d'acier corroyé et d'acier allié de $\frac{1}{15}$ de fer n'ont crevé que sous des charges de 40 grammes de poudre et de 240 grammes de plomb, avec addition de 12 centimètres de terre, laissant entre les charges et la terre un espace vide.

Enfin, un canon double, du poids de 652 grammes, en acier corroyé, a résisté sans altération à des épreuves composées de 30 grammes de poudre et de 180 grammes de plomb, avec addition de une et deux balles, placées à distance, et éloignées des premières charges.

Une émulation qui a fait obtenir de tels résultats, messieurs, était bien digne de vous être rapportée; elle trouvera, nous en sommes certain, dans votre assentiment, la plus honorable de ses récompenses. »

BALISTIQUE — **MM ARAGO** et **SIGUIER** membres d'une Commission qui doit faire un Rapport sur diverses communications de **M DELVIGNE**, rendent compte des expériences dont ils ont été témoins, dimanche, au polygone de Vincennes

Les épreuves ont été faites avec un fusil rayé, de moins de 1 mètre de long, à balle forcée, et différant par plusieurs particularités, qui seront décrites plus tard, de la première arme de **M Delvigne**. La balle, conique en avant, pesait notablement plus que celle du fusil de munition. La charge n'était que de 4^{es} 2 de poudre. **M Delvigne** tint à la manière ordinaire la crosse appuyée sur l'épaule. La mire se composait de trois panneaux carrés, ayant chacun 2 mètres de côté et placés en contact sur une même ligne horizontale.

A 500 mètres de la mire, 14 balles sur 15 ont frappé les panneaux. 14 balles sur 15 auraient atteint trois fantassins placés de front.

Les balles mettaient 2^e,6 à parcourir les 500 mètres. En arrivant au but, 10 balles sur 14 ont traversé trois planches de 2 centimètres d'épaisseur, placées les unes derrière les autres à des intervalles de 2 décimètres.

A 700 mètres de la mire 2 balles sur 9 ont atteint le rond noir du panneau central, 3 ont frappé ce même panneau mais en dehors du rond noir, 2 autres balles ont frappé le panneau de droite. Le tirait effectuait en 4^e 2.

A 900 mètres de la mire **M Delvigne** a tiré trois coups, 2 balles ont frappé les panneaux. Elles employaient 6^e,0 à franchir l'intervalle actuel.

RAPPORTS

CHIMIE — *Rapport sur un Mémoire de **M LASSAIGNE** relatif à la détermination de la présence de l'azote dans des quantités minimes de substances organiques*

(Commissaires, **MM Thenard**, **Chevreul**, **Payen** rapporteur)

Les moyens dont la chimie dispose pour déterminer la nature des matières organiques sont devenus plus faciles et plus sûrs dans ces derniers temps, toutefois, ils peuvent être insuffisants en certains cas, lorsque, par exemple, on doit agir sur des quantités à peine exactement pondérables.

C'est dans de semblables circonstances que **M Lassaigue** eut l'idée d'appliquer une réaction chimique connue, à la détermination de la présence de l'azote dans ces matières.

Son procédé repose sur la formation d'un cyanure lorsque l'on chauffe au rouge, sans le contact de l'air, une substance azotée en présence d'un excès de potassium.

Une minime parcelle, pesant moins de 1 milligramme, de gluten, d'acide d'acide unique, d'albumine, de caséine, de morphine ou de cinchonine, suffit à l'expérience.

Voici comment on opère : au fond d'un tube de 2 ou 3 millimètres de diamètre et d'environ 3 centimètres de longueur, on fait tomber un petit morceau de potassium ayant à peu près le volume d'un grain de millet, on le tasse avec une tige en platine, puis on ajoute la matière à essayer (1).

Saissant alors le tube à l'aide d'une pince, on le chauffe dans la flamme d'une lampe à alcool jusqu'à ce que l'excès de potassium se soit dégagé en vapeurs en passant au travers de la matière organique carbonisée, le tout ayant été porté à la température du rouge naissant.

Après le refroidissement on coupe en deux le tube au moyen d'une entaille faite d'un trait de lime, on détache la substance charbonneuse, on la fait tomber dans une petite capsule en porcelaine contenant quatre à six gouttes d'eau : on peut rincer le tube avec deux ou trois gouttes d'eau introduites par le bout de la tige effilée d'un tube en verre.

On verse dans la capsule une goutte d'une solution de sulfate de fer, alors l'addition d'une goutte d'acide chlorhydrique fait apparaître la coloration propre aux cyanures de fer qui constituent le bleu de Prusse, si la substance essayée contenait une combinaison azotée. Dans le cas contraire, le précipité verdâtre se redissoudrait sans développer de coloration bleue.

Nous avons voulu examiner si un procédé d'expérimentation aussi simple permettrait de reconnaître des différences entre les proportions d'azote contenues dans les quantités minimales sur lesquelles on peut opérer ainsi. Des différences appréciables nous ont paru surtout évidentes en traitant de 5 milligrammes à 1 centigramme de matière dans des tubes minces ayant 4 millimètres de diamètre et 5 centimètres de longueur. Nous citerons un des faits de ce genre : deux échantillons furent préparés pour l'essai, l'un, de farine de blé dur, donnant à l'analyse 0,025 d'azote, l'autre, de poudre d'os, qui en contenait 0,052, chacune des poudres, calcinée sur le potassium, laissa un charbon qui fut délayé dans l'eau. La moitié de la solution put être décantée

(1) Si c'était une substance volatile, on la placerait au fond du tube, et le potassium serait posé dessus.

et fut mise dans un verre conique, deux gouttes de sulfate de fer furent versées pour chaque échantillon dans le liquide decanté, et autant dans la capsule où le dépôt charbonneux se trouvait avec le liquide, enfin on ajouta autant d'acide chlorhydrique dans le verre et dans la capsule contenant les produits de chaque échantillon à l'instant même les nuances bleues, bien plus foncées dans les liquides appartenant à la décomposition de la poudre d'os que dans les solutions appartenant à la farine signalèrent les différences cherchées. L'intensité de la couleur bleue et le volume du précipité, après quelques heures de repos dans les verres coniques manifestèrent les mêmes indications.

» Ce mode d'essai nous semble pouvoir donner, dans les circonstances précitées des notions utiles sur la nature de certaines matières organiques. On pourrait y avoir recours dans le cas où l'on craindrait qu'une faible proportion d'azote obtenue dans une analyse élémentaire pût être attribuée à de l'eau interposée car on saurait ainsi s'il existe réellement du lazote à l'état de combinaison dans la matière organique.

Le procédé de M. J. assainie étant d'ailleurs d'une exécution facile et prompte, entre les mains de tout manipulateur exercé, et constituant une expérience élégante de laboratoire, nous avons l'honneur de demander à l'Académie de lui accorder son approbation.

Les conclusions de ce Rapport sont adoptées.

NOMINATIONS

L'Académie procède, par voie de scrutin, à la nomination de la Commission qui sera chargée d'examiner les pièces adressées au concours pour le prix de *Statistique*. Commissaires, MM. Francoeur, Mathieu Dupin de Gasparin, Pouillet.

MEMOIRES PRESENTES

ASTRONOMIE — *Observations crepusculaires faites en Suisse, à une élévation de 2680 mètres au-dessus de la mer, par M. BRAVAIS* (Extrait)

(Commissaires, MM. Biot, Arago, Babinet)

Permettez-moi de mettre sous les yeux de l'Académie le tableau des observations crepusculaires que j'ai faites en Suisse, à une élévation de 2680 mètres au-dessus de la mer.

Ce tableau renferme 98 mesures angulaires de la hauteur du point culminant de la courbe crépusculaire, parmi ces mesures, 75 se rapportent à la phase qui, le matin, précède, et, le soir, suit le passage de cette courbe au zénith de l'observateur, les 23 autres appartiennent à la seconde phase, celle comprise entre le moment du passage au zénith et le lever ou le coucher du Soleil. J'indique avec détail les moyens d'observation que j'ai employés.

Les résultats obtenus montrent que le passage de la courbe au zénith, commencement ou fin du crépuscule civil de Lambert, s'effectue lorsque le Soleil atteint 96 degrés de distance zénithale, le contact de la courbe avec l'horizon, commencement ou fin du crépuscule astronomique, lorsque cette distance devient égale à 106 degrés.

Il en résulte pareillement que les rayons solaires tangents au sol ou peu élevés au-dessus de lui, s'éteignent assez dans les couches inférieures de l'atmosphère pour ne pas jeter d'éclairement sensible sur la zone qui limite du côté du Soleil le cône d'ombre projeté par la Terre sur les hautes régions atmosphériques. Cette extinction déplace cette *limite géométrique* d'une quantité très-notable, en la rapprochant du lieu de la sphère céleste où se trouve le Soleil. La partie la plus basse de l'atmosphère intervenant ainsi comme un corps opaque dans les phénomènes crépusculaires, j'ai dû rejeter la considération des rayons tangents au sol, et déterminer la hauteur probable de l'atmosphère par les intersections deux à deux des diverses trajectoires lumineuses qui, du sommet de la courbe crépusculaire, *limite physique* des espaces clair et obscur, arrivent à l'œil de l'observateur pendant la durée de la rotation apparente de cette courbe. Cette hauteur ainsi déterminée ne s'élèverait pas à moins de 100 000 mètres.

Les formules que j'ai employées sont basées sur les considérations suivantes pour un point quelconque A de l'une de ces trajectoires, soient r la distance au centre de la Terre, d la densité de l'air, et $1 + kd$ son indice de réfraction. Soient en outre θ la depression vraie du Soleil au-dessous du plan de l'horizon de A, h l'angle que forme la trajectoire avec ce plan, et $\rho[h]$ la réfraction astronomique correspondante à la hauteur h et à la densité $d = 1$, de sorte que $d\rho[h]$ soit la réfraction convenable à l'état de l'air au point A. Les deux quantités $r \cos h (1 + kd)$ et $\theta + h - d\rho[h]$ (ou sera $\theta - h + d\rho[h]$, si la trajectoire tournait sa convexité du côté du Soleil), restent constantes tout le long d'une même trajectoire, chaque trajectoire fournit ainsi deux équations de condition. Si A est leur point de rencontre au moyen de ces quatre équations, et en commençant, par

fausse position, a supposer en ce point $d = 0$, on parvient facilement à déterminer les inconnues r , δ , ainsi que les angles h , \bar{h} , inclinaisons des deux trajectoires sur l'horizon de A

J'ai joint à ce Mémoire la majeure partie de mes observations sur les teintes aériennes qui accompagnent le crépuscule et entre autres sur le mode de coloration des rayons crépusculaires convergents alternativement clairs et obscurs qui se montrent souvent pendant la durée du crépuscule Ces observations sont accompagnées d'une soixantaine de mesures angulaires de la hauteur des diverses zones colorées Enfin un dernier tableau offre les données météorologiques correspondantes à ces diverses observations

ASTRONOMIE — *Sur les variations diurnes de la déclinaison magnétique dans de hautes latitudes boreales par MM BRAVAIS et LOTTIN*

(Commission précédemment nommée)

On nous a souvent demandé comment s'exerçait l'action perturbatrice du lauroie boreale sur nos aiguilles aimantées, pendant notre hivernage en Japon (latitude, $66^{\circ}58'$) Je vais essayer d'y répondre en peu de mots

On sait qu'il existe des journées pendant lesquelles l'état du magnétisme terrestre est stable, d'autres où cet état est instable On peut donc partager une longue suite de jours d'observations faites par exemple (comme les nôtres) de quart d'heure en quart d'heure en deux groupes numériquement égaux celui des journées calmes et celui des journées à orages magnétiques on pourra rechercher ensuite la variation diurne propre à chacun de ces groupes Trois voies se présentent pour arriver à mesurer le degré de perturbation magnétique d'une journée 1° on peut faire la somme de tous les écarts observés pendant ce jour entre la position de l'aiguille à chaque heure et la position moyenne correspondante à cette même heure, tous ces écarts étant d'ailleurs considérés comme positifs, 2° on peut remplacer ces écarts par les différences de position de l'aiguille d'un quart d'heure au quart d'heure suivant, et faire la somme des quatre-vingt-seize différences ainsi obtenues, considérées toutes comme positives, 3° enfin l'on peut, à chaque observation, noter l'amplitude des oscillations que fait l'aiguille, et faire la somme des quatre-vingt-seize amplitudes observées pendant la durée du jour

Les grandes sommes correspondent aux journées très-perturbées, les petites sommes aux journées peu perturbées Ces trois procédés, appliqués chacun séparément, donnent presque les mêmes résultats, quant à la division de la série générale en deux groupes partiels

» Nous avons fait entrer en ligne de compte et à titre égal ces trois procédés différents, prenant ensuite dans chaque groupe les moyennes horaires, nous avons obtenu de soixante jours d'observation les résultats suivants :

Époques des maximums et des minimums de la déclinaison.

HEURES, temps moyen astronomique de Bosselap.	DÉCLINAISONS		HEURES, temps moyen astronomique de Bosselap.	DÉCLINAISONS	
	Jours calmes.	Jours perturbés		Jours calmes	Jours perturbés
Midi. . .	N. 10° 32', 80.	N. 10° 34', 20	13 ^h . . .	N. 10° 24', 2 O.	N. 10° 12', 6 O.
1 ^h	34, 2	35, 9	14.	23, 5	12, 6
2.	33, 9	37, 7	15.	23, 9	15, 8
3.	33, 2	38, 5	16.	24, 4	16, 1
4.	32, 1	37, 5	17.	25, 3	17, 7
5.	31, 1	38, 3	18.	26, 0	23, 2
6.	30, 9	37, 9	19.	25, 8	26, 0
7.	30, 6	36, 4	20.	26, 2	27, 3
8.	30, 4	32, 8	21.	27, 0	27, 5
9.	29, 5	31, 8	22.	30, 0	30, 1
10.	27, 3	22, 2	23.	30, 7	31, 2
11.	26, 1	14, 7	Midi. . . .	32, 8	34, 2
Minuit. .	24, 4	14, 7	Moyennes.	N. 10° 28', 480.	N. 10° 27', 240

» L'influence moyenne de ces perturbations magnétiques que l'on a qualifiées jusqu'à ce jour de perturbations *irrégulières* ou *accidentelles*, est donc d'augmenter l'amplitude de la variation diurne dans le rapport de 10', 7 à 25', 9, ou plus simplement dans le rapport de 2 à 5; et ce qui est très-remarquable, c'est que ces perturbations laissent presque fixes l'époque du maximum et celle du minimum de la déclinaison : on notera toutefois que dans les jours perturbés le maximum arrive environ une heure et demie plus tard.

» Dix ou quinze jours d'observation suffisent pour ~~suppléer~~ ^{établir} ces résultats en évidence, et dans les huit mois pendant lesquels ~~nos~~ ^{nos} observations ont continué régulièrement jour et nuit, la même loi ne s'est jamais démentie.

» Lorsque nous partageons nos soixante jours d'observation en trois séries de vingt jours chacune, les jours ayant été rangés préalablement suivant les

valeurs croissantes des sommes diurnes des différences de quart d'heure en quart d'heure, nous obtenons les résultats suivants. Dans la série la moins perturbée, ou la valeur moyenne de ces différences ne s'élève qu'à 1,3, l'amplitude totale de la variation diurne est de 8,7. Dans la seconde série, à une valeur moyenne de 2,8 pour les différences correspond une amplitude de 14,85. Enfin, dans la série des jours les plus perturbés les différences de quart d'heure ou quart d'heure valent en moyenne 8,65 aussi l'amplitude s'élève-t-elle alors à 26,6.

Ces faits prouvent que, pour rendre rigoureusement comparables entre elles les mesures de la variation diurne de la déclinaison, il faudrait pouvoir tenir compte de l'état magnétique plus ou moins orageux des journées d'observation. Ils témoignent aussi d'une connexion très-intime entre la cause des perturbations dites *accidentelles* telles que sont celles qui correspondent aux aurores boréales et la cause qui produit la variation diurne habituelle, de manière même à faire presque soupçonner que ces deux ordres de phénomènes seraient identiques.

Nous n'avons point encore discuté d'une manière complète sous ce point de vue nos observations de la variation de l'intensité horizontale mais nous avons des inconvénients de fortes raisons de croire qu'elles conduiront à des résultats pareils.

Il sera sans doute fort intéressant pour les physiciens de savoir si les observations faites récemment dans l'hémisphère austral par le capitaine James Ross et ses collaborateurs mènent aussi aux mêmes conséquences.

VOYAGES SCIENTIFIQUES — *Rapport adressé à l'Académie des Sciences, par*
M LIEFFVRE, *président d'une Commission scientifique en Abyssinie*

(Commissaires MM Arago Beautemps-Beaupré Isidore Geoffroy Saint-Hilaire Fliche de Beaumont Richard)

En 1838, une Commission fut nommée par le Gouvernement pour explorer l'Abyssinie cette Commission, dont j'eus l'honneur d'être président, se composait d'abord de MM les docteurs Petit et Quatrin Dillon et adjoint plus tard M Vignaud, comme dessinateur. Ces messieurs se chargèrent de la partie de l'histoire naturelle, la partie géographique, dans toute son étendue, me concernait exclusivement.

Après nous être munis de tous les renseignements convenables et avoir pris les instructions spéciales de l'Académie, nous partîmes de Marseille le 11 décembre 1838

« Dans le cours de notre trajet en Égypte, en Arabie, nos travaux n'eurent pour but que de fournir des points de comparaison à la science, ces localités ayant été déjà étudiées avec fruit. Ce n'est qu'en arrivant dans l'archipel Dhilac, que commença la spécialité de nos recherches. Ces îles ne sont pas, comme plusieurs voyageurs l'ont affirmé, entièrement formées par le travail des madrépores, elles sont le résultat de soulèvements : certaines parties se sont élevées subitement au-dessus du niveau de la mer, tandis que les parties les plus basses se sont recouvertes d'animaux coquilliers et de madrépores, lesquels, en outre du travail d'exhaussement qui leur est particulier, ont été relevés aussi par des soulèvements généraux, qui, à différentes époques, ont exhaussé le niveau général du littoral de la mer Rouge : circonstance qui a fait que plusieurs ports, autrefois très-profonds, ont été comblés, et que des rivières se jetant naguère dans la mer, vont aujourd'hui se perdre dans plusieurs lacs qui existent sur les deux littoraux, à des niveaux inférieurs à celui de la mer.

Dans quelques unes de ces îles, les roches soulevées qui n'étaient pas arrivées à fleur d'eau, ont été recouvertes de madrépores, ces madrépores restant à nu lors du abaissement annuel du niveau, pendant la saison des vents du nord, se sont chargés de sables et de débris d'insectes, pareils à ceux qu'on voit sur les côtes de Syrie, dans les mares ou les sauterelles font leurs ravages, et c'est à la terre végétale ainsi formée que ces dernières îles, entièrement dépourvues d'eau douce, doivent leurs végétations d'arbres marins, arbres qui atteignent jusqu'à 2 mètres de hauteur. La feuille sert de nourriture aux chameaux, et le bois est employé par les marins pour brûler dans les usages journaliers.

Deux de ces îles, Dhilac et Neva, ont une grande étendue et plusieurs sources d'eau douce qui dans les années de sécheresse, approvisionnent l'île de Messoah. La première comprend douze villages principaux, dont les habitants s'adonnent à la pêche des perles, de la nacre et de la tortue, la deuxième contient sept villages, dont les habitants ont la même industrie que les précédents. Leur sol fournit assez de végétation pour nourrir quelques chèvres, des ânes et des chameaux. Le climat y est sain, j'y ai vu un vieillard de cent trente et un ans, dont le fils était âgé de quatre-vingt-quinze, et le petit-fils de soixante-dix, mais la chaleur est tellement forte en été, que les habitants eux-mêmes ne sortent pendant le jour que pour aller dans leurs puogues.

Arrivés en Abyssinie, à Adoa, nous dûmes, pour remplir convenablement le but de notre expédition, faire une longue station dans cette ville.

Si, en effet, nous n'eussions voulu faire qu'une simple exploration nous nous serions bornés à passer dans chaque localité n'y recueillant que ce que la bonne disposition des habitants nous eût laissé prendre, mais, avec le projet que nous avions de faire un travail comparatif complet de toutes les parties de l'Abyssinie, nous nous sommes, dès l'abord, trouvés dans la nécessité d'établir nos observations sur une base large et solide. Or, Adoa étant on ne peut plus propice à ce dessein tant par l'intérêt particulier qu'offre le rayon de pays dans lequel nos investigations se trouvaient étendues que par la facilité que nous rencontrâmes chez les habitants, ce qui nous permettait, soit en interrogeant les chefs de caravanes soit en consultant les traditions répandues, de nous former à priori une opinion des contrées que nous devions visiter ultérieurement, et dans lesquelles il nous eût été impossible de demeurer longtemps. C'est ainsi qu'ont pu être fructueuses nos courses dans les pays Gallas, où chacune de nos stations ne dura pas plus d'un jour.

En quittant Adoa et le Tigre nous avions donc déjà des tableaux comparatifs de géologie et d'histoire naturelle qui embrassaient toute la portion des terrains s'étendant jusqu'à la mer et l'on en sentira l'importance quand on saura qu'Adoa est situé dans un bassin environné de hauts pics qui atteignent jusqu'à 2000 mètres d'élévation absolue.

De ces études continuées avec persévérance pendant près de cinq ans, il est résulté une quantité considérable de matériaux de toute espèce, propres à fournir la matière d'une publication intéressante et assez volumineuse. J'en donne ici plus bas une liste complète, j'extrais d'abord pour les nommer ici, celles de nos observations qui nous ont paru de nature à fixer l'opinion de la science sur les contrées que nous avons parcourues.

Géographie physique — Presque toute l'Abyssinie est formée par un vaste plateau qui s'élève en gradins superposés, à quelque distance des bords sablonneux de la mer Rouge. Ce plateau s'abaisse au nord-ouest et au sud-est, mais plus sensiblement dans la première direction qui est en effet celle des principaux cours d'eau de l'Abyssinie, le Nil Bleu, le Taccazé, le Mareb. Au sud-est, ce n'est qu'au sortir des pays Gallas que le plateau prend une pente prononcée il porte alors dans l'Océan, sur la côte du Zanguebar, les eaux du Jubba et de ses affluents dont le principal a le nom de *Gube*, et prend sa source entre Noumo et Kafa dans la même chaîne ou prend sa source la Sienna, le Godjobe, l'une des principales sources du Nil Blanc.

Depuis que le Jubba a été signalé, les hommes de science font des vœux

pour que son cours soit remonté, et qu'on détermine jusqu'à quel point il est navigable. Si l'on se décidait enfin à ouvrir des relations commerciales étendues avec l'Abyssinie, il serait possible que le Toubba en devint un des principaux débouchés.

La disposition du sol, en Abyssinie, est peut-être la chose la plus curieuse de cette contrée. Elle est du moins la plus féconde en résultats remarquables. Ces plateaux superposés, taillés en bords abruptes, dominent des terrains à toutes les hauteurs du niveau de la mer jusqu'à plus de 3000 mètres, par suite de cela, des températures très-diverses et les plus extrêmes depuis la chaleur brûlante des basses terres, jusqu'aux neiges des plus hauts pics. Cette variété dans les climats en cause une analogie dans les productions naturelles, c'est ce qui ressort à la première vue d'un coup d'œil jeté sur les collections que nous avons apportées d'Abyssinie.

L'histoire naturelle formait une des parties principales de nos recherches en Abyssinie. MM. les docteurs Petit et Quartin-Dillon s'étaient partagé le domaine de cette vaste science. Le premier était chargé de la zoologie, le second de la botanique.

Les collections qu'ils ont formées, les manuscrits qu'ils ont rédigés sur les lieux, l'un d'eux qui fut dessiné par M. Vignaud dessinateur qui, plus tard, vint s'ajouter à notre Commission, ont acquis une importance bien grande par la mort déplorable de ces trois victimes de leur zèle pour la science.

Il me serait impossible de faire connaître ici en détail les objets intéressants et en grande partie nouveaux que mes compagnons de voyage ont recueillis dans les diverses provinces de l'Abyssinie.

L'ornithologie surtout s'enrichit d'un nombre très-considérable d'oiseaux nouveaux dont M. Petit a étudié les habitudes et souvent décrit l'organisation intérieure.

L'herbier fut par M. Quartin-Dillon, et que M. Petit a continué après la mort déplorable de ce premier, se compose d'environ seize à dix-huit cents espèces de végétaux. On peut approximativement évaluer à cinq ou six cents le nombre des espèces nouvelles dont la flore abyssinienne enrichit la botanique, ainsi que l'a constaté M. Richard qui, par ses conseils bienveillants, avait encouragé et dirigé mes compagnons pendant notre pénible voyage, et qui a eu la bonté de ranger méthodiquement l'herbier que les membres de la Commission avaient formé pour eux.

Voici une liste nominative des matériaux recueillis par la Commission.

1° Une carte topographique de l'Abyssinie, depuis le 16° degré lat. N. jusqu'au 8° degré lat. N., et depuis le 35° degré long. E. jusqu'au 38° degré

long et la triangulation de cette carte a eu pour base la ligne comprise entre la montagne *Damo Galela* et *Nahaile*, deux points d'où l'on découvre toute l'Abyssinie quarante points ont été déterminés astronomiquement les relevements ont été faits au théololite et à la boussole

- 2° Un tableau d'observations astronomiques
- 3° Un tableau d'observations météorologiques
- 4° Un tableau d'observations magnétiques
- 5° Un tableau d'observations barométriques
- 6° Un tableau de la direction des vents
- 7° Un tableau de la quantité de pluies tombées annuellement
- 8° Cartes coupes croquis géologiques avec les collections de minéraux
- 9° Notes botaniques avec collection
- 10° Notes zoologiques avec collection,
- 11° Dessins colonies en très grand nombre *costumes portraits* (avec les dimensions du crâne prises dans un but de travail ethnologique) *oiseaux mammifères reptiles poissons plantes ustensiles armes, vues antiques et inscriptions* (avec des notes),
- 12° Tableaux de production dans les trois royaumes
- 13° Tableau commercial
- 14° Navigation de l'océan Rouge
- 15° Vocabulaires de l'*Anarah* du *Tigrén* les *Adal* de *Messoah* des *Gallas* des *Agou*,
- 16° Manuscrits rapportés tirant du *copte*, du *phénicien* et du *syriaque*
- 17° Divers échantillons des produits du pays dans tous les genres,
- 18° Des notes très-étendues sur la religion la politique les mœurs le lois etc

» Tel est un aperçu des travaux de la Commission en Abyssinie ils mériteraient d'intéresser eux-mêmes que le prix auquel ils ont été achetés devrait les en rendre dignes Deux de mes compagnons de voyage avaient succombé dès le début de l'expédition l'assurance d'une mort certaine n'avait pu les détourner un instant de ces ravins empestés où ils entrevoient de précieuses conquêtes pour la science Un seul, M. Petit m'a accompagné à travers les lointaines contrées des Gallas, ensemble nous avons pu observer les traits distinctifs qui différencient ces peuples des habitants du Tigre l'infériorité de leur civilisation et l'originalité de leur langage établissent de prime abord un contraste frappant, cependant il est digne de remarque

que la conformation du crâne ne change pas notablement, et que tous les autres caractères de la physionomie restent les mêmes. Tous les gens qui peuplent cette haute terrasse abyssinienne ont une couleur de peau tellement uniforme qu'ils sont tous appelés *Habesch* par les Arabes, qu'ils parlent d'ailleurs *Galla*, *amarah*, *agow* ou *tallal*. En résumé donc, on est tenté de n'attribuer qu'à l'éloignement de la mer la différence appréciable entre les Gallas et les Ligréens, cette influence se fait également sentir sur la population chrétienne du *Choa*. M. Petit a fait à ce sujet des remarques curieuses, il a eu lieu d'observer aussi que le *Choa*, qui paraît être le foyer des colonies juives, semblait être également celui de la lèpre et de toutes les maladies dont l'origine est attribuée à cette nation.

Après cette ample moisson de renseignements, nous revînmes par l'ouest de l'Abyssinie. Nous traversâmes une première fois le Nil à l'embouchure de la rivière Djemma, et entrâmes dans le Godjam les difficultés que nous éprouvâmes alors de la part des habitants qui voulaient nous dévaliser, peuvent être considérées comme une mort à laquelle nous avons échappé. Nous passions dans une contrée désolée par la guerre et la famine : les habitants s'étaient réfugiés dans les bois, et ne vivaient que de pillage. Il serait trop long de dire ici à combien de dangers nous fûmes exposés dans cette pérégrination périlleuse même au temps de paix. Partis de Dima, ville asile qui nous offrait la plus grande sécurité mais où l'impatience de M. Petit ne souffrit pas que nous demeurassions, nous nous attachâmes à suivre constamment la ligne de démarcation, où les pillards des deux armées belligérantes n'osaient pas s'aventurer, cela allongea notre course, mais nous permit d'atteindre une seconde fois le Nil sans beaucoup d'encombres. En cet endroit le fleuve coule dans un lit de roches de formation primitive, modifiée par l'action du feu. Ses bords escarpés sont très rapprochés, et d'une roche à l'autre les Portugais avaient construit un pont qui reposait sur une seule arche, et dont les extrémités étaient suivies de déversoirs pour les débordements. L'arche a été rompue par les Abyssins, et, comme en cet endroit le lit du fleuve est très profond, on est obligé, pour faire passer les bagages, de les attacher à des lamieres dont les bouts sont tenus aux deux bords : c'est ainsi que je fis passer les nôtres. Pendant ce temps M. Petit, contrairement à mon avis et à celui des Abyssins, descendit la rive vers un endroit où le fleuve est moins encaissé, et qui sert au passage des mules. Il fit d'abord passer sa tunique par un de ses domestiques, qui atteignit rapidement le bord opposé, puis, ne sachant pas nager, il se mit à l'eau sous l'escorte de deux nègres qui le soutenaient. Déjà il touchait au rivage, et ses domestiques venaient annoncer

qu'il avait effectué son passage, lorsqu'un grand cri, un cri ariaché de l'âme me glaça d'effroi. Je m'élançai aussitôt : il n'était plus temps. Je ne trouvai que les deux nègres qui rapportèrent que leur maître les avait subitement lâchés en poussant un cri de douleur, et s'était immédiatement enfoncé dans l'eau pour ne plus reparaitre. Il n'y avait pas le moindre doute, un crocodile venait de m'enlever mon compagnon. En vain nous restâmes longtemps encore sur le rivage pour en apercevoir quelques traces : le fleuve ne répondit à nos recherches que par son calme et sa sérénité accoutumés.

Dans la disposition d'esprit où me jeta ce coup terrible, je ne songeai plus qu'à me rapprocher de mon dernier compagnon, M. Vignaud, que j'espérais retrouver à Gondar. En arrivant dans cette ville, on m'apprit qu'il était parti pour la France. Nouveau malheur ! Après avoir terminé promptement quelques travaux à Gondar, je m'acheminai vers Adour, où je comptais trouver des nouvelles plus positives. Je sus là que M. Vignaud était effectivement parti par la route de Soakim, mais on ne me disait pas tout. Ce ne fut qu'à Melloah que j'appris que M. Vignaud, atteint d'une fièvre qu'il avait probablement gagnée dans cette île, était tombé très malade à Soakim, où il s'était embarqué pour Djeddah. Arrivé dans ce port, mon dernier compagnon expira entre les mains du docteur Serkis.

Tous étaient donc morts un à un, songeant jusqu'au dernier moment à la patrie, objet de leurs vœux et de leurs plus chères espérances. Pour moi, resté seul si éloigné encore de la France, il me fallut, pour que le découragement ne me prit point, le sentiment d'une tâche toute nouvelle : dernier enjeu de cette terrible partie, c'est sur moi désormais qu'en reposait tout le sort, et je me disais qu'elle serait encore gagnée si je parvenais à en sauver les débris, surtout si je ne laissais pas perdre le fruit du dévouement de mes infortunés collègues.

J'y ai réussi jusqu'ici, et c'est pour suivre l'accomplissement d'un religieux devoir, que je viens, plutôt en leur nom qu'en mon nom, rendre compte à l'Académie de nos travaux, et demander un suffrage qui doit honorer leur mémoire et adoucir l'amertume de mes souvenirs. »

MINÉRALOGIE — *Sur les cristaux à faces creuses*, par M. FOURNET

(Commissaires, MM. Alex. Brongniart, Élie de Beaumont, Dufrénoy.)

« Les faces de certains cristaux présentent des concavités que l'on considère habituellement comme des oblitérations, mais un examen plus attentif ne tarde pas à modifier cette idée, en faisant reconnaître dans ces particu-

larités des corrélations, sinon aussi nettes, au moins identiques à celles qui se manifestent en général dans le développement des cristaux réguliers, en sorte qu'il faut y voir non pas des difformités, mais bien une véritable ébauche cristalline.

Pour démontrer cette proposition, rappelons que les modifications les plus complexes des formes cristallines peuvent s'expliquer par des superpositions de limes dont les dimensions en largeur et en longueur décroissent suivant certains rapports simples relativement à leur hauteur, que ces limes sont disposées en retour les unes sur les autres, à partir des bords et des angles d'un cristal élémentaire pris pour noyau de l'ensemble, et qu'enfin ces décroissements en gradins visibles ou invisibles sont assujettis aux lois de la symétrie. Ceci pose il s'agissait de s'assurer si les faces creusées n'auraient pas été soumises aux lois précédentes.

La disposition en gradins est facile à vérifier dans un grand nombre de cas, ils forment quelquefois autour d'un centre qui est celui des faces du noyau des contours anguleux analogues aux *bâtons rompus* ou aux *dessins à la grecque*, et si sur certains échantillons, ces lignes droites ou brisées anticipent légèrement les unes sur les autres, si elles manquent, si enfin elles sont remplacées par des contours arrondis, pourquoi n'appliquerait-on pas, à ces derniers traits seulement, et non à tout l'ensemble cristallin, l'idée d'un premier degré d'oblitération, comme on le fait pour les cristaux à arêtes cannelées ou pour ceux dont les faces sont convexes?

La loi de constance des angles est parfaitement observée pour les arêtes extérieures, mais ce qui précède fera deviner facilement que pour les arêtes intérieures elle sera assujettie aux mêmes vicissitudes que leur courbure, c'est-à-dire qu'elle ne se manifeste en général pas plus pour ces formes concaves que pour celles qui sont bombées, et les cristallographes sont assez habitués avec les exceptions de ce genre, pour ne pas rejeter une théorie qui a d'autres appuis. Cependant les exemples d'une certaine régularité ne manquent pas, ainsi les trémiés du sel de cuisine présentent la forme d'une pyramide quadrangulaire dont l'inclinaison des faces sur la base varie, d'après les observations de Capelle, de manière que la limite paraît être l'angle de 45 degrés correspondant au résultat d'un décroissement par une simple rangée de cubes.

Une série d'exemples pris dans différents types cristallins corrobore d'ailleurs les indications précédentes, en faisant voir que ces concavités sont assujetties à la loi de symétrie.

» Ainsi les cristaux dérivés du système cubique ont toutes leurs faces

creuses simultanément, et parmi les cristaux de ce genre on peut citer les cubes du bismuth fondu, du sel de cuisine, de la galène obtenue artificiellement par vaporisation, les octaèdres de l'oxyde blanc d'arsenic vaporisé de l'alun, du cuivre oxydulé de Chessy, et de l'argent fondu, enfin, il existe encore des trapézoèdres d'amphigène qui rentrent dans le même cas de symétrie.

Dans le système rhomboédrique, l'égalité complète des axes n'existe plus, et d'ailleurs les formes secondaires se compliquent, aussi la loi de symétrie se met en parfaite évidence dans les exemples suivants. Sur le quartz les faces creuses se dessinent particulièrement sur le sommet pyramidal, elles sont quelquefois toutes concaves simultanément, ou bien alternativement tres-évidées et presque comblées. Les faces latérales du prisme sont en général si faiblement entamées, qu'au premier aspect on pourrait douter de l'existence de la dépression, cependant, en y regardant de plus près, on s'assure qu'elle est au moins aussi manifeste que sur les faces presque planes du sommet pyramidal. La variété de chaux carbonatée dite triplante de Huy présente sur ses bords un creux profond et simplement triangulaire à cause de la correspondance qui existe entre ses côtes et les grandes facettes terminales. Enfin, dans le plomb phosphate annulaire et dans certains givres où la forme hexagonale domine dans toute sa pureté, les concavités des bases ont six côtés parallèles aux arêtes, et elles pénètrent aussi très-profondément dans la masse des cristaux.

Les scories provenant de certains traitements métallurgiques présentent fréquemment les formes du péridot, toutefois avec de légères variantes dans les angles. Ainsi, celles qui ont été trouvées dans un reverberatoire où l'on effectuait la réduction des minerais de plomb, sont jaunes, translucides, et cristallisent comme le péridot dans le système prismatique rectangulaire droit, tandis que celles qui proviennent de l'affinage du fer dérivant d'un prisme rhomboïdal droit et sont noires avec une poussière d'un gris olivâtre. Ces-ci ont déjà été décrites par M. Ebelmen, et il résulterait de ce rapprochement que l'introduction de l'oxyde de fer dans les silicates tend à détruire l'égalité des angles de ces prismes. Quoiqu'il en soit, ces deux variétés présentent, avec une netteté très-remarquable, des gradins très-profonds sur les faces octaédriques, et des concavités peu prononcées ou même nulles sur la truncature des sommets. Le feldspath binaire des microlites du lac Majeur offre quelquefois la face M profondément creuse, tandis que la face T présente une concavité douteuse, parce qu'elle est inégalement étendue, enfin les autres faces sont pleines.

» Le sulfate de fer épointé de Haüy nous fournit un dernier exemple de ces gradins intérieurs . ils sont prononcés, garnis de dentelures arrondies, et se manifestent tantôt sur les facettes triangulaires O, ou bien sur les faces octogonales P, enfin il existe des cristaux sur lesquels les deux genres de facettes montrent simultanément la même modification, et l'on doit voir que la loi de symétrie est de la dernière évidence dans cette forme assez complexe.

» En résumé, cette structure se rencontre sur toutes les faces de même espèce, et, dans le cas où le cristal est limité par des faces d'espèce différente, il peut y avoir un plein et un creux, en sorte que ce fait, déjà signalé par M. Beudant, aurait dû mériter une plus grande attention de la part des cristallographes.

» Si l'on juxtapose actuellement la section d'un cristal à gradins saillants et celle d'un cristal à faces concaves, on verra immédiatement que l'une des formes peut être considérée comme l'inverse de l'autre; il sera par conséquent permis d'admettre qu'elles sont produites toutes deux à la manière des formes dérivées, avec cette seule différence que, dans le premier cas, les gradins sont échelonnés à partir des arêtes ou des angles, tandis que, dans le second, ils fuient à partir du centre des faces du noyau cristallin. Nous exprimerons donc ce fait par les mots de *décroissement sur le centre* en opposition avec ceux de *décroissement sur les bords ou sur les angles*, déjà introduits dans la science par Haüy.

» Dans certains cas, on explique très-facilement la formation des faces creuses, telles que les trémies du sel de cuisine cristallisé par suite d'une évaporation suffisamment rapide sans être tumultueuse; il suffit, pour cela, d'imaginer un petit cube de sel nageant à la surface du liquide, de manière qu'une de ses faces soit à fleur d'eau, en sorte que, n'étant plus mouillée, elle ne peut plus éprouver aucun accroissement; mais l'évaporation, et par suite la concentration du liquide continuant à la surface, les nouvelles molécules cubiques qui surviennent se fixeront naturellement contre les arêtes supérieures, de manière à constituer une sorte de cadre dont le poids additionnel détermine une petite immersion du système. La nouvelle rangée se trouvera donc à son tour à fleur d'eau, position dans laquelle un second cadre s'établira sur les arêtes supérieures du premier, et ainsi de suite, en sorte que finalement on aura une masse infundibuliforme, ou un petit bateau carré dont les bords s'évasent au fur et à mesure de l'immersion.

» Mais cette explication ne pourrait déjà plus s'appliquer aux trémies hexagonales de certains givres qui, quoique entièrement plongés dans la va-

peur atmospherique, n en resultent pas moins d un groupement effectue sur les aretes seulement, elle n est pas davantage applicable aux faces creuses des cubes de la galene et des octaedres de l'acide arsenieux qui se forment de même dans les tas de grillage et dans les fentes des fourneaux remplies en entier par les gaz metalliques. Enfin les memes difficultes se presentent pour les cristaux de bismuth, d'alun, de sulfate de fer, et des scories dont l'impression dans le brin est complete. Il s'agit donc de trouver d'autres conditions, et, pour cela, resumons d'abord l'etat actuel de la question.

» Les cristallographes expliquent les diverses complications de forme des cristaux en supposant que les molecules, en meme temps qu'elles sont sollicitées par leur attraction mutuelle, ont aussi a vaincre l'attraction d'affinite du dissolvant qui agit pour les separer, en sorte que la resultant qui opere leur reunion est mesuree par l'excès d'une des forces sur l'autre. Or, la premiere de ces attractions est une *force constante*, puisque les molecules ne peuvent eprouver aucun changement, tandis que l'autre subit des modifications en raison de la composition du liquide, de sa densite, de sa temperature et autres circonstances. La resultant definitive est donc elle meme une *force variable*, et c'est à cette variabilité, developpee sous differentes conditions, que l'on attribue tous les resultats subordonnes de la cristallisation. Voyons maintenant si quelques faits speciaux nous donneront une idee plus approximative des causes de cette variabilité.

L'experience prouve que les cristaux à faces creuses se produisent dans les laboratoires lorsque leur developpement s'effectue au milieu de quelques matieres terieuses ou gelatineuses, lorsque les liquides sont purs, mais tres-concentres, ou enfin quand ils peuvent cristalliser rapidement par refroidissement. D'après cela, deux conditions essentielles paraissent, au premier aspect, avoir une influence prononcee, l'une etant purement mecanique, et l'autre serait la durée de l'operation, ou, autrement dit, le temps, car on remarquera d'ailleurs que le defaut d'abondance de la matiere, qui a ete quelquefois invoque pour expliquer nullement le phenomene, puisque ces cristaux, d'un volume considerable, se developpent au milieu meme d'un excès d'elements cristallisables, et que, en definitive, une quantité égale de matiere aurait pu aussi bien etre employée pour la formation d'un petit cristal complet, que pour la façon d'un squelette volumineux.

» Ceci pose, on doit dire que les actions mecaniques peuvent exercer une influence, non pas parce qu'elles tendent à diminuer l'espace, car la puissance des attractions moleculaires se joue de la resistance que lui opposent des matieres aussi peu solides que les argiles ou les gelées siliceuses

et d'hydrosilicates alumineux, mais parce que les pulvicules neutres qui se placent sur les molécules cristallines mettent un obstacle au rapprochement intime réclamé par les forces moléculaires. Cette cause a peut-être contribué au développement des cristaux creux du cuivre oxydulé de Chessy et du quartz car ces derniers, entre autres, présentent souvent des parties filiformes interposées entre les lames de décroissement. Mais on concevra encore que la ressource qu'elle offre est insuffisante, car des interpositions analogues ont dû aussi bien agir sur les parties voisines des arêtes dont le développement est parfait que sur les parties centrales. Il faut donc trouver dans ce phénomène quelque chose de plus qu'un simple résultat mécanique.

Le temps, avons nous dit, est la seconde des causes mises en avant par les cristallographes mais dans quel sens faut il prendre un mot aussi vague? qu'est-ce que le temps pour une substance dont la cristallisation est pour ainsi dire instantanée, comme l'est celle des liquides parfaits ou des métaux? Et jusqu'à quel point faut il l'allonger dans le cas d'une viscosité plus ou moins sensible comme c'est le cas pour les silicates en général? De quelle manière encore peut on l'appliquer aux tremées du givre dont les plus belles et les plus développées sont précisément celle qui se produisent quand la persistance du froid ou du rayonnement nocturne a été la plus considérable et il en est bien certainement de même pour les autres substances, telles que la glycérine et l'acide arsenieux, résultantes d'une condensation de vapeurs dont le dépôt aurait dans tous les cas eu le loisir de s'effectuer aussi bien sur le centre des faces que sur les arêtes?

Il y a dans cette circonstance une autre cause, et ne pourrait on pas la trouver dans l'attraction générale qu'exercent les surfaces sur les molécules d'une dissolution? On sait qu'un corps dissout cristallise avec une plus grande rapidité lorsque des corps solides sont suspendus dans le liquide que quand ceux-ci ne s'y trouvent pas, par la même raison comme l'observe M. Mitscherlich les cristaux se déposent bien plus vite autour d'un cristal déjà formé que dans toute autre partie du liquide ambiant. Ajoutons maintenant que cette attraction des surfaces est dans un certain rapport avec le développement de celles-ci, aussi les aspérités et les fibrilles dont la superficie est un maximum relativement au volume constituent toujours des centres de cristallisation mais les arêtes et les angles d'un cristal sont autant de parties analogues aussi les *forces de contact ou catalytiques* y exercent naturellement une plus grande action que sur le centre des faces. On peut donc expliquer par leur moyen cette tendance en vertu de laquelle la nature semble s'attacher à disposer d'abord la charpente, et, si il est permis de s'exprimer ainsi, l'ossature des

cristaux, conformément aux règles qui caractérisent l'espèce. Le temps et les autres circonstances interviennent seulement ensuite pour combler les intervalles, c'est pourquoi il est si fréquent de voir sur le centre de certaines faces appartenant à des formes complètes, des espèces de nébulosités indiquant quelque chose d'incomplet dans l'œuvre de la cristallisation, ou bien une certaine porosité qui serait l'expression de l'imperfection du remplissage définitif des concavités. C'est peut-être encore en se basant sur les déductions de ce mode d'achèvement d'un cristal que l'on trouvera la cause des différences de dureté que l'on remarque non seulement entre ses faces mais encore entre celles-ci et ses arêtes ou ses angles.

Nota. C'est par suite d'une erreur que dans la Notice sur l'influence de la pression dans les phénomènes géologico-chimiques insérée dans les *Comptes rendus*, tome XVIII page 414 ligne 25 l'expérience de M. Beudant a été considérée comme un résultat de la pression.

GÉOLOGIE. — *Sur divers phénomènes diluviens observés dans le département de l'Ariège et quelques vallées voisines, par M. E. DUBOIS, ingénieur des Mines (Extrait)*

(Commissaires, MM. Al. Brongniart, Élie de Beaumont, Dufrénoy)

La première inspection de la vallée de l'Ariège suffit pour montrer quel rôle important les phénomènes diluviens ont joué dans le creusement et l'élargissement de cette vallée. À Foix, à Montgaillard, à Saint-Antoine on reconnaît que le lit actuel de l'Ariège a été creusé dans une nappe diluvienne des *micux calcaireuses*, qui a plus de 20 mètres de puissance en certains endroits. L'écoulement des eaux a ainsi donné naissance à une deuxième vallée dans la vallée principale.

Si l'on remonte l'Ariège, on voit, au-dessus de Tarascon, plusieurs lignes de blocs erratiques parallèles au cours de la rivière et cela aux environs des Cabanes, au-dessous de l'Audoubert et dans les vallées affluentes, notamment dans les vallées de Bonan et Larnat, où ces blocs sont fort nombreux. La vallée de Vicdessos, qui débouche à Tarascon dans la vallée de l'Ariège, contient aussi des blocs erratiques bien caractérisés. Le bloc du col de Sem, notamment, qui est désigné dans le pays sous le nom de *palet de Samson* est isolé sur un rocher escarpé, ce qui lui donne une position hardie et pittoresque dont tous les étrangers sont frappés.

Sans doute je ne prétends pas dire que la débâcle diluvienne a seule creusé les vallées de l'Ariège et de Vicdessos. Le soulèvement granitique qui

a crée le relief principal des Pyrénées, et celui des Ophites et des Lherzolites qui a profondément modifié ce relief, ont dû produire dans les couches des calcaires des déchures violentes qui ont été en quelque sorte les rudiments de la vallée, puis sont venus les phénomènes ératiques, de façon que l'écrêtement grossier produit par l'action soulevante des roches cristallines a tracé pour ainsi dire, l'itinéraire par où les courants diluviens se sont créé une voie et ont ainsi en définitive creusé élargi façonné les vallées de Vicdessos et de l'Ariège.

En parcourant ces deux vallées où l'action diluvienne a laissé des traces manifestes on remarque d'ordinaire un élargissement subit aux points de jonction de la vallée principale avec les vallées secondaires. Cet élargissement ne se continue pas fort loin du point de jonction il forme, le plus souvent un petit bassin en plaine plus fertile et mieux cultivé que le reste du sol, et, un peu plus bas la vallée reprend une largeur peu différente de celle qu'elle avait au-dessus du point de croisement.

Une deuxième circonstance qui accompagne souvent cet élargissement est un bassin des vallées de l'Ariège et de Vicdessos aux points de jonction des vallées voisines c'est la présence d'une roche isolée abrupte, plus ou moins élevée en aval du point de croisement. Tels sont les *rochers de Foix* de Montgaillard de Tarascon, dans la vallée de l'Ariège ceux du Calvaire et de Montreuil dans la vallée de Vicdessos et le rocher d'*Antorria-la Viella*, sur le revers méridional des Pyrénées.

Les considérations suivantes me paraissent expliquer ces deux circonstances qui accompagnent, en plusieurs points le croisement des vallées ou les phénomènes diluviens ont eu une action puissante.

Soient A et B deux vallées qui se croisent et qui ont été creusées en partie ou du moins profondément modifiées par des courants diluviens comme c'est le cas des vallées qui nous occupent, soient *ao* *bo* les axes de ces vallées représentant aussi les directions des courants diluviens (le lecteur pourra facilement suppléer à la figure), au point *o*, où a dû se faire grossièrement le choc des deux courants diluviens, on peut concevoir que, par suite de l'élasticité des masses transportées, les deux courants ont modifié l'un l'autre leur direction et leur vitesse de manière à suivre après le choc les directions initiales *oc* *od* ces directions initiales *oc*, *od* dépendent de diverses circonstances, et notamment de la direction et de l'intensité des courants avant le choc, de la nature des masses de transport, et aussi de la consistance des parois encaissantes, puis ces directions *oc*, *od* ont été successivement modifiées par la résistance des roches formant parois, et elles ont ainsi formé deux lignes

courbes, convergentes en un certain point I, et la les deux courants diluviens, se réunissant sous un petit angle, sont restés sensiblement unis, et ont continué à creuser la vallée suivant une direction inconnue cette direction dépend surtout de la position des vides antérieurs formés par la rupture des roches de soulèvement, et dépend aussi de la direction du courant, en un mot, le courant diluvien résultant se creusera une issue en suivant principalement la ligne de moindre résistance, et obéissant en partie à sa propre direction.

On voit donc qu'à partir du point o, la portion de terrain qui sera le plus directement, le plus violemment soumise à l'action nivaleuse des deux courants diluviens, sera l'espace correspondant aux deux bandes parcourues par les courants déviés de là, tendance des deux courants à l'élargissement de la vallée en forme de bassin. L'espace intérieur circonscrit par ces deux bandes sera moins soumis à la violence des courants diluviens, pourtant comme les choses ne se passeront pas d'une manière aussi simple qu'on le dit ici, l'action érosive des courants sera encore assez puissante dans cet espace central, et si n'existe pas là de roches consistantes en masse considérable, la portion de terrain correspondante aux deux bandes latérales et à l'espace qu'elles entourent sera nivelée en entier, et ne formera plus qu'un bassin en plaine, en aval du point de jonction des vallées c'est la le cas ordinaire.

Mais si l'on se trouve à l'intérieur de l'espace circonscrit par les courants déviés un massif de roches consistantes M, on conçoit que ce massif M, étant moins violemment tourmenté que les roches voisines, pourra résister et survivre à l'action diluvienne, c'est ce qui explique la présence de roches semblables qu'on trouve parfois aux points de croisement des vallées. Ces roches, qui ont été usées sur toutes leurs faces verticales par l'action érosive des courants, sont le plus souvent à pic, et offrent un aspect vraiment pittoresque.

Ces roches isolées sont fréquemment à stratification verticale, telles sont les roches de Montréal et du Calvaire, à Vicdessos dans ce cas, on remarque souvent que les deux parois de la vallée sont formées par des roches en éventail, inclinées en sens inverse, de telle sorte que le courant diluvien entraîne les roches inclinées voisines de ces parois, tandis qu'il laisse debout les roches verticales du milieu de la vallée.

Les phénomènes diluviens ont laissé dans l'Ariège des traces évidentes de leur action, la présence des blocs erratiques, par exemple, est comme un témoin irrécusable de cette époque diluvienne.

• Vers le haut de la vallée de Vicdessos, on rencontre quelques blocs er-

ratiques il est du boug de ce nom, tout pres du col de Sem on voit un rocher isolé posé sui des rochers a pic, et qui est designé dans le pays sous le nom de *palet de Samson*. Ce roc isolé, dont j'ai deja parlé, est de nature primitive, a gros grains le granit dont il est formé est identique à celui qu'on trouve pres des ports de Vicdessos, sur la frontiere de la Catalogne et de la vallée d'Andorre. La position de ce bloc, sa nature différente de celle des calcaires sui lesquels il repose, font penser que c'est un bloc erratique venu de la haute chaîne des Pyrenees.

PHYSIQUE — *Recherches sur l'intensité de la lumiere emise par le charbon dans l'experience de Davy, par MM FIZEAU et L. FOUGAULT*

(Commissaires, MM Arago, Dumas, Regnault)

On voit avec quelle facilité l'on peut repeter aujourd'hui l'expérience de l'incandescence du charbon par la pile au moyen du puissant instrument que M. Bunsen a mis récemment entre les mains des physiciens, des lors il nous a semble possible de tenter quelques expériences dans le but de comparer cette source lumineuse aux autres sources les plus remarquables par leur intensité. Nous avons choisi pour cette comparaison la lumiere solaire et la lumiere produite par la chaux placée dans la flamme du chalumeau à gaz oxygene et hydrogene.

Notre but n'étant pas de comparer entre elles les quantités de lumiere versées par ces différentes sources, mais de comparer leurs intensités memes le choix du procédé photométrique devenant difficile, nous avons donc pensé à avoir recours aux propriétés chimiques de la lumiere. Cette application des procédés photographiques, indiquée il y a plusieurs années par M. Arago n'a pas encore été tentée, ce qui nous oblige à exposer en quelques mots les principes sur lesquels nous nous sommes appuyés.

Il est certain, d'après ce que l'on sait aujourd'hui sur les propriétés chimiques de la lumiere, que l'on ne peut pas confondre en général l'intensité chimique des radiations avec leur intensité optique, de sorte que l'on peut concevoir deux faisceaux lumineux tels que, le premier possédant une intensité optique supérieure à celle du second, le second, au contraire, l'emporte sur le premier en intensité chimique.

Il suit de là qu'un procédé photométrique fondé sur les propriétés chimiques de la lumiere ne doit être considéré que comme donnant la mesure de l'intensité chimique des sources lumineuses. C'est donc dans ce sens qu'il convient d'interpréter ce que nous allons dire sur les moyens de com-

parer les intensités de deux sources lumineuses, par leurs effets sur les substances impressionnables.

» Si l'on expose une couche sensible à l'influence de l'image formée par un objet lumineux au foyer d'une lentille, le degré d'altération qu'elle subit dépend du temps d'exposition et de l'intensité de l'image focale.

» Si dans deux expériences ce temps et cette intensité focale restent constants, le degré d'altération sera le même, si, le temps étant le même, on obtient le même degré d'altération, on en pourra conclure que l'intensité focale est la même. Or cette intensité i de l'image focale est liée à l'intensité I de l'objet lumineux, au rayon d'ouverture de la lentille r , et à la distance focale d par la relation

$$(1) \quad i = \frac{I r^2}{d^2} = i \operatorname{tang}^2 \alpha,$$

α étant l'angle sous lequel on verrait l'ouverture en se plaçant au foyer

» Par conséquent, si dans un même temps on obtient le même degré d'altération dans deux mêmes couches sensibles placées aux foyers de deux lentilles pour lesquelles les angles α et α' seront différents, et que l'on aura dirigées vers deux objets lumineux d'intensités I et I' , on en pourra conclure l'égalité des intensités focales $i = i'$, ou bien, par suite de la relation (1),

$$I \operatorname{tang}^2 \alpha = I' \operatorname{tang}^2 \alpha',$$

d'où l'on tire

$$\frac{I}{I'} = \frac{\operatorname{tang}^2 \alpha'}{\operatorname{tang}^2 \alpha},$$

or, ces tangentes étant données par la mesure directe des ouvertures et des distances focales des deux lentilles, on aura donc le rapport entre les intensités des deux sources lumineuses.

» Dans ces sortes d'expériences il est quelquefois difficile de disposer les ouvertures et les distances focales de manière à obtenir un même degré d'altération dans le même temps; il était donc important de pouvoir arriver au rapport $I : I'$ en obtenant un même degré d'altération dans des temps différents.

» Pour cela il suffirait d'admettre, ce qui d'abord semble probable, qu'il y a égalité d'action chimique lorsque les temps sont en raison inverse des intensités. Il fallait rechercher jusqu'à quel point ce principe était vrai; c'est ce que nous avons fait dans les expériences suivantes :

» Nous avons dirigé une chambre obscure sur une lampe à lumière bien

fixe, puis, en faisant varier l'intensité focale avec des diaphragmes variables, nous avons obtenu sur une couche sensible une série d'images de la lampe, la durée de l'impression pour chaque image étant en raison inverse de l'intensité focale

Nous avons trouvé que les images successives ainsi obtenues sont sensiblement égales tant que les temps et les intensités varient entre les limites 1 et 10, c'est-à-dire tant que les rapports $\frac{t'}{t} = \frac{i'}{i}$ n'atteignent pas une valeur plus grande que 10. Si l'on continue à faire varier l'intensité et le temps au delà de cette limite, on s'aperçoit bientôt que les images ne sont plus égales, pour les valeurs $t' = 60 t$ et $i' = \frac{1}{60} i$, l'image obtenue avec l'intensité i' et le temps t' est incontestablement plus faible que celle qui a été produite par l'intensité i et le temps t .

Il n'est donc pas rigoureusement exact de dire qu'il y a égalité d'action chimique lorsque les temps varient en raison inverse des intensités, mais nos expériences nous ont montré que l'on pouvait sans erreur sensible admettre ce principe entre des limites de temps telles que l'on ait $t' < 10 t$.

C'est-à-dire qu'entre ces limites, si l'on a $\frac{t'}{t} = \frac{i'}{i}$, on aura égalité d'action chimique.

Reciproquement, si l'on a égalité d'action chimique dans des temps t et t' renfermés entre ces limites, on en pourra conclure le rapport entre les intensités focales i' et i ,

$$\frac{i'}{i} = \frac{t'}{t},$$

ou bien, d'après la relation $i = I \tan^2 \alpha$,

$$(2) \quad \frac{I \tan^2 \alpha}{I' \tan^2 \alpha} = \frac{t'}{t}, \quad \text{d'où} \quad \frac{I}{I'} = \frac{t' \tan^2 \alpha}{t \tan^2 \alpha},$$

ce qui permet d'obtenir le rapport entre les intensités de deux sources lumineuses dans le cas plus général où, les temps d'expositions, les ouvertures et les foyers des lentilles étant différents, on a obtenu un même degré d'altération dans deux mêmes couches sensibles.

Il s'agit donc, en dernière analyse, de déterminer, dans la série des altérations qu'éprouvent les couches sensibles, un point fixe qui permette de reconnaître qu'elles ont subi un même degré d'altération.

La couche sensible qui nous a paru le mieux se prêter à cette détermi-

uation, en raison de sa préparation assez facilement constante, est la couche d'iodure d'argent de M. Daguerre, et le point fixe que nous avons adopté est le degré d'altération auquel la couche sensible commence à condenser la vapeur du mercure, c'est le point auquel commence à naître l'image photographique.

Cette couche d'iodure d'argent, quoique peu impressionnable en comparaison des couches sensibles employées aujourd'hui, nous a présenté de graves difficultés, par la rapidité avec laquelle elle s'est impressionnée sous l'influence des radiations très-intenses que nous voulions étudier. On comprendra cependant que nous ayons rejeté l'emploi de papiers sensibles, moins impressionnables il est vrai, mais aussi d'une préparation difficilement constante, et surtout ne présentant pas dans la série de leurs altérations un point fixe aussi facile à reconnaître que celui que nous venons de signaler dans la couche d'iodure d'argent. Cependant nous devons dire que cette dernière couche sensible elle-même doit être préparée, pour des expériences comparatives, par des moyens absolument identiques et par la même personne, des différences en apparence insignifiantes dans son mode de préparation pouvant faire varier sa sensibilité d'une manière très-notable.

Les expériences étaient faites de la manière suivante :

Une chambre obscure était dirigée vers la source lumineuse, le corps lumineux formait ainsi son image au foyer de la lentille. Cette image ayant de petites dimensions dans nos expériences, on pouvait, en déplaçant un peu l'axe de l'instrument, la déplacer elle-même dans le plan focal.

La lentille étant couverte par un écran, on plaçait la plaque sensible dans le plan focal, on soulevait alors l'écran pendant un temps compté avec soin, puis, ayant déplacé un peu l'axe de l'instrument, on soulevait de nouveau l'écran, pendant un temps un peu différent, et ainsi de suite on obtenait cinq ou six impressions successives correspondant à des temps différents.

La plaque étant alors soumise aux vapeurs du mercure, on voyait naître une série d'images décroissantes correspondant aux différents temps de l'impression, si l'expérience avait réussi, la série était incomplète, l'altération de la couche sensible, pendant les temps les plus courts, n'ayant pas été suffisante pour la rendre apte à agir sur la vapeur de mercure. On notait le temps correspondant à la première image, c'est-à-dire à l'image naissante, puis on mesurait l'ouverture de la lentille et sa distance focale.

En opérant de la même manière sur une autre source lumineuse, on avait de même le temps correspondant à l'image naissante, l'ouverture de la lentille et la distance focale.

De ces quantités on déduit, par la relation (2), le rapport 1 l' Nous avons ainsi opéré 1° sur le soleil, 2° sur les charbons incandescents d'une pile 3° sur un fragment de chaux placé dans la flamme du chalumeau à gaz oxygène et hydrogène

1° Pour le soleil, nous avons fait usage d'une chambre obscure, munie d'une lentille achromatique de 1^m,413 de foyer l'ouverture était limitée par des diaphragmes compris entre 1^{mm},3 et 3 millimètres

2° Pour les charbons de la pile et la chaux du chalumeau à gaz, nous avons fait usage de lentilles d'un foyer principal plus court, plaçant alors la lentille à une distance de la source lumineuse égale au double de la distance focale principale, nous pouvions opérer sur une image dont les dimensions étaient celles du corps lumineux lui-même. Le peu d'étendue de ces sources lumineuses rendait nécessaire une telle disposition. La distance focale déterminée par cette position de l'objet était de 0^m,56 dans nos premières expériences, et fut portée, dans les suivantes, à 1^m,125. L'ouverture du diaphragme varia entre 17 et 3 millimètres

Dans toutes nos expériences les temps correspondant à la naissance de l'image furent compris entre 3 secondes et $\frac{1}{2}$ de seconde, on comptait les quarts ou les cinquièmes de seconde

Lumière solaire — Les expériences relatives à la lumière solaire ont été faites dans les mois d'août et septembre derniers, et répétées dans les premiers jours d'avril courant

Il fallait opérer par un temps très-pur et à des heures voisines de midi, conditions auxquelles il a été rare de pouvoir satisfaire simultanément

» Deux séries ont réussi l'une, le 2 avril à 1^h 15^m, par un temps d'une pureté remarquable, nous a donné la plus grande intensité, nous la représentons par

1 000

L'expérience, répétée le même jour à midi 40 minutes, a donné

le même nombre

1 000

L'autre, le 20 septembre à 2 heures, par un ciel d'un bleu pâle, a donné une intensité plus faible

751

» Il sera intéressant de répéter comparativement ces expériences vers le solstice d'été ainsi qu'à des heures variables de la journée, c'est ce que nous nous proposons de faire

Lumière de la pile — Pour la lumière des charbons de la pile nous avons fait nos premiers essais en plaçant les charbons dans le vide, mais nous avons été obligés de renoncer à ce moyen, par la rapidité avec laquelle les parois intérieures du globe de verre se ternissent. Dans un gaz non com-

bustible le même effet se fût produit il fallait donc opérer à l'air libre et cependant éviter la combustion rapide que les charbons ordinairement employés subissent dans ce cas. L'un de nous M. Foucault, a atteint ce but par l'emploi du charbon provenant de la distillation de la houille, ce charbon permet d'obtenir à l'air libre une lumière fixe et surtout durable, à cause de la lenteur de sa combustion, toutes nos expériences ont été faites avec ce charbon.

Dès nos premiers essais nous avons remarqué une différence notable dans la distribution des surfaces lumineuses sur les deux pôles de la pile le pôle positif l'emportant de beaucoup en surface lumineuse et même en intensité sur le pôle négatif.

Le premier présente une surface circulaire de 2 ou 3 millimètres de diamètre douée d'un éclat à peu près uniforme en dehors de cet espace l'intensité décroît rapidement le second ne présente qu'une surface plus petite et qui nous a paru moins brillante. L'arc lumineux qui les unit émet une lumière d'un bleu pourpré et d'une intensité optique évidemment inférieure à celle des deux pôles.

Le pôle positif se prêtait donc le mieux à nos expériences, c'est sur lui que nous avons opéré.

La pile était, comme nous l'avons dit, une pile de Bunsen dont les dimensions étaient telles que les cylindres de charbon d'un diamètre intérieur de 5^{cent},5 plongeaient dans l'acide de 9 centimètres l'acide nitrique employé marquait 20 degrés à l'aréomètre, et l'acide sulfurique 15 degrés.

Dans ces conditions, nous avons obtenu les nombres suivants

46 couples ont donné pour intensité	235,
80 couples ont donné	338

Si l'intensité ne varie pas d'une manière notable avec le nombre des couples, elle s'accroît beaucoup avec leur surface, comme on pouvait le prévoir.

46 couples simples ayant donné	235
Trois séries semblables réunies pôle à pôle, ou 46 couples à grandes surfaces, la pile fonctionnant depuis une heure, ont donné	385

Ce qui nous a empêché de varier ces expériences autant que nous l'aurions désiré, c'est l'affaiblissement assez rapide qu'éprouve la pile lorsqu'elle est montée depuis quelque temps, lors même que le circuit n'est pas fermé.

Avril

80 couples ayant donne pour intensite	238,
les memes 80 couples, trois heures apres, ont donne	159,
46 couples ayant donne	235,
40 couples une autre fois, la pile etant montee depuis deux heures, ont donne	136,
Dix series semblables pôle à pôle ou 40 couples doubles dans les memes circonstances	238

L'augmentation d'intensité avec la surface est ici remarquable

La moyenne des deux premiers nombres 235 et 238 doit être regardée comme l'expression de l'intensité produite par une série de couples de Bunsen de la dimension indiquée en nombres compris entre 46 et 80, et dans les premiers temps de leur action il faut ajouter la condition que le circuit sera fermé par le charbon très dense que nous avons employé, car il nous a paru que les charbons d'une densité moindre produisaient une intensité moindre aussi.

Cette intensité peut être prise pour unité et comparée alors à l'intensité solaire du 2 avril, on a le rapport 1 : 4,23, la plus grande intensité 385 produite par 46 couples à grande surface, comparée de la même manière, donnerait le rapport 1 : 1,59, mais le nombre 385 est certainement trop faible, car il a été obtenu lorsque la pile fonctionnait depuis une heure, et des lors avait dû s'affaiblir. Nous pensons rester au-dessous de la correction à faire en donnant le rapport 1 : 2,5.

Lumière produite par le gaz oxygène et hydrogène projeté sur de la chaux — Nous avons trouvé pour son intensité un nombre d'une faiblesse inattendue, en effet,

I intensité solaire, le 2 avril, étant	1000,
L'intensité de la lumière du chalumeau à gaz a été trouvée	6,85

Ce nombre est le plus grand que nous ayons pu obtenu en augmentant la pression sous laquelle s'échappait le gaz autant que le permettait l'appareil dont nous disposions, cette pression était produite par un poids de 20 kilogrammes sur une surface de 430 centimètres.

Quand on diminue la pression ou que l'on retarde par quelque obstacle la vite de l'écoulement du gaz, l'intensité décroît rapidement, en effet, nous avons substitué un orifice plus étroit, et l'intensité trouvée dans ce cas n'a plus été que 3,4.

» Au lieu de diminuer l'orifice du chalumeau, nous avons réduit le poids à 8 kilogrammes, l'intensité est descendue à 0,86.

Avec le même orifice et le même poids l'addition d'un tube de sûreté en plomb qui permettait de placer le réservoir du gaz dans une pièce voisine, a réduit l'intensité à 0,54

En prenant pour unité l'intensité maximum 6 85 et la comparant à celle de la lumière solaire et de la lumière de la pile on trouve

Avec l'intensité solaire	le rapport	1	146
Pour 46 couples à grande surface		1	56
Pour 46 couples ordinaires		1	34 3

Le procédé photométrique sur lequel reposent ces déterminations d'intensité donne en réalité la mesure des intensités chimiques des sources lumineuses, comme nous l'avons dit, or, la faible intensité trouvée pour la lumière produite par le gaz pouvait être expliquée en admettant que les intensités chimiques seraient très-différentes des intensités optiques dans les sources lumineuses que nous comparions, nous avons donc été conduits à tenter la mesure des intensités optiques par la voie ordinaire des comparaisons simultanées

Des difficultés de mise en expérience nous ont empêché de donner à cette partie de notre travail l'étendue qu'elle méritait cependant nous avons obtenu, dans la comparaison optique de la lumière produite par le gaz avec celle des charbons de la pile, des résultats assez nets

Sans décrire en détail la disposition photométrique que nous avons adoptée, nous dirons qu'au moyen d'une lentille, les images des deux sources lumineuses venaient se former l'une à côté de l'autre sur un écran translucide, avec des dimensions égales à celles des objets lumineux chacun des faisceaux lumineux qui formaient chacune des images était limité par un diaphragme, l'ouverture de l'un de ces diaphragmes pouvait varier par degrés insensibles, de manière à permettre d'amener les deux images à la même intensité Cette égalité étant obtenue, le rapport inverse des surfaces des diaphragmes donnait le rapport entre les intensités lumineuses

Les deux surfaces lumineuses avaient, dans nos expériences, des dimensions sensiblement égales

Les intensités optiques de la lumière émise par le chalumeau à gaz, comparée à la lumière produite par 46 couples, ont été trouvées, par cette méthode, dans les rapports suivants

1	26,5
1	33 6
1	37,7

Les intensités chimiques avaient été trouvées 1 34,3

Bien que ces nombres soient assez différents, nous pensons que l'on peut en conclure que ces deux sources lumineuses possèdent des intensités optiques et des intensités chimiques qui sont sensiblement dans le même rapport

Si l'on considère la grande différence d'intensité qui existe entre ces deux sources de radiation, et surtout la nature très-différente des causes physiques qui leur ont donné naissance, on est conduit à généraliser ce résultat et à regarder comme très-probable que les radiations lumineuses émanées de sources différentes mais qui produisent de la lumière blanche, possèdent des intensités optiques et des intensités chimiques qui sont dans le même rapport

» Si l'on admet ce principe, les mesures d'intensité chimique que nous avons données dans ce travail, et qui se rapportent à la lumière solaire, à celle des charbons de la pile, et à celle du gaz oxygène et hydrogène projeté sur de la chaux, seraient également les mesures des intensités optiques de ces sources lumineuses

Après avoir rendu un compte verbal de ce Mémoire, M. ARAGO a rappelé les expériences, déjà très-anciennes, à l'aide desquelles il compara, par des moyens photométriques directs, la lumière du soleil et celle des charbons de la pile

M. LECCHI soumet au jugement de l'Académie un *appareil photographique* qui diffère principalement de ceux que l'on emploie d'ordinaire, en ce que dans sa chambre obscure, l'image est produite au moyen d'un miroir périscope en verre étamé. M. Lecchi assure que pour avoir une épreuve nette, il faut que la plaque sensible ne soit pas placée tout à fait au foyer. Afin d'éviter les tâtonnements à cet égard, il a adapté à la chambre noire un petit mécanisme au moyen duquel la distance de l'objet à représenter étant connue, on règle les positions respectives de la plaque et du miroir en faisant mouvoir une aiguille sur une sorte de cadran où sont marquées les distances en usage pour le portrait

(Commissaires, MM. Arago, Babinet, Regnault)

M. FAULCON soumet au jugement de l'Académie un *nouveau système de chemins de fer à pression pneumatique*. Dans ce système, qui n'a encore été l'objet que d'essais en petit, la machine à vapeur agit non plus comme pompe aspirante, mais comme pompe foulante. Le tube pneumatique, au lieu d'être solide et ouvert dans le haut sur toute son étendue, est flexible, suscep-

table de s'affaisser sur lui même et de se gonfler alternativement, et clos dans tout son pourtour. Le piston, qui, dans le système Clegg et autres systèmes analogues glisse dans l'intérieur du tube est remplacé ici par un galet à gorge qui se meut à la surface du tube flexible et qui est d'ailleurs, de même que le piston, lié au convoi par des tiges verticales rigides. Ce galet est disposé de manière à réguler le long d'une plaque de fer qui occupe la partie centrale du chemin. Le tube, qui repose également sur cette plaque est pressé par la gorge plate du galet, qui applique étroitement ses deux parois l'une contre l'autre sans d'ailleurs pouvoir les écraser leur double épaisseur étant justement égale à la hauteur des deux filets extérieurs du galet. Cela pose ou conçoit que lorsque la machine soufflante est mise en jeu le tube flexible tend à se gonfler ce qu'il ne peut faire sans pousser en avant le galet dont le mouvement détermine celui du convoi.

M LANTERY occit relativement à l'emploi des *sections musculaires* dans les traitements des déviations de l'épine

(Renvoi à la Commission nommé pour le Mémoire de M. Malgaigne)

CORRESPONDANCE

M ARAGO présente au nom de l'auteur M. le docteur *Sturmer*, trois volumes de *Lettres* sur diverses questions relatives à la médecine et spécialement à la conciliation des doctrines homéopathique et allopathique. Plusieurs de ces *Lettres* ont aussi rapport à l'enseignement médical en Allemagne et en Russie (Voir au *Bulletin bibliographique*)

M LIBRI annonce, de la part de madame la comtesse Fossombroni, la mort de M. le comte Fossombroni, son mari, qui était correspondant de l'Académie pour la Section de Mécanique. M. Fossombroni, décédé à Florence le 13 avril dernier, à l'âge de quatre-vingt-neuf ans possédait des connaissances très variées. Il a publié divers ouvrages de Mathématiques et de Mécanique, et il n'a cessé de travailler jusqu'à ses derniers jours. M. Libri avait reçu dernièrement un poème fort remarquable sur Galilée, composé par cet illustre vieillard. M. Fossombroni était depuis très-longtemps premier ministre de S. A. I. et R. le grand-duc de Toscane, et il s'était servi de l'influence qu'il exerçait, pour appliquer très-heureusement à une province en-

tière (la *Valdichiana*) la méthode des *colmates* (des atterrissements), si utile pour dessécher les marais. Ces grands travaux avaient mérité à M. Fossombroni la reconnaissance du pays.

Sur l'invitation de M. le Président, M. Libri écrira à madame la comtesse Fossombroni, pour lui exprimer les regrets de l'Académie.

PHOTOGRAPHIE — *Sur un nouveau moyen de préparer la couche sensible des plaques destinées à recevoir les images photographiques, par M. DAGUERRÉ* (Lettre à M. Arago.)

Vous avez bien voulu annoncer à l'Académie que j'étais arrivé, par une suite d'expériences, à reconnaître d'une manière certaine que, dans l'état actuel de mon procédé, la couche sensible à la lumière étant trop mince, elle ne pouvait fournir toute la dégradation de teintes nécessaire pour reproduire la nature avec relief et fermeté en effet, quoique les épreuves obtenues jusqu'à ce jour ne manquent pas de pureté, elles laissent, à quelques exceptions près, beaucoup à désirer sous le rapport de l'effet général et du modelé (1).

C'est en superposant sur la plaque plusieurs métaux, en les y réduisant en poussière par le frottement et en acidulant les espaces vides que laissent leurs molécules, que je suis parvenu à développer des actions galvaniques qui permettent l'emploi d'une couche d'iodure beaucoup plus épaisse sans avoir à redouter, pendant l'opération de la lumière dans la chambre noire, l'influence de l'iode devenu libre.

La nouvelle combinaison que j'emploie, et qui se compose de plusieurs iodures métalliques a l'avantage de donner une couche sensible qui se laisse impressionner simultanément par toutes les valeurs de ton, et j'obtiens ainsi dans un très-court espace de temps, la représentation d'objets vivement éclairés avec des demi-teintes qui conservent toutes, comme dans la nature, leur transparence et leur valeur relative.

En ajoutant l'or aux métaux dont je me servais d'abord, je suis parvenu à aplanner la grande difficulté que présentait l'usage du brome comme substance accélératrice. On sait que les personnes très-exercées pouvaient seules employer le brome avec succès et qu'elles n'arrivaient à obtenir le maximum

(1) Sur la plaque décapée au moyen de la couche d'or, comme je l'ai indiqué, on obtient très-rapidement des épreuves d'une grande finesse, mais qui manquent aussi de modelé, à cause du peu d'épaisseur de la couche sensible.

de sensibilité que par hasard, puisque ce point est impossible à déterminer très-précisément, et qu'immédiatement au delà le brome attaque l'argent et s'oppose à la formation de l'image (1)

» Avec mon nouveau moyen, la couche d'iode est toujours saturée de brome, puisqu'on peut laisser sans inconvénient la plaque exposée à la vapeur de cette substance la moitié au moins du temps nécessaire, car l'application de la couche d'or s'oppose à la formation de ce qu'on appelle *le voile de brome*. Il ne faut cependant pas abuser de cette facilité, car la couche d'or, étant très-mince, pourrait être attaquée, surtout si on l'avait trop usée par le polissage (2). On trouvera peut-être le procédé que je vais donner un peu compliqué, mais, malgré le désir que j'avais de le simplifier autant que possible, j'ai été au contraire conduit, par les résultats de mes expériences, à multiplier les substances employées qui, toutes, jouent un rôle important dans l'ensemble du procédé. Je les regarde comme étant toutes nécessaires pour obtenir un résultat complet, et cela doit être, puisque ce n'est que graduellement que je suis arrivé à découvrir les propriétés de ces différents métaux, dont l'un aide à la promptitude, l'autre à la vigueur de l'épreuve, etc (3).

Il naît du concours de ces substances une puissance qui neutralise tous les effets inconnus qui venaient si souvent s'opposer à la formation de l'image (4).

» Je crois d'ailleurs que la science et l'art ne doivent pas être arrêtés par la considération d'une manipulation plus ou moins longue, on doit se croire heureux d'obtenir à ce prix de beaux résultats, surtout lorsque les moyens d'exécution sont faciles.

(1) Tout le monde sait que la vapeur sèche du brome est plus favorable que celle qu'on obtient au moyen de l'eau bromée, car cette dernière a l'inconvénient d'entraîner avec elle de l'humidité qui se condense à la surface de la plaque. L'emploi de l'huile que j'indique plus loin neutralise cet effet et donne à la vapeur du brome étendue d'eau la même propriété qu'à celle du brome sec.

(2) Cela est tellement vrai que, si l'on fait une épreuve sur une plaque qui a été fixée plusieurs fois, on peut la laisser à l'exposition de la vapeur du brome autant de fois en plus du temps nécessaire qu'elle a reçu de différentes couches d'or.

(3) Je veux dire seulement que l'emploi de tous les métaux que j'indique plus loin est indispensable, mais la manière de les appliquer peut varier.

(4) Car, en multipliant ces éléments comme dans une pile, on augmente cette puissance, et l'on parvient ainsi à faire agir dans le même temps les radiations les plus paresseuses, telles que celles du rouge et du vert.

Cir la preparation galvanique de la plaque ne presente aucune difficulte l'operation se divise en deux parties principales la premiere, qui est la plus longue, peut etre faite tres longtemps a l'avance, et peut etre considerée comme le complément de la fabrication de la plaque Cette operation une fois faite, sert indéfiniment, et l'on peut, sans la recommencer, faire un grand nombre d'épreuves sur la meme plaque

Designation des nouvelles substances

- Solution aqueuse de bichlorure de mercure (sublimé corrosif),
- » Solution de cyanure de mercure,
- Huile de pétrole blanche acidulée avec de l'acide nitrique,
- Dissolution de chlorure d'or et de platine

Preparation des substances

Solution aqueuse de bichlorure de mercure (sublime corrosif) — 5 decigrammes de bichlorure de mercure dans 700 grammes d'eau distillée

Solution de cyanure de mercure — On sature un flacon d'eau distillée de cyanure de mercure et l'on en decante un volume quelconque, que l'on allonge d'une egale quantite d'eau distillée

» *Huile de pétrole blanche acidulée* (1) — On acidule cette huile en y melant un dixieme d'acide nitrique pur, qu'on y laisse au moins quarante-huit heures, en ayant soin d'agiter le flacon de temps en temps On decante l'huile qui s'est acidulée, et qui rougit alors fortement le papier de tournesol Elle s'est aussi un peu coloree, tout en restant tres-limpide

Dissolution de chlorure d'or et de platine — Pour ne pas multiplier les dissolutions, j'ai pris pour point de depart le chlorure d'or ordinaire, qui sert a fixer les epreuves On sait qu'il est compose de 1 gramme de chlorure d'or et de 4 grammes d'hyposulfite de soude pour 1 litre d'eau distillée

(1) L'huile de pétrole la plus convenable est d'un ton jaune verdâtre, et prend, sous differents angles, des reflets azurés

J'ai donne la preference à cette huile sur les huiles fixes, parce qu'elle reste toujours limpide, quoique fortement acidulée Le but que je me propose en employant une huile acide est de reduire les metaux en poussière et de retenir cette poussière à la surface de la plaque, en même temps de donner plus d'épaisseur à la couche par ses propriétés onctueuses car le naphte qui resulte de la distillation de cette huile ne produit pas le même effet, parce qu'étant trop fluide, il entraîne la poussière des metaux C'est par cette même raison que j'ai conseillé dernièrement l'emploi de l'essence de lavande, plutôt que celui de l'essence de terebenthine

Quant au chlorure de platine, il faut en faire dissoudre 2 $\frac{1}{2}$ grammes dans 3 litres d'eau distillée on mêle ensuite ces deux dissolutions en égales quantités

MANIÈRE D'OPÉRER

Première préparation de la plaque

Nota — Pour être plus court dans la description qui va suivre, j'indiquerai chaque substance en abrégé. Ainsi je dirai pour désigner la *solution aqueuse de bichlorure de mercure*, sublime pour la *solution de cyanure de mercure*, cyanure pour l'*huile de pétrole acidulée*, huile pour la *dissolution de chlorure d'or et de platine*, or et platine et pour l'*oxyde de fer rouge* seulement

On polit la plaque avec du sublime et du tripoli d'abord, et ensuite avec du rouge (1), jusqu'à ce qu'on arrive à un beau noir. Puis, on pose la plaque sur le plan horizontal et on y verse la solution de cyanure que l'on chauffe avec la lampe absolument comme si l'on fixait une épreuve au chlorure d'or. Le mercure se dépose et forme une couche blanchâtre. On laisse un peu refroidir la plaque et après avoir renversé le liquide, on la sèche en la frottant avec du coton et en la stupondiant de rouge.

Il s'agit maintenant de polir la couche blanchâtre déposée par le mercure. Avec un tampon de coton imbibé d'huile et de rouge on frotte cette couche juste assez pour qu'elle devienne d'un beau noir. On pourra, en dernier lieu, frotter assez fortement mais avec du coton seul, pour amincir le plus possible la couche acidulée.

Ensuite on place la plaque sur le plan horizontal et on y verse la dissolution d'or et de platine. On chauffe comme à l'ordinaire, on laisse refroidir et puis on renverse le liquide que l'on sèche, en frottant légèrement avec du coton et du rouge.

* Il faut faire cette opération avec soin, surtout lorsqu'on ne doit pas continuer immédiatement l'épreuve, car autrement, on laisserait sur la plaque

(1) Si je préfère, pour polir le rouge aux autres substances ce n'est pas que je lui reconnaisse une propriété photographique mais bien parce qu'il brunit mieux et qu'il aide à fixer la couche d'or qui n'est plus si susceptible de s'enlever par écailles lorsqu'on la chauffe trop.

Les plaques galvaniques, lorsqu'elles n'ont ni marbrures ni taches noires (ce qui arrivait quelquefois dans l'origine,) reçoivent mieux que les autres l'application des métaux, et par conséquent le chlorure d'or y adhérant plus fortement ne s'enlève pas par écailles.

des lignes de liquide, qu'il est toujours difficile de faire disparaître. Par ce dernier frottage la plaque ne doit être que séchée et non pas polie.

» Ici se borne la première préparation de la plaque, celle qui peut être faite longtemps à l'avance.

Seconde préparation

Nota. Je ne crois pas convenable de mettre entre cette opération et l'iodage de la plaque un intervalle de plus de douze heures.

Nous avons laissé la plaque avec un dépôt d'or et de platine. Pour polir cette couche métallique, il faut prendre avec un tampon de coton de l'huile et du rouge, et frotter jusqu'à ce que la plaque redevienne noire, et puis avec de l'alcool et du coton seulement, on enlève le plus possible cette couche d'huile et de rouge.

» Alors on frotte assez fortement, et en repassant plusieurs fois aux mêmes endroits, la plaque avec du coton imprégné de cyanure. Comme cette couche sèche très-promptement, elle pourrait laisser sur la plaque des traces d'inégalité, pour éviter cela, il faut repasser le cyanure, et pendant que la plaque est encore humide, avec un tampon imbibé d'un peu d'huile on s'empresse de frotter sur toute la surface de la plaque, et de mêler ainsi ces deux substances, puis, avec un tampon de coton sec, on frotte pour unir et en même temps pour dessécher la plaque, en ayant soin d'enlever du tampon de coton les parties qui s'humectent de cyanure et d'huile. Enfin, comme le coton laisse encore des traces, on saupoudre également la plaque d'un peu de rouge que l'on fait tomber en frottant légèrement et en rond.

Ensuite, avec un tampon imprégné d'huile seulement, on frotte la plaque également, et de manière à faire revenir le bruni du métal, et puis on saupoudre avec du rouge, et l'on frotte très-légerement en rond, de manière à faire tomber tout le rouge qui entraîne avec lui la surabondance de la couche acidulée (1).

» Enfin, avec un tampon de coton un peu ferme, on frotte fortement pour donner le dernier poli (2).

(1) Il faut avoir soin d'appuyer le moins possible, car autrement le rouge adhérerait à la plaque et formerait un voile général.

(2) Lorsque l'on opérera sur une plaque qui aura reçu longtemps à l'avance la première préparation, il faudra, avant d'employer l'huile acidulée et l'oxyde rouge, opérer comme je l'indique plus loin pour la plaque qui a reçu une épreuve fixée. Cette précaution est nécessaire pour détruire les taches que le temps pourrait avoir développées.

Il n'est pas nécessaire de renouveler souvent les tampons imbibés d'huile et de rouge, il faut seulement les garantir de la poussière

J'ai dit plus haut que la première préparation de la plaque peut servir indéfiniment, mais on comprend que la seconde doit être modifiée selon qu'on opère sur une plaque qui a reçu une épreuve fixée ou une non fixée

Sur l'épreuve fixée

Il faut enlever les taches laissées par l'eau du lavage, avec l'oxyde rouge et de l'eau faiblement acidulée d'acide nitrique (à 2 degrés dans cette saison et moins dans l'été)

Ensuite il faut polir la plaque avec de l'huile et du rouge pour enlever toutes les traces de l'image qu'on efface

On continue alors l'opération comme je viens de le dire plus haut pour la seconde préparation de la plaque neuve et à partir de l'emploi de l'alcool

Sur l'épreuve non fixée (mais dont la couche sensible a été enlevée comme à l'ordinaire dans l'hypo-sulfite de soude)

D'abord, il faut frotter la plaque avec de l'alcool et du rouge pour enlever les traces de l'huile qui a servi à faire l'épreuve précédente

On continue ensuite comme il est indiqué plus haut pour la plaque neuve et à partir de l'emploi de l'alcool

TABEAU RÉSUMÉ DES OPÉRATIONS

Première préparation

- 1° *Sublime corrosif* avec tripoli d'abord, et rouge ensuite, pour polir la plaque
- 2° *Cyanure de mercure chauffé* et séché avec du coton et du rouge,
- 3° *Huile acidulée* avec rouge pour polir la couche de mercure
- 4° *Or et platine chauffé* et séché avec du coton et du rouge

Seconde préparation

- 5° *Huile acidulée* avec rouge pour polir la couche d'or et de platine,
- 6° *Alcool absolu* pour enlever le plus possible l'huile et le rouge,
- 7° *Cyanure de mercure employé à froid* et frotté seulement avec du coton,
- 8° *Huile frottée assez fortement* et égalisée en dernier lieu avec du rouge saupoudré

Sur l'épreuve fixée

- 1° *Acide nitrique* à 7 degrés avec *rouge* pour enlever les taches,
 - 2° *Huile avec rouge* pour enlever les traces d'image et pour polir
- (continuer ensuite comme plus haut, à partir du n° 6, alcool, etc

Sur l'épreuve non fixée (dont la couche sensible a été enlevée avec l'hyposulfite de soude)

Alcool avec rouge pour enlever les traces d'huile et continuer comme plus haut à partir du n° 6 alcool, etc

OBSERVATIONS

De l'iodage

La couleur de l'épreuve dépend de la teinte que l'on donne à l'iodure métallique. On peut donc la varier à volonté, cependant la couleur *rose violâtre* me paraît la plus convenable.

Pour transmettre l'iodure à la plaque, on peut remplacer la feuille de carton par un plateau de faïence dont on aura usé l'email. L'iodure transmis par ce moyen n'est pas décomposé.

Il est inutile, je dirai même nuisible, de chauffer la plaque avant de l'exposer à la vapeur d'iodure.

Du lavage à l'hyposulfite de soude

Pour enlever la couche sensible, il ne faut pas que la dissolution d'hyposulfite de soude soit trop forte, parce qu'alors elle voile les vigueurs. 60 grammes d'hyposulfite suffisent pour 1 litre d'eau distillée.

PHYSIQUE — *Suite des expériences électriques de MM. Palmieri et Sinigaglia*
(Extrait d'une Lettre de M. MELLONI à M. Arago)

Lorsque je vous annonçais, il y a quelques mois, les recherches de MM. Sinigaglia et Palmieri sur les courants d'induction de la Terre et les nouveaux résultats qu'ils avaient obtenus, savoir, la secousse et la décomposition de l'eau, j'espérais qu'en poursuivant leurs expériences, ces deux physiciens obtiendraient, tôt ou tard, l'étincelle électrique par l'action du globe terrestre sur leur pile, ou batterie *magnéto-électro-tellurique* (1). Cet espoir vient de se réaliser plus promptement et plus aisément qu'on ne pouvait le prévoir. En effet, MM. Sinigaglia et Palmieri n'ont ni augmenté le nombre, ni

(1) Voir *Comptes rendus*, etc., t. XVI, p. 1442

varié la structure ou les dimensions de leurs éléments, qui sont toujours composés de cylindres de fer creux, enveloppés par sept spirales superposées de fil de cuivre recouvert de soie, ils ont seulement imprimé à ces mêmes éléments un mouvement assez rapide de rotation, au moyen d'un bon système de roues dentées construit par notre habile mécanicien M Baudieri l'artifice avec lequel ils produisent l'étincelle est le même que celui de la machine de Clarke, qui consiste, comme vous savez à faire plonger un instant dans le mercure l'une des deux pointes opposées d'une petite poulie métallique fixée à l'axe de rotation, chaque fois que la force électro-magnétique atteint son maximum d'intensité, ce qui arrive, dans l'appareil de MM Inari et Palmieri, lorsque les éléments sont dirigés dans le sens de l'aiguille d'inclinaison, une des extrémités du fil communique avec la poulie, l'autre avec le mercure. Les cylindres de fer qui portent les spirales de cuivre formant une série parallèle, on conçoit que leur rotation doit avoir lieu autour d'une ligne horizontale perpendiculaire au plan du méridien magnétique.

• L'étincelle obtenue par MM Inari et Palmieri est faible, mais parfaitement visible dans l'obscurité. Je l'ai remarquée très-nettement un grand nombre de fois, ainsi que MM de Luca, Semmola et plusieurs autres personnes. Pour éloigner les doutes que l'on pourrait avoir sur un prétendu dégagement d'électricité ou de chaleur lumineuse dû au frottement des axes, de l'air ou à toute autre cause différente de celle qui forme le but de l'expérience il suffit de tourner la poulie d'un quart de cercle afin que ses pointes plongent dans le mercure, lorsque les axes des éléments sont perpendiculaires à la direction de l'aiguille d'inclinaison, car alors il ne se produit plus la moindre trace de lumière, quelle que soit la vitesse que l'on imprime à la machine de rotation. donc la lumière observée dans la disposition normale de l'appareil provient bien certainement de l'induction électro-magnétique du globe terrestre sur les cylindres de fer doux, et de leur réaction sur leurs enveloppes de cuivre. Il est même superflu de mettre exactement la ligne droite qui passe par les deux pointes de la poulie dans la direction perpendiculaire au plan contenant les axes des éléments de la batterie, car l'étincelle devient insensible quand on a le soin de l'écarter tant soit peu de ce plan et cela se conçoit puisque le déplacement, si faible qu'il soit, diminue considérablement l'action inductive de la Terre, or, comme l'étincelle est peu intense, il n'y a point lieu de s'étonner si elle devient invisible lorsqu'on la réduit à une petite fraction de sa valeur primitive.

• Du reste, le premier pas est fait, et on ne saurait plus douter que les auteurs n'arrivent à tuer de l'induction électro-magnétique du globe des étin-

celles beaucoup plus brillantes, s'ils veulent prendre la peine de déterminer d'abord exactement *la tension convenable du courant, ou les dimensions du fil de cuivre roulé en hélice, nécessaires à faire éclater l'étincelle*, et s'ils augmentent ensuite *la quantité* d'électricité en mouvement au moyen d'un nombre suffisant de ces hélices munies de leur cylindre de fer doux, et *sommées* ensemble par la réunion de leurs extrémités homologues. Il paraît même probable, d'après quelques essais tentés que MM. Inanî et Palmieri obtiendront l'étincelle avec les hélices toutes seules, dégagées des cylindres bien entendu que dans ce cas il sera indispensable de leur donner un diamètre beaucoup plus grand, surtout dans le sens perpendiculaire à l'axe de rotation alors l'expérience ne laissera plus rien à desirer.

» En attendant, l'observateur qui cultive avec passion les sciences physiques ne peut s'empêcher d'éprouver un sentiment bien vif de satisfaction en apercevant pour la première fois la lumière électrique développée par l'induction magnétique de la Terre. Les innombrables expériences d'Ampère ont prodigieusement étendu le champ des analogies entre les courants électriques, les aimants et l'action magnétique du globe terrestre. Il est constaté par MM. Linari et Palmieri tout en étant une conséquence prévue de la brillante découverte de M. Faraday, met le dernier cachet de l'évidence au principe de l'identité des actions électrodynamiques des aimants et de la force qui produit la direction constante de cette aiguille si précieuse qui, par un temps couvert, est le seul guide du navigateur au milieu des immenses solitudes de l'Océan.

Post-scriptum. Le puits est arrivé à 108 mètres de profondeur on a traversé 60 mètres d'un banc de tuf jaune, puis du tuf gris d'une formation beaucoup plus ancienne les marnes et les sables commencent à se montrer mais entremêlées de petites couches de pierre ponce. La température augmente *bien lentement*. Je vous enverrai plus tard le tableau des observations.

ASTRONOMIE — *Sur la comète découverte par M. Faye le 22 novembre 1843*
(Extrait d'une Lettre de M. VALZ à M. Arago.)

» Je viens vous faire part du résultat extraordinaire auquel je suis parvenu, c'est que la dernière comète ne serait autre que celle de 1770, que Jupiter nous avait enlevée en 1779, et qu'il nous rendrait de nouveau, ainsi qu'il était déjà arrivé en 1767. Cela est sans doute fort extraordinaire, mais n'en est pas moins dans l'ordre des possibilités et même des probabilités, car il suffit qu'un corps céleste ait passé par un point de l'espace pour qu'il y

revienne continuellement tant que des perturbations étrangères n'en changeraient pas le cours. Ainsi une rencontre approximative ayant eu lieu entre deux astres elle se renouvellera, dans la suite des temps, selon le rapport de leurs révolutions respectives. La comète de 1770 devait donc revenir rencontrer l'orbite de Jupiter jusqu'à un nouveau concours des deux corps. On ne peut, quant à présent, qui montre les diverses probabilités d'identité des deux comètes, de même que Burckhardt n'a pu qu'établir la possibilité des grandes perturbations de 1767 et 1779. Mais il est à espérer que la prochaine réapparition en 1751, quoique devant avoir lieu dans des circonstances assez défavorables, ne pourra cependant nous échapper, et permettra de joindre des preuves plus certaines aux simples probabilités actuelles.

J'ai eu recours, dans ce qui suit, à l'orbite elliptique de M. Plantamour comme satisfaisant bien aux dernières observations. J'admettrai toutefois dans la révolution qui y répond, une faible différence de $\frac{1}{100}$ ou de cinquante jours, qui n'atteint pas même celles que présentent les meilleures orbites entre elles, ce qui me suffira pour établir les recherches suivantes. Pour déterminer l'action de Jupiter sur cette comète, dans sa dernière révolution j'ai cherché la plus grande proximité des deux astres qui a eu lieu dans le mois de mars 1841, mais la distance au nœud de 40 degrés n'a pas permis qu'elle fut moindre que 0,648. J'ai cependant calculé l'effet qui en résultait sur la révolution, et je n'ai trouvé qu'une augmentation de quelques jours, entièrement insuffisante pour répondre à une forte perturbation qui aurait tout à fait changé l'orbite. Il fallait donc recourir aux rapprochements voisins du nœud ascendant. Or il suffit d'augmenter la révolution de $\frac{1}{100}$, et de la porter à 7,56 ans pour obtenir une grande proximité à Jupiter en décembre 1815, dans le cas d'altérer fortement l'orbite antérieure. Mais depuis 1779, où l'orbite de 1770 fut entièrement changée, l'intervalle est de trente-six ans avec 23 degrés de plus d'anomalie et Burckhardt a trouvé qu'après cette époque le nouveau demi-grand axe devait être 6,388, qui répondrait à 16,145 ans de révolution, non exacte sans doute à un an près, et 2,18 ans de plus étant nécessaires pour parcourir les 23 degrés d'anomalie. Les deux révolutions qu'il y aurait eu ainsi, permettraient donc d'admettre que ce pourrait être la même comète, et ont dû me porter à le penser. Mais il était essentiel de vérifier si les autres éléments ne seraient pas contraires à une pareille induction. Je les ai donc calculés d'après les mêmes données employées par Burckhardt, et j'ai trouvé l'inclinaison $14^{\circ}35'$, le nœud ascendant, 191 degrés, la longitude du périhélie, 39 degrés. Certes, on trouvera sans doute étonnante l'analogie qu'ils présentent encore avec ceux de cette année,

après une réduction de moitié dans la révolution, mais on peut concevoir que, selon les diverses circonstances respectives du cours des deux astres, les variations de la révolution puissent être beaucoup plus considérables que celles des autres éléments. Il paraît donc que l'identité de la dernière comète avec celle de 1770 présente une assez grande probabilité, du moins jusqu'à ce qu'une nouvelle apparition puisse en décider entièrement.

D'après ce qui précède, Jupiter, ce dominateur, ce tyran pourrait-on dire de notre système planétaire, semble destiné à jouer un rôle fort important dans la transformation des orbites cométaires, ainsi qu'on peut en juger par la comète de 1770. Mais j'étendrai encore son influence prépondérante aux comètes de trois et de six ans, quoiqu'en étant actuellement assez éloignées, et qui, après avoir éprouvé de pareilles violences de la part de Mercure et de la Terre, me semblent vouées à la domination de Jupiter dans un avenir encore assez loigné à la vérité, comme on va le voir, si toutefois les deux autres planètes n'interviennent plus dans l'intervalle. On a présumé que la résistance de l'éther, sensible sur les comètes, pourrait, avec le temps, amener celle de trois ans en contact avec le Soleil. Ce serait bien un des résultats qui tendent à se produire, mais un autre en sens inverse peut annuler et surpasser le premier : car si cette résistance est sensible, la densité de l'éther pourrait être en comparaison avec celle de la comète, et ferait perdre à celle-ci un poids égal à celui de l'éther sous même volume, ce qui équivaldrait à un affaiblissement de l'attraction du Soleil, et occasionnerait un plus grand éloignement de la comète, une parabole se changeant alors en ellipse, ou celle-ci devenant moins allongée. L'éther assimilé à un simple gaz doit croître en densité avec sa proximité du Soleil, et la résistance augmentera avec la densité, mais le poids, et par suite l'attraction relative, diminuera comme la différence des densités, qui pourrait même devenir nulle ou négative, auquel cas l'attraction se changerait en repulsion, ainsi que je l'ai déjà mentionné, pour expliquer avec des perturbations entièrement insuffisantes, les variations dans les révolutions de la grande comète de 1843. Mais, indépendamment de ces considérations, la puissante attraction de Jupiter suffirait pour empêcher les deux petites comètes de se joindre au Soleil, les amener dans son entière dépendance, et en changer le cours dans un avenir qui, quoique éloigné, peut cependant se prévoir approximativement. D'après le cours de ces deux comètes, on peut assez bien reconnaître, par l'intersection des orbites, que Mercure a déterminé l'orbite actuelle de trois ans, et la Terre celle de six ans. Ces planètes pourraient encore les changer si l'influence de Jupiter sur ces orbites ne les altérerait de plus en plus. L'aphélie de ces comètes, et leurs nœuds se trouvant les points les plus rap-

prochés de l'orbite de Jupiter à chaque concours de la planète et des comètes qui y aura lieu, le grand axe de celle de trois ans sera augmenté, et celui de six ans diminué jusqu'à ce qu'à la suite des temps, la proximité étant devenue assez grande, l'orbite sera entièrement changée comme celle de 1770. On peut apprécier à peu près cette époque pour la comète de trois ans, et même celle où Mercure a pu établir l'orbite actuelle. Tous les vingt-trois ans, ou après sept révolutions a lieu la plus grande proximité de Jupiter, qui, par son action, augmente alors la révolution de neuf jours : c'est ce qui est arrivé en septembre 1820 et décembre 1843. Mais il y a diminution de trois jours dans les six révolutions suivantes, ce qui réduit l'augmentation à six jours en sept révolutions. Ainsi, avant 1819 la révolution était de 1204 jours, et elle a été ensuite successivement de 1213, 1212, 1212, 1210, 1209, 1211, 1210, et la prochaine sera de 1219 jours. Pour que cette orbite atteigne celle de Jupiter la révolution doit augmenter d'un an, et, comme l'augmentation doit être progressive, on peut évaluer à sept ou huit siècles l'époque où la grande proximité des deux astres pourra amener un entier changement dans l'orbite de la comète. Pour remonter à l'origine de l'orbite actuelle, on remarquera d'abord qu'elle doit être assez récente dans la position qu'elle occupe, car la comète qui la parcourt avait une queue et un noyau lors de son apparition de 1786, ainsi qu'à celle de 1805, où la queue fut visible vingt et un jours avant le périhélie mais en 1819 avec encore noyau et queue, cette dernière ne fut plus visible que treize jours avant le périhélie. Enfin, depuis, plus de queue ni de noyau. Si, en 1795, on ne put reconnaître de queue, c'est que la comète fut vue seulement vingt-quatre jours avant le périhélie, époque où la queue n'était pas encore formée. Sans doute que si cette orbite eût été fort ancienne, la queue eût disparu depuis fort longtemps. C'est un exemple remarquable de l'affaiblissement et de la possibilité de disparition des queues et des noyaux. D'après les éléments de cette comète, en 1786, elle avait passé, le 27 janvier, par 132 degrés de longitude au point de son orbite le plus rapproché de celle de Mercure ($\frac{1}{160}$ à peu près de la distance de la Terre au Soleil), quinze jours seulement après la planète. D'après leurs révolutions respectives, il paraîtrait que les deux astres ont dû s'y trouver ensemble le 27 février 1776. Lorsque on pourra calculer les perturbations jusqu'à cette époque, on vérifiera mieux la certitude de ce concours, mais, en attendant, il est à présumer que c'est sans doute alors que l'orbite a dû acquérir sa forme actuelle.

(Après l'analyse, faite par le *Secrétaire*, de la Lettre de M *Fais*, M *CAUCHY* a annoncé que M *Leverrier* s'est livré, sur la comète de 1770, à des recher-

ches toutes semblables a celles de l'astronome de Marseille M *Arago* a parle aussi de diverses remarques de M *Faye*, mais il n'avait pas saisi leur sens veniable M *Faye* disait, non que sa comete etait celle de Lexell, mais qu'elle avait dû etre dérangée par l'action de Jupiter comme cette fameuse comete de 1770)

PHYSIQUE — *Sur la cause des differences existant entre les résultats des experiences faites sur le Faulhorn, relativement au point d'ebullition de l'eau sous differentes pressions, et les résultats d'experiences de cabinet*
Lettre de M PELTIER

Les precautions que nous avons prises, M Bravais et moi dans notre expérience sur le point d'ebullition sous differentes pressions, en descendant du Faulhorn, le 6 août 1842, ne nous permettent pas d'attribuer à l'observation les differences que présentent nos résultats, lorsqu'on les compare a ceux qui ont ete obtenus dans les expériences de cabinet Le réservoir du thermometre ayant toujours ete plongé, soit dans l'eau bouillante pendant la marche, soit dans la vapeur pendant les stations, il ne nous parait pas probable qu'il ait pu subir des contractions et des dilatations assez brusques pour produire ces differences La cause de ces anomalies doit etre cherchée ailleurs et d'après quelques observations et quelques expériences speciales, elle me parait provenir de notre mode d'expérimentation, de celui qui prend sa pression dans l'atmosphère même, à des hauteurs différentes, et, conséquemment, sous des influences météorologiques qui peuvent etre tres-diverses

Le 5 août 1842, à 2 heures de l'après midi, la température était, sur le sommet du Faulhorn de 12°,2, la pression de la vapeur etait de 9^{mm},395, c'est-à-dire 0^{mm},245 au dessous du point de saturation Le barometre était a 558^{mm},62 à zero Il descendit graduellement pendant le reste de la journée et toute la nuit Le lendemain, 6, a 6 heures du matin au commencement de l'expérience, il était descendu a 556^{mm},66, la température etait a 4°,2, et la pression de la vapeur à 5^{mm},855 ou 0^{mm},215 au-dessous de la saturation le vent etait ouest-sud-ouest faible

« Pendant notre descente, le barometre observe a Brienz, par mon fils, tomba de 715^{mm},32 a 712^{mm},47 Vu de Brienz, le ciel fut d'abord voilé par des strates élevés qui passaient au-dessus du Faulhorn et dont la blancheur indiquait la haute tension positive Ces strates blancs, par leur influence positive, firent sortir, des flancs de ce sommet, des vapeurs grises dont la partie supérieure s'élevait vers le nuage dominant Il régnait un calme plat dans la vallée

« Pour nous, qui étions sur le sommet, le ciel n'avait pour le voiler que

les *cirro-strati* blancs qui se formaient peu à peu. Les nuages parasites qui sortaient du flanc de la montagne, et dont la teinte grise indiquait la haute tension négative, étaient au dessous de nous et ne pouvaient avoir d'influence sur nos instruments. Tout annonçait un été orageux, et, en effet, l'orage éclata avec violence le lendemain, 7 août, dans la matinée.

Nos observations ont donc été faites sous des influences atmosphériques très-différentes. Au moment du départ nous étions dominés par une tension positive très-considérable, provenant des strates blancs, nous traversâmes les nuages parasites gris, et bientôt nous les eûmes au dessus de nos têtes, agissant avec toute leur influence négative. Le temps se découvrit un peu vers onze heures, il y avait de larges éclaircies, et nous passâmes alternativement de l'influence des nues à celle d'un ciel inégalement dé couvert. C'est à ces changements d'état atmosphérique que j'attribue les altérations dans les points d'ébullition, et j'aurais depuis longtemps essayé d'élucider cette question, si une longue maladie ne m'avait fait suspendre mes travaux.

Je ne puis donc dire aujourd'hui avec précision quel est le degré d'influence de ces états atmosphériques, mais je puis citer quelques faits qui prouvent de quelle manière l'influence électrique agit sur les vapeurs, sur l'évaporation, et par suite suivant moi, sur le point d'ébullition. Relativement à l'influence de l'électricité sur l'évaporation qu'elle sextuple, je ne puis que renvoyer à ce que j'en ai dit dans mon *Traité des trombes* et dans mon *Mémoire sur l'électricité atmosphérique*, je me bornerai donc à citer des observations sur la marche anormale de la fumée et quelques expériences qui s'y rapportent.

Le 19 décembre 1822, sous une température de -34 à -36 degrés centigrades, et sous une pression de $0^m,762$ vent nord nord-est modéré le capitaine Parry observa avec surprise que la fumée du poêle s'abaissait au lieu de s'élever, comme elle devait le faire sous un ciel pur et froid. Il fit une observation semblable le 28 suivant, sous un froid de -36 degrés centigrades. M. Bravais a eu également l'occasion d'observer plusieurs faits analogues pendant son séjour à Bossekop. J'ai fait moi-même des observations pareilles pendant les temps les plus froids et au milieu d'un calme plat, lorsque tout annonçait que la fumée devait s'élever rapidement, à cause des différences de pesanteur. Les expériences suivantes conduisent à l'explication de ces anomalies apparentes.

On place au dessus d'une lampe à alcool un vase bien fermé et à demi rempli d'eau, ce vase ne laisse sortir la vapeur que par un tube horizontal, afin d'éviter l'influence des courants d'air chaud sur l'orifice par où sort la vapeur. On place tout l'appareil sur des gâteaux de résine pour l'isoler. Lorsque l'eau

bout et que la vapeur sort avec abondance, on électrise le vase et l'on présente à quelques décimètres du tuyau, une grosse sphere de cuivre polie, ou un pinceau de fil de cuivre. Dans le premier cas, si l'appareil est chargé d'électricité positive, la vapeur s'écoule en colonne serrée blanchâtre, et va mouiller la sphere, elle sort plus rapidement et plus abondamment qu'à l'état neutre. Si l'appareil est *negatif*, la colonne de vapeur est plus dilatée, plus rare elle est grisâtre, presque transparente et s'avance vers la boule en filets détachés.

Au lieu d'une sphere polie, si l'on présente un faisceau de pointes et si l'appareil est positif une grande partie de la vapeur opaque qui sort du tuyau repasse à l'état de vapeur élastique, et le reste s'avance vers les pointes. Si l'appareil est chargé d'électricité négative, une moindre quantité de la vapeur sortante repasse à l'état de fluide élastique, elle est repoussée par le pinceau positif qu'on lui présente, et elle rétrograde dans sa marche. Le rayonnement positif du pinceau a donc fait rétrograder la vapeur négative qui sortait du tuyau. Pour rendre l'expérience plus intéressante encore, j'ai placé en regard les éjecteurs de deux bouilleurs chargés d'électricités contraires la vapeur du bouilleur positif sort alors rapidement, accompagnée de projections d'un blanc nacré, elle s'avance en droite ligne sur la vapeur du bouilleur négatif, qu'elle repousse et qu'elle force à rétrograder vers son propre bouilleur. J'ajouterai encore l'expérience suivante.

» On prend un tube capillaire en verre, terminé par un très-petit entonnoir à angle droit, on place le tube presque horizontalement, incliné d'une vingtaine de degrés sur l'entonnoir on verse dans ce dernier, avec une pipette, un filet d'eau jusqu'à ce que l'entonnoir soit rempli complètement, une portion de l'eau s'allonge dans le tube et forme un index. Par l'autre extrémité on fait passer un fil métallique plus fin que le diamètre du tube, afin que l'air y circule librement on l'enfonce jusqu'à ce qu'il pénètre dans la colonne liquide de 1 centimètre environ, et l'on fait communiquer son extrémité libre avec le sol. On suspend alors au dessus de l'entonnoir une boule de métal polie communiquant à une machine électrique on charge cette boule et l'on voit toute la colonne liquide s'avancer vers elle, on la voit rétrograder aussitôt qu'on la décharge.

» Il résulte de ces expériences deux faits bien distincts qu'il ne faut pas confondre 1° l'action statique d'un corps poli, non rayonnant, qui attire la vapeur en masse et les corps liquides, 2° l'action dynamique, c'est-à-dire le courant rapide qui s'établit, au moyen des pointes rayonnantes, entre elles et la vapeur sortante ou l'eau qu'on leur présente, rayonnement qui fait passer rapidement une portion de l'eau ou de la vapeur opaque à l'état élastique,

comme mes expériences antérieures l'ont prouvé surabondamment. Le premier effet peut faire avancer le point d'ébullition en soulevant le liquide le second doit le retarder, puisque la vapeur opaque qui repasse à l'état de fluide élastique prend son calorique latent au reste de la vapeur et au vase qu'elle refroidit.

D'après les expériences que je viens de rapporter et d'autres que je ne puis même indiquer dans cette Lettre j'attribue les anomalies de notre courbe, non au thermomètre ni à un défaut d'exactitude de notre part, mais aux circonstances météorologiques qu'on a méconnues jusqu'alors, et dont on est à l'abri dans les expériences de cabinet.

ANALYSE MATHÉMATIQUE. — *Équations des mouvements infiniment petits d'un système de sphéroïdes soumis à des forces d'attraction ou de répulsion mutuelle* (Extrait d'une Lettre de M. LAURENT à M. Arago)

Parmi les divers mouvements que peuvent exécuter les molécules des corps solides et notamment celles des corps cristallisés, il en est un que Poisson a négligé dans ses Mémoires et qui consiste en un mouvement de rotation qui peut subsister indépendamment de tout mouvement de translation. Effectivement, considérons une série indéfinie de parallélépipèdes rectangles identiques dont les centres soient également espacés par une ligne droite. Admettons, en outre, que les faces homogènes de ces parallélépipèdes soient respectivement parallèles. Ces conditions étant remplies, le système ne sera en équilibre sous l'action des forces attractives ou répulsives auxquelles les parallélépipèdes sont soumis, qu'autant que leur axe sera dirigé suivant la ligne des centres. Mais il est à remarquer que les centres n'auront aucune tendance au mouvement, qui se réduira dès lors à un mouvement de rotation. Telles sont les considérations qui m'ont engagé à former les équations des mouvements infiniment petits d'un système de sphéroïdes soumis à des forces d'attraction ou de répulsion mutuelle. Dans le cas où le système est isotrope, c'est-à-dire où ces équations prennent une forme indépendante de la direction des axes des coordonnées, la forme des sphéroïdes doit être telle que leur moment d'inertie relatif à un axe mené par le centre de gravité soit indépendant de la direction de cet axe. Cette condition étant supposée remplie, soient

x, y, z les coordonnées du centre de gravité d'un sphéroïde,

u, v, w les déplacements de ce centre de gravité, mesurés parallèlement aux axes des x , des y et des z au bout du temps t ;

φ, ψ, θ les angles infiniment petits dont ce sphéroïde a tourné autour de trois axes menés par son centre de gravité parallèlement aux axes des x , des y et des z ;

m la masse du sphéroïde;

\mathbf{I} la valeur constante du moment d'inertie. Si, en outre, adoptant la notation de M. Cauchy, on représente par les caractéristiques

$$D_x, D_y, D_z, D_t,$$

et leurs puissances, les dérivées partielles d'une fonction quelconque, et que l'on désigne par E, F, G, H, I certaines fonctions symboliques du trinôme

$$D_x^2 + D_y^2 + D_z^2,$$

on aura

$$\begin{aligned} mD_t^2 u &= Eu + F.D_x(D_x u + D_y v + D_z w) + G(D_y \theta - D_x \psi), \\ mD_t^2 v &= Ev + F.D_y(D_x u + D_y v + D_z w) + G(D_x \varphi - D_z \theta), \\ mD_t^2 w &= Ew + F.D_z(D_x u + D_y v + D_z w) + G(D_x \psi - D_y \varphi), \\ mD_t^2 \varphi &= G(D_y w - D_z v) + H[D_y(D_y \varphi - D_z \psi) + D_z(D_x \varphi - D_x \theta)] + I\varphi, \\ mD_t^2 \psi &= G(D_x u - D_z w) + H[D_x(D_x \psi - D_y \varphi) + D_z(D_x \psi - D_y \theta)] + I\psi, \\ mD_t^2 \theta &= G(D_x v - D_y u) + H[D_x(D_x \theta - D_z \varphi) + D_y(D_y \theta - D_z \psi)] + I\theta. \end{aligned}$$

Si, supposant que le rayon d'activité des sphéroïdes soit très-petit, on ne conserve dans chacune de ces équations que ceux des termes dont les coefficients *peuvent être* du même ordre de grandeur, on trouvera que, par suite des formes des fonctions symboliques que nous avons désignées par E, F, G, H, I. on aura

$$\begin{aligned} \frac{d^2 u}{dt^2} &= C \left(\frac{d^2 u}{dx^2} + \frac{d^2 u}{dy^2} + \frac{d^2 u}{dz^2} \right) + \mathcal{F} \left(\frac{d^2 u}{dx^2} + \frac{d^2 v}{dx dy} + \frac{d^2 w}{dx dz} \right) + \mathcal{G} \left(\frac{d\theta}{dy} - \frac{d\psi}{dz} \right), \\ \frac{d^2 v}{dt^2} &= C \left(\frac{d^2 v}{dx^2} + \frac{d^2 v}{dy^2} + \frac{d^2 v}{dz^2} \right) + \mathcal{F} \left(\frac{d^2 v}{dx dy} + \frac{d^2 v}{dy^2} + \frac{d^2 w}{dy dz} \right) + \mathcal{G} \left(\frac{d\varphi}{dz} - \frac{d\theta}{dx} \right), \\ \frac{d^2 w}{dt^2} &= C \left(\frac{d^2 w}{dx^2} + \frac{d^2 w}{dy^2} + \frac{d^2 w}{dz^2} \right) + \mathcal{F} \left(\frac{d^2 w}{dx dz} + \frac{d^2 v}{dy dz} + \frac{d^2 w}{dz^2} \right) + \mathcal{G} \left(\frac{d\psi}{dx} - \frac{d\varphi}{dy} \right), \\ \frac{d^2 \varphi}{dt^2} &= \frac{m}{M} \mathcal{G} \left(\frac{dw}{dy} - \frac{dv}{dz} + 2\varphi \right), \\ \frac{d^2 \psi}{dt^2} &= \frac{m}{M} \mathcal{G} \left(\frac{du}{dz} - \frac{dw}{dx} + 2\psi \right), \\ \frac{d^2 \theta}{dt^2} &= \frac{m}{M} \mathcal{G} \left(\frac{dv}{dx} - \frac{du}{dy} + 2\theta \right), \end{aligned}$$

$C, \mathcal{F}, \mathcal{G}$ désignant des coefficients constants.

Je ne peux développer ici diverses conséquences remarquables de ces équations, je remarquerai seulement qu'il en résulte que les molécules des corps solides peuvent être animées de certains mouvements de rotation dont la vitesse est incomparablement supérieure à celle des mouvements de translation. La considération de ces mouvements de rotation à grande vitesse semble acquérir une grande importance par les réflexions suivantes. Poisson admet que les propriétés caractéristiques de l'élasticité des corps doivent être attribuées à l'influence qu'exerce la forme de leurs molécules, influence qui est insensible dans les liquides et les gaz soit parce que la forme des molécules est alors sphérique, soit parce qu'elles sont trop éloignées les unes des autres pour que cette forme, quelle qu'elle soit, puisse influencer sur les lois de leurs mouvements. Or, les densités d'un même corps considéré successivement à l'état solide et à l'état liquide étant d'une grandeur comparable, il doit nécessairement y avoir de même des intervalles des molécules dans l'un et l'autre état. Il semble donc résulter des idées émises par l'illustration géométrique que je viens de citer, que la fluidité des liquides doit être attribuée soit à la forme sphérique des molécules, soit à une contraction considérable, en vertu de laquelle leurs dimensions à l'état liquide deviennent insensibles relativement à celles qu'elles ont à l'état solide. Cette modification dans la forme ou les dimensions des molécules, quoique formellement admise par Poisson, prête à plusieurs objections sensibles qui ne permettent pas de supposer que telle est effectivement la loi de la nature. Il me semble que tout ce qu'il est permis d'affirmer, c'est que *les molécules des liquides se comportent comme si elles étaient sensiblement sphériques*. Or, si on les suppose d'une forme quelconque, mais animées de mouvements de rotation très rapides, on pourra les considérer comme sensiblement sphériques, pourvu toutefois que ces mouvements de rotation satisfassent à certaines conditions et qu'ils ne soient plus infiniment petits, comme le supposent les équations que j'ai rapportées plus haut. De tels mouvements pouvant subsister indépendamment de tout mouvement de translation, sont possibles, ainsi qu'on peut le voir pour le cas d'amplitudes infiniment petites. Cette hypothèse présente la théorie des fluides sous un jour nouveau, du moins pour moi elle conduit à des équations d'où découlent plusieurs conséquences qui ne sont pas sans importance. Je remarquerai seulement ici qu'on aperçoit immédiatement comment il se fait que l'influence de la forme des molécules peut se faire sentir, dans certaines circonstances, dans le mouvement des fluides, ce cas aura lieu dès que la vitesse de translation des molécules devient comparable à la vitesse de rotation à laquelle, dans cette hypothèse, on

doit attribuer la fluidité. J'ajouterai encore que cette hypothèse admise conduirait à supposer qu'il existe une relation intime entre la chaleur propre des corps et le mouvement de rotation de leurs molécules, conjecture qui se trouve confirmée par bon nombre de faits, entre autres par la faible conductibilité des liquides et des gaz.

ANALYSE MATHÉMATIQUE — *Mémoire sur l'équilibre et le mouvement d'un système de molécules dont les dimensions ne sont pas supposées nulles*, par M. AUGUSTIN CAUCHY

Dans la séance du 5 décembre 1842, j'ai présenté à l'Académie un cahier qui renfermait de nouvelles recherches sur la théorie de la lumière et qui a été paraphé dans cette même séance par M. Arago. Les recherches dont il s'agit étaient relatives en partie à l'équilibre et au mouvement d'un système de molécules dont les dimensions ne seraient pas supposées nulles, en partie aux lois suivant lesquelles un rayon lumineux est réfléchi et réfracté par la surface de séparation de deux milieux isophènes, dans le cas où l'on tient compte de la dispersion des couleurs. Je ne m'occuperai pas aujourd'hui de ces lois, auxquelles je reviendrai dans un autre article, mais seulement de l'équilibre et du mouvement d'un système de molécules : cet objet me paraissant digne d'être examiné de nouveau, quoique le même sujet ou des sujets analogues aient déjà été traités par quelques auteurs, entre autres par M. Poisson, par M. Savary, par M. Broch, et par moi-même. Je me bornerai d'ailleurs à indiquer le plus brièvement possible quelques uns des résultats auxquels j'étais parvenu.

§ I^{er} — *Préliminaires* — *Sur le moment de rotation d'un corps*

* Considérons un corps qui tourne autour d'un point fixe pris pour origine des coordonnées. Soit m un élément de ce corps, et supposons la position de cet élément déterminée, au bout du temps t , non-seulement par les coordonnées

$$x, y, z,$$

relatives à trois axes rectangulaires qui restent fixes dans l'espace, mais encore par les coordonnées

$$x', y', z',$$

relatives à trois axes rectangulaires qui restent fixes dans ce corps. On aura

$$(1) \quad \begin{cases} x = \alpha x + \epsilon y + \gamma z, \\ y = \alpha' x + \epsilon' y + \gamma' z, \\ z = \alpha x + \epsilon'' y + \gamma'' z, \end{cases}$$

$\alpha, \epsilon, \gamma, \alpha', \epsilon', \gamma', \alpha'', \epsilon'', \gamma''$ étant les cosinus des angles formés par les demi-axes des x, y, z positives avec les demi-axes des x, y, z positives. D'ailleurs ces cosinus seront liés entre eux par les équations connues

$$(2) \quad \begin{cases} \alpha^2 + \alpha'^2 + \alpha''^2 = 1, & \epsilon^2 + \epsilon'^2 + \epsilon''^2 = 1, & \gamma^2 + \gamma'^2 + \gamma''^2 = 1, \\ \epsilon\gamma + \epsilon'\gamma' + \epsilon''\gamma'' = 0, & \gamma\alpha + \gamma'\alpha' + \gamma''\alpha'' = 0, & \alpha\epsilon + \alpha'\epsilon' + \alpha''\epsilon'' = 0 \end{cases}$$

De ces équations différentielles on pourra en déduire d'autres de la forme

$$\begin{aligned} \alpha D_t \alpha + \alpha' D_t \alpha' + \alpha'' D_t \alpha'' &= 0, & \alpha D_t \epsilon + \alpha' D_t \epsilon' + \alpha'' D_t \epsilon'' &= r, \\ \alpha D_t \gamma + \alpha' D_t \gamma' + \alpha'' D_t \gamma'' &= -q, \\ \epsilon D_t \alpha + \epsilon' D_t \alpha' + \epsilon'' D_t \alpha'' &= -r, & \epsilon D_t \epsilon + \epsilon' D_t \epsilon' + \epsilon'' D_t \epsilon'' &= 0, \\ \epsilon D_t \gamma + \epsilon' D_t \gamma' + \epsilon'' D_t \gamma'' &= p, \\ \gamma D_t \alpha + \gamma' D_t \alpha' + \gamma'' D_t \alpha'' &= q, & \gamma D_t \epsilon + \gamma' D_t \epsilon' + \gamma'' D_t \epsilon'' &= -p, \\ \gamma D_t \gamma + \gamma' D_t \gamma' + \gamma'' D_t \gamma'' &= 0, \end{aligned}$$

p, q, r désignant trois nouvelles variables, dont les valeurs, une fois connues, serviront à faire connaître celles de

$$\alpha, \epsilon, \gamma, \alpha', \epsilon', \gamma', \alpha'', \epsilon'', \gamma''$$

En effet, des neuf dernières formules on tirera, par exemple,

$$(3) \quad D_t \alpha = \gamma q - \epsilon r, \quad D_t \epsilon = \alpha r - \gamma p, \quad D_t \gamma = \epsilon p - \alpha q,$$

et par conséquent, p, q, r étant supposées connus, il suffira, pour trouver α, ϵ, γ , d'intégrer trois équations différentielles linéaires, savoir, les formules (3). D'ailleurs, ces trois équations continueront évidemment de subsister quand on y remplacera α, ϵ, γ par $\alpha', \epsilon', \gamma'$ ou par $\alpha'', \epsilon'', \gamma''$.

» Soit maintenant u une quantité positive déterminée par la formule

$$(4) \quad u^2 = p^2 + q^2 + r^2,$$

et posons

$$(5) \quad \frac{p}{u} = \cos \lambda, \quad \frac{q}{u} = \cos \mu, \quad \frac{r}{u} = \cos \nu.$$

On s'assurera aisément que λ, μ, ν représentent les angles formés, au bout du temps t , par l'axe instantané de rotation, prolongé dans un certain sens, avec les demi-axes des x, y, z positives; et u la vitesse angulaire de rotation du corps autour de ce même axe.

» Soient encore

ω la vitesse absolue de l'élément m ;

χ le moment linéaire principal relatif aux quantités de mouvement, et

$$(6) \quad \psi^2 = \sum m \omega^2$$

la somme des forces vives. Si, en faisant coïncider les axes des x, y, z avec les axes principaux du corps relatifs au point fixe autour duquel il tourne, on nomme

A, B, C

les moments d'inertie principaux relatifs à ce point, on aura

$$(7) \quad \begin{cases} p^2 + q^2 + r^2 = u^2, \\ A p^2 + B q^2 + C r^2 = \psi^2, \\ A^2 p^2 + B^2 q^2 + C^2 r^2 = \chi^2. \end{cases}$$

» Si d'ailleurs on nomme

$\alpha, \alpha', \alpha''$

les projections algébriques du moment linéaire χ sur les axes des x, y, z , et

P, Q, R

les projections algébriques du même moment linéaire sur les axes des x, y, z , on aura non-seulement

$$(8) \quad \begin{cases} \alpha = \alpha' P + \alpha'' Q + \alpha''' R, \\ \alpha' = \alpha'' P + \alpha''' Q + \alpha'''' R, \\ \alpha'' = \alpha''' P + \alpha'''' Q + \alpha''''' R, \end{cases}$$

mais encore

$$(9) \quad P = -A p, \quad Q = -B q, \quad K = -C r;$$

et l'on conclura des formules (8)

$$(10) \quad \begin{cases} P = \alpha \mathcal{P} + \alpha' \mathcal{Q} + \alpha'' \mathcal{R}, \\ Q = \beta \mathcal{P} + \beta' \mathcal{Q} + \beta'' \mathcal{R}, \\ R = \gamma \mathcal{P} + \gamma' \mathcal{Q} + \gamma'' \mathcal{R}. \end{cases}$$

» Soient enfin

K le moment linéaire principal du système des forces appliquées, aux divers points du corps;

\mathcal{L} , \mathcal{M} , \mathcal{N} les projections algébriques de ce moment linéaire sur les axes des x , y , z ;

et L , M , N ses projections algébriques sur les axes des x , y , z

On aura non-seulement

$$(11) \quad \begin{cases} L = \alpha \mathcal{L} + \alpha' \mathcal{M} + \alpha'' \mathcal{N}, \\ M = \beta \mathcal{L} + \beta' \mathcal{M} + \beta'' \mathcal{N}, \\ N = \gamma \mathcal{L} + \gamma' \mathcal{M} + \gamma'' \mathcal{N}; \end{cases}$$

mais encore

$$(12) \quad D_i \mathcal{P} = \mathcal{L}, \quad D_i \mathcal{Q} = \mathcal{M}, \quad D_i \mathcal{R} = \mathcal{N},$$

et l'on tirera des formules (12), jointes aux équations (9) et (10),

$$(13) \quad \begin{cases} AD_i p + (B - C) q r + L = 0, \\ BD_i q + (C - A) r p + M = 0, \\ CD_i r + (A - B) p q + N = 0. \end{cases}$$

Des formules (13), jointes aux équations (7), on conclut

$$(14) \quad \begin{cases} \psi D_i \psi + L p + M q + N r = 0, \\ \chi D_i \chi + AL p + BM q + CN r = 0. \end{cases}$$

Si le moment lineaire principal du systeme des forces appliquées au corps sevanouit ce qui aura lieu, par exemple, dans le cas ou ces forces elles-memes se reduiraient à zéro, les formules (14) donneront

$$(15) \quad D_1\psi = 0, \quad D_1\chi = 0,$$

et par conséquent les valeurs de ψ, χ se réduiront à des quantités constantes.

Les formules obtenues dans ce paragraphe s'accordent avec celles qui étaient déjà connues, et en particulier avec celles que j'ai données dans mon cours de Mécanique de la Faculté des Sciences, en les établissant à l'aide de raisonnements analogues à ceux dont je viens de faire usage.

» Observons d'ailleurs que ces formules continuent de subsister dans le cas ou le corps que l'on considère se meut librement dans l'espace, et ou l'on prend pour origine des coordonnées le centre de gravité de ce corps.

§ II — *Sur l'équilibre et le mouvement d'un systeme de molecules dont les dimensions ne sont pas supposées nulles*

Considérons un systeme de molécules dont les dimensions ne soient pas supposées nulles, et nommons

m une de ces molecules,

(m) et $[m]$ deux éléments distincts et infiniment petits de cette même molécule

Supposons d'ailleurs qu'en prenant pour axes coordonnées trois axes fixes de position dans l'espace, on nomme

x, y, z les coordonnées du centre de gravité de la molécule m ,

$x+\partial x, y+\partial y, z+\partial z$ les coordonnées de l'élément (m) ,

$x+\partial x, y+\partial y, z+\partial z$ les coordonnées de l'élément $[m]$

» Soient encore

m une molécule distincte de m ;

(m) et $[m]$ deux éléments de la molécule m correspondants aux éléments

(m) et $[m]$ de la molécule m ,

et $x+\Delta x, y+\Delta y, z+\Delta z$ les coordonnées du centre de gravité de la molécule m

» Les coordonnées de l'élément (m) seront

$x + \Delta x + \partial x + \Delta \partial x, \quad y + \Delta y + \partial y + \Delta \partial y, \quad z + \Delta z + \partial z + \Delta \partial z;$

tandis que celles de l'élément $[m]$ seront

$x + \Delta x + \partial x + \Delta \partial x, \quad y + \Delta y + \partial y + \Delta \partial y, \quad z + \Delta z + \partial z + \Delta \partial z.$

» Soient enfin

r la distance qui sépare les centres de gravité des molécules m et m ;

ι la distance qui sépare l'élément (m) de l'élément $[m]$;

$(m)[m]f(v)$ l'action mutuelle de ces deux éléments, $f(v)$ désignant une quantité positive, lorsque les molécules s'attirent, et négative lorsqu'elles se repoussent. On aura

$$(1) \quad \begin{cases} v^2 = (\Delta x + \partial x - \partial x + \Delta \partial x)^2 \\ \quad + (\Delta y + \partial y - \partial y + \Delta \partial y)^2 + (\Delta z + \partial z - \partial z + \Delta \partial z)^2. \end{cases}$$

D'ailleurs au système des forces qui solliciteront la molécule m correspondra, non-seulement une *force principale*, mais encore un *moment linéaire principal*; et, si l'on nomme

α, β, γ les projections algébriques de cette force principale,

ξ, η, ζ les projections algébriques de ce moment linéaire principal, dans le cas où l'on prend pour origine des moments le centre de gravité de la molécule;

on aura, pour déterminer

$$\alpha, \beta, \gamma, \xi, \eta, \zeta,$$

des équations de la forme

$$(2) \quad \alpha = S \sum \left\{ (m) [m] \frac{\Delta x + \partial x - \partial x + \Delta \partial x}{v} f(v) \right\}, \dots,$$

$$(3) \quad \xi = S \sum \left\{ (m) [m] \frac{(\Delta x + \partial x - \partial x + \Delta \partial x) \partial y - (\Delta y + \partial y - \partial y + \Delta \partial y) \Delta x}{v} f(v) \right\}, \dots,$$

la sommation qu'indique le signe S se rapportant aux diverses molécules m distinctes de m , et les deux sommations qu'indiquent les deux signes \sum étant relatives, l'une aux divers éléments (m) de la molécule m , l'autre aux divers éléments $[m]$ de la molécule m .

• Cela posé, si le système des molécules que l'on considère est en équilibre, les équations d'équilibre seront

$$(4) \quad \begin{cases} x = 0, & y = 0, & z = 0, \\ \xi = 0, & \eta = 0, & \pi = 0, \end{cases}$$

• Passons maintenant au cas où le système de molécules est en mouvement. Soient

$$x, y, z$$

les coordonnées de l'élément (m) de la molécule m , rapportées à trois axes rectangulaires qui conservent une position fixe dans la molécule, et qui coïncident avec les trois axes principaux menés par le centre de gravité. Soient, de plus,

$$A, B, C$$

les trois moments d'inertie principaux relatifs à ce même centre, et

$$\begin{aligned} \alpha, \beta, \gamma, \\ \alpha', \beta', \gamma', \\ \alpha'', \beta'', \gamma'', \end{aligned}$$

les cosinus des angles formés avec les demi axes des x, y, z positives par les demi-axes des x, y, z positives. Enfin, supposons les quantités

$$p, q, r$$

liées à ces cosinus, et les quantités

$$I, M, N$$

liées aux projections algébriques

$$\xi, \eta, \pi$$

par les formules données dans la § 1^{re}. Les équations qui représenteront le mouvement du système de molécules seront

$$(5) \quad m D_t x = x, \quad m D_t y = y, \quad m D_t z = z,$$

et

$$(6) \quad \begin{cases} AD_1 p + (B - C) qr + L = 0, \\ BD_1 q + (C - A) rp + M = 0, \\ CD_1 r + (A - B) pq + N = 0. \end{cases}$$

On aura d'ailleurs

$$\begin{cases} \partial x = \alpha x + \xi y + \gamma z, \\ \partial y = \alpha' x + \xi' y + \gamma' z, \\ \partial z = \alpha'' x + \xi'' y + \gamma'' z \end{cases}$$

Il importe d'observer qu'on peut, aux formules (7), joindre des formules analogues, mais relatives à la molécule m . En effet, soient

$$x, y, z,$$

les coordonnées de l'élément $[m]$ de cette dernière molécule, rapportées aux axes principaux qui passent par le centre de gravité. Les formules (7) continueront de subsister quand on y remplacera simultanément

$$\begin{array}{lll} \partial x, \partial y, \partial z, & \text{par} & \partial x + \Delta \partial x, \quad \partial y + \Delta \partial y, \quad \partial z + \Delta \partial z, \\ \alpha, \xi, \gamma, & \text{par} & \alpha + \Delta \alpha, \quad \xi + \Delta \xi, \quad \gamma + \Delta \gamma, \\ \text{et } x, y, z, & \text{par} & x, y, z. \end{array}$$

On aura donc

$$(8) \quad \begin{cases} \partial x + \Delta \partial x = (\alpha + \Delta \alpha) x + (\xi + \Delta \xi) y + (\gamma + \Delta \gamma) z, \\ \partial y + \Delta \partial y = (\alpha' + \Delta \alpha') x + (\xi' + \Delta \xi') y + (\gamma' + \Delta \gamma') z, \\ \partial z + \Delta \partial z = (\alpha'' + \Delta \alpha'') x + (\xi'' + \Delta \xi'') y + (\gamma'' + \Delta \gamma'') z. \end{cases}$$

Si maintenant on substitue les valeurs de

$$\partial x, \partial y, \partial z, \quad \partial x + \Delta \partial x, \quad \partial y + \Delta \partial y, \quad \partial z + \Delta \partial z,$$

tirées des formules (7) et (8), dans les seconds membres des équations (2) et (3), on en conclura que les six quantités

$$x, y, z, \xi, \eta, \pi$$

peuvent être considérées comme des fonctions déterminées des variables

$$x, y, z, \alpha, \beta, \gamma, \alpha', \beta', \gamma', \alpha'', \beta'', \gamma'',$$

et de leurs différences indiquées à l'aide de la caractéristique Δ . D'ailleurs, parmi ces variables, les neuf dernières seront liées entre elles par les équations (2) du § 1^{er}

On doit remarquer le cas où les dimensions de chaque molécule sont supposées très-petites par rapport à la distance des deux molécules voisines, en sorte que vis-à-vis des rapports

$$\frac{\partial x}{r}, \frac{\partial y}{r}, \frac{\partial z}{r}, \frac{\partial x'}{r}, \frac{\partial y'}{r}, \frac{\partial z'}{r},$$

on puisse négliger les carrés ou même seulement les cubes de ces rapports. Nous développerons dans un autre article, non seulement les formules qu'on obtient dans cette hypothèse et qui se déduisent aisément des précédentes, mais encore celles que renferment divers Mémoires joints à celui-ci, et relatifs à la théorie de la lumière »

M DE NOTHOMB a présenté à l'Académie, par l'intermédiaire de M Liebegours, un *appareil electro medical* importé par lui. Cet appareil magnétique construit à Prague, est susceptible de donner des commotions graduées

M LIEBEGOURS profite de cette occasion pour en présenter un qui a été construit dans ses ateliers, et dans lequel, d'après les conseils de M de Nothomb, l'élément à courant constant de l'appareil allemand se trouve remplacé par un élément de Bunsen. Il a reconnu que cette modification augmente notablement l'énergie déjà très-grande de l'appareil allemand, et permet de reproduire avec succès tous les effets de l'appareil de Clarke

M SOLKIL a présenté, dans une séance précédente, plusieurs appareils servant à la démonstration des phénomènes des anneaux colorés, il en présente dans cette séance deux nouveaux qui doivent faire partie de la même collection. Ces deux appareils ont été construits sur l'indication de M Regnault

Le premier a pour objet les anneaux colorés qui se forment entre une plaque métallique et une lentille convexe

Le second appareil présente les anneaux qui se forment entre une plaque de spath d'Irlande et la surface inférieure légèrement convexe d'un

prisme de verre, lorsqu'on interpose un liquide dont l'indice de réfraction est intermédiaire entre l'indice du rayon ordinaire et celui du rayon extraordinaire du spath. Lorsqu'on regarde les anneaux au moyen d'un prisme biréfringent, on en voit deux systèmes qui sont successivement, l'un à centre blanc, l'autre à centre noir, dans les diverses positions que l'on donne à la section principale du prisme biréfringent.

» Le liquide qui convient le mieux pour cette expérience est un mélange à parties égales d'essence de girofle et d'essence de laurier. »

PHYSIOLOGIE. — *Recherches physiologiques sur les substances alimentaires;*
par MM. C. BERNARD (de Villefranche) et BARRESWIL.

Expériences comparatives sur le sucre, l'albumine et la gélatine.

» Dans un travail, publié au mois de décembre dernier, l'un de nous a indiqué un procédé simple, et d'une exécution facile, pour reconnaître si une substance est alimentaire.

» Ce procédé consiste à faire dissoudre dans le suc gastrique la substance qu'on veut étudier, et à injecter la solution dans la veine jugulaire d'un animal (1).

» En opérant ainsi, ou a pour but de faire, au moyen du suc gastrique, des *chyles artificiels* avec des substances connues et dosées, qu'on introduit directement dans le sang et dont on peut suivre les transformations diverses. « Si la substance soumise à cette épreuve est assimilable, elle disparaît en entier dans le sang, et l'on n'en découvre aucune trace dans les excréments; tel est le cas du sucre et de l'albumine qui s'assimilent entièrement quand on les injecte avec du suc gastrique, tandis que les mêmes matières se retrouvent en nature dans les urines, sans avoir subi aucune modification, quand on les injecte comparativement à la même dose, mais seulement dissoutes dans de l'eau simple.

» Si, au contraire, les substances soumises à ce mode d'expérimentation ne sont pas assimilables, elles ne disparaissent jamais dans le sang; et, qu'elles aient été dissoutes dans le suc gastrique, en *proportion quelconque*, ou bien dans tout autre véhicule, elles se trouvent toujours en nature dans

(1) C'est toujours avec le suc gastrique d'un chien que nous avons opéré les dissolutions des substances; les injections peuvent être faites indifféremment sur des chiens ou des lapins.

les excréments, tel est le cas du prussiate de potasse, par exemple, qui est toujours éliminé par les voies urinaires.

» Les résultats fournis par ces digestions artificielles sont conformes à ce qui se passe dans la digestion naturelle. Ainsi, en introduisant du sucre, de l'albumine, dans l'estomac d'un chien à jeun, nous n'avons jamais pu retrouver ces substances dans les urines, tandis que le prussiate de potasse se retrouvait en totalité.

» En résumé, pour nous, le caractère d'une substance alimentaire est de disparaître dans le sang quand on l'injecte préalablement dissoute dans le suc gastrique.

» C'est à l'aide de ce moyen nouveau d'expérimentation, employé toujours d'une manière comparative, que nous avons entrepris l'étude des différentes substances indiquées comme alimentaires.

Résultats d'une première série d'expériences faites comparativement avec le sucre, l'albumine et la gélatine.

» 1°. Sur trois chiens à jeun et bien portants, nous avons injecté par la veine jugulaire: au premier, une solution aqueuse de 5 décigrammes de sucre de canne; au deuxième, une solution aqueuse de 5 décigrammes d'albumine, au troisième, une solution aqueuse de 5 décigrammes de gélatine (ichtyocolle) (1).

» Aucun accident ne s'est manifesté à la suite de ces injections.

» Les animaux ayant été sondés trois heures après, nous avons examiné leurs urines.

» Dans l'urine du premier chien, nous avons retrouvé le sucre qui n'avait subi aucune modification, et qui avait conservé tous ses caractères de *sucre de canne*.

» Les urines du deuxième chien contenaient de l'albumine; et dans l'urine du troisième chien, les réactifs nous ont dénoté, de la manière la plus évidente, la présence de la gélatine.

» Ainsi le sucre, l'albumine et la gélatine, injectés *sans suc gastrique*, ont été retrouvés en nature dans les urines.

» 2°. Nous avons pris une même quantité de ces mêmes substances, nous

(1) Pour avoir des résultats constants, nous avons employé l'ichtyocolle, qui peut toujours être injectée dans le sang impunément, tandis que les gélatines, même très-belles, prises dans le commerce, ont souvent produit des accidents qui compliquaient l'expérience.

avons fait dissoudre chacune séparément dans 15 grammes de suc gastrique fraîchement extrait de l'estomac d'un chien, et nous les avons laissés digérer pendant six ou huit heures au bain-marie, à une température de + 38 à 40 degrés.

» Sur trois chiens à jeun et bien portants, nous avons injecté par la veine jugulaire: au premier, la solution de sucre; au deuxième, la solution d'albumine; et au troisième, la solution de gélatine.

» Aucun accident n'est résulté de ces injections qui, de même que dans le cas précédent, ont été faites avec précaution et lentement.

» Les urines ont été retirées de la vessie trois heures après, et examinées avec soin et à différentes reprises.

» Nous n'avons pu découvrir ni le sucre, ni l'albumine dans les urines des deux animaux auxquels on avait injecté ces substances, tandis que la présence de la gélatine était indubitable dans les urines du troisième chien.

» Ainsi donc le sucre et l'albumine, préalablement dissous dans le suc gastrique et injectés dans les veines, ont disparu dans le sang et ont été assimilés, au lieu que la gélatine, traitée de la même manière, n'a pas été assimilée et a été, comme auparavant, expulsée par les voies urinaires.

Seconde série d'expériences dans lesquelles le sucre, l'albumine et la gélatine ont été soumises à la digestion naturelle.

» Nous avons nourri trois chiens l'un, exclusivement avec du sucre, l'autre, avec de l'albumine, le troisième avec de la gélatine.

» Durant cette alimentation, les urines des trois animaux ont été examinées comparativement: le sucre et l'albumine n'ont pas pu être retrouvés dans les urines, tandis qu'au contraire on y trouvait de la gélatine

» Pour donner à ces dernières expériences encore plus de certitude, nous les avons répétées sur nous-mêmes. Nous avons pris à jeun et alternativement, du sucre, de l'albumine et de la gélatine. Dans aucune circonstance nous n'avons pu constater dans nos urines la présence du sucre ou de l'albumine, tandis que nous y retrouvions de la gélatine.

» En résumé, quand on injecte directement, dans le sang, de la gélatine dissoute dans le suc gastrique, on la retrouve constamment dans les excréments; le sucre et l'albumine, au contraire, dans les mêmes circonstances, disparaissent dans l'économie (1). »

(1) Dans la suite de ce travail, nous indiquerons quels sont les produits ultimes de la digestion de l'albumine et du sucre.

ECONOMIE RURALE. — *Sur les premiers efforts faits pour introduire en France la culture du Polygonum tinctorium.* Lettre de M. JAUME SAINT-HILAIRE

« Dans sa séance du 16 juillet 1838, l'Académie des Sciences entendit et approuva le Rapport d'une Commission composée de MM. Thenard, d'Arcet et Robiquet, sur la priorité de l'introduction en France du *Polygonum tinctorium*, dans lequel le rapporteur dit : « C'est au nom de la Commission » que je viens déclarer qu'il résulte en effet des diverses lettres ministérielles » et autres qui ont été mises à notre disposition, que depuis 1816 M. Jaume » Saint-Hilaire n'a cessé d'appeler l'attention du Gouvernement sur les » plantes tinctoriales de l'Inde et de la Chine..., et il nous paraît bien évident » que c'est d'après ses communications, faites à la Société royale et centrale » d'Agriculture, qu'on s'est enfin occupé en France du *Polygonum* et de » l'extraction de son indigo, etc. Il n'en demeure pas moins constant pour » vos Commissaires que si nous arrivons un jour à tirer un parti avantageux » de cette plante, nous en serons redevables aux soins et aux instances de » M. Jaume Saint-Hilaire. »

« Dans sa séance du 12 novembre de la même année, feu Turpin lut un Mémoire sur la matière bleue du *Polygonum*, dans lequel on trouve, page 5 » De toutes les personnes qui se sont occupées du *Polygonum* et qui ont » par différents moyens, contribué à l'introduction de cette plante, on doit » placer en tête M. Jaume Saint-Hilaire, qui dans un Mémoire sur les végé- » taux indigofères, publié en 1816, a le premier attiré l'attention sur cette » plante tinctoriale, en en donnant une description détaillée et une figure » coloriée. »

« Ces deux jugements, appuyés de pièces authentiques et d'un Mémoire imprimé, n'exciterent alors et ne pouvaient exciter aucune réclamation. De sorte qu'il paraîtra au moins fort singulier que, six ans après, M. Delile, directeur du Jardin botanique de Montpellier, dans une Lettre qu'il vient d'adresser à l'Académie des Sciences, s'attribue la priorité de l'introduction en France du *Polygonum*, parce qu'il a semé des graines de cette plante en 1835, etc., comme l'a dit son ami M. Vilmorin dans l'*Almanach du bon Jardinier* pour l'année 1844. Il paraîtrait même que l'annonce de M. Vilmorin, qui appuie la prétention de M. Delile, a été insérée dans le *Bon Jardinier* à l'insu du rédacteur principal, M. Poiteau, qui a dit, dans les *Annales de la Société royale d'Horticulture*, à l'occasion de « nos boules de

blou céleste, extrait de l'indigo du *Polygonum* : « M. Jaume Saint-Hilaire, l'auteur même de l'introduction du *Polygonum tinctorium* en France, est le premier qui a donné l'éveil sur l'utilité de cette plante. »

« Ainsi, joignant au jugement de l'Académie des Sciences l'opinion de feu Turpin et celle de M. Poiteau, positivement contraires aux assertions dénuées de preuves de MM. Delile et Vilmorin, je puis attendre avec beaucoup de tranquillité le jugement du public.

« J'espère aussi qu'on remarquera la différence de position du directeur du Jardin des plantes de Montpellier avec la mienne. M. Delile a la prétention de s'attribuer un certain mérite, parce qu'il a eu la peine de semer ou de faire semer les graines qu'on lui avait envoyées. Tout le monde trouvera qu'il n'a fait que son devoir, car il est logé et payé par l'État; tandis que, depuis 1816, j'ai fait des recherches à l'étranger, j'ai imprimé un Mémoire avec figures en couleur, pour donner l'histoire de plusieurs plantes tinctoriales; pendant vingt ans j'ai continué mes instances auprès de l'autorité, jusqu'à ce que M. le comte Molé m'ait fait venir des graines de *Polygonum*, que j'ai cultivées et répandues en France, et tout cela entièrement à mes frais, dans l'espoir de contribuer aux progrès de l'industrie agricole, et de recevoir la récompense promise par un décret de l'Empereur. »

CHIMIE. — *Nouvelles recherches sur la composition du limon du Nil,*
par M. J.-L. LASSAIGNE

« La fertilité du sol, en Égypte, dans les plaines qui sont inondées chaque année par le débordement des eaux du Nil, est due, comme on le sait, au limon particulier qu'elles y déposent, et qui, par son mélange avec les couches superficielles de ce sol sablonneux, rend ainsi les terres propres à diverses espèces de culture. La nature de ce limon n'a encore été établie que par une seule analyse faite, en 1812, par M. Regnault, et publiée dans les Mémoires de la Commission d'Égypte. (*Histoire naturelle*, t. II, p. 405) Les recherches de ce chimiste tendent à démontrer que ce limon, recueilli à 500 toises du Nil (974^m, 197), est composé de : eau, 11; carbone, 9; oxyde de fer, 6; silice, 4; carbonate de magnésie, 4; carbonate de chaux, 18; alumine, 48. Consulté dernièrement par M. de Las Cases sur la véritable composition de ce limon et les résultats énoncés dans le travail précédent, j'ai dû faire différentes recherches pour m'assurer si de nouveaux essais avaient été entrepris depuis la publication du Mémoire de M. Regnault, et j'ai vu, avec surprise, que rien n'avait été publié sur ce sujet capable d'in-

terresser les agronomes. En conséquence, M. de Gasparin, membre de l'Académie, m'ayant procuré une petite quantité de ce limon qu'il devait à la complaisance de son collègue à l'Institut, M. Élie de Beaumont, je me suis empressé de l'analyser. Ce limon avait l'aspect et la couleur jaune-brunâtre d'une terre fine argilo-ferrugineuse, il happait très légèrement à la langue, et avait un toucher doux et un peu savonneux. Desséché à + 100 degrés centigrades pendant trois heures, ce limon, qui a l'apparence d'une terre bien sèche, perd néanmoins 8,5 pour 100 de son poids. Pressé entre les doigts, il se réduit facilement en poussière, et, quand on en plonge des morceaux dans l'eau à la température ordinaire, il se délite bientôt en augmentant un peu de volume, et se transforme en une bouillie épaisse qui, après avoir été égouttée de l'excédant d'eau interposée entre ses molécules, offre la plasticité de l'argile, se pétrit et prend de la dureté par l'action du feu.

Avant d'entreprendre aucune réaction chimique sur ce limon, il m'a paru intéressant d'en rechercher la densité, et, pour éviter l'hydratation de cette terre limoneuse, en la pesant dans l'eau distillée par les moyens employés ordinairement pour arriver à ce but, j'ai fait l'expérience en pesant le limon desséché à + 100 dans de l'alcool pur à 0,811 de densité. Par le calcul, il m'a été facile ensuite de rapporter la densité de ce limon à la densité de l'eau distillée.

Voici les données fournies par l'expérience

Poids du limon sec	2 ^{gr} ,50
Poids du volume d'alcool déplacé à la température de + 15 degrés	0 ^{gr} ,85
Poids du volume d'eau distillée correspondant à celui de l'alcool	1 ^{gr} ,048

$$x = \frac{2,50}{1,048} = 2,385$$

En comparant la densité de cette portion du limon du Nil à la densité des différentes terres simples et composées, telle que Schubler en a donné des exemples, on remarque qu'il se rapproche, par ce caractère physique, des argiles et de la bonne terre de jardin (Voyez *Cours d'Agriculture*, par M. de Gasparin, tome I^{er} 2^e partie, chapitre I^{er}, page 153).

Analyse chimique

Un gramme de ce limon, bien desséché à + 100 degrés, ayant été calciné au rouge dans un creuset de platine au contact de l'air, a perdu, par cette calcination, 0^{gr},135. Cette perte, comme nous l'avons reconnu par des expériences ultérieures, doit être attribuée à une portion d'eau qui y

reste combinée, et à une matière combustible qui a été brûlée par l'oxygène de l'air

» Dans le but de rechercher d'abord si ce limon ne renfermait pas de la matière organique dont la présence n'est nullement signalée dans le travail de M. Regnault, j'ai tenté plusieurs essais qui m'ont permis de la distinguer par les propriétés suivantes, que j'ai pu constater :

1^o Une portion de ce limon chauffée dans un tube de verre en plaçant à l'ouverture du tube deux petites bandes de papier, colorées l'une en bleu et l'autre en rouge, par le tournesol, a laissé exhaler avec l'eau qui s'est condensée sur les parois supérieures, une vapeur ammoniacale empyreumatique qui a bleui le papier rouge de tournesol. Après cette calcination effectuée à l'abri de l'air, le limon avait pris une teinte noirâtre assez prononcée, due indubitablement à une partie de carbone que la matière organique a abandonnée par sa décomposition au feu.

2^o Bien que la vapeur ammoniacale produite dans la calcination précédente attestât la présence de l'azote au nombre des éléments de la matière organique que je venais de déceler, j'ai tenté une nouvelle expérience en chauffant avec du potassium, dans un tube, une petite quantité de limon desséché. Le produit de cette nouvelle calcination a été dissous dans l'eau, et le solum qui en est résulté, décanté de la portion de terre non attaquée, a fourni avec le deutosulfate de fer et l'acide chlorhydrique une liqueur bleuâtre qui a laissé précipiter des flocons de *bleu de Prusse*. La formation de ce composé en attestant la présence du cynogène dans le produit de la calcination, démontre évidemment la préexistence de l'azote dans la matière organique en question.

3^o Une autre portion de limon mise en contact avec des solums séparés de potasse et d'ammoniaque faibles, a abandonné à ceux-ci une matière organique brune, qui s'y est dissoute à la température ordinaire, en les colorant. Cette matière organique, extraite par l'évaporation du solum ammoniacal, se présente en une masse brunâtre que l'eau froide redissout en partie, en abandonnant une matière brune floconneuse, que les solums alcalins plus concentrés et l'acide chlorhydrique peuvent redissoudre. Cette matière brune est azotée, comme je m'en suis assuré en la calcinant avec du potassium par le procédé que j'ai déjà fait connaître dans le précédent paragraphe. La partie soluble extractiforme, obtenue par la macération de la terre limoneuse dans l'ammoniaque liquide étendue de son volume d'eau, pendant douze heures, renferme, après avoir été desséchée, de l'ammoniaque en combinaison ainsi que le démontre l'action de la po-

tasse sur elle. Ce solum alcalin, saturé par l'acide chlorhydrique, se trouble et laisse déposer des flocons bruns qui présentent, par leur légère solubilité dans l'alcool, par les combinaisons solubles, brunes et incristallisables qu'ils forment avec la potasse, la soude et l'ammoniaque, tous les caractères de l'acide ulmique existant dans le terrain végétal et les débris de la décomposition de la plupart des substances organiques.

L'acide ulmique, que cette action des solums alcalins m'a permis de reconnaître dans le limon du Nil, y existe mélangé à la matière brune azotée que j'ai signalée plus haut et en partie libre et en partie unie à la chaux et à un peu d'ammoniaque. En effet, en traitant à froid une partie de ce limon par un solum concentré de potasse, il s'y développe un dégagement sensible et faible d'ammoniaque que l'odeur fait distinguer concurremment avec les vapeurs blanches que l'approche d'un tube mouillé d'acide chlorhydrique y produit. D'un autre côté, le limon traité d'abord par l'acide chlorhydrique très-faible, cède plus facilement à l'ammoniaque liquide et l'acide ulmique et la matière organique qu'il contient. L'acide chlorhydrique tient en dissolution de la chaux, un peu d'oxyde de manganèse, de l'oxyde de fer et une petite quantité de matière organique brune.

Détermination et évaluation des éléments inorganiques ou minéraux du limon

Le rapport des principes minéraux formant la base principale du limon du Nil a été établie en suivant, à quelques modifications près, le procédé qui a été exécuté par M. Regnault dans l'analyse qu'il a publiée en 1812, procédé qui, au reste, est celui que l'on suit ordinairement dans l'analyse des roches et des pierres.

Avant de l'employer sur le limon du Nil, j'ai cru devoir isoler, par l'action successive de l'acide chlorhydrique et de l'ammoniaque faible, tout ce que ces agents pouvaient directement en extraire, c'est ainsi qu'il m'a été possible de déterminer la petite quantité de matière calcaire et de matière organique qui est mélangée à l'espèce de terre argileuse, base de ce limon.

Quant aux éléments de cette dernière terre, je les ai isolés en fondant avec trois fois son poids de potasse dans l'alcool, dans un creuset d'argent, une portion de limon préalablement calcinée au rouge. La masse fondue qui en est résultée était colorée en jaune verdâtre, délayée dans de l'eau distillée tiède, elle a été ensuite entièrement dissoute par l'acide chlorhydrique.

La dissolution évaporée à siccité a laissé un résidu blanc pulvérulent, d'où l'eau bouillante, acidulée par l'acide chlorhydrique, a séparé la silice à

l'état de pureté. Son poids a été estimé, après l'avoir fait rougir dans un creuset de platine.

L'ammoniaque versée ensuite dans la liqueur d'où la silice avait été séparée a produit un précipité abondant jaunâtre et floconneux composé d'alumine et de peroxyde de fer à l'état d'hydrates. Ces deux oxydes recueillis ont été traités par un solutum bouillant de potasse caustique qui a dissous l'alumine et a isolé le peroxyde de fer. Ce dernier, dissous dans l'acide sulfurique pur, a fourni une dissolution qui a été évaporée à siccité. Le résidu qui en provenait calciné au rouge a laissé du peroxyde de fer anhydre qu'on a lavé à l'eau bouillante pour isoler d'un peu de chaux et de magnésie qu'il contenait à l'état de sulfates.

L'alumine a été précipitée de sa solution alcaline en saturant exactement cette dernière par un acide.

En resumant les faits observés dans ce travail, il m'est permis de conclure que la portion du limon du Nil sur laquelle j'ai opéré est composée après dessiccation à $+ 100$ degrés centigrades,

Silice (acide silicique)	42 50
Alumine (oxyde d'aluminium)	24 25
Peroxyde de fer	13 65
Carbonate de chaux	3 85
Carbonate de magnésie	1 20
Magnésie	1 05
Acide ulmique et matière organique azotée	2,80
Eau	10 70
	<hr/> 100 00

Cette nouvelle analyse, en faisant mieux connaître la composition du limon du Nil, que ne l'avaient établi les résultats publiés en 1812 par M. Regnault, démontre que cette terre d'alluvion, si fertile, est un véritable *silicate d'alumine* formé, à peu de chose près, de 2 atomes de silice et de 1 atome d'alumine (Al Si^2). La proportion d'eau qui existe dans ce limon desséché à $+ 100$ degrés serait en partie unie à ce silicate et en partie au peroxyde de fer.

La présence assez remarquable de l'acide ulmique et d'une matière organique azotée dans ce limon expliquerait mieux ses avantages comme engrais que le carbone que M. Regnault y a admis en 1812.

Il est toutefois vraisemblable que les bons effets du limon du Nil abandonné par les eaux à la surface des terres de la moyenne et de la basse Égypte sont dus tout à la fois à ce qu'il agit en amendant la constitution sa-

blonneuse du sol et en y déposant l'espace de terreau qu'il contient naturellement

M PANCKOUCKE adresse une Notice sur un *nouveau système d'impression* qui permettrait d'économiser moitié sur les frais de papier et de tirage. M Panckoucke a remarqué qu'on peut, avec un peu d'habitude, lire sans hésitation une ligne imprimée dont on ne voit que la moitié supérieure, il propose en conséquence de retrancher toute l'autre moitié. Or, comme dès lors la partie inférieure des caractères est rangée sur une ligne droite, on peut réduire l'intervalle entre les lignes sans qu'il en résulte de confusion, l'espace qui l'on maintient ordinairement n'étant nécessaire que parce que plusieurs lettres, le *p*, le *q*, le *f*, le *g* et le *y*, ont des prolongements inférieurs qui disparaissent dans l'impression *a mi-type*.

M FARDELY adresse à M. Arago quelques considérations sur les *télegraphes électriques*, et notamment sur la découverte récente de M. Bain, qui est parvenu, en Angleterre, à faire agir ces télégraphes sans l'emploi d'une batterie voltaïque régulière, et seulement en plaçant dans la terre humide des lames de zinc et de cuivre que l'on fait communiquer par un fil métallique isolé. M Fardely rappelle quelques faits déjà connus, mais qui lui semblent dignes d'intérêt, en ce qu'ils permettent d'espérer que l'isolement absolu des conducteurs cessera d'être une condition indispensable pour l'établissement de télégraphes électriques.

M GARNVAL, à l'occasion d'une Lettre récente de M. *Loiris du Val*, insiste sur les inconvénients qui peuvent résulter de l'emploi des poisons minéraux dans les *embaumements*, et fait remarquer que la question cessant d'être une pure question industrielle, mais intéressant à la fois l'hygiène publique et la médecine légale, l'Académie jugera peut-être convenable de signaler les méthodes qui pourraient conduire à de graves abus, et celles dont l'innocuité n'est pas douteuse.

Une PERSONNE qui, d'après le but de sa Lettre, ne devait pas se faire connaître, prie l'Académie de vouloir bien reculer de trois mois l'époque fixée pour la clôture du concours concernant l'application de la vapeur à la navigation.

Cette demande est renvoyée à l'examen de la Commission nommée pour le concours en question.

M. BOURT adresse un paquet cacheté
L'Académie en accepte le dépôt.

La séance est levée à 5 heures et demie.

A

FERRATA.

(Séance du 12 février 1844.)

Page 262, ligne 20, *au lieu de BARRET-RIVET, lisez : BANET-RIVET.*

(Séance du 8 avril.)

Page 673, le renvoi (1) pour la note doit être reporté à la fin de la vingt-septième ligne, et remplace par le renvoi (2) qui se rapportera à la note suivante, qui a été oubliée.

(2) *Archives d'Histoire naturelle d'Erichson, pour 1842.*

Page 674, ligne 16, *blicea, lisez blicea.*

Page 676, ligne 3 de la note, interne, *lisez continue.*

Page 695, ligne 27, *au lieu de BARRET, lisez. BANET.*

Page 710, lignes 16 et 17, *au lieu de apoplexie, lisez. asphyxie.*

BULLETIN BIBLIOGRAPHIQUE

L'Académie a reçu, dans cette séance les ouvrages dont voici les titres

Comptes rendus hebdomadaires des séances de l'Académie royale des Sciences
1^{er} semestre 1844, n° 16, in-4°

Annales de la Chirurgie française et étrangère, avril 1844, in-8°

Annales de la Société entomologique de France, tome I^{er}, 1843, 4^e trimestre,
in 8°

Mémoires de la Société royale d'Emulation d'Abbeville, 1841 1842, 1843
in-8°

Notice sur quelques perforations faites par les Insectes dans les plaques métalliques, par M E DESMAREST, broch in-8°

Histoire des Enfants trouvés par MM TERME et MONFALCON nouvelle
édition, revue et augmentée Paris, 1840, in 8°

Collection géographique de la Bibliothèque royale, 4^e et 5^e numéros, in 8°

Nouveaux Bateaux à vapeur, de très-grandes dimensions et à très-grandes vitesses ou la résistance de l'eau ne peut plus augmenter comme le carré des vitesses, par MM VILBIEN et LEGRIS, 1 feuille in-8°, autographiée

Impression mi-type — Réduction possible de moitié de tous les frais d'impression papier, brochure, reliure des livres journaux etc , etc, par M PANCKOUCKE, broch in-8°

Mémorial encyclopédique mars 1844, in-8°

Journal de Chirurgie par M MALGAIGNE, avril 1844, in-8°

Journal des Connaissances médicales pratiques, avril 1844, in-8°

Observatoire de Bruxelles — Rapport adressé à M le Ministre de l'Intérieur sur l'état et les travaux de l'Observatoire pen tant l'année 1843, 1 feuille in 8°

The electrical Le Magasin d'Electricité dirigé par M WALSER, vol I^{er},
n° 4, février 1844, in 8°

Journal für die Journal de Mathématiques pures et appliquées publié par
M CRELLE, XXVII^e vol , 1^{re} et 2^e livr Berlin, 1844, in-4°

Zur vermittelung Sur la conciliation des Doctrines extrêmes en Médecine,
par M TH V STURMER Leipzig, 1837, 1839 et 1843, 3 vol in 8°

Ephemeridi Ephémérides astronomiques de Milan, pour l'année bissextile
1844, calculées par MM CAPELLI et BUZZETTI Milan, 1843, in-8°

Notizie. Notices géologiques sur les Volcans de la Campanie, extraites des
Leçons de Géologie de M A SCACCHI Naples, 1844, in 8

COMPTE RENDU

DES SÉANCES

DE L'ACADÉMIE DES SCIENCES.

SÉANCE DU LUNDI 29 AVRIL 1844.

PRÉSIDENCE DE M. ÉLIE DE BEAUMONT.

MÉMOIRES ET COMMUNICATIONS

DES MEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE L'ACADÉMIE.

CHIMIE OPTIQUE. — *Note sur les phénomènes de polarisation produits à travers les globules féculacés ; par M. Biot.*

« J'ai l'honneur d'offrir à l'attention de l'Académie, dans la salle d'attente, la disposition d'appareil microscopique, dont je l'ai entretenue dans la séance dernière, et qui a pour effet de manifester, avec une entière évidence, la construction, tant externe qu'interne, des globules féculacés, par les modifications que la lumière polarisée reçoit en traversant les couches solides et superposées qui les constituent. J'avais depuis longtemps annoncé ce fait dans les *Comptes rendus* (tome V, page 905), et je l'établissais en observant les globules à travers deux prismes de Nicol croisés rectangulairement; car alors la transmission de la lumière était restituée en chaque point de leur interposition, avec des particularités dépendantes de leur structure, de leur forme et de leur grosseur. Mais, en réfléchissant à la nature lamellaire de ce genre d'action, j'ai compris qu'il devrait devenir bien plus manifeste, si, au lieu d'observer les effets absolus des globules sur la lumière blanche, on les faisait agir, par différence et par somme, sur la teinte extraordinaire produite

par une lame mince de chaux sulfatée, telle que celles que j'ai appelées *lames sensibles*, dans mes recherches sur la *polarisation lamellaire*. L'expérience a confirmé cette prévision. Lorsqu'une pareille lame est interposée entre les deux prismes, de manière que la ligne moyenne entre ses axes forme avec leurs sections principales un angle d'environ 45° , la masse de chaque globule s'illumine de vives couleurs, dont les nuances varient avec la multiplicité de leurs couches, et avec la direction suivant laquelle les rayons lumineux les traversent; de manière à montrer, comme par la plus parfaite peinture, toutes les inflexions de leurs contours, toutes les ondulations de leur surface, toutes les particularités de leur structure, et les moindres accidentés qui les diversifient. On peut même voir ainsi la constitution interne des globules, soit en les brisant par la friction entre deux objectifs, l'un concave, l'autre convexe, de rayons peu différents, soit en les écrasant entre les lames planes d'un compresseur confectionné par M. Charles Chevalier. Alors, ceux qui sont seulement entr'ouverts agissent par leurs fragments séparés conformément aux lois de leur structure propre; ceux qui sont complètement ouverts agissent par leurs contours encore obliques aux rayons transmis, tandis que les couches écrasées, devenues normales à ces rayons, perdant leur pouvoir, laissent passer la teinte générale du fond sans la changer, ce qui est un résultat propre à toute action lamellaire. Toutefois, lorsque la lame sensible est parfaitement choisie, si l'on regarde avec attention l'intérieur des couches ainsi déployées et étendues, on y aperçoit encore des filaments, et même des granules, dont l'action propre, conséquemment l'organisation, se décele par une modification de la teinte générale très-faible, mais pourtant sensible; ce qui est le seul effet perceptible qu'on en puisse attendre, puisque leur excessive petitesse, rapprochant au même degré dans l'œil les filets lumineux diversement colorés qui en résultent, cette diversité de coloration correspondante aux diverses parties de leur masse, n'est plus perceptible que dans leur ensemble. Toutes les lames minces de chaux sulfatée employées de la même manière éprouvent ainsi, dans leur teinte extraordinaire, des modifications analogues, par lesquelles les globules se montrent illuminés d'autres couleurs qu'avec la lame sensible; mais comme ces modifications sont moins grandes, surtout moins frappantes par leur opposition de nuance que celles de cette lame, elles font perdre les derniers détails que celle-ci fait apercevoir. J'ai pu, par exemple, avec son secours, reconnaître des effets d'organisation manifestes jusque dans les granules filtrables à chaud à travers le papier, mais non solubles dans l'eau froide avec permanence, que M. Jacquelin a extraits de la fécule de pommes de terre, en la désagrégeant dans

l'eau chargée seulement de $\frac{1}{1000}$ d'acide oxalique, avec le secours d'une haute température et d'une haute pression.

» De tout cela, il résulte que les globules de fécule sont de véritables fruits, nés dans les cellules végétales d'où on les extrait, et aussi régulièrement organisés que des pommes ou des poires; de sorte qu'il faut avoir égard aux phénomènes physiques résultant de la désagrégation plus ou moins avancée que leur structure éprouve, lorsqu'on veut étudier exactement les effets produits sur eux par les milieux des agents chimiques qui peuvent s'unir à leur substance, avec ou sans décomposition. »

ÉCONOMIE RURALE. — *Expériences sur la qualité nutritive des tourteaux de la graine du Sésame; par MM. DE GASPARIN et PAYEN.*

» De graves intérêts, sous les points de vue agricoles, manufacturiers et commerciaux, se rattachent aux produits de la graine du Sésame.

» Peut-être la question telle que les économistes l'envisagent aujourd'hui changerait-elle de face s'il arrivait qu'un jour on eût la certitude de pouvoir récolter économiquement cette graine oléifère si riche dans nos terres de la Provence et de l'Algérie.

» La graine de sésame fournit en abondance une huile douce, presque incolore, propre à divers usages et particulièrement à la fabrication des savons; les extracteurs d'huile, ceux surtout qui approvisionnent la grande industrie de Marseille, savent bien apprécier les avantages du produit principal de cette matière première; mais on ignore quelles sont les propriétés du résidu de l'énergique pression à laquelle est soumise la graine broyée; ce résidu, le *tourteau de sésame*, constituerait, pour l'agriculture, un produit important s'il pouvait servir à la nourriture des vaches laitières et à l'engraissement des animaux, car il augmenterait la production de la viande et du lait, favorisant ainsi le développement de consommations, trop restreintes encore chez nous, et laissant une plus grande masse d'engrais à la disposition de nos cultivateurs.

» Mais d'abord le tourteau de sésame est-il alimentaire, et à quel degré? Les avis étaient partagés à cet égard; et si, dans des publications récentes d'ouvrages estimés d'agriculture, la question fut décidée négativement, on devait regretter qu'aucune expérience n'eût été citée à l'appui de cette assertion. Il nous a donc semblé utile d'essayer de résoudre la question par des expériences spéciales et directes.

» Sur notre demande, M. le Ministre de l'Agriculture et du Commerce a

bien voulu faire venir de Marseille et mettre à notre disposition 220 kilogrammes de tourteaux de sésame, provenant de l'huilerie de MM. Castinel et C^{ie}. Des essais préliminaires ne nous ont démontré, dans les produits de l'infusion ni de la décoction des tourteaux, aucune matière qui pût être vénéneuse, relativement aux quantités à introduire dans le régime alimentaire des animaux, quelques petits rongeurs nous ont fortuitement confirmés dans cette opinion par leur avidité et leur persistance à manger un fragment desdits tourteaux qui se trouvait à leur portée.

» Nous crûmes donc pouvoir entreprendre à la fois des essais d'alimentation et des analyses immédiates et élémentaires sur les échantillons que nous avions reçus.

» M. Vinsson, habile fabricant de fromages de Roquefort, à la Cour-Neuve, pres Saint-Denis, consentit à mettre au régime du tourteau de sésame une des brebis du troupeau qu'il entretient pour les besoins de son industrie : il donna, en élevant graduellement les doses, environ l'équivalent en tourteau du tiers de la nourriture totale ordinaire ; le lait de cette brebis, au bout de huit et de quinze jours d'alimentation au sésame, ne lui parut modifié sensiblement ni dans la quantité, ni sous le rapport de la saveur.

» Toutefois, l'obligation où l'on se trouvait de tenir cette brebis enfermée durant quelques heures, chaque jour ; les changements continuels de la nourriture prise par le troupeau en pâturage dans des champs non emblavés, ou sur les bords des chemins ; toutes ces circonstances variables ne nous permettaient point d'établir expérimentalement une comparaison précise entre les résultats des deux régimes ; ce fut donc surtout afin d'examiner nous-mêmes, à cette occasion, les caractères et la composition du lait de brebis, que nous fîmes les essais suivants

» Le lait de la brebis mise au régime du tourteau était sensiblement alcalin au papier de tournesol ; de même que le lait provenant du reste du troupeau, l'alcalinité se maintenait durant une partie de la concentration au bain-marie, un état neutre succédait à cette réaction et était suivi d'une troisième réaction légèrement acide.

	1 ^{re} brebis.	2 ^e brebis
100 centimètres cubes de lait donnèrent un résidu qui,		
desséché à 100 degrés centésimaux, pesait.	19,50	24,40
Contenant en matière butyreuse blanchâtre.	6,69.	10,50

» Le résidu de l'évaporation épuisé par l'éther de toute sa matière grasse, fut analysé dans la vue de déterminer sa contenance en azote et d'en déduire le poids de la caséine et des autres substances azotées. Voici les nom-

bres de cette analyse :

Substance employée 495^{mm},5.

Volume de l'azote. 34^{cc},5, pression 0^m,763; température 16 degrés,

d'où l'on déduit 8,13 pour 100 du lait desséché et privé de substance grasse. En admettant que la caséine et les matières azotées de ce lait continssent 0,156 d'azote, on déduirait des analyses la composition suivante dans les deux conditions, ce qui indiquerait du moins la composition approximative du lait de brebis entre deux limites et pour deux conditions différentes.

	BREBIS	
	paissent en liberté.	enfermees une partie du jour
Eau..	75,60	79,50
Beurre.	10,50	6,70
Caséine et autres matières azotées	7,54	6,92
Lactine, sels, etc.	6,36	5,88
	100,00	100,00

» Le lait provenant de toutes les traites du troupeau, mélangées, donna 18,66 de matière solide pour 100, ou 18,1 après dessiccation dans le vide.

» Il résulte de ces expériences que le lait des brebis est plus riche que le lait des vaches en substances solides, dans le rapport de 13 à 18; qu'enfin sa richesse en matière butyreuse est relativement encore plus grande (1).

» Quant à l'influence de l'addition du tourteau, elle ne pouvait être appréciée dans l'expérience autrement qu'en ce qui concerne la saveur du lait, et celle-ci ne parut en rien modifiée.

» Nous avons cru pouvoir réunir des conditions plus favorables à une expérience complète en nous adressant au propriétaire de l'un des établissements les plus considérables et les mieux dirigés pour la production du lait.

(1) L'analyse publiée par MM. Stipian, Lucius et Bondt conduirait aux mêmes conclusions, bien que ces chimistes n'eussent trouvé sur 0,25 de résidu sec, que 0,058 de beurre.

M. Damoiseau, dont nous avions déjà mis à contribution l'obligeance et le zèle éclairé pour les applications scientifiques, s'empresse de seconder nos vœux, et tandis qu'il disposait par degrés une vache de ses étables à un régime dans lequel le tourteau de sésame devait prendre une large part, nous constatons la composition du lait de la même vache, bonne laitière, sous l'influence de l'alimentation habituelle, et nous obtenions des résultats fort rapprochés de ceux des analyses faites en d'autres temps sur les produits de qualité toujours en effet bonne et sensiblement uniforme dans cet établissement.

» On en jugera en examinant les résultats comparatifs indiqués plus loin ; nous donnerons ici d'abord la composition du tourteau de sésame.

Détermination de l'azote.

Substance séchée dans le vide à 100 degrés, 427 milligrammes.

Volume du gaz acide carbonique 27^{cc},5 ; pression 76^{mm},5, température 18°,5 ; d'où l'on déduit pour 100 de matière sèche, azote 7^{mm},47.

L'eau hygroscopique étant 9,97, le tourteau normal contient 6,79 d'azote.

» La substance sèche fournit par sa combustion, 0,2 de cendres.

» 1^{er},378, traités par l'éther, ont donné 125 millig. d'huile ou 9,08 pour 100.

» Ces nombres conduisent à la composition suivante du tourteau à l'état normal :

Substance azotée	44,135	Azote. . .	6,79
Matière organique non azotée.	19,723		
Substances minérales.	18,000		
Huile	8,172		
Eau	9,970		
	<hr/>		
	100,000		

ANALYSES DU LAIT DE VACHE	ALIMENTATION habituelle.	Même du tourteau.
Pour 100 centimètres cubes de lait (dissociation au bain-marie) : substance sèche.	13,840	15,950
Beurre extrait par l'éther	3,530	4,287

Ainsi donc, le lait obtenu sous l'influence du régime du tourteau de sé-

saime est plus abondant en substances solides, et plus riche en matière butyreuse que le lait produit par la même vache nourrie avec des aliments de qualité reconnue convenable depuis longtemps.

» Les observations que nous a transmises M. Damoiseau démontrent, en outre, que l'alimentation nouvelle n'a pas été moins favorable à la production du lait, sous le rapport du volume total.

» Voici le tableau comparatif des deux régimes, dans l'un desquels M. Damoiseau eut le soin de remplacer, par une addition d'eau équivalente, l'eau contenue dans les betteraves.

1 NOURRITURE D'UNE VACHE EN VINGT-QUATRE HEURES.	2 RATION habituelle.	3 RÉGIME au tourteau
Betteraves.	32,000	0,000
Tourteau de sésame divisé.	0,000	6,666
Eau.	0,000	26,667
Remoulage blanc.	2,667	2,667
Recoupettes.	2,667	2,667
Luzerne.	4,000	0,000
Paille d'avoine.	6,000	6,000
Sel marin.	0,050	0,050

d'où l'on voit que 32 kilogrammes de betteraves et 4 kilogrammes de luzerne, représentant ensemble 8^{lit},5 de substance desséchée, ont été remplacés par 6^{lit},667 de tourteaux renfermant, à la vérité, une plus forte proportion de substance azotée et de matière grasse, et donnant un produit en lait plus considérable non-seulement sous le rapport de sa richesse en crème et matière solide totale, mais aussi par son volume; car les traites fournissaient par vingt-quatre heures:

- » 1°. Sous l'influence de l'alimentation habituelle, 15^{lit},5;
- » 2°. Sous l'influence du régime de sésame, 17 litres.
- » La saveur du lait était d'ailleurs excellente.

» Enfin, il convient d'ajouter que la main-d'œuvre, pour diviser les 6 $\frac{2}{3}$ kilogrammes de tourteau avec une hachette, est sensiblement moindre que pour nettoyer et découper en tranches les 32 kilogrammes de betteraves.

Il nous paraît donc démontré que le tourteau de sésame peut être considéré comme un bon aliment pour les vaches laitières et sans doute pour plusieurs autres animaux nourris ou engraisés dans les fermes, si des résultats contraires ont été obtenus ailleurs, cela tiendrait peut-être à l'altération des tourteaux par des *moisissures*, ou la rancidité de leur huile, surtout s'ils avaient été gardés trop longtemps et sans les soins convenables. Nous avons d'ailleurs eu l'occasion de nous assurer nous-mêmes que les tourteaux, essayés sans succès pour la nourriture des vaches dans la ferme de M. Caffin, n'étaient pas exclusivement formés par les produits de la graine de sésame, mais qu'ils étaient composés des résidus de l'expression de plusieurs graines oléagineuses.

On sait que les *tourteaux*, convenablement employés dans la nourriture des vaches, augmentent la production du lait et rendent sa qualité plus butyreuse, mais, en général, ces résidus communiquent au lait le goût spécial de leur huile. Le tourteau de sésame, dont l'huile d'ailleurs n'a pas d'odeur sensible, serait donc d'une application plus avantageuse sous ce rapport puisqu'il accroîtrait les produits des traites sans altérer leur saveur agréable.

Note lue à l'Académie, par M. AUGUSTIN CAUCHY

« Le quatrième paragraphe de mon Mémoire sur la synthèse algébrique renfermait le passage suivant (tome XVI des *Comptes rendus*, p. 1051) :

« On pourra, par la synthèse algébrique, obtenir des solutions élégantes de problèmes déterminés, par exemple, de celui qui consiste à tracer une sphère tangente à quatre sphères données, dont les centres sont C, C', C'', C''' , et les rayons r, r', r'', r''' .

« J'indiquais ensuite une solution fort simple de ce dernier problème, en disant qu'elle se déduit d'une analyse semblable à celle que j'avais employée pour la solution du problème analogue relatif aux cercles.

« C'était pour abrégé que je n'avais pas, dans le Mémoire dont il s'agit, donné *in extenso* la solution du problème relatif aux sphères. Je vais reproduire ici l'analyse qui sert à résoudre ce dernier problème, telle que je la retrouve dans une *addition* rédigée vers l'époque où je venais de composer le Mémoire. Cette analyse diffère très-peu, comme on le verra, non-seulement de celle qui a été employée par M. Arcas Trébert, dans une Note dont l'auteur a bien voulu m'adresser un exemplaire, mais encore de celle que j'avais employée moi-même dans le Mémoire sur la synthèse algébrique, pour la détermination du cercle tangent à trois cercles donnés. »

ANALYSE MATHÉMATIQUE — *Addition au Mémoire sur la synthese algebrique,*
par M. AUGUSTIN CAUCHEY

Dans le troisième paragraphe du *Mémoire sur la synthese algebrique*, j'ai considéré de nouveau un probleme de géométrie qui a souvent occupé les géometres, et qui consiste à tracer, dans un plan donné, un cercle tangent à trois cercles donnés, probleme dont j'avais présenté moi-même, il y a longtemps, une solution géométrique assez simple qui a été publiée dans la *Correspondance sur l'École Polytechnique* pour l'année 1807. L'analyse dont je me suis servi pour résoudre, non-seulement le probleme dont il s'agit, mais aussi le probleme de la sphere tangente à quatre centres, coincide en partie, comme je me suis empressé d'en faire la remarque, avec l'analyse que M. Gergonne a employée dans les *Memoires de l'Academie de Turin* pour l'année 1814, et que le même auteur a reproduite, avec de nouveaux développements, dans les *Annales de Mathematiques* (1816, 1817). J'ajoute que cette analyse peut être modifiée de manière que les équations des deux droites dont elle exige la construction renferment seulement les expressions algebriques propres à représenter les carrés des tangentes menées d'un point extérieur à des cercles ou à des spheres concentriques aux cercles ou aux spheres données, et des valeurs particulières de ces expressions. On se trouve alors conduit, par des formules très-concises et très-symétriques, aux solutions obtenues par M. Gergonne et à celles que j'ai données moi-même comme je vais l'expliquer en peu de mots (1).

Sur la recherche d'une sphere tangente à quatre autres

Soient

r, r', r'', r''' les rayons des quatre spheres données,

$a, b, c, a', b', c, a'', b'', c, a''', b''', c$ les coordonnées rectangulaires de leurs centres C, C', C'', C''' ,

ρ le rayon d'une sphere tangente aux quatre autres,

x, y, z les coordonnées du centre de cette nouvelle sphere,

x, y, z les coordonnées du point où la nouvelle sphere touche la première des spheres données

(1) Pour abréger, je ne conserve ici de mon analyse que la partie relative au probleme le plus compliqué, savoir, au probleme des spheres

Le centre (x, y, z) se trouvera séparé du centre (a, b, c) de la première sphere par la distance $r \pm \rho$. On aura donc

$$(x - a)^2 + (y - b)^2 + (z - c)^2 = (r \pm \rho)^2,$$

ou, ce qui revient au meme,

$$\mathcal{A} = 0,$$

la valeur de \mathcal{A} etant

$$\mathcal{A} = (x - a)^2 + (y - b)^2 + (z - c)^2 - (r \pm \rho)^2$$

Il y a plus. Si l'on nomme

$$\mathcal{A}, \mathcal{A}', \mathcal{A}_s$$

ce que devient \mathcal{A} quand on y remplace a, b, r par a', b', r' , ou par a_s, b_s, r_s , ou enfin par a_s, b_s, r_s , on aura évidemment

$$(1) \quad \mathcal{A} = 0, \quad \mathcal{A}' = 0, \quad \mathcal{A}_s = 0, \quad \mathcal{A}_s = 0$$

Ces quatre equations détermineront les quatre inconnues

$$x, y, z, \rho$$

D'autre part, les trois points (a, b, c) , (x, y, z) , (x, y, z) devront être situés sur une meme droite, de telle sorte que les distances du premier au deuxième et au troisième se trouvent représentées par r et par la valeur numérique du binôme $r \pm \rho$, le point (a, b, c) étant renfermé ou non renfermé entre les deux autres, suivant que le binôme $r \pm \rho$ sera positif ou négatif. On aura donc encore

$$(2) \quad \frac{x - a}{x - a} = \frac{y - b}{y - b} = \frac{z - c}{z - c} = \frac{r}{r \pm \rho},$$

le choix du double signe devant être réglé de la même manière que dans l'équation qui fournit la valeur de \mathcal{A} . Or, la formule (2) suffira évidemment pour déduire des valeurs de x, y, z, ρ les valeurs des trois inconnues

$$x, y, z$$

En resume, les sept équations représentées par les formules (1) et (2) suf-

front à la détermination des sept inconnues

$$x, y, z, \quad x, y, z, \quad \rho,$$

par conséquent à la résolution algébrique du problème. Mais, si l'on voulait construire géométriquement les valeurs des sept inconnues tirées des équations (1) et (2), on arriverait à des constructions peu élégantes. Pour éviter cet inconvénient, il suffit de combiner entre elles les formules (1) et (2) et d'en déduire des équations qui soient linéaires par rapport aux inconnues, en opérant comme il suit

Observons d'abord que, dans la fonction

$$R = (x - a)^2 + (y - b)^2 + (z - c)^2 - (r \pm \rho)^2,$$

et par suite dans chacun des polynômes

$$R, R_1, R_2, R_3,$$

la somme des termes du second degré en x, y, z, ρ sera

$$x^2 + y^2 + z^2 - \rho^2$$

Donc, si des formules (1) on veut tirer des équations linéaires en x, y, z, ρ , il suffira de combiner ces formules entre elles par voie de soustraction. On obtiendra ainsi les trois équations

$$(3) \quad R - R_1 = 0, \quad R_1 - R_2 = 0, \quad R_2 - R_3 = 0,$$

qui se trouveront comprises dans la seule formule

$$(4) \quad R = R_1 = R_2 = R_3$$

Si l'on élimine ρ entre ces mêmes équations, on obtiendra deux équations nouvelles, qui seront linéaires par rapport à x, y, z , et représenteront en conséquence une droite OA sur laquelle devra se trouver le centre (x, y, z) de la sphère cherchée

Ce n'est pas tout. Si l'on représente par θ la valeur commune des rapports égaux qui composent les divers membres de la formule (2), on aura

$$x - a = \frac{x - a}{\theta}, \quad y - b = \frac{y - b}{\theta}, \quad z - c = \frac{z - c}{\theta}, \quad r \pm \rho = \frac{r}{\theta}.$$

et, en substituant les valeurs de

$$x, y, z, \rho$$

tirées de ces dernières formules dans les équations (3), on obtiendra évidemment après avoir fait disparaître le dénominateur θ trois équations qui seront linéaires en

$$x, y, z, \theta$$

Où il suffira évidemment d'éliminer θ entre ces trois équations pour obtenir deux autres équations linéaires qui renfermeront les seules inconnues

$$x, y, z$$

et qui, en conséquence, représenteront une nouvelle droite PB sur laquelle devra se trouver le point (x, y, z) ou la sphère cherchée touchera la première des sphères données

Cela pose, il est clair que le problème énoncé pourra être réduit à la construction des seules droites OA, PB. Car, la droite PB étant tracée, l'un quelconque des points T, où elle rencontrera la surface de la première des sphères données, pourra être considéré comme le point de contact de cette sphère et de la sphère cherchée. De plus, le rayon C mene par ce point de contact devra rencontrer la droite OA au centre même de la sphère cherchée.

D'autre part, pour construire les deux droites OA, PB il suffira de connaître deux points P et A, ou O et B de chacune d'elles.

Or comme les équations des droites OA, PB se déduiront, par l'élimination de l'inconnue ρ , des seules formules (2) et (4), les valeurs de

$$x, y, z, x', y', z',$$

que fourniront, pour une valeur donnée de ρ , les six équations comprises dans ces deux formules, seront évidemment les coordonnées de deux points correspondants O et P, ou A et B des deux droites OA, PB. Enfin, il est clair que la formule (2) donnera, pour $\rho = 0$,

$$x = x', \quad y = y', \quad z = z',$$

et pour $\pm \rho = r$,

$$\frac{x-a}{x-a} = \frac{y-b}{y-b} = \frac{z-c}{z-c} = \frac{1}{2},$$

d'où il résulte que le point P se confondra simplement avec le point O si celui-ci correspond à une valeur nulle de ρ , et que la distance CB sera la moitié de la distance CA, si le point A correspond à $\pm \rho = r$. Donc, en définitive pour résoudre le problème énoncé, il suffira de construire le point O ou A dont les coordonnées x, y, z sont déterminées par la formule (4) lorsqu'on suppose dans cette formule $\rho = 0$ ou $\pm \rho = r$.

Or, chacune des formules (1), prise séparément, représente l'une des quatre sphères décrites des centres C, C, C, C₄ avec des rayons équivalents aux valeurs numériques des binômes

$$1 \pm \rho, 1 \pm \rho, 1 \pm \rho, 1 + \rho$$

et la fonction A qu'on prend pour x, y, z les coordonnées d'un point extérieur à la première de ces sphères représente le carré d'une tangente menée de ce point à la sphère. Donc le plan représenté par l'une quelconque des équations (3) est celui que M. Gaultier, de Tours, a nommé le *plan radical* correspondant à deux des sphères dont il s'agit, c'est à-dire le lieu géométrique de tous les points d'où l'on peut mener à ces deux sphères des tangentes égales. Donc le point dont les coordonnées x, y, z se trouvent déterminées par le système des équations (3), ou, ce qui revient au même par la formule (4) sera le centre radical du système des quatre sphères, c'est à-dire le point commun aux plans radicaux qui correspondent à ces mêmes sphères combinées deux à deux. Enfin les quatre sphères dont il s'agit se réduiront évidemment, si l'on pose $\rho = 0$, à celles qui étant décrites des centres C, C, C, C₄ ont pour rayons

$$1, r, 1, r,$$

par conséquent aux quatre sphères données et, si l'on pose $\pm \rho = r$, aux quatre sphères qui, étant décrites des mêmes centres, auront pour rayons les valeurs numériques des quantités

$$2r, 1 \pm 1, 1 \pm 1, r \pm 1$$

Donc, pour trouver une sphère qui en touche quatre autres, décrites des centres C, C, C, C₄ avec les rayons $r, r, 1, r$, il suffira de recourir à la règle suivante

» Déterminez le centre radical O correspondant au système des quatre sphères données, puis le centre radical A de quatre nouvelles sphères qui,

étant respectivement concentriques aux quatre premières, offrent pour rayons les valeurs numériques des quantités

$$2r, \quad 1 \pm r, \quad r \pm 1, \quad r_{\mu} \pm r$$

Enfin, joignez le point O au milieu B de la distance CA. La droite OB ainsi tracée coupera la première des sphères données en deux points T, dont chacun pourra être considéré comme un point de contact de cette sphère et d'une sphère nouvelle qui touchera les quatre premières. De plus, le centre de la nouvelle sphère sera le point ou le rayon CT, prolongé s'il est nécessaire, rencontrera la droite OA.

Il est bon d'observer qu'en égard au double signe renfermé dans chacun des binômes

$$r \pm r, \quad r \pm r, \quad r_{\mu} \pm r,$$

le nombre des positions différentes que pourra prendre la droite OB sera

$$2^3 = 8$$

Comme d'ailleurs, dans chacune de ses positions, la droite OB coupera la première des sphères données en deux points au plus, il est clair que le nombre des sphères tangentes à quatre sphères données ne surpassera jamais le nombre

$$2^4 = 16$$

On pourrait, au lieu de s'arrêter aux formules (2) et (4), chercher à déduire de ces formules les équations mêmes des droites OA, OB. Alors en raisonnant comme dans la recherche du cercle tangent à trois cercles donnés, on se trouverait conduit aux conclusions suivantes

Soient

$$R, R, R, R_{\mu}$$

ce que deviennent

$$R, R, R_{\mu}, R_{\mu}$$

quand on y pose $\rho = 0$. Soient encore

$$K, K, K_{\mu}$$

ce que deviennent

$$K, K, K_{\mu}$$

quand on y pose simultanément

$$x = a, \quad y = b, \quad \pm \rho = -r$$

Les équations de la droite OA pourront être réduites à la formule

$$(5) \quad \frac{R - R}{R - R} = \frac{R - R}{R - R} = \frac{R_{\infty} - R}{R_{\infty} - R}$$

et, si l'on désigne par x, y , non plus les coordonnées courantes de la droite OA, mais celles de la droite OB, les équations de cette dernière droite seront celles que comprend la formule

$$(6) \quad \frac{R - R}{K} = \frac{R - R}{K} = \frac{R_{\infty} - R}{K_{\infty}}$$

Si d'ailleurs on observe que R, R, R, R_{∞} représentent les carrés des tangentes menées d'un point extérieur (x, y, z) aux sphères données et K, K, K_{∞} les carrés des tangentes qui sont communes à la première sphère et aux trois autres, on se trouvera immédiatement conduit, par la formule (6) aux solutions qu'a données M. Gergonne du problème énoncé, en les tirant d'une analyse qui s'accorde au fond avec celle à laquelle nous venons de recourir.

RAPPORTS

M. DUMAS présente, de la part de l'auteur, M. GEHARDT professeur suppléant à la Faculté des Sciences de Montpellier, la première partie d'un ouvrage encore inédit, intitulé *Precis de Chimie organique*, dont l'Académie l'a chargé de lui rendre un compte verbal. L'auteur, qui a traduit en français le *Traité de Chimie* de M. Liebig et qui a accompli cette tâche avec un succès complet, fait remarquer qu'il a pu se convaincre, mieux que personne, de l'insuffisance de la théorie des radicaux organiques adoptée par M. Liebig comme base de son ouvrage.

Il a été conduit ainsi à composer lui-même un ouvrage de chimie organique, en se fondant sur la théorie des types chimiques.

Dans cet ouvrage, l'auteur emploie des équivalents qui lui sont propres et qui possèdent des propriétés remarquables. Sans croire que les chimistes adopteront facilement cette notation nouvelle, on peut avancer, du moins qu'elle fixera leur attention et que pour beaucoup de corps elle offre de grands avantages. Le carbone est particulièrement dans ce cas.

M. Gehardt a cherché à classer les matières organiques par familles naturelles et il a fait preuve d'une très-grande sagacité dans la discussion

des analyses et des formules admises jusqu'ici. Il en corrige beaucoup et il le fut en général, avec finesse et bonheur, car les formules qu'il adopte sont presque toujours bien plus simples que celles qu'elles remplacent.

L'ouvrage de M. Gehhardt représente donc le système d'idées auquel se rattachent les travaux exécutés en France depuis quelques années, et il contribuera certainement pour beaucoup à propager des idées que de mon côté je cherche depuis longtemps à répandre par mon enseignement public.

M. Gehhardt a poursuivi avec soin la comparaison des propriétés physiques des corps d'un même type chimique, et il a été conduit à faire beaucoup d'expériences pour vérifier ou découvrir les lois qui président à leurs variations. On trouvera donc, dans son ouvrage, beaucoup de points d'ébullition déterminés par lui.

D'ailleurs, il présente un tableau précis et complet de l'état de nos connaissances en chimie organique, l'auteur fait preuve, sous ce rapport, d'une érudition très étendue. »

MEMOIRES LUS

ÉLECTRICITÉ ANIMALE — *Recherches anatomiques sur l'organe électrique de la torpille*, par M. JORET, de l'amballe (Extrait par l'auteur)

(Commissaires, MM. de Blainville, Flourens, Becquerel, Dumas)

« Après l'examen historique et critique des travaux qui ont précédé le mien, j'aborde l'exposition des résultats anatomiques où je suis parvenu. Ici je me bornerai à ceux qui concernent l'appareil électrique, en passant sous silence la peau, les conduits excréteurs, leurs anomalies et les granulations mucifères qui se rencontrent sur leur trajet, etc.

Membrane de recouvrement Cette membrane, que j'appellerai *sero-albuginée*, à cause de sa structure, et *prismatique*, à cause des fonctions que je lui suppose, est une des parties les plus importantes à considérer dans l'appareil électrique de la torpille.

Cette membrane, à travers laquelle on distingue la forme aréolaire de l'organe, est fine, transparente, assez résistante, et formée de fibres entrecroisées; elle est lisse en dehors, onctueuse en dedans, et adhérente au pourtour de l'espace dont nous avons donné les limites. Il n'y a point de tissu cellulaire entre elle et la substance qui constitue l'organe. On voit à la face interne un grand nombre de cellules polygonales dont les arêtes forment des

reliefs peu saillants Cette espèce d'imbrication contribue sans doute à fixer l'un à l'autre et l'organe et la membrane de recouvrement Cette membrane n'envoie aucun prolongement, de quelque nature qu'il soit, dans l'intérieur de la substance sous-jacente *Quelques vaisseaux sanguins rampent à l'extérieur seulement*

Si l'on examine avec soin le fond de chaque loge polygonale, on voit qu'il est comme villex, et charge d'une substance albumineuse et visqueuse C'est une face qui a de l'analogie pour les fonctions avec la matrice de l'ongle, voila pourquoi les loges sont toutes formées à la face interne de cette membrane c'est, en un mot, un organe de sécrétion, une membrane *prismagénique*

Cette enveloppe est composée de deux portions distinctes, une dorsale et une ventrale Toutes deux sont organisées de la même manière, retenues vers le museau et attachées au cartilage semilunaire par une série de petits tendons résistants C'est dans l'espace compris entre elles qu'est située la substance de l'appareil électrique

Organe électrique Sous la membrane que nous venons de décrire, on aperçoit une substance blanchâtre molle presque pulpeuse, et dont l'aspect reproduit cette série d'aréoles polygonales indiquées à propos de la membrane prismagénique

Cette masse blanchâtre, ellipsoïde, est formée d'une série de colonnes simplement accolées, et si l'on excepte les gros troncs nerveux et leurs ramifications déliées, il n'existe entre elles ni tissu cellulaire, ni filaments tendineux ou aponévrotiques, ni vaisseaux sanguins, ni liquide gélatineux ou muqueux épanché dans leur intervalle Ces petits corps sont maintenus les uns contre les autres à l'aide de leur pression latérale réciproque, du soutien perpendiculaire qui leur est offert par les membranes, et de l'espèce d'insertion qui a lieu aux extrémités des prismes dans la loge polygonale creuser à la face interne de ces membranes

Jusqu'ici on avait considéré les prismes, soit comme des colonnes creuses remplies d'un liquide particulier, soit comme des prismes divisés par des diaphragmes transversaux, laissant entre eux un espace également rempli par un liquide spécial Voici ce que l'observation nous a permis de constater Ces colonnes prismatiques solides sont constituées par des granulations égales entre elles, et superposées de manière à simuler au premier coup d'oeil une colonne d'une seule pièce La face supérieure de la première granulation et la face inférieure de la dernière d'une colonne sont convexes et immédiatement accolées à la partie interne de la loge polygonale placée

sur la membrane de recouvrement. Toutes les autres granulations ont leur face supérieure concave, l'inférieure convexe, de façon à pouvoir être successivement reçus les unes dans les autres. Leur mode d'union sans tissu cellulaire intermédiaire est celui de la membrane avec la surface des colonnes prismées, de ces colonnes entre elles et des filets nerveux qui les entourent. Les colonnes centrales contiennent environ dix à douze de ces granulations, qui n'ont pas plus que les prismes de membrane ou d'enveloppe particulière. Elles sont *pleines* ou *solides*, et ne contiennent aucun liquide. Quand on les écrase, tout se résout en une substance mucoso-gélatineuse ou albumineuse, informe, sans débris de membranes. tout ce qu'on peut apercevoir, et ce qui n'est pas constant, c'est que la portion la plus externe de cette matière est un peu plus condensée que celle qui est placée à son centre. Il n'existe aucun liquide épanché, soit entre les prismes, soit entre les granulations qui les composent. Toute la masse a seulement un degré plus ou moins grand d'humidité qui semble n'être là qu'un phénomène d'endosmose et de cosmose général, et qui s'opère entre toutes les parties à la fois de l'appareil et la membrane qui l'entoure, on n'aperçoit dans l'appareil électrique aucune trace de vaisseaux sanguins.

En traitant des nerfs de l'appareil électrique, je décris la disposition des quatre lobes cérébraux, et j'insiste sur la structure du quatrième lobe, je me demande s'il constitue bien un lobe cérébral distinct, ou s'il est une dépendance du cerveau, comme le veut M. de Blainville, un lobe à part, et que l'on pourrait appeler *lobe respiratoire*, selon M. Flourens, un simple renflement de la moelle allongée, ainsi que le professent MM. Matteucci et Savani. Un filet nerveux arrive près des granulations d'une petite colonne, il se divise, et alors les deux petites divisions nerveuses secondaires la contiennent complètement pour se réunir et constituer une anse qui est liée tout au tour d'elle à des anses ou mailles de la même forme et de la même nature, quelquefois il y a plusieurs granulations saisies entre les bras de cette anse nerveuse, d'autres fois une seule granulation occupe l'une de l'anse. Il y a donc aux extrémités des divisions de ces nerfs un réseau à mailles polygones dans lequel sont comme suspendues, sous forme de grains infiniment nombreux, toutes les granulations isolées, dont la réunion constitue une colonne prismatique. Une excitation à l'origine du nerf doit donc retentir dans toute sa distribution. Ainsi les nerfs ne se perdent pas dans l'organe ni dans la substance gélatineuse ou albumineuse, etc., comme l'ont écrit tous les auteurs. Les nerfs, dans l'appareil électrique de la torpille, n'ont donc point, à proprement parler, de terminaison, ils forment un cercle dont les anses

peripheriques extremes se chargent de ramener au tronc primitif le courant qui les a parcourues qui retourne a son origine

Quant à la physiologie de l'appareil, de toutes les théories électriques proposées, la seule admissible suivant moi, est celle du courant, telle que l'ont formulée MM Nobili et Ampere

» Nous terminerons par une remarque que M Dumas a faite dans ses cours, et dont nos recherches nous ont permis d'apprécier la justesse, à savoir que la torpille, le silure, la gymnote, la grenouille électrique possédant des appareils particuliers sont des exceptions dans l'ordre de la nature, et qu'on ne peut expliquer ce qui se passe chez ces animaux par ce qui a lieu chez ceux qui leur sont supérieurs Ici la circulation joue un rôle très-important dans la production du fluide électrique C'est ce que M Dumas a démontré, et nous nous efforcerons de l'établir sur des faits nouveaux dans un prochain Memoire

CHIMIE — Memoire sur les combinaisons oxygénées de l'or, suivi de recherches sur le pourpre de Cassius et sur l'or fulminant, par M L FIGUEN
(Extrait)

(Commissaires, MM Becquerel, Dumas, Regnault)

Protoxyde d'or — D'après les recherches de M Berzelius tous les chimistes ont décrit le protoxyde d'or comme une poudre verte d'une instabilité extreme Ces caracteres n'appartiennent pas au protoxyde d'or et je montrerai, dans mon Mémoire, que M Berzelius n'a point obtenu le protoxyde d'or pur, mais bien un mélange de beaucoup d'or métallique avec ce composé

» Le protoxyde d'or est une poudre d'un violet si foncé à l'état d'hydrate, qu'elle paraît noire, desséchée, elle présente la couleur bleu violet du pourpre de Cassius Chimiquement, c'est un composé indifférent qui peut s'unir à la fois aux acides et aux bases Les acides hydrogènes produisent avec lui un dépôt d'or en dissolvant le tritoxyle forme, l'ammoniaque donne avec lui un composé violet et fulminant Il se décompose à 250 degrés Loin de présenter l'altérabilité extreme que M Berzelius lui attribue, le protoxyde d'or est, au contraire, le moins altérable de tous les oxydes de ce métal

» On n'avait obtenu jusqu'ici le protoxyde d'or qu'en décomposant par la potasse le protochlorure d'or, mais il prend naissance dans un grand nombre d'autres circonstances que je vais brièvement indiquer

» Ainsi le trichlorure d'or neutre, traité par le protonitrate de mercure,

donne un précipité noir violet de protoxyde d'or. L'acide acétique bouillant, en reappassant sur le protoxyde d'or, ramène partiellement celui-ci à l'état de protoxyde. L'acetate, le tartrate, le citrate de potasse, et généralement les sels à acide organique, sous l'influence d'un léger excès d'alcali libre, produisent à l'ébullition un dépôt noir violet de protoxyde d'or. Les infusions de matières végétales ou animales se comportent de la même manière. Quand on fait bouillir le tritoxyle d'or avec de la potasse ou de la soude caustique, on obtient un dépôt de protoxyde d'or qui va en augmentant à mesure que l'ébullition se prolonge. Le chlorure d'or se comporte de la même manière avec la potasse ou la soude caustiques. Enfin les carbonates ou les bicarbonates alcalins produisent avec le chlorure d'or la même réaction. Le protoxyde d'or a pu être facilement analysé par la simple action de la chaleur.

Acide peraurique — J'admets comme très-probable l'existence d'un acide oxygène de l'or plus oxygène que toutes les combinaisons de cette espèce soluble dans l'eau ou du moins dans l'eau acidulée, et qui devra constituer l'acide peraurique, si mes recherches sur ce point sont confirmées par des expériences ultérieures. Voici dans quelles circonstances ce composé m'a paru prendre naissance. Quand on fait bouillir, comme je l'ai déjà indiqué, du tritoxyle d'or avec de la potasse caustique, il se forme, après une ébullition un peu longue, un précipité abondant de protoxyde d'or. Comme, dans cette circonstance, il ne se dégage aucune trace d'oxygène, et que l'alcali caustique se trouve absolument exempt de toute matière organique susceptible de réduire le tritoxyle d'or, il faut admettre, je crois, qu'il se forme une combinaison plus oxygénée de l'or qui reste dissoute dans la potasse. Voici, en effet, ce que l'on observe quand on sature l'alcali par l'acide nitrique ou sulfurique. L'addition de l'acide détermine la séparation du tritoxyle d'or non décomposé, il se dégage uniquement de l'acide carbonique, et la liqueur filtrée reste colorée fortement en jaune. Cette liqueur présente au bout de quelques instants les signes d'une décomposition évidente : elle verdit promptement, se trouble et dépose de l'or. Il suffit de la chauffer à 60 ou 65 degrés pour voir ce phénomène se produire, et le dépôt de l'or s'accompagner de bulles gazeuses infiniment petites. On peut aussi observer ce phénomène en employant le chlorure d'or ordinaire. Après avoir fait bouillir sa dissolution additionnée de potasse assez longtemps pour fournir un abondant dépôt de protoxyde d'or, on précipite la liqueur par du chlorure de baryte, et ensuite par de l'eau de baryte. Il se forme un précipité d'abord jaune, puis verdâtre, ce précipité étant traité par l'acide sulfurique, le trit

oxyde d'or reste à l'état insoluble mêlé au sulfate de baryte, et la liqueur filtrée contient le composé dont il s'agit

Il me semble assez naturel de conclure des faits qui précèdent, que le tritoxyle d'or se dedouble, en cette circonstance, en protoxyde d'or et en un acide nouveau plus oxygéné que le tritoxyle, et présentant une altérabilité extrême. C'est précisément cette altérabilité remarquable qui m'a empêché de faire jusqu'à ce moment une étude plus complète de ce composé. Je reprendrai très-prochainement la suite de ces recherches.

Oxyde d'or intermédiaire — Guyton, Oberkampf et M. Berzelius admettent l'existence d'un oxyde de couleur pourpre, M. Berzelius, qui examine assez longuement cette question dans son *Traité de chimie*, représente sa composition probable par la formule Au^2O^3 . Ne pouvant rapporter ici des recherches d'une nature très-variée que j'ai faites à cette occasion, je dirai qu'après avoir répété toutes les expériences de Guyton, d'Oberkampf et de M. Berzelius, je me suis convaincu que, dans toutes les réactions invoquées par ce dernier chimiste en faveur de l'existence de son oxyde intermédiaire, il ne se forme aucun oxyde d'or, c'est toujours de l'or métallique qui prend naissance, seulement l'or affecte, dans ces cas, la teinte pourpre ou pourpre rose, qu'il affecte lorsqu'il est amené à son plus grand état de division.

Pourpre de Cassius — Il résulte de mes recherches sur le pourpre de Cassius, que ce composé si souvent étudié par les chimistes est une combinaison parfaitement définie de protoxyde d'or et d'acide stannique ou peroxyde d'étain. Donnons tout de suite la preuve qui paraîtra assurément la plus positive à cet égard. Elle consiste à montrer que le pourpre de Cassius se produit de toutes pièces, quand on met en présence le protoxyde d'or et le peroxyde d'étain. Il suffit, pour faire l'expérience, de faire bouillir quelques minutes le protoxyde d'or avec une dissolution de peroxyde d'étain dans la potasse. Aussitôt le pourpre de Cassius prend naissance, et l'analyse indique dans ce composé la constitution que nous lui reconnaissons bientôt.

De plus, les réactifs démontrent dans le pourpre de Cassius l'existence de peroxyde d'étain sans aucune trace de protoxyde. Ainsi l'acide chlorhydrique, la potasse caustique enlèvent au pourpre uniquement du peroxyde d'étain, ajoutons que le pourpre de Cassius et le peroxyde d'or ont entièrement la même couleur.

On sait que tous les chimistes qui ont analysé le pourpre de Cassius ont obtenu des nombres extrêmement éloignés les uns des autres. En effectuant de mon côté les analyses de différents pourpres, je n'obtenais jamais des nombres comparables entre eux et représentant une formule simple en équi-

valents mais ayant eu l'idée de soumettre ces composés à l'action de la potasse bouillante pour examiner le produit, j'ai reconnu que la potasse, sans altérer le composé primitif, lui enlève une proportion variable de peroxyde d'étain, et laisse subsister le pourpre de Cassius avec ses propriétés ordinaires analysées en cet état, il m'a constamment fourni des nombres qui correspondent très exactement à cette formule



C'est rigoureusement à cette composition que j'ai été amené en analysant le pourpre de Cassius formé à l'aide du protoxyde d'or et du stannate de potasse, et c'est encore cette même constitution que j'ai reconnue au pourpre de Cassius qui se forme par une réaction très-curieuse anciennement indiquée par B. Pelletier et qui consiste à jeter de l'étain métallique dans du chlorure d'or.

Cette formule, qui semble au premier abord peu admissible, rentre pourtant tout à fait dans le cadre des combinaisons ordinaires, comme on le reconnaîtra aisément si l'on se rappelle que M. Frémy, dans ses recherches sur les acides métalliques, a montré que l'acide stannique entre dans les sels neutres pour 3 équivalents, de telle sorte que la composition des stannates neutres n'est pas $(\text{StO}^3) \text{MO}$, mais bien $3 (\text{StO}^3) \text{MO}$.

On voit donc, d'après cela, que le pourpre de Cassius représente bien réellement le stannate neutre de protoxyde d'or. Ce qui confirme encore la constitution que j'assigne au pourpre de Cassius, c'est l'existence d'un composé correspondant qui contient précisément deux fois plus d'oxyde d'étain et qui représente, d'après cela, le bistannate de protoxyde d'or.


En effet, M. Berzelius a fait l'analyse du pourpre de Cassius préparé avec la dissolution d'étain dans l'eau régale, et a trouvé pour sa composition des nombres qui, calculés dans l'idée de l'existence de protoxyde d'or, conduisent à cette formule




Trioxycde d'or — Je signale dans mon Mémoire diverses particularités nouvelles relatives au protoxyde d'or (acide aurique). Ne pouvant rapporter ici ces résultats, à cause de leur diversité, je me contenterai de dire un mot sur un procédé nouveau pour la préparation de ce composé. Ce procédé consiste à saturer très-exactement le chlorure d'or neutre par le carbonate de soude, et à faire bouillir jusqu'à cessation de précipité. Dans ce premier traitement, la presque totalité de l'or est obtenue à l'état d'oxyde

Pour retirer, à cet état, le reste du métal, on sursature la liqueur par le carbonate de soude pour former de l'aurate de soude qui, neutralisé à chaud par l'acide sulfurique, laisse précipiter le reste de l'oxyde d'or. La liqueur filtrée passe presque entièrement incolore, ce qui indique qu'elle ne contient plus qu'une quantité d'or insignifiante.

Or fulminant — Il existe sur l'arrangement intérieur des éléments de l'or fulminant deux théories opposées. Dans l'une, émise pour la première fois par Proust et Berthollet, on regarde ce composé comme une combinaison pure et simple d'oxyde d'or et d'ammoniaque, dans l'autre, proposée en 1830 dans un travail de M. Dumas, on regarde l'or fulminant comme une combinaison d'azotate d'or et d'ammoniaque, l'azotate d'or jouant le rôle d'acide. À mon sens, l'ancienne opinion de Proust et de Berthollet serait encore la mieux en harmonie avec les faits. Les circonstances qui me portent à le croire sont les suivantes : 1° On peut obtenir autant d'espèces d'or fulminant qu'il existe d'oxydes d'or connus ; il faudra donc admettre dans l'opinion de M. Dumas, autant d'azotures d'or correspondants, or, jusqu'à ce moment aucune combinaison de l'or avec l'azote n'a pu être réalisée. 2° Les espèces diverses d'or fulminant présentent identiquement la couleur de l'oxyde d'or qui leur a donné naissance, ce qui porte à penser que dans ces combinaisons, les oxydes d'or entrent sans subir d'altération dans leur nature. 3° Les analyses effectuées par M. Dumas s'accordent entièrement avec ce point de vue. Ainsi M. Dumas représente la constitution de l'or fulminant obtenu par le tritoxyle d'or par la formule



Il est clair que cette formule revient à celle-ci



c'est-à-dire un sous-aurate d'ammoniaque.

Enfin, quel or fulminant obtenu par le chlorure d'or a fourni à M. Dumas, pour l'or et l'azote, des nombres en centièmes qui répondent exactement à la formule



c'est-à-dire au composé précédent hydraté.

Explication théorique des phénomènes de la dorure au trempé — Je présente dans mon Mémoire l'exposition théorique de tous les phénomènes que l'on observe dans les curieux procédés de cette industrie que j'ai dû à la rare obligeance de M. de Ruolz, de pouvoir suivre et examiner dans ses

détails, je dois me borner à dire ici que cette théorie diffère complètement de celle qui jusqu'à ce jour a été généralement admise »

CHIRURGIE — *Courte réponse à quelques attaques contre la myotomie rachidienne*, Note de M le docteur J GUERIN

(Commission nommée pour le Mémoire de M Malgaigne)

L'Académie a pu apprécier jusqu'ici la réserve et la sobriété de mes réponses aux attaques qui lui ont été adressées contre mes travaux. Cette discrétion, commandée par mon respect pour elle et ma haute confiance dans ses lumières, est devenue un encouragement à un système de dénigrement contre lequel je ne puis plus me dispenser de protester. Les témoignages d'estime dont l'Académie m'a honoré à plusieurs reprises m'en font un devoir.

Parmi les attaques dont j'ai été le plus récemment l'objet, se trouvent un Mémoire sur la myotomie rachidienne, présente le 15 de ce mois, et une Lettre sur le même sujet, lue à la dernière séance.

L'auteur du Mémoire affirme que, sur 24 sujets que j'ai traités par la myotomie rachidienne, il n'a pas pu découvrir une seule guérison complète. Il en induit que la myotomie rachidienne est scientifiquement sans valeur, qu'elle n'est d'aucune utilité pratique, qu'elle est susceptible au contraire, d'inconvénients graves et il présente le résultat de son enquête comme en opposition avec les faits que j'ai annoncés. Voici comment l'auteur du Mémoire a procédé pour arriver à ces conclusions :

Dans un relevé numérique de mon service à l'Hôpital des Enfants, j'avais, sur 155 cas de déviation de l'épine, indiqué 24 guérisons, 38 améliorations, 4 non améliorations, 1 mort et 98 cas dont le résultat n'était pas précis, parce que le traitement n'était pas achevé ou n'avait pas été continué. Toutes ces indications n'étaient données qu'en chiffres. L'auteur du Mémoire est allé visiter ou a fait visiter un certain nombre de mes malades. Il a ainsi réuni 24 cas sur 155, sans savoir à laquelle de mes catégories, *guérisons, améliorations, non améliorations, traitements interrompus*, ces 24 cas se rapportaient. Au contraire, il est prouvé aujourd'hui que la plupart des malades cités par l'auteur du Mémoire appartiennent aux 98 cas indéterminés, c'est-à-dire à la catégorie des traitements interrompus ou non achevés, et que plusieurs même n'ont pas subi d'opération. En procédant comme il l'a fait, ce n'est pas 21 non-guérisons que l'auteur du Mémoire aurait pu rencontrer, mais 131, puisque le relevé, sur le nombre de 155 malades, ne mentionne que 24 guérisons.

* Mais ce n'est pas tout pour juger du degré d'efficacité de la myotomie, l'auteur du Mémoire aurait eu besoin de connaître l'état des malades avant leur entrée en traitement et à leur sortie. Or, il n'a eu aucun renseignement de ce genre, mes collaborateurs ni moi n'avons rien publié à cet égard il a suppléé à ce point de départ indispensable par des renseignements et une méthode d'exploration que l'Académie appréciera par les deux faits qui suivent

* *Premier fait* — Il rapporte parmi les cas de non-guérison sur lesquels, dit-il, il a eu des renseignements *authentiques*, celui d'une jeune fille nommée *Celina Lefèvre*. Or, cette jeune fille a été transférée de l'Hôpital des Enfants, où elle avait été prise d'une fièvre typhoïde pendant son traitement orthopédique, à l'hôpital Necker, où elle est morte après quelques semaines de maladie

Deuxième fait — Voulant donner une idée des accidents auxquels expose la myotomie rachidienne, l'auteur du Mémoire cite une jeune malade (*Pauline Dumont*), comme ayant contracté, depuis sa sortie de l'hôpital, une claudication grave qui n'existait pas, dit-il, auparavant. Eh bien, cette jeune fille est entrée à l'hôpital avec une déviation de l'épine et une *luxation d'un des femurs*, datant de la naissance

Enfin l'auteur du Mémoire a une manière d'apprécier les résultats de la myotomie qui bouleverse complètement les idées et la langue chirurgicale, relativement à ce que l'on était convenu d'appeler améliorations, succès, guérisons. Ce qui n'est pas amélioré est un revers grave, ce qui n'est qu'amélioré est un insuccès, ce qui est une véritable guérison n'est pour lui qu'une amélioration

Je n'ai que peu de chose à dire sur la Lettre communiquée dans la dernière séance. L'auteur est un ex-employé de mon établissement qui n'y a jamais exercé aucune fonction médicale. Il n'a pris et n'a pu prendre aucune note ni sur mes malades ni sur mes opérations. Ce n'est pas le lieu d'insister sur les motifs particuliers auxquels il faut attribuer son attaque

Que l'Académie me permette, en terminant, de lui rappeler qu'en 1837, sur le Rapport d'une Commission composée de sept de ses membres, elle m'adjugeait le grand prix de Chirurgie pour mes recherches sur les difformités (1). Je n'ai pas, il est vrai, pour asseoir l'autorité de mes derniers tra-

(1) Voici les conclusions du Rapport de la Commission

* Après tant de recherches faites successivement sur le squelette, sur le cadavre, sur le vivant, après un si grand nombre d'observations rigoureusement et sévèrement interprétées

vaux, la sanction éclatante donnée par l'Académie à mes premiers. Qu'on attende cependant. Une Commission, composée de médecins et de chirurgiens des hôpitaux, choisie parmi les membres des Académies des Sciences et de Médecine, a été chargée, sur ma demande, d'examiner toutes mes méthodes, tous mes procédés et opérations, y compris la myotomie rachidienne. Le Rapport de cette nouvelle Commission, j'en ai l'espoir, dissipera toutes les incertitudes, et complétera ce qu'avait commencé, en 1837, le Rapport de l'Académie des Sciences.

MEMOIRES PRESENTES

M. POUCHET adresse à l'Académie une Note supplémentaire à son Mémoire sur l'*Ovulation spontanée et périodique des Mammifères*.

Cette Note, qui est accompagnée de figures, a pour objet d'éclaircir l'histoire des *spermatozoaires* de l'homme et des animaux.

La plupart des micrographes nous ont donné, suivant M. Pouchet, que des figures fort imparfaites des zoospermes de l'homme. Il les représente lancéoles, et terminées en avant par une extrémité pointue, comme l'avait déjà, d'ailleurs, annoncé M. Wagner.

À l'exemple de quelques naturalistes allemands, M. Pouchet considère ces animalcules comme possédant une organisation interne. Selon lui, on découvre facilement chez eux une espèce de vésicule plus transparente que le reste du corps, et qui réside dans sa région antérieure. L'arrière de celle-ci, on voit une masse plus opaque, qui ne peut être qu'un appareil viscéral.

M. Pouchet a, en outre, reconnu qu'il existe à la surface de ces spermatozoaires une sorte d'épithélium qui enveloppe tout le corps, et s'en trouve séparé par une couche très-mince de liquide. Il avait d'abord cru que ce qu'il observait à cet égard était dû à des différences dans la refraction, mais sur divers zoospermes, il a pu reconnaître que cet épithélium était rejeté en arrière du corps, tout d'une pièce, comme la déponille épidermique de certaines larves, et sur d'autres, il a reconnu que cet épithélium était déchiré par lambeaux. Sur les zoospermes de plusieurs mammifères, au reste, il n'a pas reconnu ces diverses particularités. Ainsi, sur les zoospermes du lapin, qui

après cette foule de faits nouveaux et de vues neuves sur les différentes parties du sujet, « finalement, après de si nombreux, de si beaux et de si féconds résultats introduits dans la science et dans l'art, nul ne s'étonnera sans doute que le prix ait été adjugé à ce remarquable travail. » (*Rapport sur le concours pour le grand prix de Chirurgie*, page 22.)

ont été pour lui l'objet d'une étude attentive il n'a pu entrevoir la moindre trace d'organisation interne

Les zoospermes de la grenouille ont été aussi pour M Pouchet l'objet d'une étude particulière il les a vus filiformes rectilignes très-longs, et étant terminés, à la sortie des capsules dans lesquelles ils naissent terminés en arrière par un globule sphéroïdal Ce globule est attaché à l'extrémité flexible de leur queue laquelle lui communique un mouvement incessant Quelques heures après leur émission ces zoospermes perdent le globule terminal et peu de temps après leur corps de rectiligne qu'il était se courbe vers son milieu formant un angle qui devient de plus en plus aigu, puis les deux extrémités de ces animalcules finissent par se croiser ensuite elles s'entortillent ensemble de manière à ne plus représenter en apparence qu'un seul filament tordu terminé en avant par une sorte d'anse, qui a été prise pour une tète aplatie par des observateurs inattentifs cette espèce d'anse marche en avant lorsque l'animalcule se meut après avoir subi ce singulier changement de forme

(Commission du prix de Physiologie expérimentale)

ZOOLOGIE — *Histoire des genres Pediculus Ricinus, Pulex Podura ou Forficula de Geer, par M P GERVAIS*

(Commissaires MM de Blainville Duméril, Milne Edwards)

Ce travail, dit l'auteur, est, comme celui que j'ai récemment soumis au jugement de l'Académie, destiné à faire partie de l'ouvrage de M Walckenaer sur les insectes aptères D'après sa destination, j'ai dû y exposer tout ce que la science possède sur ce sujet, et, pour ce qui a rapport aux nombreux hexapodes aptères parasites des mammifères et des oiseaux, j'ai pris principalement pour guide les excellentes observations du docteur Nitzsch mais on y trouvera aussi un assez grand nombre de faits entièrement nouveaux qui m'ont été fournis surtout par des animaux morts à la Ménagerie et auxquels j'ai consacré deux des planches jointes à mon texte Les deux autres planches et le reste de ce travail sont relatifs aux Podures et aux Thysanoures ou Lépismes, j'en fais connaître plusieurs qu'on n'avait point encore observés et que j'ai recueillis à Paris ou dans les environs Je signalerai en particulier les deux genres *Nicolété* et *Campodee*, qui, lent de la manière la plus intime les Lépismes aux Névroptères proprement dits »

GÉOLOGIE — Note sur quelques faits géologiques et minéralogiques nouveaux, par M. BERTRAND DE LOM (Extrait par l'auteur)

(Commissaires, MM. Cordier, Dufrénoy)

« Au nombre des faits exposés dans mon Mémoire, je signalerai comme un des plus intéressants, la découverte de l'aimant non pas de l'aimant purement attractif, c'est-à-dire du fer oxydulé, substance qui se trouve dans la nature avec une sorte de profusion, mais de l'aimant polaire, offrant parfois de petits octaèdres simples ou tronqués sur les arêtes, et se couvrant facilement de limaille de fer. Les circonstances de gisement dans lequel il a été rencontré sont toutes nouvelles, puisqu'il provient des formations volcaniques de la Haute Loire, ou il ne se trouve d'ailleurs que par accident, ayant été emprunté par la cause volcanique aux terrains anciens.

Cette découverte me paraît d'autant plus intéressante, qu'elle semble promettre la solution du problème concernant l'origine du *zircon des volcans de la Haute Loire*, origine qui se trouve être granitique et non moderne ou volcanique comme cela avait été annoncé jusqu'ici.

M. MAYOT fils de Lausanne adresse la description et le modèle d'un *appareil destiné à préserver de l'asphyxie par submersion*.

Cet appareil consiste dans une ceinture qui se place autour de la poitrine un peu au dessous des aisselles, et qui est garnie sur les côtés de deux ballons en étoffe imperméable, pouvant contenir chacun de 7 à 8 litres d'air. Un tube élastique en forme de T fait communiquer les deux ballons entre eux et avec l'air extérieur, et un robinet placé au point de jonction du tronc et des branches, intercepte la communication au moment où les deux ballons sont suffisamment remplis de l'air qui y a été poussé par la bouche. Les deux branches du tube en T sont comprises dans l'épaisseur de la partie antérieure de la ceinture. L'autre partie est libre et d'une longueur suffisante pour pouvoir être portée commodément aux lèvres, même après que la ceinture est fixée. L'appareil, étant ployé, est d'un assez petit volume pour être porté dans la poche, lorsqu'il est en place, et que les ballons sont gonflés, la tête entière est nécessairement maintenue au-dessus de l'eau, même quand l'immersion des bras est complète. Le nageur, pour se mouvoir, n'a besoin que de ses pieds, et il a l'usage des mains parfaitement libre.

(Commissaires, MM. Magendie, Flourens, Dumas, Regnault)

M CARRIGNAC-DESCOMBES soumet au jugement de l'Académie un projet d'école élémentaire d'Agriculture

(Commissaires, MM Boussingault, de Gasparin, Payen)

M PARRY adresse un Mémoire ayant pour titre *Examen de quelques expériences sur la décomposition des oxydes et sur celle des sels, sur le transport des éléments, sur la décomposition de l'eau par la pile et les conséquences qui se déduisent des faits observés dans cette circonstance*

(Commissaires, MM Dumas, Pelouze)

L'ACADÉMIE DES BEAUX-ARTS prie l'Académie des Sciences de vouloir bien désigner un de ses membres pour faire partie de la Commission qui a été chargée de faire un Rapport sur un piano présenté par **M Hertz**

M Séguier est désigné à cet effet

CORRESPONDANCE.

M FLOURENS, en présentant un opuscule de **M REMAK** sur le développement du poulet dans l'œuf, indique quelques-uns des faits qui lui semblent les plus dignes de fixer l'attention. Ainsi, suivant l'auteur, les corps presque cubiques qui dès le commencement du développement de l'embryon, apparaissent de deux côtés de la corde dorsale, considérés généralement comme les premiers rudiments de la colonne vertébrale, ne sont autre chose que les germes des nerfs cérébro-spinaux.

» Ces nerfs, d'abord solides, se séparent bientôt en capsule et en masse centrale plus foncée, cette masse centrale est la première manifestation de la substance des ganglions spinaux. Les parois antérieure et postérieure de la capsule deviennent les racines antérieures et postérieures des nerfs. Vers la fin du troisième jour de l'incubation, les filaments des racines nerveuses se réunissent avec les points correspondants de la moelle épinière. De la partie la plus extérieure de chaque capsule, naissent des filaments qui se réunissent entre eux et constituent, par leur ensemble, le cordon le plus externe du nerf sympathique.

Quant au canal vertébral, il se compose de deux moitiés qui se rapprochent l'une vers l'autre, en partant du bord externe des germes nerveux.

Observations de **M SERRES**

Parmi les faits qui servent de base à mon travail sur l'anatomie com-

pareil de l'encéphale ceux relatifs à la formation de la moelle épinière et du cerveau ont si souvent été vérifiés par les observateurs, qu'ils font, présentement pûti du domaine de la science ce point de la Note qui vient d'être communiqué à l'Académie ne présente donc pas l'intérêt de la nouveauté.

Il n'en est pas de même de ce qui est relatif à la formation du système nerveux périphérique. On sait qu'avant mes recherches on faisait émaner tous les nerfs de la moelle épinière et du cerveau, et personne n'ignore que depuis les travaux de Malpighi et les commentaires de Boerhaave cette opinion suivait de fondement à l'hypothèse du développement centrifuge du système nerveux.

On sait aussi que mes observations sur les jeunes embryons du poulet sur ceux des reptiles et des mammifères me conduisant à un résultat opposé (c'est-à-dire qu'au lieu de voir les nerfs périphériques émaner de l'axe cérébro-spinal je constatai que leur marche était inverse et que c'étaient eux au contraire qui venaient s'insérer sur cet axe.

Les difficultés de toute nature que j'avais éprouvées pour m'assurer de la réalité du fait, dans les trois classes des vertébrés me firent craindre qu'elles ne détournassent les anatomistes de ce point capital de la névrologie. C'est, en effet, ce qui avait eu lieu jusqu'à ce jour.

L'intérêt de l'opuscule de M. Remak porte donc particulièrement sur l'origine des nerfs périphériques, origine isolée des lames nerveuses qui par leur réunion constituent l'axe cérébro-spinal. C'est une vérification du fait que j'ai présenté à l'Académie il y a vingt-trois ans et que M. Cuvier énonça dans son Rapport de la manière qui suit.

Les nerfs ne naissent pas du cerveau pour se rendre aux organes, comme on l'a pensé jusqu'à ce jour; mais ils se rendent au contraire des organes au cerveau et à la moelle épinière pour se mettre en communication avec ces centres nerveux.

L'opinion qui fait considérer les corps ovalaires ou cubiques qui apparaissent de si bonne heure sur les côtés de la ligne primitive, comme les noyaux des ganglions intervertébraux, et la source des branches antérieures et postérieures des nerfs spinaux, est si favorable à la théorie centripète du système nerveux qu'elle m'a vivement intéressé.

Mais cet intérêt même, et surtout les intérêts de la science qui dominent tous les autres, me obligent de reconnaître que cette opinion n'est pas justifiée dans l'opuscule. Néanmoins, avant de la juger, avant de lui opposer les faits qui lui sont contraires, il est convenable d'attendre que l'auteur ait fait connaître les observations sur lesquelles elle repose.

M DE GASPARIN présente, au nom des auteurs, **MM. BIXIO** et **YABRAL** le cinquieme et dernier volume de la *Nouvelle Maison rustique*, ouvrage qui, dit il, a répandu dans le public de saines notions d'agriculture, en remplaçant une foule de compilations sans valeur

Ce volume renferme tout ce qui a trait à l'horticulture

M BRODIE, nommé récemment à une place de correspondant Section de Medecine et de Chirurgie adresse ses remerciements à l'Academie

MM MURCHISON et **SABINE** qui sont cette année secretaires généraux de l'Association britannique pour l'avancement des Sciences, annoncent que la quatorzieme reunion de l'Association aura lieu dans la ville d'York a dater du 26 septembre prochain, et invitent **MM** les membres de l'Academie qui seraient libres a cette époque a vouloir bien y assister. L'Association ayant depuis sa fondation siégé successivement dans toutes les villes d'université et les grandes villes qui avaient été designées a cet effet on s'occupera de l'ouverture de la prochaine reunion des résultats obtenus dans cette premiere periode **MM** les Académiciens qui croiraient pouvoir se rendre a York sont invités a faire connaitre d'avance leur intention aux secretaires généraux chargés de prendre les mesures nécessaires pour la reception des personnes invitées

M DUMAS fait observer à l'Academie que la Société pour l'avancement des Sciences a change cette année l'époque de sa reunion annuelle **M Dumas** avait sollicité, l'an dernier, ce changement d'ins l'intérêt réciproque des savants des deux nations, car lorsque la réunion de la Société anglaise avait lieu vers la fin du mois d'août les membres de l'Académie ne pouvaient guère s'y rendre, car parmi eux les professeurs de l'Ecole Polytechnique ceux des Facultés et des Collèges royaux, se trouvaient retenus par leurs devoirs en France Aussi les savants français ont-ils été jusqu'ici en petit nombre à ces réunions

Celles-ci ont pourtant beaucoup d'intérêt, car, indépendamment des savants distingués que la Société réunit, indépendamment des Mémoires scientifiques qui sont lus dans ses séances, indépendamment des recherches météorologiques qu'on y combine ou qu'on y resume, elle offre encore un attrait particulier à notre curiosité, les manufacturiers de la contrée où la réunion se tient étant dans l'usage d'ouvrir leurs ateliers à tous les membres de l'Association

L'Académie sans doute gré à MM. les membres de l'Association britannique pour l'avancement des Sciences, d'avoir bien voulu, sur un simple vœu de son président, faire un changement qui aura pour effet d'augmenter et de rendre plus intimes les rapports scientifiques des deux peuples, et qui exigeait, de la part des savants anglais, le sacrifice de quelques habitudes locales »

ASTRONOMIE — *Sur la comète de M. Faye*, Lettre de M. LE VERRIER à M. Cauchy

Je vous suis très-reconnaissant d'avoir bien voulu, à l'occasion de la Lettre de M. Valz, annoncer immédiatement que je vous avais communiqué, peu de temps auparavant, des résultats semblables à ceux qu'envoie aujourd'hui cet astronome. Vos remarques me permettent de continuer mon travail, et de le présenter plus tard à l'Académie, sans qu'on puisse m'accuser de m'emparer des idées d'autrui.

Les mêmes considérations qui ont guidé M. Valz m'ont porté à penser que la comète de M. Faye était la même que celle de Lexell, mais je n'ai pas cru devoir entretenir l'Académie de résultats aussi vagues avant d'être parvenu à leur donner quelque précision. Il m'a paru inutile de soulever cette question sans apporter en même temps une solution satisfaisante, à laquelle je travaille. Malheureusement le problème est des plus étendus. Ainsi, avec les idées qu'on doit se faire de la précision astronomique, je n'admets pas qu'on puisse se contenter des éléments donnés par Burckhardt sans les avoir revus. Le travail de cet astronome renferme des inexactitudes évidentes, et qu'il est nécessaire de corriger avant de suivre la comète dans la sphère d'activité de Jupiter.

J'ai actuellement achevé de calculer les perturbations que l'action de la Terre a fait éprouver à la comète, qui passa fort près de notre planète le 3 juillet 1770. J'ai trouvé, par exemple, que cette action avait considérablement diminué la longitude du nœud de la comète. Or Burckhardt donne pour cette longitude $131^{\circ} 52' 46''$ avant les perturbations et $131^{\circ} 54' 54''$ après les perturbations. Qui de nous deux a raison? Il est facile de le décider. Car à l'instant des perturbations, la Terre et la comète se trouvaient, l'une et l'autre, entre 90° et 180° degrés de longitude vraie, comptée à partir du nœud lant, et par cette simple construction, qui sert à expliquer la rétrogradation du nœud de la Lune, et qui ne s'appuie que sur le parallélogramme des vitesses, on reconnaît que le nœud de la comète a dû nécessairement

étrograder J'aurais même pu, à cette occasion, présenter une partie de mon travail, si cette erreur de Burckhardt que j'ai reconnue trop tard, ne me forçait à le revoir en partie

GÉOLOGIE — *Exploration géologique d'une partie très-peu connue de la Turquie d'Asie* (Extrait d'une Lettre de M EMILE DE CHANCOURTOIS, élève-ingénieur des Mines à M Fie de Beaumont)

L'approche de l'hiver m'ayant empêché de compléter autant que je l'aurais désiré l'exploration des bords du lac de Van j'ai pris ma route au sud pour me rendre à Djéziréh (sur le Tigre). Le lac de Van est borné au sud par une chaîne de montagnes fort élevées et abruptes qui fait suite à celle de ~~Mont~~ Elle se forme de plusieurs chaînons parallèles dirigés à l'est un peu au nord, et présente cette particularité, que la ligne de séparation des eaux se trouve précisément sur celui qui est contigu au lac, de manière que les cours d'eau importants qui y prennent leur source vont tous affluer au Tigre. Ce chaînon n'est cependant pas l'axe de la chaîne, sa composition qui est constante sur toute la longueur que j'ai pu observer, c'est-à-dire environ 120 kilomètres est un calcaire gris compacte superposé au schiste micace ou tiliqueux verdâtre passant quelquefois au véritable micaschiste et plongeant fortement vers le nord. À l'angle sud est du lac il y a une espèce de brouillement par suite duquel la chaîne est assez abaissée, et c'est là que je l'ai passée. Malheureusement, au second col, nous avons été assaillis par une neige fort épaisse, et je n'ai pu reconnaître la nature de l'axe. À partir de ce moment, nous avons commencé à descendre d'une manière continue jusqu'à Djéziréh, en suivant un des principaux affluents du Tigre, qu'on appelle Djennet-Souï ou Eau du Paradis. Cette rivière, dont le nom contraste singulièrement avec la nature sauvage du pays, coule presque constamment dans une vallée excessivement resserrée et très profonde, dans quelques endroits, les flancs sont tellement escarpés, que l'on est obligé de s'élever à une grande hauteur, et alors on découvre un horizon montagneux immense, dans lequel il est très-difficile de distinguer quelques lignes saillantes. Quant à la nature des roches dans le voisinage de la vallée, ce sont toujours des calcaires et des schistes plus ou moins métamorphiques et dont les couches ont été fortement bouleversées. L'orientation de ces couches indique le plus souvent un ridement dont l'axe serait dirigé de l'est à l'ouest. Cependant, dans beaucoup d'endroits, elle est totalement différente. Ainsi l'aspect de cette contrée présente de l'analogie avec les Alpes pour la multiplicité des soulèvements, et les effets métamorphiques qu'ils ont

produits mais l'intensité de l'action a dû être moindre, les roches éruptives ne s'y montrent que rarement, et il n'y a pas de ces chaînes bien dessinées qui pourraient guider utilement dans les recherches et servir de cadre aux observations.

Trois journées avant d'arriver à Djezireh, les montagnes métamorphiques cessent tout à fait et l'on entre dans un immense bassin de gres maîeux verdâtre, contenant de nombreuses couches subordonnées de calcaire argileux compacte d'un gris clair. Ce bassin présente une surface très-accidentée par l'action des eaux plus encore que par celle des soulèvements, mais toujours à un niveau de beaucoup inférieur aux montagnes environnantes. Au dessus des gres, dans certains endroits, on rencontre des bancs puissants de calcaire grisâtre avec des nummulites, des pecten et des oursins, qui forment comme des espèces de chaperons également peu dérangés, comparativement aux roches métamorphiques. Enfin au sud, on voit une crête régulière de calcaire relevée fortement au nord et qui forme une véritable muraille percée d'une seule porte et le défile par lequel s'échappe le Djennet-Souï et au delà duquel commence le désert.

Voici ce qu'il y a de plus frappant dans l'aspect du pays, au point de vue géognostique, je pourrais difficilement entrer ici dans plus de détails, et j'ajouterai seulement quelque chose sur les habitants. L'espèce que j'ai parcourue entre Van et Djezireh est le cœur du Kurdistan. On n'y parle pas le turc, et l'on peut dire que c'est un pays indépendant, puisqu'il y a un bey qui ne paye aucun tribut et aucun employé turc. Le costume et les mœurs des Kurdes sont aussi très-distincts. Ils sont en général très-intelligents et industrieux. La meilleure preuve que l'on puisse en donner, c'est qu'ils fabriquent tout ce qui leur est nécessaire et ne tirent presque rien des provinces environnantes. Avec ces bonnes dispositions ils ne sont cependant pas riches, et je crois que cela tient à la passion du vol, qui est développée chez eux à un très-haut degré. A chaque instant un bey en dépouille un autre moins fort et ruine tous ses villages. Dans le moment actuel, pourtant, ils sont très-tranquilles, parce qu'ils sont gouvernés par un homme de fer qui a réussi à se faire craindre de tous et veut que l'on ne vole pas, pour voler à lui tout seul, et quelle que soit la moralité de ce genre de gouvernement je ne lui en ai pas moins beaucoup d'obligations, puisque j'ai pu ainsi traverser avec sécurité un pays où peu d'Européens se sont hasardés.

Comme je quittais Djezireh, le 3 décembre 1843, le campement des Kurdes nomades qui venaient en grande hâte grouper leurs tentes nombreuses au pied de la ville pour y passer l'hiver, présentait un spectacle très-pittoresque,

mais était en même temps l'annonce des froids anticipés que j'avais à redouter. Je devais me rendre en premier lieu à Diarbékîr, distante encore de six journées. Pendant les deux premiers jours, ma marche se fit dans une plaine, et suivant une ligne parallèle à celle des montagnes que je venais de traverser. Cette plaine est de très-peu supérieure au niveau du Tigre, qui suit exactement ce dernier versant. De grands ravins qui la coupent fréquemment laissent voir la nature du sol. En général, on remarque une roche grise, caverneuse, souvent fissurée comme les basaltes, et dont les cavités sont, pour la plupart, remplies de zéolithes. Dans d'autres parties, on voit un calcaire blanc, saccharoïde et aussi excessivement caverneux qui semble comme le témoin de la roche couverte par la coulée ignée. La ligne des montagnes est dirigée à peu près de l'est à l'ouest, et je marchais vers le nord-ouest, ainsi je me rapprochais peu à peu de cette ligne, et le terrain devenait de plus en plus onduleux, sans changer toutefois de nature. Enfin nous sommes rentrés dans la région montagneuse, en franchissant trois fois de calcaire siliceux qui sort de dessous la roche basaltique. Une journée après, nous quittons de nouveau les hauteurs, pour descendre dans la plaine de Diarbékîr, d'une nature complètement identique à celle de la plaine de Djezireh, mais d'ailleurs entièrement entourée de montagnes. Sur toute cette route les villages sont très-rare, et leur emplacement paraît avoir été toujours déterminé par le plus grand nombre de cavernes naturelles qu'on a trouvées dans le sol. Ces villages sont assez riches, car sur les points où la terre peut être cultivée elle est très-productive, mais, en général, le manque d'eau se fait sentir, et, dans les grands intervalles sans culture qui séparent les lieux habités, des citernes suffisent à peine au besoin des voyageurs et des caravanes. La population que l'on rencontre est presque entièrement composée de chrétiens portant le costume arabe, et parlant l'arabe de Syrie.

En arrivant à Diarbékîr, je dus y subir toutes les tribulations des quarantaines turques. Ayant traversé précédemment un pays où la peste sévissait avec violence, on me fit rester pendant dix jours dans un prétendu lazaret, maison sans portes ni fenêtres, où la pluie pénétrait de tous côtés à travers un toit dégradé, et qui ne contenait pour tout mobilier que de la paille fangense et cependant on laissa entrer dans la ville le khavas qui m'escortait, preuve du discernement que les Turcs apportent dans leurs mesures sanitaires. Lorsque j'entrai dans ce lieu, je souffrais de plaies aux jambes résultant du frottement des courroies de mes étriers pendant une marche forcée, et je n'osais cependant me soigner, dans la crainte que, se méprenant sur la nature du mal, on ne m'imposât le maximum de la quarantaine. Je dus à mon séjour

dans cet endroit malsain un rhumatisme articulaire, et lorsque j'entrai en libre pratique, il fallut, à ma grande contrariété, attendre pour me remettre en route le rétablissement de ma santé

L'hiver venait de se déclarer définitivement on éprouvait plusieurs degrés de froid une neige abondante couvrait entièrement la terre, et les observations géologiques devenaient par conséquent impossibles mais j'avais à visiter les mines d'Argana et de Keban, comme aussi les fonderies de Tokat, et ce fut vers ces points que je me dirigeai aussitôt qu'il me fut possible de remonter à cheval

En quittant Diarbekir j'eus lieu d'observer nonobstant la neige, que la plaine que nous traversions ne changeait pas de nature, et, avant d'arriver à Argana je pus reconnaître deux ridements calcaires très-nets et d'une formation qui m'a paru récente, mais qu'il ne m'a pas été possible de déterminer

Argana est bâtie en gradins sur le flanc d'un immense rocher Ici, l'explication du midi de pentes d'ailleurs très-inclinées se était opposée à ce que la neige demeurait, et j'ai pu reconnaître ce même étage de craie à nummulites que j'avais déjà observé deux fois mais d'Argana à Argana-Maden la neige arrêta mes observations, et je n'ai pu m'occuper, en arrivant dans ce dernier lieu que des mines et fontaines Ils s'établissent, sous la direction d'ingénieurs allemands, envoyés par suite d'un contrat passé entre le gouvernement autrichien et la Porte, de nouvelles constructions destinées à remplacer les anciens fourneaux On ne traite encore à Argana-Maden que des minerais de première qualité, et on rejette ceux qui ne contiennent que de 5 à 6 pour 100 La richesse est souvent de 27 à 28 pour 100 Les anciens fourneaux grecs, malgré leur imperfection, denotent encore une certaine connaissance de l'art métallurgique, et présentent des dispositions qui ne sont pas sans intérêt Si d'Argana-Maden à Keban-Maden l'étude du terrain ne m'a pas été permise, je me suis du moins attaché à observer les positions topographiques Arrivé à Keban, parfaitement accueilli par les ingénieurs allemands qui s'y trouvaient réunis, j'ai pu voir avec détail les procédés nouveaux en les comparant à ceux qu'ils remplaçaient, et visiter attentivement l'exploitation des mines d'argent Le minerai est avec ou sans galène, mais toujours avec de la blende qui rend le traitement au fourneau à manche assez difficile Ce minerai est principalement le sulfure d'argent, mais accompagné de chlorure et mélangé de quelques minéraux arsenicaux On trouve aussi dans les filons beaucoup de gypse cristallisé, et quelques cristaux de sulfate de plomb dignes d'entrer dans une collection

* La rigueur de l'hiver persistait, et les neiges augmentaient d'épaisseur,

mais au delà d'Argana, la forme abrupte des montagnes ne m'a pas moins permis d'observer leur nature avec exactitude, et de reconnaître qu'elles présentent généralement le calcaire saccharoïde superposé à des micachistes très-quartzes, les deux roches étant fréquemment coupées par des filons porphyriques, mais très-pres des trachytes. J'ai profité à Keb en des moyens de rétablir mon baromètre, déjà cassé deux fois, et j'ai pu ainsi obtenir des données sur le niveau de l'Euphrate. Quand je voulus partir de Kéban, la route se trouvait complètement interceptée, et ce ne fut que quinze jours après, lorsqu'on ouvrit un étroit sentier pour le passage du Lartare, qu'il me fut possible d'avancer. La marche était fort pénible, nos chevaux s'abattaient à tout instant, et mon baromètre fut de nouveau brisé. Le ciel était alors très-pu, et c'était là un mal plutôt qu'un bien, car la réflexion du soleil sur la neige était fort pénible à supporter, elle eut pour effet, dès le premier jour, de me rendre la figure couleur de suie, en même temps qu'elle m'occasionna un mal d'yeux assez grave. Malgré ces inconvénients, j'eus lieu d'être assez satisfait de cette partie de mon voyage. Nous nous élevions de plus en plus, et un immense horizon montagneux et des plus imposants se développait devant nous, d'ailleurs la nature du terrain, de gres et de conglomérats, en grande partie, favorisait beaucoup la fonte des neiges, et facilitait les observations sur les versants méridionaux, tandis que, de l'autre côté, la terre restait entièrement couverte. Je n'ai pas encore assez comparé les remarques que j'ai faites pour présenter une opinion sur cette formation, mais j'ai lieu de penser que leur résultat ne sera pas d'une médiocrité. Après être parvenu sur un très-vaste plateau, appelé Deliklitach, on descend rapidement vers la vallée de Sivas, dont l'analogie topographique est frappante avec celle d'Erzeroum aussi élevée que celle-ci, elle est parcourue dans sa longueur par le Kézilsomak ou fleuve Rouge, le plus grand cours d'eau de l'Asie Mineure après l'Euphrate. En quittant Sivas pour marcher vers Tokat, on rencontre une grande formation de gres et de conglomérats d'un gris verdâtre, bien distincts de la formation crayeuse des montagnes d'Erzeroum. Ensuite on arrive par des vallées successives jusqu'au sommet d'une crête presque complètement serpentineuse, appelée le Tchamlubel. A cet endroit, je pus jouir d'un spectacle vraiment magnifique. Toute la contrée que je venais de traverser, depuis Sivas, présentait l'aspect de l'hiver dans toute sa rigueur, et tout à coup, du sommet élevé où je me trouvais placé, se développait devant moi une immense série de montagnes couvertes des plus belles forêts d'arbres verts. Plus de trace de neige, et partout les travaux de la terre en pleine activité. Je ne pense pas qu'il soit possible de rencontrer une transition plus

tranchée Les fatigues et les contrariétés que je supportais depuis plus de trois mois furent aussitôt oubliées, et j'arrivai à Tokat dans des dispositions aussi favorables que celles où je me trouvais au début de mon voyage.

Depuis que je suis à Tokat, j'ai mis le temps à profit, en étudiant avec détail l'affinage du cuivre d'après les procédés que les ingénieurs allemands ont introduits, et qu'ils appliquent au moyen de fourneaux à reverberie et d'un fourneau à manche, construits sur les modèles de la Hongrie. Ces procédés, dont je m'occupe à comparer les résultats avec ceux précédemment en usage, et que l'on continue à pratiquer en utilisant les fourneaux anciens qui subsistent encore, sont tout à fait européens, sauf quelques modifications nécessitées par la mauvaise qualité du cuivre noir provenant d'Argana, et que l'on apporte brut, à dos de chameau. Le cuivre, après l'affinage, est généralement vendu à des négociants français et totalement dirigé sur la France. Cette circonstance m'a paru ajouter de l'intérêt à une étude que je compte présenter avec tous les détails nécessaires.

» De Tokat je me rendrai à Samsoun et visiterai, dans les environs, les forges des Turkmans nomades, puis je m'embarquerai pour Héracleie, où j'aurai à voir les mines de charbon et la formation houillère de cet endroit. »

ANTHROPOLOGIE — *Des caractères distinctifs des trois races du nord de l'Afrique : l'Arabe, le Kabyle et le Mozabite*, par M. Guyon

Caractères distinctifs de l'Arabe

Corps sec, élance, cou long, taille au-dessus de la moyenne, yeux noirs, cheveux de même couleur, tendant à se boucler, peau un peu basanée, face oblongue, déprimée latéralement, crâne ovoïde d'avant en arrière, front étroit, oblique, nez long, arqué, sec, dents longues, très-belles.

» Les os du crâne sont remarquables par leur peu d'épaisseur. Hérodote signale un caractère semblable chez les Perses. Cette conformité organique conduira peut-être plus tard, avec le concours d'autres éléments, à établir entre les deux peuples une communauté d'origine. Tous deux, du reste, habitent des contrées limitrophes, et cette seule circonstance suffirait déjà pour faire soupçonner qu'ils ne sont que deux branches d'un même tronc.

Or sait que l'établissement des Arabes en Afrique commença à s'opérer dès l'origine même de l'islamisme. Ce grand événement était accompli dans les premières années du VIII^e siècle, époque à laquelle l'Arabe passa de l'Afrique en Espagne, en s'aidant, pour cette nouvelle conquête, des deux peuples qu'il avait trouvés dans la première de ces contrées, le Maure et le Berbère.

Ce dernier nom, comme on sait, est celui du Kabyle dans les montagnes du Maroc

Caractères distinctifs du Kabyle

» Corps trapu, musclé, cou court, taille peu élevée, yeux et cheveux noirs, parfois yeux bruns, avec cheveux châtons, peau d'une teinte moins foncée que celle de l'Arabe, face ovale, pleine, crâne globuleux, conique en arrière, front moins étroit et moins oblique que celui de l'Arabe, nez moyen, épais, dents moins longues et moins belles que chez l'Arabe

Le Kabyle habite les montagnes, et son organisation, comme celle de tous les peuples montagnards, se modifie selon les localités. Ainsi, dans les vallées, il est sujet au goitre et, par suite, au crétinisme, et ce n'est pas là qu'il faudrait aller chercher le type de la race. Déjà, dans une autre circonstance, nous avons fait une remarque semblable à l'égard des Goths qui, sous le nom de *Cagots*, habitent aujourd'hui nos Pyrénées. Généralement, la race kabyle est belle, c'est elle qui prédomine dans une race que nous désignons, à son insu, sous le nom de *Maure*, et qui ne rappelle du Maure d'autrefois que les lieux où il lui a succédé. Le Maure d'aujourd'hui est un produit de croisements multiples : son organisation est des plus belles, et nous nous en occupons ailleurs. C'est lui, comme on le sait, qui constitue en très grande partie la population de la plupart des villes du nord de l'Afrique.

Le Kabyle est, comme l'Arabe, étranger à l'Afrique, mais il lui est, dans ce pays, de beaucoup antérieur. Son origine paraît phénicienne, aussi je vois en lui l'ancien Numide, lequel n'est pas, selon moi, le Maure d'autrefois, celui des Grecs et des Romains. Celui-ci me paraît avoir été le peuple autochtone, sinon de tout le nord de l'Afrique, du moins des contrées où il existait encore du temps de Salluste. C'est ce que je me propose d'établir ailleurs, sur des données qui me paraissent devoir porter la conviction dans tous les esprits.

Caractères distinctifs du Mozabite

Corps plus ramassé et plus charnu que celui de l'Arabe, taille moyenne, yeux noirs, cheveux de même couleur, boucles, peau olivâtre, face ovale, moins anguleuse que celle de l'Arabe, crâne ovoïde d'avant en arrière, déprimé latéralement, comme chez l'Arabe, étendue verticale, remarquable, front étroit, moins oblique que chez ce dernier, nez assez grand, charnu, parfois terminé en pointe, dents assez longues, belles.

Le Mozabite vient de l'Orient, comme l'Arabe et le Kabyle, mais l'époque de son passage en Afrique est inconnue. Pour quelques-uns, l'émigration

des Mozabites sur l'Afrique ne remonterait qu'à l'époque de l'établissement du schisme qui les sépare des autres musulmans. L'opinion contraire pourrait s'étayer de la position géographique qu'ils occupent au sud-ouest de l'Algérie, ou l'on peut supposer qu'ils ont été refoulés par les populations arrivées, après eux, sur le sol étranger.

ZOOLOGIE — Sur la nature de l'alimentation des Ibis, par M. GUYON

Selon Pline, les Ibis dévoraient l'Égypte de ses serpents. Hérodote, avant lui, avait déjà émis une opinion semblable.

Des doutes ont été émis sur la faculté qu'auraient ces animaux de détruire les serpents, et par conséquent sur les services qu'ils auraient rendus, sous ce rapport, à l'antique Égypte. Ces doutes étaient fondés sur l'organisation du bec de l'oiseau, bec dont la longueur et la délicatesse paraissent peu propres à lui permettre de lutter avec des animaux jouissant d'une certaine force, quelque petits qu'on les suppose.

L'*Ibis noir*, l'une des deux espèces d'Ibis que possédaient les Égyptiens, est assez répandu dans l'Algérie du sud, où nos troupes l'ont souvent vu voler par bandes, à l'instar de notre cormoran. Il y a quinze à dix-huit mois qu'on en tua un individu dans l'Ouarencenis (1). Son jabot, qu'on eut l'idée d'ouvrir, se trouvait rempli de trois sortes d'insectes encore tout entiers : ils y formaient trois paquets bien distincts l'un de l'autre, et de manière à faire croire que l'oiseau n'était passé à la chasse d'une espèce qu'après avoir terminée celle de la précédente. Un piquet se composait de sauterelles, un autre de scolopendres, et le troisième de scorpions.

Depuis d'autres Ibis, qui avaient été pris vivants, n'ayant été que blessés par des chasseurs, furent tenus en domesticité par des officiers et d'autres personnes. On en voyait ainsi, l'été dernier, dans plusieurs de nos camps de l'intérieur (2). Ces oiseaux ne se nourrissaient que de sauterelles, alors très-multipliées sur les points où ils se trouvaient, ils allaient à la chasse de ces insectes qu'ils venaient prendre jusque dans la main lorsqu'on leur en présentait. La consommation qu'ils en faisaient était considérable.

J'en étais là de la question sur l'alimentation des Ibis, lorsqu'un de nos jeunes collaborateurs, M. Lefevre, qui arrivait de l'intérieur et en qui j'ai

(1) Grand massif de montagnes dans la province d'Alger, au delà du Chéïf.

(2) A Thiaret, à l'entrée de la plaine de Cherson, à Orléansville, sur le Chéïf, etc.

toute confiance, m'assura avoir vu un Ibis saisir et avaler de petits sauriens, ainsi que d'assez forts tronçons de couleuvres, qu'il s'amusa à lui jeter. C'est, du reste, ce que l'on concevra fort bien lorsque j'aurai dit comment procède l'animal pour avaler sa proie. Celle-ci ayant été saisie, avec le bout du bec, l'Ibis, par un mouvement rapide, la projette en l'air, et la reçoit aussitôt dans le gosier. Si c'est un corps vivant qu'il saisit, c'est toujours la tête qui pénètre la première dans son bec.

« Depuis les renseignements que nous donnait M. Lefevre sur l'alimentation des Ibis, nous en avons reçu d'autres, ils sont tout récents. Il en résulte que cet oiseau aime beaucoup le *barbeau*, poisson qu'il trouve abondamment dans nos rivières, qu'il avale de la viande, cuite ou crue, du pain mouillé d'eau ou de bouillon, etc. Nous avons encore appris que l'Ibis s'apprivoise à ce point qu'un de ces animaux, qui existait en liberté à Orléansville, où il a vécu six mois, venait tous les jours, à l'heure des repas, sous la tente d'un capitaine, pour y recevoir la nourriture qu'on avait l'habitude de lui donner.

« L'Ibis noir ayant la faculté de détruire les reptiles, celle-ci doit être encore plus prononcée chez l'Ibis sacré, à raison de sa taille, qui est de beaucoup supérieure à celle de l'Ibis noir.

« De nouvelles observations restent à faire sur le sujet de cet article. Il serait à désirer qu'on pût les étendre à l'Ibis sacré. Je ferai remarquer que cet Ibis existe aussi en Algérie, où il s'avance sur la côte, ce que ne fait pas l'Ibis noir. L'Ibis sacré, *Ibis religiosa*, se rencontre sur les bords des lacs, j'en ai vu de nombreux individus, en 1840, sur les bords du lac *Halouloula* (1). Cet oiseau vole aussi par bandes, comme l'Ibis noir, et souvent à fleur de terre, circonstance qui, jointe à la taille de l'animal, fait que, parfois, des bandes d'Ibis ont été prises, par nos troupes, pour des pelotons de cavalerie arabe. »

PHYSIOLOGIE — *Expériences sur la coloration du chyle par la garance*
(Extrait d'une Lettre de M. Bouisson à M. Flourens.)

« Les physiologistes ont émis à ce sujet des assertions contradictoires. Les uns, avec Haller, Hunter, Lister, Blumenbach, etc., disent avoir vu les matières colorantes introduites avec les aliments, passer dans le chyle au moyen de l'absorption, et communiquer à ce liquide la couleur qui leur est propre; d'autres, avec MM. Magendie, Tiedemann, etc., déclarent n'avoir

(1) Situé au sud et au pied du Tombeau dit de la *Chrétienne*, entre Alger et Cherchell.

pas observé ce résultat dans les expériences qu'ils ont faites pour le constater.

L'observation d'un fait aussi facile à vérifier que celui de la coloration du chyle, après l'usage d'aliments chargés de matière colorante, est trop simple, trop aisée pour qu'on puisse supposer que les expérimentateurs se soient fait illusion. Il est donc probable que, s'ils ont constaté des effets différents, c'est que les conditions de l'expérimentation n'avaient pas été établies d'une manière identique.

Les essais que j'ai entrepris à cet égard m'ont convaincu, en effet, que tantôt le chyle était chargé de matière colorante et que tantôt il en était dépourvu, suivant la manière dont l'expérience avait été dirigée.

Première expérience — Deux lapins soumis à une abstinence préalable furent alimentés avec du son dans lequel une assez forte proportion de poudre de garance avait été incorporée, l'aliment coloré fut laissé à leur disposition pendant trois heures, ils furent ensuite tués pendant qu'ils étaient en pleine digestion. Les lymphatiques du mésentère, les ganglions de la même région et le canal thoracique étaient remplis de chyle légèrement opalin, ou l'on n'apercevait aucune trace de la couleur particulière de la garance. Mais le sérum du sang était manifestement coloré par cette substance.

Deuxième expérience — Deux autres lapins furent soumis au même régime, mais l'aliment fut laissé plus longtemps à leur disposition, et ils ne furent sacrifiés que le lendemain du jour où ils avaient commencé à prendre de la garance. Le chyle n'était pas encore coloré mais le sérum du sang l'était avec évidence, et la teinte rouge se observait en outre dans quelques liquides sécrétés et spécialement dans l'urine.

Troisième expérience — Deux lapins furent alimentés par du son mélangé avec de la garance en poudre, pendant dix jours, ils furent ensuite soumis à deux jours d'abstinence complète, afin de pouvoir examiner que de la lymphe dans le canal thoracique. Les animaux furent alors sacrifiés, la coloration rouge de la garance imprégnait la plupart des liquides, et elle était particulièrement sensible dans la lymphe recueillie dans le canal thoracique.

Quatrième expérience — Deux lapins furent soumis au régime de la garance, jusqu'à saturation, et furent nourris ainsi, l'un pendant dix jours, l'autre pendant quinze. Après ce laps de temps, ils furent tués pendant la digestion. Chez tous les deux, le chyle du canal thoracique présentait la couleur rouge de la garance d'une manière moins prononcée que la lymphe obtenue dans l'expérience précédente, mais assez caractérisée pour que l'on ne pût la méconnaître. La plupart des liquides étaient rouges, ainsi que le tissu osseux.

» Ces expériences amènent à conclure

» Que la matière colorante de la garance est absorbée par le système veineux, et, par conséquent, ne colore pas directement le chyle, mais que lorsque l'alimentation est assez prolongée pour qu'il y ait diffusion du principe colorant dans l'organisme, la lymphé s'en charge comme les autres liquides, et transmet au chyle cette coloration en se mélangeant avec lui. D'où il résulte que la coloration du chyle est subordonnée au temps depuis lequel dure l'administration des aliments colorés. Les premiers jours, le chyle conserve sa couleur ordinaire, plus tard, il présente celle des substances qui ont servi à l'expérimentation »

M DUJARDIN écrit, de Lille, qu'il vient de construire une nouvelle machine magnéto-électrique qui produit des effets très-énergiques

« Cette machine, dit-il, se compose, 1^o d'un aimant en fer-à-cheval fixé horizontalement sur une tablette, 2^o d'un chassis de galvanomètre fixé verticalement entre les branches de l'aimant un fil de cuivre, revêtu de coton et long de 500 mètres, entouré de ses nombreuses enroulements (le chassis de galvanomètre, 3^o enfin, d'un morceau de fer doux tournant d'un tiers l'intérieur du galvanomètre. Les extrémités du morceau de fer doux passent alternativement très-pres des pôles de l'aimant et s'en éloignent. Lorsqu'elles passent près des pôles de l'aimant, il y a aimantation, et, par suite, il se produit dans le fil du galvanomètre un courant d'induction dans un sens, lorsqu'elles s'éloignent des pôles de l'aimant, il y a désaimantation, et, par suite, il se produit dans le fil du galvanomètre un courant d'induction dirigé en sens contraire du premier. Ainsi à chaque révolution complète du fer doux il y a production dans le fil du galvanomètre, de quatre courants d'induction de signes alternativement contraires »

M LEVOL adresse une nouvelle Lettre relative à la question de priorité débattue entre lui et M *Becquerel*, pour certains cas d'*application des métaux sur les métaux au moyen de l'électricité*

« J'ignorais, dit M. Levol, les expériences de M. Wollaston citées par M. Becquerel, et ce savant lui-même n'en a point parlé dans la publication qui a donné lieu à ma réclamation. M. Becquerel reconnaît d'ailleurs que l'application avec adhérence de l'antimoine sur le cuivre m'appartient, que je l'avais signalée le premier, et qu'il a oublié de me nommer à cette occasion.. M. Becquerel, qui paraît attacher beaucoup d'importance à l'emploi des doubles chlorures métallico-alcalins (emploi très-avantageux en

effet dans certains cas, et que M Boettger indiquait des 1840 pour le zinc (usage du cuivre et du laiton), recommande un sel de cette espèce pour obtenir l'adhérence de l'antimoine sur le cuivre. Je suis très porté à croire que le chlorure simple que j'emploie à la température ordinaire donne de meilleurs résultats que ceux qu'on obtient laborieusement à chaud avec le chlorure antimonio-alkalin, si toutefois il existe un pareil sel, M Becquerel dit, en effet, que le métal déposé par son procédé a un aspect gris violacé, celui que j'obtiens a tout l'aspect métallique qui lui est propre, ainsi qu'il est facile de le remarquer sur l'une des lames qui ont été déposées par moi au secrétariat de l'Institut, à l'appui de ma première communication

M BAUDENS, qui avait soumis au jugement de l'Académie un *appareil* de son invention pour le traitement des *fractures du corps et du col du fémur*, écrit qu'il a en ce moment, dans son service au Val-de-Grace, deux cas de fracture traités par ce procédé et exprime le désir que MM les membres de la Commission chargés de faire le Rapport sur son invention veuillent bien constater le plus promptement possible l'état des malades

Dans la même Lettre, M Baudens annonce qu'il a imaginé un autre *appareil pour le traitement des fractures en travers de la rotule*, appareil au moyen duquel il espère obtenir la réunion des deux fragments, sans formation d'une substance intermédiaire MM les Commissaires pourront voir aussi, au Val-de-Grace, l'application de ce nouveau procédé, dans un cas qui paraît promettre une guérison complète

(Renvoi à la Commission nommée)

M DELEAU écrit à l'occasion d'un Mémoire lu récemment à l'Académie, et dans lequel l'auteur, M Bonnafont, soutient qu'on ne peut obtenir, d'une manière durable, la dilatation de la trompe d'Eustache au moyen d'injections aériennes M Deleau assure, au contraire, avoir obtenu par ce moyen des guérisons durables, et envoie, comme pièce à consulter, pour la Commission chargée de faire un Rapport sur le travail de M Bonnafont, un ouvrage qu'il a publié sur les maladies de l'oreille moyenne, ouvrage dans lequel il s'est particulièrement occupé des injections aériennes de la trompe et des effets obtenus par ce moyen

(Renvoi à la Commission nommée)

M ACKERMANN annonce son prochain départ pour l'île de Madagascar, île dans laquelle il doit faire un séjour prolongé, pour s'y occuper de recherches

scientifiques, il espère que l'Académie, à laquelle il a fait part, depuis plusieurs années, de son projet de voyage, voudra bien contribuer à le rendre plus fructueux en lui indiquant les principaux points sur lesquels il serait important d'obtenir des renseignements.

Une Commission composée de MM de Blainville, Flourens, Isidore Geoffroy-Saint Hilaire, Élie de Beaumont, Gaudichaud et Rayer, est chargée de préparer des instructions pour ce voyage.

M SAUVEUR, en adressant au nom de l'Académie royale de Médecine de Belgique, dont il est secrétaire perpétuel, plusieurs livraisons du Bulletin de cette Académie, exprime le désir de voir s'établir un échange entre les publications faites par ce corps savant et celles de l'Académie des Sciences.

(Renvoi à la Commission administrative)

M DANGER adresse un *paquet cacheté*
L'Académie en accepte le dépôt

La séance est levée à 5 heures et un quart

F

ERRATUM

(Séance du 22 avril 1844)

Page 768, ligne 7, au lieu de *faites sur le Faulhorn*, lisez *faites en descendant le Faulhorn*

BULLETIN BIBLIOGRAPHIQUE

L'Académie a reçu, dans cette séance, les ouvrages dont voici les titres

Comptes rendus hebdomadaires des séances de l'Académie royale des Sciences
1^{er} semestre 1844 n° 17, in-4°

Annales de Chimie et de Physique, par MM GAY-LUSSAC, ARAGO, CHE-
VREUL, DUMAS, PELOUZE, BOUSSINGAULT et REGNAULT 3^e série, tome XI
mai 1844, in-8°

Précis de Chimie organique, par M GEHRARDT Montpellier 1 vol in 8°

Maison rustique du XIX^e siècle, tome V *Horticulture*, 1 vol in-8°

Recherches pratiques sur les Maladies de l'Oreille — 1^{re} partie *Maladies de*
l'Oreille moyenne par M DELEAU 1 vol in 8°

Mémoire sur l'attraction des Polyèdres par M D'ESTOCQUOIS, bioch in 4°

Les Idées et les Vœux d'un jeune plébéen, par M A-F LEBRUN 1840
in 16

Voix de la Nature — *Pensées*, par le même, 1842, in 8°

Dissertation sur les Dogmes de la Foi et l'immortalité de l'Âme sur le de quel-
ques points de morale, par le même, 1843, in-8

Dictionnaire universel d'Histoire naturelle, tome IV, 47^e livr in 8°

Le Technologiste, mai 1844, in-8°

Encyclographie médicale avril 1844, in 8°

Chemins de fer — *Système* JOUFFROY *Quelques mots à MM les rédacteurs*
du Journal des Débats à propos de leur article relatif au Rapport de M MALLFT
sur le Chemin de fer atmosphérique, in-8°

Mémoire sur les Composés décolorants formés par le chlorure avec les oxydes
alkalins, par M MARIENS (Extrait du tome VII des *Mémoires de l'Académie*
royale de Bruxelles) in 4°

Bulletin et Annales de l'Académie d'Archéologie de Belgique, tome I^{er}, 3^e livr ,
in-4°

Bulletin de l'Académie royale de Médecine de Belgique, années 1841-1842
n° 1 et année 1842-1843, nos 1 à 10 Bruxelles, in-8°

Académie royale de Médecine de Belgique Programme, $\frac{1}{2}$ de feuille in-8°

An account (classification du Système nerveux, par M CH BELL) *Exposé*
de cette classification, par M A SHAW Londres, 1844, in-8°

The electrical *Magasin électrique dirigé par M CH -V WALKER*, vol 1^{er}
n° 4, avril 1844, in-8°

Astronomische . *Nouvelles astronomiques de M SCHUMACKER*, n° 501,
in-4°

Notizie . *Nouvelles concernant des Recherches électriques*, par M F ELICE
Genes, 1844, in 8°

Gazette médicale de Paris, n° 17

Gazette des Hôpitaux, n° 48 à 50

L'Echo du Monde savant n° 32 et 33

COMPTE RENDU

DES SÉANCES

DE L'ACADÉMIE DES SCIENCES.

SÉANCE DU LUNDI 6 MAI 1844.

PRÉSIDENCE DE M. ÉLIE DE BEAUMONT.

- - - -

MÉMOIRES ET COMMUNICATIONS

DES MEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE L'ACADÉMIE.

PHYSIQUE. — *Recherches sur la concentration de la force magnétique vers les surfaces des corps magnétisés; par M. le docteur DE HALDAT.*

« J'ai publié, en 1828, une Notice sur la condensation de la force magnétique à la surface des aimants (1) dans laquelle j'ai rassemblé quelques-uns des faits les plus propres à éclairer une question dont la solution est propre à établir une nouvelle analogie entre les propriétés des corps à l'état électrique et ceux qui possèdent la force magnétique; mais les faits que j'ai rapportés n'ayant été établis que sur un petit nombre d'expériences dont les résultats peu prononcés, variables, parfois équivoques, n'ont pu résoudre exactement la question, j'ai dû me livrer à de nouvelles recherches sur ce sujet.

« A l'imitation de Nobili, qui l'a examiné avant moi, j'avais, dans mes premières expériences, cherché à reconnaître si, en formant des assemblages de fils de fer de diamètres divers, dont une partie magnétisée se plaçait au cen-

(1) *Mémoires de l'Académie de Nancy*, en 1828.

tre d'un faisceau formé de fils semblables à l'état neutre, la force magnétique passerait du centre à la surface du cylindre et s'y condenserait. Les résultats ayant été nuls en employant des fils d'acier qui, par leur force coercitive trop énergique, s'opposent à la propagation de la force magnétique, et s'étant montrés douteux pour les fils de fer non recuits et même pour ceux qui l'étaient, j'y ai substitué des lames de tôle de fer minces, de 15 centimètres de longueur et de 15 millimètres de largeur, dont j'ai formé des faisceaux dans lesquels les lames qui occupaient le centre avaient été magnétisées. Cependant ce mode qui semblait plus propre à la solution de la question s'étant encore montré inefficace, j'ai eu recours à des prismes creux d'acier qui recevaient dans leur intérieur des prismes de même substance magnétisés qu'on pouvait en extraire après qu'ils y avaient séjourné le temps nécessaire à la propagation de la force magnétique. C'est à ce procédé que je suis revenu, mais en lui faisant éprouver des modifications propres à rendre la force magnétique communiquée plus énergique, plus constante, et par cela même plus facilement appréciable. Au prisme quadrilatère j'ai substitué un tube de fer doux, formé d'un tronçon de canon de fusil de 20 centimètres de longueur et de 22 millimètres de diamètre extérieur, qui, régulier, bien poli en dehors comme en dedans, admet dans sa capacité un cylindre plein de 16 millimètres de diamètre et du poids de 340 grammes. Ce tube est fermé à l'une de ses extrémités par un tampon de fer hermétiquement ajusté, et à l'autre par un bouchon à vis qui remplit l'espace vide et presse modérément le cylindre intérieur. Le cylindre extérieur est enveloppé d'un tube de cuivre très-mince recouvert d'un fil de cuivre garni de soie de 1 millimètre de diamètre. Ce fil forme trois couches concentriques répondant aux deux extrémités et couvrant les deux tiers de l'enveloppe. Un couple cuivre-zinc d'une surface assez grande reçoit à ses deux pôles les extrémités de ces fils qui développent dans le tube de fer la force magnétique dont l'intensité est mesurée par trois procédés différents.

» PREMIER PROCÉDÉ. — 1°. *Par les poids soutenus.* — Dans ce procédé, notre appareil, placé dans une direction verticale, est fixé au moyen d'une échoppe adaptée à l'une de ses extrémités; à l'autre s'adapte un contact de fer doux qui peut recevoir des poids dont la masse exigée pour en opérer l'arrachement présente la force magnétique acquise à l'appareil par le courant que conduisent les fils qui en joignent les pôles. Six expériences faites à peu d'intervalle les unes des autres, afin de maintenir plus d'égalité dans l'action de la pile, ont prouvé que la force acquise à l'appareil, qui était représentée par 4 kilogrammes, conservait la même intensité; soit que le tube

de fer magnétisé par induction fût vide, ou qu'il fût rempli par le cylindre accessoire qu'on y introduisait. On connaît assez les difficultés qu'on rencontre dans l'appréciation de la force attractive des aimants par ce procédé pour s'attendre à une détermination rigoureuse, soit à raison de l'inexactitude du contact entre les parties de l'appareil réunies par la force magnétique, soit à raison de la manière dont s'opère la séparation. Cependant en faisant état de la conformité des résultats obtenus par ce procédé avec ceux que l'on obtient par d'autres méthodes plus précises que nous ferons connaître, ils établissent, en général 1° que la masse dans les aimants n'a que très peu d'influence sur leur puissance, 2° que la force magnétique réside principalement, si ce n'est absolument, près de la surface des corps magnétisés.

DEUXIÈME PROCÉDÉ — 2° *Par les oscillations de l'aiguille* — Ce procédé consiste à faire osciller une aiguille aimantée placée dans sa direction normale, à une distance constante de notre tube de fer doux vide ou rempli de son cylindre additionnel, et à compter le nombre des oscillations qu'elle exécute en un temps donné, pendant que l'appareil est soumis à l'influence du courant qui le constitue à l'état magnétique. La distance du pôle nord de l'aiguille au pôle sud de l'aimant étant de 3 centimètres, elle a constamment donné soixante-cinq à soixante dix oscillations doubles par minute, dont la moyenne, soixante-deux et demie, n'a offert que des différences de peu de valeur, soit que le tube ait été magnétisé lorsqu'il contenait son cylindre complémentaire ou qu'il était vide, soit lorsqu'il était rempli de limaille de fer bien tassée ou qu'on y avait substitué un faisceau cylindrique de fils de fer doux propre à remplir sa capacité.

TROISIÈME PROCÉDÉ — 3° *Par les courants d'induction* — L'appareil employé dans ce procédé se compose de deux parties, dont la première est notre tube de fer doux pourvu ou privé de son cylindre additionnel et armé de sa garniture de fils de cuivre couverts de soie, il est pourvu de deux pièces de fer doux qui se fixent solidement à ses extrémités, par le moyen desquelles on le met en contact avec la seconde partie de l'appareil aussi composée d'un cylindre de fer doux de 24 centimètres de longueur, de 2 centimètres de diamètre et du poids de 500 grammes, armé, comme le tube, d'un manchon de cuivre mince enveloppé de fils de cuivre couverts de soie. La force magnétique est développée dans le tube de fer par un couple d'assez grande dimension, et dans le cylindre par l'induction de ce même tube de fer. Le cylindre d'induction communique par son armature avec une boussole de sinus dont l'aiguille indique la force magnétique développée dans le cylindre. Les expé-

riences faites avec cet appareil comme susceptible de résultats plus exacts que ceux énoncés précédemment, ont été répétées un grand nombre de fois, et de deux manières différentes 1° par la séparation violente des deux aimants, cas dans lequel l'aiguille de la boussole de sinus s'est écartée, terme moyen, de 15 à 20 degrés de la normale 2° en approchant lentement l'aimant induit du tube de fer armé ou aimant inducteur, et en n'établissant le contact entre les deux parties de l'appareil que quand les pôles des deux aimants se trouvaient à une très-petite distance l'un de l'autre L'aiguille prenant alors une direction très-voisine de celle qu'elle conserve ensuite, il est bien plus facile d'apprécier son écartement de la normale mesure de la force magnétique du tube de fer doux qui forme la première partie de l'appareil De toutes ces expériences réunies et comparées il résulte donc que le tube qui remplit le rôle d'aimant inducteur pourvu ou privé de son cylindre complémentaire (accessoire), qu'il ait été rempli d'une quantité suffisante de limaille de fer ou de faisceaux de fil de ce métal, a constamment déterminé dans la boussole le même écartement de la normale

La sensibilité assez faible de la boussole de sinus n'ayant donné que des indications limitées entre 15 à 20 degrés d'écartement de la normale, j'ai dû craindre qu'elles ne fussent insuffisantes c'est pourquoi je les ai contrôlées en consultant l'aiguille magnétométrique de Schweigger, destinée à la mesure des courants thermo-électriques ou à fils courts Elle a été disposée de la même manière que la boussole, après avoir toutefois diminué la puissance du courant par l'interposition d'un fil conducteur mince et de plusieurs mètres de longueur et l'emploi d'un couple cuivre-zinc de très-petite dimension Employée avec ces précautions, l'aiguille a présenté, terme moyen, une déviation constante de 40 à 45 degrés Si maintenant nous examinons les faits que nous venons de rapporter, nous ne pouvons méconnaître le peu d'influence exercée par la masse dans les aimants par induction, et par conséquent dans tous les autres, quelle que soit leur espèce, puisqu'ils ne diffèrent entre eux que par la constance dans l'état magnétique, permanent dans les uns et transitoire dans les autres, identiques enfin, selon la doctrine d'Ampère Je me suis servi du terme *peu d'influence*, pour ne pas dire nullité absolue d'influence, parce que les expériences de ce genre ne sont pas susceptibles d'une rigoureuse exactitude De cette conséquence en résulte nécessairement une autre, dont le but est relatif à la constitution des aimants, c'est que l'on en augmenterait inutilement la masse, toutefois considérant que ce principe n'est exact qu'entre certaines limites qui dépendent de la nature chimique du métal, de la disposition intime de ses molécules

constitutives, de la dureté de sa trempe et de sa forme conditions que l'expérience peut seule apprécier. L'autre conséquence que nous tirons des faits précédemment exposés relativement à la théorie générale du magnétisme, et à laquelle il ne semble impossible de refuser son assentiment, en se rappelant la nullité d'influence du cylindre additionnel, c'est que *leur force reside a la surface ou pres de lui surface*. Ces faits qui établissent ce principe nous offrent à la fois une analogie remarquable entre l'état magnétique et l'état électrique, et une différence qui n'est pas moins étonnante, c'est que le vide qui exerce, comme on sait, une si grande influence sur les uns, est absolument impuissant sur les autres.

Ces recherches relatives à l'influence exercée par la masse des corps sur la force qu'ils peuvent acquérir, ont des rapports trop directs avec la question relative à la puissance communiquée au fer par les courants, pour ne pas s'être offertes à ma pensée durant ce travail. Cette influence n'a pu sans doute être négligée par les physiciens qui, comme M. Jacob, ont dirigé leurs vues vers l'emploi du magnétisme comme source d'un pouvoir dynamique susceptible d'être appliqué aux machines, mais comme, dans les questions d'une telle importance, on ne peut trop multiplier les faits, j'ai cherché dans quel rapport croît la force d'un aimant donné de masse et de volume sous l'influence des courants d'intensité variée. L'appareil employé à la solution de cette question était composé d'un petit fer cylindrique courbe en fer à cheval qui, redressé, aurait 40 centimètres de longueur, et dont le diamètre est de 20 millimètres, le poids de 500 grammes. Il est inutile de dire qu'il est armé d'une garniture convenable de fils de cuivre couverts de soie. Le couple employé pour développer le magnétisme dans cet aimant temporaire était formé de lames de cuivre et de zinc de 400 centimètres carrés de surface. Cette paire cylindrique a été divisée en six bandes horizontales égales, qui devaient donner des courants dont on peut supposer les intensités proportionnelles aux surfaces immergées dans l'eau acidulée. Supposant donc cette égalité d'action entre les surfaces immergées dans un liquide excitateur dont le volume est assez considérable pour conserver une activité égale durant les expériences, à raison du soin que l'on a de réparer les pertes qu'il éprouve, et de rendre sa densité uniforme par une agitation répétée, les résultats ont été tels qu'ils sont indiqués dans le tableau suivant.

Numéros des expériences	Étendue des surfaces immergées	Force employée pour séparer l'ancre de l'aimant
1	1	5 kilogrammes
2	2	10
3	3	15
4	4	17 à 18
5	5	15
6	6	13 à 14

La force attractive développée dans l'aimant temporaire a été mesurée par un dynamomètre fort exact la force acquise dans les quatre premières expériences croît comme l'étendue de la surface du couple immergée elle décroît à partir de la quatrième, quoique l'étendue de la surface immergée croisse toujours dans le même rapport, ce qui indique que la surexcitation du fer, loin d'augmenter sa force magnétique, la diminue au contraire d'une manière très-remarquable Ce résultat, qui me semblait digne d'un examen plus exact a été vérifié par les oscillations de l'aiguille et par notre aimant cylindrique déjà employé, et dont les pôles sont armés de la même manière, le liquide exciteur étant renouvelé nous avons obtenu les résultats suivants

Numéros des expériences	Étendue de la surface de la pile employée	Nombre des oscillations de l'aiguille par minute
1	1	90
2	2	120
3	3	150
4	4	170
5	5	160
6	6	145

Quoique les forces acquises par les courants dont la puissance croît comme les nombres 1, 2, 3, 4, n'offrent pas dans ces deux tableaux un parfait accord, il n'en résulte pas moins que la puissance des aimants n'augmente pas comme celle des courants, et que par conséquent le développement de cette force a une limite au delà de laquelle elle ne peut être portée, qu'il y a par conséquent une proportion à établir entre la masse du fer à magnétiser, sa surface, sa forme, et la puissance du courant employé à la développer proportion qui doit être soigneusement établie quand on veut user de la force magnétique comme agent en mécanique »

RAPPORTS

PHYSIOLOGIE VÉGÉTALE — *Rapport sur un Mémoire de M Zantedeschi, intitulé De l'influence des rayons solaires transmis par des verres colorés sur la végétation des plantes et la germination des graines*

(Commissaires, MM de Jussieu, Ad Brongniart, Boussingault, Dutrochet rapporteur)

Ce Mémoire, écrit en italien, a été remis à l'Académie le 10 avril 1843 et est daté du 30 novembre 1842 Son auteur est professeur de physique à Venise

Les premières recherches relatives à l'influence qu'exercent sur les plantes les rayons lumineux colorés appartiennent à Senebier et remontent à l'année 1782 (1) Ce physiologiste se servit de grandes bouteilles de verre très-mince, remplies d'eau rouge par le carmin, jaune par le curcuma et le safran, rendue violette par la teinture de tournesol Les plantes et les graines étaient soumises à la lumière transmise par ces bouteilles remplies d'eau colorée ou d'eau pure Les résultats de ses expériences continuées pendant quatre ans furent les suivants

La germination arriva d'abord dans les graines soumises à la lumière jaune et à la lumière violette, ensuite dans les graines soumises à la lumière rouge, et enfin dans les graines tenues dans l'obscurité

• L'allongement des tiges et des racines fut dans l'ordre suivant au plus haut degré dans l'obscurité, cet allongement diminua successivement sous l'influence des lumières jaune, violette et rouge il fut encore moindre sous l'influence de la lumière transmise par les bouteilles remplies d'eau pure il fut au plus faible degré à la lumière libre Cette dernière fut toujours trouvée plus efficace, pour verdifier les plantes, que celle d'un seul des rayons colorés dont elle se compose Les rayons violets furent trouvés avoir plus d'énergie pour prévenir l'étiollement, que les autres rayons de lumière colorée (2)

• Ces expériences ont été faites sur les graines et sur les jeunes plantes de laitue, d'épinards et de haricots

(1) Mémoires physico chimiques Influence des différents rayons qui composent la lumière solaire sur les plantes qu'on y fait végéter

(2) Physiologie végétale, tome IV, page 273

* Carradori, dans un ouvrage publié en 1841 (1), ouvrage cité par M. Zantedeschi, mais que nous n'avons pu nous procurer, confirme les résultats obtenus par Senebier en ceci, que le pouvoir de la lumière, pour colorer en vert les végétaux, est à un degré éminent dans les rayons violets et bleus, bien qu'il y soit plus faible que dans la lumière ordinaire.

Vingt-quatre ans avant la publication de ces dernières observations de Carradori, c'est-à-dire en 1817, le docteur Sebastien Poggioli (2) avait publié un travail fort remarquable sur le même sujet mais, au lieu de soumettre les plantes à la lumière transmise par des verres colorés, il les soumit à l'influence des rayons colorés du spectre solaire. Toutefois, il ne fit usage que des deux rayons extrêmes du spectre, c'est-à-dire des rayons rouges et des rayons violets. Dépouillé d'héliostat, et réduit à déplacer à la main les vases qui contenaient des plantes pour suivre le déplacement du spectre solaire, il ne pouvait, dans cette œuvre d'extrême patience, expérimenter à la fois avec tous les rayons colorés du spectre.

Voici comment il fit ses expériences : deux vases de même grandeur et placés dans des conditions semblables, reçurent un même nombre de graines de *Raphanus rusticus*. Les plantules naissantes prirent accidentellement un développement plus considérable dans un de ces vases que dans l'autre. Les plantules les plus développées furent soumises aux rayons rouges, les plantules les moins développées furent soumises aux rayons violets. Cette exposition des plantules aux deux rayons rouge et violet dura pendant six heures le premier jour, et également pendant six heures dans chacun des trois jours qui suivirent. Dès le troisième jour, les plantules soumises aux rayons violets et qui, au commencement de l'expérience, étaient les plus petites, avaient surpassé en développement celles qui étaient soumises aux rayons rouges, ces dernières, au quatrième jour, parurent étiolées. L'auteur observa que, dans les deux vases, les feuilles cotylédonaire des plantules changeaient de position et dirigeaient leur face supérieure vers le prisme, c'est-à-dire vers la lumière rouge, dans un des vases, et vers la lumière violette dans l'autre vase. Cette direction arriva bien plus tôt chez les plantules soumises aux rayons violets que celles qui étaient soumises aux rayons rouges, elle n'avait pu s'opérer que par le moyen de l'inflexion des pétioles de ces feuilles cotylédonaire, et plus spécialement par l'inflexion des tiges elles

(1) *Della fertilità della terra*

(2) *Opuscoli scientifici*, Bologna, tomo I, p. 9. *Della influenza che ha il raggio magnetico sulla vegetazione delle piante*

memes M Poggiali n'en dit rien, il est vrai, mais cela résulte implicitement et nécessairement du fait qu'il exprime. À ce sujet, je dois dire que, dans des expériences de ce genre, que M Pouillet et moi avons tentées aides de M Silbermann lui-même, et avec l'héliostat inventé par ce dernier, nous avons recherché l'influence qu'exercent les rayons du spectre solaire sur les tiges végétales. Faisant la majeure partie des résultats que nous avons obtenus, je dois ici ne parler que de celui dont MM de Jussieu et Adolphe Brongniart, Commissaires avec moi pour le présent Rapport, ont été rendus témoins. Je veux parler de la flexion des jeunes plantes d'*Alsine media* vers la lumière rouge du spectre solaire. Ce fait est aujourd'hui rendu incontestable. M Poggiali qui expérimentait sur des plantules de *Raphanus rusticus*, a vu que les deux feuilles cotylédonaies qui couronnent ces plantules avaient dirigé leurs faces supérieures vers la lumière violette en premier lieu, et vers la lumière rouge en second lieu. Les deux feuilles opposées qui terminaient nos plantules d'*Alsine media* dirigèrent de même leurs faces supérieures vers la lumière rouge, laquelle seule elles étaient soumises dans l'expérience dont MM de Jussieu et Adolphe Brongniart ont été témoins. Ainsi le phénomène est le même que celui qui a été observé il y a déjà vingt-sept ans par M Poggiali. On parlait de la direction de la face supérieure des feuilles vers le prisme; il leur en devait venir tenu là et aura regardé comme superflu de parler de la flexion de la tige. Flexion qui opérait cette direction. Au reste je ferai observer que cette flexion s'opéra, non pas en deux ou trois jours, comme dans les expériences de M Poggiali sur le *Raphanus rusticus*, mais dans la journée même où l'expérience avait été instituée, et cela par une température de + 18 à 19 degrés C.

M Poggiali a fait des expériences semblables sur des plantules de *Brassica oleracea viridis*. Il estima que l'énergie de l'influence des rayons rouges et celle des rayons violets étaient entre elles dans le rapport de 1 à 3.

M Poggiali ayant soumis des feuilles de capucine et des feuilles de vigne plongées sous l'eau, les unes aux rayons rouges et les autres aux rayons violets, il observa que ces feuilles ne dégagèrent pas la plus petite bulle de gaz oxygène.

Le même expérimentateur a observé que les graines de *Brassica eruca* germent plus promptement sous l'influence des rayons rouges du spectre solaire que sous l'influence des rayons verts, et plus promptement sous l'influence des rayons verts que sous l'influence des rayons violets.

» Nous arrivons actuellement aux expériences de M Zantedeschi, auteur

du Memoire qui est l'objet de ce Rapport Voici l'exposé sommaire de ces experiences

Une caisse de bois fut divisee en sept cases, et chacune de celles-ci fut fermee avec un des verres colores suivants orange, violet, jaune, bleu, vert, noir L'auteur n'avait pu se procurer de verre rouge Un pied de balsamine fut placé dans chacun des cases fermées par les verres orange, jaune, vert, bleu et violet

Sous le verre bleu, la plante s'allongea plus que sous tous les autres verres

Sous le verre vert, il n'y eut aucun allongement sensible, la plante périt le huitieme jour

La plante qui eut le plus de vigueur fut celle qui se trouvait sous le verre violet, mais cependant ses fleurs periront

Les plantes les plus faibles furent celles qui se trouvaient sous les verres orangé, jaune, vert et bleu

Sous les verres violet et vert, les feuilles conserverent leur couleur verte, sous tous les autres verres, elles jaunirent

Sous les verres violet, bleu et vert, les tiges se courberent vers la lumiere, sous les verres orange et jaune, elles resterent droites

Dans d'autres experiences, M Zantedeschi plaça sous le verre vert des pieds d *Olymum viride*, de *Myrthus moscata* et de *Cereus pentalophus* Les deux premieres de ces plantes perdirent leurs feuilles, la troisieme se maintenant longtemps en bon etat et s'allongea beaucoup en se courbant vers la lumiere

M Zantedeschi sema des graines de balsamine dans les cases de son appartement, recouvertes par les differents verres colores Les graines germerent, des le second jour, sous le verre vert elles germerent, le troisieme jour, sous le verre violet, le quatrieme jour, sous les verres jaune et orangé, le cinquieme jour, sous le verre bleu enfin elles ne germerent que le neuvieme jour dans celle des cases qui, n'ayant point de verre, etait à la lumiere et à l'air libres

Sous le verre vert, les feuilles cotyledonaires prirent une teinte verte que n'avaient pas celles qui étaient librement exposees à la lumiere, sous tous les autres verres, ces feuilles devinrent jaunâtres

M Zantedeschi expose ensuite les expériences suivantes qu'il a faites sur des pieds d *Echino-cactus Ottonis*, placés dans les cases fermées par des verres colores, et cette fois il avait pu se procurer un verre rouge pour fermer une de ses cases Dans l'espace de temps qui s'écoula depuis le

26 juin jusqu'à la fin d'octobre, les plantes mises en expérience jeunes encore prirent des développements différents sous les différents verres colorés. Leur accroissement en longueur fut de 2 centimètres sous les verres violet et orange, cet accroissement fut de $1\frac{1}{2}$ centimètre sous les verres jaune et vert ce même accroissement fut de 1 centimètre seulement sous les verres rouge et bleu.

Dans deux autres mesures prises antérieurement, l'une le 19 juillet, et l'autre le 6 août l'ordre de l'accroissement de ces plantes avait été tout à fait différent, en sorte que l'auteur renonce à tirer aucune conclusion de ces expériences.

M Zantedeschi ayant semé des graines d'*Ichino cactus Ottonis* dans chacune des cases de son appareil vit germer ces graines en vingt-quatre jours dans les cases fermées avec les verres violet et bleu et dans la case qui était sans verre, ces graines germerent en vingt-neuf jours dans la case fermée avec un verre vert et en trente jours dans la case fermée avec un verre rouge.

M Zantedeschi plaça des plantules d'*Oxalis multiflora* dans les cases de son appareil elles se comportèrent comme il suit.

Les tiges de cette plante se courbaient vers la lumière sous les verres violet, bleu et vert, elles n'offraient aucune inflexion vers la lumière sous les verres rouge, jaune, orange et noir.

M Zantedeschi tire les conclusions suivantes de ses expériences.

La végétation sous l'influence de la lumière transmise par tous les verres colorés est languissante et malade, ainsi que l'avaient observé Senebier et Caird.

L'ordre observé pour la germination sous les verres colorés est différent de celui qui a été observé par Senebier.

La lumière violette a une puissance peu inférieure à celle de la lumière ordinaire pour verdifier certains végétaux, ainsi que l'avait dit Senebier, la balsamine est dans ce cas, mais cela n'a pas lieu pour l'*Oxalis multiflora*.

Quant à la vigueur de la végétation, elle n'est point plus grande sous le verre violet qu'elle ne l'est sous les verres jaune et rouge, ainsi que l'avait observé Senebier.

La lumière verte est moins favorable à la végétation que la lumière rouge.

La plus grande vigueur de végétation a lieu sous le verre bleu pour l'*Oxalis multiflora*.

M Zantedeschi pense que les anomalies présentées par ces expériences

proviennent de ce que ce n'est pas seulement la lumière qui agit sur les plantes pour favoriser leur végétation, mais aussi d'autres agents à l'influence desquels est soumise d'une manière variable la vitalité des tissus, et ceci suivant la diversité des plantes.

» Vos Commissaires pensent que, malgré l'incertitude des résultats obtenus par M. Zantedeschi on ne doit pas moins lui savoir gré de s'être livré à l'étude des phénomènes qui sont exposés dans son Mémoire phénomènes qui, dans ce moment, attirent de nouveau l'attention des physiciens et des physiologistes.

Nous avons l'honneur de vous proposer de remercier M. Zantedeschi de sa communication, et de l'engager à continuer ses recherches, et cela non plus en employant des verres colorés qui ne sont jamais rigoureusement comparables sous le point de vue de l'intensité de la lumière qu'ils transmettent, mais bien en employant les rayons colorés du spectre solaire.

M. Boussingault absent n'a pu prendre part à ce Rapport.

Les conclusions de ce Rapport sont adoptées.

MEMOIRES LUS

CIMMII — *Mémoire sur une nouvelle série de sels doubles, et sur quelques combinaisons éphémères qui compliquent parfois les essais par voie humide* par **M. J. A. POUHAREDE** (Extrait par l'auteur.)

(Commissaires, MM. Dumas, Pelouze, Regnault.)

Après avoir, dans mon Mémoire, exposé la série de faits et d'idées qui m'ont amené à étudier les nombreuses combinaisons que les sesquioxides et leurs sulfates peuvent former en se combinant avec les protoxydes ou les protosulfates, après avoir mis en évidence l'affinité bien manifeste qui préside à la formation de tous ces composés, j'arrive à l'histoire des sels qui font l'objet principal de mon travail, sels bien définis, à propriétés singulières, et dont la composition me semble toujours devoir être exprimée par la formule générale



Sulfate ferroso ferrique

(Quand on traite un mélange formé de 2 parties de sulfate ferreux et 2 parties de sulfate ferrique, théoriquement neutre, par 5 ou 6 parties d'eau

distillée, on observe, après quinze ou vingt minutes de contact, que le mélange s'échauffe notablement, qu'il aqueit, par exemple, une température de 25 à 30 degrés centigrades au dessus de la température ambiante. On voit, en outre, que les deux sels se dissolvent en entier en donnant une liqueur brune parfaitement claire qui se prend en masse cristalline par une évaporation convenable.

Il y a deux faits remarquables à signaler dans la réaction précédente d'abord l'élévation de température du mélange, ensuite la dissolution de deux sels d'une solubilité limitée en proportion énorme dans une très-petite quantité d'eau. N'est-ce point là tous les caractères d'une véritable combinaison et ne doit-on pas admettre, quoi qu'on ait dit tout récemment sur la constitution des sels doubles, que la force qui préside aux combinaisons, qui l'affinité dont l'intensité semble, en général, être d'autant moindre qu'elle agit sur des corps plus composés, s'exerce encore entre des sels d'un même genre, ou du moins du genre de ceux qui nous occupent? Je crois qu'il sera désormais difficile de conserver des doutes à cet égard.

Quoi qu'il en soit, le nouveau sel, égoutté sur un entonnoir et redissous dans environ son poids d'eau distillée, donne une liqueur claire peu colorée qui, par une évaporation convenable, le laisse de nouveau cristalliser et cette fois dans un état de pureté parfaite.

Ainsi obtenus, ces cristaux se présentent sous la forme de longues aiguilles ou de longs cristaux prismatiques très-fenus, et qui, en raison de cette ténuité, n'ont pu être décrits d'une manière bien rigoureuse, mais qui paraissent du reste, avoir la même forme que le sel de zinc correspondant qu'il a été facile de décrire. Ils ont une couleur verte très-pale, une saveur très-légèrement styptique, avec un arrière goût sucré très-prononcé.

Abandonné au contact de l'air, ce sel finit, à la longue, par se recouvrir d'une couche de sous sulfate de peroxyde. Mais sa tendance à se peroxyder me paraît moindre que celles des protocels de fer.

* Soumis à l'action de la chaleur, il fond facilement, perd son eau de cristallisation, abandonne plus tard l'acide de son persulfate, et donne enfin à une température plus élevée tous les produits de la décomposition du proto-sulfate ordinaire.

Ce sel est soluble en toutes proportions dans l'eau. Avant de donner les caractères de sa dissolution, il importe, je crois, de bien établir sa composition.

Après avoir tenté divers moyens d'analyse, je me suis arrêté au suivant qui me paraît à la fois le plus simple et le plus rigoureux. Ce moyen consiste

et établi la composition du sel par l'augmentation de poids qu'il est susceptible d'acquies par sa transformation en persulfate. Dans ce cas l'augmentation de poids ne porte pas seulement sur l'oxygene fixe sur le protoxyde, mais encore sur la quantité d'acide correspondant, ce qui diminue beaucoup les chances d'erreurs.

Après avoir dosé l'eau d'une manière rigoureuse avec des précautions qui sont indiquées dans mon Mémoire, je n'ai eu ensuite qu'à dissoudre une quantité connue de sel dans l'eau distillée, à traiter la dissolution par un mélange d'acide sulfurique et nitrique, à évaporer, etc., pour avoir toutes les données nécessaires pour établir sa composition.

Je dois ajouter que je ne me suis arrêté à ce moyen d'analyse qu'après m'être assuré qu'entre le point de volatilisation de l'acide sulfurique et celui de la décomposition du persulfate, il y a une distance telle qu'on peut laisser indéfiniment ce sel sur un bain de sable chauffé comme d'habitude, sans qu'il éprouve la moindre décomposition.

Je dois ajouter encore qu'avant de chercher à fixer la formule du sel je me suis assuré comme on le verra par les nombres qui suivent que j'avais bien affaire à un sel normal théoriquement neutre, à un sulfate dont l'oxygene des oxydes est à celui de l'acide comme 1 est à 3.

Après avoir, dans mon Mémoire, décrit les caractères de la dissolution de ce sel je fais successivement l'histoire des sulfates correspondants, *zincico-ferrique*, *cuprico-ferrique*, je signale l'existence de quelques autres sels congeneres et je termine mon Mémoire par les considerations qui suivent.

» Par tout ce qui precede on voit que les divers sels doubles, qui viennent d'être décrits donnent par les réactifs tous les caractères de sels simples à radicaux inconnus et qu'on pourrait vraiment se méprendre sur leur double composition si l'on se bornait seulement à l'emploi de quelques réactifs. Ainsi on a dû remarquer que lorsque on traite leurs dissolutions par les alcalis, on en précipite toujours les deux oxydes formant une combinaison dont les caractères n'ont aucun rapport avec ceux des oxydes qui la constituent. On a dû remarquer encore ce qui n'est pas moins singulier, que les carbonates de potasse et d'ammoniaque déterminent dans ces memes dissolutions des précipités qui se redissolvent toujours dans un excès de réactif. On a dû remarquer enfin, que les deux prussiates, que le chromate de potasse, etc., se comportent avec les dissolutions de ces sels comme avec des dissolutions de sel à un seul radical, que l'oxyde composé se trouve constamment précipité comme un oxyde simple, c'est à dire que le précipité qui prend naissance correspond toujours, par sa composition, au sel double de la dissolution.

Mais puisque nous voyons des oxydes composés présenter les caractères des oxydes simples, ne peut-on supposer, avec quelque raison, que des oxydes que nous croyons simples sont composés et que plusieurs sont, par exemple, dans le cas de l'oxyde noir de fer, qu'on a longtemps considéré comme un protoxyde, dans le cas de l'oxyde de cerium et de l'yttrium que M. Mosander vient de dédoubler? Ces considérations me paraissent dignes de fixer l'attention des chimistes.

Je m'occupe ensuite de certaines combinaisons éphémères, et je suis parvenu à conclure que toutes les fois que l'on traite par un alcali une dissolution de deux oxydes dont l'un est le sesquioxyde de fer, le précipité qui apparaît d'abord dans la dissolution est une combinaison des deux oxydes.

PHYSIOLOGIE EXPERIMENTALE — *Recherches sur les causes de l'albuminurie*
par M. FOURCAULT (Extrait par l'auteur)

(Renvoyé sur la demande de l'auteur à l'examen de la Commission des prix de Médecine et de Chirurgie, fondation Montyon)

Jusqu'à ce jour on n'a considéré l'influence de la suppression de la transpiration cutanée, dans la production des maladies, que d'une manière générale, on n'a point cherché à connaître le mode d'action des divers éléments que la peau cesse d'éliminer, sur l'altération du sang et sur les lésions locales observées dans le cours des inflammations et des fièvres graves. Cependant la doctrine des crises, fondée par Hippocrate prouve que les crises les plus fréquentes et les plus heureuses s'opèrent par la peau.

Dans le but de contribuer à remplir cette lacune de la science, j'ai, d'une part, étudié les causes des maladies sous divers climats, dans des lieux offrant les conditions les plus variées, d'une autre part, j'ai supprimé artificiellement la transpiration cutanée, chez les animaux, au moyen d'enveloppes imperméables. Dans l'un comme dans l'autre cas, on voit se manifester les mêmes phénomènes morbides : une altération du sang, parfois la dissolution de ses éléments organiques, des supersécrétions, des épanchements de diverses natures, des lésions locales, des engorgements vasculaires que l'on retrouve dans les fléaux qui régnent dans les régions intertropicales, comme dans les fièvres graves de nos climats, qui ne sont qu'une dégradation de ces terribles maladies.

La statistique comparée prouve que c'est en agissant sur la peau, dans la généralité des cas, en supprimant primitivement, ou d'une manière secondaire, l'exhalation cutanée, que ces maladies se développent et s'aggravent, la même

méthode établit également que la plupart des affections chroniques résultent de la suppression lente de cette excretion. En ce qui concerne l'albuminurie cette vérité est positivement démontrée par les recherches d'une foule d'observateurs qui ont cependant reconnu l'origine la plus commune de cette altération.

Pour produire l'albuminurie, j'ai employé deux méthodes différentes. J'ai recouvert la peau des animaux vivants d'enduits imperméables, j'ai enlevé cette membrane et j'ai ensuite appliqué les mêmes enduits sur la large plaie résultant de cette opération. Dans ces deux circonstances l'albuminurie s'est développée chez les chiens, plus rarement chez les lapins. Cette altération affecte les anomalies qu'elle présente dans les maladies qui sont le résultat de l'action du froid et de l'humidité sur la peau. Lorsqu'on enlève cette tunique on ne produit point le même phénomène, et les animaux conservent pendant longtemps la même température, tandis que, lorsque les enduits suppriment la transpiration ou le suintement sero-purulent des surfaces que le tégument externe recouvre cette température peut diminuer de 15 à 18 degrés centigrades.

La source la plus commune de l'albuminurie étant connue, il fallait en trouver la cause matérielle. Or, en examinant successivement les effets des éléments de la transpiration sur l'albumine, il était facile de reconnaître que l'acide lactique qui se trouve en excès dans le sang, lorsque l'excretion acide de la peau et des reins est suspendue, est la véritable cause de ce phénomène et des autres altérations chroniques de l'albumine. Parmi ces altérations on trouve l'hydro-albuminurie, les scrofules, les tubercules, le carreau, l'engorgement du tissu cellulaire chez les enfants l'éléphantiasis, la leproie enfin cette maladie des femmes en couches connue sous le nom bizarre de *phlegmasia alba dolens*, etc.

Conclusions

1° La peau n'est qu'un organe excréteur, et les produits de la transpiration ne sont pas formés dans son tissu,

2° Lorsqu'on enlève la peau d'un animal vivant, sa température intérieure reste pendant longtemps au même degré, l'albuminurie n'est pas le résultat de cette opération. Lorsque cette altération existe, elle peut même disparaître dans cette circonstance.

3° La suppression artificielle de l'exhalation cutanée détermine cinq ordres de phénomènes. A une altération profonde du sang, B un grand abaissement de la température. C des supersécrétions et des épanchements de di-

verses natures, D des lésions locales et des engorgements vasculaires, E des altérations de l'urine, enfin l'albuminurie, qui peut être déterminée, quoiqu'un bien plus rarement, par l'affection primitive des reins,

4° L'introduction du lactate de soude dans les veines produit l'albuminurie, en favorisant la formation d'un excès d'acide lactique dans le sang,

5° Lorsque la suppression de la sécrétion acide de la peau s'opère subitement, elle détermine une altération profonde des éléments organiques du sang : cette altération s'observe dans le choléra asiatique, dans la peste, la fièvre jaune et dans quelques maladies graves de nos climats,

6° Lorsque cette suppression s'opère lentement, on voit se développer une foule de maladies chroniques, parmi lesquelles on compte l'albuminurie et les autres altérations déjà indiquées de l'albumine

MÉCANIQUE APPLIQUÉE — *Note sur un appareil qui permet de sonder en mer pendant la marche d'un navire, par M. LAIGNEL*

(Commissaires, MM. Duhamel, Despretz)

On sait que lorsqu'un navire marche avec vitesse, si l'on jette la sonde à la mer, le plomb au bout de quelques instants, cesse de descendre, et remonte même un peu vers la surface, la *ligne* à laquelle il est attaché prenant une position qui s'approche d'autant plus de l'horizontale que le mouvement de translation du navire est plus rapide. C'est un moyen de faire descendre l'extrémité libre de cette ligne qu'a cherché M. Laignel, et l'appareil qu'il a imaginé à cet effet repose sur le même principe qui fait monter un cerf-volant, c'est, en quelque sorte, l'inverse du cas dans lequel, étant en repos, l'enfant qui tient l'extrémité libre de la cordelette court en avant avec une vitesse suffisante. Le disque en papier du cerf-volant est ici remplacé par une planchette en bois léger plus longue que large, et qui est fixée obliquement à l'extrémité libre de la *ligne* par quatre cordelettes de longueur convenable, la résistance de l'eau fait enfoncer la planchette qui décrit une portion de cercle et finit par prendre une position constante relativement à la direction de la verticale au point d'attache. Elle se trouve ainsi à l'extrémité inférieure d'un triangle rectangle dont on connaît les angles et dont on connaît aussi l'hypoténuse, qui est la corde de la courbe formée par la ligne de sonde. Si donc on lache suffisamment de *ligne* pour que le bord inférieur de la planchette drague le fond, on sait quelle est la distance de ce fond à la surface de l'eau. Au moyen d'une modification apportée à l'appareil, on peut,

au lieu de sonder dans la ligne de sillage du navire, sondez sur une ligne parallèle à celle-ci

MEMOIRES PRESENTES

PHOTOGRAPHIE — *Addition à une précédente Note concernant l'application des procédés daguerriens à la photographie, par MM H FIZEAU et L FOUCAULT*

(Commission précédemment nommée)

Nous avons observé dans le cours de ce travail, quelques faits intéressants que nous allons rapporter

1° *Images solaires* — Le diamètre de l'image solaire avec la distance focale dont nous disposions (1^m,413) avait seulement 13 millimètres de diamètre et cependant, vers la fin d'août, nous avons eu, d'une manière très distincte l'image d'une tache assez grande qui traversait, à cette époque le disque solaire. Nous ne doutons pas qu'à l'aide d'appareils optiques convenables on obtienne ainsi des dessins précieux de certaines taches remarquables par leur forme et leur étendue

Un autre fait est constamment présenté à nous, c'est un faible décroissement dans l'intensité des images du centre à la conférence, mais surtout près des bords. Ce fait touchant à l'importante question des intensités relatives des bords et du centre du Soleil, nous nous proposons de répéter nos expériences à ce point de vue nous comprenons en effet que cette simple remarque, faite incidemment dans nos recherches, n'a pas une valeur proportionnée à l'importance de la question

2° *Arcs lumineux de la pile* — La lumière d'un bien poivre qui se produit entre les charbons possède une intensité chimique égale à un tiers environ de celle que possède la lumière émise par le pôle positif

La formation de l'arc lumineux entre quelques métaux nous a présenté les résultats suivants avec 80 couples

Tous les métaux que nous avons employés comme pôles, ont produit des arcs de couleurs et d'intensités variables le *platine forge* comme les autres métaux, nous devons dire que M de la Rive a observé le contraire avec ce corps

Des particularités intéressantes se présentent lorsqu'un des pôles est terminée par du charbon, et l'autre par un métal. Le pôle positif étant de l'argent et le négatif du charbon, l'arc se forme facilement, bientôt l'argent fond et

distille abondamment, dès lors on peut éloigner davantage le charbon négatif sans rompre l'arc lumineux, qui est d'une fixité et d'une beauté remarquables. Si l'on intervertit les pôles, le phénomène n'est plus le même. Dans les premiers instants l'arc se forme comme précédemment du charbon positif à l'argent négatif, mais lorsque l'argent est entré en fusion l'arc se brise. Si l'on cherche à le rétablir, on éprouve beaucoup de difficultés, lorsqu'on y parvient pendant quelques instants, la partie de l'arc qui touche au globule d'argent s'agit avec un bruit particulier.

Le platine et le charbon présentent un phénomène analogue, mais à un degré beaucoup moins marqué.

Ce fait nous semble devoir être rattaché aux phénomènes de transport du pôle + au pôle —, étudiés avec tant de soin par M. de la Rive. Pour l'argent qui, comme l'on sait, absorbe de l'oxygène lorsqu'il est en fusion, la rupture de l'arc pourrait être attribuée à la combustion du charbon transporté au contact même de l'argent, la décomposition singulière dont nous avons parlé appuierait cette manière de voir.

3° L'explication que donna Davy de la nature des flammes éclairantes nous a conduits à essayer de fermer le circuit d'une pile de 40 couples par la flamme d'une bougie, on observe alors les faits suivants : un faible courant s'établit, mais sans lumière, et l'on voit peu à peu le pôle négatif se couvrir d'un charbon très-léger qui se dépose sous forme d'arborisations.

Avec une pile de 80 couples le charbon se dépose de plus sur le pôle positif avec les mêmes apparences, mais en moindre quantité que sur le pôle négatif.

4° Un phénomène particulier de lumière se présente lorsque l'on décompose l'eau avec des fils métalliques assez fins et une pile de 80 couples, les fils s'échauffent sans rougir, s'ils sont d'un diamètre suffisant, mais les gaz qui les enveloppent sont alors lumineux, leur dégagement étant accompagné d'un bruit particulier. Le phénomène est le plus marqué au pôle négatif : on remarque que tant que les gaz sont ainsi lumineux, l'intensité du courant est beaucoup diminuée. Ce fait doit-il être rattaché aux phénomènes des arcs lumineux ? aurait-on ainsi, au pôle négatif, un arc formé par l'hydrogène ?

5° Nous terminerons en appelant l'attention sur une modification remarquable éprouvée par le charbon lorsqu'il a supporté la très-haute température qui se développe pendant l'incandescence des pôles de la pile.

Le charbon très-dense qui provient de la distillation de la houille, et que nous avons employé, a des caractères physiques qui le rapprochent de l'es-

pece minérale appelée *anthracite*, en examinant, après les expériences d'incandescence, le charbon transporté au pôle négatif et l'extrémité du pôle positif lui-même, nous avons remarqué que ses caractères physiques sont alors changés

Ce charbon est mou, traçant, sa surface, étant frottée, devient d'un gris plombé métallique. Ces caractères l'assimilent complètement à l'espèce minérale appelée *graphite*, cette modification se fait très rapidement, et s'obtient également avec d'autres espèces de charbons conducteurs. Il suffit de promener l'arc lumineux sur la surface d'un des pôles de charbon pour que cette surface soit à l'instant revêtue d'une couche de graphite.

Cette formation de graphite, sous l'influence d'une température très élevée, nous semble devoir jouer un rôle important dans l'étude des masses minérales où se rencontre si fréquemment cette variété de charbon.

MÉCANIQUE APPLIQUÉE — *Note sur divers perfectionnements dans les machines à vapeur, les chaudières, les foyers, etc.*, par M. SONKE (Extrait par l'auteur)

(Renvoi à la Commission précédemment nommée)

J'ai l'honneur de présenter à l'Académie des Sciences, et de soumettre à son jugement plusieurs appareils de mon invention, applicables aux foyers, chaudières et machines à vapeur.

1° Un mécanisme que je nomme *degage grille*, qui s'adapte au-dessous de la grille du foyer pour la nettoyer et faciliter le passage de l'eau à travers le combustible,

2° Un appareil pour vaporiser l'eau entraînée avec la vapeur,

3° Un nouveau générateur tubulaire à foyer intérieur, facile à nettoyer et d'une construction très simple,

4° Des appareils destinés à prévenir les explosions des chaudières à vapeur.

5° Un mécanisme pour régler et modérer la vitesse des machines malgré les variations de la pression de la vapeur et celles de la résistance.

Je mets sous les yeux de l'Académie la plupart de ces appareils. Ils ont tous reçu la sanction de l'expérience, j'appelle particulièrement l'attention de l'Académie

sur 1° Sur le mécanisme destiné à activer la combustion. Au moyen de ce dispositif, on peut doubler la production de vapeur d'un générateur, ce qui

sera un immense avantage pour la navigation à vapeur (1) et pour la locomotion sur les chemins de fer. Le dégage grille, appliqué aux locomotives, non-seulement permettra de diminuer considérablement le poids et le volume de ces dernières et celui de l'eau et du combustible que l'on est forcé de traîner avec soi, mais il permettra encore de supprimer ou d'agrandir le tuyau d'échappement de vapeur, qui absorbe une quantité de force évaluée, en moyenne, à 15 chevaux.

2° J'appelle également l'attention de l'Académie sur mon appareil pour vaporiser l'eau qui est entraînée dans les cylindres, et celle qui s'y forme par la condensation de la vapeur. Cet appareil donne le résultat indiqué ci-dessus, en opérant, dans certaines proportions, le mélange de la vapeur sursaturée avec de la vapeur surchauffée. L'application de cet appareil produit une économie de combustible de 25 pour 100 environ.

3° Sur mon modérateur-régulateur de vitesse qui est construit tout en métal, sans exiger de soufflet, qui n'absorbe pas, comme d'autres régulateurs, une partie notable de la force du moteur.

4° Sur mes nouveaux appareils destinés à prévenir les explosions des chaudières à vapeur : ces appareils forment le complément de ceux que j'ai successivement présentés à l'Académie en 1837 et les années suivantes, notamment le 8 mai 1843. Je dois inutile de rappeler ici que c'est moi qui ai le premier appliqué le sifflet des locomotives pour donner l'éveil lorsque le niveau de l'eau descend trop bas dans la chaudière, une Commission de l'Académie, composée de MM. Arago, Dulong, d'Arcet et Séguier, se rendit, le 30 novembre 1837, chez M. Bourdon, pour examiner un indicateur de niveau, avec sifflet de locomotives inventé par moi. »

PHYSIQUE ANALYTIQUE — *Memoire sur les mouvements infiniment petits d'un système de spheroides sollicités par des forces d'attraction ou de repulsion mutuelle*, par M. LAURENT.

(Commissaires, MM. Cauchy, Binet.)

ANALYSE MATHÉMATIQUE — *Aperçu de quelques propriétés des segments déterminés par les lignes et surfaces algébriques sur les groupes de cordes ou secantes menées symétriquement par un même point*, par M. BERTON, de Champ.

(Commissaires, MM. Poncelet, Sturm, Lamé.)

(1) M. le Ministre de la Marine, après avoir fait examiner mon mécanisme, a commandé des applications de ce dispositif dans plusieurs arsenaux de l'État.

PHYSIQUE — *Sur la theorie elementaire du calorique*, par M MAIZIERE
(Commissaires, MM Babinet, Duhamel)

MECANIQUE APPLIQUEE — *Memoire sur un moyen simple et economique
d'obtenir, pour les lampes, un niveau constant*, par M SAUZAY
(Commissaires, MM Pouillet, Babinet, Séguier)

MECANIQUE APPLIQUEE — *Note sur un niveau a bulle d'air et a lunette*,
par M BODIN
(Commissaires, MM Mathieu, Pouillet, Laugier)

PHYSIQUE CENTRALE — *Des phenomenes de mouvement, de repos et d'equi-
libre consideres dans le monde reel et dans leurs rapports avec les
regles de la statique*, par MM FLAHAUT et NOISATTE

(Renvoi a la Commission déjà nommée pour de précédentes communications
des memes auteurs sur diverses questions de physique generale)

M SERRES presente au nom de l'auteur, M le docteur *Sturmer*, une Note
sur le mode de transmission de la peste
(Renvoi a la Commission des quarantaines)

Sur la demande de MM VALLER et BARRESWILL, on ouvre un paquet cache-
déposé par eux dans la seance du 11 mars dernier. Ce paquet se trouve
contenir une Note sur la *substitution de la poudre d'Algaroth a la ceruse
dans la peinture a l'huile*

Cette Note est renvoyée a l'examen d'une Commission composée de
MM d'Arcet, Chevreul et Dumas

M AUTIER adresse de nouveaux échantillons de *charpie* fabriquée, par des
procédés économiques, avec des substances textiles qui n'ont pas été précé-
demment soumises au tissage

(Renvoi a la Commission déjà nommée)

CORRESPONDANCE

M ARAGO présente, au nom de l'auteur M *Hommaire de Hell*, les pre-
mieres livraisons d'un ouvrage ayant pour titre *Les steppes de la mer Cas-*

pienne, le Caucase et la Russie méridionale, voyage pittoresque, historique et scientifique (Voir au *Bulletin bibliographique*)

PHYSIQUE MATHÉMATIQUE — *Sur la nature des forces répulsives entre les molécules* (Extrait d'une Lettre de M LAURENT à M Arago)

« L'élasticité des corps doit être attribuée à l'action de deux forces auxquelles leurs molécules sont soumises l'une, attractive, que l'on désigne sous le nom d'*attraction moléculaire*, l'autre, répulsive, provenant du calorique. Tel est le principe, exigé pour ainsi dire en axiome, que l'on trouve en tête de tous les Traités de Physique, et qui, quoique adopté sans réserve par Poisson dans ses Mémoires, mérite cependant un examen approfondi. L'action répulsive du calorique est effectivement bien constatée, et il ne peut exister aucun doute à cet égard. Mais cette action est-elle la seule force répulsive à laquelle les molécules des corps sont soumises? C'est ce qu'il serait très-intéressant de déterminer. En effet, tous les corps de la nature contiennent des fluides impondérables que l'on admet généralement être autres que le calorique. Dans la théorie de l'élasticité, on suppose ces fluides à l'état neutre et on néglige leur action non-seulement dans l'état d'équilibre, mais encore dans les mouvements moléculaires. Or, il est à remarquer que l'épithète de *neutre*, appliquée par exemple à l'*électricité*, indique seulement l'absence des circonstances nécessaires à la production de certains phénomènes, mais qu'il n'est pas démontré que l'électricité latente, ou insensible au galvanomètre, reste sans action dans les phénomènes de l'élasticité. Au contraire, les expériences de M Becquerel porteraient à admettre l'existence d'une relation entre l'électricité latente ou naturelle et l'élasticité des corps, puisqu'il en résulte que les circonstances qui modifient cette élasticité, telles que la *pression*, la *torsion*, la *flexion*, etc., sont généralement accompagnées de phénomènes électriques, ou de développements d'électricité sensible au galvanomètre. Il n'est donc pas probable que le rôle de l'électricité naturelle soit purement positif. Je ne cite, du reste, cette conjecture que comme un exemple de nature à motiver les considérations que je vais développer.

J'ai pensé que si, outre la force répulsive du calorique, les molécules sont soumises, au moins dans certains corps, à des forces répulsives indépendantes de cet agent, leur existence doit se manifester principalement dans les anomalies que présentent ces corps soumis à l'action de la chaleur, et, à cet égard, le phénomène si remarquable du maximum de densité de l'eau a particulièrement fixé mon attention. Voici un aperçu du résultat au-

quel on semble conduit soient

m, m' les masses de deux molécules d'eau,
 c, c' leurs quantités de calorique,
 r leur distance,

et considérons l'action exercée par m' sur m , laquelle est égale et contraire à la réaction de m sur m' . Admettons pour un moment que cette action soit la résultante de l'*attraction moléculaire* et de la *force repulsive du calorique*. Comme il s'agit ici de deux molécules d'un liquide, elle se réduira à une force unique dirigée suivant la droite m, m' et son intensité sera une fonction de r que nous représenterons par R . En même temps la répulsion mutuelle des deux molécules sera proportionnelle au produit de c et c' , et leur attraction au produit de m et m' . En considérant la force R comme positive ou négative selon qu'elle tendra à augmenter ou à diminuer la distance R , sa valeur sera l'excès de la répulsion sur l'attraction, et si l'on suppose, avec Poisson (voir le xx^e cahier du *Journal de l'École Polytechnique*, pages 6 et 90), que l'attraction de la matière et du calorique qui retient celui-ci dans chaque molécule, s'étend au dehors, il faudra retrancher de cet excès l'attraction du calorique de m sur la matière de m et celle de la matière de m sur le calorique de m , lesquelles forces seront proportionnelles, la première au produit mc' , et la seconde au produit $m'c$. De cette manière, la valeur complète de R sera

$$(1) \quad R = cc'f(r) - (mc' + m'c)\psi(r) - mm'\varphi(r),$$

$f(r)$, $\psi(r)$, $\varphi(r)$ désignant des fonctions de la distance r dont toutes les valeurs sont positives, puisque, ainsi que le remarque Poisson dans un de ses Mémoires, il est très-probable qu'il n'existe pas dans la nature de force qui change de signe lorsqu'on fait varier la distance. Cela posé, si les deux molécules que nous considérons sont en équilibre, leur distance r devra satisfaire à l'équation

$$(2) \quad R = 0$$

qui servirait à déterminer sa valeur en fonction de c et c' , si les formes des fonctions $f(r)$, $\psi(r)$, $\varphi(r)$ étaient connues. Si donc, on fait varier les quantités de chaleur c et c' des molécules, leur distance d'équilibre variera aussi en général. Cherchons s'il peut exister une valeur déterminée de r , correspondant à des valeurs déterminées de c et c' , qui soit un maximum ou un

minimum ces valeurs de r , c et c devront satisfaire aux équations

$$(3) \quad \frac{dr}{dc} = - \frac{\frac{dR}{dc}}{\frac{dR}{dr}} \quad \frac{dr}{dc} = - \frac{\frac{dR}{dc}}{\frac{dR}{dr}}$$

qui jointes à l'équation (2) serviront à les déterminer. On satisfait à ces équations soit en posant

$$(4) \quad \frac{dR}{dr} = \pm \infty$$

soit en faisant

$$(5) \quad \begin{cases} \frac{dR}{dc} = c f(r) - m' \psi(r) = 0 \\ \frac{dR}{dr} = c f(r) - m \psi(r) = 0 \end{cases}$$

L'équation (4) suppose que l'une des quantités c , $\psi(r)$, ou l'une des dérivées $f(r)$, $\psi(r)$, $\varphi(r)$ est infinie, et il est à remarquer que dans l'une et l'autre hypothèse, les trois quantités r , c , $\psi(r)$ ne seraient assujetties à vérifier que deux équations, l'équation (2) et l'équation (4). L'une de ces quantités resterait donc indéterminée. Dans le cas ce cas n'est pas celui qui nous occupe. Il reste donc à examiner les conséquences des équations (5). Si l'on élimine c et c entre ces équations et l'équation (2), on trouve que la valeur maximum ou minimum de r devra satisfaire à l'équation

$$(6) \quad \frac{\psi(r)^2}{f(r)} + \varphi(r) = 0$$

Dans l'hypothèse que j'ai admise comme très-probable, qu'il n'existe pas dans la nature de force qui change de signe, les fonctions $f(r)$, $\psi(r)$, $\varphi(r)$ n'ayant que des valeurs positives, il est impossible de vérifier cette équation autrement que par des valeurs indéterminées de r suffisamment grandes pour que les valeurs correspondantes de $f(r)$, $\varphi(r)$ et $\psi(r)$ soient insensibles. Ainsi donc, en supposant les deux molécules soumises aux seules forces *l'attraction moléculaire* et la *force répulsive du calorique*, telle que Poisson l'envisage, il n'existera pas de valeurs déterminées de c et c pour lesquelles la distance r soit un maximum ou un minimum. Si, au contraire, on admet l'existence de forces autres que celles que nous venons de spéci-

fier, en designant leur résultante par $\varpi(r)$, la valeur de R deviendra

$$(7) \quad R = cc'f(r) + \varpi(r) - (mc' + m'c)\psi(r) - mm'\varphi(r),$$

et si l'on suppose que $\varpi(r)$ soit indépendant de c et c' , on trouvera que la valeur maximum ou minimum de r devra satisfaire non plus à l'équation (6), mais à la suivante

$$(8) \quad \varpi(r) - mm' \left[\varphi(r) + \frac{\psi(r)^2}{f(r)} \right] = 0,$$

qui suppose que la fonction $\varpi(r)$ peut prendre des valeurs positives, c'est-à-dire qu'au nombre des forces nouvelles, dont cette fonction représente la résultante, il s'en trouve de repulsives.

Actuellement, au lieu de deux molécules, considérons une file rectiligne de trois molécules M, M', M , auxquelles, pour simplifier, nous supposons la même masse m , pour ce motif, nous admettons aussi que les molécules extrêmes M et M ont la même quantité de calorique que nous représenterions par c , tandis que celle de la molécule intermédiaire M' sera désignée par c' . Par suite de ces hypothèses, la symétrie exige que la distance des molécules M, M' soit égale à celle des molécules M', M . En la représentant par r , sa valeur déterminée par l'équation d'équilibre

$$(9) \quad cc'f(r) + c^2f(2r) - mc[\psi(r) + 2\psi(2r)] - mc'\psi(r) - m^2[\varphi(r) + \varphi(2r)] = 0$$

sera en général une fonction de c et c' , et sa valeur, maximum ou minimum sera déterminée en joignant à cette équation les deux suivantes

$$(10) \quad c'f(r) + 2cf(2r) - m[\psi(r) + 2\psi(2r)] = 0, \quad cf(r) - m\psi(r) = 0,$$

d'où l'on tire

$$(11) \quad \begin{cases} c = m \frac{\psi(r)}{f(r)}, \\ c' = m \left[\frac{\psi(r) + 2\psi(2r)}{f(r)} - 2 \frac{f(2r)\psi(r)}{f(r)^2} \right], \end{cases}$$

substituant ces valeurs dans l'équation (9), on trouvera

$$(12) \quad \frac{\psi(r) + 2\psi(2r)}{f(r)} = \frac{f(2r)\psi(r)}{f(r)^2} - \frac{\varphi(r) + \varphi(2r)}{\psi(r)}$$

Des lors la valeur précédente de c' deviendra

$$(13) \quad c' = -m \left[\frac{f(2r)\psi(r)}{f(r)^2} + \frac{\varphi(r) + \varphi(2r)}{\psi(r)} \right]$$

Si donc les fonctions indiquées par les caractéristiques f , φ et ψ , n'ont que des valeurs positives, c' sera négatif, c'est-à-dire que le calorique de la molécule M attire celui des molécules M , M' , M'' , tandis que son action sur la matière de celles-ci est repulsive. Dans les mêmes circonstances, la valeur de c déterminée par la première des équations (11) étant positive, le calorique de la molécule M agit par repulsion sur le calorique de la molécule M' , en attirant la matière de celle-ci. Si l'on admet que l'action du calorique ne peut être ainsi tantôt attractive, tantôt répulsive, on arrivera à cette conséquence, qu'en supposant les molécules M , M' , M'' soumises aux seules forces spécifiques par Poisson, l'*attraction moléculaire* et la *force repulsive du calorique*, leur distance d'équilibre n'est susceptible d'aucun maximum ou minimum déterminé.

Dans le cas, au contraire, où ces molécules seraient soumises à d'autres forces indépendantes du calorique, en désignant leur résultante par $\varpi(r)$ pour deux molécules à la distance r , l'équation (13) sera remplacée par la suivante,

$$(14) \quad c = \frac{\varpi(r) + \varpi(2r)}{m\psi(r)} - m \left[\frac{f(2r)\psi(r)}{f(r)^2} + \frac{\varphi(r) + \varphi(2r)}{\psi(r)} \right],$$

qui suppose, comme l'équation (8), qu'au nombre des forces nouvelles il s'en trouve de repulsives.

On arrive à la même conclusion par des calculs analogues, mais plus compliqués, si, au lieu de trois molécules, on considère successivement des files rectilignes de quatre, cinq, molécules, et que l'on cherche les conditions nécessaires pour que la longueur totale de chaque file soit susceptible d'un maximum ou d'un minimum déterminé.

En définitive, on arrive à cette conclusion : si le phénomène du maximum de densité de l'eau persiste dans une file isolée de molécules de ce liquide, il faut nécessairement admettre que celles-ci sont soumises à des forces repulsives autres que celle provenant du calorique.

Sans accorder plus d'intérêt à ce résultat qu'il ne le mérite, il me semble cependant qu'il doit être remarqué.

MINÉRALOGIE — Notice sur la présence de l'axinite dans une roche fossilifère des Vosges, par M. A. DAUBREE

Jusqu'à présent l'axinite n'a été observée au moins à ma connaissance dans aucune roche fossilifère, aussi n'est-il peut-être pas sans intérêt de faire connaître avec quelques détails les circonstances de gisement dans lesquelles j'ai récemment rencontré cette substance à Rothau, dans les Vosges, d'autant plus que l'on y trouve un nouvel exemple de la manière dont les roches ignées ont pu altérer les terrains stratifiés, non-seulement par leur chaleur, mais aussi en y introduisant de nouveaux éléments.

Près du village de Rothau dans la vallée de la Bruche, le terrain de transition est traversé par une roche noirâtre à grain très fin dans laquelle l'amphibole se présente çà et là en petits cristaux. Cette roche, à laquelle on peut provisoirement conserver le nom de trapp, constitue une colline nommée le petit Donon de Rothau.

Le terrain de transition consiste principalement ici en une roche pélosiliceuse très-dure non fissile, à peu de distance de son contact avec la roche ignée, elle renferme de nombreuses empreintes organiques qui appartiennent particulièrement au *Calomopora spongites* (Goldfuss) et à des *Filustres*. Dans les parties où sont accumulés ces restes de madréporiens on trouve des noyaux du calcaire lamellaire c'est précisément dans les mêmes points qui paraissent l'épidote, l'amphibole et le quartz, qui sont aussi à l'état cristallin. Cette association peut faire croire que le carbonate de chaux de cette roche est d'origine madréporique et, de plus, que l'épidote et l'amphibole se sont formés aux dépens de ce calcaire et seulement là où il en existait. Il est remarquable que la roche silicatée renferme différentes formes organiques parfaitement conservées, ainsi il existe des empreintes de *Calomopora spongites* tout à fait nettes, qui sont entourées d'un mélange d'épidote, d'amphibole, de quartz et de calcaire lamellaire il paraît donc que la cristallisation du quartz de ces silicates et du calcaire s'est faite sans qu'il y ait eu fusion dans la masse.

À côté de ces vestiges animaux, il existe d'autres cavités de forme peu distincte qui sont tapissées de cristaux brillants d'amphibole aciculaire, d'épidote et de quartz, d'après leur ressemblance de dimension avec les premières on peut croire que celles-ci sont aussi des empreintes madréporiques, dont la cristallisation a plus ou moins altéré les contours.

C'est dans l'une de ces dernières cavités que se présentent de petits cristaux d'axinite qui possèdent les faces nommées *l* et *s* par Haüy.

Les reactions caractéristiques de cette substance ne laissent d'ailleurs pas de doute sur sa nature, au chalumeau elle fond avec boursoufflement en un email noirâtre et avec un mélange de spath fluor et de sulfate acide de potasse elle colore aussitôt la flamme en un vert intense.

Le même minéral se trouve encore en masses cristallines et mélange aux quatre autres substances qui ont été signalées plus haut.

Si la tourmaline n'était tirée dans le massif granitique voisin qui est le groupe montagneux du *Champ du Feu* il serait possible que les débris de ce dernier minéral eussent été disséminés mécaniquement dans les schistes lors de leur sédimentation et qui par l'influence de la chaleur il eût produit de l'axinite à l'aide d'éléments préexistants dans la roche comme il est fréquemment arrivé par exemple pour l'épidote l'amphibole ou le grenat. Mais ce n'est pas le cas ici il est beaucoup plus probable que l'acide borique n'a été apporté dans les couches de transition qu'à la suite de la précipitation de la roche trappenne.

Les mines métallifères du sud-est de la Norvège (1), situées au contact même du terrain de transition et des roches amphiboliques ou du granite renferment aussi quelquefois parmi leurs gangues de l'axinite qui y a été fournie en même temps que les combinaisons métallifères, probablement par un procédé analogue à celui auquel l'axinite de Rethra doit son origine. Il en est peut-être de même du schiste stannifère de Bottalack en Cornouailles (2) qui contient outre l'oxyde d'étain de la tourmaline de l'axinite du grenat et de l'amphibole.

L'arrivée de l'acide borique qui a concouru à la formation de l'axinite à Rethra et dans les amas des environs de Christiania n'est sans doute pas sans analogie avec les émanations d'acide borique qui, en Toscane jaillissent abondamment aux environs de Serpentina ou celles qui se dégagent du cratère de Vulcano, dans les îles Lipari.

CHIMIE — *Note sur la décomposition de l'éther hydriodique par la chaleur,*
par M. E. ROFF

M. Gay-Lussac en étudiant les réactions de l'éther hydriodique avait déjà remarqué que ce liquide en traversant un tube chauffé au rouge

(1) Mémoire sur les dépôts métallifères de la Suède et de la Norvège (*Annales des Mines* 4^e série, tome III).

(2) DUFRENOY et ELIE DE BEAUMONT, *Voyage métallurgique en Angleterre* 2^e édit. tome II page 196.

obscur, donnait naissance à une matière solide, plus pesante que l'eau et indecomposable par les alcalis caustiques. Tous les dérivés de l'alcool présentent une assez grande importance dans la science, et la nature de ce composé n'y a pas été déterminée, j'ai pensé qu'il ne serait pas sans intérêt de compléter nos connaissances à cet égard. Quant à la préparation de l'éther hydriodique ($C^4H^{10}I^2$), le procédé qui en fournit le plus consiste à dissoudre de l'iode dans l'alcool à 85 pour 100, d'y ajouter du phosphore, jusqu'à ce que la couleur ait disparu, d'y introduire une nouvelle quantité d'iode, puis du phosphore, en ayant soin de refroidir la liqueur pour éviter une trop grande élévation de température. On continue ainsi jusqu'à ce qu'il y ait dégagement de gaz phosphure hydrique (P^2H^4) non inflammable spontanément. En distillant, on obtient presque toute la quantité d'éther indiquée par la théorie. Le résidu est formé d'un liquide très acide (contenant de l'acide phosphorique, de l'acide phosphovinique et un peu d'acide hydriodique) et d'un résidu solide, pulvérulent d'une couleur rouge foncé.

Ce corps bien lavé est insipide, inodore, n'attire que faiblement l'oxygène de l'air et n'est autre chose que du phosphore dans sa modification rouge. On peut le dessécher au bain-marie sans qu'il s'oxyde sensiblement, mais il est difficile d'en chasser les dernières traces d'humidité. Distillé, il bouillit d'abord et se transforme en phosphore ordinaire, qui se condense. En même temps il se dégage un peu de gaz phosphure hydrique, et il reste un léger résidu d'acide phosphorique fondu et incolore, dont la quantité, variable dans différents essais, n'excédait par 7 pour 100 de la matière employée. L'éther hydriodique, en passant à travers un long tube de verre assez étroit et chauffé au rouge sombre, se décompose en majeure partie, des gaz inflammables, et brûlant avec une flamme brillante se dégagent, et dans un récipient refroidi se condense une matière solide, cristalline et colorée en rouge-brun par l'iode. Les gaz, analysés par le chlore, donneront pour résidu du gaz carbone bihydrique CH^2 , et de l'hydrogène dans le rapport de 2 volumes du premier à 1 volume du second.

Pour purifier la matière solide, on la traite par une solution bouillante de potasse caustique, l'excès d'iode est enlevé, et le nouveau produit se précipite au fond de la liqueur, sous forme d'une huile jaunâtre, pesante, qui se solidifie par le refroidissement. On décante le liquide, et en dissolvant la masse desséchée dans de l'alcool bouillant, on obtient par le refroidissement une très belle cristallisation en aiguilles longues, flexibles, légèrement jaunâtres et très-brillantes. Exprimées fortement entre des feuilles

de papier, et exposées pendant quelque temps à l'air, elles deviennent entièrement blanches, et présentent la matière à l'état de pureté

La densité = 2,07, mais il est difficile de l'obtenir exactement, puisque des morceaux fondus contiennent toujours des cavités. Chauffée, elle fond à 70 degrés centigrades en un liquide jaunâtre qui refroidi, se prend en masse cristalline, à une température de 84 degrés, elle commence déjà à se décomposer, et prend une teinte rougeâtre de plus en plus foncée, due à l'iode mis en liberté. Chauffée plus fortement elle entre en ébullition et se volatilise en se décomposant en partie des vapeurs abondantes d'iode apparaissent et il se dégage des gaz inflammables, le produit sublimé brun traité par la potasse et par l'alcool, reproduit des cristaux primitifs.

La matière est très soluble dans l'alcool et l'éther à chaud mais assez peu à froid ce qui permet d'en obtenir de belles cristallisations. Elle est insoluble dans l'eau et ni les acides ni les alcalis étendus ne l'altèrent sensiblement.

L'acide nitrique concentré dégage sur-le-champ des vapeurs nitreuses et met l'iode en liberté.

L'acide sulfurique concentré ne l'attaque qu'à l'aide d'une élévation de température.

Pour déterminer l'iode, on introduit la matière fondue au fond d'un tube long et très-étroit, et on le fait passer en vapeur sur la tournure de fer chauffée au rouge. Il se forme de l'iodure ferreux, qu'on décompose à chaud par une solution de soude caustique exempte de chlorures, en introduisant la tournure de fer et les fragments du tube lui-même dans la liqueur alcaline. Après avoir filtré et lavé le précipité d'oxyde ferreux la solution neutralisée par l'acide nitrique, fut précipitée par le nitrate d'argent.

I 0^{gr},850 de matière donnèrent 1^{gr},416 l'Ag = 0,76277 d'iode,

II 0^{gr},680 de matière donnèrent 1^{gr},130 l'Ag = 0,60871 d'iode,

III 1 gramme brulé par l'oxyde de cuivre a donné 0^{gr},140 d'eau et 0^{gr},306 d'acide carbonique

Calcul			Expérience		
			I	II	III
I	786,145	90,02	89,70	89,64	
C	75,000	8,43			8,40
H ²	12,500	1,55			1,57
	<u>876,645</u>	<u>100,00</u>			

La matière est donc l'iodure élayique (C²H⁴I²) ou l'hydriodate d'iodure

d'aldehyde $C^4H^3I^2 + H^3I^2$), déjà si bien étudiée par M. Regnault, sa composition et ses propriétés démontrent leur identité.

Des essais tentés dans le but d'obtenir le cyanure éthylique ($C^2H^4Cy^2$) donnaient des résultats négatifs.

En chauffant un mélange d'iodure éthylique et de cyanure de mercure, on obtient de l'iodure de mercure (I^2Hg), de l'iodure de cyanogène et des gaz inflammables.

En dissolvant dans l'alcool les deux sels, on obtient un sel double, cristallisable en belles aiguilles blanches, fusibles, et qui supportent une température supérieure à 80 degrés sans se décomposer. Les produits de sa décomposition tendent à prouver qu'il est formé de $C^4H^3I^4 + HgCy^2$, car par une température élevée, il se décompose en iodure de mercure, iodure de cyanogène, un léger dépôt de charbon et de gaz carbure bihydrique.

En chauffant $C^4H^3I^4$ avec une solution aqueuse très concentrée de potasse la majeure partie distille sans altération, mais une partie se décompose en iode, qui réagit sur la potasse, et en gaz CH^2 qui se dégage.

En employant une solution alcoolique de potasse, une partie de $C^4H^3I^4$ se décompose comme précédemment, en iode et en gaz inflammable CH^2 mais la majeure partie se transforme en iodure d'aldehyde ou d'acétyle ($C^4H^3I^2$) et en H^3I^2 qui se combine à KO.

L'iodure d'aldehyde s'obtient facilement en précipitant par l'eau le liquide alcoolique condensé dans le récipient bien refroidi, $C^4H^3I^2$ est un liquide incolore, d'une odeur alliée très-forte, insoluble dans l'eau, très-soluble dans l'alcool et l'éther. Il bout à 56 degrés, sa densité = 1,98. Les acides sulfurique, chlorhydrique et nitrique ne l'attaquent point à froid. L'acide nitrique fumant le décompose en dégageant de l'iodure et des vapeurs irritantes.

0° 850 brûlés par l'oxyde cuivreux ont fourni eau 0° 153 et acide carbonique 0° 474

		Calcul	Expérience
C^4	300,00	15,66	15,70
H^3	37,50	1,95	2,00
I	1578,29	82,39	
	1915,79	100,00	

Il est assez facile de se rendre raison des différences de réaction observées dans la décomposition des éthers chlorhydrique et bromhydrique, comparativement à celle de l'éther hydriodique. En effet, en vertu de

l'affinité puissante du chlore et du brome pour l'hydrogene, les deux etheis ainsi que la si bien observé M. Thenard, se décomposent en acide chlorhydrique, acide bromhydrique et gaz hydrogene carboné, qui se dégagent ensemble, sans pouvoir reagir les uns sur les autres. L'iode ayant bien moins d'affinité pour l'hydrogene, le compose $C^4H^{10}I^2$ se decompose en iode libre et en un melange de 4 volumes (CH^2) d'hydrogene carbone sur 1 volume d'hydrogene. Mais l'iode, dans ces circonstances, peut se combiner a la moitie de l'hydrogene carboné, et de là la formation de l'iodure claylique ($B^2H^4 + I^2$) tandis que le reste des gaz se degage.

CHIMIE. — *Analyse de l'eau minerale de Sultz-les Bains*, Note de
M. E. Kœni

En examinant le gisement du trias dans le voisinage de la ville du Rhin ou remarque que sur le versant occidental des Vosges, en Lorraine et sur le versant oriental de la foret Noire, en Wurtemberg, il occupe des étendues assez considerables et se montre tres-riche en gites de sel gemme. Au contraire, dans la vallee meme du Rhin, sur le versant oriental des Vosges et vis-a-vis, dans le grand-duche de Bade, le terrain triasique ne se montre qu'en faible proportion et sans offrir de gisements de sel. En effet, ce terrain, qui n'est quelquefois represente que par l'un de ses trois etages, forme une lisiere etroite a peu pres continue le long de la chaine des Vosges, depuis Wissembourg jusqu'à Befort, et ne disparaissant que vers le milieu de la plaine, sous des depôts plus récents. Ce n'est qu'à Ballbronn, dans le voisinage de Sultz, que M. Voltz a trouvé des traces de sel gemme. Cependant l'existence de plusieurs sources salées, provenant probablement d'eaux douces qui se sont chargées de principes salins en traversant ce terrain, parle en faveur des gites de sel gemme, dans le trias de la vallee du Rhin. Quelques-unes de ces sources sortent immédiatement du pied du versant oriental des Vosges, notamment à Niederbronn, Châtenois, Wattwiller et Sultz (Haut Rhin), d'autres, de meme nature, se rencontrent à quelque distance de la chaine, comme a Sultz-les-Bains et Sultz-sous-Forêts.

L'analyse qualitative, faite par M. Persoz, en constatant pour la première fois l'existence du brome et de l'iode dans les sources de Sultz-les-Bains et de Châtenois, a prouvé la grande analogie de composition entre ces eaux et celles de Sultz-sous-Forêts. L'eau de Sultz-les-Bains est claire, transparente, non gazeuse, d'une saveur salée, légèrement alcaline, elle ramene lentement au bleu le papier de tournesol rouge, et ne forme point de depot

par son exposition à l'air, concentrée, elle laisse peu à peu déposer une poudre blanche, formée principalement de carbonate de chaux et de magnésie, évaporée plus fortement, il se précipite du sulfate de chaux, et l'on obtient finalement une abondante cristallisation de sel marin, dans laquelle on distingue de petits cristaux brillants de sulfate de soude

Sa densité à 10° = 1,0034	poids du même volume d'eau distillée	42 ^{gr} ,652
	id minérale	42 ,796
Sa température est de 12°,5 centigrades		

L'analyse qualitative y indique la présence des acides carbonique, chlorhydrique et sulfurique, de la chaux, de la magnésie, de la soude, et de petites quantités d'acides silicique et phosphorique, d'oxyde de fer, de potasse, de brome et d'iode, et de matière organique

ANALYSE QUANTITATIVE

(a) *Détermination des acides*

- 1 litre d'eau, rendu acide par l'acide nitrique, fournit, par le nitrate d'argent, 7^{gr},80 Cl^{Ag} = 1^{gr},924 de chlore,
- 1 litre d'eau, rendu acide par l'acide chlorhydrique, fournit, par le chlorure barytique, 1^{gr},293 SO², BaO = 0^{gr},445 d'acide sulfurique

Le liquide filtré, ayant été évaporé à sec, fritté et repris par l'acide chlorhydrique, laissa un résidu de silice = 0^{gr},004

Pour obtenir l'acide carbonique, 1 litre d'eau fut précipité à l'abri du contact de l'air par une solution ammoniacale de chlorure barytique. Le précipité lavé fut repris par l'acide chlorhydrique, et la liqueur précipitée par l'acide sulfurique. On obtint ainsi 1^{gr},585 de sulfate de baryte, qui équivalent à 0^{gr},298 d'acide carbonique

Pour doser le brome et l'iode, 100 litres d'eau, rendus alcalins par de la soude pour décomposer les sels de magnésie et fixer le brome et l'iode, furent évaporés jusqu'à cristallisation du sel marin. La liqueur concentrée, après avoir été neutralisée par l'acide chlorhydrique (opération qui occasionne un grand dégagement de gaz carbonique et la séparation d'une partie de la matière organique, sous forme d'une résine brune), fut introduite dans une cornue tubulée, munie de son allonge et d'un récipient tubulé, contenant de l'ammoniaque liquide, ainsi qu'un appareil à boules adapté à la tubulure du récipient. Le liquide de la cornue avant été porté à l'ébullition, on y fit arriver par la tubulure un courant de chlore. Les vapeurs de brome et

diode ainsi déplacées vinrent, avec l'excès de chlore, se condenser dans le récipient et dans le tube à boules. On continua l'opération jusqu'à ce qu'il y eût grand excès de chlore et on entretenit l'ébullition pendant quelque temps, pour permettre aux vapeurs d'eau de chasser tous les gaz dans le récipient. L'ammoniaque dont une partie avait été décomposée, renfermait alors des chlorures bromure et iodure ammoniques. On neutralisa par l'acide nitrique, et on précipita la liqueur par le nitrate d'argent. Le précipité de chlorure, bromure et iodure d'argent bien lavé, fut mis en digestion avec l'ammoniaque liquide, tant que ce véhicule en put dissoudre. On obtint ainsi un résidu d'iodure argentique pesant 0^{gr},56, ce qui fait, par litre, 0^{gr},0056 ou 0^{gr},003 diode. La liqueur ammoniacale ayant été précipitée par l'acide nitrique et le précipité bien lavé et fondu, on en constata le poids et on le soumit à l'action du chlore gazeux. Le mélange de chlorure et bromure argentique se transforma, en dégageant du brome, en chlorure d'argent pur, en éprouvant une perte de poids de 0^{gr},37. En calculant ce résultat, on trouve sur 1 litre, 0^{gr},0072 de brome.

Enfin, 1 litre d'eau ayant été évaporé aux trois quarts, on le neutralisa par l'acide sulfurique étendu, et l'on trouva ainsi que, pour rendre la liqueur acide il fallait une quantité d'acide sulfurique équivalente à 0^{gr},30 de carbonate de chaux.

(b) *Détermination des bases*

1 litre d'eau légèrement acidulée et contenant du chlorure ammonique ayant été précipité par l'oxalate ammonique, le précipité lavé fut transformé en sulfate de chaux pesant 0^{gr},685 = $\begin{cases} 0,284 \text{ de chaux,} \\ 0,401 \text{ d'acide sulfurique} \end{cases}$

La liqueur filtrée et concentrée, ayant été rendue ammoniacale fut précipitée par le phosphate ammonique, le précipité de phosphate ammoniomagnésien suffisamment lavé, pesait 0^{gr},17 = 0,068 de magnésie.

Pour doser la soude et la potasse, les sels de l'eau furent transformés en sulfates, en évaporant à siccité sous l'influence d'un léger excès d'acide sulfurique. Les sulfates, redissous dans l'eau, furent précipités par l'acetate de baryte, la liqueur filtrée évaporée à siccité, et le résidu calciné. Les acetates furent ainsi transformés en carbonates, dont ceux de potasse et de soude étaient les seuls solubles dans l'eau. Cette solution, rendue acide par l'acide chlorhydrique et évaporée, fournit un résidu solide de 3^{gr},374 par litre, formé de 3^{gr},370 de chlorure sodique et 0^{gr},004 de chlorure potassique, qui en avaient été séparés par le chlorure platinique. Or, en supposant la chaux à l'état de bi-

(878)

carbone, le reste de la chaux combinée à l'acide sulfurique dont l'excédant est lui-même saturé par la magnésie et la soude, le chlorure uni au sodium, les traces de brome et d'iode combinés au potassium, et la silice libre, on trouve que 1 litre de l'eau de Sultz-les-Bains renferme

Acide carbonique libre	0,036		
Bicarbonate de chaux	0,431	{ CO	0,131
		{ CO ² , CaO	0,300
Sulfate de chaux	0,278	{ S	0,163
		{ CaO	0,115
Sulfate de soude	0,267	{ S	0,150
		{ NaO	0,117
Sulfate de magnésie	0,200	{ S	0,132
		{ MgO	0,068
Chlorure sodique	3,189	{ Cl ²	1,924
		{ Na	1,265
Bromure potassique	0,009		
Iodure potassique	0,004		
Silice	0,004		
Traces d'acide phosphorique, d'oxyde de fer et de matière organique			
			4,417

l'analyse des gaz recueillis à la source affouant, sur 100 volumes

Acide carbonique	3
Azote	97
	100

En retranchant l'acide carbonique qui peut se dégager par l'évaporation 0^{sr},167, il reste 4^{sr},250. Or le poids total des sels obtenus en évaporant avec précaution 10 litres d'eau et en desséchant fortement le résidu, a été égal à 43^{sr},20, ce qui fait par litre 4^{sr},32. Il y a donc eu perte de 0^{sr},07, dont une partie représente la matière organique.

MÉDECINE — *Sur la fréquence croissante des cancers* (Extrait d'une Note de M. TANCHEU)

Le nombre des cancers augmente d'année en année. En Angleterre, M. FAAR en signale 2448 pour l'année 1838, et 2691 pour l'année 1839.
 A Berlin, en 1826, on avait déjà fait la même remarque.

D'après un ouvrage que je viens de publier sur les affections cancéreuses, on trouve sur les registres du département de la Seine qu'en 1830 668 personnes ont succombé au cancer, c'est-à-dire 1,96 sur les décès et en 1840, 889 ont succombé au cancer, c'est-à-dire 2,40 pour 100

Cette maladie paraît être plus fréquente dans les villes que dans les campagnes, elle est presque inconnue en *Amerique* et en *Afrique*. En *Égypte* on la trouve chez les femmes turques, et nullement sur les Fellahs. De plus, cette maladie n'est pas rare sur les animaux domestiques et sur ceux de nos ménageries, tandis qu'il est encore sans exemple que le cancer se soit développé sur les animaux à l'état sauvage

» A Paris (ville), il y en a eu 2,54 sur les décès, dans les environs, seulement 1,63 pour 100

Sur 9118 décès causés par le cancer, il y avait 6967 femmes et 2161 hommes

En Angleterre sur 5139 décès il y avait 3859 femmes et 1220 hommes

C'est de quarante à soixante-dix ans que cette maladie est surtout fréquente

Chez la femme c'est le sein, et chez l'homme l'estomac qui en sont le plus souvent affectés

Le traitement de cette maladie est nul à notre époque, les chirurgiens opèrent et aux malades qui refusent l'opération ils répondent *Il n'y a rien à faire*, cependant tous sont d'accord que l'opération ne guérit pas elle ne prolonge même pas la vie. En voici la preuve

D'après un relevé qui a été adressé à l'Académie par M. l'Écuyer d'Étiolles, il résulte que sur 1192 malades qui n'ont pas été opérés 18 ont vécu plus de trente ans après l'invasion de la maladie, tandis que, sur 801 opérés 4 seulement ont vécu après le même laps de temps

Ont vécu de vingt à trente ans après le développement de la maladie 18 opérés 34 non opérés de six à vingt ans, 88 opérés, et 228 qui n'avaient subi aucune opération

M. DENISOFF transmet le tableau des *observations météorologiques* faites par ses soins à Nijné-Vaguisk pendant le mois de novembre 1843

M. MAREY-MONGE adresse quelques détails sur un *tremblement de terre* qui a été ressenti à la Corogne, le 18 avril dernier, à 3^h 30^m de l'après-midi

MADAME DE CRUISE communique, d'après une Lettre de M. Zea Bermudez, en date du 16 mars, quelques détails sur la *phosphorescence extraordinaire*

qu'on a remarquée dans les eaux de la mer aux environs de l'île de Madere

Depuis quelques semaines, dit l'auteur de la Lettre, le temps a été constamment beau dans cette île, même trop beau pour la saison, car, pendant tout ce temps, il n'est pas tombé une seule goutte d'eau. Je ne sais si cette longue sécheresse a été pour quelque chose dans un événement qui vient de mettre en émoi toute la ville de Funchal, et je crois l'île entière de Madere. Dans la nuit du 12 de ce mois, vers huit heures et demie du soir, on a observé une lumière très-forte et étincelante répandue sur toute la surface de la mer, au point que beaucoup de personnes en ont été très-effrayées, entre autres des pêcheurs, qui n'étaient pas encore rentrés dans le port, sont revenus à la hâte, en criant que la mer était en combustion, et qu'ils avaient senti une odeur très-prononcée de soufre. D'autres annonçaient un prochain tremblement de terre, d'autres se désolaient et criaient à la fin du monde. Cette espèce de feu phosphorique est allée en augmentant jusqu'à une ou deux heures du matin. L'apparition de ces lumières ou de ces feux, dans nos parages, est un phénomène assez rare et qui paraît avoir pour le peuple quelque chose d'effrayant.

M. COURRY écrit relativement à de nouvelles taches qui se montrent depuis quelques jours sur le disque du soleil.

L'Académie reçoit une Note ayant pour titre *Sur les effets de l'explosion d'un grand gazomètre de 46 mètres de diamètre sur 10 mètres de hauteur*, explosion qui a eu lieu à Paris, le 30 avril, à midi. M. le Secrétaire perpétuel, en annonçant cette communication, fait remarquer que, l'auteur ne s'étant pas fait connaître les détails intéressants qu'il donne sur cet événement ne pourront, s'il persiste à garder l'anonymat, être rendus publics par la voie du *Compte rendu*.

M. BONNAFONT, à l'occasion d'une Lettre écrite dans la précédente séance par M. Deleau, demande, comme ce médecin, qu'on soumette à des expériences comparatives deux méthodes proposées pour les cas de rétrécissement de la trompe d'Eustache : d'une part, les insufflations gazeuses, et, de l'autre, l'emploi de sondes élastiques.

(Renvoi à la Commission nommée pour le Mémoire précédemment présenté par l'auteur.)

M. JULO adresse quelques considérations sur les *aerostats* et sur les avan-

tages qu'il y aurait, suivant lui, à donner à tout l'appareil la pesanteur spécifique convenable en faisant le vide dans l'intérieur.

M. **MALÉ**, qui avait précédemment adressé une Note concernant la *navigation par la vapeur*, prie l'Académie de hâter le travail de la Commission à l'examen de laquelle cette Note a été renvoyée

La séance est levée à cinq heures.

A

ERRATA.

(Séance du 29 avril 1844.)

Page 814, ligne 2, *au lieu de* en réagissant sur le protoxyde d'or, *lisez* en réagissant sur le tritoxyle d'or.

Page 814, ligne 5, *au lieu de* produisent à l'ébullition un dépôt, *lisez* produisent à l'ébullition avec le chlorure d'or un dépôt.

Page 816, ligne 31, *au lieu de* protoxyde d'or, *lisez* tritoxyle d'or.

BULLETIN BIBLIOGRAPHIQUE

L'Académie a reçu, dans cette séance, les ouvrages dont voici les titres

Comptes rendus hebdomadaires des séances de l'Académie royale des Sciences,
1^{er} semestre 1844, n° 18, in-4°

Bulletin de l'Académie royale de Médecine, tome IX, n° 13 et 14.

Annales maritimes et coloniales, avril 1844, in 8°

Histoire naturelle des îles Canaries, 74^e livraison, in-8°

Les Steppes de la mer Caspienne, le Caucase, la Crimée et la Russie méridionale, voyage pittoresque historique et scientifique, par M. X. HOMMAIRE DE HELL, livr. 1 à 5, in 8°, et pl. in-fol

Notices historiques sur MM. HENRI et LOUIS DE FREYCINET par M. DE LA ROQUETTE (Extrait du *Bulletin de la Société de Géographie*) Bioch in-8°

Société royale et centrale d'Agriculture — Recherches sur la production de la Soie en France, par M. ROBINET, 1^{re} et 2^e Mémoires, in-8°

Lettre sur les Cartes agronomiques et sur l'influence de la nature du sol sur les productions agricoles, adressée à MM. GIRARDIN et DUBREUIL par M. DE CAUMONT, broch. in-8°

Journal de Chimie médicale, mai 1844, in-8°

Journal de Médecine, mai 1844, in-8°

Journal des Connaissances utiles, avril 1844, in-8°

La Clinique vétérinaire, mai 1844, in-8°

Astronomische . Nouvelles astronomiques de M. SCHUMACKER, n° 502, in-4°

Rendiconto *Comptes rendus des séances et des travaux de l'Académie royale des Sciences de Naples*, novembre et décembre 1843, et janvier et février 1844, in-4°

Gazette médicale de Paris, n° 18

Gazette des Hôpitaux, n° 51 et 52

L'Echo du Monde savant n° 34 et 35

L'Expérience, n° 356 et 357, in-8°

Projet de Monument à la mémoire du chancelier GERSON, Prospectus in-fol

COMPTE RENDU

DES SÉANCES

DE L'ACADÉMIE DES SCIENCES.

SÉANCE DU LUNDI 13 MAI 1844.

PRÉSIDENCE DE M. ÉLIE DE BEAUMONT.

MÉMOIRES ET COMMUNICATIONS

DES MEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE L'ACADÉMIE.

« M. LAOUILLE communique verbalement à l'Académie des remarques relatives, 1° à des classes très-étendues de quantités dont la valeur n'est ni rationnelle ni même réductible à des irrationnelles algébriques; 2° à un passage du livre des *Principes* où Newton calcule l'action exercée par une sphère sur un point extérieur.

» 1. Pour donner des exemples de fractions continues dont on puisse démontrer en toute rigueur que leur valeur n'est racine d'aucune équation algébrique

$$f(x) = ax^n + bx^{n-1} + \dots + gx + h = 0,$$

a, b, \dots, g, h étant des entiers, il suffit de se rappeler que $\frac{p_n}{q_n}$ et $\frac{p}{q}$ étant deux réduites successives de la fraction continue qui exprime le développement d'une racine incommensurable x de cette équation, le quotient incomplet μ , qui vient après la réduite $\frac{p}{q}$, et sert à former la réduite sui-

vante, finira (cela résulte d'une formule de Lagrange, voyez les Mémoires de Berlin, année 1768) par être, pour des valeurs de q très-grandes, constamment inférieur à

$$\pm \frac{df(p, q)}{qf(p, q)dp},$$

expression essentiellement positive où l'on suppose

$$f(p, q) = q^n f\left(\frac{p}{q}\right) = ap^n + bp^{n-1}q + \dots + hq^n.$$

Abstraction faite des signes, on aura dès lors, à plus forte raison,

$$\mu < \frac{df(p, q)}{qdp},$$

puisque $f(p, q)$ est un entier, égal au moins à l'unité si l'on admet (ce qui est permis) que l'équation $f(x) = 0$ a été débarrassée de tout facteur commun, $f(p, q) = 0$ donnerait en effet $f\left(\frac{p}{q}\right) = 0$. Maintenant représentons par $f'(x)$ la dérivée de $f(x)$, l'inégalité ci-dessus deviendra

$$\mu < q^{n-1} f'\left(\frac{p}{q}\right)$$

Or, $f'\left(\frac{p}{q}\right)$ est une quantité finie qui tend vers la limite $f'(x)$, comme $\frac{p}{q}$ vers la limite x . En désignant par A un certain nombre fixe supérieur à cette limite, on sera donc certain d'avoir

$$\mu < Aq^{n-1}.$$

» Ainsi les quotients incomplets d'une fraction continue représentant la racine x d'une équation algébrique de degré n , à coefficients rationnels, sont assujettis à ne jamais dépasser le produit d'un certain nombre constant par la puissance $(n-2)^{\text{ème}}$ du dénominateur de la réduite précédente.

» Il suffira de donner aux quotients incomplets μ un mode de formation qui les fasse grandir au delà du terme indiqué, pour obtenir des fractions continues dont la valeur ne pourra satisfaire à aucune équation algébrique proprement dite; cela arrivera, par exemple, si, partant d'un premier quotient

incomplet quelconque, on forme chacun des suivants μ à l'aide de la réduite $\frac{p}{q}$ qui le précède, d'après la loi $\mu = q^m$, ou bien encore d'après la loi $\mu = q^m$, m étant l'indice du rang de μ .

Au reste la méthode précédente, qui s'est offerte la première, n'est ni la seule ni même la plus simple qu'on puisse employer. Ajoutons qu'il y a aussi des théorèmes analogues pour les séries ordinaires. Nous citons en particulier la série

$$\frac{1}{a} + \frac{1}{a^2} + \frac{1}{a^3} + \dots + \frac{1}{a^{2+2n}} + \dots,$$

a étant un nombre entier

2° Newton a démontré que l'action exercée sur un point extérieur par une sphère recouverte uniformément de molécules matérielles, agissant chacune en raison inverse du carré de la distance, est égale à celle que produiraient les mêmes molécules réunies au centre de la sphère. La méthode synthétique qu'il a suivie est, dans ce cas du moins, tout aussi simple, tout aussi directe on peut dire tout aussi propre à l'invention, que les méthodes analytiques auxquelles on a eu depuis recours, en la traduisant en calcul, on en déduit un théorème sur une classe d'intégrales, et l'on se trouve conduit à une conséquence assez singulière, c'est qu'elle renferme en quelque sorte implicitement la transformation remarquable par laquelle on réduit une fonction elliptique de module c à une autre de module $c' = \frac{2\sqrt{c}}{1+c}$. Ce rapprochement curieux entre deux théories si différentes sera développé ailleurs avec tous les détails convenables, nous nous bornons ici à l'indiquer.

M AUGUSTIN CAUCHY présente à l'Académie deux opuscules qu'il vient de publier :

» Le premier opuscule a un rapport manifeste avec les travaux de statistique dont se sont plusieurs fois occupés des membres de l'Académie. Il a pour titre *Considérations sur les moyens de prévenir les crimes et de reformer les criminels*.

» M Cauchy explique à quelle occasion cet opuscule a été composé.

» Appelé à faire partie du jury près la cour d'assises du département de la Seine, pour la dernière session de l'année 1843, M Cauchy avait concouru à la rédaction d'une Note que les jurés adresseront à M le Ministre de la Justice. Cette Note était conçue dans les termes suivants

N° 1 sur l'11, et la suite d'une réforme dans le mode actuel de repression des délits et des crimes

Les jurés du département de la Seine, membres du jury près la cour d'assises pour la dernière session de l'année 1843, après avoir mûrement réfléchi sur les obligations que la loi leur impose dans les fonctions qu'ils sont appelés à remplir, ont cru qu'un devoir sacré pour eux était de faire connaître à M. le Ministre de la Justice, au Gouvernement et aux Chambres, la cruelle alternative dans laquelle ils se trouvent habituellement placés, en raison du mode actuel de repression des délits et des crimes. Après avoir juré devant Dieu et devant les hommes *de ne trahir ni les intérêts de l'accusé, ni ceux de la société qui l'accuse*, les jurés ont la douleur de ne pouvoir satisfaire ni à l'un ni à l'autre de ces deux intérêts, simultanément compromis par la législation pénale existante. Si le jury acquitte un coupable, la société n'est point vengée, et il est fort douteux que le repentir que l'accusé a pu témoigner à l'audience soit assez persévérant pour le prémunir contre la tentation de commettre de nouveaux crimes. Le jury le condamne-t-il? Ce sera bien pis encore, surtout si l'accusé est novice et compaît pour la première fois devant la cour d'assises. Le bienfait d'une bonne éducation lui avait manqué. Il va maintenant recevoir des leçons de crime et la prison fera, d'un homme entraîné par de mauvaises passions ou de mauvais exemples, un scélérat par principes, un scélérat consommé. *Non seulement nos prisons actuelles ne corrigent pas, mais elles depravent, cela est hors de doute. Elles rendent à la société des citoyens beaucoup plus dangereux que ceux qu'elles en ont reçus* (1).

D'après ces faits irrecusables, on ne doit pas s'étonner de la progression effrayante des délits et des crimes qui se multiplient de telle manière que, de 1830 à 1841, le nombre des poursuites judiciaires s'est élevé de 62 000 à 96 000 (2).

Pour arrêter cette multiplication des délits et des crimes, il faudrait évidemment 1° procurer aux enfants des classes pauvres, et surtout à ceux qui, élevés dans la misère et dans le vice, deviendront plus tard le fléau de la société, la bonne éducation dont ils sont généralement privés,

1) Les paroles soulignées sont extraites du Rapport fait en 1843, au nom de la Commission chargée d'examiner le projet de loi sur les prisons, par M. de Tocqueville, député de la Manche (Page 34.)

(2) Voir le Rapport cité, page 3

2° Soustraire les prévenus et les condamnés aux leçons du crime qu'ils reçoivent dans les prisons, •

3° Faciliter la réforme des condamnés et leur retour au bien, en leur faisant donner dans les prisons la bonne éducation dont ils ont été généralement privés avant leur condamnation,

4° Prendre des mesures telles que, parmi les coupables, chacun de ceux qui rentrent dans la vie commune après l'expiration de leur peine, ne soit pas considéré et ne se considère pas lui-même comme un ennemi de la société •

N'existe-t-il aucun moyen d'obtenir en France les améliorations et les réformes que nous venons d'indiquer ? Répondre négativement ce serait faire injure à notre patrie, à cette France qui s'est toujours montrée jalouse de marcher à la tête de la civilisation européenne, lorsque les ressources précieuses qu'offrent des institutions toutes françaises deviennent la garantie de succès déjà constatés par l'expérience, lorsque la maison centrale de Nîmes lorsque les colonies agricoles de Marseille et de Mettray prouvent d'une manière invincible la possibilité d'obtenir la réforme des prisons et même la réforme des criminels

En priant M. le Ministre de la Justice de vouloir bien ordonner ou provoquer les mesures administratives et législatives qui doivent assurer le succès d'une réforme devenue nécessaire dans le mode actuel de répression des délits et des crimes en réclamant pour cet objet le concours du Gouvernement et des Chambres le concours des conseils municipal et départemental de la ville de Paris, et même de toutes les villes de France, enfin, le concours des juges qui leur succéderont dans les pénibles fonctions qui leur sont confiées, les soussignés ont la douce satisfaction de songer qu'ils remplissent un devoir qui leur est prescrit par l'intérêt général de leurs concitoyens, et que leur pensée sera comprise par les Français de toutes les opinions et de tous les partis

Après avoir revêtu de leurs signatures la Note qu'on vient de lire, les jurés avaient chargé cinq d'entre eux de faire les démarches qui pouvaient être utiles pour la réalisation des vœux exprimés dans cette Note. La Commission instituée à cet effet se trouvait composée de MM. Edouard Thayer, membre du conseil général du département de la Seine, le baron Augustin Cauchy, membre de l'Institut, Énard, Reiss, docteur médecin, et Rousselle-Chailard, juge suppléant au tribunal de Commerce

M. le baron Zangiacomi, président de la cour d'assises, avait bien voulu

accepter la proposition de transmettre lui-même la Note signée par MM les juges à M le Ministre de la Justice

M Augustin Cauchy fut chargé par la Commission de communiquer cette Note à M de Tocqueville, membre de l'Institut, et rapporteur du projet de loi sur les prisons. Celui-ci témoigna le désir de lire quelques réflexions que M Cauchy avait tracées sur le papier, et qui étaient en quelque sorte un développement de la Note elle-même. M Cauchy s'empressa de les lui remettre, et quelques jours plus tard il reçut la lettre suivante

Monsieur, j'ai lu attentivement le manuscrit que vous avez bien voulu me confier. Cette lecture a été pour moi d'un intérêt extrême, et je ne puis trop vous remercier de m'avoir permis de la faire. Je pense que la publication de cet opuscule servirait puissamment la cause de la réforme.

Veuillez etc.

» ALEXIS DE TOCQUEVILLE

Paris ce 1^{er} avril 1844 »

Ainsi, en publiant les *considérations* qu'il présente à l'Académie, M Cauchy ne fait autre chose que se conformer au vœu exprimé par l'honorable rapporteur du projet de loi sur les prisons.

Le second opuscule, présenté par M AUGUSTIN CAUCHY, a pour titre *Mémoire à consulter, adressé aux membres des deux Chambres*. Ce Mémoire se rattache à la question que l'auteur avait déjà traitée dans l'ouvrage précédemment offert à l'Académie, et intitulé *Considérations sur les ordres religieux, adressées aux amis des sciences*.

MEMOIRES PRESENTES

CHIMIE — *Note sur la chaleur dégagée dans l'hydratation de l'acide sulfurique* par M ABRIA (Extrait par l'auteur)

(Commissaires, MM Pouillet, Despretz, Regnault)

La discordance entre les résultats obtenus par MM Hess et Graham sur la chaleur dégagée dans la combinaison de l'acide sulfurique avec l'eau, exigeait de nouvelles recherches. Cette Note renferme le détail des expériences que j'ai entreprises.

Elles conduisent à la conséquence suivante

• Les quantités de chaleur, successivement dégagées dans la combinaison de l'acide sulfurique anhydre avec les premiers atomes d'eau, varient à fort

peu près comme les nombres

$$1, \frac{1}{3}, \frac{1}{6}, \frac{1}{12}, \frac{1}{16}, \frac{1}{24}$$

Ces rapports diffèrent peu de ceux énoncés par M Hess, à l'exception toutefois du premier, mes expériences conduisent à la conclusion, que la chaleur dégagée par le premier atome d'eau est le triple de celle dégagée par le deuxième, et non le quadruple, comme M Hess l'avait annoncé

ANATOMIE — *Sur la structure des deux épithéliums des membranes muqueuses du canal intestinal*, Note de M MANDL

L'existence de l'épithélium sur les membranes muqueuses a été depuis longtemps un sujet intéressant d'investigations pour les anatomistes. La plupart des auteurs ont nié son existence mais les recherches si précises et positives de M Flourens ont mis non seulement sa présence hors de doute, mais elles nous ont en même temps fourni des enseignements, inconnus jusqu'alors, sur la composition de cet épithélium. En effet, cet auteur a prouvé que toutes les membranes muqueuses sont pourvues d'un épithélium qui est formé par deux lames superposées. Des préparations anatomiques nombreuses viennent à l'appui de l'opinion de M Flourens.

Je me suis proposé, non-seulement de constater l'existence de ces couches diverses de l'épithélium qui, par quelques auteurs, ont été encore mises en doute, mais en outre d'étudier les éléments dont elles se composent. Je prends la liberté de soumettre à l'Académie le résultat de mes recherches à ce sujet.

1° Toutes les membranes muqueuses du canal intestinal sont pourvues d'un épithélium composé de deux couches.

2° La première couche, celle qui regarde la surface libre de la membrane muqueuse, est composée d'éléments deux à trois fois plus longs que larges et épais, formés par une masse finement granulée, transparente, d'une couleur légèrement grisâtre, que j'appellerai avec Henle, *cylindres d'épithélium*. Ces cylindres sont pointus à leur extrémité inférieure, arrondis ou aplatis à leur extrémité libre, pourvus d'un noyau transparent, oblong et situé dans l'intérieur du cylindre près de son extrémité inférieure. Ce noyau porte à son tour un ou deux nucléoles, et se présente, dans les cylindres vus de haut, comme un petit cercle transparent que Treviranus et quelques auteurs ont pris pour une ouverture ou une bouche, surtout dans les cylindres de l'épithélium qui recouvrent les villosités intestinales. Tous ces

cylindre sont places longitudinalement les uns a côté des autres ils sont couverts a leur surface libre, d'une membrane transparente, amorphe, epaisse de $\frac{1}{300}$ à $\frac{1}{100}$ de millimetre. Lorsqu'on place une particule de cet epithelium dans l'eau pour l'examen microscopique, on voit bientôt, à son bord libre et a sa surface soudee une foule de gouttelettes arrondies ou allongées, d'une matiere amorphe, blanchatre, coagulable.

3° La seconde couche, inferieure à la premiere et située entre celle ci et le derme de la muqueuse, se compose d'éléments qui sont des cylindres aux divers degres de leur developpement. Nous les decrivons sommairement, en montant du derme vers la premiere couche. On aperçoit d'abord de petits globules, ayant un diametre de $\frac{1}{300}$ de millimetre, places dans la substance organisatrice le *blasteme*, qui les reunit. Ils sont suivis par des globules un peu plus grands pourvus d'un nucléole. Viennent ensuite des globules allongés, elliptiques pourvus d'un ou de deux nucléoles. Plus haut encore on aperçoit ces memes éléments, mais entourés d'une legere couche d'une masse finement granulee, transparente, legerement grisatre qui, dans les éléments les plus éleves de la seconde couche, devient encore plus considerable. Alors ces derniers présentent déjà presque la forme des cylindres parfaits qui composent la premiere couche. En effet, ils sont oblongs, composés d'une masse finement granulée, portent un noyau (le globule elliptique, autour duquel s'est amassée la matiere grisatre) pourvu d'un ou de deux nucléoles. Mais ces éléments sont a peu pres moitié plus petits que les cylindres parfaits leur longueur n'excede guere $\frac{1}{6}$ de millimetre.

4° Ainsi la seconde couche se compose d'éléments qui s'accroissent, qui se developpent, qui sont les germes des elements parfaits dont est formée la premiere couche.

5° Il y a renouvellement continuuel de l'épithélium, comme cela a lieu pour l'épiderme. M. Flourens a prouvé que dans la peau et dans les membranes muqueuses les couches inférieures remplacent les supérieures. Nos observations expliquent de quelle maniere, dans les muqueuses, la seconde couche, qui est ce que les anatomistes ont appelé le réseau de Malpighi, remplace la premiere, qui, lorsqu'elle est détachée, est évacuée avec les excréments, ou l'on retrouve toujours ses éléments.

6° Dans quelques maladies, comme par exemple dans la dysenterie, dans les inflammations chroniques, etc., ce renouvellement est très-acceléré, et la premiere couche de l'épithélium continuellement repoussée. Elle paraît dans les excréments sous forme de lambeaux blanchâtres, que l'on a pris pour du mucus coagulé.

J'ai l'honneur de joindre à cette Lettre une planche qui fait partie de mon *Anatomie microscopique*, dans laquelle je ferai bientôt paraître le Mémoire sur l'épithélium. J'ajouterai seulement encore que, dans mes recherches sur le pigment de l'œil, j'ai pu constater, dans les yeux des écrevisses, des globules noirs qui sont de véritables cellules. En effet, après un séjour plus ou moins prolongé dans l'eau, je les ai vus crever, et verser leur contenu, composé de molécules noires. Je n'en ai vu d'analogue dans les yeux d'autres animaux, ou probablement les cellules se sont déjà solidifiées.

ANATOMIE — *Sur l'épithélium des zoospermes*, Note de M. MANDL.

Dans une Note adressée à l'Académie des Sciences le 29 avril dernier, M. Pouchet dit qu'il existe à la surface des zoospermes de l'homme une sorte d'épithélium qui enveloppe tout le corps et s'en trouve séparée par une couche très-mince de liquide.

La pellicule dont parle M. Pouchet a été déjà décrite et figurée par moi dans mon *Anatomie générale* (Paris, 1843, *Pl. V*, fig. 8, c). En effet, on y trouve (p. 496) le passage suivant : Nous avons vu sur beaucoup des zoospermes une membrane granuleuse attachée à la queue, à quelque distance de la tête, c'est le reste de la cellule dans laquelle s'est développé le zoosperme. En comparant mon dessin avec les figures que M. Pouchet a bien voulu me faire voir, je me suis convaincu qu'il s'agit de la même membrane. Je regrette de ne pouvoir entrer pour le moment dans plus de détails sur le développement des zoospermes, puisque je compte présenter bientôt à ce sujet un Mémoire spécial. Toutefois, j'ajouterai que cette pellicule, qui a été indiquée par moi dans l'ouvrage cité, est d'autant plus petite que les zoospermes ont séjourné plus longtemps dans les vésicules spermatiques, et qu'un séjour prolongé la fait même entièrement disparaître ; au contraire, elle est plus grande sur les jeunes animalcules où, si l'interprétation donnée par M. Pouchet était exacte, tout le contraire devrait arriver.

M. Pouchet dit aussi que, chez les grenouilles, le corps des zoospermes de rectiligne qu'il était, se courbe vers son milieu, formant un angle qui devient de plus en plus aigu, puis les deux extrémités de ces animalcules finissent par se croiser, ensuite elles s'entortillent ensemble, de manière à ne plus représenter en apparence qu'un seul filament tordu, terminé en avant par une sorte d'anse qui a été prise pour une tête aplatie par des observateurs inattentifs. Or, dans mon *Traité du Microscope*, qui a paru en 1839, j'ai dit,

en parlant de l'effet produit par l'eau sur les zoospermes (p 150) « Il (cet effet) consiste principalement dans une torsion, ou plutôt une flexion en forme d'anse de la partie antérieure du corps, de sorte qu'on voit, en cet endroit, naître un corpuscule elliptique que quelques auteurs ont signalé comme tête mais qui, en réalité, n'est autre chose qu'un anneau plus ou moins elliptique (1) »

Sur la demande de M. Serres, cette Note est renvoyée à la Commission chargée de l'examen des pièces adressées au Concours pour le prix de Physiologie expérimentale, Commission qui aura également à s'occuper du travail de M. Pouchet

CHIMIE — *Note supplémentaire à un précédent Mémoire sur une nouvelle série de sels doubles, par M. POUCHARDE*

(Renvoi à la Commission précédemment nommée)


Dans le court extrait du Mémoire que j'ai eu l'honneur de lire à l'Académie, et qui a été imprimé dans le *Compte rendu* de sa dernière séance, je n'ai pu en raison du peu d'espace réservé à chaque auteur, qu'énoncer un fait qui pourrait être fort mal compris, si je n'ajoutais quelques détails indispensables

J'ai dit que toutes les fois qu'on précipite par un alcali une dissolution de deux oxydes dont l'un est un protoxyde et l'autre le sesquioxyde de fer, le précipité qu'on obtenait d'abord était toujours une combinaison des deux oxydes. Je dois ajouter que pour vérifier ce fait, il faut que les quantités des sels en dissolution soient telles que l'oxygène du protoxyde soit au moins le double de l'oxygène du sesquioxyde

Je ferai remarquer également que ce n'est point par la formule



comme le porte par erreur le *Compte rendu*, que j'ai exprimé la composition des sels qui sont l'objet principal de mon travail, mais bien par la formule



c'est-à-dire par $\frac{1}{6}$ d'équivalent de sulfate de peroxyde, par 1 équivalent de sulfate de protoxyde, et par 10 équivalents d'eau

(1) Ces changements, qui se produisent sur les zoospermes des grenouilles, ont été aussi attribués par M. Peltier à l'effet de l'eau

MÉCANIQUE APPLIQUÉE — *Note sur un bûi a essieux convergents, pour locomotives et wagons, par M SERNET DE TOURNFORT.*

(Renvoi à la Commission des chemins de fer)

MÉCANIQUE APPLIQUÉE — *Note sur une nouvelle disposition de sabot pour les berlines de voyage, calèches, etc, par MM LEFEVRE et SAUTEREAUX*

(Commissaires, MM Morin, Segnier)

CORRESPONDANCE.

M FLOURENS présente, au nom des auteurs, MM CARUS et OTTO, la sixième livraison de l'*Atlas d'Anatomie comparée* que publient ces deux savants

Cette livraison, qui se compose de huit planches accompagnées chacune d'un texte explicatif, est relative au système circulatoire

La première planche a rapport à la constitution des globules sanguins, à l'appareil circulatoire dans les animaux inférieurs, et aux premières manifestations de cet appareil dans des animaux d'un ordre plus élevé

La seconde représente l'évolution du système vasculaire dans les mollusques

La troisième, sur laquelle M Florens attire plus particulièrement l'attention, est relative à la circulation des articulés, et montre les modifications remarquables que subit le système vasculaire dans le cours d'une évolution qui a pour résultat définitif la diminution de la circulation En effet à mesure que les vaisseaux aériens, se ramifiant de plus en plus, vont chercher le sang dans toutes les parties du corps, il devient moins nécessaire que ce soit le sang qui se porte alternativement du réseau capillaire de l'appareil de nutrition vers le réseau capillaire de l'appareil respiratoire Aussi voyons-nous la circulation incomplète des larves diminuer à mesure que l'appareil respiratoire se ramifie, et cesser entièrement chez l'insecte parfait chez lequel la respiration se fait dans toutes les parties du corps Au contraire, chez les vers et les crustacés qui, à certains égards, peuvent être comparés aux larves et aux nymphes des insectes, il y a circulation du sang et même d'un sang rouge

La planche quatrième montre l'appareil vasculaire dans les poissons, la cinquième dans les reptiles, la sixième dans les oiseaux, la septième et la huitième enfin dans les mammifères

M FLOURENS presente également, au nom de l'auteur, M GERDY, un opuscule sur les *retractures des tissus blancs*, affections qui paraissent jouer un rôle beaucoup plus important qu'on ne l'avait suppose dans les déviations et dans les difformités du tronc et des membres M Gerdy a reconnu que ces retractures peuvent être combattues avec succès, quand elles sont récentes, par les moyens antiphlogistiques, et que même celles qui sont anciennes cedent souvent à des moyens gymnastiques convenablement dirigés

M CH P BOVAPARTE prince de Canino, nommé récemment à une place de correspondant pour la section d'Anatomie et de Zoologie, adresse à l'Académie ses remerciements

M ARAGO entretient l'Académie d'un projet relatif à l'exécution d'une grande *lunette astronomique*, projet qui a été conçu à l'occasion des progrès récents faits par les verriers français dans la fabrication du flint-glass et du crown glass Le nouvel instrument devant avoir des dimensions fort supérieures à celles des lunettes qu'on a construites jusqu'ici, exigera de la part de l'artiste qui sera chargé de son exécution, l'emploi de méthodes nouvelles qui seraient pour lui, sans doute, l'objet de tâtonnements longs et coûteux, s'il n'était dirigé par les conseils des savants M Arago propose donc à l'Académie de charger dès à présent une Commission prise dans son sein, de rediger des instructions à ce sujet

MM Biot, Arago, Gambey, Regnault, Babinet, sont nommés membres de la Commission

M ARAGO fait une communication relative à un accident qui a interrompu momentanément le forage d'un *puits artésien* que l'on creuse en ce moment à Naples, dans la cour du palais Jusqu'au moment de l'interruption des travaux, les observations thermométriques faites dans l'intérieur du trou du sonde indiquaient la persistance de l'anomalie déjà indiquée par M Melloni, relativement à la distribution de la chaleur dans le terrain traversé L'anomalie, dans les derniers jours, paraissait même beaucoup plus marquée

M ARAGO, enfin, appelle l'attention sur quelques circonstances d'un fait récemment rapporté par les journaux, la chute de la foudre sur le clocher d'une église de Laon, et l'incendie d'une partie de la flèche Par suite de cette communication, une demande sera adressée à M le Ministre de l'Intérieur, à l'effet d'obtenir une relation plus circonstanciée de l'événement

M MATHON adresse une réclamation de priorité à l'occasion d'un Mémoire lu par M Dupré dans la séance du 12 février dernier. Ce Mémoire est relatif à un *procédé nouveau d'embaumement*, qui consiste à faire pénétrer dans le système artériel, au moyen d'une cornue, le mélange de vapeurs fourni par la distillation de certaines matières organiques végétales et animales.

La réclamation de M Mathon est renvoyée à l'examen de la Commission qui a été chargée de faire le Rapport sur le Mémoire de M Dupré.

M le SECRÉTAIRE PERPETUEL DE L'ACADÉMIE DE MÉDECINE DE BELGIQUE transmet de nouveaux numéros du Bulletin des séances de cette Académie.

La séance est levée à 4 heures et demie

F

COMITÉ SECRET

De la séance du 6 mai 1844

La Commission du concours pour le *grand prix de Mathématiques*, année 1843 fait, par l'organe de M Liouville, le Rapport suivant.

La question de mécanique céleste proposée pour l'année 1843 avait déjà été proposée sans succès pour l'année 1840. En 1843 deux pièces ont été envoyées à l'Académie, mais aucune ne paraît encore mériter le prix. Néanmoins, vu l'importance du sujet, la Commission est d'avis de remettre la même question au concours une troisième fois et pour l'année 1846, en l'énonçant dans les termes suivants, qui laissent aux géomètres toute la latitude possible.

Perfectionner dans quelque point essentiel la théorie des perturbations planétaires »

Le prix consistera en une médaille d'or de la valeur de 3000 francs. Les pièces devront être parvenues au secrétariat de l'Académie avant le 1^{er} mai 1846.

BULLETIN BIBLIOGRAPHIQUE

L'Académie a reçu, dans cette séance, les ouvrages dont voici les titres

Comptes rendus hebdomadaires des séances de l'Académie royale des Sciences
1^{er} semestre 1844, n° 19, in-4°

Considérations sur les moyens de prévenir les Crimes et de réformer les Crimi-
nels, par M le baron CAUCHY, in 8°

Mémoire à consulter adressé aux Membres des deux Chambres, par le même
Bloch in 8°

Leçons de Calcul différentiel et de Calcul intégral rédigées principalement
d'après les méthodes de M CAUCHY, et étendues aux travaux les plus récents des
géomètres par M l'abbé MOIGNO, tome II *Calcul intégral*, 1^{re} partie, in 8°

Annales de la Société royale d'Horticulture de Paris, mars 1844, in-8°

Société royale et centrale d'Agriculture — Bulletin des séances, tome IV,
n° 5, in 8°

Société royale et centrale d'Agriculture — Notice biographique sur MATHIFU
DÉ DOMBASLE, par M LECLERC-THOUIN, in-8°

Philosophie chimique, ou Chimie expérimentale et raisonnée, par M ROBIN,
tome 1^{er}, in-8°

Rétracture des Tissus albuginés, par M GERDY broch in 8°

Recherches paléontologiques métallurgiques et zoologiques concernant plusieurs
localités du terrain tertiaire de Paris, par M F ROBERT, broch in-8°

Rapport adressé à S. Exc. M le Ministre de l'Instruction publique sur l'orga-
nisation de l'enseignement et de la pratique de la Médecine en Prusse et dans les
Etats secondaires de la Confédération germanique, par M HOFFER, broch
in 8° (Extrait du *Moniteur universel*, avril 1844)

Musée de la Faculté de Médecine de Strasbourg — Observations d'Anatomie
pathologique, accompagnées de l'Histoire des maladies qui s'y rattachent, par
M EHRLICH, 1^{er} fasc, Strasbourg, in 8°

Nouveau Catalogue du Musée d'Anatomie normale et pathologique de la Fa-
culté de Médecine de Strasbourg, par le même, in 8°

Laryngotomie pratiquée dans un cas de polype du Larynx, par le même, in-8°

Archéologie cello-romaine de l'arrondissement de Châtillon-sur-Seine, par
MM LECLERC et GAVEAU, broch in 4°

Journal de Pharmacie et de Chimie, mai 1844, in 8°

Journal de la Société de Médecine pratique de Montpellier, mai 1844, in-8°

Annales Médico-psychologiques; mai 1844; in-8°.

Journal des Connaissances médico-chirurgicales, mai 1844; in-8°.

Annales de Thérapeutique médicale et chirurgicale et de Toxicologie, mai 1844; in-8°.

Annales de la propagation de la Foi, mai 1844, in-8°.

Bulletin de l'Académie royale de Médecine de Belgique; années 1841 et 1842, n^{os} 2 et 3, années 1842 et 1843, n^o 11; année 1844, n^{os} 1 à 5, in-8°.

Bibliothèque universelle de Genève, mars 1844; in-8°.

Supplément à la Bibliothèque universelle de Genève. Archives de l'Électricité; par M. DE LA RIVE; tome IV, n^o 13, in-8°.

Tabulæ Anatomiarum comparativam illustrantes quas exhibuit C-G CARLS, junctus cum A.-G. OTTO; pars VI; in-fol.

Astronomische... Nouvelles astronomiques de M. SCHUMACHER, n^o 503; in-4°.

Bericht uber... Analyse des Mémoires lus à l'Académie des Sciences de Berlin, et destinés à la publication, février 1844; in-8°.

Fenomeni... Phénomènes physico-chimiques des Corps vivants; par M. MATTEUCCI, Pise, 1844; 1^{re} partie.

Gazette médicale de Paris; n^o 19.

Gazette des Hôpitaux; n^{os} 53 à 55.

L'Écho du Monde savant; n^{os} 36 et 37.

L'Expérience; n^o 358, in-8°.

OBSERVATIONS METEOROLOGIQUES. — AVRIL 1844.

JOURS du MOIS	9 HEURES DU MATIN.			MIDI.			3 HEURES DU SOIR.			9 HEURES DU SOIR.			THERMOMÈTRE		ÉTAT DU CIEL.		VENT.
	BAROM. à 0°	THERM. à 11°	MOISURE	BAROM. à 0°	THERM. à 11°	MOISURE	BAROM. à 0°	THERM. à 11°	MOISURE	BAROM. à 0°	THERM. à 11°	MOISURE	MAXIMA.	MINIMA.			
1	762,58	+9,4		761,58	+15,1		761,03	+17,4		761,82	+12,2		+18,6	+1,1	Becu		E
2	761,73	+12,1		760,77	+19,6		759,25	+18,2		757,73	+10,4		+19,8	+5,6	Becu		SSE
3	755,66	+14,6		754,63	+19,5		752,58	+20,3		751,35	+13,0		+21,5	+5,1	Becu		SSE
4	749,50	+13,5		749,01	+18,6		748,19	+20,4		749,04	+11,5		+17,5	+7,2	Becu		SSE
5	752,72	+13,3		753,13	+18,4		753,48	+14,8		754,32	+8,9		+17,5	+7,8	Tres nuageux		S
6	752,72	+9,8		753,13	+18,4		753,48	+14,8		754,32	+8,9		+17,5	+7,8	Couvert		S
7	752,72	+9,8		753,13	+18,4		753,48	+14,8		754,32	+8,9		+17,5	+7,8	Becu		SSE
8	752,72	+9,8		753,13	+18,4		753,48	+14,8		754,32	+8,9		+17,5	+7,8	Becu		SSE
9	769,60	+11,3		768,87	+16,5		763,36	+19,8		767,35	+9,8		+18,3	+5,6	Becu		NNE
10	768,79	+12,5		765,32	+17,3		761,84	+18,1		767,35	+9,8		+18,3	+5,6	Becu		NNE
11	757,43	+10,8		756,85	+17,2		756,50	+18,8		760,90	+13,0		+19,4	+4,9	Vapours		NNE
12	757,43	+10,8		756,85	+17,2		756,50	+18,8		760,90	+13,0		+19,4	+4,9	Couvert		NNE
13	757,43	+10,8		756,85	+17,2		756,50	+18,8		760,90	+13,0		+19,4	+4,9	Couvert		NNE
14	757,43	+10,8		756,85	+17,2		756,50	+18,8		760,90	+13,0		+19,4	+4,9	Couvert		ONO
15	757,43	+10,8		756,85	+17,2		756,50	+18,8		760,90	+13,0		+19,4	+4,9	Couvert		ONO
16	757,43	+10,8		756,85	+17,2		756,50	+18,8		760,90	+13,0		+19,4	+4,9	Couvert		ONO
17	757,43	+10,8		756,85	+17,2		756,50	+18,8		760,90	+13,0		+19,4	+4,9	Couvert		ONO
18	757,43	+10,8		756,85	+17,2		756,50	+18,8		760,90	+13,0		+19,4	+4,9	Couvert		ONO
19	757,43	+10,8		756,85	+17,2		756,50	+18,8		760,90	+13,0		+19,4	+4,9	Couvert		ONO
20	757,43	+10,8		756,85	+17,2		756,50	+18,8		760,90	+13,0		+19,4	+4,9	Couvert		ONO
21	757,43	+10,8		756,85	+17,2		756,50	+18,8		760,90	+13,0		+19,4	+4,9	Couvert		ONO
22	757,43	+10,8		756,85	+17,2		756,50	+18,8		760,90	+13,0		+19,4	+4,9	Couvert		ONO
23	757,43	+10,8		756,85	+17,2		756,50	+18,8		760,90	+13,0		+19,4	+4,9	Couvert		ONO
24	757,43	+10,8		756,85	+17,2		756,50	+18,8		760,90	+13,0		+19,4	+4,9	Couvert		ONO
25	757,43	+10,8		756,85	+17,2		756,50	+18,8		760,90	+13,0		+19,4	+4,9	Couvert		ONO
26	757,43	+10,8		756,85	+17,2		756,50	+18,8		760,90	+13,0		+19,4	+4,9	Couvert		ONO
27	757,43	+10,8		756,85	+17,2		756,50	+18,8		760,90	+13,0		+19,4	+4,9	Couvert		ONO
28	757,43	+10,8		756,85	+17,2		756,50	+18,8		760,90	+13,0		+19,4	+4,9	Couvert		ONO
29	757,43	+10,8		756,85	+17,2		756,50	+18,8		760,90	+13,0		+19,4	+4,9	Couvert		ONO
30	757,43	+10,8		756,85	+17,2		756,50	+18,8		760,90	+13,0		+19,4	+4,9	Couvert		ONO
1	759,43	+11,4		758,90	+15,5		758,20	+16,5		758,60	+10,8		+17,8	+5,6	Moy du 1 ^{er} au 10		Pluie en centimètres
2	759,43	+11,4		758,90	+15,5		758,20	+16,5		758,60	+10,8		+17,8	+5,6	Moy du 11 au 20		Contr. 0,928
3	759,43	+11,4		758,90	+15,5		758,20	+16,5		758,60	+10,8		+17,8	+5,6	Moy du 21 au 30		Terr. 0,860
	759,43	+11,4		758,90	+15,5		758,20	+16,5		758,60	+10,8		+17,8	+5,6	Moyenne du mois		+ 12,7

COMPTE RENDU

DES SÉANCES

DE L'ACADÉMIE DES SCIENCES.

SÉANCE DU LUNDI 20 MAI 1844.

PRÉSIDENCE DE M. ÉLIE DE BEAUMONT.

MÉMOIRES ET COMMUNICATIONS

DES MEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE L'ACADÉMIE.

PHYSIOLOGIE VÉGÉTALE. — *Quatrième Notes relatives à la protestation faite dans la séance du 12 juin 1843, à la suite de la lecture du Mémoire de M. de Mirbel, ayant pour titre Recherches anatomiques et physiologiques sur quelques végétaux monocotylés, par M. CHARLES GAUDICHAUD*

PREMIÈRE PARTIE

« Tout ce que nous avons avancé dans nos trois premières Notes sur les développements méristhaliens des monocotylées, s'applique surtout aux dicotylées

» Ce sont partout les mêmes causes et les mêmes effets, modifiés seulement par les types organiques des classes, des familles, des genres.

» Ne répétons donc pas ce que nous avons dit et redit à satiété en traitant des monocotylées, de l'origine et du développement des individus vasculaires ou phytons, de leur composition organique, de leurs méristhalles ou système ascendant, qui produit l'accroissement en hauteur; de leur système descendant, radicaire ou ligneux, qui produit l'accroissement en lar-

geur, etc., puisque nous ne pourrions que reproduire ce que renferment nos précédentes Notes, et ce qui est peut-être assez convenablement exprimé dans nos *Recherches générales sur l'Organographie*, ouvrage qui, maintenant, est dans les mains de tous les membres de cette Académie.

» Bornons-nous donc, pour ne pas abuser trop des moments qu'on veut bien nous accorder, à constater que, dans les dicotylées, il y a constamment deux ou plusieurs cotylédons complets ou incomplets, et qu'à part cela, les phénomènes d'accroissement en hauteur et en largeur sont, et d'une manière plus évidente encore, de tout point semblables à ceux des monocotylées.

» Ici, messieurs, les faits ne nous manqueront pas, puisque j'en ai par milliers à vous montrer.

» J'ai dû me borner, à cause de l'espace, à ceux qui sont sur ce bureau

» Le but que je dois aujourd'hui chercher à atteindre, est de vous prouver que les tissus vasculaires ligneux se forment de haut en bas, et que, généralement, ils descendent depuis les bourgeons jusqu'à l'extrémité des racines.

» Entrons donc de suite et rapidement dans les démonstrations.

» J'ai pris plusieurs tronçons de racine de *Marlura*, et j'en ai fait des boutures (1). Ces racines n'avaient ni feuilles, ni bourgeons, ni radicelles.

» Au bout d'un certain temps, j'ai vu une sorte de végétation cellulaire se produire au sommet de ces boutures, entre l'écorce et le bois, et, plus rarement, sur quelques parties cellulaires du bois lui-même.

» J'ai soigneusement étudié ces cellules, d'abord à l'époque de leur apparition, et plus tard, lorsqu'elles avaient formé une sorte de bourrelet cellulaire haut de 1 à 2 millimètres. C'est alors que j'ai pu voir que plusieurs d'entre elles s'animaient et se convertissaient rapidement en bourgeons.

» Des expériences très-difficiles, mais qui ont complètement réussi, m'ont prouvé que dès que ces cellules animées sont arrivées à l'état de phytons ou de premiers individus des bourgeons, elles envoient des prolongements radiculaires sur le corps ligneux préexistant des tronçons de racines.

» On sait maintenant que les racines n'ont pas de canal médullaire, et conséquemment pas de trachée.

» Les trachées qui apparaissent dans les nouvelles productions des bourgeons s'y créent donc naturellement

» C'est pour cela que j'ai choisi, pour la démonstration de ce fait, des tronçons de racines.

(1) Voyez GAUDICHAUD, *Organographie*, Pl. XIII, fig. 6, 7, 8.

Il est inutile de dire que, sur des racines entières naturellement fixées au sol et également coupées transversalement, le même phénomène a lieu et qu'il se produit avec non moins de facilité sur des troncs (1), des branches et des rameaux, comme sur des fragments de ces parties.

Si le bourgeon se développe au-dessous du sommet tronqué de la bouture de la racine entière, du tronc de la branche ou du rameau, tout ce qui sera situé au-dessus des bourgeons ne tardera pas à mourir. L'enun sommairement indique les causes dans mes troisièmes Notes.

Il est aujourd'hui bien inutile de dire que, dès que le premier individu ou phytion est arrivé à un certain degré d'organisation, il donne naissance à un second, le second à un troisième etc. qui tous envoient successivement leurs tissus radiculaires à la surface du corps ligneux de la bouture, de manière à ce que les vaisseaux radiculaires du dernier individu formé enveloppent tous les autres.

Sur une première bouture les tissus radiculaires étaient à peine visibles au-dessous du point d'attache des bourgeons. Sur une seconde, observée un peu plus tard, ils descendaient au tiers supérieur de la longueur, sur une troisième, qui était plus avancée ils descendaient un peu plus bas et enfin plus bas encore sur une quatrième, sur une cinquième, ils atteignaient la base de la bouture, mais sans former encore de racines.

Ce ne fut que vers la fin de l'année que j'obtins des racines à la base de quelques-unes de ces boutures.

Dans cette dernière expérience, on voit très-distinctement les vaisseaux radiculaires descendre le long des rameaux, passer sur la tige, et de là dans les racines nouvelles.

Ces faits des plus concluants, et qui me semblent ne rien laisser à désirer, vont nous donner l'explication exacte de tous ceux que je vais faire passer sous vos yeux.

Vous comprendrez, messieurs, que puisque nous prouvons que des bourgeons qui se forment de toutes pièces à l'une des extrémités d'une bouture de racine, envoient des vaisseaux radiculaires d'abord sur les tissus ligneux de cette bouture, puis dans les racines qui se sont produites à sa base, à plus forte raison nous obtiendrons les mêmes résultats d'une greffe, c'est-à-dire de bourgeons tout formés et entés naturellement sur les jeunes rameaux d'un individu, et que nous enleverons pour les transporter et

(1) *Feyer Gaudichaud, Organographie, Pl. XVII, fig. 8*

pour ainsi dire les planter sur un sujet différent, mais de nature analogue, au lieu de les mettre en terre pour en former des boutures. Une greffe n'est donc autre chose qu'un bourgeon qui, au lieu de naître naturellement sur un sujet végétal, est porté tout formé sur ce végétal, auquel il se lie au moyen de ses tissus cellulaires et de toutes ses productions radiculares.

Il n'y a donc, sous ce rapport, aucune espèce de différence dans les phénomènes organographiques qui se produisent entre les bourgeons qui naissent naturellement sur un végétal et les bourgeons qui y sont greffés.

Seulement, si l'on greffe du bois rouge sur du bois blanc, toutes les puties qui se trouveront dans les limites de la greffe seront rouges et produiront des bourgeons à bois rouge, tandis que les autres resteront blanches et ne produiront jamais que des bourgeons à bois blanc.

Dans notre *Physiologie*, où ce curieux phénomène est traité très au long, nous prouverons, mieux que nous ne l'avons peut-être fait encore, que ce sont les mêmes vaisseaux qui couvrent les deux sortes de bois, et que leurs colorations différentes ne sont qu'apparentes, et dues seulement aux milieux divers qu'ils traversent.

Voici des greffes desséchées de bois rouge sur bois blanc, mais qui ont en partie perdu leurs couleurs par la dessiccation et le temps, mais je vous en apporte aussi de fraîches, sur lesquelles le phénomène est fortement marqué.

Que l'Académie me permette de lui rappeler que, dans le temps, j'ai fait des injections dans ces greffes, et que même j'ai introduit des chaux dans le bois rouge, et qu'ils sont allés sortir par le bois blanc, et *vice versa* (1).

Maintenant que nous savons qu'une bouture quelconque, soit de rameau, soit de tige, de racine, de feuille ou de n'importe quelle autre partie végétale vivante (2), peut produire des bourgeons, maintenant que nous savons que ces bourgeons commencent par une cellule, et que cette cellule animée produit un premier phyton double dans les dicotylées, que ce premier phyton en produit un second, le second un troisième, etc., maintenant enfin que nous connaissons ces phytons, leur système ascendant qui produit l'accroissement en hauteur, leur système descendant qui, avec le rayonnement des fluides cellulifères, produit l'accroissement en largeur, nous pou-

1) Voyez GAUDICHAUD, Recherches sur les vaisseaux tubuleux, *Annales des Sciences naturelles* mars 1841.

(2) Voyez GAUDICHAUD *Organogénie*, Comptes rendus, t. XIV, p. 973 et suivantes.

vons aborder franchement tous les phénomènes connus de l'organographie, et les expliquer d'une manière normale

Partout et toujours nous trouverons les mêmes causes et les mêmes effets

Il serait donc superflu d'entrer ici dans de nouveaux développements sur la théorie des méristèmes, chacun la connaît aujourd'hui (1)

La question qui domine dans cette discussion si complexe, est celle du développement en diamètre des tiges, et de savoir si elles s'accroissent de haut en bas ou de bas en haut. Celles-ci résoudront presque toutes les autres

Prouvons donc, par des faits incontestables, que l'accroissement en diamètre des tiges s'opère de haut en bas, et que, comme je l'ai dit dans mon *Organographie* (2), il ne monte dans les tiges que des principes nourriciers et en voie d'élaboration, et que tous les principes élaborés, organisateurs ou organisés, descendent et se solidifient progressivement du sommet du végétal à sa base

La première preuve qui s'offre à nous est celle de la décortication circulaire

Si, au premier printemps, au moment où l'écorce commence à se détacher du bois, on enlève une bande circulaire, régulière ou irrégulière d'écorce, on ne tarde pas à voir un bourrelet se former au bord supérieur de cette décortication (3)

On sait que, malgré cette opération, le végétal peut vivre encore un grand nombre d'années, et que, chaque année, le bourrelet reçoit une nouvelle couche de tissus ligneux

Il arrive souvent que le bourrelet, gagnant de proche en proche du sommet à la base de la cicatrice (4), finit par la franchir et par atteindre le

(1) Comme je l'ai dit dans mon *Organogénie*, cette théorie offrira sans doute quelques exceptions, mais sans cesser d'être générale et vraie. Quelle science d'ailleurs n'a pas les siennes? Ces exceptions, dès qu'elles seront bien connues et constatées, loin d'être un obstacle, nous ouvriront au contraire de nouvelles voies pour les classifications botaniques et organographiques. Dès que nous connaîtrons de nouveaux effets, nous en rechercherons les causes

(2) Voyez GAUDICHAUD, *Organographie*, page 46

(3) *Ibid.*, id., Pl. XVI, fig. 19, 21, Pl. XVII, fig. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10. *Magnificolobium pictoretense*, t. XII, p. 53, fig. 3

(4) *Ibid.*, id., Pl. XVII, fig. 1, 2, 3, 6, 13

bord inférieur Dans ce cas, les tissus ligneux, des qu'ils ont atteint le bord inférieur, reprennent leur cours naturel vers la base du végétal, et la plaie finit souvent par se combler.

A plus forte raison, ce phénomène a lieu lorsque, à la place d'enlever un anneau complet d'écorce, on laisse une bande de cette écorce pour réunir la partie supérieure à l'inférieure.

Dans ce cas, le bourrelet ne devient pas très-gros, les tissus ligneux, trouvant un passage libre, s'y portent et vont au dessous reprendre leur cours naturel de descension (1).

Ainsi donc, non-seulement la théorie, mais des faits matériels prouvent que, dans tous les cas de decortications, les bourrelets se forment au bord supérieur de la plaie, et jamais à la base, que ces bourrelets peuvent s'accroître progressivement jusqu'au point de réunir le bord supérieur à l'inférieur, et que, lorsqu'on laisse persister une bande d'écorce de la partie supérieure d'une decortication partielle à la partie inférieure, tous les tissus ligneux se dirigent vers cette sorte de pont pour aller reprendre au-dessous la direction et, à peu de chose près, le même ordre qu'ils avaient au-dessus.

Il n'y a jamais de bourrelet naturel au bord inférieur de la decortication lorsque celle-ci est complète. L'on expliqua, dans mon *Organographie*, les causes qui en déterminent quelquefois la formation dans les decortications partielles (2), dans les broussins (3), etc. Dans ce cas, les vaisseaux tendent à remonter, sans doute, mais pour redescendre après.

» Mais, si la plante se trouve dans les conditions favorables d'exposition, d'humidité, de chaleur, etc., on voit souvent apparaître au bord inférieur d'une decortication circulaire complète ou partielle, comme nous venons de le voir sur les boutures de racines de *Maclura*, sur des tiges coupées transversalement, etc., non un bourrelet ligneux, puisque cela est impossible, mais quelque chose qui en a l'apparence, apparence qui, jusqu'à ce jour, a trompé un grand nombre de très-bons observateurs (4).

Quand les conditions que je viens d'énumérer existent, on distingue une tuméfaction remarquable à ce bord inférieur. Elle est produite, exactement comme dans le premier fait que je vous ai cité, par une végétation cellulaire,

(1) Voyez GAUDICHAUD, *Organographie*, Pl. XVI fig. 20.

(2) *Ibid.* id., Pl. XVI, fig. 9 à 15.

(3) *Ibid.* id., Pl. XVII, fig. 15.

(4) *Ibid.* id., Pl. XVII, fig. 1, 2, 7, 8.

mais uniquement cellulaire, dans laquelle des cellules nombreuses s'unissent pour former des bourgeons.

Des que ces bourgeons sont organisés, ils envoient leurs prolongements ligneux de haut en bas, comme ceux qui sont situés au-dessus de la décortication envoient les leurs jusqu'au bord supérieur de cette même décortication (1).

Voici de nombreux exemples de ce fait.

Mais il en est plusieurs sur lesquels je désire fixer l'attention de l'Académie.

Le premier nous est fourni par la racine dénudée d'un jeune peuplier auquel j'ai enlevé à la base, et tout près du sol, un anneau d'écorce. J'ai enveloppé de linge et de papier la partie inférieure de cette décortication, je l'ai ensuite en grande partie recouverte de terre, et j'ai soigneusement maintenu cette terre dans un état constant d'humidité. Le bord inférieur de la plaie s'est fortement tuméfié et, à la place de quelques bourgeons qui se seraient produits, comme dans les cas ordinaires, j'en ai obtenu cent cinquante et plus de tous les âges.

L'expérience a été faite le 5 juin 1842 et recueillie le 5 juillet de la même année.

Ainsi donc, en un mois de temps, j'ai déterminé la formation d'un millier peut-être de bourgeons qui, pour la plupart, se sont développés et ont formé d'assez gros rameaux.

Les prolongements radiculaires de ces bourgeons naissants et de ces rameaux ont produit sur cette base un accroissement ligneux plus considérable que celui de la partie supérieure qui recevait les tissus ligneux de l'arbre entier.

Mais je dois dire, pour être toujours vrai, que l'arbre avait un peu souffert de l'opération et peut-être aussi de la chaleur, et qu'au moment où j'ai fait l'expérience, les feuilles étant presque toutes développées, avaient antérieurement envoyé, sur le tronc, tous leurs tissus radiculaires.

Un second exemple a été obtenu de la même manière, et dans des circonstances tout à fait semblables, sur un jeune ormeau.

Les rameaux qui couronnent le bord inférieur de la décortication ayant acquis une assez grande vigueur, il me vint à la pensée de couvrir de terre toute sa plaie, de manière à ne laisser au-dessus du sol que l'extrémité des rameaux. Un mois environ après, j'arrêtai l'expérience et je trouvai au bord

(1) Foyes GAUDICHAUD, *Organographie*, Pl. XVI, fig. 19.

supérieur un grand nombre de racines qui descendent vers le sol en se croisant sur la cicatrice avec les rameaux. Ces racines ont été coupées ou brisées, mais on en voit distinctement les bases.

Cette expérience prouve deux faits déjà parfaitement établis par Dubamel du Monceau et par moi, que les tissus ligneux radiculaires du bord supérieur produisent des racines, et les tissus cellulaires du bord inférieur des bourgeons.

Mais il est des expériences fort simples qui démontrent la descension des tissus radiculaires ligneux de manière à lever tous les doutes et à fournir toutes les convictions.

Voici des pièces qui, à elles seules, resument toute la question.

Au mois de septembre 1841, j'ai fait, sur un rameau de frêne, une décollation circulaire. A cette époque, les feuilles étaient fanées par vétusté et commençaient même à se détacher de l'arbre, la végétation annuelle de cet arbre était donc achevée. Ce qui le prouvait bien encore, c'est que son écorce adhérait déjà assez fortement au bois. Je parvins cependant, quoiqu'avec peine, à la détacher complètement, puis j'abandonnai, pendant l'hiver, cette expérience à l'action du temps.

Le 15 avril 1842, au moment où les feuilles commencent à se développer, et où quelques-unes seulement étaient déjà formées au sommet du rameau, je détachai ce rameau de l'arbre, j'enlevai son écorce, qui alors se séparait avec facilité du bois, et le mis quelque temps à macérer dans l'eau fraîche.

Sur cette pièce, on voit distinctement, en outre d'un accroissement ligneux considérable, qui s'est opéré à la partie supérieure, un grand nombre de vaisseaux radiculaires qui descendent tout le long de ce bois, jusqu'au bord supérieur de la cicatrice, et qui s'arrêtent là, tandis que la partie inférieure, qui ne s'est que très-légèrement tuméfiée, n'offre pas un seul de ses vaisseaux (1).

Vous concevez, messieurs, que si ces vaisseaux montaient, le contraire aurait lieu : la base en serait chargée, et il n'y en aurait pas au sommet.

Ceci fait isole en dit plus que toutes les théories imaginables.

J'ai un grand nombre d'expériences analogues, actuellement en action, qui viendront confirmer celle-ci, et qui nous apprendront beaucoup d'autres choses encore. Car, quand nous aurons vidé cette question du dévelop-

(1) Cette pièce, que j'ai aussi prêtée au *Magasin pittoresque*, a été gravée, t. XII, p. 53, fig. 4.

pement des tissus ligneux, question qui, je l'espère, touche à sa fin, nous aurons toutes les questions physiologiques de la formation de l'écorce à aborder, et nous les aborderons

» Il est, je pense, fort inutile de dire que la plupart des pièces que j'ai l'honneur de montrer à l'Académie ont été tentées dans le but de démontrer dans leurs généralités les principaux phénomènes de la physiologie, phénomènes qu'il serait presque ridicule d'aborder avant de savoir exactement ce que c'est qu'un végétal, et comment il naît et se développe en tous sens. Ce que je puis dire, par anticipation, c'est que tous les principes de la physiologie, et par là j'entends une physiologie rationnelle établie sur des expériences et démontrée par des faits, viennent fortifier les principes d'organographie que je soutiens, et leur donner une nouvelle sanction

Le rameau que j'ai l'honneur de vous montrer a été coupé au ras du tronc. On voit, à sa base, deux ou trois vaisseaux radiculaires des rameaux supérieurs qui passent dessus, mais qui ne remontent pas

Si tous les bourgeons en se développant, envoient de haut en bas leurs faibles lineaments radiculaires, si les feuilles qui se développent en août fournissent aussi les leurs et si un rayonnement de fluides cellulifères vient ensuite à la fin de l'année et pendant l'hiver, envelopper tous ces tissus radiculaires, on doit nécessairement ne plus les apercevoir au moment qui précède la végétation printanière

C'est en effet ce qui a lieu et ce que cette nouvelle pièce va nous de montrer

Le 15 du mois d'août 1843, j'ai fait une décoction circulaire sur un jeune frêne. Les feuilles qui se développaient encore à cette époque et les bourgeons qui s'accomplissaient pour la végétation de 1844, ont naturellement envoyé leurs vaisseaux radiculaires sur la partie supérieure de cette tige, mais lorsque ceux-ci ont cessé de se produire, le rayonnement cellulaire, qui a continué sa marche, est venu les recouvrir. Les choses sont restées en cet état pendant l'hiver

» Cette pièce a été cueillie le 5 avril 1844, avant l'épanouissement des bourgeons et, conséquemment avant l'arrivée, sur cette partie supérieure, des vaisseaux radiculaires des nouveaux individus qui s'engendraient ou qui achevaient de se constituer dans ces bourgeons

» J'ai eu beaucoup de peine à détacher l'écorce du bois, surtout dans la partie inférieure, où elle adhère aussi fortement qu'en hiver

Si vous voulez bien examiner cette pièce, vous ne trouverez pas un

seul vaisseau radulaire à la surface de la partie supérieure, et encore moins à sa partie inférieure

Voici maintenant une nouvelle pièce préparée à la même époque (15 août 1843) et recueillie le 9 mai, au moment où presque toutes les feuilles étaient en voie de développement. Toute sa partie supérieure est couverte de vaisseaux ligneux radulaires, et, comme vous pouvez vous en convaincre, il n'y en a pas de traces à la partie inférieure.

Le bord inférieur de la plaie était fortement tuméfié par la présence d'une masse considérable de tissu cellulaire qui, plus tard, eût infailliblement produit de nombreux bourgeons.

Vous voyez, messieurs, que puisque nous connaissons aussi bien les causes et les effets de ces développements divers, nous pouvons, en multipliant et en combinant bien nos expériences, obtenir tous les résultats que la nature peut produire, puisqu'elle s'est pour ainsi dire mise à notre disposition et qu'elle marche au gré de nos desirs, puisque nous pouvons prédire d'avance quels seront les résultats de toutes les expériences que nous pourrions faire. Il ne nous faut donc plus que du temps pour arriver à la démonstration complète du phénomène de l'accroissement des couches.

Avant de quitter la série des décolorations circulaires, rappelons que de fortes ligatures produisent des effets analogues (1), et citons encore quelques exemples remarquables.

» En voici un qui mérite peut-être l'attention de l'Académie.

Tout le monde a vu ces arbres à rameaux pendants dont les extrémités atteignent souvent le sol : les saules, *Sophora*, et frênes pleureurs.

J'ai enlevé un anneau d'écorce sur les rameaux de ces arbres, et le bourrelet s'est encore formé au bord supérieur réel de la cicatrice : quoique, par la position des rameaux, ce bord supérieur fût placé au-dessous de l'inférieur. Ce fait est assez important, en ce qu'il prouve que la force qui produit les développements ligneux réside dans les bourgeons, et que, quelle que soit la position des végétaux ou de leurs parties, elle agit toujours dans le même sens, c'est-à-dire du sommet à la base.

Voici des expériences qui ne sont pas moins dignes d'intérêt.

» La première nous est fournie par un jeune saule sur lequel j'ai fait trois décolorations circulaires assez rapprochées. Au bord supérieur de la première, il s'est formé un très-gros bourrelet. Les deux lambeaux d'écorce sé-

(1) Voyez GAUDICHAUD, *Organographie*, Pl. XVI, fig. 1, 2, 3, 4.

parés par les trois décortications, ont forme des bourgeons adventifs dont les tissus radiculaires ligneux enveloppent circulairement la tige (1)

Sur des assez gros rameaux, qui se sont développés au dessous de la troisième plaie, y ont produit un notable accroissement ligneux

Sur cette autre tige de saule j'ai isolé deux jeunes bourgeons qui en se développant, ont envoyé leurs vaisseaux radiculaires jusqu'au bord supérieur de la seconde décortication exactement comme tous ceux de l'arbre ont envoyé les leurs au bord supérieur de la première au-dessous le même phénomène se reproduit encore (2)

Il se frene comme l'on sait à les feuilles et conséquemment les bourgeons opposés Les merithales tigellaires, dans les rameaux de cet arbre sont souvent très-allongés ici il en est qui n'ont pas moins de 25 centimètres

J'ai, par des décortications circulaires, isolé alternativement les parties de la tige qui portent des bourgeons et celles qui en sont privées Il n'y a pas eu d'accroissement ligneux dans ces dernières parties, auxquelles il a été extrêmement difficile d'enlever l'écorce, tandis que dans les autres, qui se sont écorcées avec la plus grande facilité on voit très distinctement les vaisseaux radiculaires qui descendent des bourgeons, et vont jusqu'au bord supérieur des cicatrices qui les limitent intérieurement

Dans cette expérience, et dans toutes celles qui sont de la même nature on remarque que les vaisseaux radiculaires naissants sont très petits comparativement aux anciens, qui pourtant ne datent que du commencement de l'année Les vaisseaux grandissent donc Cette expérience a été faite du 15 juin au 15 juillet 1843

Ainsi donc, si nous isolons, d'une manière quelconque des bourgeons sur certaines parties des tiges, soit par des décortications circulaires, ovales et autres, nous obtiendrons à part tous les produits ligneux de ces bourgeons

Voici une expérience dans laquelle j'ai isolé, sur un saule, deux bourgeons axillaires, dont les tissus ligneux descendent jusqu'au bord inférieur de la bande d'écorce conservée On voit que ces tissus ligneux marchent régulièrement jusque près de la base, et que là, se trouvant gênés dans leur mouvement, ils se mêlent en formant une espèce de remous

Si, maintenant, nous isolons une partie d'écorce privée de bourgeons, nous aurons encore un léger accroissement ligneux mais uniquement cellu-

(1) J'ai obtenu des faits analogues sur des monocotylées (*Dracæna*)

(2) M. Gaudichaud montre à l'Académie toutes ces anatomies

laire, tant qu'il ne s'animerait pas de cellules et qu'il ne se produirait pas de bourgeons

Dans l'exemple que je mets sous les yeux de l'Académie, un grand nombre de cellules du bord supérieur de l'écorce se sont animées, et quoiqu'elles soient restées à l'état rudimentaire et en quelque sorte cachées, il est facile de voir qu'elles ont envoyé quelques prolongements radiculaires qui, tout réduits et imperceptibles qu'ils sont à l'œil nu, peuvent facilement se démontrer par le microscope

Les tissus radiculaires des cellules animées et latentes ne sont pas les seuls vaisseaux qu'on remarque dans le petit bourrelet qui se forme à la base de ce lambeau isolé d'écorce. L'expérience m'a aussi prouvé que les vaisseaux radiculaires anciens, abrités du contact de l'air par cette écorce, conservent longtemps encore leur vitalité, et que, dans certains cas, ils peuvent produire des ramifications très-déliées, qui descendent aussi jusqu'au bord inférieur. Mais je décrirai et figurerai, j'espère, un jour ce curieux phénomène, si j'arrive à publier mes principes d'organographie dans tout leur ensemble

THEORIE DES NOMBRES — *Nouvelle démonstration d'un théorème sur les irrationnelles algébriques, insérée dans le Compte rendu de la dernière séance, par M. LIOUVILLE*

Soient $x, x_1, x_2, \dots, x_{n-1}$ les n racines (la première réelle, les autres réelles ou imaginaires) de l'équation algébrique

$$f(x) = ax^n + bx^{n-1} + \dots + gx + h = 0,$$

que l'on peut supposer irréductible, et où a, b, \dots, g, h sont des entiers positifs, nuls ou négatifs, comme on voudra. Désignons par $\frac{p_1}{q_1}, \frac{p_2}{q_2}$ deux réduites consécutives de la fraction continue dans laquelle x se développe, et par z le quotient complet qui vient après, en sorte que l'on ait

$$\frac{p}{q} - x = \pm \frac{1}{q(qz + q_1)}$$

Enfin, posons

$$f(p, q) = q^n f\left(\frac{p}{q}\right) = ap^n + bp^{n-1}q + \dots + hq^n$$

Par la décomposition de $f\left(\frac{p}{q}\right)$ en facteurs, opérée à l'aide des racines $x,$

x_1, \dots, x_{n-1} , on trouve

$$\frac{p}{q} - x = \pm \frac{1}{q(q^2 + q)} = \frac{f(p, q)}{q^2 a \left(\frac{p}{q} - x \right) \left(\frac{p}{q} - x_{n-1} \right)}$$

Or, à mesure que la réduite $\frac{p}{q}$ converge vers x , la quantité

$$a \left(\frac{p}{q} - x_1 \right) \left(\frac{p}{q} - x_{n-1} \right)$$

converge aussi vers une limite finie, savoir,

$$a(x - x_1)(x - x_{n-1}),$$

il y a donc un certain maximum A au-dessous duquel elle restera toujours. D'un autre côté, $f(p, q)$ est un nombre entier, au moins égal à l'unité abstraction faite du signe. On a donc

$$\frac{1}{q(q^2 + q)} > \frac{1}{Aq^2},$$

d'où

$$z < Aq^{n-2} - \frac{q_1}{q} < Aq^{n-2},$$

inégalité qui subsiste, à plus forte raison, quand on substitue au quotient complet z la partie entière qu'il contient, c'est à dire le quotient incomplet μ . Le théorème que nous avons en vue est ainsi démontré d'une manière simple, sans qu'on ait eu besoin de recourir à la formule de Lagrange dont nous avons d'abord fait usage. On peut, du reste, appliquer une méthode semblable aux divers genres de développements dont les quantités irrationnelles sont susceptibles, et obtenir par là des résultats intéressants.

PHYSIQUE — *Mémoire sur les causes de l'altération de la force magnétique*, par M. le docteur DE HALDAT (Extrait par l'auteur)

Bien que plusieurs des causes de l'altération de la force magnétique aient été indiquées, la question générale n'ayant pas fixé d'une manière particulière l'attention des physiciens, M. de Haldat, pensant que son examen pouvait répandre quelque lumière nouvelle sur la théorie du magnétisme, a entrepris une suite d'expériences sur chacune des causes les plus efficaces de l'altéra-

tion d'une force qui semblerait devoir une fois développée, se conserver indéfiniment. Les résultats de ces recherches sont consignés en un Mémoire divisé en autant d'articles que l'on connaît de causes de ces changements remarquables.

La première, des longtemps connue et qui avait été le sujet de recherches de la part de MM. Kupfer et Pouillet, a été soumise à un mode nouveau. L'examen au moyen d'un appareil composé d'un barreau aimanté et d'une aiguille magnétique dont le nombre des oscillations, en un temps donné et constant, représentait les alterations de la force magnétique dans ce barreau soumis à divers degrés de température. Celle à laquelle il a été exposé n'a pas été bornée aux degrés inférieurs de l'échelle thermométrique, mais poussée jusqu'aux degrés qui déterminent l'incandescence. Elle a été appliquée d'abord au moyen d'un bain d'huile, ensuite avec des lampes à alcool dont la flamme l'enveloppait de toutes parts. Sous l'influence de ces températures variables la force magnétique a éprouvé des altérations qui ont été représentées par des oscillations dont le nombre décroissant a été de 90 à 42 par minute de $+ 0$ à 300 degrés Réaumur, et de 300 à l'incandescence de 42 à 24, nombre d'oscillations que l'aiguille donnait sous la seule influence de la terre. Cette nombreuse suite d'expériences a prouvé que l'altération de la force magnétique est insensible pour les degrés inférieurs de l'échelle thermométrique de $+ 10$ à $+ 20$ degrés Réaumur, qu'elle est progressive avec l'augmentation de la température, que cette force peut se reproduire partiellement dans un aimant tant que sa température n'a pas atteint le degré de l'incandescence, qu'à ce degré comme l'avait prouvé M. Pouillet le fer ou l'acier non-seulement perdait la force magnétique acquise, mais devenait absolument impropre à l'acquiescer. L'auteur a observé que cette impuissance du fer ne subsistait que lorsque l'incandescence était totale, l'abaissement de température de la plus petite partie lui rendant partiellement son énergie. L'altération de la force magnétique, par l'incandescence partielle d'un aimant, a été reconnue par le moyen d'un fantôme magnétique qui a présenté des différences, selon que le centre ou les pôles ont été soumis à l'influence de cette puissante modification. L'abaissement de température d'un aimant au dessous de 0 degré n'ayant pu être poussé au dessous de $- 25$ degrés Réaumur, n'a donné qu'un seul résultat, c'est que la force de l'aiguille aimantée ne peut être altérée qu'à une température bien inférieure à ce degré.

• L'examen de l'influence du choc sur la force magnétique a prouvé que cette cause n'est efficace qu'autant que, produisant des vibrations énergiques, elle déplace les molécules intégrantes dans lesquelles résident les éléments de

la force d'un aimant, d'après quoi les vibrations productrices des sons demeurent impuissantes. Celles qui ont une grande énergie sont d'autant plus efficaces qu'elles sont plus violentes, que leur nombre est plus grand dans le même temps que la force magnétique de l'aimant est plus complète, d'où il résulte que, par ce moyen, on ne peut que l'affaiblir dans les aimants saturés et l'éteindre complètement que dans les aimants d'une faible énergie, tels que les lames d'acier sur lesquelles on trace les figures magnétiques.

L'écroutissage et la torsion, opérations par lesquelles sont produits des déplacements considérables dans les molécules intégrantes, ont présenté des résultats qui prouvent leur efficacité comme cause de l'altération du magnétisme. Une tige cylindrique d'acier de 31 millimètres de diamètre aimantée et pourvue d'une force représentée par 35 oscillations par minute, battue au marteau sur une enclume et réduite en une bandelette de 3 $\frac{1}{2}$ millimètres de largeur a perdu, par ce changement de forme, près de moitié de sa force. Rougie, puis aimantée de nouveau et tordue six fois autour de son axe elle a perdu le tiers de la force qu'elle avait acquise. Le déplacement des molécules intégrantes, par des causes violentes est donc aussi efficace, pour l'altération de la force magnétique, que les vibrations légères, les frictions, le sont pour son développement. La séparation violente ou arrachement brusque des aimants réunis par leur attraction mutuelle, soumise à un examen expérimental a présenté pour résultat une décroissance progressive dans la force magnétique qui a généralement diminué à mesure que les arrachements se sont répétés, mais cette décroissance s'est arrêtée à un terme au delà duquel la répétition de ces actions violentes est devenue impuissante. Un aimant auquel on avait enlevé la moitié de sa force a présenté le phénomène remarquable de la reproduction spontanée de cette force par le repos ou les intervalles entre les arrachements successifs. La cause générale de cette altération de la force magnétique a paru dépendre de sa concentration anormale vers les pôles des aimants.

L'influence mutuelle des aimants, dont la puissance est si efficace pour opérer l'altération de la force magnétique, a été étudiée par le moyen du fantôme magnétique dont les formes, dans son ensemble et dans ses détails, ont présenté le tableau des modifications de la force magnétique par l'influence des aimants, selon qu'ils agissent les uns sur les autres par les pôles de mêmes noms ou de noms différents, selon que ces pôles se correspondent entre eux ou correspondent aux centres des barreaux, selon qu'ils agissent les uns sur les autres par leur contact ou qu'ils agissent à distance.

• Les découvertes nombreuses et assez récentes de l'électro-magnétisme

laissant peu à désirer relativement à l'influence réciproque des aimants sur les courants et des courants sur les aimants l'article consacré à l'examen de cette cause d'altération de la force magnétique n'a pu comprendre que quelques remarques sur les effets combinés des courants qui développent la chaleur dans les aimants employés comme réophores, et dans les réophores magnétisables parcourus par des courants

RAPPORTS

CHIMIE — *Rapport sur un Mémoire de M. PAUL THENARD* préparateur de chimie au Collège de France, *sur les combinaisons du phosphore avec l'hydrogène*

(Commissaires MM Gay-Lussac, Regnault, Pelouze rapporteur)

Avant de rendre compte à l'Académie du Mémoire qui lui a été présenté par M. Thenard, nous croyons utile de mentionner rapidement les principaux travaux dont les phosphures d'hydrogène ont été l'objet

En chauffant le phosphore avec une dissolution de potasse caustique Gengembre chimiste français découvrit en 1783 un gaz composé de phosphore et d'hydrogène, doué de la propriété curieuse de s'enflammer spontanément au contact de l'air

On remarqua bientôt que ce gaz conservé sur l'eau ou sur le mercure perdait peu à peu son inflammabilité, et laissait déposer une matière jaune qu'on considéra comme du phosphore jusqu'en 1835, époque à laquelle M. Thénard démontra qu'elle consiste en un véritable phosphure d'hydrogène solide

Quelques années après la découverte de Gengembre, H. Davy fit l'observation que l'acide phosphoreux soumis à l'action de la chaleur donnait naissance à un gaz hydrogène phosphoré dépourvu de la propriété d'être spontanément inflammable et il considéra ce nouveau gaz comme différent de l'autre

La composition de ces phosphures d'hydrogène restait inconnue on savait seulement la nature de leurs principes constituants On ignorait les rapports qu'ils présentaient, soit entre eux, soit avec le gaz qui a perdu, après un certain temps de préparation, la propriété de brûler au contact de l'air froid

Plusieurs chimistes entreprirent de combler cette lacune, Thomson et Vuquelin cherchèrent à déterminer combien un volume de chacun des gaz

phosphores renferme d'hydrogene Le temps n'a pas confirmé les résultats de leurs analyses Les premières expériences exactes sur la composition des phosphores d'hydrogene sont dues à MM. Gay-Lussac et Thenard Ils trouverent que le gaz spontanément inflammable contient sensiblement une fois et demie son volume d'hydrogene

M. Houtou-Labillardiere, et plus tard M. Dumas, vérifiaient ce rapport dans les deux gaz phosphores

On admit, quoique sans preuve suffisante que le gaz spontanément inflammable contenait plus de phosphore que celui qui est dépourvu de cette propriété, et on les désigna en conséquence sous les noms de *gaz hydrogene perphosphore* et de *gaz hydrogene protophosphore* On supposa que le premier devait son inflammabilité à la proportion plus considérable de phosphore qu'il renfermait, et l'on crut expliquer la perte de cette inflammabilité par la perte même de cet excès de phosphore

M. Dumas qui fit paraître en 1826 un travail étendu sur ces gaz leur assigna les formules Ph H^2 et Ph H , dont la première représente la composition du gaz hydrogene spontanément inflammable, et la dernière celle du gaz non inflammable

Ces formules étaient généralement adoptées, et elles semblaient en effet parfaitement établies, lorsqu'en 1827, M. H. Rose émit des doutes sur leur exactitude, et contrairement à l'opinion de M. Dumas, il admit que le gaz qui s'enflamme dans l'air, à la température ordinaire, contient moins de phosphore que celui qui est dépourvu de cette propriété, et il lui assigna précisément la formule Ph H^2 , que M. Dumas avait donnée au gaz de Davy

Il admit en outre que le gaz qui avait perdu sur l'eau ou sur le mercure son inflammabilité était un mélange des deux autres gaz

Toutefois, en revenant plus tard (en 1832) sur cette question si délicate des phosphures d'hydrogene, M. Rose corrigea un point important de son précédent travail, et il conclut définitivement de ses nouvelles recherches que les gaz hydrogenes phosphores, quoique d'ailleurs si différents par leurs propriétés, présentent exactement la même composition, et ne sont conséquemment que des modifications isomériques l'un de l'autre

Dans l'espoir de découvrir la cause des différences que présentent les phosphures d'hydrogene relativement à leur combustibilité, M. Graham a soumis ces gaz à un nouvel examen les résultats auxquels cet habile chimiste est parvenu n'ont pas répondu à son attente, quant à l'explication qu'il cherchait, mais il n'en a pas moins trouvé des faits très-importants qui prouvent que des traces impondérables de matières peuvent communiquer

l'inflammabilité a un gaz qui ne la possède pas ou l'enlever a un gaz qui en est pourvu

Lafin M Lavoisier, qui a publié en 1835 (*Annales de Chimie et de Physique*, t I V) un travail remarquable sur les phosphures d'hydrogene, a été conduit a des inductions que les experiences de M Thenard ont transformées en conclusions certaines

» Maintenant que nous avons exposé les principaux points de l'histoire des phosphures d'hydrogene, il deviendra plus facile d'apprécier le but et l'importance du travail de M Thenard

Suivant ce chimiste, il existe trois combinaisons du phosphore avec l'hydrogene

» La premiere est solide, de couleur jaune C'est la substance que laisse déposer le gaz spontanément inflammable et qu'on avait prise, avant M Lavoisier pour du phosphore M Thenard, qui ne l'avait obtenue qu'en très-petite quantité et sans doute impure l'avait crue formée d'équivalents égaux de phosphore et d'hydrogene M Thenard, qui l'a préparée facilement et dans un parfait état de pureté, est arrivé a un résultat différent Il lui assigne la formule Pb^2H

Ce phosphure prend naissance dans beaucoup de circonstances, mais de ses divers modes de préparation, le meilleur consiste a recevoir dans l'acide chlorhydrique liquide le gaz spontanément inflammable Il y laisse déposer le phosphure solide qu'on lave a l'eau froide et qu'on dessèche rapidement dans la machine pneumatique

Le second phosphure d'hydrogene est le gaz non spontanément inflammable On l'obtient pur en projetant du phosphure de calcium dans de l'acide chlorhydrique presque fumant, au moyen d'un tube vertical plongeant dans le liquide acide

Il se forme, en même temps que ce gaz, une quantité considérable de phosphure solide qui reste en suspension dans l'acide chlorhydrique, sans y subir d'altération

Lorsqu'au lieu d'acide on emploie de l'eau, le gaz, comme on le sait, est toujours spontanément inflammable, mais il n'est jamais pur, il contient de l'hydrogene libre dont la proportion s'accroît avec la durée de l'expérience, et toutefois la quantité totale de gaz hydrogene phosphore obtenue avec le même poids de phosphure est plus grande avec l'eau qu'avec l'acide chlorhydrique Ces différences tiennent, d'une part, a ce qu'il se forme un hypo phosphite, et d'une autre part, a ce que le phosphure d'hydrogene solide produit d'abord, se décompose ensuite, tandis qu'avec l'acide chlorhydrique

il ne se forme pas ou il ne se forme que de traces d'acide hypophosphoreux et qu'au contraire, il se produit beaucoup de phosphure d'hydrogène solide qui reste inaltérable dans l'acide même.

Plusieurs corps, tels que le protochlorure de phosphore, les acides chlorhydrique, bromhydrique, etc., font perdre au gaz obtenu avec l'eau et le phosphure de calcium son inflammabilité spontanée; il la perd aussi peu à peu, surtout à la lumière, au seul contact des parois des vases dans lesquels on le conserve. Dans ces diverses circonstances, il laisse déposer du phosphure d'hydrogène solide et se change en hydrogène phosphoré non spontanément inflammable.

C'est en cherchant l'explication de ces faits, c'est en les analysant avec habileté et pénétrance que M. Paul Thénard a découvert une nouvelle combinaison de phosphore et d'hydrogène dont l'existence est venue jeter la plus vive lumière sur les causes de l'inflammabilité du gaz hydrogène phosphoré.


Il avait trouvé un moyen simple et facile de saturer profondément la chaux de phosphore; il avait vu qu'en projetant peu à peu le composé qui en résulte dans de l'acide chlorhydrique très faible, il se déposait quelquefois une matière poisseuse qui, au contact de l'eau, prenait feu tout à coup, et il réfléchit que cette matière, en se réduisant en vapeur dans le gaz hydrogène phosphoré, pourrait bien être la cause de la facile inflammabilité que ce gaz présente quelquefois.

» Guidé par ses observations et par l'examen approfondi qu'il avait fait des hydrogènes phosphorés, M. Thénard fit passer le gaz obtenu avec l'eau et le phosphure de calcium dans des tubes recourbés en U, et il ne tarda pas à recueillir un phosphure d'hydrogène liquide qui avait échappé à tous les chimistes qui s'étaient occupés de la même question et dont la découverte constitue le point capital de son travail.

Ce phosphure est liquide au dessous de -10° degrés, sa tension est considérable, il est sans couleur et d'une transparence parfaite. Il s'enflamme avec une extrême énergie au contact de l'air et il y brûle avec une flamme blanche douée de l'éclat le plus vif.

Exposé à la lumière solaire, il se change rapidement en phosphure jaune solide et en gaz hydrogène phosphoré. Cette décomposition, qui a lieu même à la lumière diffuse, rend très dangereuses les expériences sur le phosphure d'hydrogène liquide. Toutefois, à l'aide de certaines précautions, M. Thénard a pu déterminer la composition de cette nouvelle substance, en utilisant son mode même de décomposition spontanée. Il a reconnu que, pour une quan-

té de phosphore solide représentée par Ph^3H , elle donne un volume de gaz phosphore entierement absorbable par le sulfate de cuivre, dont le poids equivaut a $3(\text{Ph H}^3)$. Il en a conclu que le nouveau phosphore a pour formule



* La tendance de ce composé a se doubler, comme nous venons de le dire en deux autres hydrures de phosphore, augmente beaucoup lorsqu'on le met en contact avec les acides chlorhydrique, bromhydrique, le chlorure de phosphore, avec une foule d'autres corps, de nature d'ailleurs tres diverse, surtout lorsque ceux ci sont dans un grand état de division. Sous ce rapport, il présente quelque analogie avec l'eau oxygénée et le polysulfure d'hydrogene.

Les faits que nous venons de signaler sont d'un grand intérêt, ils éclairent singulierement la question des phosphures d'hydrogene, question difficile, longtemps agitée, et jusque-là fort obscure. Ils permettent une explication simple, et en quelque sorte naturelle, des phenomenes relatifs a la plus ou moins grande inflammabilité des hydrogenes phosphorés.

Cette explication, on la trouve tout entiere dans l'existence du liquide Ph H^3 , dans son excessive combustibilité et dans son instabilité meme.

Doué, a la temperature ordinaire, d'une excessive affinité pour l'oxygene, qui le décompose avec un developpement considérable de chaleur, il n'est pas étonnant qu'il determine l'inflammabilité des gaz formes d'éléments combustibles, tels que l'hydrogene phosphore, le cyanogene, l'hydrogene, le gaz oléifiant, etc. C'est en quelque sorte un incendie qu'une étincelle allume, et qui continue tant que la flamme trouve un aliment.

La presence de ce phosphore d'hydrogene liquide dans l'hydrogene phosphoré spontanément inflammable ne peut étre révoquée en doute, puisqu'il suffit d'un simple abaissement de temperature pour l'en séparer. Des lors la grande combustibilité de ce gaz ne présente plus rien d'extraordinaire, elle est due à ce phosphore liquide, qui la communique indistinctement à tous les gaz combustibles.

Si un gaz phosphoré spontanément inflammable cesse bientôt de présenter cette propriété, c'est que le phosphore liquide qu'il contenait d'abord s'est décomposé. Cette décomposition, qui a lieu dans le liquide même a l'état de pureté et d'isolement, sera plus ou moins accélérée par le contact de divers corps, de là l'explication des principaux faits observés par

M Graham sur la faculté que possèdent un grand nombre de substances diverses, d'enlever à l'hydrogene phosphoré sa grande combustibilité

L'identité de composition signalée par M H Rose dans les hydrogenes phosphores spontanément et non spontanément inflammables, n'a rien qui doive surprendre, puisqu'il suffit pour ainsi dire d'une trace de phosphure d'hydrogene liquide pour provoquer l'inflammabilité du dernier de ces gaz. Comment l'analyse centésimale ferait-elle connaître d'une manière certaine la présence d'une quantité, même assez considérable, de phosphure d'hydrogene liquide repandue dans un gaz forme des memes elements et d'ins des proportions d'ailleurs si voisines?

A l'appui de l'hypothese qui consiste à considérer comme isomeres et susceptibles de se transformer l'un dans l'autre les gaz spontanément et non spontanément inflammables M H Rose a signalé particulièrement la propriété qu'ils possèdent de s'unir à certains chlorures métalliques et de former avec eux des combinaisons identiquement semblables de telle sorte par exemple, que lorsqu'on vient à les décomposer par l'eau, celle-ci en reprenne un gaz qui ne s'enflamme pas, tandis qu'avec l'ammoniaque liquide, il s'enflamme au contraire constamment

M Thénard a répété les expériences de M Rose et les a étendues et en a trouvé l'explication qui est fort simple

Le gaz hydrogene phosphore pur, bien depouillé de phosphure liquide, n'est pas inflammable à la température ordinaire mais il suffit d'une faible élévation de température pour rendre sa combustion très facile à 100 degrés il s'enflamme déjà. Toutes les fois donc que, par suite de quelque action chimique, ce gaz sera porté à la température que nous venons d'indiquer, et à le contact de l'air, il s'embrasera. C'est précisément ce qui arrive quand on décompose par l'ammoniaque liquide les combinaisons de l'hydrogene phosphore avec les chlorures de titane et d'étain, le mélange s'échauffe et le gaz qui s'échappe devient par cela seul, inflammable. Ce qui le prouve, c'est que si on le refroidit pendant un instant seulement, en opérant la décomposition sur le mercure, et le versant ensuite dans l'atmosphère, il cesse d'être spontanément inflammable

Le gaz séparé par l'eau des combinaisons précédentes ne s'enflamme pas à l'air, suivant M Rose. Cela est exact, pourvu qu'on opère de telle sorte que le gaz, au moment où il se dégage, ne puisse atteindre la température qui détermine sa combustion. On remplit cette condition en laissant tomber le composé dans une quantité d'eau relativement très considérable, mais si l'on se place dans des circonstances contraires, si l'on met beaucoup de

chlorure hydrophosphoré dans peu d'eau, le mélange s'échauffe, et le gaz qui s'en dégage brûle alors avec vivacité.

» On le voit clairement, ce sont là des effets de température.

» Nous pourrions multiplier les exemples de réactions intéressantes qui semblaient inexplicables avant le travail de M. Thenard; mais ce que nous avons dit suffira, sans doute, pour montrer toute la portée de ce travail.

» Les chimistes sauront apprécier la persévérance, l'esprit d'analyse et la sagacité que l'auteur a su montrer dans une question dont l'étude était tout à la fois difficile et dangereuse; ils ont tous vu avec plaisir un jeune homme qui porte un nom si connu d'eux, débiter dans la carrière des sciences d'une manière aussi honorable.

» Nous avons l'honneur de demander à l'Académie l'insertion du Mémoire de M. Paul Thenard dans le *Recueil des Savants étrangers*. »

Les conclusions de ce Rapport sont adoptées.

ANALYSE MATHÉMATIQUE. — *Rapport sur un Mémoire de M. LAURENT, relatif au calcul des variations.*

(Commissaires, MM. Liouville, Cauchy rapporteur.)

» L'Académie nous a chargés, M. Liouville et moi, de lui rendre compte d'un Mémoire de M. Laurent qui a pour titre *Mémoire sur le calcul des variations*.

» L'Académie se rappelle que, dans sa séance publique du 13 juillet 1840, elle avait proposé pour sujet du grand prix des sciences mathématiques la question suivante, relative au calcul des variations : *Trouver les équations aux limites que l'on doit joindre aux équations indéfinies pour déterminer complètement les maxima et minima des intégrales multiples*. Le programme exigeait de plus des exemples de l'application de la méthode à des intégrales triples.

» L'Académie se rappelle encore que, parmi les Mémoires envoyés au concours, l'un, dont l'auteur était M. Sarrus, a remporté le prix, tandis qu'un autre, dont l'auteur était M. Delaunay, a été jugé digne d'une mention honorable.

» Le Mémoire de M. Laurent a été adressé à l'Académie après l'expiration du concours, mais avant l'époque à laquelle les juges du concours ont fait connaître le résultat de leur examen. M. Laurent n'a donc pu avoir aucune connaissance des Mémoires des concurrents. Cette circonstance augmente l'intérêt qui s'attache à son travail.

L'application du calcul des variations à la recherche des maxima et minima des intégrales multiples réclamait avant tout de nouvelles formules d'intégration par parties, et une notation nouvelle qui permit d'écrire facilement ces nouvelles formules. Les juges du concours ont vu particulièrement remarqué les paragraphes relatifs à ces deux objets dans le *Mémoire de M. Sarrus*. Les paragraphes correspondants du *Mémoire de M. Laurent* sont aussi dignes de remarque. Les deux auteurs ont employé des méthodes différentes pour établir les formules d'intégration par parties. Mais ces formules sont en réalité les mêmes dans les deux *Mémoires*, quoiqu'elles s'y trouvent écrites à l'aide de deux notations distinctes. Nous ajoutons que, ces formules une fois établies, M. Laurent se sert, pour obtenir les équations aux limites de raisonnements analogues à ceux dont M. Sarrus avait fait usage.

D'ailleurs le *Mémoire de M. Laurent* renferme, sur les diverses manières de vérifier les équations aux limites des observations qui ne sont pas sans intérêt.

Nous ne dissimulons pas que, parmi les méthodes employées par M. Laurent, quelques-unes peuvent être considérées plutôt comme des méthodes d'induction que comme des méthodes parfaitement rigoureuses. Mais il est généralement facile de constater l'exactitude des résultats obtenus par ces méthodes qui, pour l'ordinaire, permettent d'effectuer assez simplement les calculs.

En résumé, nous croyons que le *Mémoire de M. Laurent* est digne d'être approuvé par l'Académie et inséré dans le *Recueil des Savants étrangers*.

Les conclusions de ce Rapport sont adoptées.

PHYSIQUE APPLIQUÉE — *Rapport sur deux Mémoires de M. WERTHEIM*
intitulés *Recherches sur l'élasticité*

(Commissaires, MM. Poncelet, Duhamel, Pelouze, Babinet rapporteur.)

L'Académie nous a chargés, MM. Poncelet, Duhamel, Pelouze et moi de lui faire un Rapport sur les recherches de M. Wertheim, relatives à l'élasticité, et d'abord sur l'élasticité étudiée dans les corps solides, ce qui, pour les métaux, est l'objet d'un premier *Mémoire*, en date du 18 juillet 1842, et, pour les alliages, d'un second *Mémoire*, présenté à l'Académie le 8 mai 1843. Le but que l'auteur a eu en vue a été de rechercher expérimentalement quelles sont les lois des changements de forme que subissent les corps soumis à des allongements divers, soit dans les limites de ce qu'on appelle ordinairement l'élasticité parfaite, soit jusqu'à l'extension qui précède la rupture, puis de

tuer de ces déterminations les conséquences qui s'en déduisent par rapport à la constitution moléculaire des corps, au coefficient d'élasticité et à la comparaison de la vitesse théorique du son avec la vitesse expérimentale, que l'auteur détermine aussi directement.

L'auteur trouve que toute extension est accompagnée d'un changement permanent de forme, et que si l'on défalque de l'allongement total l'allongement permanent, on trouve dans les diverses positions définitives d'équilibre toujours le même coefficient d'élasticité ainsi une tige qui, chargée d'un poids moyen, s'allonge d'un millième, acquiert la même extension proportionnelle lorsqu'elle a déjà subi un allongement quelconque par une traction très-forte, et ce même poids moyen détermine encore dans cette tige, déjà modifiée par cette forte traction, le même allongement d'un millième de sa longueur actuelle. Ainsi, dans les diverses positions d'équilibre, l'auteur a pu déterminer le coefficient d'élasticité qu'il a trouvé constant. Nous allons revenir sur cette portion considérable des travaux de M. Wertheim, qui fait partie de l'une des méthodes destinées à la détermination de ce coefficient d'élasticité, mais, pour donner une idée de l'ensemble du travail, nous dirons que ces pénibles recherches expérimentales étaient seulement destinées à fournir des données pour découvrir un rapport entre la constitution chimique moléculaire des corps et leurs propriétés mécaniques, rapport qui peut se résumer ainsi : pour un même métal à divers degrés de densité, et pour plusieurs métaux comparés ensemble, le coefficient d'élasticité est d'autant plus grand que la distance des molécules est plus petite; par exemple, pour le platine écroui ou laminé, le coefficient d'élasticité est beaucoup plus grand que pour le même métal recuit, et si l'on compare le fer, dont les atomes sont très-rapprochés, aux autres métaux, dont les atomes sont plus distants, le coefficient d'élasticité du fer est de beaucoup supérieur. Parmi les résultats importants de l'auteur, on trouve que si l'on détermine le coefficient d'élasticité par le moyen du son, on arrive à un coefficient d'élasticité plus élevé qu'au moyen de la mesure directe de l'allongement, ce qui fournit à l'analyse, et notamment à celle de M. Dubamel, des données sur la chaleur dégagée par la compression dans les solides. Notons encore que M. Wertheim a étudié avec un soin pareil l'influence des températures sur le coefficient d'élasticité, et qu'il a trouvé que la diminution de densité occasionne là, comme toujours, une diminution du coefficient d'élasticité, et même une diminution plus grande que celle qui résulte des changements mécaniques de la densité.

» Nous allons donner maintenant un résumé du premier Mémoire de M. Wertheim. L'introduction de ce Mémoire contient une esquisse historique

des nombreuses recherches qui ont été faites déjà sur ce sujet et la discussion des points douteux et des lacunes qui restent à remplir

Il en résulte que les lois des petits changements de forme et des vibrations peuvent être regardées comme connues mais qu'il n'en est plus de même par rapport aux déplacements qui ne sont pas très petits comparativement aux distances qui séparent les molécules que les matériaux qui entrent dans les constructions ont été suffisamment soumis à l'expérience dans un but pratique mais qu'il importe beaucoup plus sous le point de vue physique d'examiner que des substances pures et chimiquement simples et qu'enfin l'étude expérimentale des rapports entre l'élasticité et les forces moléculaires a été dépassée de beaucoup par les recherches analytiques qui ont été faites sur cette matière dans ces derniers temps

Il s'agissait donc de résoudre les questions suivantes qui étaient restées parfaitement indéterminées jusque-là

1° Quelles sont les vitesses du son et les coefficients d'élasticité dans les métaux purs et homogènes?

2° La vitesse théorique et la vitesse réelle du son dans les solides sont-elles les mêmes ou bien y a-t-il une différence entre elles comme pour les gaz?

3° Le coefficient d'élasticité est-il toujours le même pour un même métal quel que soit le traitement mécanique auquel on le soumette ou bien est-il change par différentes circonstances, et si cela est quelles sont les lois de ces changements? On sait que Coulomb et Lagerhjelm ont cru trouver toujours le même coefficient pour le fer et pour l'acier M Poncelet au contraire d'après l'ensemble des résultats connus n'admet pas cette constance même pour le fer

4° D'après quelles lois les fils métalliques s'allongent-ils dans les différentes positions d'équilibre que leurs molécules peuvent prendre? la loi de Gerstner sur la constance du coefficient d'élasticité est-elle admissible?

5° Y a-t-il une vraie limite d'élasticité parfaite et quelle est sa grandeur pour les différents métaux?

6° Quelle est la cohésion des métaux purs et de quelle valeur cette donnée peut-elle être pour la théorie?

7° Quels sont les changements permanents ou transitoires que l'élévation de température fait subir à l'élasticité et à la cohésion des métaux?

8° Quel rapport y a-t-il entre les propriétés mécaniques d'un métal et sa constitution physique et chimique?

Pour résoudre ces différentes questions M Wertheim a opéré de la manière suivante

» D'abord il n'employait que des métaux purs, et pour ceux qu'il est impossible d'avoir absolument tels, leur composition chimique fut déterminée par l'analyse. Chaque métal fut coulé, quand cela se pouvait, puis écroui et étiré, et enfin recuit. Dans chacun de ces états, la densité fut prise, puis le coefficient d'élasticité et la vitesse de son correspondante furent déterminés au moyen de trois méthodes différentes : par les vibrations transversales, par les vibrations longitudinales, et par l'allongement produit par des poids.

» Pour déterminer avec certitude la durée d'une vibration transversale d'une verge cylindrique, de longueur et de diamètre connus, M. Wertheim a appliqué la méthode pour dessiner les vibrations due à M. Duhamel. Pour cela, un disque en verre bien dressé et enduit de noir de fumée est fixé sur un autre disque pareil en laiton, qui tourne autour de son centre au moyen d'un simple mouvement d'horlogerie à poids, muni d'un petit volant à ailettes pour régler la vitesse. Ce mouvement n'ayant pas été trouvé assez uniforme pour pouvoir servir à la détermination du temps, M. Wertheim a eu recours à un procédé employé pour la première fois par M. Duhamel dans le *Memoire sur les vibrations des cordes chargées de curseurs*, lu à l'Académie en 1840. Ce procédé a pour objet de dispenser de la nécessité d'un mouvement uniforme pour le disque, en déterminant les nombres de vibrations exécutées dans un même temps par le point dont on étudie le mouvement, et un autre point dont le mouvement est toujours le même. Ici, M. Wertheim a comparé les vibrations dont il s'agissait de connaître la durée avec celles d'un diapason qui fait exactement 256 vibrations par seconde ; voici comment toute la machine est placée sur un petit traineau, qui se meut en avant dès qu'on pose le pied sur une pédale, laquelle fait en même temps sortir un morceau de fer d'entre les branches du diapason pour le faire parler. La verge soumise à l'expérience est fixée dans un fort étau ; elle est munie à son sommet d'une petite pointe élastique et recourbée ; une pointe pareille est fixée sur chaque branche du diapason. Ainsi donc, dès qu'on a mis la verge en vibration transversale, on appuie du pied sur la pédale, le diapason sonne et la plaque se meut en avant, tout en tournant autour de son centre, jusqu'à ce qu'elle soit légèrement effleurée par les deux pointes dessinantes ; là elle est arrêtée par deux vis de rappel.

» La plaque reçoit alors deux bandes concentriques contenant les empreintes des vibrations de la verge et du diapason. Quand la plaque a fait à peu près un tour en contact avec les pointes, on enlève le pied ; l'appareil rétrograde au moyen d'un contre-poids ; on détache le disque de verre, et l'on compte sous le microscope le nombre de vibrations du diapason isochrone à

une vibration de la verge. Pour plus d'exactitude, M. Wertheim a eu soin de prendre la moyenne d'un certain nombre de vibrations de la verge. Les vibrations du diapason étant assez grandes pour qu'on puisse évaluer avec facilité les cinquièmes parties de chaque demi-vibration, la durée des vibrations de la verge se trouve ainsi déterminée à moins de $\frac{1}{31170}$ de seconde près.

» On n'a alors qu'à substituer ce temps dans les formules connues, pour en tirer immédiatement le coefficient d'élasticité et la vitesse du son.

» On trouve plus facilement encore la durée des vibrations longitudinales; c'est là la seconde méthode dont M. Wertheim s'est servi. On excite le son longitudinal de la manière connue, en tenant la verge par son milieu et en la frottant à un de ses bouts, et l'on reproduit exactement ce son sur un sonomètre différentiel, jusqu'à ce que l'oeil ne distingue plus de battements. Le sonomètre étant accordé sur le diapason dont nous venons de parler, on calcule le nombre de vibrations par seconde, correspondant au son en question, au moyen de la longueur de corde nécessaire pour le produire.

» Pour s'assurer du degré d'exactitude auquel on peut ainsi atteindre, M. Wertheim a compté directement les nombres des vibrations longitudinales de deux verges de 2 metres de longueur, dont l'une en laiton et l'autre en acier fondu, ces verges font des vibrations longitudinales suffisamment grandes pour qu'on puisse prendre leur empreinte et les compter sous le microscope.

» Eh bien, les nombres ainsi trouvés ne différaient des nombres donnés par le sonomètre que de 3 à 7 vibrations sur 1000. Il est vrai que les erreurs doivent devenir plus grandes quand on opère sur des verges plus courtes et par conséquent sur des sons plus aigus; mais comme M. Wertheim n'a employé à cet effet que des verges d'un metre de longueur, on peut regarder les coefficients d'élasticité et les vitesses de son ainsi trouvées comme exactes, à un ou deux centièmes près.

» Enfin M. Wertheim a soumis à l'extension directe les verges et les fils qui avaient déjà été examinés au moyen des deux méthodes que nous venons d'exposer.

» A cet effet, l'auteur s'est servi de l'appareil suivant, qui lui est propre et qui offre plusieurs avantages.

» Une forte poutre de chêne porte, par son sommet, une espèce d'étau en acier scellé par derrière dans le mur, et qui, au moyen d'échancrures convenables, peut fortement serrer des verges de différents diamètres.

» Les verges, ainsi retenues par le haut, sont serrées par le bas dans un étau semblable, auquel on attache une grande caisse contenant les poids. Cette caisse, au lieu de poser sur le plancher, est portée elle-même par quatre

vis ; ainsi, on n'a qu'à remonter les vis pour que la caisse, avec tous les poids qu'elle contient, soit supportée par la verge. On tourne les vis en sens contraire pour soulever toute la charge et pour faire revenir la verge à un nouvel état d'équilibre sans traction. On prévient ainsi les secousses, qui sont inévitables quand on met les poids avec la main, et les erreurs considérables provenant des frottements des poulies et des leviers sur leurs boulons dans les machines ordinaires à extension ; on a, de plus, beaucoup de facilité pour mettre et pour ôter des charges même fort considérables.

» Pour prendre une mesure, l'auteur opère de la manière suivante : il trace d'abord avec une fine pointe deux traits déliés sur le haut et sur le bas de la verge bien redressée d'avance, il mesure la distance de ces deux traits au moyen d'un cathétomètre placé sur une forte pierre de taille, et qui donne les longueurs à $\frac{1}{160}$ de millimètre près, puis il met une charge petite relativement à la section transversale du fil ; il retire les vis, il attend que le système soit revenu à l'équilibre, et il mesure de nouveau, puis il ôte la charge au moyen des vis, il mesure, il augmente la charge d'une petite quantité, et ainsi de suite jusqu'à la rupture ; enfin, après la rupture, le coefficient d'élasticité, au moyen des vibrations transversales, et la densité d'une des parties, sont prises de nouveau.

» De cette manière, M. Wertheim a pu déterminer en même temps tout ce qui a rapport au coefficient d'élasticité, à la limite d'élasticité, à l'allongement maximum et à la cohésion, et en outre, et c'est là le grand avantage de cette disposition, il a pu distinguer exactement les deux parties dont les allongements se composent, savoir, la partie qui disparaît avec l'action de la charge, et qu'il appelle par excellence l'allongement élastique, et l'autre partie, qui constitue l'allongement permanent.

» L'allongement élastique donne immédiatement le coefficient d'élasticité dans chacune des positions d'équilibre de la verge, l'auteur a ainsi déterminé, depuis vingt jusqu'à cinquante fois, le coefficient d'élasticité pour chaque fil, et l'accord entre les résultats lui a permis de prendre la moyenne comme le vrai coefficient d'élasticité par l'allongement, et de calculer, d'après celui-ci, la vitesse théorique du son.

» Dans le calcul du coefficient d'élasticité, on peut négliger le rétrécissement que la section transversale de la verge éprouve par l'effet de l'allongement élastique ; cette correction porterait sur les millièmes parties des coefficients d'élasticité, tandis qu'on ne mesure les allongements que jusqu'aux centièmes. Mais il n'en est plus de même quand la verge a subi un notable allongement permanent. Dans ce cas, on a eu égard à cette diminution de

diamètre dans le calcul de la charge que la verge avait porté par unité de section

Il en est de même pour la charge produisant la rupture, elle fut calculée d'après le diamètre correspondant à la dernière longueur qu'on avait encore pu mesurer

Toute cette série d'expériences a été répétée aux températures de 100 de grés et de 200 degrés, pour cela, une espèce de fourneau en tôle, de 75 centimètres de longueur, fut placée entre les étaux supérieur et inférieur. Ce fourneau contient d'abord un espace rempli de charbon, puis un espace servant de bain de sable, et enfin, au centre, un espace par lequel la verge passe, pour être également échauffée dans toute la longueur que l'on veut mesurer. Deux thermomètres, placés à différentes hauteurs, donnent la température, que l'on peut régler en ouvrant ou en fermant les issues du fourneau.

Quoique ces expériences fussent faites avec tout le soin nécessaire, les résultats ne présentent peut-être pas encore toute l'exactitude désirable à laquelle, selon la remarque de l'auteur, on ne pourra parvenir qu'en employant des bains liquides.

Toute cette série d'expériences fut faite sur chacun des métaux suivants : plomb, étain, cadmium, zinc, argent, or, palladium, platine, cuivre et sur différentes espèces de fer et d'acier, enfin, accessoirement, sur deux métaux à texture cristalline, le bismuth et l'antimoine.

L'auteur résume les résultats de toutes ses expériences dans une série de tableaux, il les compare entre eux, il discute le degré de précision et la valeur théorique de chacune des données, et il arrive enfin aux conclusions suivantes, qui ne sont réellement que l'énoncé des résultats numériques fournis par les expériences.

1° Le coefficient d'élasticité n'est pas constant pour un même métal diversement traité : toutes les circonstances qui en augmentent la densité le font augmenter, et réciproquement.

2° Les vibrations longitudinales et transversales donnent sensiblement le même coefficient d'élasticité, et par suite la même vitesse du son.

3° Les vibrations conduisent à un coefficient plus grand que l'allongement.

4° Si l'on admet, pour expliquer cette différence, les mêmes hypothèses pour les corps solides que Laplace a admises pour les gaz, on peut, au moyen d'une formule donnée par M. Duhamel, faire servir cette différence à la détermination du rapport entre la chaleur spécifique à pression constante et

a volume constant. Ce rapport est généralement plus grand pour les métaux recuits que pour les non recuits.

» 5° Le coefficient d'élasticité diminue avec l'élévation de température dans un rapport plus rapide que celui qu'on déduirait de la dilatation correspondante; le fer et l'acier paraissent faire une exception sur laquelle l'auteur se propose de revenir.

» 6° L'allongement permanent des verges ou fils par l'application de charges ne change que très-peu leur densité, le coefficient d'élasticité doit donc aussi être sensiblement le même dans les différentes positions d'équilibre de la verge ou du fil; c'est en effet ce qui a lieu tant que les charges n'approchent pas de très-près celle qui produit la rupture. La loi de Gerstner se trouve donc généralement établie.

» 7°. Les allongements permanents se font d'une manière continue, ils sont liés à la durée d'action de la charge par une loi qui ne nous est pas encore connue. En changeant convenablement la charge et sa durée d'action, on pourra produire tel allongement permanent qu'on voudra.

» 8°. Il n'existe pas de vraie limite d'élasticité : si l'on n'observe pas d'allongement permanent pour les premières charges, c'est qu'on ne les a pas laissés agir pendant assez de temps, ou que les verges soumises à l'expérience sont trop courtes relativement au degré d'exactitude de l'instrument qui sert aux mesures.

» Les valeurs de l'allongement maximum et de la cohésion au moment qui précède la rupture dépendent également de la manière d'opérer. on trouve l'allongement maximum permanent d'autant plus grand qu'on augmente plus lentement les charges, l'inverse a lieu pour la cohésion.

» On ne saurait donc, ni établir des lois d'après les valeurs de ces données, ni les faire servir à l'étude des forces moléculaires.

» La résistance à la rupture est notablement diminuée par le recuit, mais les métaux recuits d'avance ne perdent pas beaucoup de leur cohésion quand la température s'élève jusqu'à 200 degrés.

» Pour établir ces lois on n'a eu besoin d'aucune hypothèse, elles résultent immédiatement de l'expérience; mais il ne peut plus en être de même quand on veut remonter des effets à la cause, de l'élasticité aux forces dont elle dépend, car ici nous touchons à la question la plus importante et la plus abstraite de la physique moléculaire. En se plaçant à ce point de vue, on est obligé d'adopter une certaine hypothèse sur l'arrangement des molécules et sur les forces moléculaires, pour pouvoir ensuite comparer les résultats de l'expérience à ceux de l'analyse.

L'auteur traite ses résultats dans l'hypothèse suivie par Poisson, et qui dans l'état actuel de la science a été généralement adoptée par les géomètres

Concevons que les corps soient composés de molécules très-petites par rapport aux distances qui les séparent que ces molécules soient douées de forces attractives et de forces répulsives qui leur soient propres ou qui naissent de leur chaleur, que la *resultante* de ces deux forces devienne infiniment petite dès que la distance devient sensible et que le rayon d'activité d'une molécule soit un multiple très grand de la distance moyenne des molécules. Cela admis Poisson arrive à l'expression suivante

$$\eta = \frac{\pi}{3} \sum_{\alpha} \frac{r}{\alpha^3} \frac{d^3 f r}{dr^3}$$

dans laquelle q désigne le coefficient d'élasticité, r le rayon d'activité α la distance moyenne des molécules et $f r$ la fonction qui exprime la *resultante* dont nous venons de parler

Admettons de plus que les poids relatifs des molécules soient donnés par leurs poids atomiques ou par les poids de leurs équivalents chimiques

En divisant les poids spécifiques par les poids atomiques correspondants on trouve les nombres relatifs de molécules contenues dans le même volume

Puis on en déduit les distances relatives des molécules c'est-à-dire les valeurs de α . Il ne reste donc d'inconnu dans la formule que la fonction $f r$ ce qui permet à l'auteur d'étudier la nature de cette fonction d'après les résultats de l'expérience

1° Quand α décroît q grandit et réciproquement c'est en effet ce qui a lieu d'après le n° 1 des conclusions précédentes, car toute augmentation de la densité diminue la distance des molécules. Malheureusement, les condensations et les dilatations que nous pouvons produire par nos moyens mécaniques, sont trop petites pour qu'on en puisse déduire avec exactitude le rapport qui existe entre les variations de q et celles de α . le produit $q \alpha^3$ semble bien être constant pour un même métal à la température ordinaire, mais il n'en est plus de même aux températures élevées le coefficient q décroît alors si rapidement, que le produit $q \alpha^3$ va toujours en diminuant

2° Les différents métaux se suivent dans le même ordre par rapport

a leur coefficient d'élasticité, à la proximité de leurs molécules et à leur conductibilité pour le son relativement à son intensité.

» Le platine seul présente une anomalie; il se place entre le cuivre et le fer par rapport à son coefficient d'élasticité, tandis qu'il prend place entre le zinc et le cuivre par rapport à la distance de ses molécules.

» 3°. Le produit du coefficient d'élasticité et de la septième puissance de la distance moyenne des molécules est sensiblement le même pour la plupart des métaux. Cet accord est aussi satisfaisant qu'on peut le désirer à ce degré d'approximation pour le plomb, le cadmium, l'or, l'argent, le zinc, le palladium et le fer; mais le cuivre donne un produit moindre, le platine et l'étain un produit plus élevé.

» Si cet accord était général, on en pourrait déduire la loi d'après laquelle la résultante en question décroît quand la distance des molécules devient plus grande, mais, dans l'état actuel, les expériences démontrent seulement que cette résultante décroît rapidement et dans un rapport certainement plus grand qu'en raison inverse du carré des distances.

» C'est à ce point que l'auteur s'est arrêté, sans vouloir entrer dans des spéculations qu'il n'aurait plus été possible de contrôler par l'expérience.

» Nous pourrions être plus courts dans l'analyse du second Mémoire de M. Wertheim.

» L'objet de ce Mémoire est de constater si les lois qu'il a trouvées pour les métaux simples sont également applicables aux alliages, de rechercher le rapport qu'il peut y avoir entre les propriétés mécaniques des alliages et celles des métaux constituants, et enfin d'arriver par là à la connaissance de la constitution moléculaire des alliages.

» Ce sujet était tout nouveau. L'élasticité des alliages n'avait pas encore été étudiée, malgré leur fréquent emploi dans les arts et malgré le grand nombre d'expériences qui avaient été faites sur leur cohésion.

» Les alliages ont été préparés par l'auteur avec des métaux purs. Après les avoir suffisamment mêlés et brassés à plusieurs reprises pendant la fusion, il les a coulés dans une lingotière de 50 centimètres de longueur qui fut quelquefois chauffée jusqu'au rouge; les alliages ductiles furent étirés après, les autres furent calibrés à la lime.

» Chaque alliage a été soumis à l'analyse chimique, quoique, pour la plupart d'entre eux, les métaux eussent été combinés dans les rapports de leurs poids atomiques ou des multiples les plus simples de ces poids. Mais l'inégale oxydabilité des constituants ou la volatilité de l'un d'entre eux avait souvent notablement changé ces rapports. Il a fallu avoir égard, en outre, à la

non-homogénéité de leur composition, ceux surtout dans lesquels entrent des métaux dont les poids spécifiques diffèrent beaucoup entre eux, offrent souvent de grandes inégalités de composition qui se trahissent déjà par des différences de couleur et de malléabilité, mais que l'on trouve avec sûreté au moyen de deux analyses faites sur des parties que l'on prend aux deux extrémités des verges. L'auteur a rejeté toutes celles qui offraient de trop grandes inégalités.

» Du reste, la manière d'opérer est absolument la même que pour les métaux simples. Les expériences de M. Wertheim portent sur 54 alliages binaires et sur 9 alliages ternaires de composition simple et connue, dans ce nombre se trouvent aussi la plupart des alliages qu'on emploie si fréquemment dans les arts, sans bien connaître leurs propriétés mécaniques, tels sont le laiton, le bronze, le tombac, le packfong, le métal des tam-tams, trempé et non trempé, l'alliage des caractères typographiques, etc.

» Ces expériences ont conduit l'auteur aux résultats suivants.

1° Les coefficients d'élasticité des alliages s'accordent assez bien avec la moyenne des coefficients d'élasticité des métaux constituants, les condensations et les dilatations qui ont lieu pendant la formation de l'alliage n'influent pas sensiblement sur ce coefficient.

» On peut donc déterminer d'avance quelle doit être la composition d'un alliage pour qu'il ait une certaine élasticité ou pour qu'il conduise le son avec une vitesse donnée, pourvu que cette élasticité ou cette vitesse tombe entre les valeurs extrêmes des mêmes quantités pour les métaux connus.

2° Ni la cohésion, ni la limite d'élasticité, ni l'allongement maximum ne peuvent être déterminés à priori au moyen des mêmes quantités connues pour les métaux simples qui les composent.

3° Les alliages se comportent comme les métaux simples, quant aux vibrations et quant à l'allongement.

4° Si l'on suppose que toutes les molécules des alliages sont à la même distance les unes des autres, on trouve que plus cette moyenne distance est petite, plus le coefficient d'élasticité est grand. Toutefois cet accord n'est pas suffisamment exact, pour qu'on en puisse conclure avec sûreté que l'arrangement moléculaire est réellement tel qu'il a été supposé.

» En considérant l'ensemble du travail de M. Wertheim, on voit que, contre l'usage, il ne s'est pas laissé entraîner à des déductions théoriques prématurées, que les relations qu'il a indiquées entre les résultats de ses expériences et la constitution moléculaire des corps sont d'une haute importance, mais, de plus, son travail, considéré sous le rapport expérimental,

contient un tel nombre de déterminations nouvelles, de constantes numériques, de mesures exactes, que l'Académie ne peut que donner une complète approbation à ce travail consciencieux et riche de faits

Votre Commission vous propose donc d'approuver les deux Mémoires de M. Walthem, et d'en ordonner l'insertion dans le *Recueil des Savants étrangers* »

Les conclusions de ce Rapport sont adoptées

MEMOIRES PRESENTES

M. KROCHLIN soumet au jugement de l'Académie une nouvelle turbine hydraulique dite *turbine à double effet*. Plusieurs de ces machines fonctionnent déjà en Alsace, et l'une d'elles, établie à Aspach le-Pont, a été l'objet d'un rapport fait à la Société industrielle de Mulhouse, ce rapport fait partie des pièces qui accompagnent la description et la figure de l'appareil

(Commissaires, MM Poncelet Lamé MOULU)

M. BONNOW adresse pour le concours de Mécanique fondé par M. de Montyon un Mémoire écrit en anglais *sur les causes des explosions des chaudières à vapeur*

(Renvoi à la Commission du prix de Mécanique)

M. DUPRÉ envoie un supplément à son Mémoire sur un *nouveau moyen de désinfection des matières animales et de conservation des cadavres*. Dans cette Note, l'auteur répond à une réclamation de priorité faite à l'occasion de sa première communication, suivant lui, les deux procédés n'ont de commun que l'emploi des vapeurs provenant de la combustion de matières organiques, mais ces vapeurs, M. Dupré les introduit par les vaisseaux sanguins et les fait pénétrer ainsi jusque dans la profondeur des tissus, tandis que, dans le procédé qui avait été proposé avant le sien mais qui paraît n'avoir jamais été mis à exécution, elles devaient agir seulement à la périphérie du corps. Le réclamant, dit M. Dupré, ne pouvait donc donner, comme lui appartenant, que l'idée d'appliquer à la conservation des cadavres humains une méthode employée de temps immémorial à la conservation des substances alimentaires »

(Renvoi à la Commission précédemment nommée)

M SERRET DE TOUANEFORT, qui avait présente dans la précédente séance une Note sur un *bâti à essieux convergents pour les locomotives et les wagons des chemins de fer*, met sous les yeux de l'Académie un modèle de cet appareil, et demande que son invention soit renvoyée à l'examen d'une Commission spéciale

(Commissaires, MM Probert, Morin)

MM LEFEVRE et SAUTEREAUX présentent une addition à leur Note sur une *nouvelle disposition du sabot pour les voitures de voyage*

(Renvoi à la Commission précédemment nommée)

M NOIRAT soumet au jugement de l'Académie un Mémoire sur une *nouvelle méthode d'enseignement pour le calcul élémentaire*

(Commissaires, MM Mathieu, Francoeur)

M CARTERON adresse un supplément à sa Note sur une *nouvelle chaîne d'arpenteur*, et fait remarquer qu'une poignée de chaîne, pour laquelle on a pris récemment un brevet, n'est que la reproduction de celle qu'il a depuis longtemps inventée et qu'il avait fait connaître dès l'année 1837 par la voie de l'impression

(Renvoi à la Commission déjà nommée)

M FAYET présente la deuxième partie de son *Essai sur la Statistique intellectuelle et morale de la France*. À ce Mémoire est jointe une Note destinée à répondre aux objections qui ont été faites, dans le Rapport de la Commission du prix de Statistique pour l'année 1842, contre l'exactitude de quelques uns des résultats généraux exposés dans la première partie du travail dont M Fayet envoie aujourd'hui la suite

(Renvoi à la Commission de Statistique)

M CHOPINEAUX, qui avait adressé, dans une des précédentes séances, une Note sur une *nouvelle locomotive et sur une nouvelle disposition des chaudières à vapeur*, demande qu'on regarde comme non avenue la partie de la Lettre d'envoi dans laquelle il annonçait l'intention d'y prendre ultérieurement un brevet d'invention, et prie l'Académie de vouloir bien charger une Commission de faire un Rapport sur les appareils qu'il soumet à son jugement

(Commissaires, MM Dupin, Poncelet, Probert.)

M GUILLON écrit qu'il est sur le point de pratiquer une opération de lithotritie au moyen de l'instrument qu'il a soumis au jugement de l'Académie. Désirant que MM. les Commissaires qui ont été chargés de faire le Rapport sur son lithotriteur puissent être témoins de cette opération, il demande que M. Breschet, en ce moment absent de Paris, soit remplacé par un autre membre. M. Roux est désigné à cet effet.

M. Roux remplacera également M. Breschet dans la Commission chargée de faire un Rapport sur un *appareil pour les fractures du col du fémur*, présenté par M. BAUDENS.

CORRESPONDANCE

M. ARAGO présente au nom de l'auteur, M. l'abbé MOIGNO le deuxième volume des *Leçons de Calcul différentiel et de Calcul intégral* (Voir au *Bulletin bibliographique* de la séance du 13 mai).

M. ARAGO présente au nom de M. A. DUPONT, plusieurs spécimens de *reproduction par la lithographie d'anciennes impressions et d'anciennes estampes*. Dans le nombre des pièces présentées se trouve la deuxième partie d'un ouvrage devenu rare, et qui a été complètement reproduit par ce moyen. La première partie avait été déjà mise sous les yeux de l'Académie. Le titre, en lettres de deux couleurs, porte une vignette en taille-douce que la lithographie a rendue fidèlement. Le livre, qui a rapport à l'histoire ecclésiastique du Périgord (voir au *Bulletin bibliographique*), avait été imprimé en 1629. Une vieille gravure en taille douce, qui représente la ville de Périgueux, n'a pas été moins heureusement rendue, mais ce qui paraît plus digne, peut-être, de fixer l'attention, et ce qui présentait, à coup sûr, beaucoup plus de difficultés, c'est la reproduction de plusieurs manuscrits, et d'un plan de la ville de Périgueux fait à la plume en 1773, ce dernier dessin surtout est irréprochable.

A ces pièces sont jointes quelques épreuves de vignettes obtenues avec les planches en relief sur pierre que M. Dupont désigne sous le nom de *cliches pierres*. Dans ce procédé, une opération chimique très-simple est substituée au travail du graveur sur bois, et celle du clicheur devient sans objet, car, le dessin une fois fait sur une première pierre, on peut, par le simple report des épreuves sur d'autres pierres d'une nature particulière, et par l'action des acides, obtenir le nombre de planches que l'on juge nécessaire.

M *ARAGO* met sous les yeux de l'Académie un tableau imprimé des hauteurs de l'eau tombée journellement sous les formes de pluie ou de neige sur différents points du bassin de la Saône, avec indication des hauteurs correspondantes des rivières et de la direction des vents. Les observations sont faites, par les soins de la *Commission hydrométrique de Lyon*, sur quatorze points différents. Ce tableau, qui est transmis par M le Maire de Lyon comprend seulement les observations du mois de mars.

Remarques de M DE GASPARIN

La Commission hydrométrique de Lyon a pour but de constater les quantités d'eau tombées dans la partie supérieure de la vallée de la Saône, pour pouvoir avertir les riverains inférieurs des crues qui les menacent. En faisant cette observation, M de Gasparin ajoute qu'il serait très-important que l'on pût instituer de pareilles stations météorologiques dans les vallées du Rhône, de l'Isère et de la Durance, qui donnent quelquefois les crues les plus subites. Il a désiré par ces quelques mots appeler, sur cette lacune l'attention de M Lortet, Président de la Commission, de M le Maire de Lyon du préfet du Rhône et celle de MM les Ministres des Travaux publics et de l'Agriculture, qui pourraient être invités à coopérer à cette œuvre par leurs encouragements.

MM *Arago* et *de Gasparin* sont chargés de demander, au nom de l'Académie, à M le Ministre de l'Intérieur et à M le Ministre de l'Agriculture et du Commerce, que le même plan d'observations soit étendu au bassin de l'Isère, de la Durance et du Rhône, et qu'on y joigne des observations thermométriques et barométriques.

M DE GASPARIN présente, de la part de M GUÉRIN-MÉNEVILLE, membre de la Société royale et centrale d'Agriculture du département de la Seine, un Mémoire d'entomologie appliquée, publié par ce zoologiste dans les Mémoires de cette Société.

Le travail de M Guérin-Ménéville a été motivé par des observations très-importantes de M Herpin sur les insectes nuisibles au froment, au seigle, à l'orge et au trèfle. M Guérin-Ménéville a étudié sous le point de vue entomologique toutes les espèces obtenues par M Herpin, il les a rapportées à leurs genres et espèces des méthodes les plus modernes, en a donné de bonnes figures détaillées, comme il est nécessaire de le faire dans l'état actuel de la science, et a fait connaître avec soin leurs divers parasites.

Le *Mémoire* de M Guérin-Meneville étant imprimé à la suite de celui de M Heppin, les observations de l'agriculteur sont complétées par les déterminations positives de l'entomologiste, ce qui offre un tableau des connaissances acquises jusqu'à ce jour sur tous les insectes qui nuisent à nos récoltes de céréales et occasionnent chaque année des pertes considérables aux cultivateurs

Ce travail devra être étudié par les agronomes, et il leur donnera des enseignements qui leur seront très-utiles •

M HAMILTON, nommé récemment à une place de correspondant Section de Géométrie, adresse ses remerciements à l'Académie

M le MINISTRE RESIDENT DE TOSCANE transmet une Lettre de M FALCIAJ FOSSOMBRONI à M Arago Cette Lettre renferme l'annonce officielle de la mort de M le comte de Fossombroni, ministre secrétaire d'État de S A le grand duc de Toscane, et correspondant de la Section de Mécanique M Falciaj Fossombroni prie MM les membres de l'Académie de vouloir bien lui communiquer les Notices qui auraient été publiées en France sur le savant homme d'État, offrant de son côté de leur transmettre tous les renseignements dont ils pourraient avoir besoin relativement à la vie scientifique, littéraire et politique de l'illustre mort

PHYSIQUE MATHÉMATIQUE — *Sur la rotation des plans de polarisation dans les mouvements infiniment petits d'un système de spheroides* (Extrait d'une Lettre de M LAURENT à M Arago)

La théorie de la polarisation mobile en est encore aujourd'hui au point où la laissée Fresnel M Cauchy, il est vrai, a donné des équations différentielles propres à reproduire l'explication de ces phénomènes telle que la présente l'illustre physicien que je viens de citer, mais ces équations sont purement empiriques En effet, M Cauchy les a formées en admettant à priori précisément ce qu'il serait très-important de vérifier, à moins que dans certains systèmes de molécules, les mouvements simples polarisés circulairement en sens contraire se propagent *nécessairement* avec des vitesses différentes En outre, ces équations empiriques sont incompatibles avec celles qui représentent les lois des mouvements d'un système, ou même de deux systèmes isotropes de points matériels, et que, depuis quatorze ans, M Cauchy donne comme représentant les lois des mouvements de la lumière dans les corps diaphanes En un mot, il est mathématiquement impossible que dans un système,

ou même deux systèmes isotropes de points matériels, deux mouvements simples polarisés circulairement en sens contraire doivent *nécessairement* se propager avec des vitesses différentes. Ainsi donc, si on adopte l'hypothèse de points matériels admise sans réserve par M. Cauchy pour former les équations du mouvement de la lumière, il faut nécessairement admettre que l'explication des phénomènes de la polarisation mobile donnée par Fresnel est inexacte, et il en résulterait une objection sérieuse contre le système des ondulations dont toutes les formules ne pourraient plus être considérées que comme empiriques. Voilà l'état actuel de la question. Je pense que vous au moins, monsieur, partisan déclaré du système des ondulations, non-seulement pour représenter les lois des phénomènes lumineux, mais encore pour en donner l'explication réelle, vous verrez avec plaisir que l'explication que Fresnel a donnée des importants phénomènes de polarisation mobile que vous avez signalés le premier est une conséquence nécessaire de l'hypothèse de molécules à dimensions sensibles. Dans le Mémoire que j'ai l'honneur de vous adresser, je ne considère, il est vrai, qu'un système unique de sphéroïdes; mais les conséquences auxquelles j'ai rive subsistent, si l'on considère un système de sphéroïdes et un système de points matériels qui coexistent dans une portion donnée de l'espace. Il est donc *prouvé* que les molécules des corps ont des dimensions sensibles. J'attache d'autant plus d'importance à ce résultat, qu'on devra nécessairement admettre les conséquences vraiment extraordinaires qui en résultent, et que je me propose de vous communiquer au fur et à mesure que le peu de loisirs dont je dispose me permettra de les rédiger.

Mémoire joint à la lettre précédente

Soient

- x, y, z les coordonnées du centre de gravité d'un sphéroïde,
 m la masse de ce sphéroïde,
 μ le moment d'inertie supposé constant pour tous les axes menés par le centre de gravité,
 u, v, w les déplacements du centre de gravité au bout du temps t
 γ, ψ, θ les angles infiniment petits de rotation autour de trois axes menés par le centre de gravité parallèlement aux axes des x , des y et des z ,
 l, F, G, H, I, K des fonctions entières de $D_x^2 + D_y^2 + D_z^2$,
 δ la dilatation

* Lorsque le système est isotrope, les équations des mouvements infiniment petits, que j'ai données dans un autre Mémoire, prennent la forme

$$1 \quad \left\{ \begin{array}{l} mD_t^* u = Eu + FD_x \theta + G(D_y \theta - D_x \psi), \\ mD_t^* v = Ev + FD_y \theta + G(D_x \varphi - D_x \theta), \\ mD_t^* w = Ew + FD_z \theta + G(D_x \psi - D_y \varphi), \\ \mu D_t^* \theta = H(D_y u - D_x v) - ID_x(D_x \varphi + D_y \psi) + [K + I(D_x^* + D_y^*)]\theta, \\ \mu D_t^* \psi = H(D_x w - D_z u) - ID_y(D_x \varphi + D_x \theta) + [K + I(D_x^* + D_y^*)]\psi, \\ \mu D_t^* \varphi = H(D_x v - D_y w) - ID_x(D_y \psi + D_z \theta) + [K + I(D_x^* + D_y^*)]\varphi. \end{array} \right.$$

* Supposons que le mouvement se réduise à un mouvement simple par ondes planes perpendiculaires à l'axe des x et sans condensations ou dilata-tions, on aura, dans ce cas,

$$2) \quad \left\{ \begin{array}{l} mD_t^* v = Ev - GD_x \theta, \\ mD_t^* w = Ew + GD_x \psi, \\ \mu D_t^* \theta = -HD_x v + [K + ID_x^*]\theta, \\ \mu D_t^* \psi = HD_x w + [K + ID_x^*]\psi; \end{array} \right.$$

et E, F, G, H, I, K ne seront plus que des fonctions entières de D_x^* . Consi-dérons spécialement le cas où l'on aurait

$$(3) \quad \frac{E}{m} = \frac{K + ID_x^*}{\mu}, \quad \frac{G}{m} + \frac{H}{\mu} = 0,$$

alors on pourra poser, pour simplifier,

$$4) \quad \frac{E}{m} = L, \quad \frac{K + ID_x^*}{\mu} = L, \quad \frac{H}{\mu} = M, \quad \frac{G}{m} = -M,$$

L, M étant deux fonctions entières de D_x^* . Les équations (2) prendront par conséquent la forme

$$(5) \quad \left\{ \begin{array}{l} D_t^* v = Lv + MD_x \theta, \\ D_t^* w = Lw - MD_x \psi, \\ D_t^* \theta = -MD_x v + L\theta, \\ D_t^* \psi = MD_x w + L\psi. \end{array} \right.$$

Admettons que le mouvement des centres de gravité soit polarisé circulaire-

ment, on aura

$$(6) \quad \begin{cases} v = a \cos(kx + st + \lambda), \\ w = a \sin(kx + st + \lambda); \end{cases}$$

et si l'on désigne la longueur d'ondulation par l , et la vitesse de propagation par ω , on aura, comme l'on sait,

$$(7) \quad l = \frac{2\pi}{k}, \quad \omega = \frac{s}{k}.$$

Cela posé, les valeurs correspondantes de θ et ψ seront nécessairement de la forme

$$(8) \quad \begin{cases} \theta = a' \cos(kx + st + \lambda'), \\ \psi = a'' \cos(kx + st + \lambda''), \end{cases}$$

substituant ces valeurs de v , w , θ , ψ dans les équations (5), on trouvera, en désignant par L' , M' , ce que deviennent L , M , lorsqu'on remplace D^2 par $-k^2$,

$$(9) \quad \begin{cases} \lambda' - \lambda = \frac{\pi}{2}, & a + a' = 0, \\ \lambda'' - \lambda = 0, & a - a'' = 0, \\ s^2 + L' + M'k = 0, & \omega^2 + \frac{L'}{k^2} + \frac{M'}{k} = 0; \end{cases}$$

et alors les valeurs de θ et ψ deviennent

$$(10) \quad \begin{cases} \theta = w = a \sin(kx + st + \lambda), \\ \psi = v = a \cos(kx + st + \lambda). \end{cases}$$

• Considérons actuellement le mouvement simple semblable au précédent, mais polarisé en sens contraire, il faudra alors remplacer les valeurs (6) par les suivantes

$$(11) \quad \begin{cases} v = a \cos(kx + st + \lambda), \\ w = -a \sin(kx + st + \lambda); \end{cases}$$

et les valeurs de θ et ψ étant toujours de la forme déterminée par les équations

tions (8), on trouve que, pour satisfaire aux équations (5), il faut que l'on ait

$$(12) \quad \begin{cases} \lambda' - \lambda = \frac{\pi}{2}, & a' = 0, \\ \lambda'' - \lambda = 0, & a'' - a = 0, \\ s^2 + L' - M'k = 0, & \omega^2 + \frac{L'}{F^2} - \frac{M'}{k} = 0; \end{cases}$$

et par suite on aura définitivement

$$(13) \quad \begin{cases} \theta = w = -a \sin(kx + st + \lambda), \\ \psi = v = a \cos(kx + st + \lambda). \end{cases}$$

» La valeur de la vitesse de propagation déterminée par la dernière des équations (12) étant différente de celle déterminée par la dernière des équations (9), il en résulte que les conditions (3) étant satisfaites, deux mouvements simples d'une même longueur d'ondulation, polarisés circulairement en sens contraire, se propagent nécessairement avec des vitesses différentes. Nous n'insisterons pas sur les conséquences remarquables de ce résultat, nous observerons seulement que si tous les sphéroïdes du système sont identiques, on aura

$$G + H = 0,$$

comme je le ferai voir dans un autre Mémoire; et, dans ce cas, les équations (3) et (4) conduisent à

$$M = 0,$$

et les conséquences précédentes sont alors inexactes. Par conséquent, pour qu'un système de sphéroïdes puisse présenter les phénomènes de la polarisation mobile, il est nécessaire qu'ils ne soient pas tous identiques. Ainsi que je viens de le dire, je reviendrai sur ce sujet dans un autre Mémoire. »

» M. AUGUSTIN CAUCHY présente quelques observations relatives à la Note de M. Laurent.

» M. Cauchy a clairement indiqué la méthode rationnelle à l'aide de laquelle il avait recherché les conditions analytiques de la polarisation circulaire. Il a dit expressément, dans la séance du 14 novembre 1842 : *Au lieu de former à priori les équations différentielles d'après la nature des forces et des systèmes de molécules supposés connus, et d'intégrer ensuite*

ces équations différentielles pour en déduire les phénomènes observés, je me suis proposé de remonter de ces phénomènes aux équations des mouvements infiniment petits. Les principes généraux qui servent à la solution de ce problème sont exposés dans le premier des deux Mémoires que j'ai l'honneur de soumettre à l'Académie. Parmi ces principes, il en est deux surtout qu'il importe de signaler. Un premier principe, etc. (voir le tome XV des Comptes rendus, pages 911-913).

» C'est en s'appuyant sur les principes rappelés, dans le passage dont nous venons de transcrire les premières lignes, que M. Cauchy a obtenu les conditions analytiques de la polarisation circulaire. Il a dit, page 913 : *Ces conditions se réduisent à deux, et, pour que la polarisation d'un rayon lumineux devienne circulaire, il suffit que la dilatation symbolique du volume s'évanouisse avec la somme des carrés des trois déplacements symboliques de chaque molécule.* Ces conditions, qui étaient effectivement vérifiées dans les formules données par M. Cauchy, ne devront pas cesser de l'être si le mouvement se trouve représenté par des équations différentielles qui renferment six inconnues au lieu de trois.

» M. Laurent observe que les équations différentielles de la polarisation chromatique sont incompatibles avec celles qui représentent les mouvements d'un système isotrope de points matériels, telles que M. Cauchy les a données dans les *Exercices*. Cette proposition est évidente par elle-même, puisque, pour passer des unes aux autres, il faut faire évanouir la fonction désignée par la lettre G dans le Mémoire du 14 novembre 1842 (tome XV des *Comptes rendus*), et qu'en réduisant cette fonction à zéro, on fait précisément disparaître la polarisation circulaire. Il y a plus dans le Mémoire cité, aussi bien que dans les nouvelles recherches qu'il a présentées à l'Académie le 22 avril dernier, M. Cauchy avait déjà signalé la différence qui existe entre les deux espèces d'équations, dont les unes se réduisent aux autres lorsque la fonction G s'évanouit. (Voir le tome XV des *Comptes rendus*, page 916.)

» Ce n'est pas tout. Si M. Laurent veut bien prendre la peine de relire attentivement les Mémoires de M. Cauchy, relatifs à la polarisation circulaire (14 novembre et 12 décembre 1842), il reconnaîtra que l'auteur n'y a pas réduit les molécules à de simples points matériels. M. Cauchy a dit, page 911 : *Le nombre des coefficients, que renferment les équations des mouvements infiniment petits d'un système de molécules, se trouvera encore considérablement augmenté, si l'on tient compte, avec quelques auteurs, des rotations des molécules, ou avec moi-même des divers atomes qui peuvent*

composer une seule molécule. Enfin il croîtra de nouveau, si l'on considère deux ou plusieurs systèmes de molécules au lieu d'un seul, etc. M. Cauchy a dit encore, dans le Mémoire du 12 décembre 1842 (voir le tome XV des *Comptes rendus*, page 1082) : Soient au bout du temps t , ξ , η , ζ les déplacements d'une molécule ou plutôt de son centre de gravité; et il est clair qu'il n'y a lieu à parler du centre de gravité d'une molécule que dans le cas où cette molécule ne se réduit pas à un simple point matériel.

» Reste à savoir si M. Laurent est parvenu à établir *a priori* les équations différentielles de la polarisation chromatique, en partant de la seule considération des actions mutuelles de molécules dont les dimensions ne sont pas supposées nulles.

» Pour se former à ce sujet une opinion raisonnée, il sera nécessaire non-seulement de lire avec attention la Note de M. Laurent, mais encore de connaître le développement des calculs dont cette Note offre seulement un aperçu. Si M. Laurent a effectivement démontré qu'on peut obtenir un système de sphéroïdes qui présente les phénomènes de la polarisation circulaire, cette proposition constituera, dans la théorie de la polarisation, un nouveau progrès auquel M. Cauchy s'empressera d'applaudir »

ASTRONOMIE. — *Nouvelles recherches faites à l'occasion de la comète découverte par M. Faye.* (Extrait d'une Lettre de M. VALZ à M. Arago.)

» Dans ma dernière Lettre, j'ai été amené, d'après les changements extraordinaires survenus dans l'orbite de la comète de Lexell par l'action de Jupiter, à examiner les circonstances du cours des comètes à courtes périodes, et j'ai remarqué que l'orbite de trois ans pouvait être due à l'action de Mercure, dont elle peut passer fort près, et celle de six ans à l'action de la Terre, dont elle rencontre presque l'orbite. Depuis lors, continuant mes recherches sur les orbites périodiques, j'ai reconnu aussi que la comète de Halley, passant bien près de l'orbite de la Terre ($\frac{1}{50}$ de la distance du Soleil), vers son nœud descendant, avait pu s'en trouver encore plus près dans des temps antérieurs, et que la forme de son orbite, depuis le changement qui y serait survenu, pourrait être due à l'action de la Terre; de façon que toutes les orbites périodiques actuelles des comètes pourraient avoir une origine planétaire, et ne feraient plus ainsi exception à une commune origine primitive, étrangère à notre système solaire, qu'on a attribué aux comètes. On pourrait objecter que la grande comète de 1843 a été reconnue aussi comme périodique, mais la grande proximité de son orbite à celle de Pallas ($\frac{1}{10}$ de la dis-

tance au Soleil) peut bien faire penser qu'elle n'est pas étrangère au fait cosmologique, qui, en changeant son orbite, aurait donné lieu à la séparation des quatre petites planètes, dont les variations continuelles auraient de puis lois modifié sensiblement les éléments. La nébulosité qui donne à l'une d'elles l'apparence des comètes pourrait être favorable à une pareille manière de voir. Lors du dernier retour de cette comète, Pallas s'en est trouvée à quelques degrés seulement en décembre 1842. Voilà sans doute des idées quelque peu hardies, mais on ne devait pas craindre d'en émettre de pareilles et de provoquer sur elles l'examen, car ce pourrait être un moyen de reconnaître des vérités scientifiques assez bien cachées pour qu'il ne fut pas facile de les découvrir différemment.

J'ai dit, dans la Lettre précédente, que de sept en sept révolutions la comète de trois ans se trouvait à sa plus grande proximité de Jupiter : ce qui n'est pas bien rigoureux actuellement, et n'aura guère lieu que dans un siècle environ, plus exactement, ce serait de sept en onze et dix huit révolutions ; mais la conclusion qui en a été déduite n'en sera guère affaiblie pour cela.

Burchardt, pour obtenir une grande perturbation dans la comète de Tevell en 1767, a été obligé d'augmenter de douze jours la révolution à laquelle il était parvenu, et de sept jours seulement pour parvenir en 1779, à l'extrême proximité de Jupiter, indiquée par le milieu de l'intervalle entre le deuxième et le troisième satellite, ce qui, du reste, a été contesté mais ne pourra se démontrer, à cause de l'incertitude de trois jours qui reste sur la révolution que lorsqu'elle identifie avec la comète de 1843 sera rendue bien manifeste, et permettra de remonter aux perturbations antérieures. Burchardt paraît admettre que la révolution est certaine à un jour et demi près, car, dit-il, les observations ont suffi pour faire reconnaître

la nécessité d'une correction aussi légère (*Mémoires de l'Institut*, 1806, page 24), et il ne pouvait justifier les augmentations qu'il se permettait dans la révolution que par la nécessité d'avoir recours à de fortes perturbations pour expliquer la disparition de la comète. Mais, dans un grand et beau travail, qui a été couronné par l'Académie de Copenhague, M. Clausen, en ayant égard aux perturbations de toutes les planètes, a bien confirmé les augmentations auxquelles Burchardt avait été obligé d'avoir recours, en montrant que les révolutions auxquelles il était parvenu devaient être plus longues de dix jours. Les différences restantes se trouvent exactement dans la limite d'incertitude fixée à trois jours par les calculs de M. Clausen.

A l'occasion de cette communication, M. Arago lit quelques passages d'une

Lettre de M. GAUSS qui annonce qu'à Pulkowa on a pu observer la comète de M. Faye jusqu'au 10 avril, et qu'on l'a encore aperçue le 16 du même mois.

MINÉRALOGIE. — *Note sur le Dipyre; par M. ACHILLE DELESSE.*

« MM. Gilet de Laumont et Charpentier⁽¹⁾ ont donné le nom de *Dipyre* à une substance très-rare qui se trouve aux environs de Mauléon, dans les Basses-Pyrénées; mais jusqu'à présent cette substance n'avait pas été regardée par tous les minéralogistes comme une espèce bien déterminée, et quoi-qu'elle eût pour elle l'autorité d'Hauy, on conservait des doutes sur son existence, du reste, il n'est pas étonnant qu'il en ait été ainsi, car le plus souvent on a donné le nom de dipyre à des substances minérales très-différentes, et, d'un autre côté, la seule analyse qu'on eût avait été faite par Vauquelin sur une petite quantité de matière, et était inexacte.

» En étudiant la collection de l'École des Mines, qui renferme de nombreux échantillons, remis pour la plupart par les personnes qui ont établi cette espèce minérale, on reconnaît deux variétés qui se distinguent surtout par leur gangue.

» Une première variété, qu'on trouve près du Gave et à Libarens, est généralement cristallisée en prisme droit, à base carrée; quelquefois ses cristaux sont transparents et ont un éclat vitreux, quelquefois, au contraire, ils paraissent éprouver un commencement de décomposition, et ils se désagrègent avec facilité. dans ce dernier cas, ils sont ordinairement accompagnés par la chlorite et par le quartz cristallisé, que M. Dufrénoy a trouvés dans ses courses géologiques aux Pyrénées (voir *Annales de Chimie et de Physique*, décembre 1843); la gangue est un talc argenté, verdâtre ou rougeâtre, contenant un calcaire qui peut même devenir tout à fait prédominant; quelquefois il y a aussi un peu d'amphibole vert clair.

» La deuxième variété se trouve à Mauléon, dans une pâte argileuse dont la couleur varie du jaune-brun au gris-noirâtre; cette espèce d'argile est très-onctueuse au toucher, surtout quand elle est jaune: elle contient alors une grande quantité de talc à un état de division extrême; elle renferme aussi de petits cristaux dodécaèdres de pyrite de fer, qui sont souvent décomposés et attirables au barreau aimanté. lorsqu'on la met dans l'eau, elle donne une odeur nauséabonde; du reste, elle se laisse assez facilement désagréger,

(1) CHARPENTIER, *Essai sur la constitution géologique des Pyrénées.*

surtout quand l'eau est chaude; on peut alors en extraire facilement les cristaux de dipyre qui se rapportent ordinairement à la variété périoctogone de Haiüy, et sont répandus en très-grande quantité dans la masse. Près d'Angoumer (Ariège), M. Charpentier a également signalé de petits cristaux blancs altérés, qui se trouvent, comme les précédents, dans une pâte argileuse d'une couleur brun foncé et qu'il regarde comme se rapportant à cette variété de *Dipyre*.

» L'analyse quantitative du dipyre a été faite par quatre expériences différentes :

» Dans la première, j'ai attaqué le minéral par le carbonate de potasse, j'ai dosé exactement la silice, puis j'ai déterminé approximativement les quantités d'alumine et de chaux, dans deux autres expériences, j'ai attaqué le minéral porphyrisé par cinq fois son poids de carbonate de baryte, en le chauffant à la forge et en suivant la marche ordinaire donnée par M. Berzelius après avoir précipité la baryte par l'acide sulfurique, en évitant de mettre un excès d'acide et en lavant bien, de manière à dissoudre tout le sulfate de chaux, l'alumine a été précipitée par l'ammoniaque, la chaux par l'oxalate d'ammoniaque et dosée à l'état de carbonate. L'évaporation des eaux-mères m'a donné les alcalis à l'état de sulfates, je les ai pesés et je les ai transformés en carbonates au moyen de l'acétate de baryte; j'ai dosé l'acide sulfurique du sulfate de baryte obtenu, puis j'ai pesé le carbonate alcalin et le chlorure correspondant; enfin j'ai précipité la potasse par le chlorure de platine.

» Dans une quatrième expérience, j'ai décomposé le dipyre par de l'acide fluorhydrique, et, après avoir séparé l'alumine et la chaux, je me suis principalement occupé du dosage des alcalis.

» Toutes ces analyses m'ont donné des résultats concordant bien entre eux, et qui se trouvent consignés dans le tableau qui suit . .

	I.	II.	III.	IV.
	Carbonate de potasse	Carbonate de baryte	Carbonate de baryte	Acide fluorhydrique.
Silice	0,549	0,555	0,560	»
Alumine. . . .	»	0,252	0,250	0,248
Chaux. . . .	»	0,109	0,100	0,096
Soude . . .	»	0,100	0,090	0,094
Potasse. . . .	»	»	0,096	0,008

» D'après les analyses qui précèdent et d'après les expériences qui me paraissent mériter le plus de confiance, je crois qu'on peut admettre, pour

la composition moyenne du dipyre,

		Oxygène	Rapports
Silice.	0,555	0,2884	5,52
Alumine. . . .	0,248	0,1158	2,22
Chaux.	0,096	0,0270	1,00
Soude.	0,094	0,0240	
Potasse	0,007	0,0012	
	1,000		

D'après Vauquelin, la composition de ce minéral serait .

Silice.	60
Alumine. . . .	24
Chaux.	10
Eau.	2
Perte.	4

» La forme cristalline du *Dipyre* avait porté quelques minéralogistes à le regarder comme une variété de la *Paranthine*; mais si l'on compare l'analyse qui précède aux nombreuses analyses de paranthine faites dans ces derniers temps et qui se trouvent rapportées avec beaucoup de détail et de soin dans le *Manuel de Minéralogie* de M. le docteur Rammelsberg, on reconnaît qu'il est absolument impossible de rapprocher ces deux espèces.

» La grande quantité d'alcali du dipyre et plusieurs de ses propriétés physiques porteraient à croire qu'il doit être rangé dans la famille des feldspaths; déjà M. de Köbell avait annoncé que le dipyre n'est autre chose que du *labrador*, quoique l'analyse de Vauquelin ne donne pas d'alcali. Si l'on compare, en effet, les résultats obtenus dans les expériences qui précèdent avec la composition du *labrador* (Rammelsberg, p. 379), on trouve la plus grande analogie; le dipyre contiendrait seulement plus de soude. Cependant un examen plus attentif ne permet pas d'adopter cette opinion, car le *labrador* cristallise dans le système unitaire, tandis que le dipyre paraît cristalliser dans le système quaternaire: la densité du premier est de 2,714; celle du second, de 2,646; en outre, le rapport entre la somme de l'oxygène des bases à 1 atome et celui de l'alumine n'est pas de 1 à 3, comme dans le *labrador*; et les modifications qu'il faudrait faire subir aux données de l'expérience pour arriver à la formule



qui est celle du *labrador*, ne me semblent pas admissibles, d'après la concordance des résultats que j'ai obtenus dans quatre analyses.

On pourrait peut-être penser que le diptyre se rapporte au *periklin* dont M. Abich a donné l'analyse dans son travail sur les feldspaths, car la quantité de soude est à peu près la même et la densité est de 2,641, mais le type cristallin est encore le système unitaire et on ne peut en aucune manière, arriver à la formule



En cherchant à exprimer par une formule les résultats de l'analyse du diptyre, j'ai trouvé, pour celle qui les représente le mieux et le plus simplement,



On peut en grouper les éléments de la manière suivante



Il serait facile d'obtenir des formules plus simples que celle-là, mais elles donneraient des résultats qui dépasseraient les limites des erreurs que je crois possible d'admettre dans les expériences qui précèdent le calcul de la formule que nous avons adoptée donne du reste

	Atomes		
Silice	7	4 042 29	54,17
Alumine	3	1 926 99	25,80
Chaux	2	712,04	9,55
Soude	2	781,80	10,40
		<hr/> 7 463 12	<hr/> 100 00

On voit que cela s'accorde assez bien avec l'analyse

En résumé, le diptyre ne me paraît pouvoir être confondu ni avec la paranthine, ni avec le labrador, et il forme une espèce minérale bien distincte, dont la formule serait



Dans une classification naturelle de minéraux, on pourrait le placer immédiatement à la suite de la grande famille des feldspaths, de laquelle il se rapproche par plusieurs propriétés, il s'en distinguerait par sa forme cristalline, et aussi parce que le rapport entre l'oxygène des bases à 3 atomes et celui des bases à 1 atome serait à peu près — 2 — 1, au lieu d'être — 3 — 1

» *Propriétés physiques.* — L'examen de ces deux variétés de dipyre m'a montré qu'elles ne présentent aucune différence dans leurs propriétés physiques ou chimiques. Les cristaux sont des prismes quadrangulaires ou de petits prismes octogonaux arrondis à leurs extrémités, et qui ressemblent à de l'orge perlée; la section perpendiculaire à la longueur de ces prismes présente un octogone dont la longueur est à peu près double de la largeur; on observe des clivages faciles parallèlement au grand et au petit côté de l'octogone, il y en a aussi parallèlement aux plans diagonaux; enfin on en a un perpendiculairement à la longueur du prisme, et même deux autres parallèles aux faces primitives. En mesurant au goniomètre à réflexion l'angle de l'octogone sur des cristaux aussi brillants que possible, on a trouvé qu'il était celui de l'octogone régulier, mais, dans cette mesure, l'erreur peut atteindre un demi degré.

» Dans la pâte argilo-talqueuse de Mauléon on trouve quelquefois des cristaux de dipyre réunis entre eux d'une manière tout à fait confuse et irrégulière, présentant un prisme dont la base est un carré ayant environ 1 centimètre de côté; la formation de ce gros prisme, dans l'intérieur duquel il y a un grand nombre de prismes octogonaux, peut s'expliquer en supposant que le cristal principal s'est formé d'abord, et qu'ensuite les petits cristaux de dipyre ont pris naissance lorsque sa matière était encore molle.

» Le dipyre est dur, il raye le verre et il se casse assez facilement, dans sa cassure, aussi bien que sur ses faces, il présente un état vitreux. Sa densité est 2,646.

» *Chalumeau* — Au chalumeau, le dipyre perd sa transparence, et fond avec un léger bouillonnement en donnant un verre blanc et bulleux; dans le tube fermé il dégage une très-petite quantité d'eau hygrométrique qui n'altère pas la couleur des papiers réactifs; avec le sel de phosphore, la fusion a lieu avec facilité, et l'on voit nager dans la perle un squelette de silice; avec le carbonate de soude, il fond aisément, et donne un verre limpide.

» *Composition chimique.* — Il ne s'attaque que difficilement par les acides, même très-concentrés, et encore pour cela faut-il qu'il soit réduit en poudre extrêmement fine.

» L'analyse qualitative du dipyre m'a appris qu'il n'éprouvait par la chaleur qu'une perte insignifiante, qui s'élève au plus à 1 millième de son poids. Comme Vauquelin donne 2 p. 100 d'eau dans son analyse, je me suis assuré de ce fait par plusieurs calcinations, et j'ai toujours obtenu le même résultat: cependant, après la calcination, les propriétés du minéral ont changé; il a perdu

sa transparence, il est devenu d'un blanc de lait il raye très-facilement le verre sans rayes toutefois le quartz ni le feldspath enfin, il se laisse difficilement réduire en poudre

Plusieurs minéralogistes ont annoncé que le dipyre contient du fluor ainsi que cela paraît avoir été constaté pour certaines variétés de paillothine desquelles il se rapproche du reste par la cristallisation cependant, ayant fait une attaque spéciale par le carbonate de soude d'après le procédé de M Berzelius il m'a été impossible de trouver du fluor l'analyse qualitative m'a donné seulement de la silice de l'alumine de la chaux, quelquefois de la magnésie de la soude et un peu de potasse la magnésie n'a été trouvée que dans une seule expérience elle me paraît devoir provenir de parcelles de talc qui n'auraient pas été complètement enlevées par le lavage Quant aux alcalis il y en a une quantité très-notable j'ai reconnu la présence de la soude par la formation de chlorure de sodium cristallisant en cubes, et celle de la potasse par le chlorure de platine cette dernière base était assez difficile à constater car elle ne se trouve qu'en très-petite quantité mais je me suis assuré d'une manière positive qu'elle existe dans le minéral par la propriété qu'a le carbonate alcalin d'attirer l'humidité de l'air

CHIMIE — *De l'action de l'ammoniaque sur l'éther butyrique,*
par M G CHANCEL

M Pelouze annonce à l'Académie les premiers résultats auxquels est parvenu l'un de ses élèves M Chancel en étudiant d'après son invitation quelques produits qui dérivent de l'acide butyrique

La fermentation du sucre peut fournir aujourd'hui cet acide en quantité suffisante pour qu'il soit possible de soumettre à une étude approfondie les diverses combinaisons auxquelles il donne naissance

L'auteur a pensé qu'il y aurait peut-être de l'intérêt à examiner l'action de quelques agents sur l'éther butyrique dont la formation est si nette et si facile On sait que l'éther oxalique donne, sous l'influence de l'ammoniaque caustique, l'oxamide, substance découverte par M Dumas qui l'a signalée comme type d'une série de combinaisons désignée sous le nom générique d'*amides* Il était probable que l'éther butyrique donnerait lieu à une réaction semblable l'expérience a confirmé d'une manière complète ces prévisions L'action de l'ammoniaque caustique sur l'éther butyrique n'a lieu, il est vrai, qu'avec lenteur et difficulté, mais elle finit par être complète et

donne lieu à une substance qui cristallise avec facilité et qui possède tous les caractères d'une amide.

Butyramide.

» *Sa formation.* — Lorsqu'on fait un mélange d'ammoniaque liquide et d'éther butyrique, ce dernier donne d'abord un aspect trouble et laiteux au liquide, mais il ne tarde pas à s'en séparer pour se maintenir à la partie supérieure. Néanmoins, à la température ordinaire, en ayant soin d'agiter fréquemment les deux liquides, l'éther butyrique est décomposé; on voit la couche diminuer de jour en jour, et, après un laps de temps suffisant, elle finit par disparaître complètement. En introduisant dans un flacon bien bouché 1 partie d'éther butyrique et 5 à 6 parties d'ammoniaque, l'action, favorisée du reste par de fréquentes agitations, est complète après huit ou dix jours; en évaporant alors le liquide jusqu'au tiers de son volume primitif, la butyramide cristallise par le refroidissement de la liqueur. Cette substance prend donc naissance dans les mêmes circonstances que l'oxamide et la succinamide proprement dite, qui vient d'être découverte récemment par M. Fehling.

» *Propriétés.* — La butyramide cristallise en tables nacrées, d'un blanc éclatant, elle est incolore, transparente, ne s'altère pas au contact de l'air, possède une saveur sucrée et fraîche, suivie d'un arrière-goût amer. Elle fond, à une température voisine de 115 degrés, en un liquide incolore qui, maintenu en fusion, se volatilise lentement; ces vapeurs se laissent enflammer: elle est, du reste, volatile, sans résidu; sa solubilité dans l'eau a lieu avec facilité; elle est plus considérable à chaud qu'à froid; elle se dissout également dans l'alcool et dans l'éther. Projetée sur l'eau, elle se dissout sans produire ces mouvements giratoires communs à plusieurs butyrates solubles, sous l'influence de la température de l'ébullition, la butyramide en dissolution aqueuse est décomposée, par les alcalis, en ammoniaque et acide butyrique. Ainsi, en ajoutant de l'hydrate de potasse à une dissolution de butyramide dans l'eau, on ne remarque à froid aucun dégagement appréciable d'ammoniaque; mais, par l'ébullition, celle-ci prend naissance et se dégage pendant longtemps en grande quantité.

» L'auteur n'a, jusqu'à présent, soumis la butyramide à l'action d'aucun autre agent.


» *Composition.* — L'analyse de cette substance a fourni des résultats qui conduisent exactement à la formule suivante.



Il en résulte que l'équivalent de la butyramide est représenté par le nombre 108,54

Cette composition confirme donc, si cela était encore nécessaire, la formule de l'acide butyrique adoptée par MM Pelouze et Gélis

La formation de la butyramide dans les circonstances qui viennent d'être mentionnées s'exprime des lors par l'équation suivante



L'auteur se propose d'examiner l'action de l'ammoniaque sèche sur l'éther butyrique, ainsi que les autres produits de décomposition auxquels divers agents pourraient donner lieu. Si cette étude le conduit à des observations qui puissent avoir quelque intérêt pour la science, il s'empres- sera de les livrer à la publicité

CHIMIE ORGANIQUE — *Sur une altération du pain causée par le développement d'un cryptogame* observation faite, il y a très longtemps, d'un phénomène qui rentre dans la classe de ceux sur lesquels Mosei a appelé l'attention, Lettre de M B Bizio

« Dans le n° 1 du *Journal de Pharmacie* de janvier 1844, j'ai lu l'extrait d'un Rapport adressé au Ministre de la Guerre sur une altération extraordinaire du pain de munition, Rapport fait par une Commission dans laquelle entraient plusieurs membres de l'Académie des Sciences, MM Dumas, Pelouze et Payen. Si le fait a paru digne d'intérêt, il me sera permis, je l'espère, de faire remarquer que je m'en suis occupé il y a déjà vingt-quatre ans et que j'en ai fait l'objet d'une étude attentive. Ce travail est un des premiers de ma jeunesse.

Voici l'exposition du fait. Dans les premiers jours du mois de juillet 1819, dans le pays de Legnaro, province de Padoue, d'abord chez M Antoine Pittarello, et ensuite chez les autres habitants de ce pays et des environs, on a vu du midi au soir, c'est-à-dire dans l'espace de huit ou dix heures, la *polenta*, faite avec de la farine de maïs, se couvrir entièrement d'une matière dont la couleur rappelait celle du sang. Cette couleur s'étendait aussi sur le pain et sur le riz cuit que l'on conservait dans le même endroit où l'on tenait la *polenta*. Ce phénomène excita tant de surprise et d'étonnement parmi le peuple, que la nouvelle en parvint jusqu'aux

autorités publiques, lesquelles nommèrent une Commission composée des plus distingués professeurs de l'Université de Padoue, qui se rendirent sur le lieu pour examiner scrupuleusement le fait (*voyez mon Mémoire inséré dans la Biblioteca italiana*, tome XXX, page 278).

• Tandis que la Commission s'occupait à faire des recherches à ce sujet et avant qu'elle eût encore émis aucune opinion, je vis de cette *polenta* purpurine, et le seul examen à la vue simple me fit reconnaître aussitôt qu'il s'agissait d'un champignon microscopique; je jugeai dès lors que les circonstances propres au développement de ces cryptogames devaient beaucoup et promptement influer sur la production du phénomène en question.

• En conséquence, le 20 août 1819, je plaçai un morceau de *polenta* de maïs dans une atmosphère saturée d'humidité et à la température de 21 degrés Réaumur. Vingt heures après environ, j'observai des taches purpurines répandues çà et là sur la surface de la *polenta*, qui, dans l'espace de quarante-huit heures, fut colorée dans toute sa superficie.

• Je trouvai ensuite que l'atmosphère humide et le concours des émanations fétides reudaient le phénomène plus prompt et plus apparent. On publia ces premiers résultats dans la *Gazetta privilegiata* de Venise, le 24 août 1819.

• J'observai en outre, qu'en mettant un morceau de *polenta* purpurine en contact avec un autre morceau de *polenta* récemment préparée, celle-ci devint rouge plus promptement, et bien plus promptement encore lorsqu'au moment où on la mettait en contact avec l'autre, elle conservait un peu de tiédeur. Le même effet avait lieu aussi en tenant la *polenta* de maïs qui était rouge, éloignée de 1 ponce et même plus de celle récemment préparée (*loc. cit.*, page 283). D'où je conclus, qu'au moyen de l'air, les semences du champignon microscopique de la *polenta* purpurine passaient sur la *polenta* récemment préparée et y germaient.

• Ayant ainsi établi dans le champignon la faculté de se régénérer, je cherchai le degré de température qui était nécessaire pour détruire cette faculté de germination, et je trouvai que les germes continuaient à se développer à + 100 degrés Réaumur, et périssaient à la température de + 120 degrés Réaumur.

• Avec le concours de l'air humide et d'une température élevée, j'ai reproduit à mon gré le phénomène ici à Venise, à Padoue et à Vicence, en 1820, 1821 et 1822. Bien mieux, en faisant les expériences ci-dessus, en 1820, aux premiers jours du mois d'août, dans une habitation située sur le territoire de Vicence, et environnée de rizières, j'observai que la couleur

rouge se produisait promptement dans ce lieu-là et avec une promptitude étonnante.

» J'examinai aussi les taches purpurines de la *polenta* de maïs avec le microscope, et j'aperçus un agrégat de très-petites vésicules hémisphériques, couvertes d'une pellicule mince, un peu luisante, et parsemée de petits points d'une couleur pourpre si foncée, qu'elle paraissait presque noire. J'ai jugé que ces points étaient les *sporules* où étaient placées les semences qui reproduisent l'espèce.

» Après avoir fait l'examen de ce cryptogame, il me sembla ne pouvoir le classer avec justesse dans aucun des genres alors connus; c'est pourquoi j'en établis un nouveau, et je l'appelai *Serratia* (page 288), du nom d'un illustre Italien, en y joignant les phrases génériques et spécifiques qui suivent :

» *Funguli acaules, semispherici, capsulis contortis S. marescens. Vesicula tenuissima, latice primo roseo, dehinc rubro repleta.*

» Je parvins à conserver avec facilité les semences de ce cryptogame singulier non-seulement d'une année à l'autre, mais encore pendant l'espace de trois années, et à prouver que pendant tout ce temps-là elles conservaient leur faculté de germination. Pour obtenir ce résultat, il suffit de recueillir sur des petits morceaux de papier ou de bois, la matière colorante des petits champignons, lorsqu'ils sont mûrs, c'est-à-dire quand la surface de la *polenta* rouge communique sa couleur pourpre aux objets qui la touchent brusquement; et plaçant l'année suivante, dans la saison favorable, ces objets en contact avec de la *polenta* de maïs récemment confectionnée, la couleur rouge se reproduit sans peine, comme je l'ai toujours reproduite à volonté. Il résulte de cela qu'il faut nettoyer avec soin l'endroit où l'on a tenu la *polenta* et le pain ainsi altéré, afin que le pain ou la *polenta* qu'on veut y renfermer ne se gâte dans la saison chaude de l'année suivante (*op. cit.*, pages 290 et 291).

» J'examinai ensuite les propriétés de la matière colorante du champignon. Après avoir soigneusement enlevé la surface purpurine de la *polenta* de maïs rougie, et l'avoir convenablement fait sécher, je la trouvai tout à fait insoluble dans l'eau et très-soluble dans l'alcool.

» Cette matière, à l'aide des mordants, colorait en rouge la soie et la laine; la couleur, toutefois, s'effaçait promptement à la lumière directe du soleil.

» Mon travail sur le phénomène de la *polenta* purpurine de maïs a été réimprimé dans le premier volume de mes *Opuscoli chimico-fisici*, publié

en 1827; ouvrage dont j'ai eu l'honneur de faire hommage à l'Académie, et où MM. les membres que ce sujet intéresserait trouveront des détails que je ne puis donner ici.

On pourra aussi voir dans cet ouvrage (page 430), quelques-unes des expériences singulières que j'ai faites concernant les effets de la lumière sur la vapeur du camphre; j'y ai rapporté un fait tout semblable aux faits fondamentaux de Mòser. Le voici. « Sur quatre verres, qui pendant soixante ans avaient été placés devant quatre peintures de Zuccarelli, sans être, d'ailleurs, en contact avec ces peintures, les images ont été exactement imprimées à la surface intérieure. » Or, m'appuyant sur les expériences contenues dans ce Mémoire, j'ai aussi tâché de donner l'explication de ce phénomène curieux, et, à cette époque, très-singulier. »

M. CLAUDET communique les résultats des recherches auxquelles il s'est livré dans le but d'affranchir la *photographie* de certaines causes d'insuccès auxquelles on paraît avoir fait jusqu'à présent peu d'attention.

« Il est reconnu, dit M. Claudet, par toutes les personnes de bonne foi qui s'occupent du daguerréotype, que l'opération manque plus souvent qu'elle ne réussit; de sorte que c'est pour ainsi dire par un effet du hasard que l'on obtient une épreuve favorable. Le polissage des plaques et la préparation de la couche sensible, paraissant les deux opérations les plus difficiles, ont absorbé tous les soins et toute l'attention des opérateurs. Il en est très-peu qui se soient occupés de la partie optique, et ceux-là mêmes, lorsqu'ils se sont procuré des objectifs dans lesquels les aberrations de sphéricité et de réfrangibilité se trouvent corrigées avec la plus grande précision possible, ne supposent pas que, pour assurer le succès de l'opération dans la chambre obscure, il reste d'autre soin à prendre que celui de mettre exactement la plaque sensible au foyer qui donne sur le verre dépoli une image bien définie. Si, malgré toutes ces précautions, on n'arrive pas à un résultat satisfaisant, on attribue communément le défaut de netteté de l'image daguerrienne à quelque dérangement survenu dans l'appareil pendant la substitution d'une plaque à l'autre. »

Ces dérangements furent d'abord considérés par M. Claudet lui-même comme une des principales causes d'insuccès, et il s'attacha en conséquence à trouver un moyen de les prévenir. Il réussit complètement à cet égard, de sorte que, après avoir substitué, à plusieurs reprises, une plaque à l'autre, l'image formée sur le verre dépoli était, dans le dernier essai, tout aussi nette que dans le premier. Ce progrès dans le procédé opératoire exerça

sur le résultat définitif une influence marquée, mais tout à fait inattendue et contraire à celle qu'on espérait : en effet, les images formées sur les plaques sensibles furent *constamment mal définies*. On essaya sans succès diverses combinaisons de lentilles ; on ne parvenait à éviter la confusion que par l'emploi d'un diaphragme à ouverture très-étroite. Après beaucoup de tentatives infructueuses, M. Claudet en vint enfin à soupçonner que le foyer d'action photogénique pouvait bien ne pas coïncider avec le foyer visuel formé par les rayons lumineux. Des expériences entreprises dans le but de vérifier cette conjecture prouvèrent, non-seulement qu'elle était parfaitement fondée, mais conduisirent en outre à reconnaître

1°. Que la différence ou l'éloignement de ces deux foyers varie suivant la combinaison achromatique des verres formant les objectifs, et suivant leur pouvoir de dispersion ;

2°. Que dans la *plupart* des objectifs achromatiques, le foyer d'action photogénique est plus long que le foyer visuel ;

3°. Que, dans les objectifs non achromatiques soit en *crown*, soit en *flint-glass*, le foyer d'action est plus court que le foyer visuel,

4°. Que l'éloignement de ces deux foyers varie suivant la distance des objets ;

5°. Enfin, qu'il varie suivant l'intensité de la lumière.

M. Claudet annonce qu'en tenant compte de ces diverses circonstances, il est parvenu à déterminer d'avance, pour un objectif donné et pour chaque distance des objets, le foyer d'action photogénique avec une certitude qui lui permet d'obtenir constamment de belles épreuves.

OPTIQUE APPLIQUÉE. — M. ARAGO donne lecture de quelques passages d'une Lettre que M. BONTemps lui a écrite et par laquelle ce très-habile directeur de la verrerie de Choisy-le-Roi, offre au Bureau des Longitudes les masses de verres nécessaires à l'exécution des grandes lunettes achromatiques projetées, à des prix d'une modicité presque incroyable. Voici ces passages :

« Un disque de flint-glass pour lunette de 55 centimètres d'ouverture, pèse environ 40 kilogrammes ; je compterais ces 40 kilogrammes à 10 francs c'est à peu près le prix auquel je vends le flint-glass en plaques pour les lunettes de 3 à 7 centimètres d'ouverture ; ces 40 kilogrammes à 10 francs, font..... 400 fr

» Les frais de ramollissage seront d'environ. 150

» Je fournirai donc ce disque de 55 centimètres pour..... 550 fr.

» C'est un disque semblable qu'on évaluait dernièrement quarante mille francs, alors que cette fabrication était encore incertaine. Nous avons vendu trois mille francs un disque de 32 centimètres, et cinq mille francs un disque de 38 centimètres.

» Le disque en crown-glass de 55 centimètres pesera environ 25 kilogrammes, à 10 francs..... 250 fr.
 » Le ramollissage coûtera environ..... 200
 Total..... 450 fr.

» Le disque de flint-glass et le disque de crown-glass pour la lunette de 55 centimètres d'ouverture coûteront donc mille francs.

» Un disque de flint-glass de 1 mètre de diamètre pèserait environ 150 kilogrammes, ce qui, au prix de 10 francs, ferait.... 1500 fr.
 » Les frais de ramollissage seraient environ de..... 1000
 Total..... 2500 fr.

» Le disque de crown-glass de 1 mètre serait environ du même prix.

» Pour établir un semblable disque, je serais obligé de faire un four et des creusets plus grands; mais l'opération devant avoir le même degré de certitude, les frais de ce four seraient couverts par la vente courante du flint-glass et du crown-glass.

» Il serait indispensable, quand on ferait une lunette de grande dimension, de ne pas opérer sur un disque seulement; je mettrais donc à la disposition du Bureau des Longitudes, plusieurs disques du diamètre de l'objectif que l'on voudrait établir, et celui-là seul me serait payé qui aurait été reconnu le meilleur; les autres rentreraient dans la consommation ordinaire de l'optique. »

M. CROWE, consul général de S. M. Britannique à Christiania, écrit d'Alten, à M. Arago, pour lui annoncer l'envoi des *observations météorologiques* qui ont été faites en ce lieu, par ses soins, pendant douze mois consécutifs. On observait trois fois par jour, et, le 21 de chaque mois, les observations se faisaient de demi-heure en demi-heure. M. Crowe pourra envoyer prochainement une série d'observations de passages, ayant reçu d'Angleterre les instruments nécessaires, instruments que l'on s'occupe en ce moment d'installer dans un observatoire bâti tout exprès. Il réclame les bons offices de l'Académie près de M. le ministre de la Marine, à l'effet d'obtenir

que les instruments apportés par les membres de l'expédition scientifique française, restent encore à sa disposition, et lui permettent de continuer ses observations sur le même plan que celles dont il annonce l'envoi, plan qu'il s'empresserait d'ailleurs de modifier ou d'étendre conformément aux remarques que pourrait lui faire à ce sujet l'Académie.

M. Crowe annonce l'intention de faire placer cet été, sur une des montagnes du Spitzberg, un thermomètre à minimum de Rutherford, qui y restera tout l'hiver. Un thermomètre de ce genre est maintenant placé sur le sommet de la montagne de Storvandsfield, montagne qui est par les 71" de lat. N., et qui, suivant M. de Buch, est élevée de 1300 mètres

M. DELARUE adresse le tableau des observations météorologiques faites à Dijon pendant les mois de mars et d'avril 1844.

L'Académie accepte le dépôt de deux *paquets cachetés* présentés, l'un par M. HOFMANN, l'autre par MM. CHOISELAT et RATLL.

La séance est levée à 5 heures trois quarts.

A



• BULLETIN BIBLIOGRAPHIQUE.

L'Académie a reçu, dans cette séance, les ouvrages dont voici les titres :

Comptes rendus hebdomadaires des séances de l'Académie royale des Sciences, 1^{er} semestre 1844, n° 20, in-4°.

Bulletin de l'Académie royale de Médecine, tome LX, n° 15 et 16; in-8°.

Société royale et centrale d'Agriculture. — Rapport fait par M. le vicomte DE THURY sur le concours du Manuel théorique et pratique de la Culture maraîchère des environs de Paris. (Séance du 14 avril 1844.) Broch. in-8°.

Atlas de Zoologie, ou Collection de 100 planches comprenant 257 figures d'Animaux nouveaux ou peu connus, classés d'après la méthode de M. DE BLAINVILLE, avec une explication, par M. P. GERVAIS; in-8°.

Études sur la Mortalité dans les bagnes et dans les maisons centrales de force et de correction, depuis 1822 jusqu'à 1837 inclusivement, faites par ordre de M. le comte DUCHATEL, Ministre de l'Intérieur, d'après les documents officiels fournis par les Ministères de l'Intérieur et de la Marine; broch. in-4°.

Cinquante Sonnets dédiés aux cinquante membres titulaires et honoraires de l'Académie; par M. MOLLEVAUT; broch. in-12.

Dictionnaire universel d'Histoire naturelle; tome IV; 48° livr., in-8°.

Mémoire sur les Appareils appliqués à la ventilation des Mines, par M. G. GLEPIN. MORS, 1844; in-4°.

Notice sur quelques Insectes nuisibles au froment, au seigle, à l'orge et au trèfle, par M. GUÉRIN-MÉNEVILLE, 1843; in-8°.

Revue zoologique; par le même; 1844; in-8°.

Types de chaque famille et des principaux genres de Plantes croissant spontanément en France; par M. PLÉE; 7° livr., in-4°.

Sujets divers d'Horticulture, par M. PUVIS. BOURG, 1844; in-8°.

Observations de la Société royale d'Émulation et d'Agriculture de l'Ain sur le Traité avec la puissance sarde; par le même; in-8°.

Des avantages de l'Irrigation, de l'étendue qu'on peut lui donner en France, et des mesures légales nécessaires pour la faciliter; par le même; in-8°.

Des Étangs, de leur construction, de leur produit et de leur dessèchement; par le même; in-8°.

Exposition générale de 1844 L'Estat de l'Eglise du Perigord, depuis le christianisme, par le R -P J DUPUY, Recollect, tome II Périgueux, 1629, in 4°. Reproduit par le procédé litho-typographique de M A DUPONT Périgueux, 1842 — Note sur les objets exposés 1° pierres lithographiques, 2° reproduction litho-typographique de vieux livres, vieilles gravures et vieux manuscrits, 3° gravure litho-typographique sur pierre, remplaçant la gravure sur bois au moyen de clichés pierres Périgueux, 1844, in-4°

Journal des Usines et des Brevets d'Invention, avril 1844, in 8°

Bulletin bibliographique des Sciences médicales et des Sciences qui s'y rapportent, janvier, février et mars 1844, in-8°

Journal d'Agriculture pratique et de Jardinage, mai 1844, in-8°

L'Abeille médicale, mai 1844, in 8°

Urgente réforme des Chemins de fer et de toute la locomotion terrestre proposée au Ministre des Travaux publics en France par M HOENÉ WRONSKI Paris, 1844, in 8°

Le Destin de la France, de l'Allemagne, de la Russie, comme prolégomènes du Messianisme, par le même, in-8°

Recherches sur la vie et les travaux de quelques Imprimeurs belges établis à l'étranger pendant les XV^e et XVI^e siècles, par M VANDER-MEERSCH Gand, 1844, in 8°

Histoire naturelle générale et particulière des Insectes neuropteres, par M PICTET 1^{re} Monographie famille des Ephémères, 3^e et 4^e livr., in 8°

Notice sur les Animaux peu connus du Musée de Genève, par MM F -1 et CH PICTET, 3^e et 4^e livr., in-4°

Magnetical Observations magnétiques et météorologiques faites à l'Observatoire royal de Greenwich dans les années 1840 et 1841, sous la direction de M H-B AIRY, publiées par ordre de l'Amirauté Londres, 1843 in-4°

Calcutta Journal d'Histoire naturelle de Calcutta — Géologie et Zoologie par M J-M CLELLAND, et Botanique par M W GRIFFITH, n° 16, janvier 1844, in-8°

Corso . Cours élémentaire de Mécanique et d'Hydraulique, par M V AMICI, 2 vol in-8° Florence, 1840 et 1842

Sul problema . Du problème de l'équilibre des Voûtes, Mémoire couronné par la Société italienne des Sciences de Modène, par le même, 1833, in 4°

Nuovo Nouvel Hygromètre — Mémoire du professeur A MAJOCCHI (Extra des Annali di Fisica, janvier 1841.) In 8°

Sur l'Action chimique du Calorique, expériences faites par le
même (Extrait des mêmes Annales septembre 1841) In-8°

Galvanometre Galvanometre universel ou à force variable par le même
(Extrait du même ouvrage) In 8°

Gazette médicale de Paris, n° 20

Gazette des Hôpitaux, nos 56 à 58

L'Echo du Monde savant nos 38 et 39

L'Experience n° 359 in-8°



COMPTE RENDU

DES SÉANCES

DE L'ACADÉMIE DES SCIENCES.

SÉANCE DU LUNDI 27 MAI 1844.

PRÉSIDENCE DE M. ÉLIE DE BEAUMONT.

MÉMOIRES ET COMMUNICATIONS

DES MEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE L'ACADÉMIE.

PHYSIQUE MATHÉMATIQUE. — *Mémoire sur la théorie de la polarisation chromatique; par M. AUGUSTIN CAUCHY.*

« Une Lettre de M. Laurent, lue en partie seulement à la dernière séance, mais insérée tout entière dans le *Compte rendu*, commence par ces mots *La théorie de la polarisation mobile en est encore aujourd'hui au point où l'a laissée Fresnel.* Pour savoir si cette proposition est exacte, voyons d'abord ce qui doit constituer une théorie.

» Si nous ignorons l'essence intime de la matière, nous pouvons du moins observer les phénomènes qui se produisent sous nos yeux, et en étudier les phases diverses. Or la théorie d'un phénomène est généralement censée connue, quand on est parvenu à la connaissance des lois qui le régissent. D'ailleurs la découverte de ces lois n'est pas ordinairement l'affaire d'un jour, ni le fruit des recherches d'un seul homme. Le plus souvent on commence par déduire de l'observation, non pas les lois véritables, mais des lois approchées; plus tard, à l'aide du calcul, on découvre les modifications ou perturbations que doivent subir ces mêmes lois. Ainsi, par exemple, en Astronomie, Kepler a déduit de l'obser-

vation les lois du mouvement elliptique des planetes, mais, comme en réalité les orbites planetaires ne sont pas de véritables ellipses, le mouvement elliptique se trouve alteré par des perturbations dont le calcul est l'objet principal de diverses methodes inventées par les géometres. De meme, en étudiant le phenomene de la réfraction des rayons lumineux produite par la surface d'un corps isophane Descartes a conclu de ses expériences que le sinus d'incidence est proportionnel au sinus de refraction, et par suite le rapport de ces deux sinus, ou l'indice de réfraction, a dû être considéré comme une constante dont la valeur pouvait s'exprimer en chiffres pour chaque substance. Mais en y regardant de plus pres, on a reconnu que cet indice variait pour un meme corps, quoique dans des limites assez restreintes, avec la nature de la couleur, et des lors il importait de decouvrir les lois de cette variation. Ce probleme offrait d'autant plus d'intéret que la dispersion de la lumiere étant regardée, par les partisans du systeme de l'émission, comme une objection grave contre le systeme des ondulations lumineuses. On sait que cette objection est maintenant résolue. Je suis parvenu, en 1830, à établir les lois de la dispersion de la lumiere. En vertu de ces lois, que j'ai développées dans les *Nouveaux Exercices de Mathématiques*, les différences entre les indices de refraction correspondants à diverses couleurs sont sensiblement proportionnelles aux différences entre les nombres inverses des carrés des longueurs d'ondulation dans l'air ou dans le vide. Cette conséquence de la theorie de la dispersion est effectivement conforme aux résultats des expériences de Fraunhofer, comme on peut le voir dans le Mémoire que j'ai présenté à l'Académie le 12 décembre 1842.

En physique, aussi bien qu'en mécanique, les lois d'un phénomène se trouvent ordinairement représentées par les intégrales de certains systemes d'équations différentielles. Donc alors la connaissance de ces équations et de leurs intégrales constitue ce qu'on pourrait appeler la théorie complète du phénomène. Ainsi, par exemple, en astronomie, le principe de la gravitation universelle fournit immédiatement les équations différentielles des mouvements planétaires, et la théorie de ces mouvements se trouvera portée au plus haut degré de perfection qu'elle puisse atteindre, lorsque les géometres seront parvenus à former, dans tous les cas, avec le moins de travail possible, les intégrales de ces équations différentielles. Pareillement, la théorie mathématique de la dispersion se trouve comprise tout entière dans certaines équations différentielles linéaires dont j'ai donné la forme et les intégrales, savoir, dans les équations qu'on obtient quand on considère d'abord comme je l'avais fait en 1827 et 1828, les mouvements infiniment petits d'un

systeme quelconque de points matériels sollicités par des forces d'attraction ou de repulsion mutuelle, et quand on introduit ensuite dans le calcul les conditions qui expriment que le systeme devient isotrope, comme je l'ai fait dans les *Nouveaux Exercices* et dans divers Mémoires présentés à l'Académie

Appliquons maintenant les notions générales que nous venons de rappeler au phénomène de la polarisation chromatique

En étudiant ce phénomène découvert, comme l'on sait, par M. Arago M. Biot a reconnu que, si l'on fait tomber un rayon polarisé sur une plaque de cristal de roche taillée perpendiculairement à l'axe, le plan de polarisation tournera proportionnellement à l'épaisseur de la lame et avec une vitesse angulaire qui sera différente pour les diverses couleurs. Par suite ainsi que l'a remarqué Fresnel, le rayon qui traverse la plaque pourra être considéré comme résultant de la superposition de deux rayons simples, polarisés circulairement, mais doués de vitesses de propagation différentes. Il y a plus M. Biot a conclu d'expériences faites avec beaucoup de précision que pour des rayons polarisés de couleurs diverses, les indices de rotation sont, à très-peu près, réciproquement proportionnels aux carrés des longueurs d'ondes. Toutefois cette loi cesse d'être exacte ainsi que M. Biot l'a remarqué lui-même quand on substitue au cristal de roche certains liquides isophanes qui présentent aussi le phénomène de la polarisation chromatique. Mais comment la loi trouvée par M. Biot doit-elle être alors modifiée? En d'autres termes, quelles sont les lois de ce qu'on peut appeler la *dispersion circulaire*? C'est pour arriver à les découvrir, s'il était possible que j'ai imaginé la méthode rationnelle qui se trouve exposée dans mon Mémoire du 14 novembre 1842. Cette méthode est fondée sur de nouveaux principes qui se rapportent à la mécanique moléculaire et aux phénomènes représentés par des systèmes d'équations linéaires aux dérivées partielles, par conséquent aux phénomènes produits par les mouvements infiniment petits de points matériels ou même de molécules à dimensions fines. Parmi ces principes, il en est un surtout qui me paraissait digne de remarque. Je prouvais que, *si un mouvement infiniment petit, se propage dans un milieu donné, peut être considéré comme résultant de la superposition de plusieurs mouvements simples, chacun de ceux-ci pourra encore se propager dans ce même milieu, pourvu toutefois que les mouvements simples, superposés les uns aux autres, soient en nombre fini, et correspondent à des symboles caractéristiques différents*. Il résultait de ce principe que, dans la polarisation chromatique, les deux rayons simples, polarisés circulairement, sont bien réellement deux rayons distincts dont chacun peut être po-

laine circulairement par le milieu soumis à l'expérience. Mais ce n'est pas tout. La méthode rationnelle que j'avais imaginée pour remonter des phénomènes aux équations linéaires qui peuvent les représenter, m'avait fourni, d'un côté, les conditions analytiques de la polarisation circulaire, et d'autre part les équations linéaires de la polarisation chromatique. D'ailleurs, ces dernières équations étant formées, j'ai pu en deduire les lois de la dispersion circulaire dans les milieux qui offrent le phénomène de la polarisation chromatique, et obtenir ainsi, dans le Mémoire du 12 décembre 1842 la théorie mathématique de ce phénomène. En vertu de ces lois, si l'on multiplie les indices de rotation relatifs aux diverses couleurs par les carrés des longueurs d'ondulations correspondantes à ces mêmes couleurs, les différences entre les produits ainsi formés seront représentées par des séries dont les premiers termes seront entre eux comme les différences entre les carrés de nombres réciproquement proportionnels aux longueurs des ondulations. Ces deux espèces de différences seront donc proportionnelles les unes aux autres, si l'on réduit les séries à leurs premiers termes. Or ce résultat remarquable se trouve précisément d'accord avec les résultats numériques des expériences de M. Biot sur l'acide tartrique étendu d'eau.

La théorie de la dispersion circulaire, qui devint nécessairement entière dans la théorie complète de la polarisation chromatique et qui déterminait ce qu'on peut appeler les *perturbations de ce phénomène*, n'a été assurément ni établie, ni même indiquée par Fresnel. Si donc M. Laurent considère la théorie de la polarisation mobile comme étant encore au point où la laisse Fresnel, je devais penser qu'à ses yeux ma théorie de la dispersion circulaire est inexacte. A la vérité, en lisant sa Lettre imprimée dans le dernier *Compte rendu*, j'ai pu croire un instant qu'il obtenait, pour représenter la polarisation chromatique des équations distinctes de celles auxquelles j'étais parvenu. Celles qu'il donne paraissent, au premier abord, renfermer six inconnues au lieu de trois. Mais, dans l'application qu'il en fait à la polarisation chromatique, les trois dernières inconnues se réduisent aux trois premières, et l'on se trouve ramené aux équations que j'avais obtenues. C'est ce dont M. Laurent lui-même pourra facilement s'assurer, en comparant ses formules aux miennes, et alors il reconnaîtra que ses formules doivent donner, pour la polarisation chromatique, précisément les lois auxquelles j'étais parvenu dans le Mémoire du 12 décembre 1842.

La seule question qui reste encore indécise, consiste à savoir quelle doit être la constitution d'un système de molécules et la nature de leurs actions mutuelles, pour que les mouvements infiniment petits de ce système

puissent être représentés par les équations différentielles de la polarisation chromatique. C'est en cherchant à résoudre cette question que j'avais construit dans le *Mémoire* du 5 décembre 1842, les formules que j'ai reproduites dans le *Compte rendu* de la séance du 22 avril 1844, et qui représentent les mouvements d'un système de molécules à dimensions finies. J'avais même conclu de ces formules, que dans le cas où le système devient isotrope, et où l'on néglige les termes du même ordre que les cubes des dimensions des molécules, les mouvements infiniment petits des centres de gravité sont représentés par des équations semblables à celles que fournirait un système de points matériels. Donc, dans ce cas, ce système de molécules était incapable, comme un système de points matériels, de produire la polarisation chromatique. Ainsi, relativement à la dernière question que je viens d'énoncer, j'étais arrivé seulement à exclure certains systèmes moléculaires, et à établir des propositions négatives. M. Laurent est-il effectivement parvenu à trouver des systèmes qui fournissent les équations obtenues? C'est ce que je me propose d'examiner dans un autre article.

ANALYSE

§ 1^{er} — Sur les équations différentielles de la polarisation chromatique

Considérons un mouvement infiniment petit du fluide éther d'un milieu isophasé. Admettons qu'une molécule d'éther qui coïncidait primitivement avec le point dont les coordonnées rectangulaires étaient x, y, z , et supposons qu'au bout du temps t , l'on représente par ξ, η, ζ les déplacements de cette molécule, ou plutôt de son centre de gravité, mesurés parallèlement aux axes des x, y, z . Soit encore

$$v = D_x \xi + D_y \eta + D_z \zeta$$

D'après la théorie que nous avons exposée dans les *Mémoires* des 14 novembre et 12 décembre 1842, les équations linéaires, propres à représenter le phénomène de la polarisation chromatique, seront de la forme

$$(1) \quad \begin{cases} (D_t^2 - E)\xi - FD_x v = G(D_x \eta - D_y \zeta), \\ (D_t^2 - E)\eta - FD_y v = G(D_x \zeta - D_x \xi), \\ (D_t^2 - E)\zeta - FD_z v = G(D_y \xi - D_x \eta), \end{cases}$$

E, F, G, désignant trois fonctions entières de la somme

$$D_x^2 + D_y^2 + D_z^2 (*).$$

Comparons maintenant les formules (1) avec celles que fournit l'analyse de M. Laurent

Supposons que, les rotations des molécules étant infiniment petites, comme leurs déplacements, la rotation infiniment petite de la molécule m soit représentée, au bout du temps t , par l'angle θ , et nommons

$$\lambda, \mu, \nu$$

les produits de cet angle infiniment petit par les cosinus des angles que forme l'axe de rotation avec les axes des x, y, z . Les trois quantités λ, μ, ν seront trois angles infiniment petits, propres à mesurer ce qu'on appelle les rotations de la molécule autour des axes des x, y et z . Soit d'ailleurs

$$\varphi = D_x \lambda + D_y \mu + D_z \nu$$

Les équations que M. Laurent a données dans le *Compte rendu* de la séance du 20 mai (page 938) pourront être simplifiées par des changements de notation et réduites aux formules

$$\begin{aligned} 2) \quad & \begin{cases} (D_x^2 - E)\xi - F D_x \nu = G(D_x \mu - D_y \nu), \\ (D_x^2 - E)\eta - F D_y \nu = G(D_x \nu - D_x \lambda), \\ (D_x^2 - E)\zeta - F D_z \nu = G(D_y \lambda - D_x \mu), \end{cases} \\ 3) \quad & \begin{cases} (D_x^2 - E)\lambda - F D_x \varphi = G(D_x \eta - D_y \zeta), \\ (D_x^2 - E)\mu - F D_y \varphi = G(D_x \zeta - D_x \xi), \\ (D_x^2 - E)\nu - F D_z \varphi = G(D_y \xi - D_x \eta), \end{cases} \end{aligned}$$

E, F, G, E, F, G désignant des fonctions entières de la somme

$$D_x^2 + D_y^2 + D_z^2$$

*) Dans le Mémoire du 14 novembre 1842 (voir le tome XV des *Comptes rendus*, p. 916), nous avons supposé que le terme indépendant de la somme $D_x^2 + D_y^2 + D_z^2$ s'évanouissait dans la fonction E. Cette supposition n'est pas une conséquence nécessaire des conditions analytiques de la polarisation circulaire énoncées dans le même Mémoire (page 913), mais elle donne des résultats conformes à ceux que fournissent les expériences, et d'ailleurs elle se vérifie toujours quand la polarisation chromatique disparaît.

Or, pour deduire de ces équations le phénomène de la polarisation chromatique, M Laurent considère le cas où l'on aurait

$$(4) \quad E = E, \quad G = G$$

Alois on satisfait aux équations (2) et (3) en prenant

$$5) \quad v = 0,$$

et de plus

$$(6) \quad \lambda = \xi, \quad \mu = \eta, \quad \nu = \zeta$$

$$7) \quad \varphi = v = 0$$

Les conditions (5) (6), (7), se trouvent effectivement remplies dans les formules définitives auxquelles parvient M Laurent Or les conditions (6) conduisent évidemment les équations (2) aux équations (1)

§ II — Sur les équations d'équilibre et de mouvement d'un système de molécule

Les équations que j'ai reproduites dans la séance du 22 avril dernier en les citant du cahier paraphé par M Arago à la séance du 5 décembre 1842, se trouvaient appliquées, dans ce même cahier, au cas où pour chacune des molécules que l'on considère, les moments d'inertie relatifs au centre de gravité sont tous égaux entre eux, et où l'on néglige dans le calcul les termes qui sont du même ordre que les cubes des dimensions des molécules Je vais reproduire en peu de mots cette application, et, en la reproduisant, je conserverai les notations dont j'ai fait usage dans le *Compte rendu* de la séance du 22 avril (pages 778, 779) Seulement pour abréger, je poserai

$$\partial x = x, \quad \partial y = y, \quad \partial z = z,$$

$$\partial x + \Delta \partial x = x, \quad \partial y + \Delta \partial y = y, \quad \partial z + \Delta \partial z = z,$$

et

$$\frac{f(v)}{v} = f(v)$$

Cela posé, les formules (1), (2), (3) de la page 779 donneront

$$(1) \quad \begin{cases} x = S \sum \sum (m) [m] (\Delta x + x, -x) f(v), & \text{etc...}, \\ y = S \sum \sum (m) [m] [(\Delta x + y,) y - (\Delta y + y,) z] f(v), & \text{etc..}, \end{cases}$$

la valeur de v^2 étant

$$v^2 = (\Delta x + x, -x)^2 + (\Delta y + y, -y)^2 + (\Delta z + z, -z)^2$$

On aura d'ailleurs

$$(3) \quad r^2 = \Delta x^2 + \Delta y^2 + \Delta z^2,$$

et, si l'on pose, pour abrégér,

$$(4) \quad \begin{cases} \xi = (x, -x) \Delta x + (y, -y) \Delta y + (z, -z) \Delta z, \\ \tau = (x, -x)^2 + (y, -y)^2 + (z, -z)^2, \end{cases}$$

la formule (2) donnera

$$(5) \quad v^2 = r^2 + 2\xi + \tau,$$

par conséquent,

$$(6) \quad v = r \left(1 + \frac{2\xi + \tau}{r^2} \right)^{\frac{1}{2}}$$

Concevons maintenant que l'on développe v et $f(v)$ suivant les puissances descendantes de r , et que dans les développements on néglige les termes comparables aux cubes des dimensions des molécules. On trouvera

$$v = r + \frac{\xi}{r} + \frac{1}{2} \frac{\tau}{r} - \frac{1}{2} \frac{\xi^2}{r^3},$$

$$f(v) = f(r) + \frac{\xi}{r} f'(r) + \frac{\tau}{2r} f'(r) + \frac{\xi^2}{2r^3} \left[f''(r) - \frac{f'(r)}{r} \right].$$

Comme on aura d'ailleurs

$$(7) \quad \sum (m) = m, \quad \sum [m] = m,$$

$$(8) \quad \begin{cases} \sum (m) x = 0, & \sum (m) y = 0, & \sum (m) z = 0, \\ \sum [m] x = 0, & \sum [m] y = 0, & \sum [m] z = 0, \end{cases}$$

et, par suite,

$$(9) \quad \sum \sum (m) [m] \xi = 0,$$

on tirera des formules (1)

$$(10) \quad \left\{ \begin{aligned} x &= S \sum \sum (m) [m] \left\{ f(r) + \frac{\tau}{2r} f'(r) + \frac{\xi^2}{2r^2} \left[f''(r) - \frac{f'(r)}{r} \right] \right\} \Delta x \\ &+ S \sum \sum (m) [m] \xi (x_1 - x) f'(r), \quad \text{etc.}, \\ \xi &= S \sum \sum (m) [m] \frac{\xi}{r} f'(r) [y \Delta x - z \Delta y], \quad \text{etc.} \end{aligned} \right.$$

Ajoutons qu'en égard aux formules (4), (7), (8), on aura

$$\sum \sum (m) [m] = m m,$$

$$\sum \sum (m) [m] \tau = m \sum (m) (x^2 + y^2 + z^2) + m \sum [m] (x_1^2 + y_1^2 + z_1^2),$$

$$\begin{aligned} \sum \sum (m) [m] \xi^2 &= m \sum (m) (x \Delta x + y \Delta y + z \Delta z)^2 \\ &+ m \sum [m] (x, \Delta x + y, \Delta y + z, \Delta z)^2. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \sum \sum (m) [m] \xi (x - x) &= m \sum (m) x (x \Delta x + y \Delta y + z \Delta z) \\ &+ m \sum [m] x, (x, \Delta x + y, \Delta y + z, \Delta z), \end{aligned}$$

$$\sum \sum (m) [m] \xi y = -m \sum (m) y (x \Delta x + y \Delta y + z \Delta z),$$

$$\sum \sum (m) [m] \xi z = -m \sum (m) z (x \Delta x + y \Delta y + z \Delta z).$$

D'autre part, les formules (7), (8), de la page 781, donneront

$$(11) \quad \left\{ \begin{aligned} x &= \alpha x + \beta y + \gamma z, \\ y &= \alpha' x + \beta' y + \gamma' z, \\ z &= \alpha'' x + \beta'' y + \gamma'' z; \end{aligned} \right.$$

$$(12) \quad \begin{cases} x = (\alpha + \Delta\alpha)x + (\xi + \Delta\xi)y + (\gamma + \Delta\gamma)z \\ y = (\alpha + \Delta\alpha)x + (\xi + \Delta\xi)y + (\gamma + \Delta\gamma)z \\ z = (\alpha + \Delta\alpha)x + (\xi + \Delta\xi)y + (\gamma + \Delta\gamma)z \end{cases}$$

puisque les coordonnées x, y, z ou x, y, z se rapportent aux axes principaux menés par le centre de gravité de la molécule m ou m on aura

$$(13) \quad \begin{cases} \sum(m)yz = 0 & \sum(m)zx = 0 & \sum(m)xy = 0 \\ \sum[m]yz = 0 & \sum[m]zx = 0 & \sum[m]xy = 0 \end{cases}$$

Cela posé si l'on fait

$$(14) \quad \begin{cases} \sum(m)x^2 = a & \sum(m)y^2 = b & \sum(m)z^2 = c \\ \sum[m]x^2 = a & \sum[m]y^2 = b & \sum[m]z^2 = c \end{cases}$$

on trouvera

$$(15) \quad \begin{cases} \sum(m)x^2 = a\alpha^2 + b\xi^2 + c\gamma^2, \text{ etc} \\ \sum(m)yz = a\alpha\xi + b\xi\gamma + c\gamma\alpha \text{ etc} \end{cases}$$

$$(16) \quad \begin{cases} \sum[m]x^2 = a(\alpha + \Delta\alpha)^2 + b(\xi + \Delta\xi)^2 + c(\gamma + \Delta\gamma)^2 \text{ etc} \\ \sum[m]yz = a(\alpha + \Delta\alpha)(\xi + \Delta\xi) + b(\xi + \Delta\xi)(\gamma + \Delta\gamma) \\ \quad + c(\gamma + \Delta\gamma)(\alpha + \Delta\alpha) \text{ etc} \end{cases}$$

Dans le cas particulier où, pour chaque molécule les moments d'inertie principaux relatifs au centre de gravité seront égaux entre eux on aura

$$\begin{aligned} a &= b = c \\ a &= b = c \end{aligned}$$

Alors les formules (15), (16) donneront

$$(17) \quad \begin{cases} \sum \langle m \rangle x^2 = \sum \langle m \rangle y^2 = \sum \langle m \rangle z^2 = a, \\ \sum \langle m \rangle yz = \sum \langle m \rangle yx = \sum \langle m \rangle xz = 0, \end{cases}$$

$$(18) \quad \begin{cases} \sum [m] x^2 = \sum [m] y^2 = \sum [m] z^2 = a, \\ \sum [m] yz = \sum [m] yx = \sum [m] xz = 0, \end{cases}$$

et l'on aura, par suite,

$$\begin{aligned} \sum \sum \langle m \rangle [m] \tau &= 3 \frac{ma + ma_1}{2}, \\ \sum \sum \langle m \rangle [m] \varsigma^2 &= (ma + ma_1) r^2, \\ \sum \sum \langle m \rangle [m] \varsigma (x - x_1) &= (ma + ma_1) \Delta x, \\ \sum \sum \langle m \rangle [m] \varsigma y &= -ma \Delta y, \\ \sum \sum \langle m \rangle [m] \varsigma z &= -ma \Delta z. \end{aligned}$$

Cela posé, les formules (10) donneront

$$(19) \quad \begin{cases} \mathfrak{X} = m S [m \mathcal{J}(r) \Delta x], & \mathfrak{Y} = m S [m \mathcal{J}(r) \Delta y], & \mathfrak{Z} = m S [m \mathcal{J}(r) \Delta z], \\ \mathfrak{L} = 0, & \mathfrak{M} = 0, & \mathfrak{N} = 0, \end{cases}$$

la fonction $\mathcal{J}(r)$ étant déterminée par la formule

$$(20) \quad m m \mathcal{J}(r) = m m f(r) + \frac{ma + ma_1}{2} \left[f_r(r) + \frac{5}{2} f''(r) \right].$$

» Lorsqu'on suppose les molécules réduites à des points matériels, on a évidemment

$$a = 0, \quad a_1 = 0,$$

et par suite

$$\mathcal{J}(r) = f(r).$$

(*) Dans le cahier manuscrit, le rapport $\frac{5}{2}$ se trouve, par erreur, réduit au nombre 2.

Donc cette dernière supposition et celle que nous avons précédemment adoptée, conduisent à des valeurs semblables de λ , \mathcal{F} , \mathcal{Z} , qu'on déduit immédiatement les unes des autres par la substitution de la fonction $f(r)$ à la fonction $\mathcal{F}(r)$, ou de $\mathcal{F}(r)$ à $f(r)$. Donc, dans l'un et l'autre cas, les équations d'équilibre et de mouvement conservent les mêmes formes et représentent les mêmes phénomènes.

PHYSIOLOGIE VÉGÉTALE — *Quatrième Notes relatives à la protestation faite dans la séance du 12 juin 1843, à la suite de la lecture du Mémoire de M. de Mirbel, ayant pour titre Recherches anatomiques et physiologiques sur quelques végétaux monocotyles, par M. CHARLES GAUDICHAUD*

SECONDE PARTIE

Dans la première partie de ces quatrième Notes, je vous ai montré que des qu'une cellule s'anime pour former un phytome, soit sur un tronc d'arbre, sur une branche, sur un rameau, sur une racine naturellement enfoncée dans le sol, soit sur des tronçons ou même sur de simples fragments de ces parties vivantes (1), la vie distincte des individus (2) qui se forment se répand aussitôt sur tout le reste du végétal, au moyen de vaisseaux radiculaires qui descendent rapidement sur les parties ligneuses précédemment formées, ou qui dans quelques cas, se convertissent immédiatement en racines (3).

Je vous ai montré des expériences faites sur des racines de *Maclura*, et vous avez pu voir que les vaisseaux radiculaires des bourgeons qui s'engendrent au sommet tronqué de ces boutures, descendent successivement jusqu'à leur base et pénètrent enfin dans les racines, des que celles-ci se sont développées.

Ces faits, que je déclare positifs, prouvent manifestement que des tissus radiculaires partent des bourgeons et descendent progressivement jusqu'à la base des boutures, des troncs et des racines.

J'ai fait l'application de ces principes aux greffes, et vous avez tous reconnu qu'il n'y avait aucune différence entre le rameau développé naturellement au sommet tronqué d'une tige quelconque et le rameau enté, et

(1) Ces parties ne vivent que d'une vie lente, insensible, dont les résultats sont des élaborations spéciales que nous essayerons de faire connaître.

(2) Bien différente, selon nous, de la première.

(3) Les plus petits fragments, les parties herbacées, etc.

que les vaisseaux radiculaires des uns et des autres se comportaient exactement de la même manière relativement au sujet, c'est à-dire qu'ils tendaient également à l'envelopper de haut en bas de leurs réseaux vasculaires

Je vous ai ensuite montré un grand nombre d'expériences qui vous ont prouvé, du moins je l'espère, que tous les tissus vasculaires ligneux descendent, et que les forces organisatrices et d'impulsion résident dans les bourgeons ou, autrement dit, dans les parties qui les constituent

A ce sujet, je vous ai fait remarquer que, si l'on greffe un bourgeon ou un rameau d'arbre à bois rouge sur un arbre à bois blanc toutes les parties qui se trouvent dans la circonscription de la greffe sont rouges et produisent des bourgeons à bois de même couleur, tandis que tout le sujet qui reçoit les fluides radiculaires de la greffe reste blanc

La greffe rouge n'envoie donc rien de coloré sur le sujet blanc

Cela tient à ce que les fluides et les vaisseaux sont incolores et que la coloration n'est produite que par les tissus cellulaires organisés

Or, ces tissus organisés ou solidifiés ne se colorent, eux que sous l'action physiologique de l'écorce

Il ne peut donc y avoir de coloration que là où il y a de l'écorce de bois rouge

La démonstration de ce fait nous est donnée par l'expérience suivante

Si l'on enlève une bande circulaire d'écorce sur le tronc d'un arbre à bois rouge et qu'on la greffe sur un arbre à bois blanc, à la place d'une semblable portion d'écorce de celui-ci on trouvera, au bout d'une ou deux années, du bois rouge sous la greffe, tandis qu'il restera blanc au-dessus et au dessous

Si maintenant on greffe plusieurs couronnes d'écorce provenant d'un bois rouge sur une certaine étendue de tige d'un bois blanc, le corps ligneux de celui-ci sera naturellement divisé en zones alternativement rouges et blanches. Les vaisseaux seront partout de même nature, et leur différence de coloration ne sera due qu'aux milieux divers qu'ils traverseront

» Comme ce sont les tissus cellulaires qui donnent naissance aux bourgeons il pourra naître des bourgeons à bois blanc sur les zones blanches, des bourgeons à bois rouge sur les zones rouges

Je donnerai le complément de ces principes dans ma *Physiologie*

Je ne suis revenu sur cet important sujet que parce qu'il m'a semblé que quelques personnes n'avaient pas complètement compris ma pensée

Maintenant que nous connaissons bien l'origine des tissus radiculaires et que nous en avons constaté la marche descendante, dirigeons-les pour ainsi

due a notre gîte afin de leur faire produire tous les phénomènes organographiques possibles

Nous n'avons fait jusqu'à ce moment que des decortications circulaires, régulières et irrégulières, et ovales, dans le but d'isoler les tissus radiculaires de certaines parties des tiges et de quelques bourgeons

Enlevons maintenant, sur une certaine longueur de tige, un grand nombre de lambeaux d'écorce, l'un à droite, l'autre à gauche et successivement, et nous obtiendrions les pièces que je soumetts à l'Académie

Dans ces pièces, on voit les tissus ligneux pour ainsi dire se promener autour de ces tiges sous les parties d'écorce conservées, et produire toutes sortes de sinuosités. Un anneau d'écorce, enlevé à la base de l'une d'elles, a produit un bourrelet au bord supérieur, tandis qu'il n'y a absolument rien au bord inférieur

La nature, qui nous guide presque toujours dans nos recherches d'organographie et de physiologie, nous a pour ainsi dire enseigné ici une des expériences les plus remarquables. Vous avez tous observé, messieurs, dans nos forêts, l'action des lianes et des plantes sarmenteuses sur les arbres qui leur servent de supports, vous connaissez tous les dégâts que cause le chevreuille sur les jeunes plantations et les halières des environs de Paris, et les singulières tiges en spirales qui en résultent

Rien au monde ne démontre mieux la marche descendante des tissus ligneux. Des cordes, des fils de fer ou des liens quelconques produisent, vous le savez, le même phénomène

» J'ai fait, d'après cet enseignement, des decortications en spirale et j'ai obtenu des effets tout à fait semblables

» Une couronne d'écorce enlevée à la base de l'une de ces spirales a limité la descension des nouveaux tissus ligneux dans le bourrelet du bord supérieur

Un grand nombre de cellules se sont formées au bord inférieur mais au bord seulement, et y ont également produit un petit bourrelet saillant

» Si ces cellules s'étaient développées en bourgeons, ceux-ci auraient envoyé, vers la base, des tissus radiculaires qui auraient augmenté le diamètre du corps ligneux inférieur

Mais en restant à l'état de cellules plus ou moins animées, elles n'ont produit que l'épaississement du bord

Ce fait, comme vous le voyez, n'a pas, comme quelques personnes le pensent, la valeur d'une objection; puisqu'au contraire nous y trouvons, nous, une preuve matérielle de plus à l'appui de nos nouveaux principes

Dans ces expériences de decortication en spirale, qui sont remarquables sous plus d'un rapport, on dirige tous les tissus ligneux nouveaux autour des tissus ligneux anciens, de manière à ce que les derniers formés croissent presque à angle droit les premiers, c'est-à-dire ceux qui existaient au moment de l'opération.

Cette expérience, comme d'ailleurs toutes les autres, a été féconde en résultats nouveaux. Il en est un surtout qui se lie trop étroitement au premier pour ne pas trouver ici sa place. Je veux parler de l'organisation du liber, organisation sur laquelle j'ai déjà fait de nombreuses recherches, que j'étudie encore aujourd'hui et sur laquelle je viendrai un jour entretenir l'Académie.

Mais ne pouvant aborder, dans de simples Notes, toutes les questions qui se rattachent à ce vaste sujet, et puisque, avant tout, nous devons nous renfermer dans celles qui ont trait au développement du corps ligneux, bornons-nous à dire que les couches internes ou nouvelles du liber se croisent dans cette expérience, avec les couches anciennes ou externes, exactement comme le font les couches ligneuses elles-mêmes.

Ainsi donc nous avons obtenu, dans cette expérience, des bandes ligneuses nouvelles et obliques à la circonférence du corps ligneux ancien et vertical, et des bandes également obliques de liber nouveau à l'intérieur du liber ancien, et conséquemment à fibres aussi verticales.

Si, à la place des decortications alternatives que nous avons faites dans un certain nombre d'expériences, on donne des coups de scie, l'un à droite, l'autre à gauche, et ainsi de suite, sur une étendue plus ou moins grande de tiges ou de racines, on obtient des résultats qui sont, sinon les mêmes, du moins très-analogues.

» Les tissus radiculaires descendent jusqu'au bord supérieur de l'entaille, ne pouvant franchir l'obstacle, ils le contournent et vont s'étendre sur toutes les parties qui leur livrent un libre passage. Dès qu'ils rencontrent un nouvel obstacle, ils recommencent leurs déviations, et marchent ainsi tout le long de ces tiges ou de ces racines lacérées, en se portant alternativement de droite à gauche et de gauche à droite.

» Dans quelques-unes de ces expériences, qui ont été faites pour ma *Physiologie*, et spécialement pour la théorie de l'ascension de la sève, j'ai fait pénétrer la scie jusqu'au delà du canal médullaire.

» Dans d'autres, j'ai, à peu de chose près, coupé tout le bois, et n'en ai laissé qu'une très-légère couche sous le lambeau d'écorce persistant et non altéré.

» Malgré les précautions que j'ai constamment prises d'étayer ces tiges

profondement entaillées, plusieurs ont été en partie brisées par le vent, ce qui n'a pas empêché le phénomène de descension des tissus radiculaires de se produire.

Les mêmes expériences, faites sur des racines dénudées, ont complètement réussi, soutenues par les deux extrémités, l'une par la base du tronc, l'autre par le sol, elles se sont admirablement prêtées à mes expérimentations.

En voici plusieurs dont j'ai complètement coupé le bois jusqu'à l'écorce du bord opposé. Sur l'une d'elles, les tissus ligneux, encore liquides, ont franchi l'obstacle, et ont ainsi formé une greffe partielle du bord supérieur à l'inférieur. Ce débordement des tissus ligneux de la partie supérieure se remarque sur un grand nombre des pièces que j'ai déposées sur ce bureau.

Au nombre de ces dernières, il en est une qui mérite peut-être l'attention de l'Académie. La voici :

Au mois de février 1842, je fis, avec une scie, trois entailles profondes sur une racine de peuplier qui avait été dénudée par l'action des eaux. Ces entailles étaient ainsi disposées : une supérieure vers le sol, une moyenne extérieure, et une inférieure encore vers le sol et au-dessous de la première.

Vers la fin du même mois il y eut, dans la localité, un très fort coup de vent. L'agitation de l'arbre s'étendit jusqu'aux racines, et celle-ci se brisa de la seconde entaille à la troisième. De cet accident il est résulté que la partie inférieure de la seconde entaille s'est éloignée de la supérieure, et que la partie supérieure de la troisième s'est rapprochée de l'inférieure.

Les tissus ligneux se sont arrêtés au bord supérieur de la première et de la seconde entaille, mais arrivés à la troisième, dont les bords étaient en contact, ils les ont greffés. Nous trouvons ici, comme partout ailleurs, la preuve évidente de la descension des tissus ligneux qui tendent sans cesse à franchir, de haut en bas, tous les obstacles qu'ils rencontrent, et qu'on voit ici s'étendre latéralement sur la base de la racine. S'ils remontaient, cette partie inférieure de la seconde section en serait recouverte, car elle était très-vive et couronnée par un bourrelet cellulaire assez considérable.

Une expérience, que je connaissais déjà, et qui m'avait été indiquée par mon respectable confrère M. Delile, professeur de botanique à l'École de Médecine de Montpellier, me restait à faire sur les racines, et je l'ai opérée avec le plus grand succès.

Elle consiste à couper transversalement et entièrement une racine, à maintenir, au moyen d'attelles, les deux parties en rapport, et à les couvrir

de terre après les avoir convenablement enveloppées de plusieurs doubles de papier, afin de les préserver de l'action des corps étrangers.

» J'ai l'honneur de montrer à l'Académie une de ces greffes complète, une seconde qui ne l'est qu'en partie, et une troisième qui, sans attelles, sans enveloppes et sans aucune précaution, a été abandonnée à l'action de l'air.

» La première provient d'une racine de frêne. Elle offre cela de particulier, que les tissus ligneux arrivés au bord de la partie supérieure ont pénétré dans la fente, l'ont comblée, et en sont ensuite sortis pour passer sur la partie inférieure.

» La seconde m'a été fournie par une racine de peuplier

» Dans celle ci, la fente est restée vide. Les tissus ligneux, arrivés au bord supérieur, y ont formé un bourrelet qui, de proche en proche, a gagné le bord inférieur.

» Elle est incomplète.

» La troisième vient également d'une racine de peuplier.

» Elle montre que, malgré la déviation des parties et les circonstances défavorables dans lesquelles elle a été laissée, la greffe a commencé à s'établir sur l'un des côtés. Un bourgeon s'est formé sur le bord de la partie inférieure, et envoie naturellement son torrent ligneux vers la base de la racine.

» Examinez toutes ces pièces, qui sont plus ou moins profondément entaillées, ou qui ont été complètement divisées, et vous trouverez partout la preuve matérielle de la descension des tissus ligneux.

» Vous verrez que tous descendent verticalement jusqu'à la lèvre supérieure des plaies, et que lorsqu'ils ne peuvent les franchir, ils se dévient à droite et à gauche pour aller chercher un passage libre dans les autres parties, qu'ils tendent à se rapprocher au-dessous de la lèvre inférieure, où cependant ils laissent presque toujours un vide plus ou moins grand. S'ils montaient, l'effet contraire aurait naturellement lieu.

» Je me suis attaché, dans le cours de mes recherches, à répéter toutes les expériences des grands physiologistes des deux derniers siècles. En voici une qui m'a été indiquée par Duhamel du Monceau, et qui paraîtra au moins fort curieuse.

» En 1839, je fis une expérience sur une racine de peuplier dénudée de terre dans la partie moyenne de sa longueur. Cette racine, exposée à l'action de l'air, tenait par sa partie supérieure, à la base du tronc, et par sa partie inférieure, au sol. Elle était nue dans une longueur de 1^m,60. Je fis avec la scie trois ou quatre entailles profondes sur la partie aérienne de

cette racine, et laissai l'expérience marcher jusqu'au printemps de l'année suivante.

» En 1840, j'enlevai la partie de cette racine sur laquelle j'avais opéré, et laissai le lambeau supérieur fixé au tronc, et l'inférieur dans le sol.

» Le supérieur, qui pendait le long de la berge, avait donné naissance à plusieurs petits rameaux. Je les coupai tous, à l'exception d'un seul, le plus vigoureux.

» Celui-ci, malgré la soustraction de la partie inférieure de la racine, n'en continua pas moins sa végétation jusqu'au 5 juillet 1842, époque à laquelle j'enlevai la pièce pour ma collection.

» Une expérience du même genre et de la même époque est encore aujourd'hui en activité. Le petit arbre qui en est résulté a maintenant 3 à 4 mètres de longueur.

» Je ne puis entrer ici dans les détails théoriques de ces expériences, la description de ce fait, envisagé à ma manière, prendrait toute une séance de l'Académie, et je n'abuserai pas à ce point de son temps. Je me bornerai donc à faire remarquer qu'un gros rameau, un petit arbre a végété pendant quatre ans (et un autre pendant cinq), à l'extrémité flottante d'une racine tronquée, que le tronc de cet arbre est plus gros que la racine qui lui sert de support et qui le nourrit, et que ses tissus radiculaires ont triplé le diamètre de cette partie inférieure de la racine.

» Ne trouverez-vous pas, messieurs, dans ce fait isolé, une démonstration complète de la doctrine phytologique que je soutiens? Ne verrez-vous pas que cet arbre tout entier, qui ne vivait que des sucs apportés par la racine et des éléments humides qu'il puisait dans l'atmosphère, a produit sur l'extrémité tronquée et aérienne de cette racine un accroissement considérable qui ne pouvait provenir ni de la partie supérieure de la racine qui, tout en s'accroissant, est, comparativement du moins, restée grêle, ni de l'inférieure, qui, suspendue dans l'air, n'avait plus de rapport avec le sol?

» Voici un fait très-curieux produit par une tige de frêne de 3 centimètres de largeur.

» J'ai coupé cette tige au-dessus de deux jeunes branches, puis j'ai retranché l'une de ces branches. L'autre s'est développée avec une grande vigueur. Je l'ai coupée à son tour au-dessus de deux jeunes rameaux, et j'ai ainsi retranché l'un de ces rameaux.

» Il est donc resté de cet arbre la tige, une branche, et, sur cette branche, un rameau. Celui-ci a poussé avec une étonnante rapidité; et, quinze ou vingt jours après, j'ai cueilli la pièce entière.

» Elle a été préparée par les moyens ordinaires, qui consistent à enlever l'écorce, à faire macérer dans l'eau fraîche et à sécher.

» Les résultats que cette expérience m'a donnés sont, je le réitère, fort curieux.

» Afin de les bien faire comprendre, je suis encore obligé d'emprunter quelques faits à ma *Physiologie*. Ces faits, les voici.

» L'expérience m'a démontré que pendant les mois de mars, avril, mai, juin et juillet, on voit très-distinctement, à la surface du corps ligneux des arbres de nos climats, les vaisseaux radiculaires qui descendent des feuilles, tant que celles-ci se développent; mais que, passé ce temps, ces vaisseaux disparaissent de plus en plus sous une sorte d'exsudation cellulifère qui se produit de haut en bas et du centre à la circonférence du corps ligneux par les rayons médullaires de toutes les parties. En sorte que, vers la fin de septembre, ces vaisseaux radiculaires ou descendants ont complètement disparu sous cette sorte de pâte cellulaire ligneuse, et ne reparaissent plus qu'au printemps, c'est-à-dire au moment de la pousse des bourgeons à feuilles.

» Ce phénomène est général dans les végétaux ligneux que j'ai observés.

» Il paraît pourtant offrir quelques rares exceptions dont je parlerai plus tard.

» Il est parfois produit dès le mois de juillet, dans plusieurs végétaux de nos régions, spécialement dans ceux qui commencent de bonne heure et accomplissent promptement leurs phases végétatives.

» Si, comme je l'assure, ce sont les feuilles qui produisent et envoient, de haut en bas, les tissus radiculaires, on doit naturellement les retrouver à la surface des troncs, au moment de la végétation connue des cultivateurs sous le nom de *sève d'aout*. C'est en effet ce qui a lieu; et ces vaisseaux sont d'autant plus distincts, que ceux de la végétation printanière sont plus complètement enfouis sous la cellulation ligneuse précitée.

» Par des expériences nombreuses faites sur le tilleul, le peuplier, le frêne et tous nos autres végétaux ligneux, expériences que je décrirai dans ma *Physiologie*, j'ai constaté que depuis les premiers jours du printemps, jusqu'à la fin d'octobre, on peut, à l'aide de circonstances favorables et par un procédé particulier aussi simple que facile, obtenir à part des vaisseaux radiculaires distincts; en un mot, que ce phénomène a lieu tant qu'il se développe des bourgeons et des feuilles.

» Dès que les vaisseaux radiculaires cessent de descendre, ils sont enveloppés par les fluides cellulifères descendants et rayonnants précités, au sein

desquels ils finissent même par disparaître entièrement. En sorte que, de striées et rugueuses que sont ces tiges, à la circonférence du corps ligneux pendant le cours de la descension des tissus radiculaires, elles deviennent unies et parfaitement lisses, dès que les feuilles cessent de se développer.

» Ces détails, dans lesquels j'aurais désiré ne pas entrer encore, parce qu'ils seront reproduits en détail dans une autre partie (ma *Physiologie*), pourront, tout superficiels qu'ils sont ici, servir à l'intelligence des phénomènes offerts par l'expérience qui m'en a occasionnellement fourni le sujet, et à laquelle je reviens.

» En coupant la tige principale, puis une branche près du tronc, puis enfin la seconde branche au-dessus de deux rameaux et même l'un de ces rameaux, j'ai privé la tige principale de tous les vaisseaux radiculaires qui en seraient descendus. Il y a donc eu un moment d'arrêt, pendant lequel le rayonnement des fluides cellulifères a eu lieu. Ces fluides ont plus ou moins complètement enveloppé tous les vaisseaux formés, avant l'opération, par la tige, par la branche et même par le rameau conservés.

» De nouvelles feuilles se sont alors formées sur le rameau isolé, et leurs vaisseaux radiculaires sont descendus le long de ce rameau, de sa branche et du tronc, à la circonférence de tout ce qui s'était antérieurement produit.

» Mais le rameau, relativement à la branche et surtout au tronc, est fort petit. Comment les vaisseaux radiculaires qu'il a produits ont-ils pu recouvrir la branche et surtout le tronc principal? C'est, comme on peut s'en assurer d'après cette pièce, en s'écartant de plus en plus les uns des autres au fur et à mesure qu'ils descendent.

» En effet, on voit très-distinctement que ces vaisseaux, qui sont fortement pressés les uns contre les autres dans le rameau, s'écartent de plus en plus sur les branches et qu'ils sont réellement très-espacés sur le tronc.

» Comme vous le voyez, messieurs, les vaisseaux radiculaires forment, pour ainsi dire, la chaîne des tissus ligneux, et les fluides cellulifères, dès qu'ils sont solidifiés, la trame.

» On me contestera certainement l'origine de cette trame, comme on me conteste avec plus ou moins de forme celle des tissus tubuleux radiculaires; mais, dans ce cas comme dans tous, je répondrai par des faits.

» Je n'aurai même pas besoin pour cela de tous ceux que j'ai moi-même recueillis; il nous suffira d'ouvrir les savants ouvrages de Duhamel et des autres grands physiologistes pour y trouver de quoi satisfaire même les plus sceptiques. Il est bien entendu que ces faits, obtenus et décrits par ces sa-

vants, auront besoin d'être soumis à de nouvelles interprétations ; et il en sera ainsi de ceux de beaucoup d'autres anatomistes qui nous ont précédé dans la carrière.

» J'ai déjà plusieurs fois rappelé que le tréne a les feuilles opposées, et qu'il y a toujours un bourgeon situé dans l'aisselle de chaque feuille.

» Si l'on coupe transversalement une jeune tige de cette plante, au-dessus de deux feuilles, les bourgeons de celles-ci se développent parallèlement, de manière à former une fourche au sommet tronqué de la tige. Si, après cela, on enlève un de ces bourgeons, l'autre forme rapidement un rameau vigoureux. En coupant ce rameau conservé au-dessus d'une paire de feuilles, les bourgeons axillaires de ces feuilles donnent de nouveau naissance à deux rameaux latéraux. En coupant encore l'un de ces rameaux, l'autre continue la tige.

» C'est en procédant ainsi, pendant deux années (1842-43), que j'ai obtenu la pièce que voici et qui nous offre un exemple remarquable des axes alternes, déviés ou brisés, comme on voudra les nommer.

» On conçoit que j'aurais pu la prolonger indéfiniment.

» Il suffit de jeter les yeux sur cette préparation pour voir, même à l'œil nu, les tissus radiculaires du dernier rameau du sommet descendre, en s'écartant, sur tous les autres.

» L'Académie reconnaîtra peut-être maintenant que je n'exagérerais pas en disant que la théorie phytologique que je soutiens donnera l'explication exacte de tous les faits connus et à connaître de l'organographie végétale, et pourtant je ne lui ai encore montré que des faits pour ainsi dire superficiels. Il faudra donc naturellement que l'anatomie intérieure vienne justifier et complètement démontrer l'exactitude de ces faits. Eh bien, messieurs, c'est ce qu'elle fera, et c'est ce qu'elle aurait déjà fait, si des circonstances indépendantes de ma volonté ne s'y étaient opposées.

» Mais si, pour appuyer ma doctrine phytologique, je ne puis encore vous apporter des anatomies microscopiques exactes et faites dans la direction que je suis, je puis au moins, en attendant, vous montrer quelques nouveaux faits qui, tout superficiels aussi qu'ils sont, n'en ont pas moins, selon moi, une très-grande valeur.

» Si, par exemple, et comme je le soutiens, les vaisseaux radiculaires descendent dans les premiers temps de la végétation, c'est-à-dire pendant que les feuilles opèrent leur développement ; et si, lorsque ces vaisseaux sont complètement formés, du sommet à la base de l'arbre, le rayonnement de

fluides cellulifères (1) qui en facilite l'organisation, le développement et la marche descendante, continue de se produire, il est évident qu'il doit finir par les envelopper entièrement d'une couche ligneuse compacte et plus ou moins épaisse.

» C'est effectivement ce qui a lieu. La preuve, puisque je n'avance jamais rien sans preuves, la voici.

» Examinez les couches concentriques ou annuelles du corps ligneux sur les coupes transversales d'un chêne, d'un châtaignier, d'un frêne, et généralement des arbres de nos régions tempérées, et vous verrez que toutes commencent par des vaisseaux tubuleux radiculaires, et finissent par des tissus de plus en plus serrés et compacts.

» Il est clair que si les feuilles, au lieu de se former toutes au printemps, se développaient successivement pendant tout le cours de l'année, comme par exemple dans la plupart des arbres des régions tropicales, on trouverait ces vaisseaux tubuleux radiculaires également répartis dans toute l'épaisseur des couches, en admettant, bien entendu, qu'il y ait dans ces végétaux des couches sensibles.

» Chaque couche annuelle du corps ligneux est ordinairement partagée en plusieurs zones (2), dont la plus intérieure n'est guère composée que de vaisseaux radiculaires.

» En dehors de cette zone des vaisseaux tubuleux de chaque couche, on trouve encore quelques rares vaisseaux de même nature, quoique plus petits, disséminés dans tout le reste de leur masse ligneuse. Je ne sais pas encore très-bien, consciencieusement parlant, si ces vaisseaux sont produits par les individus nouveaux qui s'organisent dans les bourgeons axillaires, ou s'ils appartiennent à la végétation connue sous le nom de sève d'aout, végétation que, dans ma *Physiologie*, j'expliquerai à ma manière.

» Mais ce que je comprends très-bien, et ce dont je suis parfaitement convaincu, c'est qu'ils proviennent de l'une de ces sources, sinon de toutes les deux. Il ne nous faut donc plus maintenant, pour arriver à la complète dé-

(1) Je me sers ici du mot *raisonnement* parce que j'ai un assez grand nombre d'expériences qui démontrent ce phénomène.

On sait que ces fluides descendent et qu'ils sont poussés de haut en bas par une force incessante.

(2) *Foyes Gysseuano, Organographie*, Pl. XV, fig. 10, 11. Cette coupé a été faite sur une tige de tilleul et non de peuplier comme cela a été dit, par erreur, dans le texte.

monstration de ce phénomène, comme d'ailleurs de tous ceux qui se rattachent à cet important sujet, que des expériences bien faites, bien dirigées et du temps (1).

» Voici des pièces anatomiques commencées le 15 août 1843 et arrêtées le 9 mai de cette année, époque où les vaisseaux radiculaires étaient en plein développement, et sur lesquelles on voit que tout ce qu'il y a de formé de la couche annuelle n'est encore composé que de vaisseaux tabuleux, et que ces vaisseaux sont beaucoup plus nombreux dans la partie vers laquelle je les ai dirigés que dans toutes les autres. Il ne nous faut donc plus, je le réitère, que des expériences et du temps pour arriver à une complète démonstration expérimentale de ces phénomènes.

» Voici maintenant, et pour en finir avec mes Notes, une bouture faite avec

(1) J'ai dit que dès qu'un individu vasculaire ou phyton est arrivé à un certain degré d'organisation, il produit des tissus radiculaires ou même des racines. Qu'est-ce donc qu'un bourgeon ? un assemblage d'individus ! Dès que ces individus, qui naissent les uns après les autres, les uns des autres, les uns dans les autres, arrivent isolément à ce degré convenable d'organisation, ils envoient leurs vaisseaux radiculaires distincts sur la tige ou dans leurs racines propres.

Un bourgeon commence donc par un individu, qui, au bout d'un certain temps, émet ses tissus radiculaires.

Dans ce premier individu, il s'en développe un second, qui, à son tour, fait descendre ses tissus radiculaires à la circonférence de ceux du premier ; il en sera de même du troisième individu, relativement au second, et toujours ainsi tant que le végétal en produira. Les bourgeons, en se développant, envoient donc des vaisseaux radiculaires sur le tronc. C'est ainsi qu'ils se greffent à lui.

Les tissus radiculaires des bourgeons axillaires, c'est-à-dire des individus imparfaits qu'ils renferment, et qui, pour ainsi dire, ne sont préparés que pour l'année suivante, sont et restent très-petits.

Ce sont eux que nous observons vers la partie extérieure de chaque couche ligneuse de tous les végétaux dicotylés.

Je vous ai dit que ces vaisseaux radiculaires sont très-ténus au moment de leur apparition, et que plus tard ils grandissent en tous sens : mais ici ils ne peuvent grandir, puisque les individus dont ils ne sont que les prolongements inférieurs restent à l'état rudimentaire.

La végétation de la sève d'août est, à peu de chose près, dans le même cas ; les vaisseaux radiculaires de toutes les feuilles qui se développent atteignent, sans nul doute, la base du végétal ; mais ils n'ont pas le temps de grossir, et restent à l'état de première formation. Il suffit d'inspecter les couches ligneuses qui se développent naturellement, et surtout celles que nous modifions par nos expériences, pour en acquiescer la preuve. Le problème de la formation des couches, de leurs zones et de l'accroissement en diamètre des troncs, est donc, à peu de chose près, résolu.

un fragment de tige de *Cissus*. Cette tige (1), recueillie en 1831, à Rio-de-Janeiro, avait été séchée au four. A mon retour en France, à la fin de 1833, nous aperçûmes, M. Adolphe Brongniart et moi, que les tissus cellulaires, situés sous l'épiderme, étaient encore vivants et verts. Nous la plaçâmes dans les verres du Muséum, où elle donna promptement naissance à un bourgeon qui, bientôt après, forma un très-long rameau.

» Ce rameau fut coupé pour faire des boutures. Un second rameau se produisit aussitôt à la base du premier et s'éleva rapidement jusqu'au sommet de la serre. Les boutures ayant réussi, je pus, sans crainte de perdre la plante, sacrifier la souche primitive. Cette souche, disséquée par macération, nous montre, 1° son tronc principal (2); 2° son premier rameau (3); 3° le second (4), et, très-nettement, les tissus radiculaires produits par le second rameau, qui passent sur la base du premier, sur le tronc primitif et, de ce dernier, dans les racines (5).

» Ce fait, sans le secours de tous les autres, suffit pour la démonstration de la doctrine que je soutiens.

» Tels sont, messieurs, les éléments que je voulais montrer à l'Académie.

» Je puis me tromper sans doute dans l'appréciation de ces faits; de nombreux observateurs, plus habiles que moi, ont éprouvé ce sort. Si tel était le mien, si ma doctrine phytologique était jugée inadmissible, je m'en consolerais en pensant aux efforts que j'ai faits pour atteindre la vérité, et que tous les matériaux qui ont pu m'égarer resteront du moins, et à jamais, acquis à la science et à de meilleurs interprètes (6).

» Ces matériaux se composent d'environ trois mille pièces de toute nature, dont mille au moins méritent d'être soigneusement conservées.

» Toutes serviront également à la démonstration des phénomènes de l'organographie et de la physiologie des monocotylées et des dicotylées qui, je le soutiens une fois encore, se développent en tous sens de la même manière et par les mêmes causes

(1) *Voyez GAUDICHAUD, Organographie, Pl. XIII, fig. 5. — Idem, Voyage de la Bonite, Botanique; Pl. CXXXII, fig. 13.*

(2) *Voyez GAUDICHAUD, Organographie, Pl. XIII, fig. 5, a, a'.*

(3) *Ibid., id., fig. 5, b.*

(4) *Ibid., id., fig. 5, c.*

(5) *Ibid., id., fig. 5, d. Voyez aussi les fig. 6, 7, 8 de la même planche.*

(6) Je vais déposer toutes ces pièces anatomiques dans les collections phytologiques du Muséum, où chacun pourra les étudier.

Maintenant que nous connaissons les causes générales qui produisent les développements divers, maintenant que nous prouvons que les sources principales d'où partent les principes organisateurs sont dans les bourgeons maintenant enfin que nous savons quelles sont les lois qui régissent les agencements des tissus, et, en un mot, ce que c'est qu'un végétal, nous pourrions aborder toutes les questions qui se rattachent à l'organogénie, à la physiologie et à l'anatomie proprement dites, en donnant à ces parties de la science des végétaux la rationalité que nous avons la confiance d'avoir apportée à nos principes généraux d'organographie.

Pour l'organogénie, nous vous avons déjà (1) fait connaître, sinon notre travail, du moins le plan que nous nous proposons de suivre et le cadre dans lequel nous devons le renfermer. Cadre dont nous n'avons pas changé la forme, mais que nous avons considérablement agrandi.

Pour la physiologie, nous avons, dans la sphère de nos moyens, épuisé le champ des observations, et nous ne craignons pas de dire que les matériaux que nous avons groupés sont aussi beaux, aussi nombreux et aussi concluants que ceux qui forment la base de l'organographie.

Pour l'anatomie générale, directe et microscopique, vous comprendrez messieurs, d'après les principes d'organographie que je viens de vous montrer, qu'elle va devenir une science toute nouvelle et qui jettera de vives lumières sur toutes les autres parties, puisque nous savons actuellement et d'une manière exacte quelle est l'origine, l'âge et la nature des différents systèmes organiques et des tissus qui les composent.

Nous réserverons, pour le temps où nous vous l'apporterons, les critiques que nous avons à faire sur les travaux anatomiques d'un savant étranger, M. H. Mohl, dont les attaques peu mesurées n'obtiendront pas d'autres réponses. Il nous sera facile de prouver que ces travaux ont été faits, les uns dans une mauvaise direction, les autres sans direction aucune, et que tous ont été d'une stérilité désespérante pour l'organographie, pour la physiologie et pour l'anatomie elle-même.

C'est avec regret que nous entrerons dans cette voie, mais, puisqu'on nous en fait une obligation, nous saurons la remplir. Nous dirons donc franchement, et sans nous préoccuper des personnes, toute notre pensée sur des ouvrages qui, sans compter les erreurs d'observation, d'interprétation et

(1) Foyes GAUDICHAUD, *Organogénie*, *Comptes rendus de l'Académie des Sciences*, séance du 27 juin 1842.

de reproduction des faits, ne sont, à nos yeux, que de grandes et belles inutilités »

M MAGENDIE annonce à l'Académie qu'il vient de rencontrer le *cow-pox* sur une vache qui lui appartient. La femme qui soigne cette vache s'étant plainte à lui qu'elle avait contracté des boutons aux mains en la trayant M Magendie visita les trayons de la vache et y reconnut plusieurs boutons et quelques croûtes qui lui parurent appartenir au *cow pox*. Pour plus de certitude il pria M le docteur FIARD, qui depuis longtemps s'occupe de vaccination, de s'assurer si l'éruption était bien le *cow-pox* et, dans le cas de l'affirmative, de recueillir le fluide des boutons et de le transmettre à des enfants. En effet M FIARD vaccina plusieurs enfants avec le fluide recueilli sur la vache de M Magendie, et il vit se développer un véritable bouton vaccinal qui a servi à de nouvelles et fructueuses vaccinations. Aujourd'hui, un vaccin nouveau est en pleine activité au bureau de charité du III^e arrondissement ou chacun pourra le vérifier. Moi-même je mets ma vache, qui offre encore plusieurs pustules semblables aux précédentes, à la disposition de ceux de mes confrères qui dirigent spécialement leurs recherches sur la vaccine.

Les médecins qui regardent le renouvellement du vaccin comme indispensable à sa vertu préservatrice pourront se satisfaire et se procurer sans difficulté un virus vaccinal dont l'origine ne peut laisser aucun doute.

M Magendie demande au président d'accorder la parole à M FIARD pour entendre le récit des expériences et des observations qu'il a faites avec le vaccin nouveau.

MEMOIRES LUS

MÉDECINE — *Note sur le cow pox naturel, trouvée sur une vache appartenant à M Magendie. Développement de nombreuses pustules sur deux femmes varioleées chargées de la traire. Inoculation de la matière des pustules de la vache à des enfants, et développement d'une vraie et belle vaccine.* Mémoire de M FIARD

(Renvoi à la Commission du prix concernant la vaccine.)

Trois semaines environ après son arrivée chez M Magendie, la vache qui fait le sujet de cette observation avait présenté sur ses trayons une éruption de pustules grasses, très-enflammées et très-douloureuses, la femme Subtil, jardinière, chargée de la traire, ne tarda pas à être atteinte de deux

pustules a la face palmaire de la main gauche (c'était du 25 au 30 mars), dans la même semaine six autres pustules lui survinrent également à la face palmaire de la main droite, elles acquirent le volume et la forme de fortes pustules vaccinales, et entrainerent, par l'inflammation vaste et douloureuse transmise aux tissus voisins, le développement d'un abcès au centre de la main, dont M Magendie fit l'ouverture. Cette femme est âgée de 52 ans, elle est marquée de la petite vérole. Pendant qu'elle ne pouvait faire usage de sa main, elle fut remplacée par une femme de journée, âgée de 50 ans, ayant eu aussi la petite vérole, et qui ne tarda pas à être atteinte, a l'extrémité de la face palmaire de l'index de la main droite, d'une pustule semblable.

La jardinière reprit ses fonctions, mais, en touchant un nouveau bouton elle vit se développer une nouvelle pustule à l'extrémité palmaire du pouce de la main droite. c'était le 23 ou le 24 avril. Le 1^{er} mai cette pustule, que j'observai à son neuvième jour de développement, présentait le volume et la forme ombiliquée d'une forte pustule vaccinale, modifiée par l'épaisseur et la dureté de l'épiderme d'une main calleuse, elle est très-ronde et paraît contenir une matière blanche purulente. Une dernière pustule commence encore à se développer avec pulsations, douleur et chaleur à l'extrémité de l'annulaire gauche au sommet et au-dessous de l'ongle.

Les deux femmes affirment n'avoir eu aucune corchure ou gerçure de la peau des organes atteints de l'éruption, ainsi l'infection se serait faite par le frottement à travers l'épiderme, elles n'osent plus traire cette vache elles expriment le désir que leur maître les en débarrasse.

J'ai ouvert la pustule du pouce de la femme Subtil arrivée à son neuvième jour de développement, j'ai recueilli dans deux tubes de la matière purulente blanche qui s'en est écoulée d'abord, puis, au bout de quelques instants, un ichor limpide s'écoulant abondamment, j'en ai rempli deux autres tubes.

Après ces premières observations, j'ai visité la vache, elle est jeune de petite taille, mais belle, elle vient de la Picardie, elle est de race normande, elle est seule dans l'écurie, ses pis sont bien développés, elle avait récemment vêlé, la sécrétion laiteuse commençait à s'établir, lorsqu'au milieu du mois de mars dernier elle a été prise de l'éruption des pustules se sont développées sur ses trayons et ses pis successivement, jusqu'à ce jour, elle a paru peu indisposée, elle a continué de manger, seulement elle a semblé plus faible des membres postérieurs, parfois ses jambes ont paru tremblantes. Les trayons portent les traces et les cicatrices des éruptions passées, deux croûtes

lenticulaires seches recouvrent encore d'anciennes pustules que les deux femmes accusent d'avoir été la cause des éruptions dont elles ont été si douloureusement atteintes Je les ai arrachées et recueillies avec soin, pour en avoir leur action

Un bouton sans forme vaccinale acuminée, blanc à sa pointe, sur une base conique du volume du bout du doigt, ayant la forme d'un faux trayon, existant seul en arriere sur la mamelle, je l'ai ouvert et j'en ai extrait dans trois tubes le liquide sanguinolent qui s'en écoulait.

» Ainsi il ne m'a pas été donné d'observer une éruption récente, franche et caractéristique du cow-pox sur cette vache, j'ai été prevenu trop tard toutefois il est indubitable que les deux pustules dont j'ai recueilli les croûtes ont communiqué aux deux femmes les nombreuses pustules que j'ai décrites plus haut

» Pour tirer tout le parti possible de ces diverses observations et constater par des experiences les effets virulents des produits de ces diverses pustules, j'ai recueilli

1° Deux tubes chargés de l'humeur purulente blanche de la pustule au ponce droit de la femme Subitl (jardiniere),

2° Deux tubes chargés de l'ichor limpide de cette meme pustule, quelques instants apres l'écoulement du pus ,

3° Deux croûtes seches lenticulaires détachées des trayons de la vache et provenant de pustules accusées de virulence par les deux femmes ,

4° Trois tubes charges du liquide sanguinolent, provenant du bouton (sans forme vaccinale), developpe sur la mamelle de la vache, que j'avais ouvert

» Le lendemain, jeudi 2 mai 1844, était le jour de la vaccination publique a la mairie du III^e arrondissement de Paris (la seance qui devait avoir lieu la veille avait été ajournée, à cause de la fête) médecin du bureau de bienfaisance, j'étais de service comme vaccinateur; c'était pour moi une occasion toute naturelle de profiter de cette circonstance pour expérimenter les divers produits recueillis à Sannois Je fis part à M le maire de mes projets et de mon espoir de renouveler le vaccin du comité, il m'autorisa à agir et à former une commission spéciale, composée de mes confrères du bureau de bienfaisance, chargés comme moi des vaccinations pour cet arrondissement

Il fut convenu que mes confreres vaccineraient les bras droits des enfants avec le vaccin ordinaire, et que moi, éloigné des enfants porteurs de vaccin, j'inoculerais aux bras gauches des mêmes enfants les diverses matieres que j'avais recueillies, nous convinmes de pratiquer 5 piqûres à chaque bras

Première expérience, jeudi 2 mai 1844

1° A 3 enfants j'inoculai l'humeur sanguinolente provenant du bouton informe de la vache, 15 piqûres

2° A 2 enfants j'inoculai la matiere d'une croûte délayée avec de l'eau croûte provenant d'un bouton desséché de la vache, 10 piqûres

3° A 2 autres enfants j'inoculai la matiere d'une partie de la precedente croûte que je délayai avec l'humeur sanguinolente qui me restait dans un tube provenant du bouton de la vache, 10 piqûres

En tout, sur 7 enfants, je pratiquai 35 piqûres

N B — Mes lancettes étaient neuves, et j'ai scrupuleusement évité tout contact avec le vaccin ordinaire appliqué par mes confrères au bras droit

Le mercredi suivant, nos vaccinations reprenant leur jour ordinaire le 8 mai 1844, par conséquent, à la fin du sixieme jour au lieu du septieme les 7 enfants nous furent présentés

Aux bras droits, toutes les vaccinations pratiquées par mes confreres avec le vaccin ordinaire avaient réussi, les enfants présentaient tous un plus ou moins grand nombre de pustules, en général elles étaient peu développées parce que nous n'étions qu'à la fin du sixieme jour du développement

Aux bras gauches de ces 7 enfants, sur les 6 premiers inoculés avec les diverses matieres indiquées plus haut, rien ne s'était développé, résultat complètement nuls, sur le dernier, un des deux vaccinés avec la matiere de la croûte délayée avec l'humeur sanguinolente du bouton de la vache nous trouvâmes à la troisième piqûre une pustule ayant parfaitement la forme vaccinale, en tout semblable à celle du bras droit, mais pas développée comme ces dernières

» L'enfant Alfred Henry, âgé de 3 ans 4 mois, sur lequel s'est présentée cette pustule, est maigre, faible et peu développé, sa mere habite rue Neuve Saint-Marc, n° 3

Cette unique pustule, avec ses caractères vaccinaux, était donc pour nous un résultat précieux et digne de la plus grande attention, il nous restait à étudier sa marche et son développement personne d'entre nous n'éleva de doutes sur son caractère vaccinal et sur le principe de son développement, elle était transparente, ombiliquée, mais faiblement développée, toutefois égale sous ce rapport aux cinq pustules du vaccin ordinaire de son bras droit dont elle ne différait pas non plus par ses autres caractères

• Ce qui nous frappa d'abord dans cette observation fut cette singularité

difficulté du passage direct du virus de la vache à l'homme (chose déjà observée dans d'autres circonstances et par d'autres que nous) Sur 35 piqûres, une seule a réussi, tandis que parallèlement sur les mêmes sujets, le vaccin ordinaire s'est développé sur le plus grand nombre des piqûres. Plus tard on le verra se transmettre avec une grande facilité sur d'autres enfants.

Il est cependant juste d'observer que deux enfants seulement avaient été inoculés avec la croûte délayée avec l'humour de la vache, ce qui nous réduisit à 10 piqûres (1 sur 10). Puis il est d'observation que les inoculations pratiques avec des croûtes réussissent moins bien qu'avec l'humour limpide et virulent d'un bouton au huitième jour.

Le vendredi 10 mai, fin du huitième jour, je conduisis l'enfant Henry chez M. Magendie qui constata le développement encore plus caractérisé de cette pustule vaccinale. Il constata qu'elle était d'une transparence nacrée à sa circonférence, ombiliquée à son centre, et en tout semblable aux pustules du vaccin ordinaire à l'autre bras, mais il est vrai de dire que les deux développements étaient un peu faibles vu la frêle constitution et la pâleur du sujet. Les areoles inflammatoires commençaient à peine.

M. Magendie n'eleva aucun doute sur le caractère vaccinal de cette pustule.

Le samedi 11 mai, neuvième jour, mes confrères du bureau de bienfaisance se réunirent chez moi pour étudier le développement et le caractère du bouton d'Henry. Il avait marché depuis la veille, il avait un beau développement, il était entouré d'une areole vive d'un beau rouge, et les caractères d'un vaccin beau et régulier établirent définitivement dans nos esprits une opinion formelle sur sa nature vaccinale.

J'exprimai le regret de n'avoir pas un enfant à vacciner dans l'instant même, pendant cette séance. En présence de mes confrères M. le docteur Ameuille proposa de conduire le jeune Henry chez un de ses clients dont deux enfants étaient à vacciner.

Deuxième expérience samedi 11 mai 1844

M. le docteur Ameuille et moi nous conduisîmes l'enfant Henry rue Coquenard, n° 21, et là, avec la matière extraite de la pustule, j'inoculai les deux filles de M. Ménars.

Hélène-Annonciade Ménars, âgée de 14 mois, 5 piqûres à chaque bras,

Claudia Marie Ménars, sa sœur, âgée de 30 mois, 5 piqûres à chaque bras.

Puis la mère de l'enfant Henry, qui l'accompagnait, nous déclarant

n'avoir pas été vaccinée et n'avoir pas eu la petite vérole, je la vaccinaï aussi

» Femme Henry, âgée de 36 ans, 10 piqûres

» Ensuite nous recueillîmes dans trois tubes de l'humeur de la pustule d'Henry.

» Samedi 18 mai, huitième jour, sur les trois sujets nous constatons un beau développement vaccinal, les 30 piqûres ont toutes réussi, 5 sur chaque bras, elles constituent une belle vaccine

» Nous avons, le docteur Ameuille et moi, rempli quatre tubes sur Clau-dia Marie Ménars, et quatre autres tubes sur la mère d'Henry.

» Le mardi 21 mai, onzième jour, les boutons des enfants Ménars ont acquis un développement très-remarquable, ils dépassent, par leur étendue et leur volume, le développement moyen du vaccin ordinaire

» Cette expérience ayant eu lieu en dehors du bureau de bienfaisance, nous allons revenir à nos opérations hebdomadaires et faites à époques périodiques et régulières

» Le mercredi 22 mai, l'enfant Henry nous fut encore amené à la vaccination de la mairie, mes confrères et moi nous constatâmes un développement encore plus considérable de sa pustule qui n'était point encore en dessiccation, plus lente dans sa marche, elle était arrivée, quoique tardivement, au plus beau développement

» Je vaccinaï d'abord trois enfants avec la matière recueillie dans des tubes sur la pustule d'Henry

» Victorine-Laure Roche,

» Léontine-Amélie Boudon,

» Marie-Zélie Bouigne

} Tubes

» Puis, ouvrant de nouveau la pustule dont la circonférence s'était agrandie à son treizième jour, il fut facile d'en extraire de la matière, j'inoculaï deux autres enfants

» Félicie Adèle Desplanes,

» François Malaisé.

} Bras à bras

» Mes confrères constatèrent encore dans cette séance le développement, à son quatrième jour, des 10 pustules naissantes de la mère du jeune Henry, dont, le huitième jour, nous avons constaté le parfait développement

» Le mercredi 22 mai, huitième jour, les cinq enfants nous sont présentés à la vaccination du bureau; chez tous, l'opération a réussi

» Victorine-Laure Roche a 3 pustules,

» Léontine-Amélie Boudon a 8 pustules,

Marie-Zélie Bouigne a 10 pustules,

Felicio-Adele Desplanes a 3 pustules,

François Malaisé a 7 pustules

Nous avons tous constaté le développement regulier et complet d'un beau et vrai vaccin, ils étaient tous plus largement développés, entourés d'une urticle inflammatoire plus forte que sur l'enfant Henry, mais tenons toujours compte de sa faible constitution

Le service des six vaccinateurs du III^e arrondissement étant changé, six autres medecins vaccinateurs les ont remplacés mes nouveaux confreres de cette serie, reconnaissant au nouveau vaccin toutes les qualités désirables ont pratiqué toutes les vaccinations assez nombreuses (*) avec la matiere recueillie sur les 10 belles pustules de Marie-Zélie Bouigne désignée plus haut

Ainsi, le vaccin ordinaire ayant été abandonné, la vaccination du III^e arrondissement est pratiquée uniquement avec ce nouveau vaccin, il est impossible, a moins de mauvais vouloir, de le perdre

J'ai recueilli dans plusieurs tubes la matiere vaccinale des pustules de l'enfant Bouigne, et j'en adresserai deux a M le Ministre du Commerce, avec mes observations et expériences, afin qu'il les transmette officiellement a l'Académie royale de Médecine

Troisième experience mercredi 8 mai 1844

Au bureau de la mairie du III^e arrondissement, j'inoculai aux bras droits de 5 enfants, par 5 piqûres à chaque, l'humeur recueillie de la pustule de la femme Subtil, jardinière de M Magendie, qui portait des traces de petite verole, et aux bras gauches des memes enfants, je pratiquai 5 piqûres pour inoculer la matiere de la deuxième croûte recueillie le 1^{er} mai, à Sannois, sur la vache, je la delayai avec de l'eau

Le mercredi 15 mai, ces 5 enfants ne presenterent aucun développement pustuleux, les piqûres étaient seches l'effet de cette inoculation a été complètement nul

Je crois devoir rappeler qu'en 1836, je rencontraï une femme Dory, domestique de M Domange, à la Petite Villette, qui, en trayant une vache dont le pustules ont été constatées et décrites par M Volumard, medecin veterinaire, avait été atteinte a la main d'une pustule de forme vaccinale cette femme était marquée de petite verole, cette eruption parut remarquable a

(*) 8 enfants

M le docteur Rayet, il en fit exécuter le dessin, je présentai cette femme à MM Huzard, Breschet, Magendie, Double et Dumenil, de l'Académie des Sciences les caractères de cette pustule parurent vaccinaux, j'inoculai la matière qui s'en écoulait à six enfants, en présence de MM Huzard, Dupuy Rayet, Bontin, Amussat, etc. Malgré la présomption que nous inspirait la forme vaccinale de ce bouton, développé sur une femme variolée, nos inoculations, comme dans l'observation précédente, furent sans résultat. Cette observation singulière et le dessin se trouvent dans mes travaux déposés à l'Académie, en 1836.

Il faut en conclure que des femmes, quoique variolées, peuvent recevoir l'inoculation du cow pox, mais que, dans ce cas, malgré l'intensité du développement des pustules et leur forme vaccinale, elles n'ont pas de virulence et ne peuvent produire la vaccine.

PHYSIOLOGIE VÉGÉTALE — *Mémoire sur la tendance des racines à s'enfoncer dans la terre, et sur leur force de pénétration*, par M. PAYER (Extrait par l'auteur)

(Commission précédemment nommée)

Le 23 février 1849, M. Pinot annonça à l'Académie que des graines de *Lathyrus odoratus* qu'il faisait germer sur le mercure avaient enfoncé leurs radicules dans ce métal d'une quantité telle que l'action de la pesanteur n'était plus pour expliquer ce phénomène, et qu'il fallait recourir à une force vitale particulière. Un physiologiste qui répéta quelques mois après l'expérience constata le fait de la pénétration, mais soutint que la radicule ne s'enfonçait jamais au-delà de ce qu'exige le poids de la graine. Cependant Muller ayant reconnu plus tard que les radicules de certaines plantes ne s'enfoncent jamais dans le mercure, mais rampent à la surface, M. de Candoille expliqua ces différences en les attribuant au plus ou moins de rigidité des racines.

Tel était l'état de la question lorsque j'entrepris de faire les observations dont je soumetts aujourd'hui les résultats à l'Académie. Au moyen d'un appareil, dont je donne la description dans mon Mémoire, appareil qui me permet de maintenir à la surface de l'eau une couche de mercure dont je fais varier à volonté l'épaisseur, je suis parvenu à déterminer d'une manière précise la quantité dont la radicule d'une plante quelconque peut s'enfoncer dans ce métal et à faire les expériences dont voici les principaux résultats.

1° Toutes les racines ne présentent point cette force de pénétration.

au même degré, il en est, comme celles du *Polygonum jagopyrum*, qui rampent à la surface du mercure sans jamais s'y enfoncer, d'autres ne peuvent pénétrer qu'une couche de ce métal de quelques millimètres seulement d'épaisseur d'autres enfin, le *Lathyrus odoratus* par exemple, ont toujours traversé les couches les plus épaisses que j'ai pu leur opposer c'est-à-dire jusqu'à 2 centimètres

2° Cette différence ne tient ni à une différence de poids, ni à une différence de rigidité, ni à une différence de grosseur. Les racines du sarrasin ont une grosseur et une rigidité bien plus considérables que celles du cresson alenois, elles pesent bien davantage, et cependant les premières, nous venons de le dire rampent toujours à la surface du mercure, tandis que les secondes s'y enfoncent assez profondément

» D'ailleurs qu'on retire du mercure une racine qui s'y était déjà enfoncée si ce n'était qu'en vertu de son poids que cette racine pénétre dans ce métal lorsqu'on l'abandonnerait à elle-même, elle devrait y rentrer d'une quantité égale à celle dont elle en était sortie. Or rien de semblable n'a lieu. Une racine qui s'était enfoncée dans le mercure de 1 centimètre par exemple n'y rentre plus elle flotte à la surface seulement si la vie existe. Elle est susceptible encore de rallonger la partie qui se formera à partir de ce moment, et seulement cette nouvelle partie pénétrera dans le mercure et y atteindra souvent une profondeur considérable

3° Lorsqu'une racine glisse entre le mercure et le vase, elle atteint une profondeur beaucoup plus grande que si elle s'était enfoncée directement dans le mercure. Tôt ou tard même, si la couche de ce métal n'est pas tellement épaisse qu'elle l'écrase, elle arrive à la traverser complètement et par suite, à se trouver dans l'eau sous-jacente

4° Toutes les racines ne mettent point le même temps à pénétrer une couche donnée de mercure. Trois ou quatre jours suffisent à une racine de cresson alenois, tandis qu'il faut au moins une quinzaine pour les racines de *Blutum*

5° Les racines secondaires jouissent de cette même force de pénétration à un degré un peu moindre toutefois que la racine principale. Les racines du froment atteignent même une certaine profondeur

6° Qu'il y ait de l'air, de l'eau ou de l'huile sous la couche de mercure, le temps que la racine met à traverser cette dernière est toujours le même. Donc le milieu de la couche inférieure n'a aucune influence

7° Mais il n'en est plus de même lorsqu'on fait varier l'intensité de la lumière. La faculté de pénétrer une plus ou moins grande quantité de mer-

cure et le temps employé sont extrêmement différents ainsi, pour traverser une même couche de mercure, des plantes placées dans l'obscurité complète ont mis plus du double de temps que celles qui étaient exposées à la lumière. Ainsi encore, des racines de cresson alénois, croissant dans une chambre noire, pouvaient à peine, et après plusieurs semaines, traverser une épaisseur de mercure de 3 millimètres tandis qu'à la lumière diffuse ordinaire elles traversaient en peu de temps jusqu'à 6 à 8 millimètres.

» 8° La température a une influence analogue à celle de la lumière. Voilà pourquoi des racines de chou qui, en hiver, mettaient vingt-cinq jours à traverser une couche donnée de mercure, n'emploient plus en ce moment que de dix à douze jours.

9 Si au lieu d'une seule couche de mercure et d'une seule couche d'eau, on en met plusieurs, et alternant entre elles, la racine, après avoir pénétré la première couche de mercure, arrivera dans la première couche d'eau, la traversera, atteindra la seconde couche de mercure, la pénétrera également de suite, et si la végétation présente toujours la même activité le temps de son passage à travers chaque couche de mercure sera le même.

» Il existe dans les racines deux autres tendances : l'une, *à fuir la lumière*, l'autre *à chercher la bonne terre*. Or, la troisième tendance que nous examinons en ce moment, c'est-à-dire *la tendance des racines à s'enfoncer dans la terre*, ne serait-elle qu'une conséquence des deux premières ?

10 Pour m'assurer que la racine, en traversant le mercure ne va pas chercher l'eau sous-jacente, j'ai fait l'expérience suivante. J'ai placé au fond d'une éprouvette une certaine quantité d'huile, puis, à une certaine hauteur au-dessus de la surface de cette huile, j'ai soutenu, au moyen d'un diaphragme, une couche de coton assez épaisse, et j'ai versé par dessus de l'eau qui n'a point filtré à travers le coton. J'avais donc ainsi, en allant de haut en bas, une couche d'eau, une d'air et une d'huile. Or, les radicules d'une graine placée à la surface de l'eau ont descendu, ont traversé le coton, puis la couche d'air, et sont arrivées dans la couche d'huile.

Donc la tendance des racines à descendre et leur tendance vers la bonne terre ne sont pas une seule et même chose.

PHYSIOLOGIE — *De l'influence des nerfs de la huitième paire sur les phénomènes chimiques de la digestion*, par M BERNARD, de Villefranche (Extrait)

(Commissaires, MM Magendie, Flourens, Dumas)

Première expérience — Sur un chien adulte, je pratiquai à l'estomac une

large ouverture fistuleuse qui permettait d'observer directement ce qui s'y passait pendant les divers temps de la digestion

L'animal étant bien portant et guéri depuis cinq semaines, j'étudiai comparativement la digestibilité de deux alimentations auxquelles ce chien fut alternativement soumis

Dans un cas, c'était de la viande crue qui était ingérée dans l'estomac dans l'autre, c'était une sorte de soupe composée avec du pain, du lait et du sucre de canne

1° Au moment de l'ingestion des aliments dans l'estomac, la muqueuse, qui n'était visible que dans une certaine étendue, devenait rouge, turgide, comme érectile et en même temps se produisait à sa surface, et en grande abondance, un liquide transparent et acide le suc gastrique, qui venait humecter le bol alimentaire et agir sur lui

2° Lorsque c'était la viande crue qui était ingérée, on la trouvait, en général au bout de trois ou quatre heures, réduite en une pâte chymeuse à réaction très-acide

3° Pour la soupe au lait sucré, le lait était d'abord coagulé, puis, après une demi-heure ou trois quarts d'heure, le tout ne formait plus qu'une bouillie homogène blanchâtre à réaction très-acide Ce n'est que plus tard que l'estomac était complètement vide

4° Je faisais remarquer que, dans aucune circonstance, on n'a observé des signes de fermentation dans les matières qui composaient cette soupe Le bol alimentaire sucré, examiné au commencement ou à la fin de la digestion contenait toujours du sucre à l'état de sucre de canne

C'est après avoir observé pendant huit jours consécutifs la digestion de ces deux alimentations, que je résolus de couper les deux nerfs pneumo-gastriques

Le jour où je fis l'opération l'animal était à jeun depuis vingt quatre heures et avait un très grand appétit Tout étant convenablement disposé pour l'expérience, j'enlevai l'appareil qui bouchait habituellement la fistule, et je nettoyai la face interne de l'estomac avec une éponge douce

Sous l'influence de cette excitation toute mécanique, l'estomac accusait une sensibilité marquée et se contractait visiblement sur le corps étranger, puis la muqueuse, devenue rouge et turgide, laissait échapper en assez grande abondance du suc gastrique.

C'est à ce moment même que fut faite la résection des deux nerfs pneumo-gastriques dans la région moyenne du cou Aussitôt tout changea d'aspect, et j'observai dans l'estomac les phénomènes nouveaux qui suivent

La membrane muqueuse, qui était turgescence et d'où ruisselait le suc gastrique acide, s'affaissa subitement et devint pale, comme exsangue. La sensibilité et le mouvement disparurent, et la formation du fluide gastrique fut arrêtée instantanément. Mais, chose particulière, il survint bientôt à sa place une sécrétion très-abondante d'un mucus filant à réaction neutre qui s'échappait par la fistule.

Je dois noter que la section des nerfs pneumo-gastriques n'avait pas troublé l'état général de l'animal. Ce chien, naturellement très-voirace, se jetait encore après avec avidité sur les aliments qu'on lui offrait.

Alors j'ingérai dans l'estomac, au moyen de la fistule, des morceaux de viande et une certaine quantité de la soupe au lait sucré, puis je rebouchai la fistule.

Après une heure, je trouvai les morceaux de pain imbibés et ramollis. Le lait non coagulé était mêlé d'une grande quantité de mucus filant. Les morceaux de viande n'avaient subi aucune altération, et toute la masse alimentaire offrait une réaction neutre.

Après deux heures, les choses étaient dans le même état, seulement les morceaux de pain se montraient plus ramollis. La réaction de l'estomac était toujours neutre.

Huit heures après, je trouvai dans l'estomac une espèce de bouillie blanche offrant alors une réaction excessivement acide. Il ne fut pas difficile de constater que cette acidité provenait d'une transformation lactique qui s'était opérée au sein des matières qui composaient la soupe sucrée. La viande se trouvait au milieu de cette bouillie acide et n'avait pas éprouvé la moindre altération.

Vingt quatre heures après, rien de particulier n'était survenu, et l'animal fut sacrifié.

Comme résumé de cette expérience, on voit

1° Que la résection des nerfs pneumo-gastriques a éteint non seulement le sentiment et le mouvement de l'estomac, mais qu'elle a de plus arrêté instantanément la production du suc gastrique.

2° Qu'après cette résection, la digestion ne s'est plus opérée, puisque vingt-quatre heures après, les morceaux de viande introduits dans l'estomac ont été trouvés entiers et intactes.

3° On remarquera surtout qu'en l'absence du suc gastrique, il a pu survenir des décompositions spontanées au sein des matières contenues dans l'estomac, comme le démontre la transformation lactique qui s'est développée aux dépens des éléments de la soupe au lait sucré.

Sous l'influence des nerfs pneumo-gastriques, ces réactions chimiques ne se seraient pas produites, c'est ce que prouve la double expérience suivante

Deuxième expérience — On sait que l'émulsine et l'amigdaline sont deux substances innocentes quand elles sont administrées isolément, mais qu'elles développent de l'acide cyanhydrique et de l'essence d'amandes amères et deviennent un poison violent lorsqu'on vient à les mettre en contact. Les choses se passent différemment quand on fait intervenir d'une certaine manière le suc gastrique dans la production de ce phénomène. Or, voici comment je m'en suis assuré.

Ayant pris deux animaux adultes (chiens) dans les mêmes conditions et à jeun, j'opérai la résection des nerfs pneumo-gastriques sur l'un d'eux, puis, dans l'estomac de chacun fut ingérée une même dose d'émulsine, et une demi-heure après on administra de l'amigdaline aux deux animaux.

Le chien qui avait les pneumo-gastriques coupés mourut un quart d'heure après, avec les symptômes de l'empoisonnement par l'acide cyanhydrique, tandis que l'autre chien survécut sans éprouver d'accidents sensibles.

Il est facile d'interpréter cette expérience. En effet, chez l'un de ces animaux, l'émulsine, modifiée par le suc gastrique, avait perdu la propriété de réagir sur l'amigdaline. Chez l'autre, au contraire, l'émulsine déposée dans un estomac privé de ses nerfs, et par suite de fluide gastrique, est restée intacte, aussi avait-elle conservé la propriété de réagir sur l'amigdaline. L'empoisonnement de l'animal en est la preuve évidente.

Ainsi, dans la digestion stomacale, les aliments sont, on peut le dire presque exclusivement soumis à l'action puissante du fluide gastrique, leurs affinités naturelles semblent alors en quelque sorte détruites, et il ne peut s'opérer entre les éléments aucune décomposition spontanée. Quand, après la résection des nerfs de la huitième paire, ces réactions s'opèrent, cela tient à l'absence du suc gastrique dans l'estomac.

MEMOIRES PRESENTES

ORGANOGRAPHIE VÉGÉTALE — *Note sur l'anatomie de l'Aldrovanda vesiculosa, Lin.*, par M. PARLATORE.

(Commissaires, MM. de Mirbel, de Jussieu, Ad. Brongniart.)

Cette plante singulière, dont la découverte est due au célèbre Monti de Bologne, et qui nage sur la surface des eaux des lacs de quelques endroits de

L'Italie et du midi de la France, offre une tige ordinairement simple, mais qui se ramifie quelquefois, une branche naissant alors à l'aisselle d'un des verticilles de feuilles dont je parlerai plus bas, et acquérant d'ordinaire un tel développement, que la tige paraît bifide. Il est de toute importance de bien noter l'origine de cette branche pour connaître la nature morphologique des organes, que je considère comme des feuilles, car cette branche, comme je viens de le dire, naît à l'aisselle de ces organes, suivant l'origine de tous les rameaux, qui prennent naissance à l'aisselle des feuilles. La tige de l'*Aldrovanda*, qui est lisse, sans poils et cylindrique, présente des nœuds très-rapprochés, chaque nœud ou entre-nœud n'offrant d'ordinaire que 2 ou 3 millimètres de longueur. On voit naître à chaque nœud un verticille de feuilles ordinairement au nombre de huit ou neuf, disposées sur la tige comme des rayons autour d'un axe.

Si nous examinons une feuille de chaque verticille nous la voyons formée par un pétiole et par une lame qui présente des modifications tout à fait singulières. Le pétiole, qui a environ 9 millimètres de longueur et 2 de largeur, est un peu rétréci à sa base, et élargi au sommet où il se termine en six divisions linéaires, subulées, qui ne naissent pas à la même distance du pétiole, les deux extérieures partant plus bas que les autres et ainsi de suite. Observées avec une loupe simple, ces divisions ou découpages du pétiole se montrent hérissées aux bords de petits poils, dirigés en haut vers le sommet des divisions mêmes, ces poils, vus au microscope, se montrent formés par une cellule conique, transparente et qui ne contient pas de chromule. Le creux du pétiole présente des espèces de petits renflements de forme hexagonale visibles à l'œil nu et diaphanes, qui répondent aux cavités intérieures ou lacunes, que j'examinerai tout à l'heure. Il existe en effet dans toute l'épaisseur du pétiole des cavités presque hexagonales, mais un peu irrégulières et inégales de grandeur, disposées ordinairement en deux séries pour chaque côté du pétiole quelquefois on trouve une troisième série plus petite de ces lacunes au bord du pétiole même. Lorsqu'on soumet au microscope une portion de pétiole, on voit les parois de ces lacunes formées par des cellules allongées, mais irrégulières, disposées les unes au bout des autres, et bien distinctes d'autres cellules qui sont comme des espèces de cloisons pour les lacunes, ce sont ces dernières cellules, dont je parle, qui forment le parenchyme du pétiole entre une lacune et l'autre. Ces cellules, beaucoup plus grandes que les précédentes, sont ovales ou arrondies, elles contiennent de la chromule.

La face supérieure du pétiole est parcourue dans toute sa longueur par

une ligne, espace de nervure longitudinale, qui, à son extrémité, se continue dans la vésicule formée par la lame de la feuille. Cette nervure ne présente au microscope que des cellules allongées, point de vaisseaux, ni trachées, ni vusseaux ponctués, au reste, ni dans le pétiole ni dans la vésicule je n'ai jamais observé aucun vaisseau.

La vésicule dont j'ai parlé plus haut commence donc de cette nervure médiane du pétiole, en se montant d'abord rétrécie à sa base. Elle se présente en forme de miliaire avec un bord un peu concave, et l'autre plus grand convexe. La concavité, qui donne à la vésicule cette forme de miliaire, existe supérieurement. Formée par la lame de la feuille courbée sur elle-même, elle présente en dedans une cavité remplie d'air qui la rend renflée. Mais cette cavité n'est pas générale, c'est-à-dire elle n'occupe pas tout l'espace formé par cette lame ainsi courbée, car les deux feuillets de celle-ci adhèrent dans l'étendue d'un millimètre l'un à l'autre, du côté du bord convexe de la vésicule, et ce n'est seulement que du côté du bord concave que la vésicule est véritablement renflée. L'adhérence des deux feuillets de la lame n'est pas très-intime, car on peut aisément les séparer l'un de l'autre avec une épingle ou avec une lame de canif. Les deux feuillets de la lame de la feuille une fois déployés, celle-ci se montre comme arrondie, avec une légère échancrure au sommet, et se rapproche alors des feuillets des *Dioscorea* ou de la *Dioscorea*, plantes de la famille des *Dioscoreaceae*.

La vésicule de l'*Aldrovanda* est lisse et sans stomates. Observée avec le microscope, elle présente des choses très-dignes de remarque. Après une couche de cellules irrégulières et en général ondulées, comme on les voit dans l'épiderme des feuilles d'un grand nombre de plantes, on trouve, tout près du bord convexe de la vésicule, des cellules coniques, placées à une certaine distance les unes des autres, avec une base élargie et dirigée du côté du bord convexe, et avec le sommet tourné du côté de la cavité pour ainsi dire aérienne de la feuille. Ces cellules sont très-inégaies en grandeur, car on en observe de très-petites à côté d'autres qui sont bien grandes, leur base se prolonge d'un côté et de l'autre, et son extrémité se continue souvent avec l'extrémité de la base de la cellule voisine, de sorte qu'il en résulte une espèce de ligne ou encore mieux de série, hérissee pour ainsi dire de petites dents. Je crois qu'on doit regarder ces cellules comme des poils.

• Ce n'est pas tout. La partie adhérente de la vésicule est formée par des cellules oblongues et irrégulières, et présente des corps tout à fait particuliers, que je n'ai jamais observés et dont l'existence, si je ne me trompe, n'a encore été mentionnée par aucun botaniste. Ces corps, qui sont nombreux et

rapprochés les uns des autres, se présentent sous la forme de petits ciseaux ouverts, car on peut aisément reconnaître quatre branches réunies par une espèce de nœud de forme ovale et rempli par une substance opaque: les quatre branches se dirigent presque parallèlement deux à deux en haut et en bas. Celles du même côté semblent réunies jusqu'à un certain point, elles se terminent enfin isolées, et avec une extrémité obtuse; leurs bords sont un peu transparents, tandis que vers le centre elles se montrent remplies de la même substance opaque qui se trouve dans le nœud.

« La vésicule de l'*Aldrovanda vesiculosa*, ou, pour mieux dire, la lame de la feuille qui la forme, n'existe pas dans les verticilles supérieurs des feuilles; tout au plus dans chaque pièce de ces verticilles on voit une espèce de proéminence fort petite, qui est sans doute le rudiment de la lame. Ce n'est que dans les verticilles inférieurs que cette vésicule est bien développée. cela est d'accord avec une loi que nous croyons pouvoir établir, savoir, que les organes ne se développent dans les végétaux qu'à mesure qu'ils deviennent nécessaires à la plante; loi en vertu de laquelle nous voyons par exemple se développer les feuilles séminales à l'époque où la jeune plante n'est pas encore en état de se nourrir d'elle-même, et qui se flétrissent et meurent au moment où cette plante peut bien se nourrir par la force absorbante des extrémités de sa racine, sans avoir besoin des cotylédons. »

MECANIQUE APPLIQUÉE. — *Nouvelle théorie des corps fibreux*, par M. FABRE.

(Commission nommée pour une précédente communication du même auteur, sur la théorie des voûtes.)

« Les auteurs qui jusqu'à présent se sont occupés de la théorie des corps fibreux me paraissent, dit M. Fabré, s'être engagés dans une mauvaise voie, puisque, pour arriver à une solution, ils ont eu besoin de s'étayer sur des hypothèses qui sont au moins fort hasardées. Si la question théorique des charpentes en fer et en bois est encore aussi peu avancée, je ne doute point que cela ne tienne à l'état imparfait des recherches sur les corps fibreux. J'espère que les bases que je pose dans mon présent Mémoire permettront d'asseoir un peu plus solidement cette théorie. »

M. DESAGNEUX adresse une Note ayant pour titre. *Perfectionnement du baromètre et du thermomètre.*

M. Regnaud est prié de prendre connaissance de cette Note, et de faire savoir à l'Académie si elle est de nature à devenir l'objet d'un Rapport.

M. **PERAIRE** écrit, de Bordeaux, pour demander l'autorisation de reprendre divers Mémoires qu'il avait adressés successivement au concours pour les prix de Médecine et de Chirurgie, et qui n'ont pas été mentionnés dans le Rapport de la Commission.

Cette demande est renvoyée à la Commission du concours pour les prix de Médecine et de Chirurgie de l'année 1842.

CORRESPONDANCE.

M. **FLOURENS**, en présentant, au nom de l'auteur, le second volume de l'*Histoire de la Chimie depuis les temps les plus reculés jusqu'à notre époque*, donne une idée du but que M. **HÖFER** s'est proposé en publiant son ouvrage, et des difficultés qu'il a eues à surmonter. Plus de mille volumes, tant imprimés que manuscrits, ont dû être lus attentivement et la plume à la main; parmi ces ouvrages, écrits en six ou sept langues différentes, beaucoup présentaient des idées tellement étranges et un style si obscur, qu'il fallait une grande persévérance pour suivre l'auteur jusqu'au bout et séparer de tout ce fatras quelques faits intéressants qui s'y trouvaient comme perdus. « Pour ces faits, d'ailleurs, dit M. Höfer, je me suis toujours attaché à remonter aux sources et, toutes les fois que cela était possible, j'ai cité le texte original.

» Avant d'arriver au moyen âge, j'ai fait connaître *l'art sacré* autrefois pratiqué dans les temples de l'Égypte. C'était là un sujet entièrement nouveau, qui, autant que je sache, n'avait encore été traité nulle part, c'est la source à laquelle les alchimistes avaient puisé toutes leurs théories

» Bien des assertions admises jusqu'à présent sans contestation ont dû être redressées et rectifiées. J'ai démontré qu'un grand nombre de faits importants, la distillation, la poudre à canon, la coupellation, sont des inventions grecques ou égyptiennes, longtemps connues avant Albucasis, Roger Bacon et Arnaud de Villeneuve. »

M. **DE JUSSIEU** présente, au nom de l'auteur, M. **MOAIS**, professeur à l'université et directeur du Jardin botanique de Turin, le deuxième volume de la *Flore de Sardaigne*.

« Ce volume comprend les familles de plantes rangées suivant l'ordre du *Prodromus* de M. de Candolle, depuis les rosacées jusqu'aux éricinées, et par conséquent traite de quelques groupes importants, ceux des ombellifères, des composées, des rubiacées, etc., etc.; chaque plante est décrite en détail avec

l'indication des modifications particulières que lui impriment le climat et la station qu'elle occupe dans ce pays. En tête de chaque description, l'auteur a placé une synonymie choisie, où il a eu soin de citer les noms adoptés par tous ceux qui se sont occupés de la même région botanique, comme sous le nom de *méditerranéenne*. La position à peu près centrale de la Sardaigne donne un grand intérêt à cette publication, dans un moment où les travaux, poursuivis, d'une part, dans toutes les parties de l'Europe en rapport avec le bassin de la Méditerranée, de l'autre, sur une grande partie de son littoral africain, tendent à compléter l'histoire de la végétation de cette région botanique si naturelle. Le talent et la conscience avec lesquels M. Moris a rédigé les deux volumes déjà publiés de sa *Flora Sardoia* feront de cet ouvrage un des fondements les plus solides de cette flore générale du bassin de la Méditerranée. »

PHYSIOLOGIE. — *Sur la durée de la gestation chez la femme*; Note de M. BERTHOLD.

« La durée de la grossesse est calculée ou du jour de l'impregnation, ou du jour où les dernières menstrues ont commencé, ou du jour après celui où elles ont cessé. Mais ce qu'il y a de remarquable, c'est que les auteurs, de quelque jour qu'ils commencent à compter, prennent toujours le nombre de 280 jours pour la durée normale de la grossesse. Il peut sans doute se rencontrer, selon chacune de ces méthodes de supputation, un certain nombre d'accouchements tombant sur le 280^e jour, mais ce nombre ne peut être admis, ni comme la durée normale, ni même comme la durée ordinaire de la grossesse, car des 114 accouchements notés par M. Merriman, 9 seulement sont tombés sur le 280^e jour en partant de celui qui a suivi les dernières menstrues. Le chiffre le plus élevé des accouchements correspondant à la même durée de 280 jours, mais en prenant d'autres jours de départ, n'est que de 8. S'il résulte donc clairement que, d'après les systèmes de supputation connus jusqu'ici, il ne peut être question d'un jour normal pour la fin de la grossesse; cela devient encore plus évident par les observations déjà connues et par celles que j'ai recueillies sur les animaux domestiques, dont le jour de l'impregnation est assez connu, mais dont l'époque du part n'est nullement constante. Chez les ânesses, par exemple, la fin de la gestation diffère d'un mois; chez les juments, de sept semaines; chez les brebis, la durée est déjà plus précise, il n'y a que des oscillations de huit jours.

• Il est facile de voir ce qui a fait admettre pour la durée de la grossesse

ce nombre de 280 jours, c'est qu'il embrasse dix périodes menstruelles qu'on supposait devoir être chacune, dans l'état normal, de 28 jours, ni plus ni moins. Mais, comme je l'ai déjà montré dans mon *Traité de Physiologie*, ces périodes sont, même dans les cas réguliers, soumises à des oscillations considérables, et le type de 28 jours n'est même pas le plus ordinaire.

» Les observations suivantes fourniront une autre base pour le calcul de la durée de la grossesse de la femme.

» *Première observation.* — Une femme de 28 ans accoucha le 3 juin, à onze heures du soir, ses menstrues avaient paru pour la dernière fois de l'année précédente le 17 août; auparavant, le 16 juillet, le 16 juin, le 17 mai, le 17 avril, le 16 mars, le 18 février, le 19 janvier, le 21 décembre, le 20 novembre, le 20 octobre. Ce cycle de 10 menstruations comprenait donc une période de 303 jours, si la durée de la grossesse y avait répondu, l'accouchement aurait dû tomber au 15 juin; mais comme il a eu lieu le 3 juin, c'est-à-dire le 291^e jour, la grossesse a été de 12 *jours* plus courte que la période des 10 menstruations précédentes. Cet accouchement aurait dû, selon l'une des méthodes de calcul dont nous avons parlé, avoir lieu le 24 mai, suivant l'autre, il serait tombé au 31 du même mois; suivant la troisième, enfin, il aurait dû survenir seulement le 10 juin.

» *Deuxième observation.* — La même femme accoucha trois ans plus tard, le 1^{er} juillet, à trois heures du soir, ses menstrues s'étaient montrées pour la dernière fois le 26 septembre de l'année précédente, et avant cela le 28 août, le 1^{er} août, le 2 juillet, le 3 juin, le 3 mai, le 5 avril, le 6 mars, le 6 février, le 8 janvier, le 9 décembre. Ce cycle de 10 menstruations embrassait donc un intervalle de 291 jours, mais la durée de la grossesse un espace de 279 jours; ainsi, 12 *jours de moins* que ce cycle. Cet accouchement aurait dû tomber, suivant les systèmes ordinaires de supputation, au 3, au 8 ou au 18 juillet.

» *Troisième observation.* — La même femme accoucha deux années et demie plus tard, le 30 janvier, à six heures du matin; ses menstrues s'étaient montrées l'année précédente pour la dernière fois le 20 avril, et auparavant, le 25 mars, le 25 février, le 25 janvier, le 23 décembre, le 22 novembre, le 22 octobre, le 24 septembre, le 23 août, le 23 juillet, le 26 juin. Ce cycle de 10 menstruations comprenait donc un espace de 298 jours, la grossesse une durée de 286 jours; ainsi donc 12 *jours de moins*. D'après les supputations ordinaires, l'accouchement aurait dû avoir lieu le 25 janvier, ou le 2 février, ou le 9 février.

» *Quatrième observation.* — La même femme accoucha trois années plus

tard, le 19 avril, à quatre heures du matin; ses menstrues étaient venues pour la dernière fois le 7 juillet de l'année précédente; la dixième menstruation avant celle-ci s'était montrée le 9 septembre, ce qui fait un cycle de 301 jours; la grossesse a duré 287 jours après le 7 juillet; ainsi, 14 jours plus tôt que la durée de ce cycle (à proprement dire, ce ne sont que 13 jours, l'accouchement étant terminé à quatre heures du matin).

» *Cinquième observation.* — Une autre femme accoucha le 17 juillet, à cinq heures du soir; elle avait eu, pour la dernière fois, ses menstrues le 18 octobre de l'année précédente, et avant cela, le 20 septembre, le 21 août, le 24 juillet, le 26 juin, le 26 mai, le 28 avril, le 1^{er} avril, le 4 mars, le 3 février, le 6 janvier. Ce cycle menstruel montait donc à 285 jours; l'accouchement arriva le 273^e jour (du 18 octobre au 17 juillet), ainsi 12 jours plus tôt que ne comporte le cycle menstruel. Suivant les calculs ordinaires, cet accouchement aurait dû tomber ou au 25 juillet, ou au 1^{er} août, ou au 11 août.

» *Sixième observation.* — La même femme accoucha trois ans plus tard, le 25 novembre, à neuf heures du soir; ses menstrues avaient paru, la dernière fois, le 15 février précédent, et avant cela, le 17 janvier, le 16 décembre, le 18 novembre, le 20 octobre, le 20 septembre, le 23 août, le 24 juillet, le 23 juin, le 25 mai, le 26 avril; cette période menstruelle était donc de 295 jours: la délivrance suivit de 284 jours l'apparition des dernières menstrues, ainsi 11 jours plus tôt que n'embrassait ce cycle menstruel. D'après les calculs ordinaires, cette femme aurait dû accoucher le 22 novembre, ou le 6 décembre, ou le 28 novembre.

» *Septième observation.* — Une autre femme accoucha le 22 mai, à cinq heures du matin; ses menstrues s'étaient montrées, pour la dernière fois, le 5 août de l'année précédente, et avant cela, le 7 juillet, le 6 juin, le 7 mai, le 5 avril, le 8 mars, le 7 février, le 8 janvier, le 7 décembre, le 7 novembre, le 6 octobre. Ce cycle de 10 menstruations renfermait donc 303 jours: l'accouchement arriva le 290^e jour après la dernière apparition des menstrues, ainsi 13 jours plus tôt que ne contenait ce cycle menstruel. D'après les principes ordinaires, cet accouchement aurait dû tomber au 12, ou au 16, ou au 29 mai.

» De ces observations je déduis les conséquences suivantes:

» 1^o. L'accouchement est, comme d'autres aussi l'ont déjà prouvé, en rapport avec le retour des menstrues après qu'elles ont manqué neuf fois.

» 2^o. L'accouchement n'a pas lieu à l'époque où les menstrues, qui ont disparu pendant la grossesse, devraient revenir pour la dixième fois, et apparaître réellement, mais au contraire.

» 3°. L'accouchement a lieu quand l'ovaire se prépare à la dixième menstruation..., il a donc lieu avant le retour de la dixième période menstruelle

» 4°. De même que les périodes menstruelles dans les divers individus en general, mais même dans les mêmes individus aux divers âges de la vie, suivant les autres conditions générales de leur organisation, sont soumises à des variations sensibles, ainsi la durée de la grossesse, répondant aux mêmes conditions, peut aussi varier, mais toujours en se réglant sur le cycle menstruel.

» 5°. On peut donc, dans les cas particuliers, calculer la durée de la grossesse d'après celle du cycle menstruel.

» 6°. Mais, pour cette supputation, la connaissance d'une simple période menstruelle ne suffit pas, il faut encore connaître le cycle des 10 menstruations qui ont précédé la grossesse, parce que, même chez les femmes les plus régulièrement menstruées, il y a, d'un mois à l'autre, de fréquentes variations d'un jour ou même de plusieurs.

» 7°. Mais des que les époques menstruelles varient, une faible variation de quelques jours peut aussi avoir lieu dans les rapports des deux cycles de 10 menstruations chacun, et par là aussi une différence de quelques jours entre le cycle des 10 menstruations qui ont précédé la grossesse, et la durée de la grossesse elle-même, ce qui fait que celle-ci peut être un peu prolongée ou raccourcie

» 8°. Pour fixer d'avance, avec la plus grande vraisemblance pour les femmes à menstrues régulières, l'époque normale de l'accouchement, il faut compter pour la grossesse autant de jours que pour le cycle connu des 10 menstruations précédentes.

» En déduisant de cette durée, selon qu'elle est plus grande ou plus petite, un nombre de jours qui varie de 11 à 14, ou, l'un portant l'autre 12 jours, on trouve, dans les cas réguliers, le moment de l'accouchement, soit que ce moment reste de beaucoup en arrière des soi-disant et indéterminés 280 jours de grossesse, soit qu'il les devance de beaucoup.

» 9°. D'après les observations ci-dessus, le terme normal des sept accouchements, avec un cycle de 10 menstruations successives de 285 à 305 jours et avec une grossesse de 273 à 291 jours, ne varie pas du tout ou tout au plus de 4 jours; tandis que, d'après le système ordinaire de supputation, la durée de la grossesse, dans ces sept cas, varierait en général de 35 jours, et, d'après chacun de ces systèmes en particulier, de 25, de 20 ou de 18 jours.

» 10°. Les neuf propositions précédentes ne trouvent leur application que pour les femmes à menstrues régulières.

* 11° L'idée d'accouchement prématuré, d'accouchement a point et d'accouchement tardif est tres-relative, et, dans les cas spéciaux, ne puise son importance que dans le rapport des cycles individuels de menstruation

GÉOLOGIE — *Sur quelques poissons fossiles de la province de Ceara, au Brésil* (Extrait d'une Lettre de M F CHABRILLAC à M Élie de Beaumont)

Pernambouc le 6 novembre 1872

Je prends la liberté de vous envoyer quelques échantillons de poissons fossiles trouvés dans une localité de la province de Ceara En arrivant a Pernambuco, j'entendis parler de ces débris d'animaux, et j'eus le plus vif désir de me transporter sur les lieux memes Une distance de 800 kilometres à franchir avec des dangers sans nombre, pour un Européen qui ne connaît pas encore la langue du pays, s'étant opposée a mon voyage, j'ai employé le seul moyen qui était en mon pouvoir, celui de l'argent, et j'ai eu un commencement de réussite Je vous envoie ce que j'ai obtenu les gens du pays n'apportent aucun discernement dans le choix qu'ils font des échantillons et ne sont pas capables de donner les moindres enseignements, aussi je me propose de faire moi-même le voyage l'hiver prochain, seule saison où l'on puisse l'entreprendre avec moins de difficulté.

(N B La province de Ceara se trouve au nord-ouest de Pernambuco entre les troisième et huitième parallèles de latitude australe) »

GÉOLOGIE — *Sur quelques poissons fossiles du Brésil* (Lettre de M AGASSIZ a M Élie de Beaumont)

Les poissons fossiles que M Chabrilac vous a adressés de Pernambuco et que vous avez bien voulu me confier pour les déterminer, m'ont offert des termes de comparaison si intéressants, que j'ai cru devoir les étudier d'une manière complète avant de vous faire part de mes observations Je ne me souviens pas d'avoir examiné une collection qui ait plus vivement piqué ma curiosité, non pas précisément par la variété des espèces qu'elle renferme, puisqu'il n'y en a que quatre, mais par la nature des considérations que j'ai pu y rattacher

» Il paraît qu'il existe dans l'Amérique du Sud de vastes dépôts contenant les mêmes espèces de poissons fossiles, c'est, du moins, la quatrième fois que j'ai entre les mains des poissons de cette partie du monde, qui me paraissent tous provenir du même terrain Cependant il serait aussi possible que de dif-

ferents points de ce continent on eût rapporté en Europe, a différentes reprises, des exemplaires de ces fossiles provenant d'une même localité, sur laquelle M Chabrilac sera probablement le premier a nous donner des renseignements précis. Quoi qu'il en soit, j'ai reconnu l'une de vos especes dans une figure publiée par Spix, dans l'atlas du voyage qu'il a fait au Brésil avec M Martius, de 1817 à 1821, et dont j'ai vu de mauvais exemplaires en 1828, au musée de Munich. Dix ans plus tard M Nicolet, de la Chaux de Fonds, m'a communiqué quelques fragments de poissons fossiles qu'il avait reçus de Pernambuco, qui appartiennent a une seconde de vos especes. Plus tard encore, en 1840, j'ai eu occasion d'examiner, à Glasgow, d'assez nombreux exemplaires de différents poissons fossiles rapportés par M Gardner de la province de Ceara au Brésil, et qui se trouvent maintenant disséminés dans les collections de M Bowman, du marquis de Northampton, de lord Enniskillen et de sir Philippe Egerton. Ce sont les memes especes que celles que M Chabrilac vous a envoyées. Pour fixer définitivement l'age géologique de cette faune ichthyologique, il serait indispensable d'obtenir de M Chabrilac de plus amples détails sur le gisement de ces poissons et des exemplaires des autres fossiles que l'on trouve associés avec eux. En attendant, je n'hésite cependant pas à les rapporter à la formation crétacée, pour les raisons que je développerai plus bas, et si ce résultat est confirmé par des découvertes ultérieures, comme je n'en doute pas, il vous prouvera quelle importance l'étude des poissons fossiles peut avoir pour la détermination de l'age relatif des terrains stratifiés. En effet, aucune des especes de l'Amérique du Sud que j'ai examinées n'a été trouvée jusqu'ici ailleurs, et c'est uniquement d'après les particularités de leur organisation que j'ai osé fixer leur age géologique. Mais aussi c'est la classe des poissons qui nous a offert jusqu'ici le développement génétique le plus facile a saisir dans ses détails. Chez ces animaux, la succession des especes se trouve constamment, dans toute la série des terrains, en rapport direct avec leurs affinités zoologiques, si bien que telle modification dans l'organisation d'une famille est toujours circonscrite dans une série déterminée de terrains et combinée avec des modifications analogues dans l'organisation d'autres familles, et comme dans diverses familles, ces modifications s'étendent à des époques plus ou moins longues, il en résulte que l'on peut déterminer avec précision l'age géologique de tout terrain qui renferme quelques especes de poissons de différentes familles, alors même que ces especes seraient entièrement nouvelles et n'auraient point encore été observées dans des terrains dont l'horizon géologique serait connu. Dans plus d'une occasion déjà, j'ai pu déterminer l'age géologique de

terains douteux, uniquement d'après les poissons qu'ils renferment, et *vice versa*, désigner les particularités d'organisation qui offriraient les poissons de terrains bien déterminés dans lesquels on n'avait pas encore trouvé d'espèces de cette classe. En considérant ainsi l'organisation même d'une classe d'animaux comme caractéristique des époques géologiques, ou en d'autres termes, en substituant les phases de son développement génétique aux caractères distinctifs des espèces dans cette appréciation, j'ai introduit un élément nouveau dans la paléontologie qui nous conduira probablement un jour à saisir l'enchaînement général des êtres dans l'ensemble du plan de la création.

Les détails dans lesquels je vais entrer sur les espèces que vous avez soumises à mon examen vous prouveront, je crois, que cet espoir n'est point chimérique.

Le plus remarquable des poissons de la collection de M. Chabrilac est un *Aspidorhynchus*, auquel j'ai donné le nom d'*A. Comptoni*. C'est une espèce de grande taille, dont les dimensions paraissent excéder celles de toutes les autres espèces du genre. Un de vos fragments a 1 décimètre de large, et comme dans ce genre la largeur totale est généralement à la longueur comme 1 à 10, on peut en conclure que ce poisson atteignait 1 mètre de longueur. Ce qui distingue notre espèce de ses congénères c'est que la rangée médiane des écailles est de beaucoup la plus large, elle recouvre à elle seule la moitié de la largeur du corps. N'ayant examiné que des tronçons du corps de ce poisson je n'ai pu compter le nombre des rangées d'écailles qu'il y avait dans toute la longueur du poisson, mais en combinant leur fréquence sur un fragment où elles sont bien conservées, je suppose qu'il y en avait de quatre-vingts à quatre-vingt-dix. Au-dessous de la rangée principale, on remarque une seconde rangée d'écailles moins hautes qui ont à peu près le tiers de la hauteur des plus grandes. Au bord du dos et sous le ventre, elles sont aussi longues et même plus longues que hautes. Les ornements de la surface des écailles distinguent aussi particulièrement notre espèce. Au lieu de présenter des faisceaux de rides rayonnant vers le bord des écailles, comme c'est le cas de la plupart des espèces, on ne remarque ici qu'un réseau irrégulier de mailles saillantes. Les os de la tête montrent aussi des traces d'une semblable reticulation, mais dans aucun des fragments ils ne sont assez bien conservés pour pouvoir être étudiés en détail. Comme chez tous les *aspidorhynques*, les rayons des nageoires sont courts et simplement ramifiés.

Le genre *Aspidorhynchus* fait partie de la famille des *sautoides*, de

l'ordre des ganoides. Les sauroides sont des poissons très-curieux. Ils remplacent dans les époques géologiques les plus anciennes, les grands animaux voraces des formations géologiques plus récentes. Précurseurs des reptiles et en particulier des sauriens, qui sont les plus anciens représentants de cette classe, ils participent, par leur organisation, des caractères de la classe des reptiles et de celle des poissons, comme plus tard les ichthyosaures annoncent les cetacés carnivores, et les mégalosauriens les grands pachydermes. Les sauroides ne sont cependant pas tous moulés d'après le même type, je distingue plusieurs groupes dans cette famille, qui sont chacun caractéristiques d'une époque géologique. Les *Sauroides labyrinthodontiques*, qui se rapprochent le plus des vrais sturioniens, sont exclusivement propres aux terrains de transition, les *Sauroides pygapteriens* caractérisent les terrains houillers et triasiques, les *Sauroides homocerques* n'apparaissent qu'avec le lias, et se perpétuent jusque dans la craie, enfin les *Sauroides rostrés*, auxquels le genre *Aspidorynchus* appartient, ne remontent pas au delà des terrains jurassiques mais ils continuent à exister jusqu'à nos jours. La présence d'un *Aspidorynchus* dans le terrain d'où proviennent nos fossiles serait ainsi un premier indice pour le ranger dans la série des terrains secondaires les plus récents ou parmi les terrains tertiaires. Mais comme le genre *Aspidorynchus* n'a pas de représentant dans l'époque actuelle, tandis que la plupart des genres tertiaires reparait dans la création actuelle, nous pourrions déjà, par la présence de ce seul fossile, pencher pour la première alternative.

Cette espèce n'est pas la seule de l'ordre des ganoides que je connaisse de l'Amérique du Sud. M. Gardner en a envoyé un fragment d'une seconde à M. Bowman, qui appartient au genre *Lepidotus*, de la famille des lépidoides. Comme elle ne se trouve pas dans la collection que vous m'avez confiée, je ne m'étendrai pas sur ses caractères spécifiques. Il suffira de l'appeler qu'elle se distingue des espèces déjà connues par sa caudale plus fortement échancrée et par des rayons articulés de très-pres. J'ai donné à cette espèce le nom de *L. lemruus*. Le genre *Lepidotus* est caractéristique des terrains jurassiques, dans lesquels on en trouve vingt-deux espèces, tandis que je n'en connais que cinq des terrains crétacés, et une des terrains tertiaires. Il n'existe point dans la création actuelle. L'espèce du Brésil laisserait donc pour la détermination de l'âge géologique du terrain dont elle provient, la même latitude que l'*Aspidorynchus* dont nous venons de nous occuper, tandis que l'examen des espèces qu'il me reste encore à décrire a levé toute espèce de doute à cet égard dans mon esprit.

• L'ordre des cténoïdes et celui des cycloïdes, qui comprennent la très-grande majorité des poissons vivants, n'ont eu, l'un et l'autre, des représentants qu'à partir de l'époque de la déposition des terrains crétacés. Je n'en connais aucune espèce plus ancienne, en sorte que des fossiles de ces ordres indiquent nécessairement une origine crétacée ou tertiaire. Or, parmi les quatre espèces de Pernambouc que vous m'avez adressées, il y a un cténoïde et un cycloïde, et, ce qui est plus piquant encore, c'est que le cténoïde rentre par ses caractères dans un groupe de cet ordre dont tous les représentants que je connais viennent des terrains crétacés. En effet, les cténoïdes de la craie appartiennent presque tous à la famille des percoides dans sa circonscription la plus générale, et dans cette famille nous avons trois groupes distincts. Le premier type comprend ceux qui se rapprochent du genre *Beryx*, et qui ont les rayons épineux de la dorsale réunis en une seule nageoire avec les rayons mous, et les ventrales composées de plus de cinq rayons mous et placées en arrière des pectorales. Ces espèces sont toutes de la craie et de Mont-Bolca, et votre cténoïde fait partie d'un genre encore inédit de ce groupe, auquel j'ai donné le nom de *Rhacolepis*. Les deux autres types de percoides, les percoides proprement dits à deux dorsales et à ventrales thoraciques, et les *Serrans* à dorsales continues et à ventrales également thoraciques, ne remontent pas au delà des schistes de Mont-Bolca et des terrains tertiaires proprement dits, tandis qu'ils prédominent dans la création actuelle. Le genre *Rhacolepis*, en particulier, se distingue essentiellement par sa petite dorsale très-éloignée de la nuque, ses écailles sont denticulées au bord postérieur et lobées au bord antérieur, son museau est pointu, sa gueule très-fendue et armée de petites dents coniques. L'espèce de M. Chabrilac est fusiforme, à peu près de la taille et de la forme de la perche de mer (*Serranus scriba*). Je l'ai nommée *R. burcalis*, pour mettre en saillie son caractère distinctif qui consiste dans des sous-orbitales de même dimension et de même forme. J'en connais d'autres exemplaires envoyés par M. Bowman à M. Gardner, qui m'ont offert cette particularité extraordinaire et bien inattendue, de présenter une partie des muscles dans un état parfait de conservation. Longtemps j'ai douté de la vérité de ce fait, qui me paraissait inconcevable, de la conservation de la chair d'un poisson fossile de l'époque crétacée, mais l'examen microscopique le plus attentif n'a fait que confirmer ce que la première inspection m'avait fait soupçonner. Je vous envoie un dessin de ce fossile, afin que vous puissiez le soumettre à l'Académie. La *fig. 1* représente ce fossile de grandeur naturelle, tandis que la *fig. 2* montre plusieurs faisceaux du grand muscle latéral faiblement grossis. On y distingue également les lames tendineuses

qui séparent les faisceaux musculaires, et les fibres musculaires elles-mêmes qui composent ces faisceaux. La masse qui recouvre en partie les apophyses épineuses du dos avec leurs arêtes musculaires ainsi que les côtes, est à l'état de carbonate de chaux, et d'une apparence blanchâtre et crayeuse. Ce fait nous permet d'espérer que tôt ou tard on pourra recueillir des observations très-précises sur les parties molles d'animaux fossiles dont on n'a pu étudier jusqu'ici que les parties solides. Déjà j'ai pu observer la forme du canal intestinal de divers poissons, entre autres des genres *Leptolepis*, *Thrissops* et *Macropoma*, des terrains jurassiques et crétacés. J'ai même distingué l'emplacement du foie dans un très-grand nombre de *Ichthys*, et dans un mugil des terrains tertiaires. Il suffira d'avoir fixé l'attention sur ces faits pour que les observations se multiplient rapidement. Il importerait de les signaler à M. Charbillat afin qu'il ne négligeât pas les exemplaires qui pourraient offrir quelque chose de semblable, alors même qu'ils seraient moins bien conservés que les autres. C'est au genre *Rhacolepis* qu'appartient l'espèce figurée par Spix; elle est plus large que la nôtre; ses écailles sont plus grandes, et le second sous-orbitaire est plus étroit que les autres. Je l'ai appelée *R. Olfersi*. J'en connais une troisième espèce, recueillie par M. Gardner, qui est plus large encore et dont le troisième sous-orbitaire est très-élevé, je l'ai appelée *R. latus*.

« C'est avec doute que je rapporte à la famille des mugiloides un fragment de votre collection identique avec un fragment tout semblable de la collection de M. Gardner, qui se distingue de tous les poissons que je connais par le long tube étroit des écailles de la ligne latérale et par l'uniformité de ses écailles rondes. J'ai inscrit cette espèce dans mes notes, sous le nom de *Calamopleurus cylindricus*, mais les fragments que j'en connais sont trop incomplets pour permettre des deductions de quelque valeur.

Il n'en est pas de même d'un autre grand poisson de l'ordre des cycloïdes, dont vous m'avez envoyé plusieurs beaux fragments qui m'ont servi à compléter les caractères de cette espèce que j'avais déjà reconnue dans la collection de M. Gardner. Ce fossile constitue un genre à part, caractérisé par de très grandes écailles, dont la face visible extérieurement est granulée, tandis que la partie cachée par l'imbrication est marquée de profonds sillons disposés en éventail. La ligne latérale est percée d'un tube simple dans sa partie cachée, mais qui se ramifie dans la partie visible de l'écaille, de la même manière que chez les scarés. Les écailles sont si grandes, qu'on n'en distingue que sept à huit rangées sur tout le corps, trois au-dessus de la ligne latérale, celle de la ligne latérale et trois ou quatre au-dessous. La charpente osseuse

de ce poisson est très-vigoureuse, les corps de vertèbres sont aussi larges que longs, creusés en avant et en arrière de cônes articulaires d'égale dimension qui se rencontrent au milieu de la vertèbre par leurs sommets. Les apophyses supérieures des vertèbres sont très-grosses et droites. L'humérus forme une saillie osseuse triangulaire au dessus de l'insertion des pectorales, qui sont formées de gros rayons, tandis que les rayons de la dorsale et de l'anale sont beaucoup plus faibles et plus courts. Je n'ai pu observer ni la caudale ni les ventrales. La tête n'est pas non plus bien conservée, cependant on y distingue un large opercule et un preopercule dont la branche horizontale est plus large que la branche verticale. Ces pièces ressemblent un peu à ce que l'on observe dans le genre *Halec* dont notre poisson paraît se rapprocher. Cependant, n'ayant pu examiner la position des ventrales, il me reste des doutes sur la position systématique qu'il faudra assigner à ce genre. À certains égards il se rapproche des *sphyrenes*, tandis qu'à d'autres il se rapproche davantage des *halécoides*. Les particularités des écailles m'ont engagé à en faire un genre à part, sous le nom de *Cladocyclus*. J'ai inscrit l'espèce du Brésil, dans mes Notes, sous le nom de *C. Gardineri*. J'en connais une seconde de la craie de l'ewes, dont les écailles sont plus hautes (Comparez, *Recherches sur les poissons fossiles*, vol V, p 103)

En résumé, vous voyez qu'en combinant tous les renseignements que j'ai pu recueilli sur ces poissons du Brésil, j'y ai reconnu sept espèces, dont deux ganoides, trois ctenoides, un cycloïde et un genre douteux (1). Toutes ces espèces appartiennent à des genres qui n'existent plus, aucun de ces genres n'a de représentants dans les terrains tertiaires, tandis que le genre *Cladocyclus* compte une espèce de la craie blanche, et que le genre *Rhacolepis* tout entier se rapproche des percoides de la craie. Tous les ctenoides et les cycloïdes étant postérieurs aux terrains jurassiques, la position du gîte de ces fossiles ne saurait, des lors, paraître douteuse, c'est à la craie qu'il faut les rapporter, et, malgré le petit nombre des espèces, vous pourrez voir, en consultant mon tableau général des poissons fossiles, que la proportion de gi

(1) *Aspidorhynchus Comptoni*, Ag. Sauruide

Lepidodus lemnurus, Ag. Lepidoïde

Rhacolepis buccalis, Ag. }

Rhacolepis Olfersii, Ag. } Ctenoides

Rhacolepis latus, Ag. }

Cladocyclus Gardineri, Ag. Cycloïde

Calamopleurus cylindricus, Ag. Famille douteuse

noides, de cténoides et de cycloïdes que l'on trouve réunis au Brésil, est à peu près la même que celle des espèces des terrains crétacés en général, et que les genres *Rhacolepis* et *Cladocycclus*, par leurs caractères particuliers, font décidément pencher la balance pour les terrains crétacés moyens. En général, tout assemblage de placoides, de ganoides de cténoides et de cycloïdes, ne renfermant que des genres entièrement éteints, me paraît devoir être considéré comme appartenant à l'époque crétacée. C'est du moins ce que j'ai remarqué jusqu'ici dans tous les terrains de cette grande époque. Il est vrai que nous ne connaissons pas de placoides du Brésil, mais les trois autres ordres sont dans les conditions ordinaires des combinaisons qu'offrent les poissons des terrains crétacés.

A cette occasion, permettez-moi de vous rappeler quelques résultats généraux de mes recherches sur les poissons fossiles que j'ai consignés dans mes descriptions du squelette de ces animaux, dans le premier volume de mes *Recherches*, et qui pourraient passer inaperçus par les géologues s'ils n'étaient relevés d'une manière particulière. Je veux parler des rapports qui existent entre les particularités de forme et de structure des poissons fossiles les plus anciens, et les modifications que subissent les embryons des poissons vivants dans les diverses phases de leur développement organique. Ces rapports sont si frappants et si nombreux, qu'on pourrait les considérer comme une démonstration de cette idée si souvent mise en avant et qui n'a cependant jamais été prouvée de fait, savoir, que le développement individuel répète dans certaines limites les degrés d'organisation d'une classe tout entière, de la même manière que nous avons vu au commencement de cette Notice, les divers types de poissons fossiles cadrer dans leur succession avec l'ordre systématique que leur assignent leurs affinités naturelles.

Dans l'étude de chaque classe il faut en effet distinguer trois séries de faits indépendants, que l'on n'a pas toujours su analyser convenablement, savoir : 1^o le développement individuel ou les métamorphoses que les individus de chaque espèce subissent dans leur accroissement et qui sont l'objet de l'embryologie ; 2^o la gradation des espèces d'après leurs affinités naturelles dont s'occupe l'histoire naturelle systématique, et 3^o la succession des espèces dans l'ordre des temps, qui caractérise l'histoire des formations géologiques. Lorsqu'on considère le règne animal tout entier, il faut encore distinguer les rapports primitifs des classes entre elles. Dans mes recherches sur les poissons fossiles j'ai toujours eu égard à ces divers points de vue, j'ai même démontré que le développement individuel des poissons en général, la gradation des espèces dans la classe entière et leur succession dans la série des

temps, présentent l'analogie la plus remarquable dans leurs traits essentiels. Cette coïncidence est même telle, que non-seulement les premières phases du développement embryologique appellent les caractères distinctifs de l'organisation des ordres inférieurs de la classe, mais encore que ces caractères sont ceux qui frappent le plus dans les poissons fossiles les plus anciens et qui leur donnent leur aspect particulier. Pour ne citer que quelques faits, je rappellerai que les embryons des poissons n'ont pas de colonne vertébrale, mais seulement une corde dorsale cartilagineuse que leur queue ne se termine pas d'une manière symétrique, mais que le lobe supérieur se prolonge au delà de l'inférieur, enfin que leur bouche est tournée en bas et soulevée en dessous du rostre. Or ce sont justement ces caractères qui distinguent nos poissons cartilagineux, et ce qu'il y a de plus surprenant encore, c'est que ces mêmes caractères se retrouvent chez tous les poissons fossiles antérieurs aux terrains jurassiques, et cela non seulement chez les poissons cartilagineux, mais même chez les poissons osseux qui, dans ces temps reculés, ont tous la queue asymétrique, et au lieu de colonne vertébrale articulée, une corde dorsale cartilagineuse comme les embryons de nos poissons osseux. Les tableaux que j'ai donnés du développement des différentes parties du squelette dans le premier volume de mes *Recherches*, les analogies que j'ai signalées entre leur gradation et la classification naturelle des poissons que j'ai proposée et la succession des espèces dans la série des terrains, mettent ce résultat en relief de la manière la plus complète.

Quant aux rapports primitifs des classes du règne animal entre elles, j'ai en outre fait voir que la série des vertébrés offre seule une gradation organique de ses principaux types, à partir des poissons jusqu'aux mammifères et à l'homme, en rapport avec leur ordre de succession dans les terrains, tandis que toutes les classes d'animaux sans vertébrés sont contemporaines, c'est-à-dire qu'elles remontent toutes aux époques géologiques les plus anciennes et parallèles dans la gradation de leur organisation, c'est-à-dire qu'elles ne sauraient être rangées en une série progressive, comme les vertébrés. Je crois dès lors que l'étude des poissons tant fossiles que vivants fera faire à la zoologie et à la paléontologie en général les progrès les plus importants, en fixant définitivement une foule de rapports essentiels qui sont plus masqués dans d'autres classes, soit que leur organisation plus compliquée se trouve plus difficile à analyser dans sa signification philosophique, soit que ces classes ne parcourent pas toute la série des formations géologiques, et ne puissent par conséquent pas nous révéler le sens de la succession des animaux en général.

CHIMIE — *Note sur un nouvel alcali organique, par M A LAURENT*

J'ai eu l'honneur d'adresser à l'Académie, il y a quelques mois, un Mémoire sur les produits de distillation des composés azotés et sulfurés de la série benzoïque

Je viens seulement de m'apercevoir que l'un de ces produits, le lophyle, est un nouvel alcali susceptible de se combiner avec la plupart des acides cristallisables

Sa composition doit se représenter par $C^{11}H^{14}Az^1 = Lp$

Cet alcali, que je nommerai *lophine*, offre quelques particularités assez remarquables. Ainsi il n'est pas oxydé et il renferme 4 atomes d'azote c'est de toutes les bases connues celle dont le poids atomique est le plus fort, et néanmoins il peut distiller, sans se décomposer, à une température très-élevée. Ses sels sont solubles dans l'alcool, mais insolubles dans l'eau

La formule du chlorure est	$HCl^1 + Lp$,
celle du chloro platinate	$(H^1Cl^1 + Lp) + (Cl Pt)$
celle du nitrate	Az^1O^1, H^1O, Lp

Il se compose que j'ai désigné sous le nom d'*amaryle* n'est que du nitrate lophique impur

En distillant l'azotide benzoïque, on obtient de la lophine et une nouvelle substance que je nommerai *amarone*. Elle cristallise en aiguilles, et elle n'est décomposée ni par les acides nitrique et sulfurique, ni par les alcalis, seulement elle forme avec l'acide sulfurique une dissolution d'une magnifique couleur rouge. Une goutte d'eau la détruit subitement en en précipitant l'amarone. La formule de celle-ci est $C^{11}H^{13}Az^1$

ZOOLOGIE — *Remarques relatives à une réclamation adressée par M Mandl à l'occasion de quelques observations sur les zoospermes* (Extrait d'une Lettre de M POUCHET à M Flourens)

Dans la Note que j'ai eu l'honneur de présenter, je n'ai point eu la prétention de me donner comme ayant découvert l'épithélium des zoospermes, j'ai voulu seulement en démontrer d'une manière incontestable l'existence et les rapports

Il est si peu entré dans ma pensée de m'attribuer les découvertes des micrographes qui m'ont devancé, que j'ai mentionné, à l'appui de mes opinions, celles de plus de vingt d'entre eux. La Commission pourra reconnaître

que, dans mon Memoire j'ai rendu un juste hommage aux travaux de MM Mandl et Dujardin qui ont represente cet épithelium Nous differons seulement entre nous relativement à la signification de cet organe

Pour l'incubation et l'enroulement de quelques zoospermes capillaires je n'ignorais pas non plus ce qui avait été fait avant moi, et j'ai même rappele dans mon travail, l'enroulement de ceux d'une espece de *Brachinus* bien figure dans l'ouvrage de M Dujardin Mais ce que je crois avoir signale le premier, dans le plus grand detail, c'est le singulier et graduel enroulement des zoospermes de la grenouille, puis le globule remarquable qui pendant un certain temps est suspendu a leur queue.

M CORNAY adresse un *paquet cachete*

I Académie en accepte le dépôt

La seance est levée à 5 heures et un quart

F

BULLETIN BIBLIOGRAPHIQUE

L'Académie a reçu dans cette séance les ouvrages dont voici les titres

- Comptes rendus hebdomadaires des séances de l'Académie royale des Sciences*
1^{er} semestre 1844 in 21 in-4°
- Comptes rendus hebdomadaires des séances de l'Académie royale des Sciences*
— *Tables du 2^e semestre* 1843
- Annales de la Chirurgie française et étrangère* mai 1844 in-8°
- Grammaire et Dictionnaire des régies de la langue hébreue composées par feu*
VENTURÉ DE PARADIS, sous par M. A. JAUBERT, et publiées par la Société de
Géographie Paris, 1844, in-4
- Annales de la Société royale d'Horticulture de Paris* avril 1844, in-8
- Annales forestières* tomes I et II, années 1842 et 1843 et janvier 1 mai
1844 in 8°
- Histoire de la Chumie depuis les temps les plus reculés jusqu'à notre époque* par
M. FERD. HOEFER 2 vol in 8
- Notice sur la destruction des Roses naissantes par la larve d'une mouche* a paru
par M. MÉRAT broch in 8°
- Notice sur quelques Coquilles de la famille des Ammonidées recueillies dans*
le terrain jurassique des Deux-Sevres, par MM. BAUGILH et SAUZÉ Niort bro-
chure in 8°
- Bulletin de la Société industrielle de Mulhouse* nos 84 et 85 in 8°
- Théorie de l'Œil* par M. VALLEL, 3^e livr in-8°
- Observations sur les grels tombés en 1840 dans les États de terre ferme de*
S. M. le roi de Sardaigne d'après les renseignements recueillis par la Commission
supérieure de Statistique par M. DESPINS broch in 4°
- Dernière conversation du roi CHARLES-JEAN avec M. F. STURMER* in-8
- Journal de Chirurgie* par M. MILGAIGNÉ, mai 1844, in-8°
- Journal des Connaissances médicales pratiques* mai 1844, in-8°
- Bulletin de la Société industrielle d'Angers et du département de Maine et*
Loire, nos 1, 2 et 3 15^e année, in 8°
- Académie royale de Bruxelles* — *Bulletin des Séances* tome X nos 9 à 12,
et tome XI, nos 1 à 3, in 8°
- Annuaire de l'Observatoire royal de Bruxelles*, par M. QUETLET, 1844, 11^e
année Bruxelles, 1843 in-12

Annuaire de l'Académie royale des Sciences et Belles-Lettres de Bruxelles, 10^e année. Bruxelles, 1844, in-12

Sur le Recensement de la population de Bruxelles en 1842; par M. A. QUET-TELET, in-4°

Sur la Répartition du Contingent des communes dans les levées de la Milice, par le même, in-4°

Notice sur ALEXIS BOUVARD, par le même, in-8°

Analyse des Eaux minérales de Spa, faite sur les lieux, pendant l'été de l'année 1830, par M. J. PLATEAU. Bruxelles, 1844, in-8°

Académie royale des Sciences et Belles-Lettres de Bruxelles — Instructions pour l'observation des Phénomènes périodiques, broch. in-4°.

Cours élémentaire de Chimie générale, inorganique, théorique et pratique, à l'usage des Universités et Écoles industrielles, par M. LOUYET, tome II, feuilles 31 à 66. Bruxelles, 1844, in-8°

Bulletin du Musée de l'Industrie, par M. JORARD, année 1844, 1^{re} livraison. Bruxelles, in-8°

Astronomische . . . Nouvelles astronomiques de M. SCHUMACHER n° 504, in-4°

Flora Sardoæ, seu Historia Plantarum in Sardinia et adjacentibus Insulis, vel sponte nascentium, vel ad utilitatem latius exarillarum, auctore JOSEPHO-HYACINTHO MORIS, tome II. Turin, 1840-1843, in-4°

Del peso . . . Sur le poids absolu et relatif des Viscères dans les Animaux vertébrés, par M. BELINGERI. (Extrait du 1^{er} vol. des Actes de la Société médico-chirurgicale de Turin) Turin, 1844, in-4°.

Sullo spirito . . . Sur l'esprit des Sciences naturelles dans le siècle passé et dans le siècle présent, par M. P. PARLATORE. (Discours prononcé pour l'ouverture du Cours de Botanique) Florence, 1844, in-8°

Monografia . . . Monographie des Fumariées; par le même. Florence, 1844, broch. in-8°.

Giornale . . . Journal italien de Botanique, publié par le même, tome 1^{er}. janvier et février 1844, in-8°

Sulle funzioni . . . Sur les fonctions des Racines dans les végétaux, par M. A. BELLANI. (Extrait des tomes VII et VIII de l'Institut Lombard) Milan, 1843 in-8°.

Gazette médicale de Paris, n° 21, in-4°

L'Echo du Monde savant; n° 40.

Gazette des Hôpitaux; n° 59 à 61; in-fol

L'Expérience; n° 360; in-8°.

COMPTE RENDU

DES SÉANCES

DE L'ACADÉMIE DES SCIENCES.

SÉANCE DU LUNDI 3 JUIN 1844

PRÉSIDENCE DE M ÉLIE DE BEAUMONT

MEMOIRES ET COMMUNICATIONS

DES MEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE L'ACADÉMIE

ANALYSE MATHÉMATIQUE — *De la variation des constantes arbitraires, comme l'ont établie, dans sa généralité, les Mémoires de Lagrange du 22 août 1808 et du 13 mars 1809, et celui de Poisson du 16 octobre suivant, par M FRED MAURICE*

La considération de la variation des éléments des orbites planétaires fut d'abord employée par Euler, dans ses travaux sur la théorie de la Lune et sur celle des planètes. Plus tard, Lagrange la fit remonter d'une manière plus générale à la variation des arbitraires entrant dans les intégrales premières des orbites regardées d'abord comme elliptiques, mais ce ne fut qu'en 1808, après un beau théorème démontré par Poisson, et qui réveilla, pour ainsi dire, le génie de Lagrange, que cet homme illustre éleva cette théorie à toute sa généralité.

Un des résultats les plus importants auxquels il parvint alors lui permit de s'assurer que dans les expressions générales et symétriques des différentielles des six éléments regardés comme les arbitraires de la question, expressions où l'on voit chaque terme affecté d'une dérivée partielle de la fonction

perturbatrice par rapport à chacun de ces éléments, à l'exception toutefois de celui dont la différentielle est alors considérée, tous les coefficients de ces dérivées devaient être absolument indépendants du temps. Tel fut le mémorable résultat consigné et démontré pour la première fois dans le *Mémoire* lu par Lagrange à l'Académie le 22 août 1808 deux mois après celui où Poisson avait démontré l'invariabilité des moyens mouvements même en ayant égard au second ordre des masses.

Chacun de ces grands géomètres est revenu sur cette importante théorie qui, d'abord restreinte aux applications qu'on peut en faire au système du monde, fut ensuite transportée par Lagrange à tous les cas que peut présenter la mécanique rationnelle, et enfin rigoureusement établie, d'une manière directe, par Poisson, qui se montra son digne émule, en faisant voir de plus l'avantage qu'elle offrait, sous cette forme, pour l'étude des mouvements des corps célestes autour de leurs centres de gravité.

Mais dans aucun de ses écrits Lagrange n'a fait connaître par quelle voie il avait été conduit à pressentir la vérité du théorème principal de cette théorie nouvelle dont nous avons plus haut rapporté l'énoncé. Dès le début de son premier *Mémoire*, on le voit s'engager dans une série de calculs symétriques et élégants mais assez compliqués, qui peuvent fort bien convenir pour la *démonstration* d'une vérité connue, et qui semblent au contraire peu propres à la faire découvrir par celui qui n'en aurait aucune idée préalable.

Dès lors la curiosité des géomètres paraît s'être surtout concentrée sur la nouveauté comme sur la beauté des résultats, et l'on n'a rien écrit, à ma connaissance, sur l'histoire d'une découverte si remarquable. On aurait pu espérer que son illustre auteur, toujours si empressé à présenter l'analyse des idées importantes de ses prédécesseurs ou de ses émules, et de celles qui lui étaient propres se serait chargé lui-même d'exposer l'origine des considérations qui l'avaient dirigé mais cet espoir n'a été directement satisfait dans aucune de ses productions.

Cependant, après beaucoup de recherches à ce sujet, j'ai fini par remarquer un passage du tome II de la *Mécanique analytique*, où l'auteur met vraiment sur la voie des idées qui l'ont conduit. On lit en effet dans ce volume, aux pages 79 et 80, que dans le cas où les forces perturbatrices sont, comme dans la nature, exprimées par les différences partielles de la fonction perturbatrice générale, prises relativement aux trois coordonnées, « les » variations des éléments peuvent s'exprimer d'une manière plus simple, en » employant, au lieu de ces différences partielles, celles qui sont relatives » aux éléments, après que l'on a remplacé les coordonnées par leurs valeurs

en fonction du temps et de ces mêmes éléments, et que *c'est cette considération qui a fait naître la nouvelle théorie* de la variation des constantes arbitraires

On verra, j'espère, combien cette donnée est avantageuse pour faire retrouver une marche naturelle conduisant au grand résultat dont nous parlons. Le fil des idées se trouvera rétabli là où il semblait rompu jusqu'à présent.

• Un travail semblable et plus difficile suivra celui que nous venons d'annoncer, il se rapportera à cette théorie directe que donna Poisson en octobre 1800. Jusqu'ici, elle n'a été présentée que sous la forme d'une synthèse aussi savante que profonde, mais nous espérons montrer aussi comment elle se rattache naturellement à l'analyse lumineuse de Lagrange. Ce sera en quel que sorte le commentaire de cette phrase de la *Mécanique analytique* où l'auteur, parlant de la démonstration directe de Poisson, s'exprime ainsi :

On ne se serait peut-être jamais avisé de la chercher, si l'on n'avait été assuré d'avance de la vérité de ce théorème (tome II, p. 185).

Suivent les calculs qui paraîtront dans les *Mémoires de l'Académie*.

MEMOIRES LUS

CHIMIE — *Mémoire sur la butyryne*, par M. G. CHANCEL (Extrait)

(Commissaires, MM. Dumas, Pelouze, Regnault)

M. Chevreul est le premier chimiste qui ait soumis le butyrate de chaux à la distillation sèche. Il a signalé, entre autres produits, la formation d'une huile volatile aromatique, présentant une odeur analogue à l'huile essentielle des labiées. Mais, vu les faibles quantités de butyrate que la saponification du beurre permettait d'obtenir, cette huile n'a été le sujet d'aucune recherche.

Pendant, M. Iewig a émis une opinion relativement à la nature du produit qui se forme dans ces circonstances. D'après ce chimiste, la formule de l'acide butyrique anhydre serait égale à $C^4H^4O^2$; par la distillation des butyrates, il se formerait la *butyryne* qui aurait pour composition C^4H^4O . Cette formule de l'acide butyrique s'écarte d'abord de celle donnée par M. Chevreul, et elle devient tout à fait inadmissible depuis les dernières recherches de MM. Pelouze et Gélis. On verra, d'un autre côté, que la distillation d'un butyrate ne fournit, dans aucun cas, une substance dont la composition puisse être représentée par la formule C^4H^4O .

MM Pelonze et Gelis ayant mis à ma disposition une grande quantité de butyrate de chaux, j'ai entrepris l'étude des produits que fournit la distillation de ce composé, c'est la première partie de ces recherches que j'ai l'honneur de soumettre au jugement de l'Académie

Distillation sèche du butyrate de chaux

Le butyrate de chaux, soumis à l'action de la chaleur, offre un des exemples les plus simples des décompositions de ce genre. Si l'on chauffe avec précaution une petite quantité de ce sel pur et anhydre il ne tarde pas à se décomposer en acide carbonique qui reste uni à la chaux, et en une huile volatile qui passe à la distillation. Cette huile n'est autre chose que de la butyrone presque pure ou à peine colorée, le résidu consiste en carbonate de chaux pur et parfaitement blanc. En ayant soin de ne pas dépasser la température nécessaire à la formation de la butyrone, et en n'opérant que sur quelques grammes de matière, on n'obtient pas la moindre trace de dépôt charbonneux.

Il se plus fréquemment il ne se dégage pas de gaz, à moins que l'on n'élève trop la température, dans ce cas, la quantité de produits gazeux s'élève ordinairement à 3 ou 4 pour 100 du poids du butyrate. la majeure partie est formée d'hydrogène bicarbonate absorbable par l'acide sulfurique.

Dans aucun cas, et c'est là un fait digne de remarque, il ne se dégage la moindre trace d'eau si l'opération est faite sur du butyrate anhydre, et ce pendant la distillation des matières organiques, comme on le sait, entraîne presque toujours la formation d'une certaine quantité d'eau aux dépens des éléments de la matière organique elle-même.

Cependant, en distillant des quantités un peu considérables de matière l'opération est loin d'être aussi simple, dans ce cas, je n'ai pu éviter le dépôt d'une certaine proportion de charbon, et les produits liquides obtenus étaient toujours colorés assez fortement. ce qu'il faut attribuer probablement à la décomposition ultérieure d'une partie de la butyrone formée, par suite de la répartition inégale de la chaleur dans la masse. Aussi se forme-t-il, dans ce cas, un mélange de plusieurs substances liquides dans lesquelles, toutefois, la butyrone est le produit dominant.

Dans plusieurs distillations, 100 parties de butyrate de chaux anhydre ont donné de 42 à 43 parties de butyrone brute.

Butyrone

Lorsqu'on soumet à la distillation le liquide brut obtenu comme il vient

de ce dit, le point d'ébullition, d'abord au-dessous de 100 degrés, monte assez rapidement vers 140, on recueille à part le liquide qui passe entre 140 et 145 degrés et qui n'est autre chose que de la butyryone, les portions recueillies avant et après sont un mélange de butyryone et de deux substances particulières, l'une distillant au-dessous de 100 degrés, l'autre au dessus de 160 et sur lesquelles je me propose de revenir lorsque j'aurai pu me les procurer en quantité suffisante

La butyryone recueillie entre 140 et 145 degrés présente un point de bullition constant distillée une dernière fois on peut la considérer comme pure

Propriétés — C'est un liquide incolore et limpide possédant une odeur pénétrante et particulière sa saveur est brûlante sa densité est de 0.83 elle entre en ébullition à 144 degrés environ Soumise au froid produit par un mélange d'acide carbonique solide et d'éther, elle se prend en masse cristalline Elle nage à la surface de l'eau dans laquelle elle est à peu près insoluble quoiqu'elle communique son odeur à ce liquide elle se dissout en toutes proportions dans l'alcool C'est une substance facilement inflammable et qui brûle avec une flamme lumineuse L'action de l'acide chromique sur la butyryone est des plus vives elle s'enflamme immédiatement au contact de cet acide


Exposée à l'air elle ne se colore pas quoiqu'elle absorbe à la longue une quantité d'oxygène assez notable

Composition — Plusieurs analyses de cette substance faites sur des produits provenant de différentes préparations, ont toujours donné des résultats concordants et qui conduisent à la formule



La densité de vapeur vient d'ailleurs confirmer cette formule L'expérience donne le nombre 4,0 sensiblement voisin du nombre théorique 3,98 La formule C_4H_6O représente donc 2 volumes de vapeur de butyryone

Cette composition explique suffisamment la formation de cette substance, le butyrate de chaux, soumis à la distillation, se décompose en acide carbonique qui reste uni à la base, et en butyryone qui passe à la distillation comme l'indique l'équation suivante



Ainsi, la distillation sèche du butyrate de chaux n'est pas moins nette que celle de l'acétate de la même base, la décomposition s'opère avec facilité, et la quantité de butyrone que l'on obtient, en se plaçant dans des circonstances convenables, se confond sensiblement avec celle qu'exige la théorie.

Action de l'acide nitrique sur la butyrone

L'acide nitrique agit d'une manière assez nette sur la butyrone. Lorsqu'on fait un mélange de volumes égaux d'acide nitrique de concentration ordinaire et de butyrone, celle-ci se rassemble à la partie supérieure en se colorant fortement en rouge. Si l'on chauffe très modérément le matras renfermant le mélange, il se détermine après quelques minutes et d'une manière brusque, une action des plus vives des vapeurs rutilantes se dégagent par torrents et pourraient projeter le liquide hors de l'appareil si l'on n'était soustrait immédiatement à l'action de la chaleur. L'appareil doit avoir une disposition telle que les vapeurs rutilantes puissent traverser un vase contenant de l'eau, il se rassemble à la surface de celle-ci un liquide volatil d'une odeur éthérée assez agréable et qui a quelque analogie avec celle de l'éther butyrique. Lorsque les vapeurs rutilantes ont cessé de se dégager, on verse le liquide contenu dans le matras dans une assez grande quantité d'eau, on sépare, par ce moyen, un acide azoté qui se rassemble au fond de l'eau sous forme d'un liquide huileux, et que l'on purifie par des lavages réitérés. Cet acide et le liquide étheré ci-dessus mentionné, sont les deux seules substances qui se forment aux dépens des éléments de la butyrone. Dans cette réaction il ne se dégage que des traces d'acide carbonique.

Ac de butyronitrique

Propriétés — C'est un liquide huileux, fortement coloré en jaune, qui ne se congèle pas dans un mélange d'acide carbonique solide et d'éther, il possède une odeur aromatique et une saveur sucrée très-prononcée. Il se laisse enflammer facilement et brûle avec une flamme rougeâtre, il est insoluble dans l'eau, et soluble dans l'alcool en toutes proportions, sa densité est plus considérable que celle de l'eau.

Les propriétés que je viens de signaler sont communes à l'acide butyronitrique provenant directement de l'action de l'acide nitrique sur la butyrone, et à celui retiré du sel de potasse.

» Cet acide se combine facilement avec les bases, et donne des sels cristallisables.

De la comparaison d'un grand nombre d'analyses faites sur l'acide libre et sur celui combiné avec les bases il résulte que l'acide butyronitrique est un acide bibasique renfermant à l'état libre 2 équivalents d'eau susceptibles d'être remplacés en totalité ou en partie par les bases

Voici les formules rationnelles qui expriment la composition de l'acide butyronitrique et de quelques butyronitrates

Acide libre	$C_4H_5O_2, AzO_2 + 2HO$
Sel de potasse	$C_4H_3O_2, AzO_2 + \begin{cases} KO \\ HO \end{cases}$
Sel neutre d'argent	$C_4H_3O_2, AzO_2 + 2AgO$
Sel acide d'argent	$C_4H_3O_2, AzO_2 + \begin{cases} Ag_2O \\ HO \end{cases}$
Sel de plomb	$C_4H_3O_2, AzO_2 + 2PbO$

Par l'inspection de ces formules on voit qu'un équivalent d'hydrogène a été éliminé dans la butyronitrique et remplacé par un équivalent d'acide hyponitrique, car, du reste, analogue à ceux que présentent beaucoup de substances organiques sous l'influence de l'acide nitrique

Butyronitrates

Lorsqu'on mêle une dissolution alcoolique de potasse avec de l'acide butyronitrique, la liqueur commence par se colorer légèrement on voit apparaître ensuite une multitude de cristaux, qui finissent par se prendre en masse, on recueille ces cristaux et on les purifie par des lavages à l'alcool

Obtenu de cette manière, le butyronitrate de potasse se présente sous la forme de petites lames d'un beau jaune, dont l'aspect rappelle celui de l'iodoforme. À une température voisine de 100 degrés il s'enflamme avec une sorte d'explosion cette propriété est commune à tous les butyronitrates que j'ai examinés

Ce sel de potasse est à peu près insoluble dans l'alcool, il se dissout dans environ vingt fois son poids d'eau, sa dissolution aqueuse précipite en jaune les sels d'argent et de plomb, et en vert sale les sels de cuivre

Lorsqu'on traite une dissolution de butyronitrate de potasse par le nitrate d'argent, il se forme un précipité de butyronitrate d'argent à 2 équivalents de base, ce sel, d'abord jaune, se colore rapidement en violet. Il est soluble dans une grande quantité d'eau, et cristallise par l'évaporation spontanée de la liqueur

La dissolution aqueuse de ce sel présente, à la température de l'ébul-

lution, une reaction assez remarquable 1 equivalent de base est précipité et remplace par 1 equivalent d'eau, en sorte que la liqueur filtrée laisse cristalliser un sel qui a une composition analogue au sel de potasse

Chlorobutyrene

Distillé avec du perchlorure de phosphore, la butyrone est immédiatement attaquée, il se forme de l'acide phosphorique accompagné d'un dégagement d'acide chlorhydrique, le liquide qui passe à la distillation possède une odeur caractéristique, et renferme des quantités notables de chlore. Mais, pour obtenir un produit défini, on est obligé de redistiller ce liquide un assez grand nombre de fois avec du perchlorure de phosphore, car l'action n'a lieu qu'avec difficulté sur les dernières traces de butyrone.

On purifie, du reste, cette substance à la manière des éthers composés.

Propriétés — C'est un liquide incolore et limpide, plus léger que l'eau, dans laquelle il est insoluble, il se dissout en toutes proportions dans l'alcool, il possède une odeur particulière et pénétrante. Il est inflammable et brûle avec une flamme bordée de vert. Il entre en ébullition à 116 degrés. Sa dissolution alcoolique n'est pas troublée par le nitrate d'argent, mais si, après l'avoir enflammée, on ajoute ce réactif au résidu de la combustion des quantités notables de chlore se trouvent décelées par un précipité abondant de chlorure d'argent.

Composition — Son analyse conduit à la formule



qui représente 4 volumes de vapeur.

Néanmoins l'expérience donne un peu plus de carbone et moins de chlore que n'en exige cette formule, ce qu'il faut probablement attribuer à la présence d'une faible quantité de butyrone non attaquée.

L'étude des diverses réactions de la butyrone et des nouveaux composés qui peuvent en résulter, sera l'objet de nouvelles recherches que j'espère pouvoir entreprendre prochainement, et qui seront le complément de ce premier Mémoire.

• Je ne terminerai pas sans rendre hommage à M. Pelouze pour le bienveillant appui qu'il a daigné m'accorder dans le cours de ces recherches, qu'il me soit permis de lui adresser publiquement l'expression de ma profonde reconnaissance »

MEMOIRES PRESENTES

GÉOLOGIE — *Essai d'une carte geologique de l'Italie* (Note de
M DE COLLENO)

(Commissaires, MM Al Bionnini Elie de Beaumont, Dufrénoy)

J'ai cherché à représenter graphiquement sur une carte de l'Italie les résultats des divers Mémoires que j'ai eu l'honneur d'adresser à l'Académie depuis 1836 sur la géologie de cette contrée (*Comptes rendus*, t II, p 164 t VI, p 819, t VII, p 232, t XIV, p 477, t XVII, p 1363, t XVIII p 523) L'étude détaillée des terrains du Piémont, de la Lombardie et de la Toscane m'ayant mis à même de reconnaître dans les descriptions des auteurs les analogues de ces terrains dans le reste de l'Italie, il m'a été possible de tracer avec une certaine exactitude les limites des diverses formations géologiques dans les parties que je n'ai pu encore visiter moi-même, et j'ai obtenu ainsi le premier essai d'une carte géologique générale de l'Italie, essai qui laisse beaucoup à désirer sans doute, mais qui ne sera pas entièrement inutile à la science, en attendant la publication des cartes détaillées que des géologues distingués nous promettent des divers États italiens (1) Voici les résultats généraux qui se trouvent exprimés dans l'esquisse géologique que j'ai l'honneur de présenter à l'Académie

La charpente des Alpes et une portion de celle des Apennins sont composées de roches cristallines massives ou feuilletées, dont une partie a sans doute une origine entièrement ignée et doit être comprise dans les terrains dits *primitifs*, mais dont une partie très-considérable appartient à des terrains sédimentaires qui ont subi des métamorphoses plus ou moins complètes. Je me suis borné à indiquer comme terrains métamorphiques ceux qui conservent encore des traces de leur origine sédimentaire mais je suis loin de prétendre que toutes les roches que j'ai représentées comme primitives aient eu

(1) Lors du premier congrès scientifique italien, tenu à Pise en 1839, MM de la Marmora, Areto, Pasini, Savi et Sismonda annoncèrent qu'ils travaillaient depuis quelques années aux cartes géologiques de la Sardaigne, de la Ligurie, du royaume Lombard-Vénitien, de la Toscane et du Piémont, M Pilla préparait en même temps une carte du royaume de Naples. « On peut donc espérer ajoutent les *Actes du congrès* que l'Italie aura bientôt une carte géologique qui se rattache, d'un côté, à la carte de France, et, de l'autre, aux cartes que préparent les géologues de l'Allemagne » (*Actes du congrès de Pise*, p 117)

reellement une origine aussi reculée, je pense au contraire que les roches métamorphiques occupent dans les Alpes une étendue plus considérable que celle que l'on est porté à leur assigner dans l'état actuel de la science.

Il ne connaît pas dans toute la Péninsule italienne des couches sédimentaires que l'on puisse rapporter, *avec certitude*, à une époque antérieure à la période jurassique. Les fossiles des couches les plus anciennes des Alpes lombardes appartiennent bien certainement à cette dernière période (*Comptes rendus*, t. XVII, p. 1364). On trouve, il est vrai, dans le Tyrol italien et dans les Alpes venetiennes des couches dont les caractères zoologiques sont assez énigmatiques pour que quelques paléontologistes aient eu besoin de classer provisoirement ces couches dans un groupe intermédiaire entre les formations triasique et jurassique, mais il est bien difficile de séparer *géologiquement* les marnes de Saint Cassian, de Wengen, etc., des calcaires à fossiles jurassiques qui leur sont associées. Le *verrucano* de M. Savi me paraît dû à une modification plus ou moins avancée des couches arénacées qui se trouvent dans le nord de l'Italie à la partie inférieure de la formation jurassique. Quant aux lambeaux de terrain carbonifère indiqués à plusieurs reprises sur divers points de la Péninsule, on sait aujourd'hui qu'ils appartiennent à des périodes beaucoup plus récentes. Il n'en est pas de même en Sardaigne, où M. de la Marmorata a reconnu des dépôts de combustible avec empreintes de fougères, du terrain houiller, et des schistes à spirifères, *productus*, orthocères, etc., que ce géologue rapporte au terrain diluvien.

Les terrains jurassiques forment sur le revers italien des Alpes une ceinture qui s'étend, d'une manière assez uniforme, depuis le Col de Tende jusqu'à la vallée du Fisonzo, profondément modifiée aux environs du Mont Viso, du Mont Blanc, du Mont Rose, ces terrains reprennent leurs caractères sédimentaires à l'est de la vallée du Tessin et ils présentent dès lors une telle quantité de corps organisés fossiles, qu'il est impossible d'en méconnaître l'âge. Dans la chaîne des Apennins les terrains jurassiques ne commencent à se montrer que vers la partie méridionale de la Toscane, mais ils constituent, à partir de ce point, l'axe de la chaîne jusqu'aux granits de la Calabre. On trouve, en outre, des lambeaux plus ou moins considérables de terrain jurassique en dehors des Alpes et des Apennins proprement dits : tels sont le massif des Alpes apuennes, celui des *monti Pisani*, tels sont encore les rochers de Terracine, celui d'Ancone, etc.

Les terrains crétacés de l'Italie font partie de cette vaste zone qui a été étudiée aujourd'hui depuis les Pyrénées jusqu'à la Crimée, et qui a présenté constamment des caractères minéralogiques et paléontologiques fort diffé-

rents de ceux des formations crétacées du nord de l'Europe, en Italie plus qu'ailleurs peut être, les couches à coquilles de genres et même d'espèces tertiaires sont liées de la manière la plus intime avec des couches à hippurites et sphérulites. Je comprends dans la formation crétacée les poudingues et les calcaires avec hippurites de la Lombardie et du royaume de Naples. Le gres à fucoides, ou *macigno*, si développé dans les Apennins de la Toscane et le calcaire à nummulites, si fréquent dans toute l'Italie. Les terrains crétacés ainsi composés s'étendent presque sans interruption au pied des Alpes depuis le lac Majeur jusqu'à la limite orientale de l'Italie. Ils constituent la masse principale des Apennins entre Gènes et Florence, plus au sud, ils s'appuient sur les deux vers jurassiques de cette chaîne et se continuent ainsi jusqu'à l'extrémité de la Péninsule, il paraît même que la cime la plus élevée des Apennins le *Gran Sasso d'Italia*, appartient à la formation crétacée, puisque M. Hoffmann y a trouvé supérieurement au calcaire rouge avec ammonites jurassiques, des couches dolomitiques dans lesquelles il a reconnu des hippurites et des sphérulites.

Les terrains tertiaires de l'Italie appartiennent exclusivement aux périodes miocène et pliocène. Les terrains miocènes de Superga (*Comptes rendus*, t. II p. 164) se retrouvent dans la vallée de la Bormida et sur plusieurs points de la Toscane, ou ils ont été décrits par M. Savi sous le nom de *terrains tertiaires pholioliques*. Il existe en effet une liaison intime entre les terrains tertiaires de l'étage moyen et les masses de serpentine qui surgissent à proximité de ces terrains. C'est à la période pliocène qu'appartiennent les combustibles exploités en Ligurie et en Toscane.

« Les marnes bleues pliocènes, bien connues d'après la description de Brocchi, forment sur presque tout le littoral les dernières pentes des Apennins. J'ai considéré provisoirement comme contemporains de ces marnes les terrains à ossements du val d'Arno, les travertins anciens de la campagne de Rome et le gres d'Antignano, car je ne possède pas encore assez de documents pour établir en Italie les limites des deux étages pliocènes adoptés par M. Lyell.

Les terrains sédimentaires de l'Italie ont été perçés à plusieurs époques par des masses éruptives de diverses natures. Je ne saurais rien ajouter aux Mémoires classiques de M. de Buch sur les porphyres rouges et les mélaphyres, ou à celui de M. Brongniart sur les serpentines, je rappellerai seulement que M. Savi a démontré l'existence en Toscane d'un granit postérieur aux serpentines.

Les terrains volcaniques forment en Italie, plusieurs groupes distincts

dont les principaux sont au nord les monts Euganeens et les *monti Berici*, vers le centre de la Péninsule, le groupe des environs de Rome qui s'étend depuis le monte Amiata jusqu'à Velletri plus au sud, le Vésuve et les champs Phlégréens, et enfin l'Etna avec les îles de Lipari. L'échelle de la carte ne m'a pas permis de reproduire les détails données sur ces deux derniers groupes par MM. Dufrenoy et Flic de Beaumont, je n'ai pas pu circonscrire non plus les espaces occupés ailleurs par les trachytes et les basaltes, par les leucito-phyes et les tufs volcaniques etc. »

CORRESPONDANCE

M. ARAGO met sous les yeux de l'Académie plusieurs des images daguerriennes d'après lesquelles ont été exécutées les planches de la partie anthropologique du *Voyage de L'ASTROLABE et de LA ZÉLÉE*. Ces images sont comme on le sait, la reproduction de têtes moulées sur nature, dans le cours de l'expédition par M. le docteur DUMOUTIER (*Voir au Bulletin bibliographique*)

PHYSIQUE — *Sur la conductibilité de la terre pour le courant électrique*
Lettre de M. CH. MATTEUCCI à M. Arago)

Ayant voulu, dans ces derniers temps, répéter les belles expériences de M. Wheatstone, qui sont venues confirmer, d'une manière si lumineuse, les découvertes faites en Allemagne par MM. Rechner, Jacobi, Poggendorff, etc. et en France par M. Pouillet, je me suis trouvé dans le cas d'étudier, d'une manière plus complète qu'on ne l'avait fait, la conductibilité de la terre. Je pouvais disposer, pour ces expériences, d'un fil de cuivre long de 7000 brastoscans (le bras toscan est égal à 0^m,58). Ce fil était du n° 8 du commerce et le poids d'un mètre de longueur était 4^{gr},690. Le galvanomètre que j'ai employé était le galvanomètre comparable de M. Nobili. Je possède celui-là même sur lequel ce physicien a fait son Mémoire. Dans le cours de mes expériences j'ai eu occasion de vérifier l'exactitude de la Table des intensités données par M. Nobili à son galvanomètre. Au lieu d'avoir le fil couvert de soie et d'en faire des bobines, je l'ai étendu dans une longue prairie en le soutenant élevé au-dessus du sol avec de minces pieux en bois sec, hauts de 2 bras, et sur la surface desquels j'avais fait passer trois couches de vernis. Le pieu était enfoncé dans le sol de 8 ou 10 centimètres, et le fil était tourné une fois sur le sommet du pieu. L'électromoteur que j'ai employé a été toujours un seul élé-

ment de Bunsen dans lequel je n'avais que de l'eau de pluie en contact avec le charbon et le zinc amalgame, car j'avais supprimé le cylindre d'argile et empêché le contact entre le zinc et le charbon par le moyen de trois tiges de bois liées autour du zinc. J'ai trouvé que l'isolement de mon fil, avec les pieux que j'ai décrits, était parfait. Lorsque le circuit était composé de 7000 bras, l'intensité du courant était la même, quel que fût le point du circuit dans lequel le galvanomètre était introduit. La pile m'a donné, pendant plusieurs jours, un courant constant. Je ne faisais que renouveler l'eau, de temps en temps et passai un linge sur le zinc. Je rappellerai ici que le galvanomètre comparable de M. Nobili est très peu sensible. J'ai commencé une longue série d'expériences, en ne faisant qu'ajouter au circuit de la pile des longueurs variables de fil de cuivre. J'ai pu ainsi déterminer la longueur *reduite* qui représente la résistance de la pile, et j'ai vérifié, au moins pour toute la longueur de 7000 bras, l'expression de la résistance du circuit additionnel telle qu'elle est reçue aujourd'hui généralement. J'ai pu, de la même manière, vérifier la Table des intensités donnée par M. Nobili pour son galvanomètre. Je vais décrire les expériences que j'ai faites pour étudier la conductibilité de la terre. J'ai fait plonger dans un puits une grande lame de fer à laquelle était soudé le fil de cuivre. La surface de cette lame, en contact avec l'eau, était à peu près de 3 mètres carrés. Une autre lame semblable était disposée également dans un autre puits. Dans une première expérience, les deux puits étaient à une distance qui pouvait être prise en ligne droite pour 28 bras. J'ai fermé le circuit, d'abord sans introduire la pile et avec le seul galvanomètre. J'ai eu une déviation de 4 ou 5 degrés qui a diminué ensuite sans jamais disparaître entièrement. En soulevant et en replongeant ensuite tantôt l'une, tantôt l'autre des lames, j'ai vu varier le sens de la déviation, et en laissant le circuit fermé, l'aiguille revenait à zéro. Ce sont donc là les phénomènes qu'on obtient en plongeant dans un liquide deux lames du même métal réunies aux extrémités du galvanomètre. J'ai introduit la pile dans le circuit en partant de zéro, et la déviation que j'ai obtenue m'a donné la longueur *reduite* en fil de cuivre qui représentait la résistance de la portion du circuit composée des lames de fer, de l'eau du puits et de la couche terrestre. J'ai trouvé que cette résistance de la portion de la terre, dont j'ai donné la longueur en ligne droite, de l'eau des puits et des lames, était 809 bras de mon fil. J'ai eu recours à deux puits plus éloignés. Leur distance en ligne droite était de 360 bras, et j'ai comparé l'intensité des deux courants lorsque j'avais dans le circuit, dans un cas, 360 bras de fil et la terre entre les deux puits éloignés l'un de l'autre de 28 bras, et dans l'autre, les mêmes 360 bras et la

terre entre deux puits éloignés entre eux de 360 bras. J'ai obtenu dans les deux cas exactement le même courant. J'ai ajouté soit dans un cas, soit dans l'autre, des longueurs variables de fil de cuivre, et j'ai trouvé la résistance due à ce fil telle qu'elle est donnée par la théorie. J'ai choisi encore des puits plus éloignés et j'ai fait la même expérience. Dans ce troisième cas, le circuit se composait de 780 bras de fil et de la terre entre deux puits éloignés en ligne droite de 518 bras. La pile employée dans ce cas donnait d'une manière constante, sans circuit additionnel, 26 degrés. Dans une quatrième expérience, j'avais 1120 bras de fil et la terre entre les deux puits d'une des expériences précédentes, éloignés entre eux de 360 bras. J'ai obtenu dans le premier cas $17^{\circ},5$, et dans le second $16^{\circ},7$, dans la première expérience, j'avais plus de terre et moins de fil dans le circuit, dans la seconde, c'était l'inverse. J'ai confirmé ces résultats deux fois, et je n'ai eu à me reprocher aucune erreur dans l'expérience. Évidemment il en résulte qu'une couche de terre plus ou moins longue présente la même résistance, que cette résistance de la terre se trouve à la première introduction du courant dans la terre, et qu'en opérant à des distances plus grandes et telles que la résistance du fil de cuivre ajoute suffise à diminuer la force du courant plus encore que ne l'avait fait la première introduction du courant dans la terre à une distance très-petite, cette résistance de la terre disparaît. Ces premières expériences m'ont engagé à opérer plus en grand, et je me suis rendu pour cela sur la grande route qui traverse par une longueur de 4 milles le parc du Grand-Duc, tout près de Pise, et qui aboutit à la mer. J'ai opéré également en plongeant les lames dans les puits. Je dirai seulement que, dans une première expérience faite entre deux puits éloignés entre eux de 4885 bras et avec une longueur égale de fil de cuivre, j'avais trouvé que l'isolement du fil n'était pas parfait, n'ayant pas employé les pieux que j'ai décrits. Au lieu de cela, j'avais fixé le fil autour de clous placés de distance en distance sur les arbres de la grande route. Je voyais alors que quand même la lame de la station opposée à celle où était la pile n'était pas dans le puits, j'avais une déviation, petite pourtant, au galvanomètre. Mais quand j'ai employé les pieux vernis, l'isolement du fil a été parfait, l'aiguille revenait parfaitement à zéro lorsque le circuit était interrompu à la station éloignée. De même, j'ai vu avec deux galvanomètres aux deux stations extrêmes, que la déviation était la même soit tout près de la pile, soit à 4885 bras de la pile. Il faut dire que le circuit n'est pas complètement interrompu si l'on se borne à tirer la lame du puits et à la jeter par terre étant toujours soudée au fil de cuivre. Voici les nombres trouvés dans une des quatre expériences que j'ai faites. L'élément de Bunsen, avec le seul fil de

galvanometrique, qui est long de 10 bras, donnait un courant constant de 17 degrés, égal en intensité à 36,78. Lorsque le circuit était composé de 4885 bras sans terre, j'avais 6°,5 qui est justement le nombre donné par la théorie étant égale à 7,5 d'intensité. J'ai fermé le circuit avec la même longueur de fil et la terre, à l'aide de lames plongées dans les deux puits.

L'aiguille partait exactement de zéro, et j'avais à mon galvanomètre un courant constant de 8 degrés. Le galvanomètre qui était à l'autre station indiquait exactement la même déviation. Les observateurs qui étaient placés aux deux stations interrompent et rétablissent le circuit à des instants déterminés. Lorsque le circuit était interrompu, l'aiguille revenait à zéro. Je saisis cette occasion pour faire mes remerciements à mes collègues et amis MM. Pacinotti, Ridolfi, Sbragia, Camia Ruschi, qui ont bien voulu m'aider dans ces expériences. Dans une seconde expérience, j'ai obtenu exactement les mêmes résultats qui peuvent résulter de la manière suivante : en faisant circuler un courant dans un fil de cuivre long de 4885 bras, et à travers une couche de terre de la même longueur, la diminution qui a lieu dans l'intensité du courant est telle, que non seulement il faut regarder comme nulle la résistance de la couche terrestre, mais encore il faut regarder la résistance du fil de cuivre qui entre dans le circuit mixte, comme moindre que celle qui est présentée par le même fil lorsqu'il entre seul dans le circuit. Ce fait est singulier. Voici les efforts que j'ai faits pour me l'expliquer. Je doutais d'abord qu'il y eût un courant avec les seules lames plongées dans les puits, quoique très éloignées l'une de l'autre, j'ai donc fait l'expérience en fermant le circuit avec la terre et le fil sans pile. Mon galvanomètre me donnait une déviation qui ne dépassait pas 1 degré, et qui ne tardait pas à disparaître, en tenant le circuit fermé.

Je ne pouvais donc m'expliquer la différence trouvée avec un courant dû aux seules lames. La grande route le long de laquelle le fil était étendu est justement dirigée de l'est à l'ouest. Dans la première expérience, le courant de la pile allait, dans le fil, de l'est à l'ouest. Nous pensâmes alors que le fait pouvait être expliqué en ayant recours à un courant dérivé des courants terrestres d'Ampère. L'idée était on ne peut plus attrayante. On renversa la direction du courant de la pile, on devait s'attendre à une diminution du courant, mais il fut constant et de 8 degrés. Malgré cela, je fis vite étendre le fil le long de la côte, dans une position perpendiculaire à celle de la grande route. Le circuit était le même, c'est-à-dire qu'il se composait de 4885 de fil et d'une couche de terre et d'eau à peu près de la longueur du fil. Une

des lames était restée dans le puits l'autre était plongée dans la mer Dans une deuxième expérience que je fis immédiatement après , les deux lames étaient toutes les deux plongées dans la mer Dans les deux cas j'ai toujours obtenu 8 degrés Le courant de la pile n'avait jamais changé d'intensité je ne puis donc recourir aux courants dérivés des courants terrestres pour expliquer le fait Ayant égard à la nature du sol de Pise , qui est en grande partie formé d'un terrain d'alluvion très-récemment déposé , et dans lequel on trouve l'eau à quelques bras sous terre j'ai voulu faire une expérience dans un sol différent Je me suis rendu pour cela sur les collines de Crespina qui sont à 16 milles de Pise Dans les puits que j'ai employés , l'eau était de 30 à 40 bras au-dessous du sol J'ai opéré en deux stations différentes en tenant toujours la même longueur de fil étendue , qui a été , dans ce cas , de 4260 bras La distance entre les deux puits dans la première expérience était de 3500 bras Dans la seconde expérience , la distance entre les deux puits était de 1 mille c'est-à-dire de 2800 bras Le courant de la pile , sans circuit additionnel était toujours de 17 degrés Dans la première expérience le circuit se composait de 2470 bras de fil et de la terre entre les deux puits éloignés de 3500 bras Dans la seconde expérience , le circuit se composait du même fil et de 2800 bras de terre J'ai obtenu dans les deux cas la même déviation qui a été de 8° 5 Les expériences ont été faites avec les mêmes soins , et ont confirmé les faits observés en opérant sur le sol de Pise J'ajouterai qu'en opérant avec une seule des lames dans le puits et avec l'autre soudée au fil et couchée sur la terre , j'ai obtenu , dans les mêmes circonstances , tantôt 3 , tantôt 4 , tantôt 5 degrés suivant que la lame était posée sur le sable , sur le sable humide , sur le gazon Au lieu de la pile et des lames de fer j'ai attaché au bout du fil d'une part , une lame de zinc de l'autre , une lame de cuivre Chacune de ces lames avait un demi-mètre carré de surface Lorsque le fil était long de 4885 bras , j'avais un courant constant de 4 degrés J'avoue que j'aurais désiré pouvoir opérer sur des longueurs plus grandes c'est dans ce but que j'envoie ce Mémoire au président du prochain congrès de Milan pour l'engager à faire tenter ces expériences sur une vaste échelle , avec une partie des fonds que la ville de Milan a disposés pour des expériences Ce qui résulte évidemment des essais que j'ai rapportés me conduit à conclure que la résistance de la terre pour le courant électrique est nulle dans de grandes étendues M Bain , en Angleterre , et surtout M Jacobi à Saint-Petersbourg , avaient déjà trouvé que cette résistance du sol pouvait être considérée comme n'exercant pas d'influence Mais je

crois que mes expériences ont prouvé ce résultat d'une manière plus directe et plus précise. Je dois conclure encore que lorsque un courant est transmis par un circuit composé en partie d'un long fil de cuivre et d'une longue sonde de terre, la diminution soufferte par le courant par la résistance de ce circuit mixte, est moindre que celle qu'elle aurait soufferte par la résistance du seul fil de cuivre. Cette conclusion qui devait être démontree n'operant sur une plus grande échelle est encore à vérifier. Je finirai en disant que mes résultats pourriont conduire à une application que je crois importante pour la télégraphie. Quel que soit le fil et son isolement on pourra toujours employer la terre pour former la moitié du circuit et de cette manière toutes les dépenses et les difficultés seront réduites de moitié.

MÉCANIQUE APPLIQUÉE — *Sur un appareil physico-mécanique destiné à remplacer les machines à vapeur, et dans certains cas, les machines hydrauliques de grande puissance, l'etire de M. SELLIGUE à M. Arago*

(Commissaires MM. Arago, Dupin, Dumas, Gambey.)

Depuis plusieurs années, j'avais combiné un appareil très-simple pour faire marcher les vaisseaux à voiles et autres comme avec les machines à vapeur sans que rien fût apparent en dehors de la flottaison. J'ai gardé pendant trois ans mon invention, afin qu'elle pût être utile à la France, si l'y avait eu une guerre maritime, et alors elle paraissait probable. J'avais seulement, dans le temps, confié mes moyens à une personne si bien placée que son témoignage était irrecusable, afin que mon idée ne fût pas perdue et que je pusse recourir à ses souvenirs si d'autres venaient à présenter une pareille machine.

Je sais qu'il y a des personnes qui ont voulu faire le vide dans des appareils au moyen de l'inflammation du gaz, et faire marcher ainsi des pistons dans des corps de pompe, etc., ou monter de l'eau; mais ces moyens sont de peu d'effet, puisqu'ils n'agissent que sur une partie de la pression atmosphérique et qu'ils ont besoin de machines et d'ajustements qui ne sont guère en rapport avec les forces motrices que les auteurs croient obtenir. Moi je me sers de la force expansive que j'obtiens par la détonation du gaz et qui est d'autant plus forte que l'air et le gaz contiennent de l'eau en vapeur en plus grande quantité, et comme, à chaque explosion, les vapeurs sont portées au rouge, les 20 à 30 grammes d'eau qui y sont contenus, portés à cette température, donnent une force très-considérable que je fais agir directement sur

l'eau libre, en sorte qu'il n'y a aucune crainte de rupture des récipients d'explosion

» Voici le fait qui m'a conduit à imaginer ces appareils en faisant diverses expériences sur le gaz, dans une de mes usines, j'ai remarqué que les détonations, dans diverses circonstances, avaient plus ou moins de puissance avec les divers mélanges d'air atmosphérique indiqués dans le *Traité de Chimie* de M. Dumas. J'ai vu que la quantité de vapeur d'eau en suspension, ainsi que la quantité d'oxyde de carbone, qui se produisent dans le gaz que j'obtiens par la décomposition de l'eau, par du charbon chauffé au rouge, faisaient aussi varier les effets comme puissance et comme vitesse, si je puis me servir de cette expression. Je suis parti de là pour combiner des appareils destinés à faire marcher des vaisseaux, et remplacer les machines hydrauliques d'une grande puissance.

Voici la description succincte de ces appareils. Je place à l'arrière d'un vaisseau, et le plus bas possible au-dessous de la flottaison, deux ou quatre récipients d'explosion en métal ductile, récipients que je désigne, à cause de leur forme, sous le nom d'*éprouvettes métalliques*, et qui ont, je suppose, 7 mètres de longueur sur 1 mètre de diamètre. Chacune de ces éprouvettes est courbée presque à angle droit, à la distance de 2^m,50 de la partie supérieure qui est fermée, ainsi l'autre partie du tube a 4^m,50 qui se trouvent placées presque horizontalement, et ce bout de l'éprouvette est ouvert.

» Je fixe, avec les collets qui tiennent aux bouts ouverts de cette éprouvette, et avec d'autres armatures nécessaires, l'éprouvette elle-même à la muraille et aux planches du vaisseau, de manière que le bout qui est fermé et perpendiculaire soit à la hauteur de la flottaison.

» A la partie supérieure de chaque éprouvette il y a trois robinets. L'un s'ouvre, après une première explosion, pour laisser remonter l'eau, qui reprend son niveau et chasse l'azote qui restait après l'explosion, l'autre sert à introduire le gaz et l'air dans l'éprouvette et se ferme de suite, le troisième est combiné de manière à faire effectuer la détonation. A cet effet, il y a une flamme de gaz qui brûle par un petit orifice ménagé au centre de la clef du dernier robinet, et une autre flamme, placée sur le robinet, laquelle brûle constamment et rallume la première flamme qui s'éteint à chaque explosion.

» Il y a ensuite, dans le tube inférieur de l'éprouvette, une espèce de piston rame articulé de manière à laisser passer au travers l'eau qui vient reprendre son niveau après l'explosion. Les lames qui composent ce piston se placent horizontalement et ne présentent que leur épaisseur comme ré-

sistance au retour de l'eau, et, quand l'explosion a lieu, présentent alors toute leur surface

Au moyen d'une ligne droite de va et vient, mue par un mouvement circulaire et continu, je fais faire les fonctions en temps utile, et marcher deux corps de pompe de grandeur et de capacité convenables telles que *un* pour le gaz et *huit* pour l'air. Ils aspirent dans un sens, et foulent dans l'autre, l'air et le gaz dans l'éprouvette

Voici les fonctions quand la ligne droite marche dans un sens, elle ferme le robinet supérieur qui ouvre l'éprouvette, pour en laisser échapper le gaz azote, et y laisser remonter l'eau jusqu'au niveau de la flottaison et des corps de pompe, ensuite elle injecte dans l'éprouvette l'air atmosphérique et le gaz au moyen des deux corps de pompe. Aussitôt l'injection faite, avant la fin de sa course, elle fait fonctionner par un quart de tour le robinet d'explosion qui retourne se mettre à sa première position quand l'explosion a eu lieu. Dans l'autre sens de la ligne droite, le robinet supérieur s'ouvre pour laisser échapper l'azote et remonter l'eau dans l'éprouvette ensuite il fait aspirer l'air et ce gaz par les corps de pompe, et ainsi de suite

Il va sans dire que la même ligne droite fait marcher deux éprouvettes ou récipients d'explosion en faisant la fonction par chacun de ses bouts en raison inverse, c'est-à-dire que quand elle injecte l'air et le gaz dans l'une des éprouvettes, elle aspire l'air et le gaz dans les corps de pompe pour l'autre éprouvette dont la détonation doit suivre

Dans certaines dispositions, on peut placer, outre les récipients d'explosion de l'arrière, deux autres récipients à l'avant pour vider de bord plus vite. Alors on y transporte le gaz et l'air par des tubes, et, quand on les fait agir, on ne fait faire les détonations que par les récipients de l'avant et de l'arrière du bord opposé au rayon de la courbe que l'on veut décrire

Une explosion peut avoir lieu toutes les trois secondes par le même récipient (Je prendrai à présent, pour point de départ de mise en action, des récipients d'explosion dans lesquels j'introduirai 35 litres de gaz et 280 litres d'air atmosphérique chaque explosion égale à environ 25 000 kilogr. de force) C'est donc une seconde et demie de temps par explosion, 40 explosions par minute, par heure 2 400 explosions à 35 litres, égale 84 000 litres. Il faut deux de mes fourneaux ordinaires pour obtenir d'une manière normale cette quantité de gaz et que la capacité totale des cylindres soit de 3 600 litres, ce qui fait douze tubes de 2 mètres de long sur 44 centimètres de diamètre intérieur. Pour combustible, en 124 heures, on brûle, pour deux fourneaux de cette capacité, 20 hectolitres de houille, et on emploie, pour chaque

(1040)

production de 3 500 litres de gaz, 1 kilogramme de charbon de bois ou autre pour décomposer l'eau ainsi, en 24 heures, c'est 576 kilog de charbon. L'eau ne coûtant rien, je n'en parle pas dans mon compte

20 hectolitres de houille à 3 ^f 50 ^c l'hect	70 ^f 00 ^c
576 kilog de charbon à 10 ^f les 100 kilog	57 ^f 60 ^c
Total	127 ^f 60 ^c

Quant au mécanicien et au chauffeur, je n'en parle pas, il y a plutôt moins de dépense pour mes appareils que pour les machines à vapeur

Avec 127^f 60^c on a une force motrice égale à 25 000 kilogrammes toutes les secondes et donne ce qui a 75 kilogrammes par cheval vapeur par seconde, égale 222 chevaux

Pour une machine à vapeur, par heure, il faut une dépense de 5 kilogrammes de houille par cheval en 24 heures une machine de 100 chevaux seulement emploie 150 hectolitres qui, au prix de 3^f 50^c, font 525^f. Aussi je prends le minimum pour 200 chevaux, 1 800^f

» La dépense en combustible est donc comme *un* pour mon appareil et comme *sept* pour une machine à vapeur de même puissance. La force motrice qui m'est nécessaire pour faire fonctionner l'appareil est celle de deux hommes. Pour éviter d'avoir des réservoirs de gaz de grande dimension, je fais alimenter mes fournaux d'eau à décomposer par la machine elle-même et à chaque explosion il se verse la quantité d'eau nécessaire, dans les siphons d'alimentation, pour produire le gaz que consomme une explosion, en sorte que je n'ai qu'un réservoir d'une capacité égale à 2 ou 3 mètres. C'est tout ce qu'il faut, aucun accident ne peut donc arriver

Quant à l'économie de confection et d'emmenagement de mes appareils, il n'y a pas de comparaison avec une machine à vapeur. Le poids de tous mes appareils serait de 20 tonnes au plus, et le prix, pour armer ainsi un vaisseau de ligne, serait environ de 80 à 100 000 francs. 20 vaisseaux coûteraient donc environ 2 millions, et le temps nécessaire pour armer un vaisseau serait, au plus, de deux ou trois mois

Quand les explosions ont lieu, le bruit en est à peine sensible, tout l'effet se produisant dans l'eau

» J'ai fait un appareil de démonstration qui, au moyen de 100 centimètres cubes de gaz et de 800 centimètres cubes d'air, me porte 6 litres d'eau, à chaque explosion, à environ 10 mètres de hauteur »

CHIMIE — *Recherches sur l'iode, par M. MILLON (Extrait)*

Les recherches que j'ai l'honneur de communiquer à l'Académie portent sur plusieurs faits qui peuvent se rattacher tous à l'histoire particulière de l'iode, mais qui en même temps peuvent servir à éclairer les tendances les plus générales de l'affinité chimique.

Tous ces faits se groupent autour de trois chefs principaux, qui sont : 1° l'action de l'acide nitrique sur l'iode ; 2° l'action de l'acide sulfurique sur l'acide iodique ; 3° l'étude de deux nouvelles combinaisons oxygénées de l'iode.

§ I^{er} — *Action de l'acide nitrique sur l'iode.*

L'acide nitrique en agissant sur l'iode, présente des variations non moins grandes que celles qu'il exerce, suivant ses différents états d'hydratation et à l'égard des métaux. La présence de l'acide nitreux modifie également cette action de la manière la plus notable. Ainsi l'acide nitrique à 4 $\frac{1}{2}$ équivalents d'eau n'oxyde pas l'iode et se borne à le dissoudre à chaud. L'acide nitrique à 3 équivalents d'eau le convertit en acide iodique. L'acide nitrique à 1 ou 2 équivalents d'eau amène l'iode à un nouveau degré d'oxydation, inférieur à tous ceux qui ont été découverts jusqu'ici et conduit de la sorte à la préparation d'un acide particulier qui a pour formule IO^4 : acide hypoiodique.

L'influence de l'acide nitreux se fait sentir sur les trois hydrates qui viennent d'être indiqués, mais c'est surtout à l'égard de l'acide iodique que cette influence est manifeste. Tandis que l'acide nitrique à 4 $\frac{1}{2}$ équivalents d'eau dissout très bien l'acide iodique, le même acide, mêlé d'une petite quantité d'acide nitreux, altère l'acide iodique, le réduit et donne lieu à un dépôt d'iode.

Ces différents phénomènes expliqueront à ceux qui se sont occupés de l'action de l'acide nitrique sur l'iode la singularité des phénomènes qu'on y remarquait.

§ II — *Action de l'acide sulfurique sur l'acide iodique.*

M. Gay-Lussac, en traçant l'histoire générale de l'iode, s'est borné à dire que l'acide sulfurique décompose l'acide iodique en iode et en oxygène. H. Davy, poursuivant la même étude, a signalé un composé jaune qu'il considère comme une combinaison des deux acides, Serullas essaya vainement

de reproduire la combinaison entrevue par Davy et se crut autorisé à en nier l'existence

Dans l'examen de cette réaction si simple en apparence, controversée néanmoins comme on le voit, par des chimistes éminents, je suis arrivé à reconnaître la production d'une douzaine de composés nouveaux, solides, cristallins d'une constitution parfaitement déterminée, mais assez étrange. Voici quels sont les phénomènes qui se observent dans l'action de l'acide sulfurique sur l'acide iodique, et qu'on peut très-bien suivre dans un petit ballon de verre, à l'aide d'une lampe à alcool.

À une température assez voisine de son point d'ébullition, l'acide sulfurique dissout l'acide iodique dans la proportion d'un cinquième en poids. Si après la dissolution de l'acide iodique, on continue de chauffer, il se fait un dégagement d'oxygène très-pur, sans aucun mélange d'iode. Du moment où l'oxygène se dégage la liqueur se colore fortement en jaune, et cette teinte augmente avec la production du gaz. Plus tard, en continuant l'application de la température l'acide sulfurique devient verdâtre, l'iode apparaît alors et accompagne jusqu'à la fin le dégagement d'oxygène.

En s'arrêtant dans la marche de la réaction, à différentes phases qui sont parfaitement tranchées, on sépare du sein de l'acide sulfurique

1° Plusieurs combinaisons d'acide sulfurique et d'acide iodique,

2° Des combinaisons formées par la réunion des trois acides iodique, hypoiodique et sulfurique

3° Des combinaisons d'acide hypoiodique et d'acide sulfurique,

4° Des combinaisons d'acide sulfurique et d'un acide particulier de l'iode moins oxydé encore que l'acide hypoiodique, qui se représente dans sa formule par $I^s O^{12}$, et qu'on peut appeler sous-hypoiodique.

Toutes ces combinaisons ont des conditions d'existence spéciales hors desquelles elles se détruisent avec une grande rapidité. Ainsi elles ne sont stables que dans un air rigoureusement desséché, ou bien au sein de l'acide sulfurique concentré. Ce sont des circonstances qui introduisent d'assez grandes difficultés dans l'étude de ces composés. Si l'on ajoute qu'ils se forment tous au contact seul de l'acide sulfurique bouillant et de l'acide iodique, on comprendra les soins qu'il faut apporter pour arrêter la réaction à temps, et pour séparer ces différents produits l'un de l'autre.

Néanmoins une douzaine de composés différents ont pu être isolés et analysés avec exactitude, il s'en produit certainement un plus grand nombre encore. Je dois même ajouter que, d'après le mode de séparation employé, les produits insolubles et cristallisables ont été seuls analysés. S'il existe des

combinaisons solubles de l'acide sulfurique avec IO^3 , IO^4 , I^2O^5 , ou même avec d'autres combinaisons oxygénées de l'iode, elles ont dû m'échapper.

Mais les produits qui ont été décrits suffiront, je l'espère, pour établir le point de vue auquel je me suis attaché.

Il suffit de jeter les yeux sur les formules qui représentent ces composés pour être frappé de la nouveauté de leur aspect.

A quel ordre de combinaisons faut-il rattacher ces composés particuliers ?

Comment faut-il se représenter leur constitution ?

Quelle idée faut-il se faire de leur production ?


Ce sont des questions qui découlent de l'étude de ces différents produits, car ils intéressent surtout des points de vue théorique et classique de la chimie.

Ces combinaisons, représentées dans leur formule par l'association de deux ou trois acides, ne paraissent pas, en ce moment, susceptibles d'une autre interprétation.

Ce sont des produits complexes qui résultent de plusieurs acides combinés entre eux, placés en regard l'un de l'autre dans un antagonisme aussi évident, dans une opposition électrique, si l'on veut aussi complète que si l'on agissait d'un oxyde alcalin en présence d'un acide énergique.

Cette réunion certaine et variée de plusieurs principes acides marque précisément le caractère de nouveauté des produits qui résultent de l'action de l'acide sulfurique sur l'acide iodique.

On pouvait conserver quelques doutes sur la combinaison réelle des acides minéraux entre eux. La combinaison des acides chromique et sulfurique, signalée par M. Gay-Lussac, est, en effet, contestée par d'habiles chimistes. Les produits qui résultent de l'union de l'acide sulfurique avec les composés nitriques et nitreux sont à peine indiqués. L'analyse de l'un d'eux a été faite en vue d'une idée systématique particulière. Des composés tels que



ne laissent prise à aucune incertitude.

Il faut admettre que les acides minéraux se combinent entre eux au nombre de deux, de trois et dans des proportions variables, que ces combinaisons, dans les circonstances où elles se produisent, possèdent la forme, la constitution et la stabilité des produits qui sont le mieux définis.

« Cette conclusion porte à réfléchir sur l'antagonisme, c'est-à-dire sur l'affinité réciproque des acides et des bases. On observe ici un antagonisme différent : ce sont des acides qui s'ajoutent à d'autres acides pour former des combinaisons régulièrement constituées. Faut-il pour cela repousser l'antagonisme des acides et des bases? non, assurément. Il faut reconnaître que l'affinité qui sollicite l'association des principes acides aux principes basiques est subordonnée à des conditions dans lesquelles on a toujours opéré sans se rendre exactement compte de leur influence. Ce sont des conditions de milieu, de dissolvant. Dans un milieu tel que l'eau, tel que l'air atmosphérique, les acides se combinent régulièrement aux bases. Les acides se repoussent les acides, les bases se déplacent et s'écartent mutuellement. Dans un milieu tel que l'acide sulfurique, les conditions d'affinité sont changées, les acides se superposent, s'ajoutent les uns aux autres, et se groupent en produits complexes.

M. Pelouze, en employant l'alcool comme dissolvant, au lieu de l'eau, a montré les perturbations qui se produisent dans les rapports ordinaires de l'affinité. L'acide acétique est déplacé par l'acide carbonique au sein d'une solution alcoolique. En écartant lieu d'un grand nombre de réactions. M. H. Rose a montré quelles associations curieuses on pouvait provoquer. Nous avons pu nous-mêmes condenser l'acide sulfurique anhydre sur du carbonate de potasse, et dans ce contact liquéfier l'acide par la chaleur, le distiller une heure durant sans dégager, en aucune façon, l'acide carbonique.

Il faut donc observer l'affinité chimique dans les conditions les plus variées, et tenir compte de toutes les circonstances qui l'accompagnent.

Les différents milieux dans lesquels on opère admettent parfois l'exception dans les dispositions générales et dans les règles qu'ils établissent. Il arrive alors qu'en déterminant des affinités spéciales, les influences de milieu trouvent des limites ou des forces contraires, les dominent et les effacent. Ainsi, bien que la présence de l'eau sollicite l'union des acides et des bases, il existe des sels dans lesquels l'eau sépare l'acide de ces bases. Certains nitrates de mercure se trouvent dans ce cas. L'influence de l'eau peut également être mise en défaut à l'égard des acides dont elle provoque, en thèse générale, la séparation ou le déplacement réciproque. Il nous semble que ce fait se observe dans les combinaisons désignées sous le nom d'*émétique* et d'*alun*.

« Le principe d'association des acides entre eux, si manifeste lorsqu'on agit dans un milieu acide, à l'abri de l'air humide, avec les acides sulfurique et iodique par exemple, se poursuit encore dans les émétiques et dans

les aluns, au sein de l'eau et malgré l'influence de l'eau. On comprend ainsi que le bitartrate de potasse s'unisse aux acides borique, arsénieux et arsenique, aussi bien qu'aux oxydes de chrome, de fer (sesquioxyde) et d'antimoine, qu'il serait bien plus rationnel d'envisager constamment comme des acides.

Comme conséquence très-générale de l'étude des composés qui résultent de l'action de l'acide sulfurique sur l'acide iodique, on peut conclure que les acides n'ont pas moins de tendance à se combiner les uns aux autres que les acides aux bases, et peut-être que les bases entre elles. Cette tendance se manifeste surtout dans des circonstances particulières d'atmosphère et de milieu, mais elle persévère au sein même d'un dissolvant qu'on peut considérer comme contraire à de pareilles alliances.

Nous trouvons dans cette tendance l'explication de certains composés tels que les émetiques et les aluns, qui ont offert jusqu'ici une sorte d'anomalie de constitution. En reconnaissant constamment à l'alumine, au peroxyde de fer et aux oxydes de même formule M^2O^3 , un rôle d'acide, en plaçant les combinaisons qu'ils forment avec les acides, à côté des composés qui produisent ensemble les acides sulfurique et iodique ou hypoiodique, nous pensons qu'on faciliterait l'intelligence générale et l'histoire de ces combinaisons.

§ III — Étude de deux nouvelles combinaisons oxygénées de l'iode

La découverte des deux nouvelles combinaisons oxygénées de l'iode qui se produisent à la suite de l'action de l'acide nitrique sur l'iode, et de l'acide sulfurique sur l'acide iodique, crée de nouveaux termes de rapprochement entre la série du chlore et la série de l'iode.

Ces deux acides, qui se représentent, l'un par IO^4 , l'autre par I^2O^{10} , se rangent à côté de l'acide hypochlorique, ClO^4 , et des acides chloro-chlorique, Cl^3O^{12} , et chloro perchlorique, Cl^4O^{17} . L'acide sous-hypoiodique m'a offert, dans son étude, des avantages auxquels j'ai dû attacher quelque prix. On l'obtient, en effet, par plusieurs voies différentes : on le manie et purifie sans difficulté, et la méthode analytique à l'aide de laquelle on détermine sa composition est susceptible d'une grande exactitude. Les acides minéraux polyatomiques, tels que Cl^3O^{12} , Cl^4O^{17} , sur lesquels j'ai déjà eu lieu de présenter des considérations particulières, acquerront ainsi un nouveau degré d'évidence.

CHIMIE APPLIQUÉE — *Des applications du vide aux travaux industriels*, par
M FREDERIC KUELMANN

Dans un Mémoire que j'ai eu l'honneur de présenter à l'Académie en 1839, j'ai examiné l'influence qu'exerce la pression de l'air sur la formation de l'éther. J'ai constaté que, lorsque l'on soumet à l'action de la chaleur dans le vide de l'acide sulfurique et de l'alcool mélangés dans des proportions qui dans les conditions ordinaires de pression, donnent une grande quantité d'éther, le liquide entre en ébullition à 86 degrés et donne de l'alcool, qu'à 104 degrés il distille de l'huile douce et de l'eau, qu'enfin, si l'on élève davantage la température on obtient les produits ordinaires de la décomposition de l'alcool par un grand excès d'acide sulfurique, sans une trace d'éther.

J'ai ajouté ainsi un fait de plus à cette démonstration que l'éther, pour se produire par l'action de la chaleur sur un mélange d'alcool et d'acide sulfurique exige une température qui approche de 140 degrés.

Dans les expériences que je viens de rappeler, l'alcool, dont la volatilisation était facilitée par une diminution de pression, s'est échappé avant que la température nécessaire à la formation de l'éther ait pu être atteinte. Quant à la production de l'huile douce de vin qui a distillé à 104 degrés, cette production peut avoir lieu à des températures plus basses encore, car je suis parvenu à transformer de l'alcool en ce produit à la température ordinaire (15 degrés environ) par l'action lente du fluorure de bore.

Il est vrai que, dans ce dernier cas, le temps a pu suppléer à l'élévation de température.

Il m'a paru très-intéressant pour la science et pour l'industrie d'étudier, avec quelque soin l'influence que le vide peut exercer sur les réactions chimiques, et d'amener à une solution les questions suivantes qui, à ma connaissance, n'ont pas encore été l'objet d'un examen spécial.

1° En opérant dans le vide, l'action de la chaleur ne peut-elle pas, dans un grand nombre de circonstances, permettre de distinguer le degré de stabilité des combinaisons chimiques, et reconnaître celles qui peuvent être considérées comme de simples mélanges?

» 2° Le vide peut-il amener quelque perturbation dans les époques auxquelles les décompositions chimiques se produisent?

» 3° En soumettant à une faible pression certaines substances qui, par l'action de la chaleur, donnent lieu au développement de quelques corps nouveaux, tels que des acides pyrogénés, ne peut-on pas mieux isoler ces corps qu'en opérant à la pression habituelle?

4° Par le vide, l'époque de l'ébullition, des différents corps que la distillation nous donne le moyen de séparer, se trouve modifiée, lorsque ces corps sont isolés. Cette circonstance a-t-elle de l'influence sur le rapport dans lequel les corps passent à la distillation, alors qu'on opère à diverses pressions?

Les faits que j'ai constatés, en étudiant l'éthérification, démontrent que deux corps mélangés ou faiblement associés, lorsqu'ils sont susceptibles de réagir l'un sur l'autre, peuvent donner par la chaleur des résultats différents, suivant que l'on opère sous la pression de l'air ou dans le vide. Dans l'exemple cité, l'un des corps s'est volatilisé dans le vide avant que la température ait pu s'élever au degré nécessaire pour déterminer sa décomposition par l'autre corps.

J'ai lieu de penser que le vide pourra devenir quelquefois, dans les recherches expérimentales, un auxiliaire précieux, un véritable moyen d'analyse. Jusqu'ici, la diminution de la pression de l'air m'a paru apporter bien peu de changements dans les époques auxquelles les décompositions chimiques ont lieu, ainsi l'acide sulfurique concentré décompose le bioxalate de potasse à une température sensiblement égale, dans le vide comme sous la pression de l'air, j'ai observé des résultats analogues pour la décomposition, par la chaleur, du nitrate d'ammoniaque, de l'acétate de cuivre etc.

On ne saurait cependant se prononcer avec trop de circonspection sur cette uniformité d'action, en présence des observations assez nombreuses de perturbations que de fortes pressions peuvent apporter dans les époques habituelles des réactions chimiques.

Quant à la séparation des corps pyrogénés, au fur et à mesure de leur formation et avant que les matières qui leur donnent naissance aient subi une altération plus profonde, personne ne saurait contester l'utilité de l'emploi du vide, c'est de toutes les questions celle dont la solution me paraît devoir être la plus favorable, elle est écrite, en quelque sorte, dans l'énoncé même de la proposition.

La question de la distillation à haute et à basse pression aurait un intérêt industriel puissant, si l'on venait à constater que, sur des mélanges soumis à la distillation, le corps le plus volatil s'isole plus complètement dans le vide que sous la pression atmosphérique.

Ces circonstances ne paraissent pas se présenter pour l'alcool et l'eau en s'arrêtant aux limites de la pression atmosphérique, cela résulte du moins des expériences suivantes.

I 372 grammes d'alcool à 25 degrés centésimaux, à 15 degrés de tem

pérature, ont été soumis à la distillation sous la pression de 0^m,76 de mercure, en 30 minutes, ils se sont trouvés réduits à 279 grammes, qui n'avaient plus que 7 degrés alcoométriques, la température, au maximum, a été de 95 degrés

La même quantité d'alcool à 25 degrés, distillée sous la pression de 10 à 12 centimètres de mercure, avec une élévation de la température maximum de 58 degrés, a laissé, après une réduction du poids primitif de 93 grammes, un liquide qui marquait également 7 degrés. La distillation a duré 55 minutes

II 363^{gr},20 d'alcool à 50 degrés centésimaux, à 15 degrés de température, par une perte de 98 grammes faite en une heure sous la pression de 76 centimètres de mercure, la température maximum s'étant élevée à 90 degrés, ont laissé un résidu marquant 35 degrés à l'alcoomètre

• La même quantité d'alcool à 50 degrés distillée sous la pression de 10 à 12 centimètres de mercure, après le départ de 91^{gr},20 de matière, a donné un résidu marquant 36 degrés. La température maximum a été de 50 degrés, et la durée de l'opération, une heure

• III 272 grammes d'alcool à 80 degrés centésimaux, soumis à la distillation sous la pression de 76 centimètres de mercure, après avoir laissé échapper en vapeur 111 grammes de matière, ont donné un liquide qui avait conservé une densité de 74 degrés à l'alcoomètre. L'opération a été faite en 50 minutes, et la température maximum a été de 82 degrés

La même quantité d'alcool à 80 degrés, après avoir perdu, par distillation, 111 grammes en élevant la température à 48 degrés au maximum, la pression étant de 10 à 12 centimètres de mercure, a donné également 74 degrés à l'alcoomètre. L'opération n'a duré que 35 minutes

• On voit qu'en variant même un peu la durée des opérations dans le premier et dans le dernier essai, les résultats, quant à la densité du liquide restant, ont été les mêmes sous une faible pression comme à la pression ordinaire

Faut-il conclure de ces quelques expériences, que les résultats pour la distillation de tous les liquides seront les mêmes? Certes, non, car bien que j'aie remarqué que le rapprochement de l'époque de l'ébullition des divers liquides à la faveur des basses pressions ne diffère pas considérablement, il faut considérer que cette différence est à peu près nulle pour l'alcool et l'eau

• Il y a d'ailleurs, dans la distillation des liquides alcooliques, d'autres considérations qui réclament un examen plus approfondi de la question, il

s'agit de savoir comment se présente, à la distillation dans le vide, la question des huiles produites par la fermentation, enfin il y aura, dans la pratique, à tenir compte aussi de la rapidité avec laquelle les distillations dans le vide peuvent s'effectuer

L'industrie trouvera, sans nul doute, dans le vide, un moyen efficace d'obtenir, dans un grand état de pureté, les huiles essentielles des résines et des goudrons

Il est une opération industrielle où la diminution de la pression de l'air paraît pouvoir être appliquée avec succès, c'est la concentration de l'acide sulfurique

Le plus haut degré de l'aréomètre auquel il soit possible, à la pression habituelle, de concentrer l'acide sulfurique dans des chaudières de plomb, est de 61 à 63 degrés Baume. Le plus souvent on s'arrête à 60 ou 61 degrés, toutefois, en opérant avec quelques ménagements, les chaudières de plomb ne sont pas sensiblement attaquées, même en poussant la distillation au delà de 62 degrés

En chauffant l'acide sulfurique sous une faible pression, on rapproche son point d'ébullition suffisamment pour que la concentration puisse être complétée dans des vases de plomb

L'ébullition de l'acide à 66 degrés peut avoir lieu de 190 à 195 degrés, sous une pression de 3 à 4 centimètres de mercure, à 10 centimètres de pression la température s'élève à 215 degrés (1)

Quoique la température à laquelle le plomb est attaqué par l'acide sulfurique soit assez rapprochée du point d'ébullition de cet acide dans le vide, la concentration de l'acide sulfurique jusqu'à 66 degrés pourra s'exécuter en fabrique dans des chaudières de plomb et n'exposera pas plus les vases à être corrodés ou fondus, que l'opération telle qu'elle se pratique actuellement en arrêtant la concentration à 62 degrés de l'aréomètre

En faisant concentrer à faible pression, de l'acide jusqu'à 66 degrés, dans des ballons de verre contenant des lames de plomb, la concentration se produit avec facilité sans que le plomb soit sensiblement attaqué

Il reste à examiner les questions de l'exécution en grand des diverses applications du vide dont je viens de faire mention

(1) Pour la constatation des diverses températures dont il est question dans cette Note, toutes les observations ont été faites en chauffant très-lentement, dans des bains de sable, le thermomètre plonge dans les liquides jusqu'au 0 degré de l'échelle, la température de l'air extérieur étant de 15 degrés

Pour la distillation des alcools, des essences, etc , aucune altération n'étant exercée sur les vases de cuivre, l'on pourra puiser dans l'industrie sucrière les appareils nécessaires pour produire la vaporisation et la raréfaction de l'air et dans les procédés actuels de distillation les moyens de condensation

Pour la concentration de l'acide sulfurique, les difficultés sont plus sérieuses, toutefois l'industrie a déjà résolu des problèmes plus difficiles. En effet pour la construction des chaudières n'avons-nous pas le moyen de revêtir les vases de cuivre d'une couche épaisse de plomb, et d'établir promptement par les mêmes procédés de soudure des fermetures hermétiques? Comme moyen d'aspiration, n'avons-nous pas le jet de vapeur qui pourrait directement se décharger dans les chambres de plomb et entraîner les vapeurs et les gaz dus à l'ébullition de l'acide?

Il est à craindre toutefois que le jet de vapeur ne puisse pas suffire comme moyen de raréfaction et qu'il faille avoir recours à des moyens plus efficaces et plus dispendieux. Une grande difficulté s'est rencontrée dans l'emploi d'un appareil d'essai en plomb que j'ai fait construire récemment c'est le maintien de la température à la limite convenable pour ne pas exposer le plomb à être attaqué et l'acide à être chargé de sulfate de plomb.

En consignait ces premières et bien incomplètes observations, je prie l'Académie de vouloir bien constater que je ne fais qu'énoncer des espérances dans l'intérêt des progrès industriels, et que je sais faire la part des difficultés que l'on rencontre souvent, tant sous le rapport de l'exécution que sous celui de l'économie, l'application, aux travaux de nos manufactures de résultats de laboratoire d'ailleurs bien observés.

J'ai cru utile cependant d'appeler l'attention des industriels sur une application plus générale du vide, persuadé que si cette application s'est arrêtée jusqu'ici à la fabrication du sucre c'est que les avantages qu'elle peut procurer à d'autres industries n'ont pas été suffisamment appréciés »

GÉOLOGIE — Sur l'état de surfusion du quartz dans les roches éruptives et dans les filons métallifères, par M. J. FOURNET

Il est dans les sciences certains détails connus des initiés, mais qu'on a soin de passer sous silence, ou dont on ne parle que d'une manière vague, dans la crainte qu'un point de doute placé dans une théorie n'en compromette le succès, c'est ainsi qu'aucun des minéralogistes qui se sont occupés du quartz n'a discuté à fond certains phénomènes assez particuliers et dont la bizarrerie

paraît, entre autres, de nature à déjouer complètement l'idée du remplissage instantané des filons par des magmas fondus. Il a donc fallu porter sur eux une attention spéciale pour éviter le reproche précédent, et les prendre même comme point de départ de toute la série des effets dont il s'agit de donner l'explication, avant d'oser concevoir l'espoir d'avoir acquis l'assentiment des esprits rigoureux et habitués à n'accorder leur confiance qu'à un ensemble parfaitement motivé.

Un premier exemple suffit à pour faire apprécier toute la portée des objections auxquelles les formations quartzeuses peuvent donner lieu. Soient deux lames cristallines dont une de quartz est appliquée contre une autre de pyrite de manière à dessiner les rubanements d'un filon. Il arrivera dans ce cas que les cubes de la pyrite pourront enfoncer leurs saillies dans le quartz et la conséquence naturelle que l'on déduira de cette pénétration sera que la pyrite a cristallisé d'abord et que le quartz est venu après coup prendre l'empreinte de ces cristaux. Les partisans du système de la formation des filons à l'aide de sources minérales venant d'en bas ou d'en haut, ceux qui voient partout des sublimations, ou bien encore les géologues qui admettent des injections successives tous ceux-là, disons-nous, pourront trouver dans les morceaux de ce genre les plus beaux appuis en faveur de leur idée du remplissage des fentes par des incrustations successives. Par contre les partisans de l'injection instantanée et complète des filons par un mélange de matières à l'état de fusion, seront dans l'embarras, car d'un côté l'expérience apprend que la silice est du nombre des corps les plus réfractaires et de l'autre, tout le monde admettra volontiers que le persulfure de fer doit être rangé parmi ceux qui sont fusibles, en sorte que la conclusion à déduire de ces notions élémentaires est que le quartz, cristallisant le premier, aurait dû enfoncer ses sommets pyramidaux dans la pyrite au lieu d'en recevoir le timbre cubique.

Le même raisonnement s'appliquera soit aux empreintes que les masses quartzeuses auront reçues de diverses autres substances, soit aux entrecroisements dans lesquels les cristaux se montreront percés profondément et même d'outre en outre par les aiguilles de quelques autres minéraux plus ou moins fusibles, soit enfin aux cas où la matière quartzeuse enveloppera complètement des cristaux de nature différente, car tous ces faits seront du même ordre, et comme les accidents ou les associations de ce genre sont bien connus des minéralogistes et qu'ils abondent dans les collections, on nous dispensera d'en dresser ici le tableau détaillé.

« Ceci posé, à moins de vouloir en revenir aux anciennes révélées d'après

lesquelles on regardait ces cristaux enclavés comme des productions régulières du quartz, on conviendra qu'une bonne partie des exemples que l'on pourra rencontrer est plus que suffisante pour motiver la nécessité de l'arrivée du quartz postérieurement à la cristallisation des autres minéraux, ou bien, mieux encore comme on l'a déjà dit, quelques géologues y verront des preuves palpables de sa cristallisation à froid ou par voie humide car, diront-ils, la communication de l'excessive température d'une silice à l'état de fusion pur et simple est plus que suffisante pour opérer la dissolution ou la liquéfaction des métaux, des sulfures, des oxydes, des sels et des silicates contenus dans les filons. Si donc une lame de silice s'était appliquée sur l'un de ces corps, il y aurait eu des combinaisons de cette silice avec certains oxydes, dans d'autres cas, les cristaux auraient subi l'éclatement ou l'arrondissement des angles ou enfin, amenés à un état de ramollissement complet, ils auraient pris la forme et la disposition de grenailles empatées dans le quartz à la manière des noyaux dans les amygdaloides, et, en dernière analyse, ils se seraient façonnés sous l'influence de la cristallisation siliceuse au lieu de la maîtriser. Des lors la théorie de l'introduction postérieure de la silice dans un état de fusion, aussi bien que celle de son arrivée simultanée avec les autres matériaux des filons, ne devra plus être considérée que comme une de ces utopies dont il importe de débarrasser la science au plus vite, si même elle a pu fixer l'attention un seul instant.

Cependant, contrairement à ce que doit faire un géologue, nous nous sommes jusqu'à présent maintenu dans la position de ces amateurs qui se permettent la théorie dans leurs cabinets et d'après certains échantillons dont le choix spécial fait voir en quelque sorte tout ce que l'on veut. Il importe donc de revenir à la véritable base du raisonnement, qui se trouve, non dans quelques menus détails, mais dans tout l'ensemble des caractères d'un filon, et si l'on examine sous ce point de vue quelques-uns des échantillons que l'on pourra rencontrer, on appréciera bientôt une série d'autres effets qu'il importe aussi de faire ressortir.

Remarquons d'abord qu'il existe une foule de ces cristaux empatés qui auraient en quelque sorte dû demeurer suspendus dans le vide, en attendant que la silice vint les envelopper, car ils n'ont évidemment aucun autre support que cette gangue tel est notamment le cas pour les cobalts tucotés, les réseaux de titane, les dendrites de bismuth, etc., etc., dont la cristallisation, précisément à cause de cette circonstance, n'a jamais été considérée autrement que comme contemporaine à celle du quartz. Cette condition de coexistence est encore rendue plus essentielle par la texture régulière de certaines

roches granitoides à excès de silice ; car, pour se refuser à l'admettre, il faudrait avant tout avoir expliqué par quelle espèce d'équilibre répulsif les éléments feldspathiques et micacés se seraient maintenus à des distances réciproques si parfaitement égales, jusqu'à ce que les vapeurs ou les liquides quartzeux soient arrivés pour les cimenter définitivement ensemble.

» Mais cette nécessité de la formation contemporaine de certains minerais et de leur gangue, déduite de la simple disposition réciproque, est encore susceptible de recevoir une confirmation bien autrement concluante par les phénomènes suivants. En effet.

» 1°. Des cristaux de béril sont traversés par des cristaux de quartz dans les mêmes filons où le cas inverse a lieu d'après Patrin.

» 2°. Hutton possédait un échantillon de calcédoine, renfermant un cristal de spath calcaire, dans lequel la silice a reçu l'empreinte rhomboïdale, tandis que, réciproquement, les sphéroïdes de calcédoine ont laissé leurs empreintes sur le spath.

» 3°. Dans toutes les variétés de granit graphique, le feldspath et le quartz se sont pénétrés réciproquement, mais dans quelques-unes la forme des caractères hébraïques est déterminée par la cristallisation du quartz, et c'est à cause de cela que les figures se réduisent à des portions d'hexagones, tandis que, dans d'autres variétés, c'est la cristallisation rhomboïdale du feldspath qui a influé sur celle du quartz. Ce qui est encore digne de remarque, c'est qu'un même filon peut se composer à la fois de parties dont la cristallisation est irrégulière et de nœuds à caractères hébraïques, comme je m'en suis assuré pour les pegmatites de Montagny, près de Givors, et de Saint-Symphorien, près d'Autun ; de là une sorte d'indifférence qui appuie trop parfaitement la simultanéité de ces formations, pour que nous ayons pu la passer sous silence.

» 4°. Le mica des pegmatites de Montagny et de Saint-Symphorien imprime les tranches de ses grandes lames dans le quartz ; mais, par réciprocité, celui-ci l'ayant empêché de prendre sa forme régulière, il en est résulté des lames à bords dentelés et courbés.

» 5°. La tourmaline des pegmatites de Montagny a laissé sur le quartz des cannelures qui atteignent quelquefois jusqu'à 0^m,60 de longueur ; mais le quartz à son tour pénètre dans l'intérieur des tourmalines, de telle sorte que leur tranche dessine des caractères hébraïques d'un noir foncé, et par conséquent bien plus évidents que ceux qui résultent de l'emboîtement du quartz et du feldspath.

» 6°. Hutton signale encore dans les veines des collines de Sainte-Agnès,

en Cornouailles des cristaux de quartz bipyramidés, quelquefois traversés par de très minces aiguilles de tourmaline, et dont les surfaces sont sillonnées par une série de stries, régulièrement placées les unes à côté des autres, de manière à leur donner une extrême rudesse, ces stries sont évidemment produites par les impressions des lames du feldspath, dans lequel ces cristaux sont noyés.

7° Enfin, quelle que soit la nature de ces cristallisations empâtées ou formant cachet, on trouve, à côté des impressions les plus franches, un bien plus grand nombre de cas, dont la confusion est telle, qu'il est impossible de distinguer la part d'antériorité de l'un ou de l'autre corps, en sorte que certains porphyres granitiques, par exemple, ont leur quartz tantôt régulièrement cristallisé, tantôt seulement terminé à un bout et arrondi à l'autre, tantôt, enfin, il est complètement oblitéré.

• Ces derniers exemples sont relatifs à des silicates qui, appartenant à des roches éruptives, ne peuvent plus guère être l'objet d'une contestation sérieuse dans l'état actuel de la géologie, ils auraient donc pu être passés sous silence, s'ils n'eussent pour ainsi dire conduit du connu à l'inconnu, celui-ci étant représenté par les filons métallifères auxquels divers géologues attribuent encore un mode de formation tout à fait exceptionnel. En passant donc à ces derniers, on verra se reproduire pour les métaux natifs, pour les sulfures, pour les arseno-sulfures, la plupart des circonstances détaillées précédemment et dont une nouvelle énumération deviendrait fastidieuse; cependant un exemple d'un cas complexe ne sera pas superflu, et parmi les plus remarquables à citer en faveur de ces actions et réactions, il faut ranger le suivant, qui a été observé sur une galène et un quartz de Saint-Julien-Molin-Molette.

• Pour s'en faire une idée nette, il suffit de se figurer une lame de quartz cristallin blanc, dont la surface présente des dépressions cubiques du fond desquelles s'élancent, comme d'une geode, des pyramides d'égale dimension et à axes parallèles à ceux des pyramides qui hérissent la superficie de l'ensemble de la lame. Il ressort donc avec la dernière évidence, de cet engrenage réciproque, que les deux minerais ont cristallisé en même temps, sans se gêner essentiellement, et qu'ils ont été par conséquent dans un état quelconque de fluidité qui s'est maintenu jusqu'à ce que la galène ait pris sa forme spéciale. Dans d'autres échantillons de la même localité, les saillies du quartz, régulières en dehors de la cavité cubique, forment dans son intérieur des aspérités contournées presque coralloïdes, et il n'en est pas moins évident encore que la cristallisation de la galène a eu une certaine prépon-

dérance, en contrariant celle du quartz au point de mettre obstacle à la production des arêtes et des angles de ses cristaux

En tirant les conclusions de cette série d'observations, on voit

1° D'après les granits, les porphyres et autres roches analogues dont l'origine plutonique est désormais incontestable, que le quartz a dû se trouver dans un état progressif de cristallisation en même temps que les tourmalines, les feldspaths, les micas et autres minéraux plus fusibles auxquels il est associé d'une manière intime,

2° Que du moment où la possibilité de cette circonstance aura été admise relativement aux roches plutoniques, rien n'empêchera d'en faire l'application aux filons métallifères, puisque le quartz y a reçu de même les empreintes des galènes du cuivre gris, de l'or natif, etc., etc

3° Qu'enfin, les faits mentionnés dès le début et posés comme étant de nature à renverser toute la théorie de la cristallisation simultanée du quartz et des minéraux fusibles, se trouvent complètement tournés en faveur de cette dernière manière de voir

Rappelons maintenant que l'évidence de ces ajustements exacts des formes d'une rangée de corps cristallisés sur la forme d'une autre rangée, ainsi que celle de leur consolidation en une seule et même masse, est telle qu'elle a fait dire à Hutton, prématurément peut-être, mais cependant avec vérité comme on le verra bientôt, qu'ils offrent la plus forte preuve d'une cristallisation opérée dans l'état de fluidité simple, *comme celle que la chaleur seule*, parmi toutes les causes connues, peut produire. Que le quartz en cristallisant, dit-il encore plus loin, enferme un corps de feldspath, ou que le feldspath, en se durcissant, détermine la forme du fluide quartzéux, si nous avons, comme c'est ici le cas, deux masses solides, enfermante et enfermée, tout cela tend à démontrer que ces masses ont passé de l'état de fusion à l'état concret, et qu'elles ne sont point cristallisées, comme les sels, par solution.

Toute la question se trouve donc ramenée à l'explication de cette persistance de la silice dans un état quelconque de mollesse, tandis que les autres substances acquerraient leur forme cristalline, explication qui paraît difficile à donner, à cause du renversement complet dans l'ordre de solidification, tel qu'on peut le concevoir a priori d'après la qualité réfractaire bien connue du quartz. En un mot, pourquoi cette substance se montre-t-elle comme un corps tellement passif qu'il ne prend sa forme spéciale d'une manière nette qu'autant que quelques cavités lui livrent un espace suffisant pour qu'il puisse cristalliser en parfaite liberté? C'est là, comme on le voit, un problème que

ni Hutton ni les autres observateurs n'ont cherché à résoudre, bien qu'ils en aient parfaitement posé les bases, et dont il importe maintenant de donner la solution

Pour cela, faisons observer que cette anomalie, quelque remarquable qu'elle soit, n'est pas sans analogues parmi les corps qui se prêtent à l'expérimentation. Qui ne sait, par exemple, depuis les recherches de Fahrenheit, de Blagden, et surtout de M. Gay Lussac, que l'eau, dont le point de liquéfaction est à 0 degré, peut néanmoins se refroidir jusqu'à - 12 degrés sans se congeler? Bien plus, MM. Bellani et Faraday n'ont-ils pas démontré que le soufre possède la propriété de demeurer fluide pendant des semaines entières à une température de 94 degrés centigrades au-dessous de celle de son terme de fusion? De même, le phosphore persiste dans cet état jusqu'à 13 degrés centigrades au-dessus de zéro, enfin, une foule de dissolutions salines ne sont-elles pas absolument dans le même cas quand elles se conservent, à l'état liquide, bien en deçà du terme auquel leur dissolvant a été saturé à chaud? Dans ces états de surfusion ou de sursaturation, les matières sont souvent susceptibles de résister à l'influence de certains corps et cristaux étrangers, tandis qu'elles cristallisent d'ordinaire subitement quand on leur présente un cristal de même nature dont les molécules, s'offrant à celles du liquide par leurs côtés de plus grande attraction, les contraignent à s'aligner dans le même sens.

* Quel motif aurait-on maintenant pour refuser à la sélénite la faculté de demeurer pareillement à l'état de surfusion, surtout si l'on se rappelle que, d'après les intéressantes observations de M. Gaudin, cette substance est douée d'une viscosité qui ne peut qu'exalter les effets mentionnés ci-dessus pour le soufre et le phosphore? Faisons remarquer, d'ailleurs, que cette hypothèse n'est susceptible d'être infirmée par aucune objection, tandis qu'en l'admettant, tous les faits s'expliquent de la manière la plus simple, on conçoit alors comment, dans le calme qui succède à l'injection, les substances les plus cristallisables d'un magma se façonnent les premières en imprimant leurs arêtes et leurs angles sur la pâte molle qui les environne, et en la refoulant dans leurs intervalles, mais, quand le refroidissement est arrivé au degré convenable, cette pâte cristallise à son tour, et comme sa température relative est encore assez forte, elle se trouve en contact avec des corps qui n'ont pas perdu toute plasticité, et de là ces empreintes réciproques dont nous avons cité les nombreux exemples.

* Si l'on se reporte à mes observations sur la cristallisation dans les filons publiées en 1838, on verra s'agrandir singulièrement les phénomènes de cet ordre, sans les récapituler ici en détail, il sera du moins permis de rappeler

briefvement ces concentrations de la silice et autres minerais, soit le long des salbandes, soit autour de certains fragments étiangers introduits dans les filons. Je faisais voir alors que les applications successives des lames cristallines de nature diverse n'étaient pas en rapport avec l'ordre de fusibilité, et qu'elles dépendaient d'une cause plus puissante que la simple solidification occasionnée par un contact réfrigérant, cette cause me paraissait donc inhérente à cette espèce d'affinité qui détermine des cristallisations spéciales, suivant la nature et l'état de la surface des solides immergés dans des dissolutions complexes, et maintenant je pus compléter cette première indication par l'adjonction du principe de la surfusion. Il a permis au quartz de demeurer dans un état quelconque de mollesse, tandis que des minerais plus fusibles le précédaient dans l'ordre de la solidification et de la cristallisation, et, en définitive, une des objections les plus graves qu'il soit possible d'élever contre la théorie du remplissage instantané de certains filons par voie d'injection d'une masse fondue, se trouve levée par la simple admission, au rang des vérités géologiques, du fait physico-chimique, que le point de congélation peut n'être pas le même que celui de la liquéfaction.

Le rapprochement des résultats consignés dans le *Mémoire* actuel avec ceux qui ont été développés dans mes précédentes *Notices* sur les effets de la cristallisation et de la pression, contribuera sans doute aussi à faire comprendre qu'il est peu de conceptions susceptibles de donner des explications plus claires et plus rationnelles de tous les phénomènes de chimie géologique que celle de cette injection simultanée de tous les matériaux du remplissage de certaines fentes. Non-seulement elle simplifie tout, en liant les filons éruptifs aux roches éruptives par un même mode de formation, mais elle peut encore rendre raison des cas les plus complexes de la texture de ces masses congénères, enfin elle se prête à l'explication de certains phénomènes des gèodes et de certaines pseudomorphoses quartzieuses, serpentineuses, ou, en général, plutoniques, qui, n'ayant pas encore été appréciées d'une manière convenable par aucune des autres hypothèses émises jusqu'à présent, feront l'objet de diverses *Notices* que je publierai successivement, afin de compléter autant que possible, la série des faits dont la solution est indispensable pour asseoir définitivement l'opinion des juges compétents.

MÉCANIQUE APPLIQUÉE — *Aperçu de la réforme scientifique de la locomotion terrestre*, par M. HENRI WRONSKI.

« Conformément à la demande qui lui avait été adressée à l'occasion d'une

précédente communication, M Wronski transmet un Atlas où se trouve la représentation graphique de ses nouvelles roues et de ses nouvelles voitures. Cet Atlas étant la propriété d'un étranger qui est sur le point de quitter Paris, M Wronski ne le remet pas définitivement à la Commission de l'Académie, mais il le remplacera prochainement par les dessins originaux qui se trouvent en ce moment entre les mains d'un membre de la Commission des Ponts et Chaussées chargée par M le Ministre des Travaux publics, de faire un Rapport sur ces inventions.

Voici comment se termine la Note dont nous avons donné ci dessus le titre.

Nous terminerons cet aperçu de la présente réforme de la locomotion terrestre en rappelant ici les avantages pratiques qui résultent de cette réforme scientifique telle qu'elle est maintenant réalisée matériellement par des procédés techniques positifs, par de nouvelles machines locomotives déjà construites et expérimentées dans leurs éléments primordiaux. Ces avantages pratiques, qui sont positivement fixés dans la conclusion finale du dernier de nos trois Mémoires susdits, forment les deux résultats principaux que voici :

1° Pour la *locomotion inerte* pratiquée par des forces motrices extérieures telles que le tirage des chevaux ou d'autres animaux de trait on pourra opérer actuellement, par les nouveaux procédés de cette locomotion avec la moitié des forces dont on se sert aujourd'hui, même sur les pentes les plus élevées, et avec le tiers seulement de ces forces en terme moyen c'est-à-dire en compensant les dépenses de forces sur les pentes avec celles sur la voie horizontale,

2° Pour la *locomotion spontanée* pratiquée sur les chemins de fer par des forces motrices intérieures, telles que les machines à vapeur, on pourra, en se servant des nouveaux procédés de cette locomotion, l'opérer actuellement, sur les routes ordinaires, avec la même force et avec la même célérité qu'on l'opère aujourd'hui sur les chemins de fer par les faux procédés de locomotion dont on s'y sert encore, et, au besoin, on pourra dorénavant, à l'aide des véritables procédés de la locomotion spontanée, établir les chemins de fer sur la voie en terre des routes ordinaires, et y marcher avec des forces moindres et des vitesses plus grandes que celles dont on se sert actuellement sur les chemins de fer existants.

» Mais il ne faut pas perdre de vue que ces résultats, quelque incroyables qu'ils puissent paraître, ne sont pas de simples présomptions plus ou moins probables, mais bien d'irréfragables corollaires mathématiques déduits des susdits nouveaux théorèmes de la mécanique rationnelle, de ces théorèmes qu'il n'est plus au pouvoir de l'homme de méconnaître, aussi, en nous fon-

dant sur cette certitude absolue, avons-nous pense, comme nous l'avons déjà dit plus haut, et comme on ne saurait le répéter assez dans les circonstances actuelles, qu'il y aurait l'un ou l'autre, ou une *profonde ignorance*, ou une *profonde immoralité*, à vouloir dorenavant persister dans la barbare construction actuelle des chemins de fer et dans la fausse locomotion que l'on y pratique jusqu'à ce jour

CHIRURGIE — *Sur un cas de ligature de l'artere iliaque externe,*
par M MALGAIGNE

J'ai l'honneur de communiquer à l'Académie un nouvel exemple d'une operation qui n'a compte, jusqu'à ce jour, que quatre succes à Paris, je veux parler de la ligature de l'artere iliaque externe

J'ai lie cette artere, le 11 février dernier, sur un jeune avocat du barreau de Paris M Ame, rue de la Sainte Chapelle, n° 1, pour un anevrisme tres-volumineux qui occupait l'aîne gauche et remontait jusqu'au niveau de l'épine iliaque Une seule ligature fut appliquée, elle est tombee le matin du seizieme jour Au bout de cinq semaines, la plaie était en grande partie fermee, lorsque, le trente septieme jour, la poche anévrysmale se creva du côté de la plaie, et detruisit tout le travail de cicatrisation Cet accident n'a pas eu toutefois de consequences graves, et, le 11 mai, juste apres trois mois revolutus, M Ame a recommencé à plaider Il restait encore alors une tres petite surface suppurante, qui n'a pas tardé à se cicatiser complètement

Aujourd'hui la santé générale est parfaite le membre gauche est a peu pres aussi gros, aussi chaud et aussi fort que l'autre, bien que l'on n'y sente de pulsations dans aucune artere J'avais fait l'incision presque verticale, inclinant un peu vers l'ombilic, il n'y a pas d'indice de hernie jusqu'à présent

GÉOLOGIE — *Découverte d'ossements humains dans un bloc de calcaire marneux, aux environs d'Alais (Gard)* (Extrait d'une Lettre de M F ROBERT)

J'ai trouve près de la petite ville d'Alais (département du Gard), en cassant un bloc de calcaire marneux, des ossements fossiles sur lesquels j'ai l'honneur d'appeler toute votre attention et celle des membres de l'illustre société que vous présidez Ces fossiles sont d'un homme, il y a une portion assez considérable du crâne où s'aperçoivent un apophyse et des dents bien caractérisées telles que molaires, incisives et canines Le terrain qui renfermait ce fossile humain est une couche sédimentaire de nature calcaire d'environ

1 mètre d'épaisseur et d'une couleur jaunâtre. Il repose sur d'autres couches d'un calcaire très compacte à cassures concoides, alternant en divers lits de couleur noire et blanche, veines de chaux carbonatée. Au-dessus de l'ensemble de cette formation, se trouve un banc considérable de cailloux roulés qui appartient au terrain de transport diluvien, ce qui ne laisse aucun doute sur l'époque reculée où a été enveloppé ce fossile.

Aussitôt après cette importante découverte, je suis allé à Montpellier pour la communiquer à messieurs de la Faculté de Médecine et à la Société géologique de cette ville, l'honorable M. Marcel de Serres, professeur distingué des sciences de cette Faculté, en a convoqué immédiatement tous les membres pour leur soumettre ces fossiles et avoir leur opinion. Ils ont reconnu de la manière la plus explicite que je ne métais point trompé dans la détermination que j'en avais faite au premier abord, et que c'étaient véritablement des dents et une portion d'un crâne d'homme.

Plusieurs membres de l'Académie ayant exprimé le regret de ne pas trouver dans cette Note des détails qui leur auraient paru nécessaires pour prouver que la grotte du fossile faisait réellement partie du terrain au milieu duquel il a été trouvé, de nouveaux renseignements seront demandés à M. F. Robert.

M. MOREAU DE JONNES rappelle à l'occasion de la communication de M. Robert, qu'à la demande de M. Cuvier, il rédigea il y a une vingtaine d'années un exposé des circonstances locales qui éclaircissaient l'origine de l'homme fossile trouvé dans une roche calcaire, gisant au vent de la grande terre de la Guadeloupe. Ces circonstances ne furent pas favorables à l'opinion qu'on voulait faire prévaloir, que c'était un anthropolite antédiluvien. M. Moreau de Jonnes n'en tire aucune induction à l'égard des ossements fossiles qu'on vient de découvrir et il se borne à remarquer que les vestiges humains trouvés à la Guadeloupe avaient également, pour gisement, un banc de sédiments calcaires, appelés par les nègres, *Maçonnerie-Bon-Dieu*.

M. ARAGO donne communication de la Lettre suivante qui lui a été adressée par M. BURON, à l'occasion du projet de construction d'une grande lunette destinée à l'Observatoire.

Dans sa séance du 13 mai, l'Académie des Sciences, sur votre proposition, a nommé une Commission qui sera chargée de préparer, sous le rapport scientifique, des instructions pour l'exécution d'une grande lunette astronomique, destinée à l'Observatoire.

Le projet conçu est une oeuvre éminemment nationale, et je considère comme un devoir pour ceux qui ont été conduits à s'occuper des questions qui vont devenir l'objet des méditations de la Commission, de lui apporter le tribut de leur expérience et de leurs connaissances pratiques.

Déjà MM Guinand et Bontems ont chacun présenté à l'Académie des disques de grands diamètres, et tout récemment M Bontems, dans la séance du 20 mai, s'est engagé à fournir les masses de flint et de crown glass nécessaires à la fabrication d'un objectif même d'un mètre de diamètre.

Permettez-moi d'offrir, par votre intermédiaire, le concours de mes ateliers pour le travail des objectifs.

Depuis longtemps l'exécution des grands objectifs est l'objet de méditations et de mes travaux. Ce n'est point ici le lieu de dire les difficultés que j'ai rencontrées, et au nombre desquelles se placent, en première ligne, l'insuffisance des formules algébriques assignées pour la détermination des courbes à donner aux surfaces des verres, et peut-être aussi, quoi qu'on en puisse dire encore aujourd'hui, le défaut d'homogénéité que présentent les grandes masses de verre, celles de crown principalement. Ces détails trouveront naturellement leur place dans la Note que j'ai eu l'honneur d'adresser à l'Académie, en soumettant à son jugement une grande lunette astronomique qui est presque entièrement achevée, et dont l'objectif a 37 centimètres de diamètre et 8 mètres de distance focale.

Mais je ne crois pas inutile d'appeler l'attention sur des procédés d'exécution pratique qui me sont propres, et que la présente communication a pour objet de mettre à la disposition de la Commission.

Convaincu depuis longtemps que les méthodes en usage chez les opticiens sont insuffisantes quand il s'agit de travailler des masses de verre d'un poids considérable, j'ai cherché à y suppléer par l'emploi de procédés mécaniques.

L'appareil que j'ai fait construire à cet effet fonctionne depuis plus de six mois dans mes ateliers sous le rapport de la promptitude comme sous celui de la rigoureuse exactitude du travail, les résultats qu'il donne sont, je crois, irréprochables.

Le plus grand des disques de flint présentés à l'Académie par M Bontems, séance du 11 mars dernier, a été travaillé avec cette machine. Il en est de même de plusieurs objets qui sont en ce moment à l'Exposition des produits de l'industrie, notamment un objectif de 37 centimètres de diamètre et 8 mètres de foyer, une glace parallèle de 37 centimètres de diamètre, et

une grande loupe a brûler de 41 centimetres de diametre et 65 centimetres de foyer

Je serais heureux que la Commission nommee par l'Academie voulût bien s'assurer par elle meme de la valeur de ce nouveau procédé, et qu'elle le jugeât propre a faciliter l'accomplissement de la mission dont elle est chargée. J'offirais également de remettre à MM les membres de cette Commission, avec tous les prismes dont ils auraient besoin pour leurs expériences, une série d'instruments que j'ai établis pour servir a determiner rigoureusement les indices de refraction et de dispersion des différentes especes de verre

M VAN CLEEMPUTTE adresse quelques renseignements relatifs au *coup de foudre qui a occasionné l'incendie de la tour de l'horloge de Laon*. Comme on espere obtenir bientôt sur le meme fait d'autres renseignements qui ont été demandés à M l'ingenieur des Ponts et Chaussées, il a paru convenable de ne point presenter isolément ces deux communications en consequence, l'insertion de la Lettre de M Cleemputte a été ajournée

M ARAGO communique, d'après un journal que lui a transmis M DE LA PYLAIE, quelques détails sur *un coup de foudre qui, le 17 juin dernier, a frappé la flèche du clocher de Graces*. Le lendemain matin, la croix qui surmontait cette flèche n'avait pas encore été retrouvée

On lit dans le meme journal que, le 16 du meme mois, un voyageur qui parcourait de nuit la grieve entre Pontouson et le mont Saint-Michel s'est vu entouré de lueurs electriques. Ce fait, qui a souvent été observé a donné occasion à M de la Pylaie d'en rappeler un a peu pres semblable, mais qui s'est produit dans des circonstances insolites. A l'île de Nonmoutier, des lueurs de meme nature entourèrent la tête d'une femme qui était alors dans l'intérieur de sa maison

M le général DEMBINSKI adresse les pieces relatives a sa réclamation de priorité contre M Hallette, concernant le *mode de fermeture du tube propulseur dans les chemins atmospheriques*

M ARAGO annonce, à cette occasion, qu'il a reçu de M Hallette une réponse aux réclamations de M le général Dembinski. Ces différentes pieces seront remises à la Commission déjà nommée

M **DEMIDOFF** adresse le tableau des *observations météorologiques* faites à Nijne-Taguisk pendant le mois de décembre 1843

M **ARAGO** communique une Lettre qu'il a reçue de M **ANTINORI** concernant les importants travaux météorologiques qui vont être exécutés en Italie sous les auspices du grand-duc de Toscane

M **DE ROCHEMONT** écrit relativement à la poutique qui se conservait encore au commencement de ce siècle dans le village de Vaurenard en Beaujolais *de tirer des boîtes à feu à l'approche d'un orage* dans le but de préserver des ravages de la foudre les campagnes environnantes M de Rochemont a été témoin de ces essais qui se faisaient sous la direction d'un de ses oncles alors maître du village il ne les a pas vus réussir Comme il pense cependant qu'un fort ébranlement de l'air pourrait contribuer à dissiper le nuage porteur de la foudre, il voudrait qu'on essayât l'effet de détonations produites non plus à la surface du sol mais à la plus grande hauteur possible dans l'atmosphère et pour cela il propose l'emploi de fusées volantes

M **ARTUR** adresse une Note ayant pour titre *Explication des résultats obtenus par M Pelouze relativement aux actions de l'oxyde rouge de mercure sur le chlore*

Cette Note est renvoyée à l'examen de M Pelouze

M **ARAGO** communique, d'après une Lettre de M **RIQUIEN** d'Avignon le passage suivant d'une correspondance manuscrite de Linné qui appartient à M d'Hombres-Firmas

Ego primus fui qui parare constitui thermometra nostra ubi punctum congelationis 0 et gradus coquentis aquæ 100 et hoc pro hybernaculis horti si his adsuetus esses, certus sum quod ariderent

Ce passage, comme on le voit, semblerait indiquer que ce n'est pas à Celsius mais à Linné qu'on devrait attribuer l'application de l'échelle centigrade au thermomètre

M **SCHATTENMANN** prie l'Académie de hâter le Rapport de la Commission à l'examen de laquelle ont été renvoyées les diverses communications qu'il a faites sur *l'emploi du rouleau compresseur pour le cylindrage des chaussees en empièremens*

M BRANCOURT adresse la figure d'une *machine hydraulique* qu'il désire soumettre au jugement de l'Académie. M. Brancourt sera invité à donner une description de son appareil; c'est seulement lorsque cette description sera parvenue à l'Académie qu'une Commission pourra être nommée.

La séance est levée à 4 heures trois quarts.

A

ERRATA.

(Séance du 27 mai 1844.)

Page 971, ligne 6, au lieu de $3 \frac{ma + ma}{2}$, lisez $3(ma + 1$

Idem, ligne 15, au lieu de $\frac{5}{2}$, lisez 4.

Idem, ligne dernière, supprimez la note.

BULLETIN BIBLIOGRAPHIQUE

1. Académie a reçu, dans cette séance, les ouvrages dont voici les titres

Comptes rendus hebdomadaires des séances de l'Académie royale des Sciences
1^{er} semestre 1844, n° 22, in-4°

Comptes rendus hebdomadaires des séances de l'Académie royale des Sciences
2^e semestre 1843, 1 vol in-4°

Annales de Chimie et de Physique, par MM GAY-LUSSAC, ARAGO, CHIVREUL, DUMAS, PELOUZE, BOUSSINGAULT et REGNAULT, 3^e série tome XI
juin 1844, in-8°

Annales des Sciences naturelles, avril 1844, in 8°

*Voyages de la Commission scientifique du Nord en Scandinavie, en Laponie
au Spitzberg et aux Féroé sous la direction de M. GAIMARD*, 18^e livr in fol

*Voyage au Pôle sud et dans l'Océanie, exécuté, par ordre du Roi, sur les cor-
vettes l'Astrolabe et la Zélee, sous le commandement de M. DUMONT-D'URVILLE
pendant les années 1837 à 1840, atlas d'Histoire naturelle — Anthropologie*
par M. le docteur DUMOUTIER, 1^{re} livr, in-fol

*Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Paris — Rapports et Comptes rendus
des opérations de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance pendant l'année 1843*
in-4°

*Société diplomatique de Paris Extraits des Procès Verbaux des séances pendant
les années 1836 à 1843*, 4 broch in-8°

Des Sons de la parole, par M. L.-E. OLIVIER, 1 vol in-8°

*Essai sur le Phénomène erratique et sur les conséquences qu'on peut en tirer
en faveur de l'hypothèse d'une température inférieure à celle de nos jours —
l'Étude de Physique*, par M. NAPOLEON LERAS Strasbourg, 1844, in-8°

Analyse chimique de l'Eau minérale naturelle des sources d'Evieux (Cicuste)
par M. O. HENRY, in-8°

*Recherches sur la nature et le traitement d'une cause fréquente et peu connue de
Rétention d'urine*, par M. A. MERCIER, 1844, in 8°

*Hydro-pneumatique — Nouvelle Théorie des courants des ondes et du mou-
vement des alluvions, établie d'après les lois de la nature*, feuilles 13 à 16, in-8°

Esquisse d'une Carte géologique d'Italie, par M. DE COLLEGNO, une feuille
grand aigle Paris, 1844

*Société royale et centrale d'Agriculture — Bulletin des séances, Compte rendu
mensuel*, tome IV, n° 6 et 7, in-8°

Annales de Thérapeutique médicale et chirurgicale juin 1844, in 8

Mémorial encyclopédique, avril 1844, in-8°

Journal de Chimie médicale, juin 1844, in-8°

Journal des Connaissances utiles, mai 1844 in-8°

Encyclographie médicale, mai 1844, in 8°

Revue des Spécialités et des Innovations médicales et chirurgicales mai 1844
in-8°

Uranometria nova — Stellæ per mediam Europam solis oculis conspicuæ secundum veras lurs magnitudines et cælo ipso descriptæ a D-F ARGELANDRO
Berlin, 1 vol in-8°, avec atlas in-fol

On Dinornis. Sur le *Dinornis*, genre éteint de la famille des *Struthionidées*, avec description de diverses parties du squelette de cinq espèces d'oiseaux existantes autrefois dans la Nouvelle-Zélande, par M OWEN (Extrait des *Transactions zoologiques*, vol III) In-4°

Report. Rapport sur l'exploration du pays compris entre le Missouri et les montagnes Rocheuses sur la ligne de la rivière Kansas et de la rivière Plate, par M FREMONT, du corps des Ingénieurs topographes (Offert par M WARREN) In-8°

Det Kongelige Mémoires de l'Académie royale des Sciences de Copenhague, Sciences naturelles et Mathématiques, IX^e vol Copenhague, 1842, in-4°

Die Degel De l'Orgue et de sa construction, par M J-J SEIDL Breslau 1844, in 8°

Rendi conto Compte rendu des séances et des travaux de l'Académie royale des Sciences de Naples, n° 14, mars et avril 1844, in 8°

Gazette médicale de Paris, n° 22, in 4°,

Gazette des Hôpitaux, n° 62 à 64, in fol

L'Echo du Monde savant n° 40 à 43

L'Expérience, n° 361, in-8°

COMPTE RENDU

DES SÉANCES

DE L'ACADÉMIE DES SCIENCES.

SÉANCE DU LUNDI 10 JUIN 1844.

PRÉSIDENCE DE M. ÉLIE DE BEAUMONT.

MÉMOIRES ET COMMUNICATIONS

DES MEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE L'ACADÉMIE.

BOTANIQUE. — *Sur les cèdres de l'Atlas et l'emploi de leur bois dans les constructions mauresques d'Alger; par M. BORY DE SAINT-VINCENT.*

« Une grave indisposition ne m'ayant pas permis d'assister aux séances de l'Académie durant les premiers mois du printemps, je me trouve un peu en retard pour lui faire part des intéressantes communications qui m'ont été faites sur l'Algérie, par M. le capitaine Durieu de Maisson-Neuve, membre de la Commission scientifique, et qui explore en ce moment les parties du pays où il ne nous avait pas été possible de pénétrer lorsque nous visitâmes ensemble le nord de l'Afrique. »

« Peu de jours avant de tomber malade, j'obtins de M. le maréchal Ministre de la Guerre, de qui la sollicitude éclairée s'étend sur tout ce qui concerne notre belle conquête, que M. Durieu fût renvoyé sur les lieux afin de compléter nos travaux concernant le règne végétal et les diverses branches des sciences qui s'y rattachent, travaux qui s'étaient nécessairement ressentis de la manière dont les choses étaient conduites au temps où nous les commençâmes, c'est-à-dire lorsqu'il ne nous était pas donné de parcourir des con-

trées où l'on pénètre aujourd'hui avec la plus entière sécurité. Pendant quatre mois, et dans la saison la plus favorable, M. Durieu aura pu bien voir ce que nous n'avions pour ainsi dire qu'entrevu, et découvrir une multitude de faits qui nous seraient à jamais demeurés inconnus. Débarqué dans la soirée du 18 mars, ayant dans la journée suivante remis à M. le Gouverneur les lettres de recommandation dont il était porteur, et ayant reçu du maréchal, qui sait si bien apprécier les secours que la botanique peut prêter à l'agriculture, l'assurance que ses recherches seraient puissamment encouragées, notre infatigable et savant collaborateur était, dès le 30, sur la route de la chaîne de montagnes que nous qualifions improprement d'Atlas. Il remarquait en passant par Boufarick, dont nous avions, il y a quatre ans tout au plus, trouvé le séjour quasi pestilentiel, et dont la population entière était presque constamment tourmentée par d'opiniâtres fièvres, il remarquait, dis-je, combien ce lieu s'est assaini depuis qu'une colonisation bien entendue en a fait disparaître les causes d'insalubrité, il ne s'y voit plus un seul milade.

Parvenu à Blidah, M. Durieu y admira d'abord la rapidité avec laquelle cette ville où nous n'avions naguère laissé que des ruines déplorables se repeuple, se colonise et semblerait par les soins d'une administration par laquelle rien n'est enfin épargné pour faire disparaître les traces du vandalisme qui pesa si longtemps sur une des plus délicieuses contrées qu'il soit possible de concevoir. Notre infatigable voyageur songea ensuite à gravir sur le point culminant des hautes montagnes au pied desquelles s'étendent les bois d'orangers séculaires qui réalisent aux racines de l'Atlas la tradition du jardin des Hespérides. Il ne choisit pas pour y parvenir la route fréquentée au temps de nos premières excursions, et qui ne conduisait pas même au quai de la hauteur d'une chaîne qu'il ne nous avait été donné d'admirer qu'à distance respectueuse. Cette route, ou mieux ce sentier, ne conduit qu'à Aïn-Tlaidj, par corruption *Entelazim*, endroit où des 1840 l'armée occupait un poste fortifié, parce qu'on en distingue au loin, par le revers méridional, le télégraphe de Medeah, et dont on relevait ou ravitaillait la garnison au moyen de colonnes puissantes qui, dans le trajet, étaient ordinairement accompagnées à coups de fusil par les montagnards insoumis.

M. Durieu s'achemina par la base de la chaîne à quelques lieues dans l'est, et, tournant brusquement sur sa droite, il commença par escalader un contre-fort vers la cime duquel un Maure nous avait autrefois assuré qu'il existait des cèdres. Il eût fallu alors, pour y parvenir, l'appui d'une colonne de mille à douze cents soldats aguerris, maintenant un Français peut s'y rendre seul, mais il lui faut toujours de douze à treize heures de marche soutenue.

pour faire le voyage. Les pentes sont coupées de vallons et de gorges fertiles fort bien cultivées, ombragées par de nombreux arbres fruitiers, on y chemine à travers de longs vignobles très bien entendus, « et ce n'est pas sans surprise », écrit M. Durieu, que je trouvai ceux-ci disposés et taillés absolument selon la méthode employée dans la partie du Périgord où sont situées mes propriétés. Les habitants de ces pentes, qui récoltent d'excellents raisins dont ils se promettent bien d'alimenter à l'avenir le marché d'Alger, voyaient passer, sans songer à l'inquiéter, notre botaniste qui demeura convaincu que les indigènes de toutes les parties soumises des trois régences comprennent aujourd'hui combien il est de leur intérêt de vivre en paix avec des conquérants généreux qui, loin de les traiter à la turque, respectent leurs propriétés, donnent de la valeur à celles-ci par le prix toujours exactement payé qu'ils mettent à leurs produits, font droit aux moindres plaintes, et ne châtient que ceux qui méritent d'être châtiés.

C'est à peu près vers la moitié de la hauteur de la chaîne par 7 à 800 mètres, que cessent les cultures assez bien entendues, et qu'on ne rencontre plus d'habitations. Des bois de beillotes ou chênes à gland doux succèdent, en s'y entremêlant d'abord, aux pampres, aux ibricotiers, aux amandiers, ainsi qu'aux noyers, très répandus sur des sites assez abondamment peuplés. Peu après, M. Durieu trouva un premier cèdre de la plus belle venue et dont le feuillage était argenté, son vaste tronc, à 2 mètres du sol, se divisait en cinq grosses branches, et n'avait pas moins de 7 mètres de circonférence. Sa flèche s'élevait à près de 40. Peu après, la neige persistant sur toute la face septentrionale des monts, il s'en trouvait encore des couches de 1 à 2 mètres d'épaisseur, ce qui, rendant le chemin très difficile, déterminait le savant voyageur à profiter de la première enfila-ture qu'il rencontra, pour essayer des rivières méridionales, il les trouva entièrement débarrassées des traces d'un hiver qui paraît avoir été assez rigoureux cette année, même de l'autre côté de la Méditerranée. Ici les beillotes disparaissent, le peu de celles qui persistaient jusque dans la région plus élevée, y étaient d'une apparence souffrante, mais les cèdres devenant de plus en plus nombreux et gigantesques, la majestueuse forêt qu'ils composent ne peut plus être interrompue, et, autant que la vue pouvait s'étendre, cette forêt paraissait s'épaissir. Certains ravins abrités et descendant au midi, en recelaient des massifs de la plus grande beauté. Sur les flancs du mamelon culminant et sur le plateau peu étendu qui en couronne le faite, il en existe d'énormes, et qui doivent être d'un âge prodigieux : ceux-ci résistent depuis bien des siècles à des coups de vent furieux, si l'on en juge par les débris de quelques uns des arbres les

plus gros qui, par l'effort des ouragans, gisent brisés et déracinés ça et là. On en rencontre aussi plusieurs encore debout, mais brûlés et en partie charbonnés par l'effet de ces incendies qu'allument, vers la fin de la saison sèche, des pater barbares, incendies qui se propagent parfois jusqu'en ces régions élevées, et dont nous avons plus d'une fois admiré tristement, dans le calme des nuits d'été, les torrens lumineux circulant au loin sur de vastes étendues de terrain. En cheminant vers l'ouest, toujours à travers la forêt de cèdres qui s'y étend, pour gagner les crêtes aux racines desquelles s'agrandit si rapidement la ville de Blidah on ne tarde pas à reconnaître qu'un autre danger menace de destruction les arbres les plus majestueux. Les montagnards auxquels les colons demandent le bois de construction nécessaire aux maisons, qui s'élèvent comme par enchantement, coupent sans choix tout arbre qui se trouve à proximité, et détruisent souvent, pour en obtenir la plus médiocre pièce de charpente, des colosses de végétation respectés par mille tempêtes. Trouvant la matière bonne à exploiter, l'imprudente coignée des indigènes n'eût pas tardé à y causer de notables dégâts mais cet inconvénient signalé par M. Durieu au retour de son excursion, l'administration, qui veille maintenant avec la plus louable sollicitude au bien de la contrée, s'est hâtée de prendre des mesures pour régulariser la coupe des bois, en veillant à ce que ceux dont se couronne l'Atlas ne soient plus abattus indistinctement.

Au temps même de la domination turque en Barbarie, le bois de cèdre, que les savants de l'Europe ne soupçonnaient seulement pas y abonder, était fort employé dans Alger même, concurremment avec les troncs de certains genévriers (*Juniperus phœnicea* et *oxicedrus*, L.) qui viennent assez gros dans les dunes de quelques points des côtes. On employait surtout les branches cylindriques, qui n'ont que de 5 à 6 pouces de diamètre ou un peu plus et par tronçons de quelques pieds de longueur, pour soutenir obliquement les saillies produites, en dehors des maisons mauresques, par la place qu'y occupe le divan, meuble indispensable dans la longueur des appartements étroits où se plaisent les familles musulmanes. Ce sont des pièces pareilles, des mêmes bois, qui servent aussi comme d'arcs-boutants, entre les côtés des rues si étroites d'une ville où toutes les maisons s'appuient les unes contre les autres, et deviennent pour ainsi dire solidaires par le secours de ces sortes de bûches que les passants voient à hauteurs diverses au dessus de leur tête, fixées en travers d'un mur à l'autre, d'une manière si disgracieuse, mais pourtant fort motivée par la fréquence des tremblements de terre et la nature des matériaux qui entrent dans les con-

structions C'est en examinant de telles solives, et en reconnaissant que la plupart étaient en bois de cedre, que j'eus, dès les premiers jours de mon arrivée en Afrique, l'idée que l'arbre jusqu'alors réputé comme propre aux montagnes de la Syrie, pouvait aussi croître sur celles que l'on distinguait de la terrasse de ma propre habitation

Malgré les causes de destruction qui semblent menacer quelques parties des forêts de cedre dont se couvonne l'Atlas et desquelles l'Europe ignorent jusqu'à ces derniers temps l'existence à une si petite distance d'Alger ces forêts, convenablement aménagées, devront, loin de s'amoincir s'étendre au contraire sur toute la haute région de notre Afrique car telle est la facilité avec laquelle se reproduisent deux-mêmes les arbres précieux qui en forment l'essence, que M. Durieu vit de toutes parts et autour de lui leur germination naissante s'étaler sur le sol en pompeuses rosettes du vert le plus suave Ainsi, lorsque les forêts dont le mont Liban tira son antique célébrité auont entièrement disparu, et qui, au dire des voyageurs modernes, doit incessamment arriver, celles de l'Algérie, dans une autre partie du monde où nul n'en avait signalé l'existence perpétueront l'arbre pour ainsi dire sacré dont le plus sage des rois juifs tira les charpentes du temple qu'il élevait au culte de son Dieu

Il est maintenant évident pour M. Durieu qu'il n'existe point deux espèces de cedres comme on l'avait présumé d'après des renseignements entièrement inexacts On imagina un cedre de feuillage obscur comme celui qui fait époque vers le sommet du Jardin du Roi, et un autre cedre de feuillage argente On s'était même hâté de publier la figure de l'un et de l'autre Il sera maintenant difficile de considérer, même comme de simples variétés ces deux prétendues espèces La coloration des cedres tient à diverses circonstances, et principalement à l'âge de chacun En effet, dit notre savant voyageur, j'ai observé une grande quantité d'arbres qui, sur le même tronc et sur les mêmes branches, présentaient les deux teintes fort tranchées avec des nuances intermédiaires Quelques pieds cependant, mais c'étaient les plus grands, conséquemment les plus vieux, n'offraient que la couleur argentée d'une manière tranchante, ce qui leur donnait un aspect tout particulier La caducité se manifesterait donc aussi dans le cedre par la blancheur?

Quand, le 3 avril, M. Durieu herborisait paisiblement dans des régions où l'on n'eût pas osé supposer, il y a deux ans, qu'un Européen pût jamais s'aventurer, la chaleur était forte dans la plaine de la Métidja, qui semblait se dérouler sous ses pieds Le thermomètre, à l'ombre, sur le midi, mai-

quait 22 degres jusque dans Blidah Sur le point culminant de l'Atlas, ou la neige representait 0, un thermometre de comparaison suspendu aux branches d'un cedre a distance du sol, garanti du soleil, et par un calme atmospherique complet, se tenait à 12 degres

Passant, pour descendre des hauteurs qu'il avait parcourues, par Aïn-el-lazid, point déjà comparativement assez bas, où les cedres ont disparu, et peu apres lequel les beillotes cessent pour céder le terrain aux arbres fruitiers M Durieu voulut vérifier si une source voisine, réputée glaciale, était aussi froide qu'elle nous l'avait paru en 1842, son thermometre, qui a l'air libre, marquait 20 degres, ayant été plongé dans l'eau, tomba à 10 en moins d'un quart d'heure

CALCUL INTÉGRAL — Memoire sur la substitution des fonctions non periodiques aux fonctions periodiques dans les integrales definies, par M AUGUSTIN CAUCHY

On sait qu'une intégrale définie est toujours équivalente au produit de la différence entre les limites par une quantité comprise entre la plus petite et la plus grande valeur de la fonction sous le signe \int supposée réelle. Dans le cas où cette fonction conserve constamment le même signe pour des valeurs de la variable comprises entre les deux limites, la proposition que nous venons de rappeler fournit à la fois et le signe de l'intégrale définie, et deux quantités entre lesquelles sa valeur numérique se trouve comprise. Il n'en est plus ainsi dans le cas où la fonction sous le signe \int est une fonction periodique qui change plusieurs fois de signe entre les limites. On conçoit donc qu'il peut être souvent utile de substituer, dans les intégrales définies, des fonctions non periodiques à des fonctions periodiques. On y parvient à l'aide de la méthode qui se trouve exposée dans mon Mémoire de 1814 sur le passage du réel à l'imaginaire. Mais l'application de cette méthode exige quelquefois des artifices d'analyse qu'il convient de signaler. Ces artifices conduisent d'ailleurs à des résultats qui ne sont pas sans importance, spécialement à une transformation remarquable de certaines intégrales que l'on rencontre en astronomie, et de diverses transcendentes qui comprennent ces intégrales comme cas particuliers. C'est ce que l'on verra dans le présent Mémoire.

§ 1^{er} — Sur le passage des intégrales indéfinies aux intégrales définies.

n Soient $F(x)$ et $f(x)$ deux fonctions telles que l'on ait

$$(1) \quad D_x F(x) = f(x),$$

on aura encore

$$(2) \quad \int f(x) dx = F(x) + \text{constante},$$

et l'équation (2) fournira ce qu'on appelle la valeur de l'intégrale indéfinie

$$\int f(x) dx$$

Si d'ailleurs on nomme

$$x_0, X$$

deux valeurs réelles de x ; alors, en passant de l'intégrale indéfinie

$$\int f(x) dx$$

à l'intégrale définie

$$\int_{x_0}^X f(x) dx,$$

on trouvera généralement

$$(3) \quad \int_{x_0}^X f(x) dx = F(X) - F(x_0).$$

Toutefois l'équation (3) suppose que la fonction $f(x)$ reste finie et continue par rapport à la variable x , depuis la limite $x = x_0$ jusqu'à la limite $x = X$. Si cette même fonction devenait infinie pour une valeur a de x comprise entre ces mêmes limites, alors, ainsi que nous l'avons dit ailleurs, la notation

$$(4) \quad \int_{x_0}^X f(x) dx$$

devrait être considérée comme propre à représenter la limite vers laquelle

converge la somme

$$5) \quad \int_{x_0}^{x-\varepsilon} f(x) dx + \int_{x+\varepsilon}^X f(x) dx,$$

tandis que les nombres ε , ε' s'approchent indéfiniment de zéro. Cette limite pourrait d'ailleurs être finie ou infinie, ou même indéterminée. Car, dans certains cas, elle dépendra du rapport $\frac{\varepsilon'}{\varepsilon}$, ou plutôt de la limite de ce rapport, et il y a la valeur principale de l'intégrale sera celle qu'on obtiendra en posant $\varepsilon = \varepsilon'$, ou, ce qui revient au même, $\frac{\varepsilon'}{\varepsilon} = 1$.

Dans mes divers ouvrages ou Mémoires, j'ai particulièrement recherché ce qui arrive quand on suppose que la fonction $f(x)$ devient infinie dès qu'elle cesse d'être continue. Mais il peut arriver qu'une solution de continuité dans la fonction $f(x)$ corresponde à une valeur a de x pour laquelle cette fonction $f(x)$, ou du moins la fonction primitive dont $f(x)$ est la dérivée, passe brusquement d'une valeur finie à une autre, alors en posant toujours

$$\int f(x) dx = F(x) + \text{constante},$$

on verra les deux quantités

$$F(a - \varepsilon), \quad F(a + \varepsilon'),$$

converger vers deux limites différentes, tandis que les nombres ε , ε' s'approcheront indéfiniment l'un et l'autre de zéro. Nommons Δ la différence de ces limites, en sorte qu'on ait

$$(6) \quad \Delta = \lim [F(a + \varepsilon') - F(a - \varepsilon)]$$

Comme on tirera de la formule (3)

$$\begin{aligned} \int_{x_0}^{x-\varepsilon} f(x) dx &= F(a - \varepsilon) - F(x_0), \\ \int_{x+\varepsilon'}^X f(x) dx &= F(X) - F(a + \varepsilon'), \end{aligned}$$

il est clair que l'intégrale (4), considérée comme limite de l'expression (5),

aura pour valeur

$$F(X) - F(x_0) - \Delta$$

Donc à la formule (3) on devra substituer la suivante

$$7) \quad \int_{x_0}^X f(x) dx = F(X) - F(x_0) - \Delta,$$

Δ représentant l'accroissement instantané qu'acquiert la fonction $F(X)$, tandis que la différence $x - a$ passe du négatif au positif

Si, tandis que la variable x passe de la limite x_0 à la limite X la fonction $F(x)$ devenait successivement discontinue pour diverses valeurs

$$a, b, c,$$

de cette variable, alors, évidemment, l'équation (10) continuerait encore de subsister pourvu que l'on posât

$$(8) \quad \Delta = \Delta_a + \Delta_b + \Delta_c + \dots,$$

$\Delta_a, \Delta_b, \Delta_c, \dots$ désignant les accroissements instantanés que prendrait successivement la fonction $F(x)$, tandis que la différence $x - a$, ou $x - b$, ou $x - c$, passerait du négatif au positif

Pour montrer une application des principes que nous venons d'établir supposons

$$(9) \quad F(x) = [1 - he^{(a-x)^{s-1}}] e^{mx\sqrt{-1}},$$

a, m, h, s désignant quatre quantités dont les deux dernières soient positives, et considérons l'intégrale définie

$$\int_0^{2\pi} f(x) dx,$$

la valeur de $f(x)$ étant toujours donnée par la formule

$$f(x) = D_x F(x)$$

Si le nombre h reste inférieur à l'unité, alors, en vertu des principes que j'ai développés dans le chapitre VIII de l'*Analyse algébrique*, la fonction $F(x)$, déterminée par l'équation (9), restera fonction continue de x , depuis la

limite $x = 0$, jusqu'à la limite $x = 2\pi$; et l'on tirera de l'équation (3)

$$(10) \quad \int_0^{2\pi} f(x) dx = F(2\pi) - F(0).$$

Ajoutons que le nombre h étant, par hypothèse, inférieur à l'unité, on aura identiquement, 1° pour des valeurs positives de $\sin(x - a)$,

$$[1 - h e^{(a-x)\sqrt{-1}}]^2 = (\sqrt{-1})^2 \{ -[1 - h e^{(a-x)\sqrt{-1}}] \sqrt{-1} \}^2,$$

2° pour des valeurs négatives de $\sin(x - a)$,

$$[1 - h e^{(a-x)\sqrt{-1}}]^2 = (-\sqrt{-1})^2 \{ [1 - h e^{(a-x)\sqrt{-1}}] \sqrt{-1} \}^2.$$

Donc, au lieu de supposer la fonction $F(x)$ déterminée par l'équation (9), on pourra la supposer déterminée, 1° pour $\sin(x - a) > 0$, par la formule

$$(11) \quad F(x) = (\sqrt{-1})^2 \{ -[1 - h e^{(a-x)\sqrt{-1}}] \sqrt{-1} \}^2 e^{mx\sqrt{-1}},$$

2° pour $\sin(x - a) < 0$, par la formule

$$(12) \quad F(x) = (-\sqrt{-1})^2 \{ [1 - h e^{(a-x)\sqrt{-1}}] \sqrt{-1} \}^2 e^{mx\sqrt{-1}}.$$

Or, quoique au premier abord, il semble désavantageux de substituer, pour la détermination de la fonction $F(x)$, le système des formules (11) et (12) à la seule formule (9), toutefois, dans la réalité, cette substitution offre un avantage très-réel et qu'il importe de signaler. En effet, la formule (9) suppose nécessairement que le binôme

$$1 - h \cos ax$$

reste positif, et lorsqu'on a simultanément

$$h > 1, \quad 1 - h \cos ax < 0,$$

cette formule doit être supprimée avec la notation

$$[1 - h e^{(a-x)\sqrt{-1}}]^2,$$

qui cesse d'offrir, dans ce cas, un sens déterminé. Mais, dans ce cas même, les seconds membres des formules (11) et (12) présenteront des valeurs com-

plètement définies. Seulement la fonction $\Gamma(x)$ déterminée par le système de ces deux formules, deviendra discontinue pour $x = a$ et variera brusquement, tandis que la différence $x - a$ passera du négatif au positif, en recevant, dans ce cas, l'accroissement instantané

$$(13) \quad \Delta = [(\sqrt{-1})^2 - (-\sqrt{-1})^{2h}] (h-1) e^{-i\pi/4}$$

Donc, en supposant $h > 1$ et Δ déterminé par l'équation (13), ou, ce qui revient au même, par la suivante

$$(14) \quad \Delta = 2(h-1) e^{i\pi/4} \sin \pi s \sqrt{-1},$$

on devra substituer à la formule (10) cette autre formule

$$(15) \quad \int_0^{2\pi} f(x) dx = F(2\pi) - F(0) - \Delta$$

Si la quantité m se réduisant à un nombre entier, alors, en vertu de chacune des formules (11), (12), le facteur $F(x)$ ne changerait pas de valeur tandis que l'on ferait croître l'arc x d'une circonférence entière 2π . On aurait donc alors

$$F(2\pi) = F(0),$$

en sorte qu'on devrait réduire l'équation (10) à celle-ci

$$(16) \quad \int_0^{2\pi} f(x) dx = 0,$$

et l'équation (15) à la suivante,

$$(17) \quad \int_0^{2\pi} f(x) dx = -\Delta$$

§ II — Sur le passage du réel à l'imaginaire

Soit

$$(1) \quad x = re^{p\sqrt{-1}}$$

une variable imaginaire, dont r représente le module, et p l'argument. Soit de plus

$$f(x)$$

une fonction donnée de cette variable imaginaire. On aura généralement

$$(2) \quad D_r f(x) = \frac{1}{r\sqrt{-1}} D_p f(x).$$

Si d'ailleurs

$$f(x) = f(re^{p\sqrt{-1}})$$

reste fonction continue des variables r et p , entre les limites

$$r = r_0, \quad r = r_1, \quad p = p_0, \quad p = p_1,$$

alors, par deux intégrations successives, effectuées entre ces limites, on tirera de la formule (2)

$$(3) \quad \int_{p_0}^{p_1} [f(re^{p\sqrt{-1}}) - f(re^{p_0\sqrt{-1}})] dp = \frac{1}{\sqrt{-1}} \int_{r_0}^{r_1} [f(re^{p_1\sqrt{-1}}) - f(re^{p_0\sqrt{-1}})] \frac{dr}{r}.$$

Supposons maintenant que la fonction

$$f(re^{p\sqrt{-1}})$$

cesse, une ou plusieurs fois, d'être continue entre les limites données, et que chaque fois elle change brusquement de valeur, les accroissements instantanés qu'elle recevra pour diverses valeurs de r ou de p , devront être [voir le § I^{er}] successivement retranchées de la fonction placée sous le signe \int , dans le premier ou dans le second membre de l'équation (3).

Supposons, pour fixer les idées, que

$$f(re^{p\sqrt{-1}})$$

reste toujours, entre les limites $r = r_0$, $r = r_1$, fonction continue de r , mais que, p venant à varier entre les limites p_0 , p_1 , la même fonction devienne discontinue pour diverses valeurs intermédiaires

$$\alpha, \beta, \gamma, \dots$$

la variable p , et reçoive l'accroissement instantané

$$\Delta_\alpha, \text{ ou } \Delta_\beta, \text{ ou } \Delta_\gamma, \dots,$$

tandis que la différence

$$p - \alpha, \text{ ou } p - \beta, \text{ ou } p - \gamma, \dots$$

passé du négatif au positif. Alors à l'équation (3) on devra substituer la suivante

$$(4) \quad \left\{ \begin{aligned} & \int_{p_0}^{p_1} [f(r_1 e^{p\sqrt{-1}}) - f(r_0 e^{p\sqrt{-1}})] dp \\ &= \frac{1}{\sqrt{-1}} \int_{r_0}^{r_1} [f(re^{p_1\sqrt{-1}}) - f(re^{p_0\sqrt{-1}})] \frac{dr}{r} - \frac{1}{\sqrt{-1}} \int_{r_0}^{r_1} \Delta \frac{dr}{r}, \end{aligned} \right.$$

la valeur de Δ étant

$$(5) \quad \Delta = \Delta_s + \Delta_t + \Delta_r +$$

» Si, pour fixer les idées, on suppose

$$p_0 = 0, \quad p_1 = 2\pi,$$

et si d'ailleurs la fonction

$$f(re^{p\sqrt{-1}})$$

reprend, pour $p = 2\pi$, la même valeur que pour $p = 0$, l'équation (4) donnera

$$(6) \quad \int_0^{2\pi} [f(r_1 e^{p\sqrt{-1}}) - f(r_0 e^{p\sqrt{-1}})] dp = \sqrt{-1} \int_{r_0}^{r_1} \Delta \frac{dr}{r}$$

Si de plus on prend

$$r_0 = 0, \quad r_1 = \infty,$$

et si l'on suppose que la fonction

$$f(re^{p\sqrt{-1}})$$

s'évanouisse avec r , l'équation (6) donnera simplement

$$(7) \quad \int_0^{2\pi} f(e^{p\sqrt{-1}}) dp = \sqrt{-1} \int_0^1 \Delta \frac{dr}{r}$$

§ III. — Sur la substitution de fonctions non périodiques à des fonctions périodiques dans les intégrales définies

» Les formules établies dans les paragraphes précédents fournissent, comme on l'a dit dans le préambule de ce Mémoire, les moyens de trans-

transformer des fonctions périodiques en fonctions non périodiques dans un grand nombre d'intégrales définies, et en particulier dans celles qui représentent les coefficients de développements ordonnés suivant des puissances entières d'exponentielles trigonométriques. Entrons à ce sujet dans quelques détails.

Soit $\mathfrak{f}(p)$ une fonction donnée de l'angle p . En développant cette fonction suivant les puissances entières de l'exponentielle

$$e^{p\sqrt{-1}},$$

on trouvera généralement, comme l'on sait,

$$(1) \quad \tau(p) = \sum \mathfrak{A}_m e^{mp\sqrt{-1}},$$

la valeur de \mathfrak{A}_n étant

$$(2) \quad \mathfrak{A}_n = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} \mathfrak{f}(p) e^{-np\sqrt{-1}} dp,$$

ou, ce qui revient au même,

$$(3) \quad \mathfrak{A}_n = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} \mathfrak{f}(-p) e^{np\sqrt{-1}} dp,$$

et le signe \sum s'étendant à toutes les valeurs entières, positives, nulle ou négatives de m . On tirera d'ailleurs de la formule (2), en y remplaçant m par $-m$,

$$(4) \quad \mathfrak{A}_{-n} = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} \mathfrak{f}(p) e^{np\sqrt{-1}} dp$$

Or, dans les intégrales définies qui représentent ici les coefficients

$$\mathfrak{A}_m, \quad \mathfrak{A}_{-m},$$

les fonctions placées sous le signe \sum sont généralement des fonctions périodiques qui changent plusieurs fois de signe entre les limites des intégrations, en sorte qu'on ne pourra ni calculer des valeurs approchées de ces coefficients, ni même trouver leurs signes, sans recourir à une détermination souvent pénible des intégrales. Pour faire disparaître cet inconvénient, il importe de pouvoir, au besoin, remplacer dans les intégrales dont il s'agit les fonctions périodiques placées sous le signe \int par des fonctions non pé-

riodiques. On y parviendra effectivement dans un grand nombre de cas, à l'aide des formules établies dans les §§ I^{er} et II.

* Supposons d'abord, pour fixer les idées,

$$(5) \quad \mathcal{J}(p) = [1 - ae^{(\alpha-p)\sqrt{-1}}]^s,$$

a, s désignant deux quantités positives dont la première soit inférieure à l'unité. On pourra substituer à la formule (5), qui subsiste quel que soit p , le système de deux autres formules, en supposant, pour des valeurs positives de $\sin(p - \alpha)$,

$$(6) \quad \mathcal{J}(p) = (\sqrt{-1})^s \{ -[1 - ae^{(\alpha-p)\sqrt{-1}}] \sqrt{-1} \}^s,$$

et pour des valeurs négatives de $\sin(p - \alpha)$,

$$(7) \quad \mathcal{J}(p) = (-\sqrt{-1})^s \{ [1 - ae^{(\alpha-p)\sqrt{-1}}] \sqrt{-1} \}^s.$$

Cela posé, \mathcal{J}_m se réduira simplement à zéro. Mais l'équation (4), jointe à la formule (7) du § II, donnera

$$(8) \quad \mathcal{J}_{-m} = \frac{\sqrt{-1}}{2\pi} \int_0^1 \Delta \frac{dr}{r},$$

la valeur de Δ étant nulle, pour $r > a$, et déterminée, dès que l'on aura $r < a$, par la formule

$$(9) \quad \Delta = 2r^m e^{m\alpha\sqrt{-1}} \left(\frac{a}{r} - 1 \right)^s \sin \pi s \sqrt{-1}.$$

On trouvera en conséquence

$$(10) \quad \mathcal{J}_{-m} = -\frac{\sin \pi s}{\pi} e^{m\alpha\sqrt{-1}} \int_0^a r^{m-1} \left(\frac{a}{r} - 1 \right)^s dr.$$

D'ailleurs, en remplaçant r par ar , on tirera de la formule (10)

$$(11) \quad \mathcal{J}_{-m} = -\frac{\sin \pi s}{\pi} a^m e^{m\alpha\sqrt{-1}} \int_0^1 r^{m-1} (1-r)^s dr.$$

Il est aisé de reconnaître que la formule (11) subsiste pour toute valeur de s à laquelle correspond une valeur finie de l'intégrale comprise dans le second membre. Donc elle s'étend au cas même où l'exposant s deviendrait négatif, en demeurant compris entre les limites 0, -1.

» Au reste, il est facile de vérifier directement la formule (11). En effet, le coefficient A_{-m} de la $m^{\text{ème}}$ puissance de l'exponentielle

$$e^{p\sqrt{-1}},$$

dans le développement de la fonction (5), est évidemment le produit de l'expression

$$a^m e^{m\alpha\sqrt{-1}},$$

par

$$(-1)^m \frac{s(s-1)\dots(s-m+1)}{1\ 2\dots m} = -\frac{\Gamma(m-s)}{1(-s)\Gamma(s+1)}.$$

On aura donc

$$(12) \quad A_{-m} = -\frac{1}{\Gamma(-s)\Gamma(m+1)} a^m e^{m\alpha\sqrt{-1}}$$

et, comme on a aussi

$$(13) \quad \frac{\pi}{\sin \pi s} = \Gamma(s)\Gamma(1-s) = -\Gamma(-s)\Gamma(s+1),$$

on tirera de la formule (11), jointe aux équations (12) et (13),

$$(14) \quad \int_0^1 r^{m-1} (1-r)^s dr = \frac{\Gamma(m-s)\Gamma(s+1)}{\Gamma(m+1)}.$$

Or l'équation (14) est effectivement exacte, et s'accorde avec la formule connue

$$(15) \quad \int_0^1 r^{m-1} (1-r)^{n-1} dr = \frac{\Gamma(m)\Gamma(n)}{\Gamma(m+n)},$$

qui subsiste pour toutes les valeurs positives entières ou fractionnaires, ou même irrationnelles, des deux nombres m, n .

» Dans l'exemple que nous venons de choisir, la valeur de A_{-m} pouvant se calculer directement, et cette circonstance nous a permis de constater l'exactitude de l'équation particulière que nous avons déduite de nos formules générales. Appliquons maintenant ces mêmes formules à d'autres exemples dans lesquels la valeur de A_{-m} est inconnue, aussi bien que la valeur de A_m .

» Supposons, en premier lieu,

$$(16) \quad f(p) = [1 - 2a \cos(p - \alpha) + a^2]^2,$$

ou, ce qui revient au même,

$$(17) \quad \mathcal{J}(p) = [1 - ae^{(p-\alpha)\sqrt{-1}}]^s [1 - ae^{\alpha-p}\sqrt{-1}]^s,$$

α designant un angle quelconque, a une quantité positive inférieure à 1, et s une autre quantité positive ou une quantité négative comprise entre les limites 0, -1. Alors la valeur de \mathcal{J}_{-n} sera toujours déterminée par la formule (8). Seulement, pour $r < a$, la valeur de Δ se trouvera déterminée, non par l'équation (9), mais par celle-ci

$$(18) \quad \Delta = 2r^m e^{m\alpha\sqrt{-1}} \left(\frac{a}{r} - 1\right)^s (1 - ar)^s \sin \pi s \sqrt{-1}$$

Donc, à la place des formules (10) et (11), on obtiendra les suivantes

$$(19) \quad \mathcal{J}_{-m} = -\frac{\sin \pi s}{\pi} e^{m\alpha\sqrt{-1}} \int_0^a r^{m-1} \left(\frac{a}{r} - 1\right)^s (1 - ar)^s dr,$$

$$(20) \quad \mathcal{J}_{-n} = -\frac{\sin \pi s}{\pi} a^m e^{m\alpha\sqrt{-1}} \int_0^1 r^{m-s-1} (1-r)^s (1-a^2 r)^s ds$$

D'ailleurs, m étant positif, pour déduire de l'équation (20) la valeur de \mathcal{J}_a il suffira de changer dans le second membre le signe de $\sqrt{-1}$. L'équation (20) fournit une transformation remarquable de la transcendante

$$(21) \quad \mathcal{J}_{-m} = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} [1 - 2a \cos(p - \alpha) + a^2]^s e^{mp\sqrt{-1}} dp$$

Cette transformation était déjà connue, elle est comprise dans une formule que renferme le Mémoire de notre confrère M. Binet sur les intégrales euliennes.

Supposons enfin

$$(22) \quad \mathcal{J}(p) = \mathcal{Q}^s,$$

s étant positif, ou compris entre les limites 0, -1, et \mathcal{Q} designant une fonction entière de $\sin p$, $\cos p$, qui reste toujours positive pour toutes les valeurs réelles de l'angle p . Une analyse semblable à celle que Lagrange a employée dans un Mémoire de 1776, pourra être appliquée à la décomposition de \mathcal{Q} en facteurs réels du second degré, et alors, en designant par k une

(1084)

constante positive, on trouvera

$$(23) \quad \mathcal{Q} = k \xi \pi \varkappa$$

et π , \varkappa , étant déterminés par des équations de la forme

$$(24) \quad \begin{cases} \xi = 1 - 2a \cos(p - \alpha) + a^2 \\ \pi = 1 - 2b \cos(p - \beta) + b^2 \\ \varkappa = 1 - 2c \cos(p - \gamma) + c^2 \end{cases}$$

dans lesquelles on pourra supposer chacune des quantités a , b , c , comprise entre les limites 0, 1. Cette supposition étant admise, la transcendante

$$(25) \quad \mathcal{A}_{-m} = \int_0^{2\pi} \mathcal{Q} e^{mp\sqrt{-1}} dp,$$

pour i et c , pour une valeur quelconque du nombre entier m , transforme à l'aide des principes ci-dessus établis. Soient, pour plus de commodité,

$$\pi_a, \varkappa_a,$$

ce qui deviennent les facteurs

$$\pi, \varkappa,$$

quand on y remplace l'exponentielle $e^{p\sqrt{-1}}$ par le produit $re^{a\sqrt{-1}}$. Soient pareillement

$$\xi_b, \varkappa_b,$$

ce qui deviennent les facteurs

$$\xi, \varkappa,$$

quand on y remplace l'exponentielle $e^{p\sqrt{-1}}$ par le produit $re^{b\sqrt{-1}}$, etc. On trouvera

$$(26) \quad \mathcal{A}_{-n} = k' \frac{\sin n\pi}{\pi} \left\{ \begin{aligned} & e^{m a \sqrt{-1}} \int_0^a \left(\frac{a}{r} - 1\right)' (1 - ar)' \pi_a \varkappa_a r^{m-1} dr \\ & + e^{m b \sqrt{-1}} \int_0^b \left(\frac{b}{r} - 1\right)' (1 - br)' \xi_b \varkappa_b r^{m-1} dr \\ & + \text{etc} \end{aligned} \right.$$

Il est bon d'observer qu'en vertu de la seconde des formules (24), on aura

$$\mathcal{M} = [1 - be^{(\rho-\epsilon)\sqrt{-1}}] [1 - be^{(\epsilon-\rho)\sqrt{-1}}],$$

par conséquent

$$\mathcal{M}_\alpha = [1 - bre^{(\alpha-\epsilon)\sqrt{-1}}] [1 - \frac{b}{r} e^{(\epsilon-\alpha)\sqrt{-1}}],$$

et par suite, pour $r > b$,

$$(27) \quad \mathcal{M}'_\alpha = [1 - bre^{(\alpha-\epsilon)\sqrt{-1}}]^r [1 - \frac{b}{r} e^{(\epsilon-\alpha)\sqrt{-1}}]^r;$$

mais que la formule (27) ne pourra plus fournir la valeur de \mathcal{M}'_α , dans le cas où r deviendra inférieur à b , et que, dans ce dernier cas, on aura ou

$$(28) \quad \mathcal{M}'_\alpha = (\sqrt{-1})^r \left\{ - \left[1 - \frac{b}{r} e^{(\epsilon-\alpha)\sqrt{-1}} \right] \right\}^r [1 - bre^{(\alpha-\epsilon)\sqrt{-1}}]^r,$$

ou bien

$$(29) \quad \mathcal{M}'_\alpha = (-\sqrt{-1})^r \left\{ \left[1 - \frac{b}{r} e^{(\epsilon-\alpha)\sqrt{-1}} \right] \right\}^r [1 - bre^{(\alpha-\epsilon)\sqrt{-1}}]^r.$$

la formule (28) devant être employée quand $\sin(\alpha - \epsilon)$ sera positif, et la formule (29) quand $\sin(\alpha - \epsilon)$ sera négatif

• Si l'on désignait par

$$\mathcal{M}_\alpha, \quad \mathcal{M}_{\alpha, \dots}$$

ce que deviennent

$$\mathcal{M}_\alpha, \quad \mathcal{M}_{\alpha, \dots}$$

quand on y remplace l'exponentielle $e^{\rho\sqrt{-1}}$ par le produit $are^{\alpha\sqrt{-1}}$, si pareillement on nommait

$$\mathcal{L}_\alpha, \quad \mathcal{L}_{\alpha, \dots}$$

ce que deviennent

$$\mathcal{L}_\alpha, \quad \mathcal{L}_{\alpha, \dots}$$

quand on y remplace $e^{\rho\sqrt{-1}}$ par le produit $bre^{\epsilon\sqrt{-1}}$, et ainsi de suite, alors, à la place de la formule (26), on obtiendrait la suivante

$$(30) \quad \mathcal{A}_{-m} = - \frac{k' \sin \pi r}{\pi} \left\{ a^m e^{m\alpha\sqrt{-1}} \int_0^1 \mathcal{M}'_\alpha \mathcal{L}'_\alpha r^{m-1} (1-r)^r (1-a^2 r)^r dr \right. \\ \left. + \text{etc.} \dots \right.$$

et de cette dernière jointe aux formules (23), (25) on tireait

$$31) \left\{ \begin{aligned} & \int_0^{2\pi} \mathcal{L}' \mathcal{M} \mathcal{N}' e^{mpv'} dp \\ & = -\frac{k \sin \pi}{\pi} \int_0^1 [a^n e^{m\alpha\sqrt{1-r^2}} \mathcal{M}_n \mathcal{N}'_n (1-a^2 r)^2 +] r^{n-1} (1-r)^2 dr \end{aligned} \right.$$

Ajoutons que, m étant positif il suffira de changer $\sqrt{-1}$ en $-\sqrt{-1}$ dans les seconds membres des équations (26) et (30) pour que ces équations fournissent immédiatement, non plus la valeur de \mathcal{M}_n mais la valeur de \mathcal{N}_n .

Dans l'astronomie si l'on nomme v la distance de deux planetes m , m' une partie de la fonction perturbatrice, savoir, la partie correspondante à l'action mutuelle de ces planetes sera proportionnelle à $\frac{1}{v}$. Si d'ailleurs on nomme ψ l'anomalie excentrique relative à la planete m , le carré v^2 sera une fonction entiere de $\sin \psi$ et $\cos \psi$ du quatrième degre. Cela pose les formules (26), (30) ou plutôt celles qu'on en déduira en posant $s = -\frac{1}{2}$ fourniront une transformation remarquable des transcendentes qui representent les coefficients des puissances entieres de l'exponentielle

$$e^{sv'}$$

dans le developpement de $\frac{1}{v}$. Apres cette transformation les coefficients dont il s'agit se reduiront à des transcendentes elliptiques.

Lorsque le nombre m cesse d'être un nombre entier, l'intégrale que l'on fait de l'équation (25) peut encore être transformée, non plus à l'aide de la formule (7) mais à l'aide de la formule (4) du § II, et l'on se trouve ainsi encore conduit à des conclusions importantes que nous développerons dans un autre article.

M MILNE EDWARDS adresse de Flavignana (Sicile) un paquet cacheté contenant quelques résultats pour lesquels il desire prendre date, mais qu'il veut vérifier de nouveau avant de les rendre publics. Dans peu de temps, dit M Milne Edwards, j'espère pouvoir donner à l'Académie plus de détails sur mes travaux et probablement aussi sur ceux de M de Quatrefages, qui poursuit avec ardeur ses recherches sur les Mollusques et m'a déjà communiqué diverses observations intéressantes.

RAPPORTS

CLIMATOLOGIE — *Rapport sur un Memoire de M FUSTER intitule*
Recherches sur le climat de la France

(Commissaires MM Gradiehaud Payen de Gasparin rapporteur)

L'histoire météorologique n'a acquis que depuis bien peu de temps les matériaux qui peuvent lui donner un caractère d'exactitude. Ce n'est que depuis l'invention des instruments destinés à mesurer le degré d'intensité des phénomènes que l'on a pu obtenir quelques données approximatives et ce n'est que très-récemment que ces instruments ont obtenu soit dans leur construction soit dans la manière de les observer ce degré de précision qui inspire la confiance. Les observations qui nous ont été transmises avant ces derniers perfectionnements ne peuvent être employées qu'après avoir passé au creuset d'une sévère critique. Il y a même plusieurs ordres de phénomènes pour lesquels on n'a pas encore des moyens exacts d'observation tels que l'évaporation, la vitesse des vents, et d'autres pour lesquels tous les moyens nous manquent, comme quand il s'agit d'apprécier l'intensité de la lumière élément si important dans les phénomènes de la végétation. Avant l'époque du perfectionnement des instruments météorologiques, l'historien de la climatologie en est réduit à glaner péniblement dans les chroniques quelques faits qu'il est obligé d'interpréter avec plus ou moins de chances d'erreurs.

Quels sont ceux de ces faits que l'on peut employer utilement, et quel degré de confiance méritent-ils ? C'est une question qui vaut la peine d'être examinée.

On peut rarement avoir confiance dans l'appréciation générale d'un climat faite par un voyageur qui vient d'un climat fort différent. D'abord parce que ses impressions sont toutes relatives : qu'un habitant des tropiques ne manquera pas de trouver très-rigoureux les hivers de la zone tempérée, que celui de l'Italie se plaindra de ceux de la France septentrionale et de l'Allemagne, ensuite, parce que ce voyageur peut avoir parcouru le pays pendant une période de mois et d'années à intempéries extraordinaires, qu'il peut rencontrer des saisons plus froides, plus humides ou plus chaudes et plus sèches que les saisons ordinaires, parce que d'autres fois il se sera fait une idée exagérée des rigueurs du climat qu'il visite, et qu'elles ne répondent pas à son attente. Nous ne pouvons donc attacher une grande impor-

tance et celui de l'enseignement qui peut être influencé par tant de causes d'ailleurs les impressions relatives au tempérament et à la sensibilité de l'individu à ses antécédents et à ses dispositions morales. Mettons donc de côté ces expressions vagues et indéterminées ces épithètes hasardées de froid et de chaud qui ne sont que relatives et ne présentent rien d'absolu et ne nous attachons qu'aux faits caractérisés qui peuvent les accompagner. Il est possible que de ces faits qui peuvent avoir une signification positive nous allons citer quelques uns.

Quand la glace convie habituellement les rivières chaque année l'époque de leur congélation et celle de leur dégel est ordinairement bien connue et quand elle arrive plus tôt ou plus tard qu'à l'ordinaire le voyageur ne manque pas d'en être prévenu par les remarques des habitants du pays. Un tel enseignement peut être utilement consulté pour servir à juger du climat. Il en est autrement de la congélation accidentelle des rivières dans le pays où ce phénomène arrive rarement. Il ne dépend pas toujours d'un degré de froid excessif nous avons vu un des fleuves les plus rapides le Rhodan couvert d'une couche de glace assez solide pour que les voitures pussent le traverser dans la partie inférieure de son cours près de Roquemaure, et cela dans des années qui étaient loin d'être les plus froides que nous ayons éprouvées, tandis que la glace ne portait pas dans nos hivers si rigoureux comme les plus rigoureux. C'est que cette congélation dépend de plusieurs circonstances. 1° Si lors des gelées le fleuve est dans ses plus basses eaux il a perdu de sa rapidité et, en outre les bas-fonds rétrécissent son lit en plusieurs endroits dès lors les glaces des débâcles supérieures s'arrêtent plus facilement et parviennent à se souder. 2° Si il survient une débâcle dans le cours supérieur et qu'elle soit surprise par une nouvelle gelée les fragments de glace se prennent et couvrent le lit. Ainsi la congélation d'une rivière n'accuse pas alors une température excessive mais bien plutôt des succussions de gel et de dégel qui occasionnent des débâcles dans les montagnes et lient les glaçons entre eux dans les plaines. Un voyageur qui jugerait de la rigueur du climat par la constance de cette congélation accidentelle, pourrait en porter un très faux jugement.

Il peut arriver aussi que d'une époque à l'autre une rivière puisse devenir plus ou moins sujette à se congeler. Ainsi après qu'on aura réuni ses eaux dans un seul lit, qu'on aura fait disparaître les bas-fonds, les rétrécissements elle aura acquis plus de vitesse aucun obstacle n'arrêtera les glaçons au passage et ne commencera leur entassement la rivière qui se gélait habituellement pourra ne plus présenter que rarement ce phénomène.

Les pays à vents violents paraissent aussi avoir une température d'hiver plus rigoureuse que celle qui est annoncée par le thermomètre : c'est que nous la mesurons par nos sensations et que le calorique ne peut plus s'accumuler autour de notre corps, mais en étant incessamment enlevé nous éprouvons alors plus de souffrance d'une température relativement peu froide que si nous étions dans un milieu tranquille avec une température beaucoup plus basse.

Certaines habitudes populaires tiennent à la permanence de la neige sur la terre et peuvent servir d'indice de la longueur et la persistance du froid en hiver. L'usage général des traîneaux est en particulier très-caractéristique. Quand dans chaque maison, dans chaque ferme, dans chaque caban on trouve des traîneaux et des patins on peut affirmer que l'hiver du pays a beaucoup de durée.

En avançant beaucoup vers le nord, on cesse de pouvoir faire des semailles de printemps. Quand le froid se prolonge beaucoup, il ne reste plus assez de temps entre sa cessation et le solstice d'été pour pouvoir cultiver la terre, l'ensemencer et voir mûrir les moissons. Cette circonstance agricole est donc un indice très sûr de la nature des hivers, comme aussi l'absence de ces semailles printanières vers le midi annonce que l'on entre dans un climat dont les printemps sont généralement secs.

La végétation étant sous l'influence la plus directe du climat, nous fournirait d'excellents matériaux pour établir son caractère météorologique. Ainsi l'existence de palmiers ou d'oliviers dans un pays où ils ne portent pas de fruits, nous annonce que l'hiver y est tempéré, mais que l'été n'y atteint pas le degré de chaleur nécessaire pour amener le fruit à sa perfection. Les faits qui concernent la vigne demandent à être examinés de très-près car ils sont quelquefois équivoques.

» L'usage général du vin, le prix que l'on attache à cette liqueur en raison de l'éloignement où l'on se trouve des lieux où elle se produit facilement, a étendu fort avant dans le nord la culture de la vigne. La limite de la maturité de ses espèces les plus précoces est mal connue, si nous entendons par maturité cet état de raisin produisant un moût assez sucré pour donner par la fermentation un vin assez alcoolique pour ne pas passer presque immédiatement à la fermentation acide. Le point précis où s'arrête la possibilité d'obtenir, année commune, des vins qui puissent se conserver au moins une année, n'est pas déterminé, mais, en général il est probable que la culture de la vigne cesse avant d'avoir atteint la limite où l'on n'obtiendrait des moûts assez sucrés que dans des années extraordinaires et qu'au midi de ce

point extreme, l'extension de la culture depend des moyens de transport, du regime fiscal, de toutes les circonstances, en un mot, qui peuvent faciliter ou entraver le commerce entre les pays ou l'on produit bien et économiquement, et ceux qui ne possèdent pas ces avantages. Ainsi ces limites dependent surtout de l'état social, et variables comme lui, ne peuvent être d'un grand poids dans la détermination d'un climat.

Quant à l'époque de maturité des végétaux dans les questions de climatologie, il est bien important de faire une distinction. On sait que les fruits mûrissent quand ils ont obtenu depuis l'époque du développement des bourgeons, ou mieux encore, dans nos climats, depuis l'époque du renouvellement de leur végétation au printemps, une certaine somme de degrés de chaleur. Quand le climat d'un pays est tel qu'un végétal a reçu cette somme de chaleur aux environs du solstice d'été, il est évident que l'époque précise de la maturité doit varier de très-peu de jours, à cause du fort contingent que chaque jour apporte pour compléter cette somme, mais quand l'époque tombe après le 15 juillet, plus elle s'éloigne et plus l'époque de la maturité peut varier, parce qu'il faut alors un plus grand nombre de jours pour arriver à ce complément. Ainsi dans le midi de la France, les moissons ne varient pas de huit jours. A Paris, il y a quelquefois plus de quinze jours du terme le plus satisfaisant qui est le plus éloigné. Dans tous les cas, on aura soin de ne comparer que des graines semées à la même époque, avant ou après l'hiver. On conçoit aussi que, pour les raisins qui mûrissent après l'équinoxe d'automne, les variations doivent être encore plus considérables. On nous a déjà donné le tableau de l'époque des vendanges à Dijon depuis des temps fort reculés, et nous demandons à l'Académie la permission de profiter de cette occasion pour placer ici, pour le conserver, un tableau des vendanges des environs de Paris vers la fin du siècle dernier, que nous trouvons dans les manuscrits de Cotte, déposés à la bibliothèque de la Société royale et centrale d'Agriculture (1).

Années	Epoque de la vendange
1767	19 octobre à Montmorency
1768	6 octobre, <i>idem</i>
1769	2 octobre, <i>idem</i>
1770	15 octobre, <i>idem</i>
1771	7 octobre, <i>idem</i>

(1) A la fin du journal in folio, de 1791 à 1805

(1091)

Années	Epoque de la vendange
1772	1 octobre, à Montmorency
1773	11 octobre <i>dem</i>
1774	6 octobre, <i>idem</i>
1775	25 septembre <i>dem</i>
1776	10 octobre, <i>idem</i>
1777	13 octobre <i>lem</i>
1778	28 septembre <i>dem</i>
1779	27 septembre <i>idem</i>
1780	25 septembre, <i>idem</i>
1781	10 septembre, <i>idem</i>
1782	17 octobre à Laon
1783	29 septembre, <i>idem</i>
1784	21 septembre, <i>idem</i>
1785	3 octobre <i>dem</i>
1786	5 octobre <i>dem</i>
1787	15 octobre, <i>idem</i>
1788	15 septembre, <i>idem</i>
1789	5 octobre, <i>idem</i>
1790	27 septembre à Montmorency
1791	3 octobre, <i>idem</i>
1792	8 octobre <i>idem</i>
1793	30 septembre <i>idem</i>
1794	12 septembre <i>idem</i>
1795	5 octobre <i>idem</i>
1796	6 octobre <i>idem</i>
1797	2 octobre, <i>idem</i>
1798	17 septembre, <i>idem</i>
1799	17 octobre, <i>idem</i>
1800	29 septembre, <i>idem</i>
1801	1 octobre, <i>idem</i>
1802	27 septembre <i>idem</i>
1803	3 octobre, <i>idem</i>
1804	27 septembre <i>idem</i>
1805	17 octobre, <i>idem</i>
1806	22 septembre, <i>idem</i>
1807	24 septembre, <i>idem</i>
1808	26 septembre, <i>idem</i>
1809 . . .	2 octobre, <i>idem</i>
1810 . . .	4 octobre, <i>idem</i>
1811 . . .	19 septembre, <i>idem</i>
1812 . . .	8 octobre, <i>idem</i>
1813	7 octobre <i>idem</i>
1814	10 octobre, <i>idem</i>

Dans cette période de 48 ans, l'époque moyenne de la vendange a été le 2 octobre l'époque la plus hâtive le 10 septembre, en 1781, l'époque la plus tardive le 19 octobre, en 1767, l'intervalle est de 40 jours, mais on a vu les vendanges faites, en 1787, le 15 octobre, et en 1788, le 15 septembre, en 1803, le 17 octobre, et en 1806, le 22 septembre. Ainsi, d'une année à l'autre, on trouve quelquefois un intervalle de 30 jours.

Si la maturité du fruit est encore plus retardée, l'époque de la maturité devient encore plus incertaine. Aussi ne cueille-t-on l'olive vraiment mûre que dans les pays où l'on attend qu'elle se détache de l'arbre, mais les inconvénients de ces récoltes successives ont fait préférer de choisir, avant l'hiver, une époque moyenne à laquelle on cueille le fruit plus ou moins mûr et par conséquent renfermant quelquefois une quantité d'huile moins grande que celle que l'on aurait obtenue d'une parfaite maturité, qui ne serait arrivée qu'au printemps suivant et seulement dans les climats où l'olive n'aurait pas été frappée par la gelée avant l'hiver.

Les débordements de rivières arrivant coup sur coup ou ne se renouvelant qu'après un assez long intervalle, ne sont pas non plus des preuves de changements dans un climat. Votre rapporteur a exposé, il y a peu de temps dans un Mémoire, ce qui avait rapport à ces périodes de longueur indéterminée qui résultent de certaines successions de météores, bientôt remplacées par d'autres séries. Il ne prolongera pas cette discussion, mais, pour compléter ce qu'il vous avait dit à ce sujet, il croit devoir noter ici les années des grands débordements du Rhône 1226, 1345, 1352, 1353, 1358, 1433, 1471, 1554, 1566, 1570, 1580, 1581, 1602, 1674, 1679, 1694, 1706, 1711, 1715, 1747, 1754, 1755, 1801, 1810, 1811, 1827, 1840, 1841, 1842, 1843.

Votre Commission a dû se poser ces règles de critique quand elle a examiné le Mémoire de M. Fuster que vous lui avez confié. Ce Mémoire est intitulé *Recherches sur le climat de la France*, et les résultats auxquels l'auteur est arrivé seraient de la plus haute importance, s'ils pouvaient être admis tels qu'il vous les a présentés. En effet, selon lui, des changements considérables de climat auraient eu lieu à différentes époques et formeraient de grandes périodes météorologiques où la température aurait passé successivement du froid au chaud et du chaud au froid. Si l'auteur était parvenu à établir solidement l'existence de ces périodes, il aurait fait la découverte la plus inattendue et la plus importante, car non-seulement elle ouvrirait la voie aux recherches sur la périodicité des modifications de l'atmosphère, que l'on n'a basées jusqu'à présent que sur de pures hypothèses, mais encore il expliquerait un grand nombre de faits intimement liés à l'histoire civile des

peuples et à celle des cultures. C'est donc avec une vive curiosité que nous avons étudié ce *Memoire* et avec le plus grand soin que nous avons cherché à apprécier les preuves apportées à l'appui des assertions de l'auteur. On peut résumer ses propositions ainsi qu'il suit :

1° A l'arrivée des Romains dans les Gaules, le climat était froid et humide.

2° Après la conquête, le climat s'adoucit progressivement du sud au nord.

3° Le I^{er} et IX^{ème} siècle marquent la limite de l'adoucissement du climat. Il reste stationnaire pendant 200 ans, mais vers l'an 1200, il entre dans une période de décroissement progressif de température qui s'est prolongée jusqu'à nos jours.

M. Fuster appuie son opinion de l'état froid et humide des Gaules lors de la conquête sur plusieurs passages de César et de Diodore de Sicile. Selon le premier, l'hiver arrivait de bonne heure, il était plus froid qu'en la Grande-Bretagne, l'abondance des neiges interceptait les communications entre les peuples du centre du pays, les vents du nord-ouest soufflaient avec violence sur les côtes de l'Océan. Quant à la précocité des hivers, César en parle probablement en les comparant à ceux d'Italie, car nulle part il ne fixe de date précise. L'auteur affirme que ses troupes entraient en quartiers d'hiver à la fin de septembre. Dans un pays sans route, sans abris assurés, serait-il bien étonnant qu'un général qui voulait ménager ses troupes, eût devancé l'époque ou la mauvaise saison aurait pu être funeste à leur santé, celle où les débordements des rivières auraient entravé leurs communications? Mais en lisant attentivement les *Commentaires*, nous trouvons que César met, chaque année, ses troupes en quartiers d'hiver après avoir accompli ses entreprises, et que nulle part il ne fixe l'époque de la séparation de son armée, pas même dans les passages indiqués par l'auteur en marge de son *Memoire*.

La neige n'a pas cessé d'intercepter les communications des peuples du centre de la France en hiver. On ne traverse pas certains plateaux de l'Auvergne, du Velay, du Gévaudan, du Limousin pendant une partie de l'hiver, surtout quand il fait des tourmentes de vent sans courir les plus grands dangers, et l'on compte chaque année plusieurs victimes de leur impudence. L'hiver continue à être plus froid en France que dans la Grande-Bretagne. La moyenne température de l'hiver est à Londres de 4°,2, à Plymouth de 6°,9, tandis qu'elle n'est à Paris que de 3°,3. Enfin les vents d'ouest soufflent toujours habituellement et violemment sur les côtes de l'Océan.

Diodore de Sicile nous dit que les hivers des Gaules étaient précoces et longs, que les fleuves et le Rhône lui-même se gelaient et pouvaient porter des voyageurs et même des armées et des chariots que le climat des Gaules leur permettait puis la culture de l'olivier, du figuier et de la vigne, et que ses habitants suppléaient au vin par l'hydromel.

Quant à la congélation des fleuves et même du Rhône nous avons vu qu'elle se représente encore quelquefois, et Diodore de Sicile ne dit pas qu'il soit un état permanent se reproduisant tous les hivers il a recueilli des faits extraordinaires et ce sont ces faits que l'on raconte aux étrangers et qu'ils constatent le plus volontiers. Nous savons par Justin que l'olivier existait en Provence depuis l'arrivée des Grecs Phocéens, en parlant de la Gaule Diodore a donc fait abstraction de sa partie méridionale et il ne nous dit encore que ce que nous voyons de nos jours pour l'olivier et le figuier nous aurons plus tard occasion de revenir à ce qui concerne la vigne.

Ainsi on le voit, les preuves apportées par M. Fustel établissent seulement que le climat des Gaules était dans cette première période à peu près tel qu'il est aujourd'hui mais cette conclusion ne détruit pas l'argumentation de l'auteur. Nous avons vu, en effet, que ce climat rigoureux des premiers siècles il fait succéder un notable adoucissement après lequel il revient graduellement à sa première rigueur. Ainsi le rapprochement du climat de la France actuelle et celui de la Gaule sous César prouverait seulement que nous sommes revenus aujourd'hui à notre point de départ. Ce qu'il importe surtout pour lui de constater c'est la température élevée des hivers qui a succédé pendant une longue période aux hivers plus froids de la première époque et de l'époque actuelle.

Voici sur quelle série de faits l'auteur établit les preuves de ce nouvel état de choses. Strabon rapporte que la vigne et le figuier ne dépassaient pas, de son temps, les montagnes des Cévennes. Quand Domitien fit arracher les vignes dans les Gaules, elles avaient atteint Autun. Enfin, sous Julien la vigne et le figuier se montraient aux environs de Paris il est vrai que le figuier n'y passait l'hiver que bien empaillé, comme il le fait encore aujourd'hui. Si l'on ajoute que, d'après le *Misopogon*, la Seine charriait pendant l'hiver des morceaux de glace semblables à des cloûtes de maille, on commencera à ne plus ajouter autant de confiance à la solidité des preuves tirées de l'avancement de la vigne vers le nord. D'autant plus que jusqu'à présent nous la trouvons seulement à la limite où elle arrive encore aujourd'hui, quoique nous venions de constater que, par la détérioration préétablie du climat survenue depuis, nous en soyons revenus à celui qu'avait la

Gaule du temps de César. Mais il est une preuve de l'adoucissement de ce climat dans le 1^{er} siècle qui serait sans réplique, et sur laquelle nous avons cru devoir nous arrêter.

» M. Fuster dit que, dans sa Lettre aux Athéniens, Julien nous apprend que de son temps les blés étaient mûrs au solstice d'été dans le nord de la Gaule. Comme aujourd'hui les moissons n'ont lieu dans ce pays qu'à la fin de juillet, si du temps de cet empereur la maturité du froment était complète à la fin de juin, on ne pourrait plus mettre en doute ce très-notable changement dans la marche des saisons, et nous dispenserions l'auteur de toute autre preuve.

» Nous avons eu recours au passage cité dans la Lettre de l'empereur Julien au peuple et au sénat d'Athènes. Ne voulant pas nous fier complètement à la version latine, nous avons prié M. Maury, sous-bibliothécaire de l'Institut, de vouloir bien vérifier la conformité du texte grec avec cette version. Il est résulté de cette étude, que l'empereur Constance donna ordre à Julien, qui n'était alors que César, de partir à l'époque du solstice d'été ou d'hiver, selon les variantes du texte qui indiquent ces deux leçons. Après avoir dit qu'il exécuta cet ordre, Julien raconte une longue série d'événements, la prise de Cologne, celle de Strasbourg, le passage des Vosges, la pacification des Gaules. Plusieurs années peuvent s'être ainsi écoulées depuis son départ à l'un des solstices, et au bout de ce temps, il dit que Constance, revenant de Perse, lui donna l'ordre de réunir à Briançon (*Brigantium*) cet énorme approvisionnement de grains s'élevant à 3 millions de médimnes, et d'en disposer en égale quantité tout le long des Alpes cotiennes. Or l'arrivée de Julien dans les Gaules est de l'an 355, celle de la marche de Constance, dont l'arrivée fut prévenue par une proclamation de Julien comme empereur, est de 360; et cependant c'est en rapprochant l'époque de l'arrivée de Julien au solstice d'été, avec celle de la formation de l'approvisionnement réuni pour l'arrivée de Constance, c'est en faisant disparaître tous les faits intermédiaires, que M. Fuster a pu tirer cette induction, que le blé mûrissait alors dans les Gaules au moment du solstice.

» En faisant abstraction, avec l'auteur, de tous les faits intermédiaires, en admettant de plus la leçon qui veut que ce solstice soit celui d'été, il ne serait pas étonnant que les approvisionnements eussent pu être faits en Provence, pays de blé le plus proche, et prélevés sur la moisson de l'année qui se fait encore à la fin de juin. Ainsi, quand même nous consentirions à faire subir au texte de la Lettre de l'empereur une aussi étrange torture, nous n'arriverions pas à établir le fait de la maturité des grains dans la Gaule

septentrionale au solstice d'été Or, nous le répétons, c'est le fait capital de l'augmentation de l'automne, et quand il est écoulé, il ne reste plus rien de solide pour établir une modification quelconque de climat du temps de l'empereur Julien au nôtre

Pour démontrer l'amélioration progressive des siècles suivants, M. Fustel de Coulanges s'appuie sur trois faits : 1° l'extension de la vigne au nord, 2° la qualité des vins que l'on y recueillait, 3° l'existence de plusieurs végétaux, tels que l'orange et le citronnier, dans des parties de la France méridionale où on ne les trouve plus

Du IX^e siècle au XIII^e, une foule de chartes font mention de vignes dans la Normandie, la Bretagne, la Picardie. Est-il vrai qu'elles en aient été chassées par le climat et non par les convenances sociales et économiques ? Mais il y a encore des vignes dans le département de l'Aisne, en Picardie et le vignoble d'Argence, près de Compiègne, existe encore en partie à l'heure que nous parlons quoique chaque année le vin décroît de d'étendue Mais ce n'est pas que le raisin n'y atteigne plus sa maturité, mais seulement parce que le bon marché des vins de Bordeaux sur la côte rend ses produits de plus en plus insignifiants. Ainsi nous avons sous nos yeux l'expérience de la disparition d'un ancien vignoble et des causes qui amènent sa destruction. Mais une autre cause a agi bien plus puissamment encore pour abolir dans le nord la culture de la vigne, c'est l'adoption du cidre en Normandie, et le perfectionnement de l'art de la fabrication de la bière de Flandre. Rozier prétend dans son *Cours d'Agriculture*, que le cidre a été introduit en Normandie vers l'an 1300, et qu'il y était venu de l'Espagne par la Biscaye ou les Arabes l'avaient importé. Cette tradition est douteuse, et les auteurs des VII^e et VIII^e siècles semblent avoir parlé de cette boisson. Nous n'avons pas pu pousser bien loin nos recherches à cet égard, et c'est un sujet d'érudition agricole que nous recommandons aux hommes spéciaux. Mais il est bien certain au moins que ce n'est que fort tard que les plantations de pommiers ont pris une extension assez grande pour faire du cidre une liqueur populaire, et alors le climat de la Normandie lui étant très approprié, cet arbre s'alliant mieux que la vigne avec les autres cultures, et surtout avec celle des prairies, il n'est pas étonnant que celle-ci ait cédé progressivement la place à son nouveau rival

Quant à la bière, ce fut longtemps un breuvage nécessaire, sans doute, pour suppléer dans le nord aux autres boissons fermentées, mais faite en petit, par de mauvais procédés, la plupart du temps sans houblon, sa boisson n'avait aucun agrément. L'un de nous a bu de ces bières de ménage en Po-

logne, et il faut toute la repugnance qu'inspirent les mauvaises eaux pour se réduire à leur usage. Mais quand le développement de la richesse de la Flandre amena celui des arts, quand les brasseries s'établirent et que l'on obtint de la bonne bière à bon marché, elle l'emporta sans peine sur les vins aigrelets et faciles à tourner que l'on recueillait, dit-on, jusqu'à Gembloux à Laège et à Louvain.

Maintenant supprimez le cidre, substituez la mauvaise cervoise à la bière, terminez la mer et détruisez les routes de terre, et dites-nous si l'on n'essayera pas de nouveau de faire une liqueur vineuse avec le fruit de la vigne qui mûrit dans tous ces pays, au point de pouvoir être mangée, et qui fournirait par la fermentation de très-mauvais vins sans doute, mais qui serait aussi utile aux habitants que les vins de groseille, de myrtille, de sorbes et tant d'autres boissons populaires qui, sans avoir les qualités du fruit de la vigne, ont tous les défauts du vin obtenu de ce fruit parvenu à une maturité imparfaite.

Dans un très-bon article inséré dans le *Journal d'Agriculture pratique* au sujet du Mémoire de M. Fuster, un de nos bons météorologistes, M. Martins examine la valeur des éloges donnés aux vins des environs de Paris dans le tableau de la bouteille de vin, de d'Andely, et il n'a pas de peine à faire voir qu'après avoir excommunié les vins du Maine, de la Normandie, et tous ceux qui viennent par-delà l'Oise, l'auteur donne le prix à ceux du centre et du midi de la France, quoique le vin d'Argenteuil se présentât *sans rougir*, dit-il, en concurrence avec ses rivaux. Il mentionne aussi que le prétendu vin de Suirène, que buvait Henri IV, est un vin des environs de Vendôme, nommé *Suren*, vin blanc très-agréable à boire. Nous abrégons donc notre discussion sur ce qui concerne la qualité des vins du nord, renvoyant à celle de M. Martins, que nous ne pourrions que répéter.

La rétrogradation de l'olivier dans le midi tient à des causes absolument semblables à celles qui ont fait rétrograder la vigne dans le nord. Partout où on a voulu conserver cet arbre, il parvient à la limite qui lui était assignée dans les plus anciens écrits. Ainsi Olivier de Serres dit qu'il s'étend jusqu'à Valence, et aujourd'hui encore on le voit à Beauchatel, sur la rive droite du Rhône, à 16 kilomètres au sud de cette ville. Sa retraite n'aurait donc pas été bien considérable. Mais si les saisons l'ont trouvé inébranlable sur le terrain qu'il avait une fois occupé, si ses conditions météorologiques sont restées les mêmes, des cultures rivales et le progrès de la civilisation ont bien changé ses conditions économiques. Quand on manquait de routes et que les transports se faisaient à dos de mulet, on devait attacher un très-grand prix à la

production de l'huile qui représente sous le même volume une valeur beaucoup plus grande que celle du vin. La construction des routes, le perfectionnement de la navigation a changé les rapports de la culture de l'olivier et de celle de la vigne mais c'est surtout le mûrier qui a été le plus grand ennemi de l'olivier. Les mûriers, mieux cultivés, ont produit plus de feuilles, l'éducation des vers à soie a été plus soignée et a donné de plus grands produits, la filature et le moulinage perfectionnés ont fourni de la soie d'un plus haut prix enfin le développement de luxe l'a fait rechercher de toutes parts. Aussi, après chaque mortalité des oliviers, et ce siècle en a déjà présenté deux (1819-1820 et 1829-1830) leurs propriétaires ont mis en délibération, si n'était pas possible de substituer la vigne ou le mûrier à un arbre qui présentait tant de chances, et dont les rejetons n'entreraient en produit que longtemps après les arbres qu'on pourrait leur substituer. Les conclusions ont souvent été faibles à l'olivier, et voilà la véritable cause de sa retraite vers la mer qui l'a rapporté et comment si les habitants du midi ne perfectionnent pas sa culture, quand tout se perfectionne autour de lui, il finira par disparaître du sol de la France.

Mais si l'on a pu conserver l'olivier en Provence, quoiqu'il n'y eût qu'une vie moyenne de quarante-deux ans, si les calculs ont prouvé à leurs possesseurs que ses produits pouvaient supporter de telles chances, même aujourd'hui au milieu de la concurrence de tant d'autres huiles, serait-il si difficile de montrer qu'il ne faudrait pas de circonstances très-extraordinaires pour qu'on pût y cultiver aussi l'oranger en pleine terre, sans supposer aucun changement de climat?

L'olivier et l'oranger frappaient quelquefois dans leurs rameaux par des dégels qui suivent des gelées de -9° pour le premier arbre, de -6° pour le second, n'ont éprouvé de ces catastrophes, qui les ont privés de leur tronc, que quand l'hiver a donné un minimum de -13° ou -14° pour l'olivier, et de -10° pour l'oranger. M. Martius observe, dans l'article dont nous avons parlé, que de 1823 à 1842, le thermomètre n'est descendu qu'une fois à -10° à Marseille, et que de 1800 à 1819, il n'atteignit jamais ce degré. Ainsi les orangers plantés en pleine terre à Marseille auraient péri deux ou trois fois depuis le commencement du siècle, ceux d'Hyères n'ont gelé qu'une fois. En compulsant la liste des hivers du XVIII^e siècle, on voit que les orangers seraient morts aux fois c'est donc une vie moyenne de dix-sept ans qu'ils auraient dans cette position.

Mais si un jeune oranger planté n'a pas donné de grands produits à dix-sept ans il n'en est pas de même de celui qui repousse des racines

vigoureuses restées vivantes après la mort du tronc il porte de nouveau des la cinquième ou sixième année de sa repousse. Si donc la valeur des oranges remontait au taux où on la a vue, si celle de ses fleurs était encore au prix que la concurrence des oranges du Levant et de l'Espagne est venue réduire, il pourrait être avantageux de cultiver l'orange à Marseille et en Roussillon, malgré les chances de mortalité. Or, voilà la situation qui s'est rencontrée au moyen âge, et qui, étant changée par les progrès des communications entre les nations, a fait disparaître l'orange, comme elle tend à déprécier et à faire diminuer la culture de l'olivier dans la France méridionale.

Nous avons passé en revue les principaux arguments de M. Fuster, et nous devons nous arrêter ici. Sans nier qu'il puisse y avoir eu des changements périodiques de climat en France, votre Commission a pensé que cet auteur n'en avait établi ni l'existence ni la durée.

M. Fuster a déjà été signalé avantageusement à l'Académie par un Rapport de notre ancien collègue, M. Double, à l'occasion d'un bon travail sur la météorologie appliquée à la médecine qui a reçu votre approbation. Dans le *Memoir* qui vient de nous occuper, il a fait preuve de beaucoup d'érudition et d'un esprit louable de recherches. Nous ne voudrions pas que le jugement que nous portons sur le résultat de son travail pût le décourager et l'empêcher de persévérer dans ses études. Il y a dans nos vieux historiens une abondante source d'instruction à exploiter et si les faits qu'ils présentent sont réunis avec méthode, ils offriront le tableau presque complet du caractère des années qui se sont écoulées au moins depuis le *xv^e* siècle. Nous protestons donc contre la pensée que nous avons pu condamner ici l'érudition appliquée à l'histoire des sciences physiques, nous croyons au contraire qu'elle peut devenir un auxiliaire très-utile, en l'absence de matériaux plus exacts que l'on ne possède que depuis trop peu de temps.

Votre Commission vous propose de remercier M. Fuster de sa communication, et de l'engager à poursuivre ses recherches et l'exécution de la tâche qu'il s'était imposée, celle de présenter les faits météorologiques que renferment les historiens depuis les premiers temps historiques de la France.

Les conclusions de ce Rapport sont adoptées.


MÉMOIRES PRÉSENTÉS.

CHIMIE — *Mémoire sur les combinaisons de deux nouvelles bases alcalines contenant du platine; par M. JULES REISSET. (Extrait.)*

(Commissaires, MM. Chevreul, Pelouze, Regnault.)


« J'ai déjà eu l'honneur d'entretenir l'Académie (*Comptes rendus*, t. X, p. 871, et t. XI, p. 711) de quelques-unes des combinaisons dont je présente aujourd'hui une étude plus complète.

« J'ai fait voir que le protochlorure de platine et l'ammoniaque donnent naissance à un corps bien cristallisé, qui a pour formule



« Ce corps offre une composition qui le rapproche beaucoup d'une série particulière de combinaisons platiniques découvertes par M. Gros. Il peut, en effet, aider à les reproduire; mais il conduit également à deux séries de sels très-distincts, qui m'ont uniquement occupé. Ces recherches restent ainsi en dehors de celles qui ont été publiées par M. Gros, et qu'il avait d'ailleurs le désir de poursuivre

« Avec un sel d'argent, le chlorure $\text{Az}^2 \text{H}^2 \text{Pt Cl}$, Cl donne un précipité de chlorure d'argent, la liqueur, filtrée et évaporée, laisse cristalliser un nouveau sel qui ne contient plus de chlore,



« C'est ainsi que l'on obtient

Le sulfate $\text{Az}^2 \text{H}^2 \text{Pt O}, \text{SO}^2$,

Le nitrate $\text{Az}^2 \text{H}^2 \text{Pt O}, \text{Az O}^2$

Ces sels sont neutres, sans action sur les couleurs végétales, et cristallisent avec la plus grande facilité.

« On isole aisément la base de ces sels en traitant convenablement par de l'eau de baryte le sulfate $\text{Az}^2 \text{H}^2 \text{Pt O}, \text{SO}^2$. Dès l'addition des premières gouttes de baryte, on obtient un précipité de sulfate de baryte, et la liqueur devient fortement alcaline, sans dégagement sensible d'ammoniaque, même

(*) $\text{Az}^2 \text{H}^2 = 2 \text{Az H}$

par une ébullition prolongée, la lessive, évaporée à l'abri du contact de l'air, et portée dans le vide sec, se prend en une masse d'aiguilles cristallines d'un blanc opaque après complète dessiccation.

Dans cet état, la base isolée contient l'équivalent d'eau qui ne peut lui être enlevé qu'en la combinant avec les acides.

Az^3H^3PtO , HO, base isolée et desséchée dans le vide.


Cette base est énergiquement alcaline et caustique, elle peut jusqu'à un certain point, être comparée avec la soude et la potasse, comme ces deux alcalis, elle est deliquescente, se combine rapidement avec l'acide carbonique pour former un carbonate Az^3H^3PtO , CO^2HO et un bicarbonate Az^3H^3PtO , $2(CO^2)HO$, moins soluble que le carbonate neutre, elle déplace l'ammoniaque de ses combinaisons, et peut s'employer comme la potasse dans le procédé de M. Trommer, pour découvrir une trace de sucre de raisin avec l'oxyde de cuivre.

L'action de la chaleur sur la base isolée est très remarquable, à 110 degrés elle fond, se boursouffle considérablement en perdant les éléments d'un équivalent d'oxyde d'ammonium AzH^3HO , et devient AzH^3PtO , masse grisâtre entièrement insoluble dans l'eau et l'ammoniaque, donnant avec les acides des composés insolubles et détonants.

» Chauffée en un seul point vers 200 degrés, ce corps devient incandescent et continue à brûler hors du foyer, en faisant entendre un bruit pareil à celui du nitre sur des charbons. Ce phénomène n'a lieu qu'au contact de l'air, l'ammoniaque rencontre alors de l'oxygène et se brûle à la faveur d'un *corps catalytique*, le platine métallique, poileux comme de la mousse de savon.

En vase clos ou dans le vide, la base chauffée à 200 degrés ne devient point incandescente, elle se décompose tranquillement, en donnant de l'eau, de l'ammoniaque et du platine métallique, le gaz dégagé est de l'azote pur.

» Pendant une des phases de cette décomposition, il se forme, sans aucun doute, un *azoture de platine* qui donne ensuite l'azote. L'équation suivante rend très-bien compte de la réaction.



» La quantité d'azote recueilli a toujours été parfaitement en harmonie avec ce mode de décomposition, qui démontre l'existence de l'azoture de

platine $AzPt^3$, correspondant à l'ammoniaque AzH^3 ; mais il est très-instable, et j'ai vainement essayé de l'isoler.

» On prépare facilement l'iodure et le bromure de la base par double décomposition, avec le sulfate $Az^3H^3PtOSO^3$ et le bromure ou l'iodure de baryum.

» L'iodure Az^3H^3PtI cristallise en cubes, sa dissolution bouillante dégage 1 équivalent d'ammoniaque AzH^3 , et il se dépose en même temps une poudre jaune AzH^3PtI , correspondante au sel de Magnus.

» Le bromure Az^3H^3PtBr cristallise en cubes, et n'éprouve pas, par l'ébullition, la même transformation que l'iodure.

» J'ai essayé de combiner directement l'acide cyanhydrique avec la base, j'ai toujours obtenu du cyanhydrate d'ammoniaque et un précipité blanc cristallin AzH^3Pt, Cy . Ce sel prend place à côté du sel de Magnus dans la série qui ne renferme qu'un seul équivalent d'ammoniaque combiné à l'oxyde de platine

» Le sulfate et le nitrate de cette deuxième série s'obtiennent en faisant bouillir, avec un sel d'argent, l'iodure AzH^3PtI . La réaction est alors très-nette



Ces sels cristallisent moins facilement que ceux de la première série; ils rougissent fortement la teinture de tournesol.

» Le nitrate $AzH^3PtOAzO^3$ ne contient pas d'eau.

» Le sulfate en retient 1 équivalent qu'on ne peut lui enlever, AzH^3PtO, SO^3, HO .

» Quelques gouttes d'acide chlorhydrique ou d'un chlorure, versées dans un sel de cette série, y produisent, au bout de quelques instants, un précipité cristallin d'un beau jaune isomère du sel de Magnus, AzH^3PtCl , et qui donne, comme lui, en se dissolvant dans l'ammoniaque, les cristaux Az^3H^3PtCl .

» Le sel vert de Magnus, insoluble dans l'eau, peut être transformé en son isomère jaune, soluble dans l'eau bouillante. En effet, ce sel vert se dissout à la longue dans une solution concentrée et bouillante de nitrate ou de sulfate d'ammoniaque; par le refroidissement se précipitent de belles paillettes jaunes exactement de même composition que le sel vert de Magnus AzH^3PtCl .

» On comprend combien de réactions nouvelles il sera possible d'obtenir avec des corps aussi stables et aussi faciles à préparer. J'ai déjà étudié deux

combinaisons intéressantes que peuvent donner le bichlorure de platine et le chlorure Az^3H^+PtCl .

» En versant du bichlorure de platine dans une solution du chlorure Az^3H^+PtCl en excès, on obtient un précipité abondant d'un vert olive. Dans ce cas, un seul équivalent de bichlorure de platine est uni à 2 équivalents du chlorure Az^3H^+PtCl , et ce précipité vert a pour formule



» Au contact d'un excès de bichlorure de platine, le précipité vert se transforme immédiatement en une poussière rouge tripoli peu soluble et cristalline; dans ce sel 1 équivalent de bichlorure de platine est combiné à un seul équivalent du chlorure Az^3H^+PtCl . La formule du sel rouge tripoli est $PtCl^2, Az^3H^+PtCl$.

Première série.

Az^3H^+PtO , HO, base isolée,
 Az^3H^+PtO , SO^4 , sulfate;
 Az^3H^+PtO , AsO^4 , nitrate;
 Az^3H^+PtO , CO^2HO , carbonate;
 Az^3H^+PtO , $2(CO^2)HO$, bicarbonate,
 Az^3H^+Pt , Cl + HO, chlorure;
 Az^3H^+Pt , Br, bromure;
 Az^3H^+Pt , I, iodure,
 Az^3H^+Pt , Cl + $PtCl^2$, sel double rouge;
 $2(Az^3H^+Pt, Cl) + PtCl^2$, sel double vert.

Deuxième série.

AsH^3PtO , obtenu en chauffant As^3H^+PtO , HO,
 AsH^3PtO , AsO^4 , nitrate,
 AsH^3PtO , SO^4 , HO, sulfate;
 AsH^3Pt , I, iodure;
 AsH^3Pt , Cy, cyanure;
 AsH^3PtCl , chlorure sel vert de Magnus et son isomère jaune

» Sauf le cyanure et le AzH^3PtO , obtenu en chauffant à 110 degrés la base Az^3H^+PtO , HO, tous les sels de la deuxième série se dissolvent dans l'ammoniaque et reproduisent ceux de la première série.

» De même, en chauffant convenablement certains sels de la série à 2 équivalents d'ammoniaque, on obtient le sel correspondant dans la série à un seul équivalent. C'est ainsi qu'à 250 degrés le chlorure Az^3H^+PtCl perd

équivalent d'ammoniaque AzH^3 , et se transforme en une poudre jaune isomère du sel de Magnus AzH^3PtCl


Les deux séries qui viennent d'être décrites établissent d'une manière certaine l'existence de deux bases nouvelles qui renferment du platine. Chacune de ces bases a été soumise à des épreuves qui ne laissent aucun doute sur son alcalinité et sur l'association permanente de tous les éléments qui la constituent. Dans l'une d'elles, Az^2H^3PtO , cette alcalinité surpasse en énergie l'oxyde de platine, l'oxyde d'ammonium lui-même, c'est presque de la potasse. Quelle idée peut-on se faire de bases ainsi constituées?

Il est impossible de trouver ici dans l'ammoniaque un rôle qui l'assimile à l'eau, suivant la théorie appliquée par M. Robert Kane aux principales combinaisons des oxydes métalliques avec l'ammoniaque. M. Berzelius suppose que l'acide se trouve combiné avec l'oxyde d'ammonium, et que ce sel est ensuite intimement uni à une combinaison particulière de platine qu'il appelle *copule*. Il représente ainsi le sulfate de la base par $AzH^3HOSO^3 + AzH^3Pt$
copule







Sans prétendre fixer d'une manière définitive la constitution de ces différents composés, il nous semble que l'on peut s'en rendre compte d'une manière plus simple en admettant que l'ammoniaque se combine intimement avec l'oxyde de platine pour former deux bases particulières. Cette combinaison, dans le cas du platine, offre une fixité remarquable, avec les autres oxydes métalliques, au contraire, l'ammoniaque donne en général des produits instables, et ne reste combinée que sous l'influence d'acides énergiques. On arrive sans peine à comprendre avec ce fait d'association, que 1 ou 2 équivalents d'ammoniaque, et quelquefois plus, peuvent s'ajouter à un même oxyde pour constituer des bases. C'est absolument ainsi que l'eau, en s'unissant aux oxydes, peut former des bases différentes de l'oxyde produit par l'union simple du métal avec l'oxygène.

Dans son travail important sur l'acide iodique libre et combiné (*Annales de Chimie et de Physique*, t. IX, 3^e série), M. Millon a développé ce point de vue pour les oxydes de calcium, de magnésium et de cuivre, et il nous semble que cette idée doit s'appliquer complètement aux combinaisons ammoniacales.

Ainsi, en se groupant avec l'eau, avec l'ammoniaque, avec l'ammoniaque et l'eau, et quelquefois avec lui-même, un oxyde peut former les bases suivantes, capables de saturer un seul équivalent d'acide A.



$3(\underline{AsH^3})NiO \frac{1}{4}HO + CrO^2$, chromate de nickel ammoniacal analysé par MM Malagut et Sarzeau



Une étude plus complète des combinaisons ammoniacales et des différents états d'hydratation des oxydes métalliques, conduira certainement à réduire le nombre considérable de bases que cette manière de voir présente au premier aspect »

ANATOMIE VÉGÉTALE — *Observations sur l'organogénie de la fleur, et en particulier de l'ovaire chez les plantes à placenta central libre* par M P DUCHARTRE (Extrait par l'auteur)

(Commissaires, MM Ad Brongniart, Richard, Grudichaud)

L'existence d'un placenta central libre chez quelques familles de plantes est une question très-importante pour l'explication morphologique de l'ovaire. Les Primulacées présentent le type de cette organisation, or le placenta central des Primulacées a été envisagé de deux manières principales. Les uns, et ce sont incontestablement les plus nombreux, ont admis que cet organe ne devient libre au centre de l'ovaire que par les progrès de l'accroissement et par la rupture d'un filet terminal primitivement continu au style, les autres ont cru que le même placenta ressemble à celui des Caryophyllées, et que des cloisons le rattachent d'abord aux parois ovariennes. J'ai cru que l'organogénie seule peut donner la solution de cette importante question. J'ai suivi la série des phénomènes organogéniques que présentent la fleur et surtout l'ovaire chez les Primulacées et chez les familles qui se rapprochent de ces plantes quant à la nature et à la disposition de leur placenta. Voici en peu de mots, le résultat de mes observations

1° La fleur se montre d'abord, comme de coutume, sous la forme d'un petit globe un peu déprimé, cellulaire et homogène. Bientôt la portion basilaire de ce globe se renfle en un bourrelet périphérique continu, qui ne tarde pas à se relever à son bord libre de cinq petits festons, c'est là le calice naissant. J'insiste sur la continuité primitive du calice naissant, parce que c'est là un fait important de plus contre l'opinion de M. Schleiden, et que ce fait vient s'ajouter à ceux que j'avais déjà fait connaître en diverses circonstances, d'après des boutons observés dès la plus extrême jeunesse, et qui ne permettent pas d'admettre la théorie du savant allemand relativement à l'organogénie des enveloppes florales gamophylles.

2° Peu après l'apparition du calice, la masse centrale de la jeune fleur se renfle en cinq mamelons arrondis, alternés aux festons calicinaux, ce sont les étamines naissantes. Ces mamelons sont devenus déjà assez saillants lorsque la corolle commence à paraître sous la forme d'un bourrelet qui les entoure à leur base du côté extérieur, de manière à ne pouvoir être regardée que comme une sorte de dépendance ou de dédoublement de l'androcée. La corolle est donc ici postérieure aux étamines.

3° L'époque de l'apparition de la corolle n'a jamais été réduite à une seule loi générale sans que l'on pût citer autant de faits contre que pour cette loi. D'après diverses observations, que je ne trouve pas assez nombreuses encore pour oser énoncer un principe général, mais qui me permettent néanmoins de pressentir ce principe, je crois avoir reconnu qu'en général la corolle est de formation antérieure aux étamines lorsqu'elle alterne régulièrement avec elles, tandis qu'elle leur est postérieure, ou tout au plus à peu près contemporaine, lorsqu'elle leur est opposée (Primulacées, Malvacees), ou lorsque, la fleur étant diplostémone, cette enveloppe florale se montre dans des relations analogues avec l'un des deux verticilles staminaux (Caryophyllées).

4° Le pistil commence à s'indiquer presque en même temps que la corolle. Il se montre d'abord sous la forme d'un bourrelet circulaire entourant un petit enfoncement dont le fond se relève en un mamelon arrondi. Le bourrelet est le commencement des parois ovariennes, le mamelon central est le placenta naissant. Le développement de ces deux parties marche parallèlement, le bourrelet primitif s'élève, s'élargit d'abord pour se resserrer ensuite en dessus par là il forme un petit cône tronqué, largement ouvert à sa truncature. Le mamelon placentaire s'élève, se renfle progressivement, et forme bientôt un petit corps ovoïde qui remplit le jeune ovaire. Ce corps est par-

faitement lisse à sa surface, et son extrémité arrive près de l'ouverture du petit cône ovarien. C'est là la première période de l'histoire organogénique du pistil.

» 5° La deuxième période commence avec la formation du style et l'apparition des ovules. Le petit cône ovarien que nous venons de voir formé se relève à son extrémité ouverte, et s'allonge en un tube dont l'orifice supérieur s'épaissit plus tard à son bord et forme enfin le stigmate. De son côté, le placenta se recouvre, dans sa portion inférieure, de petits mamelons qui ne sont que les ovules naissants, tandis que sa portion supérieure et stérile reste nue. À partir de cet instant les ovules passent par la série de phénomènes que l'on connaît déjà, et à travers lesquels il semble des lors inutile de les suivre ici. L'extrémité supérieure et stérile du placenta reste parfois très-courte et sous forme d'un simple mamelon obtus sur lequel même les ovules, en grossissant, empiètent quelque peu; ailleurs, elle s'allonge peu à peu en un petit cône émoussé, qui entre à peine dans la base élargie du canal styloïde, ailleurs enfin, son allongement se continue jusqu'à l'épanouissement de la fleur, et on la voit se prolonger en un cône aigu ou en un petit filet qui pénètre peu à peu dans la portion inférieure du canal du style. Il est clair que, même dans ce dernier cas, le seul qui ait pu donner naissance à l'opinion la plus répandue, le petit filet qui termine le placenta est de formation tardive, qu'il reste toujours libre, logé dans le sac du style comme dans une gaine, et que si jamais il y avait adhérence entre ce filet et la gaine styloïde, ce ne serait que par une sorte de gousse sans importance.

» 6° La végétation du placenta ne reste pas toujours parallèle à celle des feuilles carpellaires, parfois elle est plus rapide, et l'on voit alors cet organe saillir au dehors du jeune ovaire, les parois de celui-ci sont même quelquefois très en retard, au point de laisser le jeune placenta à nu.

» 7° La nature axile de ce placenta, généralement admise du reste, est démontrée par sa structure, son mode de végétation, sa faculté de devenir prolifère. J'ai, en effet, observé sur le *Cortusa Mathioli* deux monstruosités dans lesquelles le placenta, après avoir donné une première génération d'ovules, se terminait par une petite fleur complète, entièrement enfermée dans l'ovaire de la fleur-mère.

La portion supérieure et stérile du placenta, dans les fleurs normales, se montre dépourvue de vaisseaux.

» 8° J'ai reconnu une nature et un mode d'accroissement analogues dans le placenta des Myrsinées, soit dans la tribu des Ardisées, soit dans celle des

Thucophrastus Enfin les Santalacées me semblent venir aussi se ranger dans la catégorie des deux familles précédentes

Il est donc prouvé par l'étude des phénomènes organogéniques que, chez les Primulacées et chez les familles de plantes organisées sur le même type ovarien, le placenta se montre au centre de l'ovaire, libre et distinct depuis sa première apparition jusqu'à l'état de développement complet, que si jamais il présente une adhérence quelconque avec le style ou avec une partie quelconque de l'ovaire, c'est là un fait purement accidentel et qui n'a rien d'important, ni surtout de primitif

M C DESMARAIS soumet au jugement de l'Académie un Mémoire ayant pour titre *Statistique de l'état actuel de la science expérimentale des faits d'instinct et d'intelligence des animaux*

Après avoir passé en revue les travaux modernes qui se rapportent à cette question, et notamment ceux de MM F Cuvier, Flourens, Leuret, Elul, Léon Dufour, l'auteur s'attache à fortifier par de nouveaux rapprochements la ligne de démarcation qui sépare les phénomènes de l'instinct de ceux de l'intelligence Une autre partie de son travail a pour but de confirmer la remarque faite par M Leuret « qu'il ne faut pas attribuer à la forme qui affecte la substance nerveuse encéphalique une trop grande importance », et que, du moment surtout où il s'agit de phénomènes instinctifs, la division de cette substance n'est pas un indice d'infériorité

M CHOPINEAUX envoie un supplément à une Note qu'il avait précédemment adressée sur diverses questions concernant les *chemins de fer* Ce supplément est accompagné d'une figure relative à une soupape de sûreté que l'auteur considère comme principalement applicable aux locomotives

(Renvoi à la Commission précédemment nommée)

M SAUZAY présente le modèle d'un appareil dont il avait précédemment adressé la description et qui a pour objet de maintenir constant le niveau de l'huile dans des lampes que la simplicité de leur construction permet de donner à un très bas prix A l'époque de sa première communication, l'auteur ne connaissait pas la lampe de Hooke, sur laquelle un des Commissaires, M Bahinet, a appelé depuis son attention, et qui offre, en effet, une application du même principe M Sauzay pense toutefois que, par la disposition de son flotteur à niveau constant et la facilité qu'on a pour le régler, la nouvelle lampe a sur l'ancienne des avantages marqués, et il croit devoir persister à

appeler le jugement de l'Académie sur un appareil dont il pense que l'emploi pourrait être fort utile aux classes peu aisées de la société

(Renvoi à la Commission précédemment nommée)

MM THILLORIER et LAFONTAINE adressent une Note sur des expériences destinées à démontrer l'existence du *fluide nerveux*, et certaines propriétés de ce fluide qui, suivant eux, agirait, dans des circonstances données, sur le galvanomètre

(Commissaires, MM Magendie, Chevreul, Becquerel, Pouillet, Dutrochet, Regnault)

M AGASSIZ demande que ses *Recherches sur les poissons fossiles* soient comprises dans le nombre des ouvrages admis à concourir pour le prix de Physiologie expérimentale fondé par M de Montyon

La question du développement progressif des espèces, tant vivantes que fossiles est, dit M Agassiz, une question de physiologie générale que j'ai traitée expérimentalement, et d'une manière directe, sur une échelle beaucoup plus large qu'on ne l'avait fait jusqu'ici, puisque j'ai compris sous un même point de vue le développement individuel, la classification des espèces, les successions dans les formations géologiques, et les rapports de toutes les classes du règne animal entre elles

L'ouvrage de M Agassiz est renvoyé à la Commission du prix de Physiologie expérimentale

CORRESPONDANCE

M le MINISTRE DE LA GUERRE annonce qu'une place d'examineur permanent à l'École Polytechnique est devenue vacante, par suite de la nomination de M Duhamel à la place de Directeur des études, et demande que l'Académie, conformément à l'ordonnance du 6 novembre 1843, lui présente une liste de candidats pour la place vacante

(Renvoi à la Section de Géométrie)

M le PRÉFET DE POLICE demande communication du Rapport qui a été fait à l'Académie sur un procédé, proposé par M SMET, pour la *desinfection des fosses d'aisance*

CHIMIE — *Sur plusieurs nouveaux sels formes par la reaction des acides sulfureux et azoteux sur les bases alcalines, par M E FERNY*

Dans un travail sur les acides metalliques formés par l'osmium, qui m'occupe depuis longtemps, et dont je ferai connaitre prochainement les resultats à l'Academie, j'ai eu l'occasion d'examiner l'action de l'acide sulfureux sur des sels auxquels j'ai donne le nom d'*osmites*

J'ai reconnu que les osmites peuvent se combiner à l'acide sulfureux et former des composés nouveaux dans lesquels les propriétés de l'acide sulfureux paraissent dissimulées. J'ai eu l'idée d'étendre ces réactions, qui seront décrites avec détail dans mon Mémoire sur l'osmium, à des sels semblables aux osmites, tels que les *azotites*, les *phosphites*, etc

J'ai l'honneur d'annoncer aujourd'hui à l'Académie que lorsqu'on fait passer dans un grand excès de potasse un courant d'acide sulfureux et d'acide azoteux ou d'acide hypoazotique, la liqueur laisse déposer immédiatement de longues aiguilles soyeuses d'un sel de potasse qui est presque insoluble dans l'eau froide. Ce sel contient un nouvel acide qui est formé d'oxygène, de soufre et d'azote. Il éprouve par la chaleur une décomposition caractéristique, car il se transforme en sulfate de potasse, en ammoniaque et en sel ammoniacal volatil.

Les sels de soude et d'ammoniaque peuvent se préparer directement comme le sel de potasse, sont solubles dans l'eau froide et cristallisent facilement. Leur dissolution faite à froid est neutre et ne précipite ni par les sels de baryte, ni par ceux de plomb, lorsqu'on la fait bouillir, elle devient fortement acide et présente les réactions de l'acide sulfurique, la liqueur contient un sel ammoniacal.

Je pense que les faits qui précèdent caractérisent suffisamment les nouveaux sels qui se forment dans la réaction des acides sulfureux et azoteux sur les bases. Ces corps viendraient évidemment se placer à côté des nitro-sulfates de M. Pelouze. J'ai reconnu qu'en faisant varier les proportions d'acides sulfureux et azoteux, on pouvait obtenir des sels différents qui sont tous remarquables par leur stabilité et leurs belles formes cristallines.

Mon but aujourd'hui était de prendre date pour un travail auquel j'ai été conduit accidentellement, et que je continuerai lorsque les recherches que j'ai entreprises sur l'osmium seront terminées. »

M. Roux annonce qu'il a été chargé par M. Bischoff de présenter à l'Aca-

démie, pour le concours au prix de Physiologie expérimentale, un travail sur le développement de l'œuf dans l'espèce du chien. Ce travail, terminé depuis longtemps, n'a pu, en raison de l'absence de M Breschet, qui devait le présenter, arriver avant la clôture du concours, M Roux demande si, malgré ce retard involontaire de la part de l'auteur, le Mémoire ne pourrait pas être admis.

L'Académie n'ayant pas jugé que le Mémoire de M Bischoff put être admis autrement que pour un futur concours, M Roux annonce qu'il renverra le travail à l'auteur, dont l'intention serait probablement d'y joindre de nouvelles observations, s'il se décidait à le présenter pour un autre concours.

M PIERQUY écrit relativement à un *cas de monstruosité* qu'il a observé chez un *fœtus humain*, et qu'il croit n'avoir pas encore été décrit. « Chez cet individu, qui est du sexe féminin et qui paraît être à terme, on observe un repli cutané qui, partant des bords supérieurs des parietaux, s'élargit considérablement, puis se rétrécit et va se terminer en pointe vers la région lombaire, offrant dans son ensemble la figure d'un cerf-volant. M PIERQUY offre d'envoyer ce fœtus à l'Académie, dans le cas où il paraîtrait digne d'attirer l'attention.

La séance est levée à 4 heures et demie

f

ERRATUM

(Séance du 3 juin 1844)

Page 1062, ligne 18 au lieu de 17 juin, lisez 17 mai



BULLETIN BIBLIOGRAPHIQUE

L'Académie a reçu, dans cette séance, les ouvrages dont voici les titres

Comptes rendus hebdomadaires des séances de l'Académie royale des Sciences
1^{er} semestre 1844, n° 23, in-4°

Bulletin de l'Académie royale de Médecine, n° 17, 15 juin 1844, in-8°

Annales de la Société royale d'Horticulture de Paris, mai 1844, in-8°

Annales maritimes et coloniales, mai 1844, in-8°

Voyages de la Commission scientifique du Nord en Scandinavie, en Laponie
au Spitzberg et aux Féroé, sous la direction de M. GAIMARD, 19^e livr. in-fol

Lettre sur la Syphilis, par M. RATIER, broch. in-8°

Nouveau Forceps destiné à éviter le décroisement des branches par M. TARR
SIANI, broch. in-8°

FRANÇOIS RANCHIN, professeur et chancelier de l'Université de Médecine de
Montpellier, par M. V. BROUSSONET Montpellier, 1844 (Broch. in-8°)

Types de chaque famille et des principaux genres de Plantes croissant sponta-
nement en France, par M. PLÉE, 8^e livr., in-4°

Journal de Médecine, juin 1844, in-8°

Revue zoologique, par la Société cuvérienne n° 5, in-8°

Journal des Connaissances médico-chirurgicales, juin 1844, in-8°

La Clinique vétérinaire, juin 1844, in-8°

Journal de Pharmacie et de Chimie, juin 1844, in-8°

Journal de la Société de Médecine pratique de Montpellier, juin 1844, in-8°

Gazette médicale de Dijon et de la Bourgogne, n° 13, 2^e année, 1844, in-8°

CENSO DI STUDIO. *Recherches relatives au principe des Vitesses virtuelles*, par
M. RICCARDI Modene, 1842, in-4°

1. *Relazione . Compte rendu des séances de l'Académie royale des Sciences,*
Lettres et Beaux-Arts de Modene, dans les années académiques 1840-1841 et
1841-1842 Modene, 1843, in-8°

Relazione . Compte rendu des séances de l'Académie royale des Sciences,
Lettres et Beaux-Arts, dans l'année académique 1842-1843 Modene, 1843,
11 8°

Gazette médicale de Paris, n° 23, in-4°

Gazette des Hôpitaux, n° 65 à 67; in-fol

L'Echo du Monde savant, n° 44 et 45

L'Expérience, n° 362, in-8°

OBSERVATIONS METEOROLOGIQUES. — MAI 1844.

JOURS	9 HEURES DU MATIN.			MIDI			3 HEURES DU SOIR.			9 HEURES DU SOIR.			THERMOMÈTRE		ÉTAT DU CIEL A MIN.	VENTS A MIN.
	RANGON à 0°	TIEM ciel	MOYEN	RANGON à 0°	TIEM ciel	MOYEN	RANGON à 0°	TIEM ciel	MOYEN	RANGON à 0°	TIEM ciel	MOYEN	MAXIMA	MINIMA		
1	763,45	+17,0		763,20	+19,3		762,57	+20,5		764,20	+13,8		+21,0	+7,4	Beau.	E.
2	765,13	+14,8		764,05	+17,9		763,18	+18,8		761,17	+14,8		+19,8	+9,0	Beau	N E.
3	768,60	+12,8		767,84	+12,0		757,31	+9,6		766,89	+9,9		+14,0	+8,0	Couvert	N O
4	757,37	+12,0		766,84	+15,1		766,31	+15,8		766,97	+13,4		+17,4	+6,8	Très nuageux	N N E
5	755,31	+12,6		765,10	+13,7		763,30	+16,6		766,82	+14,1		+17,1	+8,5	Couvert	N N E
6	751,04	+15,7		760,39	+18,5		760,10	+20,3		766,34	+13,9		+20,6	+10,7	Nuageux	N N O
7	751,30	+18,9		756,28	+18,9		760,80	+20,4		763,87	+13,8		+20,4	+10,5	Nuageux	N N O
8	755,46	+15,2		755,17	+20,0		764,34	+18,2		765,41	+14,6		+21,7	+9,5	Vapeurs	N N O
9	748,15	+15,2		755,48	+19,1		764,34	+20,3		766,33	+16,1		+20,6	+9,4	Beau	N N O
10	754,30	+15,9		766,34	+17,4		765,33	+18,2		765,15	+14,1		+19,1	+8,9	Nuageux	N N O
11	754,30	+15,2		766,34	+17,4		765,33	+18,2		765,15	+14,1		+19,1	+8,9	Couvert	N N O
12	758,89	+13,2		768,83	+14,9		768,21	+19,9		761,00	+15,1		+20,7	+9,5	Beau	N N E fort
13	763,48	+14,6		763,34	+17,5		762,61	+19,3		763,54	+15,4		+19,8	+16,3	Beau	N N E
14	763,68	+14,1		763,34	+17,5		762,29	+19,6		761,70	+14,2		+19,8	+16,3	Nuageux	N N E
15	762,51	+11,6		766,75	+13,6		761,02	+12,0		761,81	+9,1		+14,7	+9,6	Beau	N fort
16	769,75	+11,2		768,06	+13,4		766,13	+15,8		764,92	+13,0		+16,2	+6,8	Beau	N fort
17	753,11	+11,4		762,06	+14,3		760,50	+16,0		760,41	+8,8		+16,9	+7,0	Nuageux	N E
18	749,02	+6,4		748,79	+7,0		746,63	+7,9		748,36	+7,0		+7,9	+6,2	Pluie	N E fort
19	747,65	+7,9		748,54	+8,2		749,04	+10,3		750,48	+9,7		+8,9	+7,3	Couvert	N fort
20	749,72	+8,4		750,48	+8,2		750,92	+8,1		752,25	+7,4		+10,2	+6,2	Pluie	N O
21	752,46	+8,2		753,13	+8,7		753,90	+9,8		757,28	+6,6		+9,9	+6,5	Pluie	N O
22	759,40	+13,1		768,81	+16,6		757,55	+18,4		768,00	+13,3		+18,8	+3,8	Nuageux	N E
23	756,34	+14,0		755,60	+18,6		754,58	+20,8		755,02	+15,5		+21,5	+10,0	Beau	N E
24	754,14	+15,7		753,22	+17,5		752,02	+17,6		752,15	+13,0		+15,0	+10,4	Très nuageux	N E
25	753,11	+11,9		753,03	+13,8		752,02	+17,6		755,02	+15,5		+15,0	+10,4	Couvert	N fort
26	757,22	+9,2		757,11	+11,9		752,02	+17,6		755,02	+15,5		+15,0	+10,4	Très nuageux	N fort
27	757,22	+9,2		757,11	+11,9		752,02	+17,6		755,02	+15,5		+15,0	+10,4	Pluie et, en le par moments	N fort
28	757,83	+9,7		756,22	+11,9		755,18	+11,4		754,84	+7,4		+12,2	+6,0	Couvert	N E
29	757,83	+9,7		756,22	+11,9		755,18	+11,4		754,84	+7,4		+12,2	+6,0	Couvert	N E
30	752,68	+13,6		752,31	+14,1		752,70	+10,7		752,08	+11,4		+10,7	+9,0	Couvert	N O
31	754,86	+12,6		755,06	+13,9		754,82	+14,0		755,72	+12,6		+15,5	+9,0	Couvert	N O
32	754,86	+12,6		755,06	+13,9		754,82	+14,0		755,72	+12,6		+15,5	+9,0	Très nuageux	N E
33	756,82	+12,8		755,67	+15,2		755,11	+16,7		755,91	+15,0		+19,0	+9,1	Très nuageux	N E
34	756,08	+12,8		755,67	+15,2		755,11	+16,7		755,91	+15,0		+19,0	+9,1	Très nuageux	N E
35	756,08	+12,8		755,67	+15,2		755,11	+16,7		755,91	+15,0		+19,0	+9,1	Très nuageux	N E
36	756,08	+12,8		755,67	+15,2		755,11	+16,7		755,91	+15,0		+19,0	+9,1	Très nuageux	N E
37	756,08	+12,8		755,67	+15,2		755,11	+16,7		755,91	+15,0		+19,0	+9,1	Très nuageux	N E
38	756,08	+12,8		755,67	+15,2		755,11	+16,7		755,91	+15,0		+19,0	+9,1	Très nuageux	N E
39	756,08	+12,8		755,67	+15,2		755,11	+16,7		755,91	+15,0		+19,0	+9,1	Très nuageux	N E
40	756,08	+12,8		755,67	+15,2		755,11	+16,7		755,91	+15,0		+19,0	+9,1	Très nuageux	N E
41	756,08	+12,8		755,67	+15,2		755,11	+16,7		755,91	+15,0		+19,0	+9,1	Très nuageux	N E
42	756,08	+12,8		755,67	+15,2		755,11	+16,7		755,91	+15,0		+19,0	+9,1	Très nuageux	N E
43	756,08	+12,8		755,67	+15,2		755,11	+16,7		755,91	+15,0		+19,0	+9,1	Très nuageux	N E
44	756,08	+12,8		755,67	+15,2		755,11	+16,7		755,91	+15,0		+19,0	+9,1	Très nuageux	N E
45	756,08	+12,8		755,67	+15,2		755,11	+16,7		755,91	+15,0		+19,0	+9,1	Très nuageux	N E
46	756,08	+12,8		755,67	+15,2		755,11	+16,7		755,91	+15,0		+19,0	+9,1	Très nuageux	N E
47	756,08	+12,8		755,67	+15,2		755,11	+16,7		755,91	+15,0		+19,0	+9,1	Très nuageux	N E
48	756,08	+12,8		755,67	+15,2		755,11	+16,7		755,91	+15,0		+19,0	+9,1	Très nuageux	N E
49	756,08	+12,8		755,67	+15,2		755,11	+16,7		755,91	+15,0		+19,0	+9,1	Très nuageux	N E
50	756,08	+12,8		755,67	+15,2		755,11	+16,7		755,91	+15,0		+19,0	+9,1	Très nuageux	N E
51	756,08	+12,8		755,67	+15,2		755,11	+16,7		755,91	+15,0		+19,0	+9,1	Très nuageux	N E
52	756,08	+12,8		755,67	+15,2		755,11	+16,7		755,91	+15,0		+19,0	+9,1	Très nuageux	N E
53	756,08	+12,8		755,67	+15,2		755,11	+16,7		755,91	+15,0		+19,0	+9,1	Très nuageux	N E
54	756,08	+12,8		755,67	+15,2		755,11	+16,7		755,91	+15,0		+19,0	+9,1	Très nuageux	N E
55	756,08	+12,8		755,67	+15,2		755,11	+16,7		755,91	+15,0		+19,0	+9,1	Très nuageux	N E
56	756,08	+12,8		755,67	+15,2		755,11	+16,7		755,91	+15,0		+19,0	+9,1	Très nuageux	N E
57	756,08	+12,8		755,67	+15,2		755,11	+16,7		755,91	+15,0		+19,0	+9,1	Très nuageux	N E
58	756,08	+12,8		755,67	+15,2		755,11	+16,7		755,91	+15,0		+19,0	+9,1	Très nuageux	N E
59	756,08	+12,8		755,67	+15,2		755,11	+16,7		755,91	+15,0		+19,0	+9,1	Très nuageux	N E
60	756,08	+12,8		755,67	+15,2		755,11	+16,7		755,91	+15,0		+19,0	+9,1	Très nuageux	N E
61	756,08	+12,8		755,67	+15,2		755,11	+16,7		755,91	+15,0		+19,0	+9,1	Très nuageux	N E
62	756,08	+12,8		755,67	+15,2		755,11	+16,7		755,91	+15,0		+19,0	+9,1	Très nuageux	N E
63	756,08	+12,8		755,67	+15,2		755,11	+16,7		755,91	+15,0		+19,0	+9,1	Très nuageux	N E
64	756,08	+12,8		755,67	+15,2		755,11	+16,7		755,91	+15,0		+19,0	+9,1	Très nuageux	N E
65	756,08	+12,8		755,67	+15,2		755,11	+16,7		755,91	+15,0		+19,0	+9,1	Très nuageux	N E
66	756,08	+12,8		755,67	+15,2		755,11	+16,7		755,91	+15,0		+19,0	+9,1	Très nuageux	N E
67	756,08	+12,8		755,67	+15,2		755,11	+16,7		755,91	+15,0		+19,0	+9,1	Très nuageux	N E
68	756,08	+12,8		755,67	+15,2		755,11	+16,7		755,91	+15,0		+19,0	+9,1	Très nuageux	N E
69	756,08	+12,8		755,67	+15,2		755,11	+16,7		755,91	+15,0		+19,0	+9,1	Très nuageux	N E
70	756,08	+12,8		755,67	+15,2		755,11	+16,7		755,91	+15,0		+19,0	+9,1	Très nuageux	N E
71	756,08	+12,8		755,67	+15,2		755,11	+16,7		755,91	+15,0		+19,0	+9,1	Très nuageux	N E
72	756,08	+12,8		755,67	+15,2		755,11	+16,7		755,91	+15,0		+19,0	+9,1	Très nuageux	N E
73	756,08	+12,8		755,67	+15,2		755,11	+16,7		755,91	+15,0		+19,0	+9,1	Très nuageux	N E
74	756,08	+12,8		755,67	+15,2		755,11	+16,7		755,91	+15,0		+19,0	+9,1	Très nuageux	N E
75	756,08	+12,8		755,67	+15,2		755,11	+16,7		755,91	+15,0		+19,0	+9,1	Très nuageux	N E
76	756,08	+12,8		755,67	+15,2		755,11	+16,7		755,91	+15,0		+19,0	+9,1	Très nuageux	N E
77	756,08	+12,8		755,67	+15,2		755,11	+16,7		755,91	+15,0		+19,0	+9,1	Très nuageux	N E
78	756,08	+12,8		755,67	+15,2		755,11	+16,7		755,91	+15,0		+19,0	+9,1	Très nuageux	N E
79	756,08	+12,8		755,67	+15,2		755,11	+16,7		755,91	+15,0		+19,0	+9,1	Très nuageux	N E
80	756,08	+12,8		755,67	+15,2		755,11	+16,7		755,91	+15,0		+19,0	+9,1	Très nuageux	N E
81	756,08	+12,8		755,67	+15,2		755,11	+16,7		755,91	+15,0		+19,0	+9,1	Très nuageux	N E
82	756,08	+12,8		755,67	+15,2		755,11	+16,7		755,91	+15,0		+19,0	+9,1	Très nuageux	N E
83	756,08	+12,8		755,67	+15,2		755,11	+16,7		755,91	+15,0		+19,0	+9,1	Très nuageux	N E
84	756,08	+12,8		755,67	+15,2		755,11	+16,7		755,91	+15,0		+19,0	+9,1	Très nuageux	N E
85	756,08	+12,8														

COMPTE RENDU

DES SÉANCES

DE L'ACADÉMIE DES SCIENCES.

SÉANCE DU LUNDI 17 JUIN 1844.

PRÉSIDENCE DE M. CHARLES DUPIN.

MÉMOIRES ET COMMUNICATIONS

DES MEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE L'ACADÉMIE.

MECANIQUE ANALYTIQUE. — *Mémoire sur l'intégration des équations de la courbe élastique à double courbure ; par M. J. BINET.* (Extrait.)

« Le problème de l'équilibre d'une courbe élastique quelconque, dont toutes les parties sont sollicitées par des forces extérieures, a été traité avec étendue par Lagrange, dans la seconde édition de la *Mécanique analytique*. Peu de temps après, je fis remarquer aux géomètres que la considération de l'élasticité de l'angle de contingence est insuffisante, pour représenter la réaction complète d'une courbe non comprise dans un même plan, sous l'action des forces qui la sollicitent : alors, il devient nécessaire d'avoir égard, en chaque point de la courbe, à une seconde réaction qui s'exerce sur l'angle formé par les plans osculateurs consécutifs, et que l'on peut regarder comme produisant la torsion des éléments matériels de la courbe, parallèlement à son plan normal au même point. En partant des principes de cette théorie, Poisson reprit la même question, par des méthodes plus simples que celles que j'avais suivies ; et il parvint à un théorème important, savoir : que, dans

une courbe élastique à double courbure le moment de cette élasticité de torsion est constant, dans toute l'étendue de la courbe en équilibre.

Lagrange avait formé les équations de l'équilibre pour le cas spécial où l'angle de contingence est en raison inverse du rayon osculateur. La courbe n'étant d'ailleurs soumise qu'à l'action de forces agissant à ses extrémités, ces hypothèses sont les plus naturelles et les plus simples que l'on puisse se proposer. Cependant, après avoir donné les équations différentielles du second ordre de la courbe, le grand analyste ajoute ces mots : Mais l'intégration ultérieure est peut-être impossible en général. » Les géomètres

n'eurent guère de telles réflexions qu'après avoir tenté l'intégration et avoir rencontré une difficulté insoluble. Lagrange abandonne donc la double courbure et il retrouve pour la courbe plane les résultats connus. Les formules plus complètes de Poisson se ramènent à celles de Lagrange, si l'on suppose nul le moment de la torsion, ce qui n'est pas permis en général. On pouvait craindre que leur intégration présentât encore plus de difficultés que les équations de Lagrange et aucun analyste, que je sache, n'y est parvenu. J'ai quelquefois hésité à aborder ce sujet en raison de la complication qu'il faisait entrevoir comme inévitable. Les savantes recherches de M. de Saint-Venant sur la résistance des pièces solides à double courbure, m'ayant ramené vers un champ d'études que j'avais perdu de vue, j'ai voulu m'assurer si la difficulté de l'intégration des équations de la courbe élastique était insurmontable : après plusieurs tentatives, et après quelques transformations, j'ai vu se développer une analyse régulière qui offre, dans sa première partie de singuliers rapports avec celle du pendule à oscillations coniques. Ainsi les fonctions elliptiques qui se présenterent à Jacques Bernoulli, pour la courbe élastique plane, fournissent encore dans la question générale, les intégrations qui abaissent au premier ordre les équations différentielles. Dans l'intégration définitive, l'élément de chaque coordonnée est une fonction plus composée, où entrent des sinus et des cosinus d'une fonction elliptique. Ces combinaisons ne paraissent pas susceptibles, quant à présent, d'être réduites aux simples fonctions elliptiques, mais le problème analytique n'en est pas moins résolu, puisqu'il est ramené aux quadratures.

ANALYSE

Les équations dérivées complètes de la courbe élastique à double courbure en équilibre sous l'action de forces qui agissent à ses extrémités seulement, et dont l'élasticité de l'angle de contingence est en raison inverse du rayon de courbure, sont de cette forme

$$p \frac{dy \, d^2z - dz \, d^2y}{ds^2} = \theta \frac{dx}{ds} + cy - bz + a_1,$$

$$p \frac{dz \, d^2x - dx \, d^2z}{ds^2} = \theta \frac{dy}{ds} + az - cx + b_1,$$

$$p \frac{dx \, d^2y - dy \, d^2x}{ds^2} = \theta \frac{dz}{ds} + bx - ay + c_1,$$

où x, y, z sont des coordonnées rectangulaires, et $ds = \sqrt{dx^2 + dy^2 + dz^2}$ est la différentielle constante; $a, b, c, a_1, b_1, c_1, p, \theta$ sont des grandeurs constantes. θ est la quantité qui représente le moment de l'élasticité de torsion, que j'ai introduit dans cette théorie, et que Poisson a démontré constant (voyez le troisième volume de la *Correspondance sur l'École Polytechnique* et la *Mécanique* de Poisson). Quand on suppose $\theta = 0$, ces formules sont celles de la *Mécanique analytique*, premier volume, page 156. Pour procéder à leur intégration, il convient de les différencier par ds , et quoique alors elles deviennent du troisième ordre, ne renfermant que les dérivées $x' = \frac{dx}{ds}$, $x'' = \frac{d^2x}{ds^2}$, etc., elles ne seront encore que du second ordre, entre x', y', z' , considérées comme variables principales. Avec ces équations ainsi différenciées, on forme une combinaison qui permet une intégration immédiate. Cette nouvelle relation est de la forme

$$p(x''^2 + y''^2 + z''^2) = 2(ax' + by' + cz' + c),$$

c désignant une constante d'intégration on a d'ailleurs

$$x'^2 + y'^2 + z'^2 = 1.$$

» Par un changement de variables ou de coordonnées, on transforme ces relations en d'autres plus simples pour cela on dispose des arbitraires qui lient les nouvelles coordonnées ξ, η, ζ , aux x, y, z ; on arrive ainsi à des équations de cette forme

$$\xi'^2 + \eta'^2 + \zeta'^2 = 1,$$

$$p(\eta' \xi'' - \xi' \eta'') = \theta \xi'' + g \eta',$$

$$p(\xi' \xi'' - \xi' \xi'') = \theta \eta'' - g \xi',$$

$$p(\xi' \eta'' - \eta' \xi'') = \theta \zeta'',$$

où $g = \sqrt{a^2 + b^2 + c^2}$ est une grandeur constante, et l'intégrale obtenue

devient

$$p(\xi'^2 + v'^2 + \zeta'^2) = 2(g\zeta' + e).$$

L'intégration de la quatrième formule donne

$$p(\xi'v' - v'\zeta') = \theta\zeta' + h,$$

h étant l'arbitraire d'intégration.

» Des combinaisons faciles conduisent ensuite à l'équation séparée

$$ds = \frac{pd\zeta'}{\sqrt{2p(e + g\zeta')(1 - \zeta'^2) - (h + \theta\zeta')^2}},$$

qui donne s par une fonction elliptique de première espèce. Les dérivées ξ' , v' des coordonnées peuvent être rapportées à une autre fonction elliptique, posant

$$\Phi = \int \frac{d\zeta'}{(1 - \zeta'^2) \sqrt{2p(e + g\zeta')(1 - \zeta'^2) - (h + \theta\zeta')^2}},$$

l'intégrale indéfinie étant prise à partir d'une première limite, indépendante des constantes e , g , h : on trouve alors, H et K désignant de nouvelles constantes d'intégration,

$$\xi' = \sqrt{1 - \zeta'^2} \cos[H - \Phi(h)] = \frac{d\xi}{ds},$$

$$v' = \sqrt{1 - \zeta'^2} \sin[H - \Phi(h)] = \frac{dv}{ds},$$

$$s = K + \Phi(e)$$

nous avons dénoté ici par $\Phi(e)$, $\Phi(h)$ des dérivées partielles de la fonction Φ , rapportées aux constantes e et h , savoir $\frac{d\Phi}{de}$, $\frac{d\Phi}{dh}$.

» Par ces formules, on obtient sur-le-champ

$$\xi = \int \frac{pd\zeta' \sqrt{1 - \zeta'^2}}{\sqrt{2p(e + g\zeta')(1 - \zeta'^2) - (h + \theta\zeta')^2}} \cdot \cos[H - \Phi(h)],$$

$$v = \int \frac{pd\zeta' \sqrt{1 - \zeta'^2}}{\sqrt{2p(e + g\zeta')(1 - \zeta'^2) - (h + \theta\zeta')^2}} \cdot \sin[H - \Phi(h)].$$

Quant à la valeur de ζ , on a

$$d\zeta = \zeta' ds,$$

ou bien

$$\zeta = \int \frac{\rho \xi d\xi}{\sqrt{2\rho(\varepsilon + g\xi)(1-\xi) - (h + g\xi)}} = \Phi(g)$$

Les variables ξ , ν , ζ , qui répondent à système spécial de coordonnées rectangulaires, devront être substituées dans les valeurs de x , y , z , ou elles sont multipliées par des coefficients constants. On obtiendra de cette manière x , y , z , à l'aide d'une seule variable ζ , avec les constantes d'intégration requises par l'ordre des équations à intégrer.

On trouve dans le Mémoire des détails analytiques et mécaniques que l'étendue de cet extrait ne permet pas de développer.

HYDRAULIQUE — *Conditions pour qu'une pouzzolane artificielle convienne à l'eau de mer*, par M. VICAT

Toutes les argiles qui contiennent assez de carbonate de chaux pour qu'après cuisson il se soit formé un silicate d'alumine et de chaux en proportions quelconques, mais telles cependant que la chaux fasse au moins la dixième partie de l'argile attaquée, toutes ces argiles, disait-on, sont propres à fournir des pouzzolanes artificielles propres à l'eau de mer. Seulement, il ne faut leur appliquer que le degré de cuisson nécessaire à la décomposition du carbonate de chaux (8 à 10 degrés du pyromètre) et ne pas le prolonger au-delà du temps nécessaire à cette décomposition. La potasse caustique, ajoutée en proportions de 5 p. 100 à une argile pure, remplace efficacement le carbonate de chaux.

Il suit de là que la condition à remplir pour qu'une pouzzolane convienne à l'eau de mer, c'est que l'argile y ait été attaquée par un fondant, mais à tel point que les principes ne soient pas trop fortement liés par cette combinaison. Dans ces cas l'argile forme immédiatement par voie humide avec la chaux éteinte qui intervient pour la confection du béton, une combinaison nouvelle qui n'est point décomposée par le sulfate de magnésie de l'eau de mer.

J'ai trouvé un procédé très-simple pour être maître de la durée et de l'intensité du feu appliqué aux argiles sous forme pulvéulente et en grand.

ASTRONOMIE — M. ARAGO a rendu compte verbalement des remarques qu'on a eu l'occasion de faire à l'Observatoire, pendant la dernière éclipse totale de Lune. Il a particulièrement insisté sur les *traces manifestes de po-*

larisation qu'on apercevait en analysant, à l'aide d'un polariscope, la lumière rougeâtre qui était répandue sur le disque lunaire, au moment même de la conjonction M Arago reparlera plus en détail de cet étrange phénomène. Tous ses collaborateurs à l'Observatoire ont bien voulu, à sa prière, en constater l'existence.

NOMINATIONS

L'Académie procède, par la voie du scrutin, à la nomination d'une Commission pour la révision des comptes de l'année 1843. Cette Commission doit se composer de deux membres qui peuvent être réélus.

Au premier tour de scrutin MM **POUCELET** et **THENARD**, membres sortants, réunissent la majorité des suffrages.

MEMOIRES LUS

CHEMIE — *Memoire sur les ferments alcooliques, par M BOUCHARDAR*
(Extrait)

(Commissaires, MM Flourens, Dumas, Regnault)

J'ai pour but, dans le Memoire que j'ai l'honneur de présenter à l'Académie, et dont je vais lire un extrait succinct, 1° de faire connaître deux espèces de ferments alcooliques distincts de la levure de bière, 2° de présenter une discussion approfondie sur la nature de ces êtres organiques, en m'appuyant sur des expériences et des observations nouvelles. 3° d'indiquer les applications à l'économie rurale qui se déduisent de ces recherches, pour arriver aux conditions les plus favorables à la fermentation des vins et autres liqueurs fermentées.

Les caractères principaux des trois ferments alcooliques que j'ai distingués sont réunis dans le tableau suivant, ils sont représentés vus à un grossissement de 455 dans les figures que je dépose sur le bureau.

Tableau contenant le résumé des caractères des trois espèces de ferments alcooliques

Ferment de la bière (fermentum cerevisiae^[1], fig. 1)

1° Globules quelquefois parfaitement ronds, mais ordinairement ovales. Ces globules ne sont pas aplatis comme ceux du sang, mais ils ont une forme assez régulièrement sphéroïdale comme les globules albumineux du cerveau. Le diamètre de ces globules varie, dans mes observations, de $\frac{1}{10}$ à $\frac{1}{12}$ de millimètre de diamètre.

2° Le plus grand nombre des globules du ferment de bière sont bien isolés les uns des autres; quelques uns cependant portent sur leur côté un globe plus petit qui n'est pas simplement posé, mais qui paraît procéder du gros globe et être encore sous sa dépendance, quelques uns des petits globules sont unis au gros par un petit prolongement très manifeste.

3° Couleur de la masse uniformément gris blanchâtre, chaque globe renferme un contenu granuleux.

4° Insoluble dans l'eau pure, insoluble dans l'eau contenant un peu d'acide chlorhydrique, soluble dans l'acide chlorhydrique concentré, qui prend une belle couleur violette. En grande partie soluble dans l'eau contenant 0,001 d'acide chlorhydrique, après avoir été broyé longtemps avec des grains de silice.

5° L'éther lui enlève environ 0,05 d'un corps gras liquide contenant de l'oléine, de la stéarine et une huile qui renferme du phosphore au nombre de ses éléments.

6° L'alcool lui enlève des acides lactique et phosphorique et des matières extractives.

7° Composition. — Des substances albumineuses, mais contenant plus d'oxygène, renfermant aussi du soufre et du phosphore.

8° Propriétés essentielles. — Placé dans l'eau de sucre à une température variant entre 10 et 12 degrés, détermine une fermentation vive, terminée dans l'espace de quelques jours, ne fonctionnant pas dans des liqueurs très chargées en alcool. Ne détruit pas l'acte de la fermentation vive.

9° Bonneilli dans la bière ordinaire.

Ferment de la lie (fermentum sacis), fig. 3

1° Globules le plus souvent parfaitement ronds, quelques uns cependant sont ovales, ils ne sont pas aplatis comme ceux du sang, mais ils ont une forme assez régulièrement sphéroïdale, ils ressemblent infiniment aux globules albumineux du cerveau. Le diamètre de ces globules varie de $\frac{1}{10}$ à $\frac{1}{12}$.

2° Presque tous les globules du ferment de la lie sont bien isolés les uns des autres; quelques uns cependant portent sur leur côté un globe plus petit qui n'est pas simplement posé, mais qui paraît procéder du gros globe et être sous sa dépendance.

3° Couleur de la masse uniformément gris blanc chair, chaque globe renferme un contenu lobuleux.

4° Idem

5° Idem

6° Idem

7° Idem

8° Placé dans de l'eau de sucre à une température de 10 à 12 degrés centigrades, détermine une fermentation lente qui n'est terminée qu'après trois ou quatre mois, vit et fonctionne dans des liqueurs contenant 16 pour 100 d'alcool. Ne se détruit pas sensiblement dans l'acte de la fermentation lente.

9° Bonneilli dans une bière très forte.

Ferment noir (ferm. nigrum), fig. 2

1° Globules parfaitement ronds, ils ne sont pas aplatis comme ceux du sang. Les dimensions de ces globules varient de $\frac{1}{10}$ à $\frac{1}{12}$ de millimètre.

2° Tous les globules du ferment noir sont isolés, quand ils sont allongés ou qu'ils portent sur leur côté de petits globules annexes, ils sont toujours isolés et n'ont aucun plus comme ferments alcooliques.

3° Examinés au microscope, le globe présente un cercle noir bien prononcé. La couleur de la masse est uniformément gris-noirâtre. On ne distingue point dans chaque globe de contenu granuleux.

4° Idem

5° L'ether lui enlève 0,003 d'une matière grasse liquide contenant de l'oléine et de la stéarine, et une huile qui tient du phosphore au nombre de ses éléments.

6° Idem

7° Idem

8° Placé dans de l'eau de sucre à une température de 10 à 12 degrés centigrades, détermine une fermentation lente qui n'est terminée qu'après six mois, vit et fonctionne dans des liqueurs contenant plus de 1° pour 100 d'alcool. Ne se détruit pas sensiblement dans l'acte de la fermentation lente.

9° Bonneilli dans un dépôt de vin blanc.

[1] J'ai adopté comme nom générique le terme *ferment* au lieu de *levure* parce qu'il est le plus exact et le plus d'usage.

Les faits contenus dans ce tableau montrent que ces trois ferments alcooliques diffèrent les uns des autres 1° par la forme, la couleur, la dimension et le contenu des globules, 2° par la manière dont ils décomposent le sucre 3° par le milieu dans lequel ils vivent

Ils se désignent sous les noms de *ferment de la bière*, *ferment de la lie* et *ferment noir*

Le ferment de la lie et le ferment noir sont surtout remarquables, parce qu'il aide d'une fermentation lente, ils peuvent déterminer la formation de liquours alcooliques plus riches que les vins les plus généreux

Pour m'éclairer sur la nature des ferments, j'ai étudié leur composition immédiate et élémentaire, et l'action sur ces globules de l'eau contenant un millième d'acide chlorhydrique

Composition immédiate des ferments alcooliques — Voici la liste des substances qui entrent dans la composition des ferments 1° matière animale protéique, insoluble dans l'alcool, renfermant de l'azote, de l'hydrogène, du carbone, de l'oxygène, du soufre et du phosphore, 2° matière azotée, soluble dans l'alcool, 3° graisse solide, 4° graisse liquide phosphorée, 5° acide lactique, lactate de chaux et de soude, 6° phosphate acide de chaux, phosphate acide de soude

Composition élémentaire — La substance animale protéique qui forme la partie essentielle du ferment diffère du caséum, de l'albumine et de la fibrine par un excès d'oxygène qui n'est pas moindre de 2 pour 100

» *Action de l'acide chlorhydrique à 0,001* — L'eau contenant 1 millième d'acide chlorhydrique dissout avec facilité comme je l'ai montré, l'albumine, le caséum, etc., les ferments alcooliques résistent complètement à cette action dissolvante, ils s'y dissolvent en partie lorsque les globules ont été déchirés par la porphyrisation, ces expériences nous prouvent que les matières protéiques des globules du ferment sont constituées par deux substances différentes l'une, incluse, soluble dans l'eau acidulée, l'autre, enveloppante, insoluble dans ce dissolvant

Je vais décrire une expérience qui nous montre l'analogie des ferments avec les globules animaux

Action du cerveau d'un homme adulte sur l'eau de sucre — J'ai pris 15 grammes du cerveau d'un homme adulte, je l'ai délayé dans un litre d'eau et j'y ai ajouté 250 grammes de sucre. Après quarante huit heures, la température étant de 25 degrés centigrades, la fermentation alcoolique a commencé et elle a continué à marcher régulièrement

» Au premier abord on serait tenté de n'apercevoir ici qu'un fait analogue

a ceux signalés par M. Colin (*Annales de Chimie et de Physique*, t. XXVIII et XXX). Ce chimiste a, en effet, prouvé que l'albumine de l'œuf et plusieurs autres matières organiques pouvaient devenir ferments alcooliques. Mais voici la différence entre les résultats de M. Colin et celui que j'annonce : l'albumine mise en présence de l'eau de sucre à la température de 33 degrés ne parvient qu'après trois semaines à se convertir en un ferment dont l'action est très-faible, tandis que la masse cérébrale d'un adulte agit au bout de quarante-huit heures comme ferment alcoolique énergique.

La substance qui compose le cerveau est formée par la réunion de globules de différentes sortes. Parmi eux, les plus importants sont les globules albumineux, qui présentent l'aspect microscopique du ferment de la lie et qui agissent comme lui sur l'eau de sucre, ces globules ne sont pas constitués par de l'albumine pure, comme on l'a cru jusqu'ici. En effet, si on délaisse la masse cérébrale d'un adulte dans de l'eau acidulée avec 0,001 d'acide chlorhydrique, cette prétendue albumine ne se dissout pas, il faut, pour obtenir la dissolution, la broyer au préalable avec de la silice. Ces expériences nous montrent que les globules protéiques du cerveau sont formés, comme les globules du ferment, d'une enveloppe insoluble dans l'eau acidulée et d'une matière albumineuse incluse, soluble dans ce véhicule.

Si au lieu de prendre la masse cérébrale d'un animal adulte, on choisit celle d'un animal qui vient de naître, qu'on la délaisse dans l'eau de sucre et qu'on expose le mélange à une température de 25 degrés centigrades, la fermentation alcoolique n'est pas déterminée, mais c'est la transformation muqueuse qu'on observe.

La raison de cette différence est très-simple. Les enveloppes des globules du cerveau d'un jeune animal ne sont pas résistantes, elles se détruisent par endosmose dans l'eau de sucre, et les globules n'existant plus, la fermentation alcoolique ne peut avoir lieu.

Nature des globules des ferments alcooliques — Les globules des ferments alcooliques présentent l'analogie la plus complète avec les globules nerveux des animaux supérieurs. Quand, dans des conditions définies, ces globules se ramifient et se transforment en végétaux infusoires, ils ont perdu leurs caractères de ferments : les spores eux-mêmes de ces nouveaux végétaux ne possèdent pas la propriété de décomposer l'eau de sucre.

Expérience sur le développement des globules de ferment alcoolique — J'ai fait dissoudre quatre blancs d'œuf et 1 kilogramme de sucre dans 4 litres d'eau contenant 0,001 d'acide chlorhydrique. Les liqueurs furent filtrées avec le plus grand soin et divisées en deux flacons égaux. Je n'ajoutai

rien dans le premier flacon, et, après deux mois, la température variant de 15 à 25 degrés centigrades, la fermentation alcoolique ne s'était pas déclarée. Dans le second flacon, j'ajoutai une dissolution également bien limpide de 10 grammes de tanin dans 100 grammes d'eau. Il se forma aussitôt un précipité abondant qui, après quarante-huit heures d'exposition à une température de 25 degrés, se trouva transformé en partie en globules de $\frac{1}{100}$ de millimètre, se comportant absolument avec l'eau de sucre comme le ferment de la lie.

Sur la multiplication des globules du ferment — Tous les chimistes savent, depuis les expériences de M. Thenard, que, lorsqu'on fait fermenter l'eau de sucre à l'aide d'une quantité suffisante de globules de ferment, quand une première fermentation est achevée, le poids des globules est notablement diminué, après une seconde fermentation, ils ont presque entièrement disparu et sont remplacés par un sel ammoniacal qu'on retrouve dans le liquide, et par des débris de végétaux microscopiques, ou M. Thenard a reconnu l'existence du ligneux, mais cette observation ne peut être invoquée pour établir la non-reproduction des globules du ferment. On peut dire que ces globules ont besoin de deux espèces de nourriture : le sucre, pour produire de la chaleur par son doublement, et la matière azotée pour fournir les éléments convenables à leur assimilation et à leur reproduction. Voici ce que l'expérience répond par rapport à cette dernière supposition.

J'ai pris 1 kilogramme de sucre, 4 litres d'eau, 50 grammes de levure et 200 grammes d'albumine de l'œuf qui a été dissoute dans l'eau à l'aide de 0,001 d'acide chlorhydrique. La température étant maintenue à 20 degrés, la fermentation s'est promptement établie et a continué à marcher avec régularité pendant quatre jours, étant alors ralentie, j'ai recueilli le ferment et je m'en suis servi. On trouve que du poids de 50^{gr},5. Il y a loin de là à la multiplication de 1 à 7 observée dans la cuve du brasserie. Les globules du ferment n'ont pu, en aucune manière, s'assimiler la matière albumineuse, pas plus que le sucre. D'autre part, j'ai répété l'expérience précédente en remplaçant les 200 grammes d'albumine par 100 grammes de gluten frais, dissous aussi à la faveur de l'eau acidulée avec 0,001 d'acide chlorhydrique. J'employai encore 50 grammes de levure. La fermentation marcha régulièrement pendant quatre jours. Le ferment recueilli à cette époque ne pesait plus que 49^{gr},2. On le voit, les globules du ferment ne s'assimilent pas plus l'eau de sucre que les dissolutions d'albumine ou de gluten. Ne ressort-il pas de ces expériences que, si dans la cuve du brasseur on retrouve 7 de ferment lorsqu'on n'en a mis que 1, cela tient uniquement à ce que 1 de ferment a rencontré des substances

proteiques qui, placees dans un milieu fermentant, sont propres à donner spontanément naissance à des globules de ferment, de même que dans le moût de raisin, sans avoir ajouté de ferment, on en retrouve cependant une quantité considérable ?

Applications — Les expériences et les observations que j'ai exposées dans mon Mémoire ont été entreprises dans un but purement théorique, mais la question des fermentations alcooliques touche à tant de points qui intéressent l'économie rurale et manufacturière, que j'ai cru utile de développer les applications principales qui découlaient de mes recherches. J'ai insisté surtout sur les conditions de la fabrication des vins et sur leurs maladies. J'ai montré que le procédé de la fermentation lente pourrait être souvent substitué avec avantage au procédé de la fermentation rapide. J'ai donné les moyens de préparer, à l'aide des fermentations lentes, des liqueurs aussi riches en alcool que les vins les plus généreux, et destinées soit à servir de boisson, soit à être distillées.

ACOUSTIQUE — *Examen des phénomènes qui se produisent pendant la formation des sons, dans les tuyaux ouverts et fermes, par M. CH. FERMONT*

(Commission précédemment nommée)

Dans un précédent Mémoire, j'ai fait connaître le phénomène d'aspiration qui se produit dans les tuyaux ouverts ou dans l'héliophone, lorsque l'on vient à leur faire rendre un son. Dans le but de savoir si la colonne moyenne est utile à la production du son, j'ai tenté quelques expériences dont les résultats m'ont paru assez nouveaux pour que j'aie cru devoir en faire connaître le résumé à l'Académie.

À cet effet, j'ai produit des sons dans un tuyau ouvert, en introduisant successivement et exactement au milieu de l'espace intérieur des tubes fermes de diverses grosseurs, et j'ai pu m'assurer qu'à mesure que l'on y introduit des tubes plus gros, à mesure aussi les premiers sons, c'est-à-dire les sons 1 et 2, disparaissent tandis que les autres sortent encore sans altération, et en même temps j'ai pu constater que l'intensité, dans tous les cas, était considérablement diminuée, d'où il m'a paru raisonnable de penser qu'à mesure que l'on diminue l'étendue de la section hélicoïdale, à mesure aussi le son s'élève, et que le mouvement contraire qui se forme au centre de la spirale sonore concourt à l'intensité du son.

» D'un autre côté, l'on sait que les sons rendus par des tuyaux très-étroits sont plus aigus que ceux qui sont rendus par des tuyaux d'un diamètre plus

grand Il me restait à concilier ces résultats avec ceux que D Bernoulli avait si bien observés et qui paraissent un peu contraires à ces expériences puisqu'il a établi que tous les tuyaux de même longueur, cylindriques ou prismatiques donnent le même son fondamental et la même série 1, 2, 3 4, etc quel que soit leur diamètre, pourvu que leur longueur soit égale à 10 ou 12 fois leur diamètre Or, d'après ce que nous venons de voir, on ne comprendrait guère comment le diamètre, qui peut varier dans le rapport de 10 à 12 n'entraîne pas une différence dans la série des sons rendus par ces divers tuyaux

J'ai dû chercher un autre mode d'expérimentation, et les expériences suivantes vont faire connaître que lorsque l'on diminue la section hélicoïdale par la circonférence au lieu de la diminuer par le centre, ainsi que je l'ai dit plus haut, on obtient exactement les mêmes résultats que ceux que je viens de signaler, c'est à-dire que la plus légère différence dans le diamètre entraîne une dans la hauteur du son produit

Si en effet au lieu de prendre des tuyaux dont la longueur égale 10 ou 12 fois le diamètre, on prend des tuyaux dont le diamètre égale la longueur alors les sons changent aussitôt que le diamètre varie Si par exemple, on substitue à un tuyau ayant une longueur de 21 millimètres sur un diamètre égal un tuyau de même longueur, mais d'un diamètre de 24 millimètres, le son est baissé d'une tierce mineure

L'instrument dont la description va suivre me paraît très propre à rendre sensible l'influence des variations de diamètre sur la hauteur des sons, en même temps qu'il démontre la solidarité des *tuyaux communiquants* dans la production des sons

Par une capacité commune où se produit le son, je fais communiquer trois tubes de manière à ce que deux d'entre eux soient placés horizontalement sur la même ligne, tandis que l'autre vient les couper à angle droit Chacun de ces tubes est muni d'un piston qu'à l'aide d'une tige l'on peut avancer ou retirer à volonté L'embouchure se compose simplement d'un disque mince de liège, troué en son milieu, et qui ferme la capacité commune À l'aide de cet instrument, on peut voir qu'aussitôt que l'on retire les pistons latéraux d'une certaine quantité, on baisse la note exactement de la même manière que si l'on retirait le piston vertical d'une égale quantité, les pistons latéraux étant remis en place Cette solidarité des tuyaux dans la production des sons m'a paru d'une assez grande importance pour être présentée ici Plus tard nous verrons, théoriquement, la conséquence qu'il est permis d'en

Comment donc Bernoulli, cet observateur si exact, avait-il été conduit à tirer de ses expériences la conséquence que j'ai indiquée plus haut ? Si je ne m'abuse, je suis porté à croire que deux causes d'erreur ont dû le conduire à adopter cette manière de voir. La première consiste dans la disposition qu'il donnait à ses tuyaux et dans le trouble qui se produit toujours près de l'embouchure, la seconde, dans la dimension des tuyaux sur lesquels il expérimentait. Nous verrons plus tard, en effet, que plus les tuyaux augmentent de volume, plus la différence dans le diamètre peut être grande sans que le son soit sensiblement altéré.

J'ai répété les expériences de Bernoulli, en me servant de tuyaux dans lesquels l'embouchure me paraît permettre la production des sons avec le moins de trouble possible. Mes tuyaux sont simplement des tubes en verre à l'un des bouts desquels je place un disque mince de liège ou de carton troué en son milieu et qui sert d'embouchure. D'un autre côté, ainsi qu'on le verra plus loin, j'ai pu reconnaître que les résultats obtenus avec les tuyaux fermés sont toujours plus exacts qu'avec les tuyaux ouverts. Cette raison a dû me faire donner la préférence aux tuyaux fermés.

Dans ces conditions j'ai fait résonner deux tuyaux, l'un de 24 millimètres de diamètre, ayant à volonté 240 ou 288 millimètres de longueur (pour me placer dans les conditions de rapport indiquées par Bernoulli), l'autre de 20 millimètres de diamètre, ayant les mêmes longueurs, et j'ai pu constater l'intervalle d'une seconde. J'ai varié ces expériences de beaucoup de manières, et constamment j'ai obtenu le même résultat.

» Ces expériences étaient précisément nécessaires pour établir la relation qui existe entre la hauteur du son et l'étendue de la section hélicoïdale, ou simplement la section hélicoïdale.

D'après ce qui précède, il me semble que l'on peut établir que la hauteur du son est en raison inverse de la section hélicoïdale.

» D'un autre côté, les expériences sur les cordes, la sirène, la roue dentée, l'hélicophone, etc., prouvent que la hauteur du son est en raison directe de la vitesse.

» Enfin, avec les tuyaux, les cordes, l'hélicophone, etc., on démontre que la hauteur du son est en raison inverse de la longueur de la spirale.

» Ces trois causes de la hauteur du son constituent une relation que me paraît représenter la formule suivante

$$\lambda = \frac{v}{f},$$

dans laquelle v exprime la vitesse, l , la longueur de la spirale, s , la section hélicique, et h , la hauteur du son

Nous démontrerons plus tard comment ces trois causes, vitesse, longueur de la spirale et section hélicique, concourent à un principe unique en vertu duquel l'oreille perçoit une seule et même note

Les résultats précédents m'ont conduit à rechercher si les tuyaux tels qu'on les emploie dans les jeux d'orgues considérés comme instruments précis d'acoustique, ne laissent pas dans leur confection quelque chose à désirer, et les expériences suivantes vont faire connaître, je pense, que les phénomènes se compliquent considérablement lorsque l'on fait usage de tuyaux d'orgues. Dans ces tuyaux, en effet, près de l'embouchure il se produit un trouble qui va proportionnellement croissant à mesure que l'on raccourcit le tuyau, et c'est là, il me semble, une cause de complication dans les résultats

C'est afin d'éviter autant que possible ce trouble, que je me sers d'embouchures faites comme je l'ai dit plus haut. En dirigeant le vent dans cette embouchure à la manière de la flûte de Pan et à l'aide d'un petit tube dont le diamètre est en rapport avec elle, on obtient des sons très purs et faciles à déterminer. De cette manière je rends les embouchures, dans les tuyaux ordinaires, semblables à l'embouchure des flûtes qui m'ont servi à faire mes expériences, et dans lesquelles le peu de trouble qui s'y produit est attesté par la régularité des sons

Mes tuyaux diffèrent des tuyaux connus par cette particularité bien simple, que l'embouchure, au lieu d'être placée à une extrémité, est placée exactement au milieu de la colonne qui doit entrer en mouvement. Il en résulte qu'un tuyau pareil peut offrir un, deux ou trois ouvertures pendant la production des sons. Appelant *tuyaux fermes* ceux qui ont les deux extrémités fermées, et *tuyaux ouverts* ceux qui les ont ouvertes, nous nommerons *tuyaux demi-fermes* ceux qui ont un seul côté ouvert, et nous verrons qu'ils correspondent exactement aux tuyaux ouverts de Bernoulli

» D. Bernoulli a démontré qu'un tuyau d'une certaine longueur rend un son à l'octave grave du son que rendrait le même tuyau coupé par moitié, mais si l'on continue ainsi de diviser le reste par moitié, on obtient des sons qui ne sont plus l'octave. Pourquoi donc n'obtient-on pas des octaves de plus en plus aiguës ? Ces résultats restaient, pour moi, sans explications suffisantes, et voilà alors, dans le but d'en connaître la cause, les recherches que j'ai entreprises

J'ai pris une série de tuyaux dont les longueurs étaient comme la progression géométrique décroissante suivante — 32 16 8 4 2 1. Leur diamètre était de 24 millimètres. Le premier avait 62 centimètres de longueur

Voici maintenant l'examen comparatif des sons rendus par les memes tuyaux mais embouchés différemment

1° Tuyaux embouchés par le milieu et fermes

Le son fondamental du 1 ^{er} tuyau	= <i>ut</i>
2 ^{me}	= <i>fa</i>
3 ^{me}	= <i>si</i> octave
4 ^{me}	= <i>fa</i> , octave
5 ^{me}	= <i>si</i> , 2 octaves
6 ^{me}	= <i>fa</i> , 2 octaves

On voit facilement que les octaves sont divisées par moitié comme les tuyaux

2° Tuyaux embouchés par un bout et fermes

Le son fondamental du 1^{er} tuyau = *ut* (le son fondamental ne sort qu'avec une embouchure plus large)

2 ^{me}	= <i>si</i>
3 ^{me}	= <i>sol</i> *
4 ^{me}	= <i>re</i>
5 ^{me}	= <i>la</i>
6 ^{me}	= <i>fa</i>

Dans le premier cas, le rapport entre les sons et les longueurs est facile à saisir. Dans le second, au contraire, on ne saisit plus aucun rapport. Ceci considéré même sous le point de vue des intervalles, il n'existe encore aucun rapport. En effet, l'intervalle qui sépare le son fondamental du premier tuyau du son fondamental du tuyau suivant, est d'une septième diminuée, l'intervalle du second au troisième est d'une sixte, l'intervalle du troisième au quatrième est d'une quinte diminuée, l'intervalle du quatrième au cinquième est d'une quinte diminuée, enfin l'intervalle du cinquième au sixième est d'une sixte.

Tous ces phénomènes trouveront plus tard, je l'espère, leur explication. Quant aux tuyaux ouverts, ceux de Bernoulli et les miens présentent des rapports identiques avec les sons. Avec eux les octaves ne sont plus divisées par moitié, comme dans le premier cas cité, mais les sons présentent très sensiblement des intervalles de sixte d'un tuyau à l'autre, soit que l'on prenne le tuyau embouché par une extrémité ou par le milieu, soit que l'on agisse avec le tuyau demi-fermé ou le tuyau ouvert.

En général, le premier tuyau ouvert rend un son exactement à la même hauteur que le deuxième tuyau demi-fermé. Celui-ci, ouvert, rend le même

son que le suivant demi-fermé, et ainsi de suite pour tous les autres de la série décroissante

J'ai dit plus haut que les tuyaux ouverts de Bernoulli devaient être considérés comme des tuyaux demi-fermés et qu'ils leur correspondent exactement. Si en effet, à la hauteur de la bouche d'un tuyau d'orgue ou d'un flageolet, mais du côté opposé à cette bouche, on pratique une ouverture, le son que rendra alors le tuyau sera d'autant plus élevé que l'ouverture embrassera une plus grande partie de la circonférence du tuyau. J'ai pu m'assurer que le son pouvait s'élever, dans ces conditions, de toute une quarte. Si maintenant on fait cette observation, que la bouche est prise sur cette base du tuyau, et si de plus l'on considère qu'il est impossible de faire une ouverture qui embrasse toute cette base, on comprendra facilement que le son puisse s'élever à une sixte si cette base était entièrement libre. Or, c'est justement la différence qui existe entre le même tuyau demi-fermé et ouvert.

L'aspiration qui se produit dans les tuyaux ouverts m'a conduit à rechercher ce qui se passait en ce genre dans les tuyaux fermés. D'un autre côté, Bernoulli avait observé ce fait remarquable, que le son fondamental d'un tuyau fermé est toujours à l'octave grave du son fondamental du même tuyau ouvert. Pour l'expliquer, Bernoulli admettait que le mouvement vibratoire du son allait se réfléchir sur le fond du tuyau et revenait sortir par l'embouchure, ce qui lui donnait à supposer que l'onde correspondante au son fondamental d'un tuyau fermé avait une longueur double de celle du tuyau ouvert. Les expériences que j'ai tentées dans le but de reconnaître si le mouvement avait lieu ainsi que l'admettait ce savant, m'ont conduit à des résultats complètement différents.

En effet, lorsque l'on emplit de fumée une flûte en verre fermée, et qu'ensuite on la fait résonner, il est facile de reconnaître les phénomènes suivants :

1° La spirale qui se met n'a jamais la longueur du tuyau, pour peu que cette longueur soit égale à six fois son diamètre.

2° La spirale qui se met est d'autant plus allongée que le son est plus aigu,

3° Enfin, la colonne d'air se comprime, et d'autant plus que le son est plus élevé.

Comme on le voit, les phénomènes sont complètement différents de ceux des tuyaux ouverts et de ce qu'ils auraient dû être dans l'hypothèse de Bernoulli.

Si, au lieu de faire l'expérience avec la fumée de tabac, on la fait avec

le lycopode, on observe a peu pres les memes phenomenes mais comme le lycopode se depose a l'endroit ou se forment les contractions de la spirale on peut voir qu'a mesure que le son s'eleve, a mesure aussi on obtient plus de plaques de poudre, et que lorsque le tuyau a une certaine longueur, 35 centimetres par exemple, sur 21 millimetres de diametre jamais on ne parvient a produire de depôt vers le fond du tuyau, quel que soit le son que l'on cherche a produire.

Enfin, si l'on fait traverser le fond du tuyau par un tube d'un petit diametre, on voit alors que la fumee est poussee suivant la direction du vent, tandis que dans le tuyau ouvert elle eût été absorbée en sens contraire. Au moyen de ce tube on peut meme en diminuant la colonne d'air comprimé par consequent en retirant le tube, allonger la spirale sans que pour cela le son soit changé de sorte que l'on peut donner a la spirale la longueur entiere du tuyau.

Nous serons forcés de revenir sur les tuyaux en general et en meme temps nous ferons connaitre la machine dont on doit envisager les tuyaux dits a cheminee.

MEMOIRES PRESENTES

M le MINISTRE DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE invite l'Académie a charger une Commission de faire un Rapport sur les résultats scientifiques obtenus par MM GALINIER et FERRAT, capitaines d'état-major dans le cours d'un voyage en Abyssinie qui a duré plusieurs années. A cette Lettre sont joints deux Mémoires sur la *Geologie de l'Abyssinie*, rédigés par les deux voyageurs, et un résumé sur l'ensemble de leurs travaux transmis a M le Ministre de l'Instruction publique par M le Ministre de la Guerre.

Les Commissaires sont MM Arago de Mirbel Beaumont Beaupie l'Herminier de Beaumont Isidore Geoffroy-Saint-Hilaire Milne Edwards.

MÉCANIQUE — *Mémoire touchant de nouveaux systemes de locomotion sur chemins de fer, a l'aide de l'air comprimé ou de l'air raréfié, par MM PECQUEUR ZAMBAUX et BONTÉPES*

(Commissaires, MM Arago, Dupin, Poncelet, Gambey, Piobert)

Nous attendrons le Rapport des Commissaires pour rendre compte de cette importante communication.

MM SILBERMANN et SOLEIL soumettent au jugement de l'Académie un instrument destiné à la démonstration des lois de la réflexion et de la réfraction

(Commissaires, MM Arago, Mathieu, Gambey)

M BODEUR présente des thermomètres dans lesquels la lecture de l'échelle graduée est rendue plus facile, par l'addition d'une couche d'émail blanc ou coloré appliquée sur le tube, et recouverte d'une seconde couche de verre destinée à l'empêcher de se gâter par suite des changements de température

(Commissaires, MM Becquerel, Pouillet, Babinet)

M HALLETTE adresse de nouveaux documents relatifs à la discussion de priorité qui s'est élevée entre lui et M le général Dembinski, concernant un moyen particulier de fermeture pour le tube pneumatique des chemins de fer à pression atmosphérique

(Commission précédemment nommée)

M DUPUIS-DELCOURT présente une Note sur des expériences qu'il se proposait de faire avec le ballon en cuivre dont il a été fait mention dans les séances du 11 et du 25 mars dernier

Cette Note est renvoyée à l'examen de la Commission administrative

M THILLONIER adresse un supplément à la Note qu'il avait précédemment présentée sur des expériences concernant le fluide nerveux

(Renvoi à la Commission précédemment nommée)

M DENIAU indique diverses améliorations qu'il croit possible d'introduire dans les transports sur chemins de fer, dans les locomotives employées soit sur ces sortes de chemins, soit sur les routes ordinaires, et enfin dans la navigation à la vapeur

La Note est renvoyée à l'examen de la Commission des chemins de fer

CORRESPONDANCE

ÉCONOMIE RURALE — Réplique de M DELILE à la Note de M Jaume Saint Hilaire, sur le *Polygonum tinctorium*, insérée aux Comptes rendus des séances de l'Académie, séance du 22 avril 1844

M Jaume Saint-Hilaire, dans sa Note insérée aux Comptes rendus des

séances de l'Académie, séance du 22 avril dernier persiste à s'attribuer la priorité de l'introduction en France du *Polygonum tinctorium*. Il fait remarquer que ce n'est que fort tard que j'ai rompu le silence au sujet de ses prétentions. La raison en est que je n'ai pu la parole qu'après que mon nom a été cité favorablement par M. Boussingault, et qu'il m'a fallu le soutenir du moment que M. Jaume Saint-Hilaire prétendait le rayer.

Du reste M. Jaume Saint-Hilaire ne touche point la question que j'ai posée, de la première introduction des grunes reçus de Russie à Montpellier et à Paris, avant celles sollicitées et obtenues par lui de la correspondance de M. le comte Mole.

Il est donc évident que la culture du *Polygonum tinctorium* a commencé de tout point, au jardin de Montpellier et à celui de Paris, par un effet tout naturel de la réputation que les livres, et ceux de M. Desfontaines principalement, avec les herbiers n'avaient cessé de faire à cette plante. M. Jaume Saint-Hilaire a pu convenablement puiser à ces sources pour corroborer ses écrits. L'approbation donnée à ses efforts pour tirer un parti avantageux de cette plante, par l'Académie des Sciences et par MM. Poiteau et Turpin, ne diminue en rien l'intérêt du fait que je me suis appliqué à faire valoir de l'introduction et de la propagation des graines de cette plante, fort indépendamment du concours de M. Jaume Saint-Hilaire, par les seules ressources de la correspondance bien établie des jardins botaniques de France avec ceux des pays étrangers non moins renommés.

ANALYSE MATHÉMATIQUE — *Sur la théorie des transcendentes à différentielles algébriques* (Extrait d'une lettre de M. HERMITE à M. Liouville)

J'ai essayé d'introduire, dans l'analyse des transcendentes à différentielles algébriques quelconques, des fonctions inverses de plusieurs variables, à l'exemple de ce qui a été fait par M. Jacobi pour les fonctions abéliennes. Je vais passer rapidement en revue les principaux résultats que j'ai obtenus en réservant les démonstrations et les développements accessoires pour un Mémoire que j'espère bientôt avoir l'honneur de présenter à l'Académie.

I

En suivant la marche tracée par M. Jacobi, dans le célèbre Mémoire intitulé *Considerationes generales de transcendentibus Abelianis*, j'ai été con-

dont d'abord rechercher le système d'équations différentielles ordinaires dont les intégrales complètes sont données par le théorème d'Abel, considérée dans toute son étendue. Cette recherche, au reste, était assez facile en sautant des résultats consignés par Abel lui-même dans le *Mémoire* couronné par l'Académie des Sciences[*].

— Soit, en suivant les notations d'Abel,

$$\chi(y) = p_0 + p_1 y + p_2 y^2 + \dots + p_{n-1} y^{n-1} + y^n = 0$$

une équation algébrique quelconque irréductible, dont tous les coefficients sont des fonctions rationnelles et entières d'une même variable x

Nommons ses racines

$$y_1, y_2, y_3, \dots, y_n$$

et designons par

$$(1) \quad f(x, y) = t_0 + t_1 y + t_2 y^2 + \dots + t_{n-2} y^{n-2}$$

une fonction rationnelle et entière de x et y dans laquelle le degré d'un coefficient quelconque t_m soit plus égal au nombre entier immédiatement inférieur à la somme diminuée d'une unité, des $n - m - 1$ plus grands exposants des développements de chaque racine y suivant les puissances descendantes de x .

Soit enfin γ le nombre des coefficients arbitraires contenus dans $f(x, y)$, cette fonction sera susceptible d'un nombre γ de formes différentes que je représenterai par

$$f_1(x, y), f_2(x, y), \dots, f_\gamma(x, y)$$

Cela pose, en designant par

$$x_1, x_2, \dots, x_\mu$$

des variables en nombre quelconque μ plus grand que γ et par

$$y_1, y_2, \dots, y_\mu$$

[*] Tome VII des *Savants étrangers*. Voyez aussi un élégant *Mémoire* de M. Minding, publié dans le *Journal* de M. Crelle, tome XXIII.

des fonctions irrationnelles choisies arbitrairement parmi les n racines

$$y_1, y_2, \dots, y_n,$$

on aura, au moyen du théorème d'Abel, sous forme algébrique, les intégrales complètes du système des équations

$$\begin{aligned} \frac{f(x, y_1)}{x'(y_1)} dx_1 + \frac{f(x_2, y_1)}{x(y_1)} dx_2 + \dots + \frac{f(x_\mu, y_{(\mu)})}{x(y_{(\mu)})} dx_\mu &= 0, \\ \frac{f_1(x, y_{(1)})}{x(y_{(1)})} dx_1 + \frac{f_1(x_2, y_{(1)})}{x(y_{(1)})} dx_2 + \dots + \frac{f_1(x_\mu, y_{(\mu)})}{x(y_{(\mu)})} dx_\mu &= 0 \\ &\vdots \\ \frac{f_j(x, y_{(j)})}{x'(y_{(j)})} dx_1 + \frac{f_j(x_2, y_{(j)})}{x(y_{(j)})} dx_2 + \dots + \frac{f_j(x_\mu, y_{(\mu)})}{x(y_{(\mu)})} dx_\mu &= 0 \end{aligned}$$

Il est inutile de dire que, dans chacune des racines $y_{(1)}$ ou y_2 , etc., on remplace la quantité x par la variable x_1 ou x_2 , etc., du terme ou elle entre

II

D'après cela, je prendrai pour fonctions inverses les quantités

$$x_1, x_2, \dots, x_r,$$

définies par les r équations suivantes

$$(2) \quad \left\{ \begin{array}{l} \sum_{k=1}^{k=r} \int_0^{x_k} \frac{f(x_k, y_{(k)})}{x'(y_{(k)})} dx_k = u_1, \quad \sum_{k=1}^{k=r} \int_0^{x_k} \frac{f_1(x_k, y_{(k)})}{x(y_{(k)})} dx_k = u_2 \\ \dots \dots \dots \sum_{k=1}^{k=r} \int_0^{x_k} \frac{f_j(x_k, y_{(k)})}{x(y_{(k)})} dx_k = u_j, \end{array} \right.$$

et je poserai, en conséquence,

$$x_1 = \lambda_1(u_1, u_2, \dots, u_r), \quad x_2 = \lambda_2(u_1, u_2, \dots, u_r), \quad \dots, \quad x_r = \lambda_r(u_1, u_2, \dots, u_r)$$

Cela étant, les intégrales du système d'équations différentielles considéré plus haut, intégrales fournies immédiatement par le théorème d'Abel, donnent sans difficulté, par un changement convenable de constantes, le theo

reme fondamental, qui consiste en ce que les γ fonctions

$$\lambda_k(u_1 + v_1, u_2 + v_2, \dots, u_\gamma + v_\gamma)$$

sont les racines d'une equation de degre γ dont les coefficients sont des fonctions rationnelles des diverses fonctions

$$\begin{aligned} \lambda_k(u_1, u_2, \dots, u_\gamma), \\ \lambda_k(v_1, v_2, \dots, v_\gamma), \end{aligned}$$

et des valeurs correspondantes de celles des racines γ que l'on a fait entrer dans les equations (2)

III

De la decoule cette propriete importante des fonctions inverses, qui consiste dans la coexistence d'une serie d'indices de periodicité pour tous les arguments, et qui montre toute l'etendue de ce caractere singulier, dont un admirable Memoire de M. Jacobi a revele depuis longtemps l'existence dans les fonctions abeliennes. Considerons l'equation

$$\gamma(y_1) \chi(y_2) \chi'(y_3) \dots \chi(y_n) = 0,$$

dont le premier membre, comme on sait, s'exprime par une fonction entiere de x . Chacune de ses racines jouit de la propriete de rendre égales deux des racines γ de l'equation

$$\chi(y) = 0$$

Supposons donc que y_1 devienne egale à une autre racine $y_{(1)}$ pour les diverses valeurs

$$x = \alpha_1, \alpha_1', \alpha_1'', \dots, \alpha_1^{(1)},$$

de meme que

$$y_{(2)} = y_{(1)}$$

pour

$$x = \alpha_2, \alpha_2', \alpha_2'', \dots, \alpha_2^{(n)},$$

et

$$y_{(3)} = y_{(1)}$$

pour

$$x = \alpha_3, \alpha_3', \alpha_3'', \dots, \alpha_3^{(n)},$$

et ainsi de suite

Faisons, pour abrégér l'écriture,

$$\frac{f_1(x, y_{(1)})}{x(y_{(1)})} - \frac{f_1(x, y_{(1)})}{x(y_{(1)})} = (k, 1)$$

$$\frac{f_1(x, y_{(2)})}{x(y_{(2)})} - \frac{f_1(x, y_{(2)})}{x(y_{(2)})} = (k, 2),$$

$$\frac{f_1(x, y_{(r)})}{x(y_{(r)})} - \frac{f_1(x, y_{(r)})}{x(y_{(r)})} = (k, r),$$

et designons par les lettres m des nombres entiers positifs ou négatifs. Si l'on pose

$$I_k = \sum_{n=1}^{n=n_1-1} m_1^{(n)} \int_{\alpha_1^{(n)}}^{\alpha_1^{(n+1)}} (k, 1) dx + \sum_{n=1}^{n=n_2-1} m_2^{(n)} \int_{\alpha_2^{(n)}}^{\alpha_2^{(n+1)}} (k, 2) dx + \\ + \sum_{n=1}^{n=n_r-1} m_r^{(n)} \int_{\alpha_r^{(n)}}^{\alpha_r^{(n+1)}} (k, r) dx$$

on aura ce théorème

Une fonction rationnelle et symétrique quelconque des r fonctions inverses conservera la même valeur en ajoutant simultanément aux divers arguments

$$u_1, u_2, u_3, \dots, u_r,$$

les quantités constantes

$$I_1, I_2, I_3, \dots, I_r.$$

Par une autre méthode, indépendante du théorème sur l'addition des arguments, mais qui il serait trop long d'indiquer ici, on obtient directement les égalités

$$\lambda_1(u_1 + I_1, u_2 + I_2, \dots, u_r + I_r) = \lambda_1(u_1, u_2, \dots, u_r)$$

$$\lambda_2(u_1 + I_1, u_2 + I_2, \dots, u_r + I_r) = \lambda_2(u_1, u_2, \dots, u_r),$$

$$\lambda_r(u_1 + I_1, u_2 + I_2, \dots, u_r + I_r) = \lambda_r(u_1, u_2, \dots, u_r)$$

Remarquons enfin cette conséquence, que l'équation

$$f_1(x, y) \frac{dx}{du} + f_2(x, y) \frac{dx}{du} + \dots + f_r(x, y) \frac{dx}{du} = 0$$

étant satisfaite par

$$x = x_1, \quad y = y_2,$$

$$x = x_1, \quad y = y_3,$$

$$x = x_1, \quad y = y_r,$$

ou peut, au moyen des différences partielles de l'une des fonctions inverses déterminer algébriquement les $r - 1$ autres

V

Le théorème relatif à l'addition des arguments conduit encore à exprimer les fonctions inverses dans toute leur généralité, au moyen des cas particuliers les plus simples, ou l'on ne suppose successivement qu'un argument variable, les autres étant égaux à des constantes quelconques, à zéro par exemple

Ce genre de réduction, qui est dû à M. Jacobi, se retrouve dans une autre partie de la théorie, comme on va le voir

En nous bornant, pour plus de simplicité, aux fonctions de la première classe des transcendentes abéliennes, considérons la différentielle totale

$$\frac{F(x)}{\sqrt{f(x)}} dx + \frac{F(y)}{\sqrt{f(y)}} dy,$$

où $F(x)$ est une fonction rationnelle quelconque, et $f(x)$ un polynôme du cinquième ou du sixième degré. Si l'on substitue aux variables x et y les variables u et v des fonctions inverses définies par les équations

$$\int_0^x \frac{dx}{\sqrt{f(x)}} + \int_0^y \frac{dy}{\sqrt{f(y)}} = u,$$

$$\int_0^x \frac{x dx}{\sqrt{f(x)}} + \int_0^y \frac{y dy}{\sqrt{f(y)}} = v$$

son intégrale étant désignée par

$$\Pi(u, v),$$

jouira, en vertu du théorème d'Abel, de la propriété exprimée par l'égalité

$$\Pi(u + u', v + v') = \Pi(u, v) + \Pi(u', v') + \text{une fonction algèbr. et log.};$$

en faisant

$$u = 0, \quad v' = 0,$$

on trouve

$$\Pi(u', v) = \Pi(0, v) + \Pi(u', 0) + \text{une fonction alg. et log.}$$

Ainsi, la fonction $\Pi(u, v)$ à double argument est ramenée aux deux cas les plus simples, où l'on suppose successivement un seul argument variable; on voit encore qu'on n'aura plus à considérer que des intégrales de formules différentielles qui contiennent seulement une variable indépendante, à savoir, des intégrales, par rapport à u , de fonctions rationnelles et symétriques de

$$\lambda_1(u, 0), \quad \lambda_2(u, 0),$$

et des intégrales, par rapport à v , de fonctions rationnelles et symétriques de

$$\lambda_1(0, v), \quad \lambda_2(0, v).$$

On se convaincra facilement de la généralité des considérations précédentes: ainsi, dans le cas des fonctions de la seconde classe des transcendentes abéliennes, ou s'offrent des fonctions à triple argument

$$\Pi(u, v, w),$$

on aura de même l'égalité

$$\Pi(u + u', v + v', w + w') = \Pi(u, v, w) + \Pi(u', v', w') + \text{une fonct. alg. et log.},$$

ou bien encore la suivante

$$\begin{aligned} \Pi(u + u' + u'', v + v' + v'', w + w' + w'') &= \Pi(u, v, w) + \Pi(u', v', w'') \\ &+ \Pi(u'', v'', w'') + \text{une fonct. alg. et log.}; \end{aligned}$$

et, en faisant

$$\begin{aligned} u &= 0, & v &= 0, \\ u' &= 0, & w' &= 0, \\ v'' &= 0, & w'' &= 0, \end{aligned}$$

il vient

$\Pi(u, v, w) = \Pi(0, 0, w) + \Pi(0, v, 0) + \Pi(u, 0, 0) +$ une fonction algébrique et logarithmique
ce qui conduit aux mêmes conséquences que précédemment

VI

La méthode qui fin a donné la division des arguments dans les fonctions abéliennes, s'étend aux nouvelles transcendentes, mais jusqu'à présent je n'ai pu aborder la théorie de la transformation sans être arrêté par les plus grandes difficultés. Mes tentatives m'ont conduit, néanmoins à quelques considérations sur cette théorie bornée aux fonctions elliptiques. Je vais les rapporter en peu de mots.

Soient $\varphi(u, k)$, ou simplement $\varphi(u)$ la fonction inverse définie par l'équation

$$\varphi(u) = \sqrt{1 - \varphi^2(u)} [1 - k^2 \varphi^2(u)] - \Delta(u, k)$$

2ω et $2\omega\sqrt{-1}$ les indices de périodicité, et n un nombre impair quelconque. Le théorème fondamental, donné pour la première fois par M. Jacobi, consiste en ce que la fonction

$$z = \sum \varphi\left(u + \frac{2p\omega}{n}\right) = \varphi(u) + \varphi\left(u + \frac{2\omega}{n}\right) + \dots + \varphi\left(u + \frac{2(n-1)\omega}{n}\right)$$

ou l'une des périodes des fonctions elliptiques se trouve divisée par le nombre n , peut être représentée de la manière suivante

$$\alpha \varphi\left(\frac{u}{\alpha}, \lambda\right),$$

λ désignant un nouveau module, α et α des constantes. On en déduit ensuite que toute fonction rationnelle et symétrique des quantités

$$\varphi(u), \quad \varphi\left(u + \frac{2\omega}{n}\right), \quad \varphi\left(u + \frac{4\omega}{n}\right), \quad \dots, \quad \varphi\left(u + \frac{2(n-1)\omega}{n}\right)$$

ou, de même, l'une des périodes des fonctions elliptiques subsiste, tandis que l'autre se trouve divisée par le nombre n , peut être représentée par une fonction rationnelle de $\varphi\left(\frac{u}{\alpha}, \lambda\right)$. Or, voici la démonstration du théorème de M. Jacobi à laquelle je me suis trouvé conduit

Il existe, entre $\frac{dz}{du}$ et z , une relation algébrique, qui s'obtiendra par l'élimination de $\varphi(u)$ entre les deux égalités

$$z = \sum \varphi \left(u + \frac{2\mu\omega}{n} \right), \quad \frac{dz}{du} = \sum \Delta \left(u + \frac{2\mu\omega}{n} \right).$$

Soit, pour cela, $\varphi(u) = x$; z , comme on le voit aisément, se transforme en une fonction rationnelle $\frac{xU}{V}$, U et V étant deux polynômes pairs du degré $n-1$, on établit ensuite sans peine que les racines de l'équation

$$(4) \quad z = \sum \varphi \left(u + \frac{2\mu\omega}{n} \right)$$

sont de la forme

$$\varphi(u) = \varphi(\varepsilon), \quad \varphi\left(\varepsilon + \frac{2\omega}{n}\right), \quad \varphi\left(\varepsilon + \frac{4\omega}{n}\right), \dots, \quad \varphi\left(\varepsilon + \frac{2(n-1)\omega}{n}\right)$$

Cela résulte, en effet, de ce que l'expression de z ne change point en augmentant u d'un multiple quelconque de $\frac{2\omega}{n}$.

Or, la même chose a lieu nécessairement dans la dérivée $\frac{dz}{du}$ et comme

$$z = \frac{xU}{V},$$

on a

$$\frac{dz}{du} = \frac{V \frac{d(xU)}{dx} - xU \frac{dV}{dx}}{V^2} = \frac{V \frac{d(xU)}{dx} - xU \frac{dV}{dx}}{V^2 (1 - x^2) (1 - k^2 x^2)}$$

Ainsi, le carré de $\frac{dz}{du}$, qui est une fonction rationnelle de x , conservera la même valeur en y substituant successivement les diverses racines de l'équation (4); par suite, $\frac{dz}{du}$ s'exprimera par la racine carrée d'une fonction rationnelle de z .

Or, cette fonction sera entière, car

$$\sum \Delta \left(u + \frac{2\mu\omega}{n} \right)$$

ne peut devenir infini sans que quelqu'une des quantités $\varphi \left(u + \frac{2\mu\omega}{n} \right)$ ne le

soit, ce qui rend des lors z infini lui-même. Pour obtenir maintenant le nombre et la nature des valeurs de z qui donnent

$$\frac{dz}{du} = 0,$$

il faut chercher les racines de l'équation

$$\sum \Delta \left(u + \frac{2p\omega}{n} \right) = 0.$$

On trouve très-facilement qu'elles sont comprises dans les deux formules

$$x^2 = \varphi^2 \left(\frac{\omega}{2} + \frac{2p\omega}{n} \right), \quad x^2 = \varphi^2 \left(\frac{\omega}{2} \sqrt{-1} + \frac{2p\omega}{n} \right),$$

p devant être supposé successivement 0, 1, 2, ..., $\frac{n-1}{2}$. Mais j'observe que pour les substituer dans l'expression de z , il est inutile d'avoir égard à ces diverses valeurs de p , de sorte qu'il reste seulement à considérer les racines

$$x^2 = \varphi^2 \left(\frac{\omega}{2} \right), \quad x^2 = \varphi^2 \left(\frac{\omega}{2} \sqrt{-1} \right)$$

On voit, par là, que le polynôme en z , qui entre dans l'expression de $\frac{dz}{du}$, sera du quatrième degré, ne contiendra que des puissances paires de z , et s'évanouira pour les valeurs

$$z^2 = \left\{ \sum \varphi \left(\frac{\omega}{2} + \frac{2p\omega}{n} \right) \right\}^2 = \alpha^2, \quad z^2 = \left\{ \sum \varphi \left(\frac{\omega}{2} \sqrt{-1} + \frac{2p\omega}{n} \right) \right\}^2 = \beta^2$$

Ainsi, l'on aura

$$\frac{dz}{du} = C \sqrt{\left(1 - \frac{z^2}{\alpha^2} \right) \left(1 - \frac{z^2}{\beta^2} \right)},$$

C étant une constante qu'on détermine en observant que, pour $u = 0$ et par suite $z = 0$, on a

$$\frac{dz}{du} = C = \sum \Delta \left(\frac{2p\omega}{n} \right),$$

faisant donc

$$\frac{\alpha}{\beta} = \lambda, \quad \frac{\alpha}{C} = a,$$

(1144)

on a

$$z = \alpha \varphi \left(\frac{u}{a}, \lambda \right).$$

VII.

Il résulte, de ce qui précède, que l'équation

$$\alpha \varphi \left(\frac{u}{a}, \lambda \right) = \frac{xU}{V}, \quad \text{ou} \quad xU - \alpha \varphi \left(\frac{u}{a}, \lambda \right) V = 0,$$

a pour racines les n quantités

$$\varphi(u), \quad \varphi \left(u + \frac{2\omega}{n} \right), \dots, \quad \varphi \left(u + \frac{2(n-1)\omega}{n} \right).$$

Je vais faire voir qu'on peut tirer de là, directement, la transformation des fonctions de troisième espèce, sans établir préalablement, comme le fait M. Jacobi, la formule de transformation des fonctions de seconde espèce.

Soit, pour abrégé,

$$F(x) = xU - \alpha \varphi \left(\frac{u}{a}, \lambda \right) V,$$

en désignant par m une quantité quelconque, on aura, comme l'on sait,

$$\frac{F'(m)}{F(m)} = \sum \frac{1}{m - \varphi \left(u + \frac{2p\omega}{n} \right)},$$

ou bien encore

$$\frac{F'(m)}{F(m)} = \frac{1}{m - \varphi(u)} + \sum_{p=1}^{p=\frac{n-1}{2}} \left[\frac{1}{m - \varphi \left(u + \frac{2p\omega}{n} \right)} + \frac{1}{m - \varphi \left(u - \frac{2p\omega}{n} \right)} \right].$$

Or, on peut écrire

$$\frac{F'(m)}{F(m)} = \frac{A \varphi \left(\frac{u}{a}, \lambda \right) - B}{\varphi \left(\frac{u}{a}, \lambda \right) - M},$$

en posant

$$A = \frac{V'}{V}, \quad B = \frac{(xU)'}{aV}, \quad M = \frac{xU}{aV} \quad \text{pour} \quad x = m.$$

Il importe beaucoup de remarquer cette valeur de M qui, pour $m = \varphi(\mu, k)$, devient $\varphi\left(\frac{\mu}{a}, \lambda\right)$, ainsi on a l'égalité

$$\frac{A\varphi\left(\frac{u}{a}, \lambda\right) + B}{\varphi\left(\frac{\mu}{a}, \lambda\right) - \varphi\left(\frac{u}{a}, \lambda\right)} = \frac{1}{\varphi(u) - \varphi(\mu)} + \sum \left[\frac{1}{\varphi\left(u + \frac{2p\omega}{n}\right) - \varphi(\mu)} + \frac{1}{\varphi\left(u - \frac{2p\omega}{n}\right) - \varphi(\mu)} \right],$$

d'où, en changeant le signe de μ ,

$$\frac{A\varphi\left(\frac{u}{a}, \lambda\right) + B}{\varphi\left(\frac{\mu}{a}, \lambda\right) + \varphi\left(\frac{u}{a}, \lambda\right)} = \frac{1}{\varphi(u) + \varphi(\mu)} + \sum \left[\frac{1}{\varphi\left(u + \frac{2p\omega}{n}\right) + \varphi(\mu)} + \frac{1}{\varphi\left(u - \frac{2p\omega}{n}\right) + \varphi(\mu)} \right],$$

puis, retranchant membre à membre,

$$\begin{aligned} & \frac{A\varphi\left(\frac{u}{a}, \lambda\right) - B\varphi\left(\frac{\mu}{a}, \lambda\right)}{\varphi\left(\frac{\mu}{a}, \lambda\right) - \varphi\left(\frac{u}{a}, \lambda\right)} \\ &= \frac{\varphi(\mu)}{\varphi(u) - \varphi(\mu)} + \varphi(\mu) \sum \left[\frac{1}{\varphi^2\left(u + \frac{2p\omega}{n}\right) - \varphi^2(\mu)} + \frac{1}{\varphi^2\left(u - \frac{2p\omega}{n}\right) - \varphi^2(\mu)} \right]. \end{aligned}$$

» Soit maintenant

$$\Pi(x, \mu, k) = \int_0^x \frac{du}{\varphi^2(u, k) - \varphi^2(\mu, k)},$$

l'équation précédente donnera, en intégrant depuis $u = 0$ jusqu'à $u = x$ et en ayant égard aux valeurs des constantes,

$$\begin{aligned} & \frac{x\varphi\left(\frac{\mu}{a}, \lambda\right) \Delta\left(\frac{\mu}{a}, \lambda\right)}{\Delta(\mu, k)} \Pi\left(x, \frac{\mu}{a}, \lambda\right) - Ax = \varphi(\mu) \Pi(x, \mu, k) \\ & + \varphi(\mu) \sum_{p=1}^{\frac{n-1}{2}} \left[\Pi\left(x + \frac{2p\omega}{n}, \mu, k\right) + \Pi\left(x - \frac{2p\omega}{n}, \mu, k\right) \right], \end{aligned}$$

ou bien

$$\alpha \varphi \left(\frac{x}{a}, \lambda \right) \Delta \left(\frac{x}{a}, \lambda \right) \Pi \left(\frac{x}{a}, \frac{\mu}{a}, \lambda \right) = \Delta(\mu, k) A.x + \varphi(\mu, k) \Delta(\mu, k) \Pi(x, \mu, k) \\ + \varphi(\mu, k) \Delta(\mu, k) \sum_{p=1}^{\frac{n-1}{2}} \left[\Pi \left(x + \frac{2p\omega}{n}, \mu, k \right) + \Pi \left(x - \frac{2p\omega}{n}, \mu, k \right) \right]$$

Le second membre peut être ramené à ne contenir qu'une seule fonction de troisième espèce, avec une quantité logarithmique; on a, en effet, la formule

$$\frac{\Delta(\mu)}{\varphi(\mu) - \varphi(x+a)} - \frac{\Delta(\mu)}{\varphi(\mu) - \varphi(x-a)} = \frac{\Delta(x)}{\varphi(x) - \varphi(\mu+a)} - \frac{\Delta(x)}{\varphi(x) - \varphi(\mu-a)},$$

qu'il est facile de vérifier, elle donne, en changeant μ en $-\mu$,

$$\frac{\Delta(\mu)}{\varphi(\mu) + \varphi(x+a)} - \frac{\Delta(\mu)}{\varphi(\mu) + \varphi(x-a)} = \frac{\Delta(x)}{\varphi(x) + \varphi(\mu+a)} - \frac{\Delta(x)}{\varphi(x) + \varphi(\mu-a)}.$$

Ajoutant membre à membre et intégrant depuis $x=0$, on trouve sans peine.

$$\varphi(\mu) \Delta(\mu) [\Pi(x-a, \mu) - \Pi(x+a, \mu)] = -2\varphi(\mu) \Delta(\mu) \Pi(x, \mu) \\ + \frac{1}{2} \log \left\{ \frac{1 - \frac{\varphi^2(x)}{\varphi^2(\mu+a)}}{1 - \frac{\varphi^2(x)}{\varphi^2(\mu-a)}} \right\},$$

d'où, en permutant a et x , et changeant les signes des deux membres,

$$\varphi(\mu) \Delta(\mu) [\Pi(x+a, \mu) + \Pi(x-a, \mu)] = 2\varphi(\mu) \Delta(\mu) \Pi(x, \mu) \\ - \frac{1}{2} \log \left\{ \frac{1 - \frac{\varphi^2(a)}{\varphi^2(\mu+x)}}{1 - \frac{\varphi^2(a)}{\varphi^2(\mu-x)}} \right\}$$

On arrive donc définitivement à la formule suivante, pour la transformation des fonctions de troisième espèce.

$$\alpha \varphi \left(\frac{x}{a}, \lambda \right) \Delta \left(\frac{x}{a}, \lambda \right) \Pi \left(\frac{x}{a}, \frac{\mu}{a}, \lambda \right) = \Delta(\mu, k) A.x + n\varphi(\mu, k) \Delta(\mu, k) \Pi(x, \mu, k) \\ - \frac{1}{2} \sum_{p=1}^{\frac{n-1}{2}} \log \left\{ \frac{1 - \frac{\varphi^2 \left(\frac{2p\omega}{n} \right)}{\varphi^2(\mu+x)}}{1 - \frac{\varphi^2 \left(\frac{2p\omega}{n} \right)}{\varphi^2(\mu-x)}} \right\}.$$

VIII.

• Des les premiers pas qui ont été faits dans la théorie des fonctions elliptiques, on a imaginé de les différentier par rapport au module, ce qui a conduit à plusieurs résultats importants. Or, le même moyen analytique s'applique avec facilité à toutes les fonctions de la forme

$$\int f(x, y) dx,$$

où y est donné par l'équation

$$\chi(y) = y^n - X = 0,$$

X étant une fonction entière de x .

» Voici, par exemple, le théorème qui en résulte pour les fonctions abéliennes.

• Soit

$$F(x) = x(x-a)\dots(x-l)$$

un polynôme du degré $2m+1$, on pourra représenter toutes les fonctions abéliennes de première et de seconde espèce par l'intégrale

$$z = \int_0^x \frac{(x-a)^k dx}{\sqrt{F(x)}},$$

et en considérant z comme une fonction du module a , on obtient l'équation linéaire de l'ordre $2m$

$$0 = \frac{2\sqrt{F(x)}}{(x-a)^{m+1}} + \sum_{n=1}^m \frac{(-2)^{m-n+1}}{1 \cdot 2 \cdot 3 \dots n} \cdot F^{(n)}(a) \cdot \frac{(-2)^{m-n+1}}{(2\lambda-1)(2\lambda-3)\dots(2\lambda+2n-4m-1)} \frac{d^{m-n+1}z}{da^{m-n+1}}$$

Lorsque k est compris entre 0 et $m-1$, de sorte que z représente les transcendentes de première espèce, l'intégrale complète s'obtient en ajoutant à la fonction

$$\int_0^x \frac{(x-a)^k dx}{\sqrt{F(x)}}$$

les diverses intégrales définies qui entrent dans l'expression des indices de périodicité de la fonction inverse, multipliées chacune par une constante arbitraire

» De là résulteraient facilement, entre autres choses, des théorèmes analogues à l'équation de Legendre entre les fonctions elliptiques complètes de première et de seconde espèce, à modules complémentaires, relation déjà généralisée par divers géomètres (*) Mais je ne veux pas m'étendre plus longuement sur ce sujet, qui, du reste, donne lieu à de nombreuses conséquences, que je développerai dans une autre occasion

POUDRE INEXPLOSIBLE — *Memoire sur quelques experiences tentees dans le but de rendre la poudre de guerre inexplosible pendant sa conservation, par M FADEJEFF, professeur de chimie à l'École spéciale d'artillerie de Saint-Petersbourg*

On connaît assez généralement le danger qu'il y a à conserver de grandes quantités de poudre de guerre. Jusqu'à ce jour, l'administration a mis toute sa sollicitude à éloigner toutes les causes qui pourraient produire l'inflammation, et l'on sait que les précautions mises en usage n'ont pas toujours été suffisantes

» Ce n'est que de nos jours qu'on a songé à diminuer, s'il est possible l'effet même de l'inflammation (**)

C'est dans ce but que j'ai entrepris, dans le cours de l'année 1841, une série d'expériences basées sur l'observation de M Piobert, savoir que la

(*) Voyez par exemple, un *Memoire* de M Catalan, couronné par l'Académie de Bruxelles

(**) Dans le *Memoire* présenté à l'Académie dans la séance du 24 février 1840 (*Comptes rendus* t. X, page 320), M Piobert a donné le moyen de ralentir considérablement l'inflammation des masses de poudre, en mêlant les grains avec le poushier, ou avec l'un de ses composants triuré très-fin, l'explosion est alors transformée en une combustion successive qui n'offre plus les dangers que cet agent énergétique présente actuellement dans sa conservation. La vitesse de combustion de ces mélanges n'est que de 0^m,018 à 0^m,30 par seconde, suivant que la matière est tassée ou ne l'est pas, et lorsque la poudre est mêlée avec le salpêtre, il arrive même quelquefois que la combustion ne se propage pas dans toute l'étendue de la masse. La poudre reprend toutes les propriétés balistiques qu'elle possédait primitivement, lorsqu'elle est retirée de ces mélanges au moyen d'un simple tamisage

vitesse de la propagation du feu entre les grains de poudre diminue rapidement, à mesure qu'il se trouve plus de poussier dans les interstices qui les séparent

On pouvait donc espérer arriver au but proposé en mêlant la poudre avec une substance pulvérulente. Une condition essentielle venait pour lors s'imposer d'elle même c'était de pouvoir séparer le mélange par un simple tamisage. Il fallait encore que la petite portion de substance additionnelle, qui restait après le tamisage, n'eût pas d'influence sensible sur la qualité de la poudre

Le prix modique de la substance additionnelle était encore une condition réalisée

Une série d'expériences que je fis sur différents corps terrieux m'a prouvé qu'il y avait un grand inconvénient à les mêler avec la poudre : quelques-unes de ces substances formaient à la longue avec la poudre, des masses compactes d'autres favorisaient trop l'attraction de l'humidité d'autres enfin, pouvaient amener des suites très-fâcheuses pendant le tamisage

À la fin, je trouvai qu'un mélange de charbon de bois et de graphite le tout bien pulvérisé, que je nommerai par abréviation *carbo-graphite* répondait parfaitement au but

Quoique le mélange de poudre et de carbo-graphite mis en tas mais sans être comprimé, brûle sans explosion, néanmoins la combustion en est encore assez vive, j'ai donc essayé de comprimer ce mélange, en l'employant à la confection d'une fusée d'après les procédés ordinaires des artificiers. Le résultat de cette expérience a été très-satisfaisant

On pourrait objecter que la poudre seule, sans aucun mélange et par le seul effet d'une forte compression, brûle aussi très-lentement, comme dans la fusée, mais il ne faut pas oublier que la poudre exige une compression assez forte qui lui fait perdre la forme granuleuse et la transforme en pulvérin, ce qui rend ce moyen d'éviter l'explosion impraticable, dès qu'il s'agit de conserver la poudre de guerre qui, comme on le sait, doit nécessairement conserver la forme granuleuse

D'un autre côté, si pour éviter de fractionner et de déformer les grains de poudre, on ne la comprimait que faiblement, un baril de poudre présenterait pour lors une fusée formidable dont l'impulsion pourrait amener les suites les plus fâcheuses

» L'expérience m'a prouvé qu'une certaine quantité de poudre mêlée de

carbo graphite et fortement comprimée ne se trouve pas sensiblement diminuée de volume après le tamisage, les grains restent purs et intacts, seulement la poudre perd un peu de son poids, mais dans une proportion très-minime

Si je ne me suis pas contenté d'employer, comme substance additionnelle à la poudre, le charbon seul, et si j'ai préféré le mélange avec le carbo-graphite, c'est que l'expérience n'a pas tardé à m'indiquer que la poudre mélangée avec le poussier ou le charbon de bois ne produit pas, par la compression, une masse assez compacte, en sorte qu'au moindre choc les grains de poudre se séparent du mélange, ce qui a lieu même au moment où on la comprime

L'addition d'une certaine quantité de graphite confère à toute la masse des propriétés plastiques qui rendent le mélange plus compacte, de sorte que les grains de poudre ne se séparent qu'avec une grande difficulté par le choc

J'espère pouvoir, le prochain, communiquer le résultat de quelques essais sur la poudre ainsi conservée pendant deux hivers en magasin

Avec les moyens que m'ont fournis nos officiers supérieurs d'artillerie, j'ai pu faire des expériences sur des quantités de poudre très-considérables j'expose ici les résultats qui m'ont paru les plus remarquables

En augmentant peu à peu la quantité du mélange de poudre et de carbo-graphite, je suis enfin parvenu à en brûler une masse entassée et comprimée dans un baril de la grandeur de ceux qui servent à conserver la poudre dans nos magasins, et qui peuvent contenir de 40 à 50 kilogr. de poudre en grains

Avant de passer à la description des résultats de mes expériences j'exposerai en peu de mots la manipulation et les ustensiles dont je me suis servi pour charger les barils et y comprimer la poudre et le carbo-graphite

- 1° Un baril de la grandeur ci-dessus mentionnée,
- 2° Un refouloir de bois, dont suit plus bas la description
- 3° Une masse à main du poids de 4 $\frac{1}{2}$ kilogr.

Le refouloir consistait en un disque de bois d'environ 6 centimètres d'épaisseur, au centre duquel était assujéti verticalement un manche en bois dur et plus large par en bas que par en haut

Pour que le manche ne fût pas endommagé par les coups qu'on devait frapper sur sa partie supérieure, je le fis maintenir dans le disque au moyen de quatre petits contre-forts en bois et disposés sur le cercle en forme de croix, sur toute la surface du disque, ainsi que sur les contre-forts,

je fis coller du gros papier pour que le mélange combustible ne pût ni s'introduire, ni se loger dans les fentes formées par les jointures des différentes parties du refouloir

Si l'on n'emploie qu'un refouloir d'un seul diamètre alors à cause de la convexité des barils au milieu de leur hauteur, il y aura un intervalle produit par la différence de diamètre de refouloir et celui de barils or pendant qu'on frapperait le refouloir pour comprimer le mélange celui-ci pourrait s'échapper par cet intervalle. Pour éviter cet inconvénient on faisait bien de donner à la partie intérieure des barils la forme régulière d'un cylindre en ne laissant de convexité qu'à leurs parois extérieures vers le milieu de la hauteur des tonneaux afin de pouvoir les croquer plus solidement

L'expérience m'a prouvé que la proportion la plus satisfaisante entre le graphite et le charbon (tant l'égalité de volume

Un baril qui peut contenir jusqu'à 49 kilogrammes de poudre sans mélange n'en peut contenir que 33 avec le mélange après la pression

Pour faire des trois substances mentionnées un mélange bien homogène il suffit de les frotter plusieurs fois dans les mains

Le mélange ainsi préparé je chargeai les barils l'expérience démontra que si l'on commençait à charger avec le charbon graphite mélangé de poudre de manière à ce que le mélange se trouvât immédiatement en contact avec la surface intérieure du baril, il s'ensuivait toujours une petite detonation vers la fin de la combustion. Pour éviter cet inconvénient je commençai la charge par une couche de charbon graphite sans poudre de 5 à 6 centimètres d'épaisseur et comprimée par un certain nombre de coups de masse sur le refouloir placé bien verticalement, fort de cette précaution je fis introduire le mélange avec la poudre, en le comprimant de la même manière

Les couches ne doivent pas être trop épaisses si l'on veut obtenir un degré de compression convenable et uniforme

Le baril étant presque rempli on ne mit pour dernière couche que du charbon graphite sans poudre, c'est ainsi que furent remplis tous les barils sur lesquels j'opérai, en les plaçant dans toutes les circonstances qui peuvent être prévues pendant la conservation de la poudre en magasin

La quantité de poudre seule employée dans mes expériences sans compter la quantité de charbon-graphite, n'était jamais moins de 32 kilogrammes

J'ai fait jusqu'à vingt expériences, mais je n'exposerai ici que celles dont les résultats sont de quelque importance

Première expérience — Un baril chargé de la manière mentionnée ci-dessus fut placé pu terre, privé de son couvercle supérieur, la surface du mélange que je voulais enflammer présentait l'étendue d'un cercle de 50 centimètres de diamètre.

Je ne pus parvenir à enflammer le mélange au moyen d'une lance à feu pu le simple contact.

Pour enflammer ce mélange, il fallut le remuer assez longtemps avec le bout de la lance à feu, jusqu'à ce que quelques grains de poudre vinssent à se détacher du carbo-graphite et s'agglomérer, alors seulement la masse prit feu et continua à brûler. Pour accélérer ensuite l'inflammation du mélange il me fallait saupoudrier de pulvérin la surface à enflammer, qui alors prenait feu subitement à l'approche de la pointe pétillante d'une meche ordinaire.

La combustion du mélange continuait d'une manière uniforme, de sorte qu'une masse de 32 kilogrammes de poudre (non compris le carbo-graphite) était consumée entièrement au bout de 67 à 75 secondes.

La longueur de la gerbe de feu qui s'échappait de l'orifice du tonneau était de 1^m,50 à 2 mètres. On pouvait se tenir à côté du baril sans aucun danger, et, la combustion achevée le baril fut jugé encore capable de servir.

Deuxième expérience — Pour savoir si le baril ne éclaterait pas par l'effet des gaz produits pendant la combustion du mélange, dans le cas où l'on y mettrait le feu par l'ouverture carrée pratiquée exprès dans le couvercle supérieur du baril, j'en fis charger un de la même quantité de poudre (32 kilogrammes) avec la proportion convenable de carbo-graphite.

La combustion fut un peu plus lente, mais accompagnée d'un bruit plus fort que lors de la première expérience. Vers la fin de la combustion le couvercle supérieur, attaqué par le feu, sauta, mais le tonneau n'en fut pas endommagé, et put servir encore.

Troisième expérience — La troisième expérience fut faite dans le but de voir si l'on pouvait arrêter la combustion avec une petite pompe à feu.

À cet effet, je fis charger un baril d'une quantité de mélange qui contenait, outre le carbo-graphite, 1^m,50 de poudre pure, et le baril étant couché par terre, j'y mis le feu avec une meche. La flamme fut éteinte quelques instants après au moyen d'une petite pompe à feu, et la moitié de la poudre resta intacte en devenant seulement tant soit peu humide.

Ayant répété cette expérience sur une plus grande quantité de poudre, je n'obtins pas les mêmes résultats, parce que le jet de feu qui avait 50 cen

timètres de diamètre se trouva plus fort que le jet d'eau de la petite pompe mais avec deux ou trois grandes pompes dirigées dans l'intérieur de ce même tonneau le succès de l'expérience eût été infallible

Quatrième expérience — Pour comparer la vitesse de combustion de deux mélanges différents je plaçai deux baïls l'un à côté de l'autre et chargés de la même quantité de poudre mais avec cette différence que l'un contenait la poudre mêlée avec du charbon de bois sans graphite tandis que l'autre ne contenait que de la poudre et du charbon de bois sans graphite

La combustion du mélange fait avec du charbon de bois fut beaucoup plus vive et plus prompte

Cinquième expérience — Pour répéter cette expérience avec des mélanges non comprimés je plaçai en deux petits tas deux mélanges dont l'un contenait $\frac{1}{2}$ de kilogramme de poudre avec une proportion convenable de charbon-graphite et l'autre $\frac{1}{2}$ de kilogramme de poudre mais avec le double de son volume de charbon

Le premier mélange mit à brûler, 7 secondes et le deuxième 4 secondes (1)

On voit par ces deux expériences que la poudre mêlée avec le charbon-graphite brûle lentement sans même être comprimée mais pour conserver la poudre en grande quantité, la compression est indispensable car d'un côté les grains de poudre dans un mélange non comprimé s'accumuleraient très facilement sur un point ce qui détruirait le principe fondamental sur lequel repose le moyen proposé et d'un autre côté une quantité donnée de ce dernier mélange occupant un bien plus grand volume exigerait indubitablement un emplacement beaucoup plus vaste

Sixième expérience — Pour voir quel effet pourrait produire un baïl de poudre brûlant dans un magasin je fis un assez grand nombre d'expériences, en ayant toujours soin de disposer les tonneaux différemment

Voici les deux résultats qui m'ont paru les plus remarquables

En chargeant deux tonneaux chacun de $\frac{3}{2}$ kilogrammes de poudre mêlée avec la quantité convenable de charbon-graphite et bien comprimée je

(1) Ce rapport entre les vitesses de combustion des deux mélanges, montre l'accord qui existe entre les résultats obtenus à Saint Petersburg, (*première expérience*), en ajoutant du charbon minéral au charbon végétal, et ceux que M. Probert avait trouvés à Metz en n'employant que du charbon de bois, pour remplir les interstices qui existent entre les grains de poudre

les fis coucher pu terre de maniere a ce que leurs axes fussent sur la meme ligne, le fond du premier tonneau était à la distance de 1 metre de celui du second

Le feu fut communiqué au melange au moyen d'un long fil d'étoupe par une petite ouverture carree pratiquée dans le fond du premier tonneau

La moitie du melange du premier tonneau brûla uniformement sans autre effet remarquable, mais alors le fond du second tonneau, attaqué par le large jet de flamme du premier, fut embrasé et communiqua le feu au melange continu dans l'intérieur du tonneau, des ce moment, il y eut deux courants de feu places tout à fait l'un vis a-vis de l'autre, les deux tonneaux, par l'effet de ces courants, s'éloignèrent doucement l'un de l'autre jusqu'à une distance assez grande pour que la force des deux courants opposes ne pût plus surmonter la résistance due au frottement des tonneaux sur le sol, alors ceux ci continuèrent à brûler lentement jusqu'à la fin

L'operation terminée, les deux tonneaux furent trouves en assez bon état pour pouvoir servir encore

Septieme experience — Comme les barils de poudre sont ordinairement disposés dans les magasins sur deux rangs, le premier placé verticalement et le second superposé horizontalement sur le premier, je plaçai deux tonneaux de la meme maniere

Le feu fut communiqué au premier tonneau au moyen de l'étoupille par une petite ouverture carree pratiquée au couvercle superieur. La flamme commença a s'échapper par cette ouverture avec un bruit semblable a celui d'une fusée montante et toucha une des parois du second tonneau en le carbonisant un peu, mais une vingtaine de secondes apres, le fond superieur du premier tonneau, étant consumé et ne pouvant plus tenir aux autres parois du tonneau, fut jeté dehors, alors, le second tonneau, déplacé par la force du courant, tomba pres du premier, sur son fond inférieur, sans avoir pris feu, et n'ayant essuyé, comme je viens de le dire, qu'une legere carbonisation sur l'un de ses côtes

Huitieme experience — Pour compléter ces experiences, je voulus encore comparer la faculté hygrométrique de ces différents mélanges

» A cette fin, je chargai trois grandes fusees en carton et de dimensions égales

» La premiere était chargée de $1\frac{1}{2}$ kilogramme de poudre pure,

» La seconde était chargée de $1\frac{1}{2}$ kilogramme de poudre mêlée d'une quantité suffisante de charbon,

La troisieme etait chargée de 1 $\frac{1}{2}$ kilogramme de poudre mêlée de carbo-graphite

Les trois fusées furent exposees a l'influence de l'air pendant quatre jours dans un endroit tres humide mais protégé par un toit

Le cinquieme jour, je fis passer par un tamis les melanges n° 2 et n° 3, apres quoi je les dégagai entierement de la poussiere qui pouvait encore adhérer aux grains de poudre puis, ayant pesé sur une balance tres-sensible la poudre des trois numeros j'obtins les résultats suivants

La poudre n° 1 avait absorbé 8^{rs},53 d'humidite,

n° 2 3^{rs},198,

n° 3 2^{rs},132

Dou il est facile de conclure que la poudre seule absorbe quatre fois plus d'humidité que lorsqu'elle est mêlée avec le carbo-graphite et qu'en conséquence ce dernier mélange n'offre aucun genre d'inconvenients

La poudre n° 1 devint tellement friable qu'on pouvait l'écraser entre les doigts celle du n° 2 l'était beaucoup moins enfin celle du n° 3 l'était encore moins que la poudre n° 2

Les essais que j'ai faits dans ce meme but mais sur une plus grande quantité de poudre, m'ont fourni les memes résultats

Qu'il me soit permis, avant de terminer cet article, d'indiquer les moyens qu'on pourrait facilement employer pour appliquer le procédé dont il s'agit, a la conservation de grandes masses de poudre

Toute poudrerie, sans que cela entraîne a des dépenses quelconques possède tout ce dont elle a besoin pour préparer les barils avec le mélange dont il a été question

Le graphite et le charbon doivent être pulvérisés le mieux possible, ce qui peut se faire avec les memes meules dont on se sert dans les poudreries pour la trituration des ingrédients de la poudre

» Pour mélanger la poudre avec le carbo-graphite, on peut employer le procédé des tonnes

» Il ne resterait donc qu'à préparer une presse, et meme au besoin une presse hydraulique, dont le pilon fût exactement en rapport avec l'orifice du tonneau a poudre

Pour n'avoir que des pilons d'un seul calibre, on pourrait tres bien donner à la partie intérieure des tonneaux la forme régulière d'un cylindre, en

ne laissant de convexité qu'à leurs parois extérieures, vers le milieu de la hauteur des tonneaux afin de pouvoir les cercler plus solidement

CHIMIE. — *Note sur le sulfate chromique, par M E Kopp*

« En recherchant quelle était l'action des corps desoxydants sur les sulfates à différents degrés de saturation, j'ai eu occasion de faire quelques observations assez intéressantes concernant le sulfate chromique insoluble

Ce composé $3\text{SO}^3 \text{Cr}^2\text{O}^3$ se prépare avec la plus grande facilité en chauffant de l'acide sulfurique concentré à une température voisine de l'ébullition et en y projetant par portions du bichromate potassique pulvérisé. Il y a effervescence très vive due au dégagement d'oxygène, et il se précipite sur le champ une poudre violette insoluble qui occasionne facilement des soubresauts assez violents

En étendant d'eau le précipité se dépose avec une si grande facilité qu'on le lave très-rapidement par decantation et la liqueur acide contient le bisulfate potassique ne retient pas trace de sel chromique

Le sulfate ainsi obtenu est une poudre verte très fine qui chauffée change de couleur et devient d'un rose légèrement violacé, en même temps qu'elle acquiert une extrême mobilité. Par le refroidissement la couleur primitive reparait. Ce sel est dans cet état tout à fait insoluble dans l'eau même après un contact prolongé. L'eau de lavage ne trouble pas la solution de sel barytique aussi peut-on s'en servir avec avantage pour séparer l'oxyde de chrome d'une foule d'autres oxydes. Supposons par exemple, une solution contenant des sels de fer, de zinc, d'alumine, d'urane, de chrome, etc., on n'a qu'à ajouter un excès d'acide sulfurique, et concentrer par l'ébullition la liqueur, pour que tout le chrome se sépare complètement à l'état de sulfate chromique insoluble, qui reste dans cet état même en ajoutant de l'eau, tandis que les autres sulfates restent en dissolution. L'oxyde de chrome se combine avec une extrême facilité. Ce sel soumis à l'action de l'hydrogène sec à une température voisine du rouge, éprouve une décomposition remarquable. En considérant l'extrême stabilité de l'oxyde de chrome, on s'attend à voir se dégager les produits de la réduction de l'acide sulfurique par l'hydrogène, c'est-à-dire de l'eau, du gaz sulfureux, et secondairement du soufre et de l'hydrogène sulfuré, tandis que l'oxyde de chrome reste pour résidu

« Au lieu de cela, tout l'oxygène de $3\text{SO}^3 \text{Cr}^2\text{O}^3$ disparaît soit à l'état d'eau, soit à l'état de gaz sulfureux et la réduction s'opère avec une si grande éner-

gie qu'il y a un phénomène d'ignition plus intense que celui qu'on observe dans la réduction de l'oxyde de cuivre par l'hydrogène

Une partie du soufre se dégage à l'état de SO^2 , une autre à l'état de soufre en vapeur

Il reste alors dans le tube un corps pulvérulent brun-noirâtre, qui a une telle affinité pour l'oxygène, qu'il constitue un des pyrophores les plus énergiques, en effet, même après l'avoir conservé pendant des semaines dans des tubes fermés et remplis d'hydrogène, il est impossible d'en exposer la moindre parcelle au contact de l'air, sans qu'elle prenne feu et brûle avec un vif éclat. Les produits de la combustion sont du gaz sulfureux et de l'oxyde chromique

Ce composé est en outre remarquable par sa composition : il ne renferme que du chrome et du soufre : ainsi que l'a prouvé l'analyse dans laquelle on a dosé séparément le chrome à l'état d'oxyde, et le soufre à l'état de sulfate de baryte. Il ne contient que la moitié du soufre contenu dans le sulfure chromique Cr^2S^3 , de manière que sa composition doit être exprimée par Cr^4S^2

Une expérience très-simple confirme cette composition : en équilibrant sur la balance un tube scellé contenant ce composé, et en brûlant ensuite les extrémités pour faire tomber Cr^4S^2 et produire son inflammation, on trouve, après l'oxydation, que l'équilibre n'a pas été sensiblement dérangé. En effet Cr^4S^2 se change, par l'oxydation, en Cr^4O^3 , en dégageant 3SO^2 , mais les S^2 perdus pèsent à peu près autant que les O^3 acquis

Cependant on remarque que souvent la quantité de soufre est plus petite que celle qui correspond à la formule Cr^4S^2 , et il semble probable qu'à une température plus élevée on puisse arriver au composé Cr^2S^3 , car c'est dans les expériences dans lesquelles la chaleur a été poussée jusqu'à fusion du verre, qu'on a observé les pertes les plus considérables de poids dues à l'enlèvement de l'oxygène et du soufre par l'hydrogène. (Dans ces cas on a aussi observé que le verre fondu était coloré en rouge foncé tellement intense, qu'il paraissait presque opaque. Il paraîtrait, d'après cela, que, tandis que les composés analogues à l'oxyde de chrome ont la propriété de colorer le cristal en vert, les composés de l'ordre inférieur le colorent en rouge. Il y a en cela analogie entre les composés du cuivre et ceux du chrome.)

» 1 6^{re},265 de sulfate chromique, traités par l'hydrogène, éprouverent une perte de 3^{re},76

$$\left. \begin{array}{l} \text{Si le composé restant était } \text{Cr}^2\text{S}^3, \text{ on aurait dû perdre } 3^{\text{re}},51 \\ \text{Cr}^2\text{S} \end{array} \right\} \frac{7,51}{4,00} = 3,75$$

» Le résultat observé est la moyenne $\text{Cr}^3\text{S}^3 + \text{Cr}^2\text{S} = \text{Cr}^4\text{S}^3$.

» II. 5 grammes de $3\text{SO}^3, \text{Cr}^2\text{O}^3$, perdirent 3,01.

Cr^2S^3 aurait exigé	2,802
Cr^2S	3,201

» Le résultat observé est encore la moyenne.

» Mais dans l'expérience dans laquelle on constate la perte la plus grande, elle était de 3^{re},11 sur 5 grammes, ce qui se rapproche de la composition Cr^3S .

» En supposant ce composé oxydé correspondant à Cr^4S^3 , on aurait, pour la série d'oxydation du chrome, $\text{Cr}^4\text{O}^3, \text{Cr}^3\text{O}^3, \text{CrO}^3$, dans laquelle les quantités de métal sont dans le rapport de 4 : 2 : 1.

» Le composé Cr^4S^3 , en contact avec la vapeur d'eau, la décompose à chaud avec dégagement d'hydrogène et d'hydrogène sulfuré, en se transformant en oxyde de chrome : aussi faut-il avoir soin de dessécher très-exactement l'hydrogène, pour éviter un mélange d'oxyde de chrome avec le composé sulfuré.

» En contact avec le chlore sec, Cr^4S^3 brûle très-énergiquement et se transforme en Cr^3Cl^3 d'une pureté parfaite et d'une belle couleur rose, tandis que le soufre forme du chlorure hyposulfureux. Le chlorure chromique Cr^3Cl^3 , soumis lui-même à l'action de l'hydrogène, perd une grande quantité de chlore qui se dégage à l'état de gaz chlorhydrique, et la perte de poids se rapproche de celle indiquée pour la formation du composé Cr^4Cl^3 . »

OPTIQUE. — *Sur les microscopes.* (Extrait d'une Lettre de M. ADOLPHE MATTHIESSEN, d'Altona, à M. le Président.)

» J'apprends que l'on réclame pour M. Amici, de Florence, la partie de mes travaux sur le microscope, qui regarde l'objectif (1).

» J'ai l'honneur de mettre sous les yeux de l'Académie l'objectif composé, que j'ai acheté il y a trois ans chez M. Amici, et un exemplaire des miens.

» Le jeu de M. Amici pèse 18 grammes, le mien 2 grammes; ses quatre

(1) M. Amici, présent à la séance, a déclaré qu'il ne connaissait pas la construction du microscope de M. Matthiessen, que, dès lors, il n'aurait eu aucun motif pour formuler une réclamation.

(Note du rédacteur.)

lentilles ont une hauteur de $17 \frac{1}{4}$ millimètres, mes quatre lentilles une hauteur de 5 millimètres

Les diamètres des trois lentilles achromatiques de l'astronome de Florence, sont de $1 \frac{1}{4}$, $3 \frac{1}{4}$ et $4 \frac{1}{4}$ millimètres, les miens ont $\frac{3}{4}$, $1 \frac{1}{4}$ et $2 \frac{1}{4}$ millimètres

La surface de la troisième lentille de M. Amici, est double de celle de la deuxième, les surfaces de mes deuxième et troisième lentilles sont égales

La troisième lentille de M. Amici, celle de $4 \frac{1}{4}$ millimètres de diamètre, a son foyer à peu près double de celui de la deuxième, ma troisième lentille a le foyer plus court que la deuxième

M. Amici obtient la compensation d'achromatisme et d'aberration de sphéricité par le grand pouvoir réfringent du boiate de plomb, lequel se ternit en quelques mois, je l'obtiens par des coulures nouvelles du flint du même bien connu de Guinand lequel ne se ternit pas à l'air

La quatrième lentille de M. Amici est une lentille plan convexe convexe, faite de crown, ma quatrième lentille est un ménisque divergent de flint en forme de verre de montre

La quatrième lentille de M. Amici présente sa convexité à l'œil la surface de ma quatrième lentille est concave vers l'œil

Le grossissement de M. Amici est de 500 diamètres sous un oculaire donné (c'est un des plus forts grossissements que j'aie vus de M. Amici) le mien est de 1100 fois sous le même oculaire

Malgré cela, le foyer de mon jeu est assez long pour permettre de placer une lame de verre entre l'objet et l'objectif, le foyer du jeu de M. Amici est si court, que l'on ne peut pas placer la plus mince lame de verre entre l'objet et l'objectif

» Je ne connais pas d'objectifs de microscopes composés à forts grossissements, plus dissemblables sur tous les points que le mien et celui de M. Amici ils diffèrent par les grossissements, par la grandeur, par les coulures, par la nature des matières employées, par les diamètres, par les relations de grossissement entre les diverses lentilles, par les principes sur lesquels ils se fondent

J'ai montré le jeu de M. Amici à beaucoup de personnes, à des savants et des micrographes, à des opticiens, j'ai loué ses bons effets, j'ai dévié les lentilles pour faire voir la construction J'ai ainsi publié moi-même les travaux de M. Amici, sans soupçonner que l'on voudrait trouver des ressemblances entre des instruments si divers

Mes objectifs doivent leur supériorité à cinq perfectionnements que je vais énumérer On n'en trouve pas un seul dans les jeux de M. Amici

1° La petitesse de la première lentille je n'ai jamais vu des lentilles achromatiques de $\frac{1}{2}$ de millimètre de diamètre avant les miennes

2° L' rapprochement presque jusqu'au toucher, des quatre lentilles sans rien perdre de l'achromatisme, ce qui est dû aux courbures nouvelles que j'ai données aux lentilles

Les deux causes produisent des grossissements inaccoutumés Des opticiens à Paris, ont fait avant moi des jeux *presque aussi* grossissants que les miens et des lentilles premières de 1 millimètre de diamètre, mais elles avaient le foyer trop court et ne donnaient ni netteté ni clarté, parce qu'elles ne possédaient pas les perfectionnements suivants

3° Le grand diamètre de la deuxième lentille et son faible grossissement qui permet de recevoir de l'objet un cône lumineux plus large, sans augmenter pour cela la distance entre la première et la troisième lentille Cette circonstance augmente beaucoup l'intensité de l'image sans diminuer son grossissement

4° L'allongement du foyer par la quatrième lentille divergente La quatrième lentille de M. AMICI raccourcit son foyer tellement que l'on ne peut observer, en l'employant, que des matières sèches à découvert

5° La correction séparée des deux aberrations

M. DUJARDIN écrit relativement à quelques expériences qu'il a faites sur l'alimentation d'un canon de fusil, au moyen d'une hélice en fil de cuivre intérieure ou extérieure, parcourue par un courant voltaïque Les faits signalés par M. Dujardin l'avaient été déjà par d'autres observateurs

M. SZOKALISKI annonce avoir pratiqué avec succès l'opération de la cataracte sur un vieillard âgé de 104 ans, qui était depuis dix ans privé de la vue

M. DURAND prie l'Académie de hâter le travail de la Commission à l'examen de laquelle a été renvoyé un Mémoire qu'il a adressé l'an passé sur diverses questions de physique générale

M. DE LAPASSE adresse une Note dont il demande le dépôt aux archives de l'Académie Cette Note est cachetée séance tenante, et, sous cette forme, le dépôt en est accepté

L'Académie accepte également le dépôt d'un paquet cacheté, adressé par M. LEROY D'ÉTIOLLES

(1161)

A 4 heures trois quarts, l'Académie se forme en comité secret

La séance est levée à 6 heures

A

ERRATA

(Séance du 10 juin 1844)

Page 1067, ligne 5, *au lieu de* présidence de M. Élie de Beaumont, *lisez* présidence de M. Charles Dupin

Page 1109, ligne 28, *au lieu de* (Renvoi à la Section de Géométrie), *lisez* (Renvoi aux Sections de Géométrie et de Mécanique)

BULLETIN BIBLIOGRAPHIQUE.

L'Académie a reçu, dans cette séance, les ouvrages dont voici les titres :

Comptes rendus hebdomadaires des séances de l'Académie royale des Sciences, 1^{er} semestre 1844, n° 24; in-4°.

Voyages de la Commission scientifique du Nord en Scandinavie, en Laponie, au Spitzberg et aux Féroë, sous la direction de M. GAIMARD; 20^e livr. in-fol.

Les Chemins de fer et l'amendement des Terres; Note adressée à la Chambre des Députés par M. NÉRÉE BOUBÉE. Paris, 1844; in-8°.

Bulletin de la Société industrielle de Mulhouse; n° 86; in-8°.

Journal d'Agriculture pratique et de Jardinage; juin 1844; in-8°.

Bulletin de la Société nationale de Vaccine; juin 1844; in-8°.

L'Abeille médicale, n° 6; juin 1844; in-4°.

Proceedings... Procès-Verbaux de la Société géologique de Londres; vol. III, n° 67; 1840; in-8°.

Memoirs... Mémoires et Procès-Verbaux des séances de la Société chimique, partie VII, broch. in-8°.

Report... Sur l'état présent de nos connaissances relativement à l'Inflammation; par M. WHARTON-JONES. Londres, in-8°.

Report... Rapport sur la Faune d'Irlande, division des Invertébrés, rédigé à la demande de l'Association britannique pour l'avancement des Sciences; par M. W. THOMPSON. Londres, in-8°.

The Edinburgh... Nouveau Journal philosophique d'Édimbourg, publié par M. JAMESON; numéros de janvier à avril 1844; in-8°.

The Athenæum; décembre 1843, mars et avril 1844; in-4°.

Bericht uber... Analyse des Mémoires lus à l'Académie des Sciences de Berlin, et destinés à la publication, mars 1844; in-8°.

Astronomische... Titre et Table du XXI^e volume des Observations astronomiques de M. SCHUMACHER; in-4°.

Journal fur... Journal de Mathématiques pures et appliquées, publié par M. CRELLE; XXVI^e vol., 3^e et 4^e livr. Berlin, 1843; in-4°.

Informe... Rapport sur l'état de l'Industrie manufacturière en Allemagne; par M. RAMON DE LA SAGRA. Madrid, 1843; broch. in-8°.

Gazette médicale de Paris; n° 23; in-4°.

Gazette des Hôpitaux; n° 68 à 70; in-fol.

L'Écho du Monde savant; n° 46.

L'Expérience; n° 363; in-8°.

COMPTE RENDU

DES SÉANCES

DE L'ACADÉMIE DES SCIENCES.

SÉANCE DU LUNDI 24 JUIN 1844.

PRÉSIDENCE DE M. CHARLES DUPIN.

MÉMOIRES ET COMMUNICATIONS

DES MEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE L'ACADÉMIE.

« M. le baron CHARLES DUPIN annonce, comme président, la perte douloureuse et profondément sentie, de notre illustre confrère M. GEOFFROY-SAINT-HILAIRE, membre de la section d'Anatomie et de Zoologie. Il se rend ainsi l'organe des sentiments unanimes de l'Académie. »

BOTANIQUE. — Sur les Isoetes et les espèces nouvelles de cette famille découvertes en Algérie; par M. BORY DE SAINT-VINCENT.

« Le savant Claude Richard pensait que le genre de cryptogames auquel Linné avait imposé le nom d'*Isoetes*, en le rangeant à la suite des Fougères, devait constituer à lui tout seul une famille naturelle des plus profondément caractérisées; ceux qui ne partageaient pas cette manière de voir objectèrent que ce serait par trop multiplier le nombre des familles que d'en former pour n'y comprendre qu'une ou deux espèces de plantes.

» Cependant, les *Isoetes* ne sont certainement pas des Fougères: malgré la situation des organes reproducteurs qui, chez elles, se développent comme radicalement à la base des feuilles, la petite famille des Rhizospermes ne les

saurait admettre celle des Iycopodiacées, où l'on avait songé à les rattacher, les repousse évidemment. Force est donc d'en revenir à l'idée de feu notre confreie, qui ne se trompa jamais, et dans la flore qui résultera des explorations botaniques de la Commission scientifique d'Algérie, la famille des Isoetes sera non-seulement solidement établie, mais encore accrue au moins de trois espèces entièrement nouvelles et propres à cette Afrique, sur nul point de laquelle on n'avait encore signalé l'existence d'aucune.

L'on ne compta d'abord que deux *Isoetes*, l'un et l'autre aquatiques, le *lacustris* du nord et le *Coromandeliana* de l'Indostan, qu'on a dit se retrouver à l'île de-France, où j'avoue qu'elle m'échappa. Durant bien des années je montrais dans mon herbier, à qui voulait se donner la peine d'en consulter les richesses cryptogamiques, combien l'espèce qui, dans les environs de Montpellier, avait donné une certaine célébrité aux herborisations de la mare de Gramont, était différente de celle de Linné, essentiellement septentrionale et retrouvée par M. le docteur Mogent, dans le Gérardmer, lac fort élevé des Vosges. M. le professeur Delile, partageant cette façon de voir, fit depuis de l'Isoete de Gramont son *setacea*, universellement admis.

Plus tard, le Brésil offrit un quatrième *Isoetes*, et divers voyageurs en ayant recueilli d'autres dans l'Amérique du Nord, dans la Nouvelle Hollande et jusque dans les îles de l'Océan Pacifique, il est permis de penser qu'on reconnaitra chez ces dernières, en les examinant soigneusement, autre chose que de simples variétés dues à l'influence des climats, de sorte qu'y compris nos africaines, on peut évaluer sans témérité à sept ou huit le nombre des espèces répandues à la surface du globe, appartenant à la nouvelle famille. Celles que produit l'Algérie, dont nous devons nous borner ici à constater l'existence, afin de prendre date, et qui avaient, sans exception, échappé à l'auteur du *Flora atlantica*, ainsi qu'à tous les amateurs qui herborisèrent ou écrivirent des plantes barbaresques sur les traces de M. Desfontaines, sont de deux sortes et pourront être réparties en deux sous-genres fort distincts: le premier composé de deux à trois espèces aquatiques, comme le sont toutes les *Isoetes* premièrement connus, le second, de deux autres espèces essentiellement terrestres dans l'état normal et qui, au lieu de vivre inondées au fond des lacs, ne se plaisent que hors de l'eau, croissant dans les expositions les plus sèches à la surface des campagnes.

* Aquatiques

1. *ISOETES SETACEA* de M. Delile dans les *Annales du Museum*, dont il existe deux formes d'aspect très différent que, pour ne pas encourir le re-

proche de trop multiplier les espèces, nous ne signalerons que comme de simples variétés

α (*Dehlei*), exactement pareille à celle de la maré de Gramont, si longtemps confondue par les floristes français avec le *lacustris*, L. et qui aura bientôt disparu de la région oxitanique où la culture en dessèche et envahit l'habitat. Nous l'avons retrouvée abondamment sur plusieurs points du canton de la Calle, particulièrement dans les patuages souvent inondés et demeurant marecageux entre les lacs el Mehla et el Houbéira, dans les sables d'Ain-Treard, où elle persiste lorsque n'étant plus recouvert d'eau, ce sol demeure seulement humide, autour de plusieurs flaques stagnantes jusque près du douar de Ben Atia, à deux lieues dans l'ouest, etc., etc. Ses feuilles qui n'ont rien dans leur forme ou dans leur consistance qui ressemble le moins du monde à de la soie, sont au contraire assez élargies à leur base, et lorsqu'elles pointent au-dessus de la surface de l'eau, elles continuent de s'y tenir ascendantes et droites, ce qui vient de ce qu'elles ont plus de diamètre et de rigidité dans leur nature que n'en ont celles de l'espèce suivante. Ces feuilles sont moins épaisses, mais beaucoup plus longues que celles du véritable *lacustris*, L., atteignant jusqu'à 32 et même 35 centimètres, leur veine est assez tendre, mais passe au jaunâtre pour peu qu'elles demeurent quelque temps exondées.

β (*Peyrremondu*), recueillie par M. le capitaine Durieu au bord des flaques d'eau des champs de la plaine d'Oran, où elle persiste jusqu'en mai pour peu qu'il se conserve quelque humidité dans le sol, la même plante m'avait été des longtemps envoyée de divers points marecageux des côtes du Languedoc et de la Provence, notamment des environs de Fréjus, où la trouva le premier feu M. de Peyrremond. Elle est, dans toutes ses parties, comme un diminutif d'environ moitié de la précédente, ses feuilles beaucoup plus fines et fermes, n'atteignent guère qu'à 16 centimètres de long.

» 2 *ISOETES LONGISSIMA* N. — Celle-ci a été découverte par M. Durieu, à la fin de mai, dans une des mares des forêts qui environnent le lac Houbéira, au canton de la Calle. Elle est fort remarquable par la finesse et surtout par la longueur de ses feuilles d'un vert assez obscur, qui atteignent et dépassent même 65 centimètres. Quand l'eau, du fond de laquelle ces feuilles s'élevaient mollement, vient à s'abaisser par l'effet de l'évaporation, elles ne pointent point au-dessus de la surface, mais s'infléchissant toutes du même côté y flottent absolument comme celles de quelques graminées aquatiques, sans jamais se redresser. La bulbe radicale est proportionnellement beaucoup plus petite que dans toutes les autres espèces.

3 ISOETES DURIETI N — Cette plante, encore assez commune dans quelques sites très-approchés d'Alger même, ou nous herborisâmes assez souvent, nous y avait complètement échappé, parce qu'alors nous ne soupçonnions point qu'il pût exister des espèces essentiellement terrestres dans un genre ou l'on n'en connaissait que d'essentiellement inondées. Ce n'est qu'en ce printemps qu'ayant, dans les premiers jours d'avril, gravi, presque aux portes de la ville, les pentes à peu près arides et dépouillées de verdure qui s'étendent au pied du fort de l'Empereur, que M. Durieu a découvert l'*Isoetes* qui portera conséquemment son nom, et qui fait le sujet d'une communication intéressante de cet infatigable botaniste, ou je lis. Les coteaux de Bab

Azoum, coupés par quelques ravins, sont assez frais sur celui de leur revers qui fait face au nord, mais fort maigres de l'autre. L'un d'eux, qui vous connaissez bien, est presque complètement stérile. C'est celui qui venant s'appuyer au village de l'Aga, à une centaine de pas du fort de Bab Azoum, s'élève directement en face. À peine quelques Cistes de Montpellier, rabougris, y donnent-ils signe de vie. Une ligne de Cactes chétifs marque la crête de cette colline. C'est au pied même de ces Cactes, sur le roc à peine recouvert d'un peu de terre sèche qui n'est que le gneiss décomposé, que croît, plein de vigueur et bravant les rayons du soleil, un *Isoetes* entremêlé à quelques pieds, tout à fait amaigris, d'*Ara caryophyllica* ou d'*Helianthus guttatus*. Lorsqu'en descendant le coteau on voit le sol devenir un peu plus substantiel, ou humide et qu'il se mouille, l'*Isoetes* disparaît. Au reste, la plante n'est pas rare dans le site desséché où je vous la signale. On l'y reconnaît pendant le printemps à sa teinte blonde, à ses feuilles assez courtes, étalées sur le sol, et sensiblement plus élargies que chez les autres espèces du même genre. Comme si le *Duriet* était un passage des *Isoetes* aquatiques à la suivante, on y distingue à la base des feuilles non des épines, mais les côtés de celles-ci venant à s'endurcir, il en résulte deux dents aiguës entre lesquelles la nervure médiane, s'endurcissant à son tour, finit par former une troisième dent plus courte, moins pointue et prononcée que les deux latérales. La souche ou bulbe radicale est à fleur de terre, et ne tardera probablement pas à disparaître des lieux où l'indique notre vaillant collaborateur qui ajoute : L'*Isoetes* nouveau a maintenant un grand ennemi, il est destiné, sans aucun doute, à ne plus faire partie de notre flore avant peu, ou du moins à être entièrement détruit aux lieux où je vous en signale l'existence. Vous devez vous rappeler que c'est précisément là que se

sont établis des gens qui nourrissent des pourceaux, proscrits au temps des Turcs. Ces nouveaux venus sont très-friands des bulbes de la plante, les recherchent, les dévorent avec avidité, et l'on reconnaît les endroits où ils ont passé par la destruction qu'ils en ont faite. Heureusement pour les botanistes, qui attacheront sans doute une grande importance à la conservation d'un si étrange végétal, M. Durieu, herborisant quelques jours après avec les savants frères Monard, sur le faite des hauteurs de Boudjarea, ils y retrouvèrent la troisième espèce d'*Isote*, ainsi à jamais acquise à la science.

4 *ISOLTES HISTRIX* N. — Le nom de celle-ci lui est mérité par l'aspect de sa bulbe couverte de pointes dures qui lui donnent en quelque sorte le singulier aspect d'une miniature de hérisson. La profusion avec laquelle la nature la répandit à la surface de presque toute l'Algérie aurait dû la faire rencontrer plus tôt par les botanistes qui fouillaient un pays dont la moitié des plantes au moins avait cependant échappé à toutes recherches. J'avoue qu'après deux ans d'investigations minutieuses la plante dont il est question m'était demeurée inconnue. J'en avais cependant eu, dans beaucoup d'endroits, des masses sous la main, et, comme tout le monde, je l'avais probablement confondue avec certaines graminées non en fructification qui forment, en beaucoup de sites arides, de maigres pelouses à la surface de certains coteaux. Je me souvenais seulement que, dans une excursion d'automne, aux environs de la Calle, l'un des membres de la Commission grand chasseur, et qui ne nous laissait jamais manquer de gibier, remarquait nous fit voir dans l'estomac de perdrix qu'il avait tuées, de petites bulbes en partie digérées et que nous ne savions à quoi rapporter. « C'est uniquement par hasard, m'écrivait plus tard M. Durieu, qu'arrachant d'autres plantes, je soulevai plusieurs bulbes pareilles à celles de l'estomac des perdrix, et que j'y reconnus celles d'une merveilleuse espèce uniquement terrestre de ce genre *Isotes*, regardé comme essentiellement lacustre ».

Le habitat de cet étrange végétal n'est pas encore ce qui le singularise le plus entre ses congénères. Ses feuilles, d'un vert assez gai, sont finement linéaires, à proprement parler bien plus setacees que celles de l'espèce si improprement nommée *setacea*, longues de 10 à 15 centimètres ou même un peu plus, selon qu'elles se développent entièrement exposées au soleil ou à l'ombre des Cistes et autres arbustes des coteaux brûlés. La bulbe ovoïde, de la grosseur d'un fort grain de maïs à celle d'un œuf de pigeon, et sensiblement amincie en pointe par le sommet, est sèche et rude au toucher, par l'effet que produisent à sa surface de véritables épines très-pointues, assez dures

noires, luisantes, longues de 4 à 10 et même 12 millimètres, disposées trois par trois, et qui paraissent être le résultat de la base des feuilles après la chute de celles-ci, et quand, se durcissant d'une façon toute particulière, les rudiments de leurs trois nervures demeurent plus courts latéralement, tandis que la médiane est un peu plus allongée.

Découverte en mai 1841, par M. Durieu, dans l'étendue du canton de la Calle, retrouvée par cet infatigable botaniste dans tous les environs de Bonne, sur les collines les plus sèches, et jusque sur les pentes de l'Eydoug, il la trouve encore revue abondamment dans le pays d'Oran, et MM. Monard l'ont dernièrement recueillie dans les environs de Medeah même, où ils se sont, comme moi, émerveillés qu'un végétal si commun nous fût si longtemps demeuré inconnu.

J'ai, dans le mois de novembre, planté en pots des bulbes de l'*Isoetes histrix*, récoltées à Bonne et à la Calle, en avril ou mai, et tirées de mon herbier, elles ont parfaitement végété, et fourni sur la fin de l'hiver des échantillons charmants. J'en ai aussi élevé entièrement sous l'eau, et dans les mêmes conditions que si il eût été question du *lacustris* ou du *setacea*. Les plantes ainsi inondées ont crû comme si elles eussent été dans leur condition normale, se sont parfaitement développées, n'ont perdu aucun de leurs caractères, ni leurs épines, et j'en conserve qui ont vécu ainsi noyées, qu'on ne saurait distinguer de celles qui recurent à la surface pelée des coteaux les plus secs. »

MÉTÉOROLOGIE — *Phénomène atmosphérique observé par MM. ARAGO et LAUGIER*

Le dimanche 24 juin, vers 8^h 30^m du soir, le ciel étant presque entièrement couvert, on vit se dessiner, du côté du sud, sur une couche presque uniforme de nuages, un arc, en apparence circulaire, sombre, régulier et très-étendu qui, cependant, ne se continuait ni vers l'orient, ni vers l'occident, jusqu'à l'horizon. Cet arc devint de plus en plus noir et de plus en plus défini. Un arc blanchâtre se forma bientôt le long de la bordure intérieure de l'arc sombre, mais non dans toute son étendue.

Au-dessus et au-dessous de ce phénomène, les nuages semblaient éprouver une agitation singulière.

Les deux arcs, noir et blanc, toujours contigus, s'élevèrent graduellement au-dessus de l'horizon. Vers 9 heures, ils atteignaient le zénith, après s'être notablement affaiblis. Ensuite ils disparurent.

Le point culminant de l'arc parut être dans un plan vertical formant avec

le méridien, vers l'est, un angle d'environ 20 degrés. Dès que cette orientation eut donné au phénomène un caractère magnétique, M. Langier observa de minute en minute la boussole des variations diurnes. *elle n'éprouva aucune perturbation*.

On aperçut, sur divers points de l'arc, des traces de polarisation qui, évidemment, ne provenaient pas de la lumière de la Lune. Il reste à rechercher si la lumière crépusculaire n'en était pas la cause.

En terminant cette communication, M. Arago a rappelé les observations faites *dans le nord*, et pendant lesquelles des nuages prenaient la forme et la position des aurores boréales.

M. FLOURENS présente, au nom de l'auteur absent, M. DUMAS, le septième volume du *Traité de Chimie appliquée aux arts* (Voir au *Bulletin bibliographique*)

RAPPORTS

PHYSIOLOGIE VÉGÉTALE — *Rapport sur un Mémoire de M. PAYER, intitulé*
Mémoire sur la tendance des racines à fuir la lumière

(Commissaires, MM. de Mirbel, Becquerel, Pouillet, Dutrochet rapporteurs.)

La tendance qu'affectent certaines parties des végétaux à fuir la lumière est connue depuis longtemps, puisque c'est en 1812 que M. Knight l'a annoncée au monde savant, dans un Mémoire inséré aux *Transactions philosophiques*. Il avait constaté cette tendance à fuir la lumière dans les vrilles de plusieurs végétaux grimpants. Malgré les assertions de cet habile observateur, cette tendance de certaines parties des plantes à fuir la lumière demeura douteuse dans l'opinion de tous les physiologistes, jusqu'en janvier 1822, époque à laquelle l'un de nous, dans un Mémoire adressé à l'Académie des Sciences, et publié pour la première fois, par extrait, dans le numéro de février du *Journal de Physique* de cette même année, fit connaître le fait de la tendance de la radicule du gui à fuir la lumière. Cette *radicule*, comme celle de toutes les graines en germination, se compose de deux parties, savoir, du premier méristhale de la tige et de la racine naissante. Ce sont ces deux parties qui forment, dans toutes les graines en germination, le *caudex descendant*. L'auteur du Mémoire que nous rappelons ici constata que la tendance à fuir la lumière existait dans la première de ces deux parties constituantes de ce que l'on nomme *la radicule*, c'est à-dire dans le premier méristhale de la

tige du gui, l'état rudimentaire de la racine naissante ne lui permit pas de voir si elle tendait aussi à fuir la lumière, direction dans laquelle elle semblait pointer d'une manière passive par la flexion du premier méristhale de la tige ou du méristhale radicaire. Plus tard, en février 1833, le même auteur communiqua à l'Académie des Sciences et publia dans les *Annales des sciences naturelles* (tome XXIX, page 413) une observation touchant une racine aérienne de *Pothos digitata* qui lui avait offert le phénomène de fuite de la lumière, mais il regarda comme exceptionnel ce phénomène, alors unique dans la physiologie végétale, d'une véritable racine qui fuit la lumière. Tel était l'état de la question sur ce point de la physiologie végétale, lorsque M. Payer en fit l'objet des recherches consignées dans son Mémoire qui est le sujet de ce Rapport, et qui a été lu à l'Académie dans sa séance du 6 novembre 1843.

Cet observateur annonça que les racines de plusieurs plantes, et nominativement celles du *chou* et de la *moutarde blanche*, développées dans l'eau qui est contenue dans un vase de verre et à la surface de laquelle elles sont soutenues fuient la lumière. Il vit que les racines du cresson alénois (*Lepidium sativum*) n'éprouvent aucune influence sensible de la part de la lumière ni pour la fuir, elles croissent constamment verticales. Les deux Commissaires qui ont fait toutes les expériences que contient ce Rapport (1) ont constaté l'exactitude de ces observations de M. Payer, l'assertion suivante qu'il émet n'est pas aussi exacte. Il prétend que l'angle d'inclinaison formé avec la verticale par la racine qui fuit la lumière est toujours plus petit que l'angle d'inclinaison formé en sens inverse, avec la verticale, par la tige qui s'infléchit vers la lumière. Cela ne peut être considéré comme vrai que sous le point de vue de la quantité de l'inflexion de ces deux parties dans l'espace de quelques heures seulement. Les tiges sont bien plus promptes à se fléchir vers la lumière que les racines ne le sont à la fuir, en sorte que, dans un même temps de peu de durée, la flexion des tiges dans un sens est bien plus profonde que la flexion des racines en sens inverse, mais avec un temps plus long on observe souvent le contraire. Chez la moutarde blanche, qui est la plante que nous avons spécialement étudiée, la flexion des racines pour fuir la lumière paraît s'opérer exclusivement dans leur pointe ou dans leur spongiole qui est la seule partie qui, chez elles, s'accroît en longueur, en sorte que c'est en s'accroissant qu'elles se courbent. Si l'on retourne vers la lumière la pointe des racines qui se sont fléchies pour la fuir, la flexion acquise persiste, ce qui n'a

1) MM. Pouillet et Dutrochet

point lieu pour les tiges chez lesquelles la flexion précédemment acquise se renverse, c'est par la partie de leur pointe que l'accroissement a allongé que s'opère, dans ce cas, la nouvelle inflexion des racines pour fuir la lumière. Nous avons fait retourner ainsi jusqu'à quatre fois des racines de moutarde blanche, lesquelles demeurèrent ainsi disposées en zigzag, tandis que les tiges qui avaient subi également ces renversements alternatifs de direction n'offraient qu'une seule courbure, celle qui était la dernière acquise, laquelle avait détruit la précédente. De ce que la spongiole seule des racines se courbe pour fuir la lumière, il résulte qu'à mesure qu'une spongiole de nouvelle formation s'ajoute à la pointe de celle qu'elle remplace et qui s'est fléchie pour fuir la lumière, cette spongiole nouvelle se fléchit dans le même sens, en sorte que cette flexion s'ajoute à la précédente en forme une totide qui est plus profonde que chacune des deux dont elle se compose. Les flexions successives des nouvelles spongioles s'ajoutant ainsi les unes aux autres, il en résulte que le corps de la racine qui résulte de cet accroissement offre souvent dans le sens de la fuite de la lumière, une flexion beaucoup plus considérable que ne l'est la courbure de la tige vers la lumière.

M. PAYET recherche ensuite, au moyen du spectre solaire rendu fixe par un héliostat, si toutes les parties de ce spectre concourent à opérer cette flexion des racines. Ses recherches le conduisent à affirmer qu'il n'y a que la partie du spectre comprise entre les raies K et H de Fraunhofer, c'est-à-dire sa partie qui comprend le violet, l'indigo et presque tout le bleu, qui soit apte à opérer cette inflexion des racines, du même que celle des tiges. Cette assertion, relative aux tiges, a été émise précédemment par M. Payer dans un Mémoire qu'il a présenté à l'Académie le 26 décembre 1842, Mémoire sur une partie duquel un Rapport favorable a été fait par M. Becque le 1^{er}, au nom d'une Commission, le 8 mai 1843. Dans ce Rapport, la partie du Mémoire qui est relative à l'influence qu'exerce sur la flexion des jeunes tiges du cresson alenois (*Lepidium sativum*) la lumière transmise par des verres colorés analysés par le prisme a été étudiée expérimentalement, mais l'influence qu'exercent sur cette même flexion les rayons colorés du spectre solaire y a été simplement relatée d'après l'assertion de M. Payer. Elle n'y a point été soumise à l'expérience. Or, comme la reproduction de cette assertion, par M. Payet, dans son Mémoire qui est le sujet du présent Rapport, la soumet à notre examen, nous en profiterons pour étudier simultanément l'influence des rayons colorés du spectre solaire sur la flexion des tiges et sur celle des racines. On sent d'ailleurs que l'étude de ces deux phénomènes doit nécessairement être simultanée.

» Le premier qui ait étudié l'action de certains rayons du spectre solaire sur la direction ou la flexion des tiges, est le docteur Poggiohi, dont le travail a été publié dans les *Opusculs scientifiques de Bologne* (tome I, page 9) Ce physicien soumit aux rayons rouges et aux rayons violets du spectre solaire des plantules de *Raphanus rusticus* et de *Brassica oleracea viridis*, dans les premiers temps qui avaient suivi la germination Il vit ces jeunes plantes diriger la face supérieure de leurs feuilles vers le prisme, c'est-à-dire vers la lumière violette d'une part, et vers la lumière rouge d'une autre part, ce qui attestait la flexion des tiges vers ces mêmes lumières Il estima que l'énergie de l'influence exercée sur ces plantes par les rayons violets était à celle des rayons rouges comme trois est à un Il a restreint ses expériences à l'emploi des deux rayons extrêmes du spectre solaire, parce que, pourvu d'héliostat, il était réduit à déplacer à la main les vases qui contenaient ses plantes pour suivre le spectre dans son déplacement continu

» Depuis le docteur Poggiohi, dont le Mémoire a été publié en 1817, jusqu'au 26 décembre 1842, qu'a été présenté à l'Académie des Sciences le Mémoire de M. Payer, aucun travail n'a paru ayant pour objet l'étude de l'influence des rayons colorés du spectre solaire sur la flexion des tiges Dans ce Mémoire M. Payer pose en fait que les rayons bleus et violets du spectre ont seuls le pouvoir de faire fléchir vers eux les tiges végétales, que les rayons bleus sont, à cet égard, plus puissants que les rayons violets, que soumises à tous les autres rayons du spectre solaire, les plantes se conduisent comme dans l'obscurité complète, c'est-à-dire qu'elles ne se courbent jamais

Depuis ce temps, le docteur Gardner, de New-York, a fait paraître, dans le numéro de janvier 1844 du *London, Edinburgh and Dublin Philosophical Magazine*, un Mémoire fort important sur ce même sujet Un extrait de ce Mémoire a été inséré au numéro de février 1844 de la *Bibliothèque universelle de Genève*

En soumettant un semis de turneps au spectre solaire fixe par un héliostat, le docteur Gardner a vu que ces jeunes tiges tendent à se courber dans deux sens différents 1° elles tendent à se courber vers le prisme ou vers la lumière, et cela sous l'influence de tous les rayons colorés du spectre solaire, 2° elles tendent à se courber vers l'espace qui est éclairé par les rayons indigo, en sorte que les plantes éclairées par les rayons rouges, oranges, jaunes, verts et bleus, d'une part, s'inclinent vers l'espace éclairé par les rayons indigo, tandis que, d'une autre part, les plantes éclairées par les rayons violets s'inclinent vers ce même espace éclairé par les rayons indigo Dans cette expé-

rience, le semis prend ainsi l'apparence d'un champ de blé couché par deux vents opposés. Les plantes éclairées par les rayons indigo n'offrent qu'une seule de ces deux tendances à la flexion, celle qui les dirige vers le prisme ou vers la lumière, les plantes éclairées par tous les autres rayons colorés du spectre solaire étant soumises à deux tendances à la flexion dans deux sens dont la direction se croise à angle droit, suivent la résultante, leur inclinaison latérale, ou suivant le sens de la longueur disposée horizontalement du spectre solaire, diminue à mesure que les plantes sont plus rapprochées de l'indigo. La raie indigo de Fraunhofer (le docteur Gardner ne la désigne pas autrement) sert de centre ou l'axe vers lequel tendent de part et d'autre les tiges infléchies. Le docteur Gardner conclut de ces expériences que la force qui produit l'inflexion des tiges selon la longueur du spectre solaire réside dans le rayon indigo. Pour ces expériences, les plantes étioles sont préférables aux plantes vertes, elles sont beaucoup plus faciles à fléchir, il ne faut qu'une à deux heures pour que ces phénomènes se manifestent, on les observe également en se servant de la lumière de la lune.

« D'après ces expériences, la propriété d'opérer la flexion des tiges végétales vers la lumière, propriété que M. Payer n'accorde qu'aux rayons bleus et violets du spectre solaire, se trouvait appartenir à tous les rayons colorés de ce spectre, mais le docteur Gardner n'a pas tenu compte de l'influence qu'exerce sur la flexion des tiges la lumière diffuse qui accompagne toujours le spectre solaire, quant au fait de la flexion des tiges végétales dans le sens de la longueur disposée horizontalement du spectre solaire, et en sens inverse de chaque côté de l'espace éclairé par les rayons indigo, il a échappé complètement à M. Payer.

« Ces curieuses expériences méritaient d'être répétées et nous nous sommes empressés de le faire. Pour cet effet, nous avons fait faire des vases de verre ou petites cuves de la forme d'un parallélépipède, longues de 50 millimètres, larges de 30 millimètres, profondes de 50 millimètres, et formées avec des lames d'un verre bien plan, assemblées avec de la glu marine. Ces vases étant remplis d'eau, on mettait sur la surface de celle-ci des lames de liège très minces, lesquelles étaient percées chacune de dix petits trous dans chacun desquels on plaçait la radicule naissante d'une graine de moutarde blanche. Nous avons choisi cette plante comme étant celle dont les jeunes tiges, et surtout les jeunes racines, nous ont paru posséder au degré le plus convenable, nous ne disons pas le plus grand, la faculté d'obéir aux diverses tendances à la flexion sous l'influence de la lumière. Les jeunes tiges de pavot, par exemple, se fléchissent avec trop de facilité vers la lumière pour

pouvoir offrir convenablement le second phénomène de flexion qui a été découvert par le docteur Gaidner

Suivant la recommandation du docteur Gaidner, nous avons constamment fait développer nos petites plantes à une très faible lumière venant de haut en bas, afin, d'une part, de leur donner un commencement d'étiollement qui les rend plus sensibles à l'action fléchissante de la lumière, et d'une autre part, afin de leur conserver la position verticale. Voici comment nous avons procédé pour les soumettre à l'influence des rayons colorés du spectre solaire.

Nous nous sommes servis de l'héliostat inventé par M. Silbermann et exécuté par M. Soleil. Nous devons dire ici que nous avons eu extrêmement à nous louer de l'usage de cet héliostat, dont l'inventeur a rendu un véritable service aux physiiciens, en leur procurant un instrument de cette nature à la fois simple et exact en même temps qu'il est peu coûteux.

Le rayon solaire était transmis au prisme par une ouverture ordinairement allongée dans le sens vertical, et d'une largeur variable.

» Le prisme employé était du plus pur flint-glass.

Le spectre était toujours produit par le minimum de déviation.

» Le rayon solaire étant reçu sur le prisme placé dans une situation verticale, le spectre se trouvait placé horizontalement dans le sens de sa longueur. C'est dans ce spectre horizontal que nous plaçons la série de nos vases dans lesquels étaient nos plantules, et cela lorsque leurs tiges avaient acquis une longueur de 20 à 40 millimètres. En deçà ou au delà de cette longueur, elles étaient peu propres aux expériences.

Les plantes étaient placées à 6^m 5 du prisme. A cette distance le spectre solaire horizontal avait environ 25 centimètres de longueur.

Nous plaçons des vases munis de leurs plantes au delà et de chaque côté des deux extrémités du spectre solaire, mais surtout du côté du violet, parce que c'est de ce côté que nous avons observé, que se prolongeait spécialement au delà du spectre solaire l'action qui fléchissait vers le prisme les tiges végétales. Voici les résultats que nous avons obtenus dans nos nombreuses expériences toutes faites par des températures de + 15 à 22 degrés centésimaux.

Le premier mouvement que l'on observe dans les tiges végétales est celui de leur flexion vers le prisme, c'est à-dire vers la lumière, ce mouvement de flexion a toujours commencé à se manifester dans les tiges soumises aux rayons violets, nous n'avons jamais observé d'exception à cet égard. Le mouvement de flexion vers le prisme se montre ensuite dans les tiges soumises

aux rayons indigo et bleus, et ordinairement en meme temps dans les rayons lavande qui forment la continuation presque invisible du spectre au dela du violet. On voit ensuite les tiges situees dans les rayons jaunes et verts se flechir, puis vient la flexion dans les rayons orangés. Les tiges situées dans les rayons rouges se fléchissent les dernières. Pendant ce temps, la flexion des tiges situees au delà du violet se manifeste jusqu'à une distance qui, selon l'intensité de la lumière, va jusqu'à 20 et meme quelquefois jusqu'à 30 centimetres au delà de la limite du violet. Ce n'est que dans les cas ou le faisceau lumineux tombant sur le prisme a une grande intensité, qu'on observe la flexion des tiges situees au delà des rayons rouges, et celle jusqu'à une distance qui, au maximum, s'étend jusqu'à 10 centimetres au dela de ces rayons. Ainsi la flexion des tiges vers le prisme ou vers la lumière, s'étend fort peu au dela des rayons rouges, tandis qu'elle s'étend fort loin au dela des rayons violets.

Lorsque l'intensité lumineuse des rayons solaires qui tombent sur le prisme est affaiblie soit par la grande exiguité de l'ouverture du porte lumière, soit parce que l'atmosphère a notablement perdu de sa transparence, alors la flexion des tiges vers le prisme flexion qui commence toujours dans les rayons violets, ne s'étend plus aussi loin de part et d'autre de ces rayons. Ainsi nous avons vu, dans plusieurs de ces cas, cette flexion vers le prisme ne pas attendre les tiges éclairées par les rayons oranges et rouges et ne s'étendre que peu au delà de l'extrémité violette du spectre. Nous avons vu, dans les cas de grand affaiblissement de l'intensité lumineuse du spectre la flexion des tiges, commençant toujours dans les rayons violets, ne s'étendre d'une part, dans le spectre, que dans les rayons indigo et dans une partie des rayons bleus, et, d'une autre part, dans les rayons lavande. C'est très-probablement pour n'avoir expérimenté qu'avec des spectres produits par des faisceaux de rayons solaires extrêmement exigus, et, par conséquent, pourvus de très-peu d'intensité lumineuse, que M. Payot a vu la flexion des tiges ne s'opérer que dans les rayons violets, indigo et bleus.

Nous avons jusqu'ici laissé de côté le phénomène de la flexion latérale des tiges, decouvert par le docteur Gardner, phénomène qui ne commence à se manifester qu'une demi-heure ou meme une heure apres la manifestation de la flexion des tiges vers le prisme dans les rayons violets. Cette flexion latérale, ou selon la direction de la longueur du spectre solaire commence toujours par les tiges situées dans les rayons jaunes, et elle y precede meme souvent la flexion vers le prisme ou vers la lumière. Alors on voit ces tiges se fléchir exclusivement du côté de l'espace éclairé par les rayons verts; un peu

plus tard, lorsque la tendance à la flexion vers le prisme se manifeste dans les tiges situées dans les rayons jaunes, elles cessent d'être fléchies exclusivement selon la direction de la longueur du spectre solaire, elles suivent obliquement la résultante des deux tendances rectangulaires qui les sollicitent à la flexion. Les tiges situées dans les rayons oranges et dans les rayons verts voisins des jaunes ne tardent pas à prendre cette même flexion latérale oblique, elle se manifeste ensuite sur les tiges situées dans les rayons rouges, puis en dernier lieu dans le reste des rayons verts, et dans les rayons bleus qui les avoisinent. Dans les rayons indigo, les tiges demeurent exclusivement fléchies vers le prisme. Ce n'est qu'environ une heure après que les tiges situées dans les rayons jaunes ont commencé à se fléchir latéralement, que les tiges situées dans les rayons violets, depuis longtemps fléchies vers le prisme, commencent à prendre une flexion latérale qui est en sens inverse de celle que possèdent déjà toutes les tiges situées dans les rayons rouges, oranges, jaunes, verts et bleus, elles se fléchissent alors obliquement vers les tiges situées dans les rayons indigo, tiges qui conservent invariablement leur flexion vers le prisme. Nous n'avons jamais vu les tiges situées dans les rayons lavande offrir cette flexion latérale, qui cependant y a été observée par le docteur Gardner. Ainsi, ce sont les rayons indigo qui sont le centre vers lequel tend de part et d'autre la flexion latérale des tiges soumises au spectre solaire.

» Bien que ce soit l'espace éclairé par les rayons indigo que l'on doit considérer comme le centre naturel de la double flexion latérale des tiges végétales qui sont soumises au spectre solaire, il arrive cependant quelquefois que ce centre se trouve placé ailleurs. Ainsi il nous est arrivé une fois de voir ce centre placé au milieu du violet, alors les tiges qui se trouvaient placées dans la moitié des rayons violets voisine des rayons indigo, les tiges placées dans ces rayons indigo eux-mêmes, et dans tous les autres rayons colorés jusqu'à l'extrémité rouge du spectre solaire, les tiges, dis-je, étaient toutes fléchies latéralement du côté de l'extrémité violette du spectre, tandis que les tiges qui étaient situées dans les rayons violets extrêmes étaient latéralement fléchies en sens contraire. Une autre fois nous avons observé que la flexion latérale des tiges se rapportait à deux centres l'un faiblement marqué, situé, comme précédemment, dans le milieu des rayons violets, l'autre, très-fortement marqué, situé dans le milieu des rayons verts. Nous devons dire que, dans cette dernière expérience, nous avons fait tomber sur le prisme un très-gros faisceau de rayons solaires, il était transmis par une ouverture circulaire de 12 millimètres de diamètre. Dans tous les cas où nous avons transmis la

lumière au prisme par une ouverture allongée verticalement, et dont la largeur n'excédait pas 3 à 4 millimètres, nous avons toujours observé le centre de la flexion latérale des tiges dans l'espace éclairé par les rayons indigo, ainsi que l'a annoncé le docteur Gardner

Il résulte de ces expériences que les tiges végétales soumises aux rayons colorés du spectre solaire subissent l'influence de deux causes différentes de flexion l'une, qui tend à les fléchir vers le prisme ou vers la lumière, et qui s'étend aux tiges placées sur la prolongation du spectre, surtout du côté de son extrémité violette, l'autre, qui tend à les fléchir dans le sens de la longueur du spectre, et cela dans deux sens opposés, en sorte qu'il y a un centre de convergence le plus souvent occupant tout l'espace qui est éclairé par les rayons indigo. Ainsi ce centre n'est pas un point, ni une raie du spectre comme le dit le docteur Gardner. Jamais nous n'avons vu cette flexion latérale dépasser les rayons violets d'une part, et les rayons rouges d'une autre part, elle ne se manifestait point du tout lorsque l'intensité lumineuse était faible.

Ce ne sont pas les seuls rayons colorés du spectre solaire qui agissent sur les plantes dans ces expériences, ils sont accompagnés par une quantité assez notable de lumière diffuse blanche. Cette lumière, qui agit nécessairement sur la flexion des tiges vers le prisme, mais qui paraît ne point devoir influencer la flexion latérale de ces tiges, a deux origines : 1° elle dérive de la réflexion de la lumière solaire par l'atmosphère, surtout autour du disque du soleil ; 2° elle provient de la lumière réfléchie à l'état de diffusion par la matière même du prisme dont la diaphanéité ne peut être parfaite. C'est cette lumière qui rend le prisme visible de tous côtés. Il est impossible de supprimer cette dernière source de lumière diffuse qui se mêle à celle du spectre solaire, mais la première de ces sources peut facilement être éliminée, on peut faire qu'il n'arrive sur le prisme que la lumière qui émane directement du soleil, pour cet effet, il ne s'agit que d'établir, entre le prisme et l'ouverture du porte lumière, un diaphragme dont l'ouverture soit de grandeur telle qu'elle ne transmette que la seule image solaire, et même pas cette image tout entière. De cette manière, le prisme placé près du diaphragme ne reçoit que la seule lumière du soleil, la lumière réfléchie par l'atmosphère est complètement éliminée. Mais, en opérant ainsi, on n'est jamais parfaitement certain d'opérer complètement l'élimination de la lumière réfléchie par l'atmosphère, on n'a point de preuves à cet égard, ce qui fait qu'on est forcé de rendre l'ouverture du diaphragme fort petite, afin qu'il devienne extrêmement probable que deux lignes tirées de son milieu à deux points opposés de

la conférence du soleil forment un angle de moins de 30 minutes, auquel cas il sera certain que l'ouverture du diaphragme ne recevra que la seule lumière solaire. Dans l'impossibilité d'établir ici une mesure exacte, on procède par approximation et plutôt que de s'exposer à employer une ouverture du diaphragme trop grande, on préfère l'employer avec excès de petitesse. La pureté du spectre en est plus grande, mais il a très-peu d'intensité lumineuse, il est par conséquent peu propre aux expériences dont il est ici question. Il faudrait donc pouvoir donner au spectre la plus grande intensité lumineuse possible en lui conservant la même pureté. Voici comment nous y sommes parvenus : nous avons pris l'image solaire à 7 mètres de distance de l'entrée du faisceau de rayons un peu divergents qui formaient cette image, dont le diamètre était de 8 centimètres ; nous y avons placé un diaphragme dont l'ouverture circulaire était un peu moins grande que ne l'était le diamètre de l'image solaire, en sorte qu'il fût bien certain que cette ouverture ne laissait passer que les seuls rayons solaires. A la suite de ce diaphragme, fut placée une lentille convergente qui recevant tous les rayons solaires que transmettait l'ouverture du diaphragme, les fit converger en un point déterminé. Un peu avant que ce point fût atteint par les rayons solaires convergents nous les rendîmes à peu près parallèles en leur faisant traverser une lentille divergente. Nous eûmes ainsi, d'une manière certaine, la majeure partie des rayons solaires introduits par le point lumière rassemblés parallèlement en un petit faisceau, sans aucun mélange de lumière réfléchie par l'atmosphère. Ce faisceau de rayons, au sortir de la lentille divergente, tombait sur le prisme, et il en résulta un spectre solaire aussi pur qu'il est possible de l'obtenir et possédant une grande intensité lumineuse. On y voyait très-bien les raies de Fraunhofer. La seule lumière diffuse qui fût mêlée à ces rayons colorés était celle que le prisme, vivement éclairé, réfléchissait de toutes parts.

Les tiges végétales soumises à l'influence de ce spectre nous montrèrent tous les phénomènes de flexion que nous avions observés précédemment en employant des spectres qui n'étaient point purgés de la lumière diffuse réfléchie par l'atmosphère, nous vîmes ces tiges opérer leur flexion dans ses deux modes, l'un direct ou vers la lumière, l'autre latéral ou selon la longueur du spectre.

De ce qu'il est impossible que le spectre solaire ne soit pas accompagné par de la lumière blanche diffuse, il résulte qu'au dehors de ce spectre, cette lumière diffuse doit opérer la flexion des tiges végétales. C'est effectivement ce que nous avons observé en plaçant des vases garnis de leurs plantules à des

bruteurs diverses au-dessus et au-dessous du spectre solaire horizontal. Nous avons vu, dans ce cas, les tiges se fléchir vers le prisme, c'est à-dire vers la lumière, et cela même lorsque la lumière réfléchie par l'atmosphère et illuminée la lumière réfléchie par le prisme suffisait pour produire cet effet. Mais, comme on le pense bien, nous n'avons jamais observé dans ce cas de flexion latérale.

Quelle est la cause de la flexion latérale des tiges dans les expériences dont il est ici question ? Ce qui y a de plus simple à supposer est ce qui est admis implicitement par le docteur Girardin, qui, en disant que, lors de leur flexion latérale, les tiges sont fléchies vers les rayons indigo, veut dire que leur flexion est dirigée vers le lieu où ces rayons indigo sont réfléchis par les corps qui sont éclairés par cette partie du spectre. C'est par suite de la même idée qu'il regarde l'ascension verticale des tiges comme produite par l'attraction qu'elles ont à se diriger vers les rayons bleus qui sont réfléchis de toutes parts par l'atmosphère. Cette explication paraît aussi naturelle qu'elle est simple, et cependant elle est bien loin de rendre raison de tous les phénomènes que présente cette flexion latérale.

La flexion des tiges vers le prisme ou vers la lumière dépend à la fois de l'action spéciale des rayons colorés du spectre et de l'action de la lumière diffuse qui accompagne nécessairement le spectre. Il n'est pas douteux que les rayons violets indigo et bleus aient ici une action spéciale à laquelle s'ajoute l'action de la lumière diffuse, mais en est-il de même par rapport aux autres rayons colorés du spectre ? Par exemple, la flexion des tiges vers le prisme, lorsqu'elles sont éclairées par les rayons rouges, est-elle en partie un résultat de l'action de ces rayons, ou doit-elle être attribuée à la seule lumière diffuse dont il est impossible de priver le spectre ? Il n'y avait qu'un seul moyen de résoudre cette question, et nous l'avons mis en usage.

Nous avons pris un verre rouge qui, recevant un rayon solaire, ne transmettait que des rayons rouges. Nous l'avons analysé avec le plus grand soin par le prisme, pour nous assurer de ce fait. Des jeunes tiges de moutarde blanche, placées derrière ce verre qui recevait la lumière solaire, se courbaient vers la lumière rouge pure qu'il transmettait. Pour avoir, s'il était possible, encore plus de certitude relativement à ce fait, nous fîmes tomber sur un prisme un faisceau de rayons rouges que transmettait ce verre éclairé par la lumière solaire réfléchie sur lui par le miroir de l'héliostat. Si ce faisceau lumineux eût contenu des rayons autres que des rayons rouges, et qui eussent été capables d'opérer la flexion des tiges tout en étant trop faibles pour

être sensibles à l'œil, ces rayons, plus réfrangibles que les rouges, en auraient été séparés par le prisme, en sorte que ces derniers seraient demeurés parfaitement purs. Le fait est que, dans cette expérience, il n'y eut pas la plus légère apparence de spectre solaire : on vit seulement une aire circulaire rouge. Des jeunes tiges de moutarde blanche, placées dans cette aire de lumière rouge pure, se courbaient vers le prisme ou vers la lumière rouge les premières au bout d'une heure, et les dernières au bout de deux heures et demie. Ce qu'il y eut de très remarquable, c'est qu'il y eut ici une flexion générale latérale vers l'espace qui, dans l'état ordinaire, aurait dû être occupé par les autres rayons colorés du spectre, desquels pas un n'existait. Deux expériences semblables nous ont offert les mêmes résultats. Ainsi les rayons rouges purs ont le pouvoir de produire la flexion des tiges végétales vers eux, et, lorsqu'ils ont traversé un prisme, on voit, sous leur influence, les tiges présenter en outre une flexion *latérale* qui, par sa combinaison avec la flexion *directe* vers la lumière rouge, donne lieu à une flexion suivant la résultante de ces deux tendances. Nous ferons remarquer que l'aire circulaire, formée par la lumière rouge foncée et pure qui, transmise par notre verre rouge, avait traversé le prisme, offrait peut-être une teinte un peu moins foncée, au côté de cette aire où devaient se trouver les rayons rouges les plus réfrangibles, qu'au côté opposé où devaient se trouver les rayons rouges les moins réfrangibles. Nous devons ajouter qu'il y avait auprès de l'aire circulaire rouge et du côté où, dans l'état ordinaire, auraient dû se trouver les autres rayons colorés du spectre, des tiges semblables à celles qui étaient dans cette aire circulaire rouge, et qu'elles n'offraient pas la plus légère inflexion.

Il nous restait à examiner l'action du spectre solaire sur les racines. Nous avons dit que nos jeunes plantes de moutarde blanche étaient plantées dans des trous fort petits, faits à des lames minces de liège qui flottaient sur l'eau qui remplissait des vases de verre à côtés parallèles. Les racines de la moutarde blanche fuient la lumière, ainsi que l'a fait voir M. Payen. Nous pouvions donc expérimenter si ce phénomène aurait lieu sous l'influence des rayons colorés du spectre solaire, ainsi que l'a annoncé le même observateur. Nous plaçâmes donc dans ce spectre, et sur sa prolongation des deux côtés, des vases dans lesquels se développaient les racines de jeunes moutardes blanches. La longueur de ces racines était de 20 à 24 millimètres, elle n'atteignant pas tout à fait la moitié de la profondeur des vases. Cette expérience fut établie à 9^h 40^m du matin, et par une température de + 17 degrés cen-

tésimaux; à 12^h 30^m nous observâmes, dans les rayons violets seulement, une flexion en arrière et en crochet de la pointe des racines; elles fuyaient la lumière violette. A 12^h 45^m cette même flexion en arrière ou en fuite de la lumière s'observait, mais moins forte, dans l'indigo et le bleu, et de plus de l'autre côté du violet, dans les rayons lavande. Ainsi le maximum de fuite de la lumière se trouvait dans les rayons violets: c'était là que se trouvait l'initiative de cette flexion, ainsi qu'avait lieu, pour les tiges, l'initiative de la flexion vers la lumière. La fuite de la lumière, toujours par la pointe des racines, se manifesta, pendant les heures suivantes, dans tous les autres rayons colorés du spectre solaire. Ce ne fut qu'à 4 heures, c'est-à-dire 6^h 20^m après le commencement de l'expérience, que nous observâmes premièrement dans les rayons jaunes, et ensuite dans les rayons orangés et dans ceux des rayons verts qui étaient voisins des jaunes, une flexion latérale de la pointe des racines, flexion dirigée vers l'espace éclairé par les rayons rouges. Cette flexion se combinant avec celle de fuite de la lumière qui la croisait à angle droit, il en résultait que les pointes des racines étaient courbées en crochet suivant la résultante de ces deux tendances.

» A 5 heures, cette même flexion latérale s'observa dans les rayons verts voisins des rayons bleus, et dans ces rayons bleus eux-mêmes; mais elle était très-faible. Dans les rayons indigo et violets, la flexion latérale ne se manifesta point; les pointes des racines demeurèrent invariablement dans leur direction de fuite de la lumière; il n'y eut point de flexion latérale des racines dans les rayons rouges. Le corps des racines ne changea nulle part de position, leurs pointes seulement, dans l'étendue de 3 à 4 millimètres, se courbèrent en crochet. Or, c'était la longueur dont elles s'étaient accrues pendant le temps assez long de l'expérience, en sorte qu'il nous fut démontré que cette double flexion s'était opérée dans la partie récemment produite par l'allongement des racines, allongement qui, comme on le sait, n'a lieu que dans les spongioles.

» Nous soumîmes, le lendemain, à la même expérience les mêmes racines qui avaient conservé leur courbure acquise la veille. Nous dirigeâmes vers la lumière les pointes de leurs spongioles en retournant les vases. Ces racines s'étaient allongées pendant la nuit. Exposées à l'influence des rayons colorés du spectre, elles conservèrent leur courbure en crochet acquise la veille, et elles en formèrent une autre en fuite de la lumière vers leur pointe. Cette flexion commença, comme la veille, dans les rayons violets, et s'étendit dans les rayons indigo et lavande. L'absence du soleil interrompit l'expérience.

* Dans une troisième expérience, nous observons les mêmes phénomènes.

Ainsi la fuite de la lumière par les racines commence dans les rayons violets et leur flexion latérale commence dans les rayons jaunes, comme chez le fucus pour la flexion des tiges vers la lumière et pour leur flexion latérale. Seulement tous les mouvements dans les racines sont inverses de ceux des tiges : ainsi, chez les tiges, il y a flexion vers la lumière et flexion vers l'espace éclairé par les rayons indigo, tandis que chez les racines, il y a flexion pour fuir la lumière et flexion pour fuir l'espace éclairé par les rayons indigo. Toutefois, d'après les expériences ci-dessus exposées, on voit que ce dernier mode de flexion ne se présente à nous dans les racines soumises aux rayons rouges ni dans celles qui étaient dans les rayons violets, et cela fort probablement parce que dans ces deux rayons, la tendance à la flexion, dans le sens latéral, est au plus faible degré. Aussi avons nous vu que lorsque la lumière n'était pas suffisamment intense, la flexion latérale ne se manifestait pas non plus dans les tiges placées dans ces mêmes rayons rouges et violets.

M. Payet, ne reconnaissant le pouvoir de fléchir les tiges que dans les seuls rayons violets et bleus, assigne le maximum de force à cet égard aux rayons *bleus* (denomination sous laquelle il désigne sans doute, à la fois les rayons indigo et les rayons bleus), mais dans l'extrait de son *Mémoire* sur la tendance des racines à fuir la lumière, il s'exprime autrement : il se contente de dire que les tiges et les racines sont fléchies par une force qui, sans dépasser les raies F et H du spectre solaire, a son maximum dans divers points de cet espace suivant l'espèce des plantes. Or, les raies F et H de Fraunhofer comprennent tout l'espace occupé par les rayons violets, par les rayons indigo et par la presque totalité des rayons bleus. Le point où se trouve le maximum de la force fléchissante de la lumière colorée comprise dans cet espace reste donc ici dans le vague ou variable. Le docteur Gardner dit explicitement que la force qui dirige les mouvements des plantes vers la lumière a son maximum dans les rayons indigo. Nous accordons le maximum de cette force aux rayons violets fondés sur ce fait, qui ne nous a point offert d'exception, que c'est dans ces rayons que commence toujours à se manifester la flexion des tiges et des racines, et que, dans le principe, elle y est toujours plus profonde que dans les rayons indigo. Mais la force qui produit la flexion latérale venant, plus tard, à manifester son action dans les rayons violets, et cette force n'agissant point dans les rayons indigo, il en résulte que, dans ces derniers, la force qui fléchit les tiges vers le prisme, ou vers la lumière agit

sant seule, peut finir par combler les tiges vers la lumière plus profondément que cela n'a lieu dans les rayons violets, où l'existence concomitante de la tendance à la *flexion latérale* diminue nécessairement l'effet de la tendance à la *flexion directe* ou à la tendance vers la lumière. Voilà comment se trouve vraie, jusqu'à un certain point, l'assertion du docteur Gardner, qui place dans les *rayons indigo* le maximum de l'action par laquelle les tiges végétales sont flechies vers la lumière, et celle de M. Payer, qui a placé plus vaguement dans les *rayons bleus* le maximum de cette même action.

Toutes ces expériences ont été faites en employant un prisme de flint-glass, il était nécessaire de les répéter en employant des prismes faits avec d'autres substances. Dans deux expériences faites avec un prisme d'eau nous avons observé des phénomènes exactement semblables à ceux qui s'étaient présentés à nous en employant un prisme de flint-glass. C'est-à-dire, 1° flexion des tiges vers le prisme ou vers la lumière, flexion commençant dans les rayons violets et se montant ensuite dans les autres rayons colorés du spectre et au delà de ses limites bien plus du côté de son extrémité violette que du côté de son extrémité rouge. 2° flexion latérale des tiges vers l'espace occupé par les rayons indigo, commençant dans les rayons jaunes et se montant ensuite dans les rayons oranges, rouges, violets et bleus, et enfin flexion des tiges soumises à l'influence des rayons violets vers l'espace éclairé par les rayons indigo. Cet espace s'est donc encore ici trouvé le centre de convergence des deux flexions latérales opposées des tiges.

Nous avons enfin employé un prisme d'un aux mêmes expériences. Le spectre solaire produit par ce prisme était trop peu étalé pour qu'il fut possible de faire sur lui des observations bien exactes, et de plus, ce prisme n'était pas d'une transparence parfaite, ce à quoi nous attribuons de n'avoir point observé par son emploi la *flexion latérale des tiges*, leur flexion vers le prisme s'est seule offerte à nous, et ayant commencé, comme toujours, dans les rayons violets, elle s'est étendue de là aux tiges éclairées par tous les autres rayons colorés du spectre.

Conclusions

N'ayant pu prendre connaissance du Mémoire original de M. Payer, sur la tendance des racines à fuir la lumière, Mémoire qui, à ce qu'il paraît, a été égaré, ne le connaissant que par l'extrait qui en a été fait par l'auteur lui-même, et qui est imprimé dans le *Compte rendu* de la séance de l'Académie du 6 novembre 1843, nous ne pouvons faire porter nos conclusions que sur ce qui est contenu dans cet extrait.

Nous pensons que M Payer a rendu un service à la physiologie végétale en faisant connaître de nouvelles plantes dont les racines ont une tendance à fuir la lumière fait dont il n'y avait jusqu'ici qu'un seul exemple de connu, fait qui d'ailleurs n'est point général. Quant à l'influence exercée par les rayons colorés du spectre solaire sur la flexion des tiges et des racines, les expériences de M Payer offrent aussi de l'intérêt, bien qu'elles aient été faites dans des circonstances où toutes les particularités des phénomènes ne sont pas produites, ou n'ont pas été observées. Nous proposons à l'Académie de remercier M Payer de ses communications, et de l'engager à continuer ses recherches entreprises et suivies avec un zèle digne d'éloges.

Les conclusions de ce Rapport sont adoptées

MEMOIRES PRESENTES

GÉOLOGIE — *Sur les roches dioritiques de la France occidentale, c'est à dire sur les roches d'épanchement qui appartiennent aux terrains du groupe carbonique (terrain du vieux grès rouge et terrains carbonifères)* par M A RIVIERE (Extrait par l'auteur)

• (Commissaires MM Cordier Éluc de Beaumont Dufrénoy)

Dans la première partie du Mémoire que j'ai l'honneur de soumettre au jugement de l'Académie, j'essaye de démontrer, à l'aide d'une discussion détaillée des caractères cristallographiques et chimiques, que toutes les amphiboles ne forment qu'une seule espèce minérale qui peut être représentée par la formule $\text{Al Si}^2 + 6 (\text{Ma, Fe, Ca, etc}) \text{Si}$. Cette formule a été fournie par la moyenne de 34 analyses, qui donne 46,75 pour la quantité d'oxygène.

Néanmoins, d'après la différence des analyses extrêmes, d'après la différence d'importance dans la nature, et peut-être d'après la différence des gisements, je divise les amphiboles en deux types quoiqu'en réalité le minéralogiste soit obligé de ne faire qu'une seule espèce, ces deux types géologiques sont la hornblende et la tremolite, types distincts quand on considère les amphiboles extrêmes et les roches amphiboliques sur une grande échelle, mais qui passent insensiblement de l'un à l'autre, principalement lorsque les amphiboles ne sont pas cristallisées comme l'entendent les minéralogistes, et lorsqu'elles sont mélangées ou impures, ce qui est le cas ordinaire.

• Le type hornblende est le seul dont le géologue doit s'occuper.

J'établis ensuite, en me fondant sur la composition, la cristallographie la différence de fusibilité, d'associations, etc, en un mot par les divers caractères minéralogiques et géologiques, une distinction entre les amphiboles et les pyroxènes, minéraux que M G Rose et d'autres savants ont essayé de réunir en une seule espèce ou en un seul type

Les roches amphiboliques, c'est-à-dire les roches dans la composition desquelles l'amphibole hornblende entre comme élément essentiel, me paraissent se diviser naturellement en deux groupes, tant sous le rapport de leurs constitutions minérales que sous le rapport de leurs gisements spéciaux et de leurs époques de formation. Le premier groupe comprend celles dans lesquelles l'amphibole du type hornblende est associée à du feldspath du type albite au contraire, le second groupe comprend les roches amphiboliques dans lesquelles l'amphibole du type hornblende est associée à du feldspath du type orthose. Le premier groupe est formé des roches dioritiques, et le second des roches syénitiques. Toutes les roches de ces deux groupes sont d'ailleurs d'origine ignée.

Les roches dioritiques peuvent être divisées, d'après leur composition minérale, en cinq espèces : l'amphibolite, le diorite, le eclogite, le kernan ton et l'hémitrène. Parmi ces cinq espèces, l'amphibolite et le diorite sont les plus abondantes, au reste, toutes les roches dioritiques se fondent les unes dans les autres, soit par leur composition, soit par leur gisement, soit enfin par leur âge, néanmoins dans chaque gisement particulier, on en voit ordinairement une qui domine, mais rarement elle se présente seule exclusivement. De sorte que, sous le point de vue géologique, il n'y a en réalité qu'une seule espèce de roches dioritiques. On peut donc prendre, d'après cela, le diorite pour type des roches dioritiques, car il est rare que dans ce groupe l'albite ne soit pas associée à la hornblende.

Dans la seconde partie de mon Mémoire, je donne la description géologique et minéralogique des roches dioritiques de la France occidentale. Voici les traits les plus saillants qui ressortent de cette partie de mon travail.

Les roches dioritiques jouent un grand rôle dans la géologie de la France occidentale, car le sol de cette contrée est percé par ces roches en un très grand nombre de points. On peut compter, en effet, plus de trois cents typhons, boutons ou filons de roches amphiboliques proprement dites ou dioritiques, mais depuis la Normandie jusque dans le haut Poitou, c'est principalement sur les côtes accidentées, et dans les pays montagneux, qu'elles se montrent, les plateaux, souvent très-élevés, qui séparent les bourrelets des côtes des régions culminantes et découpées, en sont généralement de

pouvait. Aussi le rôle important que les roches dioritiques ont joué lors de leur sortie est-il aujourd'hui exactement traduit par le relief de la contrée : elles ont porté à des hauteurs considérables certaines roches; elles ont déchiré l'ondule le sol, elles ont façonné de nombreux ravins, vallons et vallées, en donnant naissance à des sites extrêmement pittoresques, et qu'en miniature on peut comparer à ceux des pays alpins.

L'étendue apparente des typhons composés de roches dioritiques est ordinairement assez limitée, il y a même beaucoup de typhons qui se présentent comme de véritables boutons. Cependant, non-seulement un certain nombre de ces typhons se rattachent entre eux, selon toute probabilité, au-dessous du sol, c'est-à-dire que les roches dioritiques ont réellement plus d'étendue qu'elles n'en dévoilent, mais encore plusieurs typhons se montrent sur une échelle assez développée et beaucoup plus grande qu'on ne l'admet généralement pour ces sortes de roches d'épanchement.

Le relief le plus prononcé de la France occidentale, celui qui affecte toutes les roches depuis les plus anciennes jusqu'au terrain houiller inclusivement, est précisément celui qui est spécifique aux terrains du groupe carbonifère, c'est-à-dire celui qui a été produit par tous les déchirements, dont une des conséquences a été l'apparition de ce grand nombre de filons et de typhons de roches dioritiques qu'on trouve dans cette région de la France.

Tous les boutons ou filons de roches dioritiques de la France occidentale offrent entre eux un alignement ou un parallélisme constant, et tous les massifs ou typhons pris isolément ou bien dans leur ensemble, présentent, comme les filons, une allure générale qui est dirigée de l'est-sud-est un peu est à l'ouest-nord-ouest un peu ouest.

Les roches dioritiques sont toujours d'origine ignée, par conséquent elles ne sont jamais réellement stratifiées, l'apparence de stratification qu'elles présentent souvent, surtout à la surface, résulte constamment, soit de la décomposition de la roche, soit de la disposition des cristaux ou lamelles d'amphibole hornblende, dans un sens général, soit de fendillements, soit de l'extension horizontale ou inclinée d'un typhon, soit enfin d'une espèce de laminage qui a lieu entre des strates d'autres roches, au moment de la sortie des premières.

Les roches dioritiques ont traversé et disloqué tous les terrains, depuis les plus anciens jusqu'au terrain houiller inclusivement, c'est-à-dire que leur épanchement final a eu lieu immédiatement après le dépôt du terrain houiller, car elles ont disloqué tous ces terrains, et n'ont au contraire affecté aucun des terrains postérieurs au terrain houiller. Les roches dioritiques ont

ainsi terminé la série apparente des roches d'origine ignée de la France occidentale, ce sont donc les roches d'épanchement les plus modernes qui aient apparu dans cette partie de la France

Nulle part dans la France occidentale on n'aperçoit de terrains des groupes penninique et triasique, les roches dioritiques sont donc, pour ainsi dire, la cause de l'absence de ces terrains compris entre le terrain houiller et le lias les terres ayant été émergées et le sol façonné par la catastrophe qui a fait sortir les roches dioritiques des entrailles du globe

Il est probable que toutes les roches dioritiques ne sont pas sorties au même instant sur tous les points, quoique les époques de leur épanchement aient été géologiquement très-rapprochées les unes des autres. Dans tous les cas, ce qu'il y a de certain, c'est que, tout en admettant certains épanchements de roches dioritiques durant la formation des terrains du groupe carbonique et au commencement de celle des terrains pennéens, le grand épanchement ou la formation principale des roches dioritiques, et qu'on peut nommer *formation normale*, a eu lieu après le dépôt des couches du terrain houiller, dont elle a interrompu la formation, en terminant ainsi la série des terrains du groupe carbonique

Les terrains du groupe carbonique (terrain du vieux grès rouge, du calcaire carbonifère et houiller) ont non-seulement pris l'allure générale qui a été imprimée par la sortie des roches dioritiques, ou, pour mieux dire, par les cassures dont l'épanchement des roches dioritiques est la conséquence, mais encore ils ont affecté tous les accidents de contour des roches dioritiques, et par conséquent ont ainsi calqué leur allure sur celle des roches dioritiques

Dans la France occidentale, les roches dioritiques ont fait éprouver aux terrains antérieurs des modifications de deux genres, celles qui sont relatives à leurs allures, et celles qui sont relatives à la texture et à la composition de leurs roches

» Les roches dioritiques ont souvent fait subir de grandes modifications aux autres roches de leur voisinage, en donnant naissance à un changement de texture ou de composition, soit en introduisant différentes substances minérales ou en déterminant la formation de certains minéraux, soit en enlevant ou en substituant d'autres principes, mais toutes ces modifications ne s'étendent généralement qu'à une petite distance du contact des roches dioritiques

» Certains filons métalliques ou pierreux sont liés à l'apparition des roches dioritiques

» Enfin depuis leur sortie, les roches amphiboliques ont éprouvé elles-mêmes des modifications considérables par leur alteration et leur décomposition, ces modifications sont, toutes choses égales d'ailleurs, en raison de la quantité de protoxyde de fer et d'albite qu'elles renferment. Par l'action combinée de l'air et de l'eau, le protoxyde de fer passe à l'état de peroxyde hydraté et l'albite perd en grande partie son alcali .

PHYSIOLOGIE VÉGÉTALE — *Expériences relatives à l'action de l'iode sur les végétaux vivants, par M. ROBIN-MASSE (Extrait par l'auteur)*

Commissaires, MM. A. de Saint-Hilaire de Jussieu, Ad. Brongniart, Dutrochet, Payen)

Les travaux de MM. Meyer, Schleiden, Hugo Mohl, et surtout les belles recherches de M. Payen sur la composition élémentaire des tissus végétaux nous ont fait connaître, avec des détails et d'une manière qui laisse peu de choses à désirer, l'action chimique de l'iode sur la membrane cellulaire végétale. Mais quant à l'influence qu'exerce ce corps sur le développement des végétaux vivants, on ne l'a pas encore, ce me semble, suffisamment étudiée.

Les expériences auxquelles je me suis livré pour apprécier cette influence peuvent se ranger dans les six séries suivantes :

1° J'ai semé des graines dans l'iode, et je les ai arrosées d'eau distillée.

2° J'ai immergé d'autres graines dans de l'eau tenant de l'iode en dissolution, et je les ai semées après une immersion dont la durée a varié pour chaque espèce de graines.

3° J'ai semé dans de la terre végétale et dans du sable pur des graines que j'ai arrosées d'eau iodée,

4° J'ai semé d'autres graines dans les circonstances ordinaires, et lorsque les plantes qu'elles ont produites ont eu acquis un certain degré de développement, j'ai arrosé celles-ci d'eau iodée,

5° J'ai enlevé des rameaux à des plantes bien développées, et je les ai placées dans la même dissolution.

6° J'en ai fait enfin quelques expériences relatives à l'action de l'iode sur les espèces du genre *Lemna* et sur quelques espèces de la famille des algues.

» Je crois pouvoir conclure des résultats que j'ai obtenus :

» 1° Que les graines semées dans l'iode ne peuvent y germer, parce

qu'elles subissent, sous l'influence de ce milieu, une altération dans la composition de leurs tissus,

2° Que, lorsque l'iode en dissolution dans l'eau est mis en contact avec des graines, il conserve une manière d'agir analogue à celle qu'il possède à l'état solide toutefois, lorsqu'une graine n'est restée que peu de temps, vingt-quatre heures par exemple, immergée dans l'eau iodée, elle n'en germe pas moins, parce que l'action de l'iode ne s'est encore fait sentir qu'à la surface de la graine,

3° Que lorsque des graines, semées dans de la terre végétale ou du sable pur, sont arrosées d'eau iodée, presque toujours leur germination est en retard sur la germination des graines semées en même temps dans des sols analogues, et arrosées d'eau simple,

4° Qu'une fois la germination opérée et les jeunes individus produits au jour, ceux-ci restent constamment moins développés, plus chétifs que les individus de même espèce produits par des graines arrosées d'eau ordinaire;

5° Que l'iode n'est pas moins funeste aux rameaux détachés des plantes et placés dans sa solution aqueuse, qu'il ne l'est aux graines et aux végétaux complets soumis à son influence,

6° Que l'iode n'agit pas seulement en se combinant avec la cellulose qui compose les parties avec lesquelles il se trouve immédiatement mis en contact, mais qu'il est absorbé et porté au loin, soit à l'état libre, soit après être entré dans quelque combinaison formée aux dépens des tissus qu'il traverse et de quelques-unes des matières que ceux-ci contiennent, car l'analyse en constate la présence dans la tige et dans les feuilles

Dans les expériences que j'ai faites sur les espèces du genre *Lemna*, les *Lemna minor* et *gibba* placés sur de l'eau saturée d'iode ont perdu graduellement leur couleur verte, et les grains verts, contenus dans les cellules tant de la superficie que de l'épaisseur de la feuille, ont pris une couleur bleue très prononcée. Les *Lemna polyrrhiza* et *tricuspa* ne m'ont offert aucune coloration bleue, la face inférieure des *Lemna polyrrhiza* a perdu sa couleur violette qui s'est trouvée remplacée par une teinte bistre foncé, et tout ce qui est vert dans ces deux espèces a pris une teinte fauve

Sur des conferves placées sur la solution aqueuse d'iode, j'ai vu les granules verts qui remplissaient les articles, prendre une coloration bleue très-intense

Sur des filaments de *Zygnema elongatum* placés dans la même circonstance, la matière en spirale a perdu sa couleur verte pour revêtir une teinte

brune, les granules hyalins ont pris une couleur bleue très-foncée, sur des filaments de *Zygnema pectinatum*, le centre de chaque étoile offrait un noyau bleu, la matière qui formait le reste des étoiles a pris une teinte ayant à la fois quelque chose de brun et de vert fané

Les naturalistes ne s'accordant pas jusqu'à présent sur la nature de certains êtres organisés que les uns placent parmi les végétaux, tandis que les autres les regardent comme appartenant au règne animal, je me suis, depuis longtemps, demandé si l'iodo ne serait pas, pour ainsi parler, une pierre de touche propre à décider cette question si controversée. Tous ces petits êtres, dont il colorerait quelques parties en bleu, devraient alors être classés parmi les végétaux, tous ceux chez lesquels il ne produirait aucune coloration bleue devraient être regardés comme appartenant au règne animal

J'ai soumis à cette épreuve des *Arthrodesmus* (Ehrenberg) et des *Oscillaria*, les premiers sont bien évidemment devenus bleus, la couleur des *Oscillaria* n'a subi aucune modification. Les premiers seraient des végétaux, les seconds devraient rester dans le règne animal où la plupart des naturalistes s'accordent à les placer aujourd'hui

ZOOLOGIE — *Catalogue raisonné des mammifères et des oiseaux rapportés d' Abyssinie par MM. Galinier et Ferret, et description de quelques espèces nouvelles faisant partie de cette collection, par M. Guérin-Ménéville*

(Commission précédemment nommée pour l'examen des résultats scientifiques du voyage de MM. Galinier et Ferret)

Dans cette collection, qui se compose de quatorze espèces de mammifères et de près de deux cents espèces d'oiseaux, M. Guérin annonce avoir reconnu comme nouveaux un mammifère du genre *Mangouste* et quinze oiseaux appartenant à quatorze genres différents

MM. Galinier et Ferret, dit M. Guérin-Ménéville, ont pris de nombreuses notes sur les animaux qu'ils ont rapportés, et ces notes pourront servir à compléter l'histoire de ceux qui ont été décrits avant eux. Ainsi, pour les oiseaux, ils font connaître leurs mœurs, l'époque de leur nidification, de leur arrivée dans le pays et de leur départ, s'ils sont de passage, la couleur des diverses parties nues de leur tête, de leurs yeux, de leurs pattes, les pays qu'ils portent dans le pays, etc., etc., renseignements très-nécessaires aux zoologistes et pour la plupart nouveaux pour la science

Le pays parcouru par MM. Galinier et Ferret étant très-montagneux et offrant depuis les vallées chaudes jusqu'au sommet des montagnes couvertes

de neige, toutes les variations de température, la physionomie de ses productions zoologiques est en rapport avec cette constitution physique. Ainsi dans la collection de ces voyageurs, on reconnaît, à côté des oiseaux des parties les plus chaudes de l'ancien continent, telles que le Sénégal, le cap de Bonne-Espérance, etc., des espèces propres à des pays plus tempérés, comme l'Algérie, le Portugal et l'Espagne, et même des oiseaux qui habitent les parties froides de l'Europe, des Alpes et de la Suède ».

Le manuscrit présente aujourd'hui par MM. Galinier et Feiret est accompagné de seize dessins représentant les mammifères et oiseaux nouveaux décrits dans ce travail.

M. POGGIALE adresse un deuxième *Mémoire sur la solubilité des sels*.

Dans ce travail qui fait suite à celui qu'il avait précédemment soumis au jugement de l'Académie (séance du 26 juin 1843), l'auteur donne les résultats de ses expériences sur trente huit sels différents. Le procédé qu'il a généralement suivi est celui auquel M. Gay-Lussac avait eu recours quand il s'était occupé de la même question. Il a fallu d'ailleurs le modifier pour le cas des sels volatils, et, pour ceux qui se décomposent à une température élevée, il a été nécessaire de recourir à une méthode différente.

Des différents sels que l'auteur a eu cette fois l'occasion d'étudier sous le rapport que nous venons d'indiquer, le sulfate de baryte est le seul qui ait présenté la même solubilité à toutes les températures, presque tous les autres se sont montrés beaucoup plus solubles à chaud qu'à froid.

Les sels qui sont peu solubles par l'eau et par le calorique, comme le sulfate de chaux, ont donné, dit M. Poggiale, à peu près les mêmes nombres de solubilité de 0 à 100 degrés. Ceux, au contraire, qui, comme l'alun et le borate de soude, sont très-solubles par le calorique et peu solubles par l'eau, ont une solubilité beaucoup plus grande à chaud qu'à froid. L'auteur avait fait cette observation.

Si l'on compare les lignes de solubilité des cinquante-trois sels étudiés par M. Gay-Lussac et par moi, on arrive aux résultats suivants : la solubilité de quinze sels peut être représentée par une ligne droite, c'est à dire qu'elle est proportionnelle à la température, je citerai, par exemple, le chlorure de baryum, le sulfate de potasse, le bicarbonate de soude, le cyanure jaune de potassium et de fer, le citrate de chaux, la baryte, etc.

La solubilité de trente huit sels ne suit pas la même progression que la température, et forme, par conséquent, une ligne courbe. Le chlorure de sodium, le sulfate de soude, le nitrate de potasse, le borate de soude, le bi-

chlorure de mercure lemetique, l'iodure de potassium, le chlorure de calcium, le bioxalate de potasse, etc., appartiennent à cette division. Je ferai observer, en outre, que chaque ligne a une marche particulière et en quelque sorte indépendante.

Les lignes de solubilité du carbonate de soude et de l'azotate de cuivre ont remarquables en ce qu'elles sont concaves vers l'axe des abscisses.

Celle de la potasse du commerce et du foie de soufre est courbe et irrégulière, parce que ces produits sont formés de plusieurs sels. Cependant la ligne de solubilité du phosphovinate de baryte observée par M. Pelouze, est, comme je l'ai déjà dit, irrégulière.

La solubilité du sulfate de soude, du phosphovinate de baryte, du séleniate de soude et du sulfate de chaux suit une marche singulière. En effet au lieu d'augmenter, comme celle de la plupart des sels, avec la température elle est à son maximum à un certain degré du thermomètre. La solubilité de ces sels est représentée par une ligne courbe, formée de deux branches et dont le point de rebroussement correspond au maximum de solubilité. Il est important de noter que ce maximum se trouve, pour les quatre sels entre 33 et 40 degrés de température.

Les nombres de solubilité des sels qui contiennent beaucoup d'eau de cristallisation sont généralement très élevés, quand on augmente la température et je crois pouvoir affirmer qu'ils forment toujours une ligne courbe.

Le Mémoire de M. Poggiale est renvoyé à l'examen de la Commission qui avait été nommée, à l'époque de la présentation de son premier Mémoire, Commission qui se compose de MM. Dumas, Pelouze et Regnault.

M. VALLOT adresse une Note sur les *Tenthredes de la vigne*, insectes que l'on ne connaissait guère qu'à l'état de larve, et dont il a pu suivre le développement jusqu'à l'état parfait. Il en reconnaît deux espèces : une qu'il désigne spécialement sous le nom de Tenthrede de la vigne, *T. vitis*, l'autre qu'il nomme Tenthrede de l'onglet, *T. trunculi*. M. Vallot donne une description abrégée de ces deux espèces, et quelques détails sur leurs mœurs. Chez l'une et dans l'autre, la larve se convertit en nymphe nue dans la cavité médullaire qu'elle a creusée pour se nourrir, et qu'elle ferme en accumulant des débris de moelle réunis par une liqueur glutineuse.

Les sarments et onglets qui contenaient les larves observées par M. Vallot lui ont fourni aussi deux espèces parasites des Tenthredes, qu'il considère comme nouvelles, et dont l'une est un *Ichneumon*, l'autre un *Chalcid*.

La moelle du mûrier a offert à l'auteur de la Note des larves de deux espèces d'hyménoptères, dont l'une vit aux dépens de l'autre

M. Vallot annonce, en terminant sa Notice, qu'un nouvel examen lui a fait reconnaître dans un hyménoptère dont il avait fait l'objet d'une précédente communication, et qu'il designait sous le nom de *Dasypoda fodiens*, un insecte déjà connu, l'*Halictus albipes*, Latr

(Commissaires, MM Duméril, Milne Edwards)

M CULAS, qui avait présenté l'an passé au concours pour les prix de Médecine et de Chirurgie plusieurs ouvrages concernant la *gymnastique et l'éducation physique des enfants de l'un et l'autre sexe*, présente aujourd'hui conformément à une disposition imposée par l'Académie aux auteurs qui concourent pour ces prix, l'indication de ce qu'il considère comme neuf dans ses travaux

(Renvoi à la Commission des prix Montyon)

M BELHOMME adresse de même une Note destinée à indiquer ce qu'il présente comme des découvertes dans les *Recherches sur l'idiotie* qu'il a précédemment présentées au concours pour les prix de Médecine et de Chirurgie, et dont il transmet maintenant un nouvel exemplaire (voir au *Bulletin bibliographique*)

(Commission des prix Montyon)

M DUCROS soumet au jugement de l'Académie des *Observations microscopiques sur les mouvements des globules du sang chez une grenouille soumise à l'influence d'un courant galvanique*

(Renvoi à la Commission précédemment nommée pour d'autres communications du même auteur)

M PAYRNE, à l'occasion d'un Mémoire présenté par MM Pecqueur, Bontemps et Zambaux, sur l'emploi de l'air comprimé pour la propulsion des voitures sur les chemins de fer, annonce qu'il est en mesure de présenter un moteur qui fonctionne à volonté par l'air comprimé ou par l'air raréfié

(Renvoi à la Commission nommée pour examiner le Mémoire de MM Pecqueur, Bontemps et Zambaux)

CORRESPONDANCE

M le MINISTRE DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE transmet une Note de M SCHWEICH sur les mouvements apparents des cieux, le magnétisme terrestre, etc

M FLOURENS présente au nom de M F J PICTET, le premier volume d'un *l'aité elementaire de Paleontologie* (voir au *Bulletin bibliographique*)
Voici une idee, donnee par l'auteur lui meme, du but et du plan de cet ouvrage

Dans la premiere partie, specialement destiné aux jeunes gens qui commencent l'étude de l'histoire naturelle, j'ai reuni les considérations générales, l'histoire de la science, les définitions, la maniere dont les fossiles ont été déposés et leurs apparences diverses, ainsi que la classification des terrains J'ai traité ensuite, avec plus de details, des lois que l'étude des fossiles permet d'établir, et de quelques théories sur la succession des etres organisés

Dans la seconde partie, j'ai fait l'histoire spéciale des animaux fossiles, en insistant autant que possible, dans chaque groupe, sur les phases de leur histoire paléontologique, c'est-à-dire l'époque de leur apparition et leur abondance plus ou moins grande dans telle ou telle période, ainsi que sur leurs variations de formes et sur les transitions zoologiques que présentent certains types éteints

Quant aux especes, j'ai indiqué les principales en ayant soin de faire connaître dans quels ouvrages on en trouve les descriptions

Dans une troisieme partie qui occupera une portion du dernier volume, je reprendrai tout ce qui tient aux applications de la paleontologie à la classification des terrains

ECONOMIE RURALE — *Sur l'anciennete de l'usage du cidre en Normandie*
(Extrait d'une Lettre de M GIRARDIN à M de Gasparin)

■ En discutant dans votre Rapport sur le Memoire de M Fuster relatif au climat de la France, la cause de la disparition de la culture de la vigne de nos provinces du nord, vous avez été conduit à parler de l'époque à laquelle on rapporte généralement l'introduction du cidre en Normandie Tout en citant l'assertion de l'abbé Rozier, qui prétend que cette introduction date de 1300, vous avez avancé qu'elle devait être bien antérieure, puisque les auteurs des VII^e et VIII^e siècles, dites vous, semblent avoir parlé de cette boisson

Permettez-moi de vous signaler quelques dates qui fortifient votre manière de voir

• D'abord, ainsi que je l'ai indiqué dans mon premier *Memoire* sur le cidre publié en 1834 (1), on connaissait au VI^e siècle, et peut être bien avant, l'usage du jus fermenté de la pomme et de la poire, puisque, des 587, sainte Radegonde, reine de France, buvait journellement du pousse (*piratum*). La culture du pommier et du poirier devait s'être répandue dans les Gaules, sous la domination des Romains, qui, comme on le sait, attachaient à cette culture beaucoup d'intérêt. Quant à l'art d'extraire de ces deux fruits une boisson fermentée, on ne peut fixer la date précise à laquelle il remonte, mais il est certain du moins qu'il était connu des Gaulois, et par suite des Francs, longtemps avant l'arrivée des Northmans.

En effet, au VIII^e siècle, dans le fameux capitulaire de *Villis*, qui resume les vues de Charlemagne sur les finances et l'administration de ses domaines, on trouve une curieuse énumération des diverses professions qu'il jugeait nécessaire de réunir dans chacun de ses grands domaines. Ce prince illustre prescrit qu'on y entretienne des personnes en état de fabriquer de la bière et des boissons faites avec des pommes, des poires et autres fruits.

D'autres actes de la même époque parlent fréquemment de l'usage du cidre, et lors de la quatrième irruption des hommes du Nord en Neustrie, en 862, des titres non moins respectables font mention des allées de pommiers qui entouraient l'antique abbaye de Fontenelle ou de Saint-Wandrille, que ces conquérants détruisirent de fond en comble. Hugues de Gournay, dans la charte de fondation de Clair-Ruissel, donne au monastère la dime d'une de ses pommeraies.

On voit encore, dans un titre de 1183, les religieux de Jumièges recevoir une donation en pommes pour faire le cidre nécessaire à leur consommation. Il existe nombre de chartes aussi anciennes dans lesquelles une des corvées principales que le seigneur exige de ses vassaux, est de cueillir ses pommes et de faire son cidre.

Je dois à l'obligeance de M. Deville, directeur du Musée d'antiquités de Rouen, la connaissance d'un document curieux relatif au sujet qui m'occupe en ce moment. Il s'agit d'un passage d'un poème écrit par le cha-

(1) Extrait des travaux de la Société centrale d'Agriculture de la Seine-Inférieure — *Cahier de la séance publique de 1834*, p. 36

pelain de Philippe-Auguste, Guillaume Lebreton (1), qui avait suivi ce prince à la conquête de la Normandie vers 1203-1204, et qui parlait de *visu*. Voici ce qu'il dit

Non tot in autumnu rubet Algia (2) tempore pomis,
 » Unde liquare solet siceram (3) sibi Neustria gratam,

Noël a trouvé qu'il était question du cidre dans l'énumération des marchandises qui remontaient la Seine en 1315, et qu'en 1407 cette boisson était vendue à Paris chez les marchands de vin.

Il me paraît donc bien démontré que ce n'est ni aux Navarrais, ni aux Biscayens, ni aux Northmans qu'on est redevable de l'introduction de la culture du pommier en France et de l'art de brasser les pommes. Mais il me paraît également certain que ce n'est qu'à partir du XIII^e au XIV^e siècle que l'usage du cidre est devenu général en Normandie. Avant cette époque, la bière, alors connue sous le nom de *cervoise*, était la boisson populaire, même dans les cantons qui produisent le plus de pommes aujourd'hui. Bien des faits le prouvent. Dans les villes et les campagnes, il y avait des brasseries, on en connaît plusieurs très-anciennes, une entre autres à Lillebonne en 1358, il est aussi question des brasseries de Rouen, les actes de Dieppe relatent la bière, en parlant des boissons que les pêcheurs emportaient à la mer, et nous savons d'ailleurs qu'il y avait peu de maisons religieuses qui n'eussent chez elles les cuves, les fourneaux et les autres ustensiles nécessaires à la fabrication de cette liqueur.

Si, comme on n'en saurait douter, la Normandie possédait de nombreux vignobles avant et pendant le moyen âge, la bière, puis ensuite le cidre, ont contre balance de très-bonne heure l'usage du vin, qui n'a jamais dû être, dans nos contrées, qu'une fort médiocre boisson. La cessation de la culture de la vigne tient surtout, à mon avis, au déboisement de notre province, dont les hautes et antiques forêts garantissaient, des vents du nord, les coteaux plantés en vigne, et facilitaient par conséquent la maturité du raisin. À mesure que les forêts de la Normandie, qui formaient un vaste réseau, ont été abattues, la quantité et la qualité du vin dégénérant d'année en année, les habi-

(1) *Guillelmi Britonis, armorici Philippidos*, lib VI

(2) *Algia*, pays d'Auge

(3) *Siceram*. C'est de cet ancien mot latin *sicera*, qui servait à désigner toutes les liqueurs fermentées autres que le vin, que derive notre mot *cidre*, qu'on écrivait d'abord *sicre*.

tants ont dû recourir à d'autres boissons dont la préparation avait moins à redouter les intempéries des saisons. »

MÉCANIQUE ANALYTIQUE. — *Note sur l'intégration des équations de la courbe élastique à double courbure; par M. WANTZEL.*

I.

« Dans la dernière séance, M. Binet a communiqué un Mémoire sur l'intégration des équations de la courbe élastique à double courbure, dans lequel les inclinaisons de la tangente sont exprimées par des fonctions elliptiques, tandis que les coordonnées dépendent de fonctions plus compliquées. Je suis parvenu à intégrer ces mêmes équations par un procédé plus simple qui a l'avantage d'exprimer les valeurs de tous les éléments par des fonctions elliptiques ordinaires comme dans la courbe élastique plane

II.

« Les équations différentielles de la courbe élastique sont de la forme

$$p \frac{dy d^2z - dz d^2y}{ds^2} = \theta \frac{dx}{ds} + c(\gamma - b_1) - b(z - c_1),$$

$$p \frac{dz d^2x - dx d^2z}{ds^2} = \theta \frac{dy}{ds} + a(z - c_1) - c(x - a_1),$$

$$p \frac{dx d^2y - dy d^2x}{ds^2} = \theta \frac{dz}{ds} + b(x - a_1) - a(\gamma - b_1),$$

dans lesquelles a, b, c sont les composantes de la force appliquée à la courbe, et a_1, b_1, c_1 , les coordonnées de son point d'application. Si donc on prend ce point pour origine et la direction de la force pour axe des z , les équations deviendront

$$p \frac{dy d^2z - dz d^2y}{ds^2} = \theta \frac{dx}{ds} + g\gamma$$

$$p \frac{dz d^2x - dx d^2z}{ds^2} = \theta \frac{dy}{ds} - gx$$

$$p \frac{dx d^2y - dy d^2x}{ds^2} = \theta \frac{dz}{ds}.$$

« La dernière équation montre déjà que si l'on néglige θ , comme Lagrange l'a fait, la courbe sera nécessairement plane.

» En multipliant les deux membres de ces équations par dx , dy , dz , et ajoutant, il vient

$$0 = \theta ds + g(y dx - x dy), \quad \text{ou} \quad x dy - y dx = \frac{\theta}{g} ds.$$

(On trouve aussi, en ajoutant les deux premières multipliées respectivement par x et y ,

$$\frac{p}{ds} d^2x(x dy - y dx) - p dz(x d^2y - y d^2x) = \theta \frac{x dx + y dy}{ds},$$

ou, en vertu de la précédente, si l'on prend s pour variable indépendante,

$$\frac{p d^2s}{g ds^2} = \frac{x dx + y dy}{ds},$$

et, en intégrant,

$$\frac{2p}{g} \frac{ds}{ds} = r^2 - \frac{c}{g}.$$

Ainsi les deux équations différentielles du premier ordre sont

$$x dy - y dx = \frac{\theta}{g} ds, \quad \text{et} \quad 2p \frac{ds}{ds} = gr^2 - c,$$

en désignant par r le rayon vecteur de la projection, $\sqrt{x^2 + y^2}$. Ces équations expriment deux propriétés faciles à énoncer, qui pourraient servir à caractériser la courbe.

III.

» Le calcul s'achève aisément au moyen des coordonnées semi-polaires. Si l'on appelle t l'angle que fait le rayon r avec l'axe des x et σ l'arc de la projection sur le plan des xy , on aura

$$r^2 dt = \frac{\theta}{g} ds, \quad ds^2 = d\sigma^2 + dz^2, \\ d\sigma^2 = dr^2 + r^2 dt^2, \quad \text{et} \quad \frac{ds}{ds} = \frac{gr^2 - c}{2p},$$

équations qui permettront d'exprimer s , t et z en fonction de r . Mais il est

plus simple de poser, comme Lagrange,

$$\frac{ds}{d\varphi} = \cos \varphi,$$

d'où

$$dx = ds \cos \varphi, \quad d\sigma = ds \sin \varphi, \quad r^2 = \frac{2p \cos \varphi + c}{g},$$

et, par suite,

$$(1) \quad ds = \frac{p \sin \varphi d\varphi}{\sqrt{g \sin^2 \varphi (2p \cos \varphi + c) - \theta^2}},$$

$$(2) \quad dt = \frac{\theta p \sin \varphi d\varphi}{(2p \cos \varphi + c) \sqrt{g \sin^2 \varphi (2p \cos \varphi + c) - \theta^2}}.$$

On voit de même que z s'exprime par une fonction elliptique. Quant aux coordonnées x et y , elles seront données par les relations

$$x = r \cos t, \quad y = r \sin t.$$

On pourrait déduire des mêmes équations les valeurs de $\frac{dx}{ds}$ et $\frac{dy}{ds}$, mais il est plus simple de remonter à l'équation primitive

$$p \frac{dx d'y - dy d'x}{ds^2} = \theta \frac{ds}{ds}$$

Si l'on désigne par ψ l'angle que forme avec l'axe des x la tangente à la projection, on a

$$dx = d\sigma \cos \psi, \quad dy = d\sigma \sin \psi,$$

et

$$d\psi = \frac{dx d'y - dy d'x}{d\sigma^2} = \frac{\theta}{p} dz \frac{ds}{ds^2} = \frac{\theta ds \cos \varphi}{p \sin^2 \varphi},$$

ψ sera donc également une fonction elliptique

» La courbure de la projection est égale à

$$\frac{dx d'y - dy d'x}{ds^2}, \quad \text{ou à} \quad \frac{\theta}{p} \frac{ds}{ds} \frac{ds'}{ds^2} = \frac{\theta \cos \varphi}{p \sin^2 \varphi},$$

on voit donc qu'elle pourra s'exprimer algébriquement en fonction de r .

» Le rayon de courbure de la courbe elle-même s'obtient en ajoutant

membre 1 membre les carrés des premières équations, on trouve ainsi

$$\rho^2 = \frac{p^2}{g^2 r^2 - \theta} = \frac{p}{2pg \cos \varphi + cg - b^2}$$

La seconde courbure s'exprime aussi rationnellement au moyen de r ou de $\cos \theta$

Les valeurs de ds , dz et $d\psi$ s'accordent avec celles qui ont été trouvées par M. Binet en posant $\cos \varphi = \zeta'$. Cependant il faut remarquer que la constante h introduite dans les formules de M. Binet n'est pas arbitraire, et, pour retomber sur les résultats précédents, on doit lui donner la valeur zéro ce qui a lieu, en effet, d'après les équations primitives de la question.

M. Binet a bien voulu m'indiquer lui-même la cause de cette différence elle provient de ce que les équations dont il est parti sont plus générales que les nôtres, parce qu'elles répondent au cas où la torsion est produite par des forces qui n'ont pas de résultante unique.

Dans cette circonstance on pourra toujours les réduire à une force et à un couple dont le plan soit perpendiculaire à sa direction qu'on prendra pour axe des z . Cela pose, les deux premières équations d'équilibre resteront les mêmes, et la troisième deviendra

$$p \frac{dx dy - dy dx}{ds} = \theta \frac{dz}{ds} + h$$

Si l'on retranche les deux premières multipliées respectivement par dy et dx , on trouve toujours

$$2p \frac{ds}{dt} = gr^2 - c,$$

tandis que la seconde intégrale est remplacée par

$$g(x dy - y dx) = \theta ds + h dz$$

Mais les calculs ultérieurs se font avec la même facilité, et conduisent aux valeurs suivantes

$$ds = \frac{p \sin \varphi d\varphi}{\sqrt{g \sin^2 (2p \cos \varphi + c) - (\theta + h \cos \varphi)^2}},$$

$$dt = \frac{p(\theta + h \cos \varphi) \sin \varphi d\varphi}{(2p \cos \varphi + c) \sqrt{g \sin^2 (2p \cos \varphi + c) - (\theta + h \cos \varphi)^2}},$$

$$\theta dz = ds \cos \varphi, \quad d\psi = \frac{(h + \theta \cos \varphi) ds}{p \sin^2 \varphi}, \quad \frac{dx}{ds} = \sin \varphi \cos \psi, \quad \frac{dy}{ds} = \sin \varphi \sin \psi$$

Toutes ces quantités dépendent des fonctions elliptiques; d'autres sont données algébriquement par rapport à $\cos \varphi$ ce sont le rayon vecteur de la projection $r^2 = ap \cos \varphi + c$, le rayon de courbure de cette projection $\frac{p \sin^2 \varphi}{h + g \cos \varphi}$, le sinus de l'angle formé par la tangente et le rayon vecteur $\sqrt{\frac{\theta + h \cos \varphi}{g \sin^2 \varphi (ap \cos \varphi + c)}}$, et le rayon de courbure de la courbe

$$\rho = \sqrt{\frac{p^2}{h^2 + g^2 r^2 - \theta^2}}, \quad \text{ou} \quad \rho = \sqrt{\frac{p}{g (ap \cos \varphi + c)}},$$

en posant $ape = cg + h^2 - \theta^2$. Si l'on introduit cette constante e dans les valeurs de ds et $d\psi$, on retrouve exactement les formules de M. Binet. »

PHYSIQUE. — *Sur quelques faits qui viennent à l'appui de la théorie des filons*
de M. J. Fournet, Lettre de M. A. LAURENT

« Le Mémoire que M. Fournet vient de vous adresser sur la surfusion du quartz simplifie tellement la théorie des filons métallifères, que je m'empresse de vous envoyer quelques faits qui viennent à l'appui de son hypothèse.

» Je possède une vingtaine de composés chlorurés de la naphthaline et azotés du benzoyle, qui se comportent, sous l'influence de la chaleur, absolument comme M. Fournet suppose que le quartz le fait dans les filons.

» La plupart de ces corps entrent en fusion au-dessus de 100 degrés. Si, après les avoir complètement fondus, on les laisse refroidir jusqu'à la température ordinaire, ils deviennent mous, se laissent tirer en fils, puis ils se solidifient lentement, en restant complètement transparents, et sans offrir de traces de cristallisation.

» Quelques-uns de ces composés peuvent rester liquides jusqu'à la température ordinaire, puis ils cristallisent subitement par le plus léger contact d'un corps étranger. D'autres, quoique revenus à la température ordinaire, restent encore mous et peuvent cristalliser très-lentement.

» Parmi ces corps, il y en a que l'on peut faire cristalliser subitement, à la température à laquelle ils entrent en fusion, si l'on y projette un petit fragment de cristal.

» On peut reproduire des empreintes de matières très-fusibles sur d'autres qui le sont beaucoup moins, absolument comme le quartz prend dans les filons l'empreinte de pyrites très-fusibles.

» Si, après avoir fondu quelques-uns de mes composés, on les laisse refroidir

dir, et qu'on y projette, lorsqu'ils sont encore mous, à 40 degrés par exemple un cristal d'une matière étrangère qui puisse fondre et cristalliser subitement à 30 degrés celui-ci entrera en fusion, se dissoudra sur les bords dans la matière molle puis par un abaissement de température suffisant, c'est la matière la plus fusible qui cristallisera la première, tandis que l'autre se solidifiera plus tard tantôt sans cristalliser, tantôt en cristallisant lentement et confusément à partir des cristaux de la première.

Si l'on fond un de ces composés sur une feuille de verre, de manière à avoir une goutte très-allongée, et si l'on jette un cristal d'un corps étranger beaucoup plus fusible sur une des extrémités de la goutte, les deux corps se dissoudront l'un dans l'autre, et, par le refroidissement, c'est l'extrémité de la goutte qui renferme le mélange le plus fusible, qui cristallisera la première.

Il arrive quelquefois que la matière la moins fusible communique son état de surfusion à la plus fusible. Le mélange peut descendre à la température ordinaire sans cristalliser. Mais si alors on réchauffe très-doucement la goutte dont une extrémité renferme le mélange, c'est celle-ci qui cristallisera la première.

Presque tous ces composés, qui restent parfaitement transparents lorsqu'ils sont complètement solidifiés, peuvent cristalliser lorsqu'on les réchauffe légèrement.

Puisque parmi ces combinaisons il en est qui peuvent communiquer leur état de surfusion à des matières qui seules ne le possèdent pas, on conçoit qu'il y dû arriver quelque chose de semblable dans les diverses associations que le quartz forme avec un grand nombre de silicates.

CHIMIE. — *De l'action de l'acide borique sur l'alcool et sur l'esprit-de bois*
par M. EBELMEN

En examinant la méthode employée par Gmelin pour doser l'acide borique dans les minéraux silicifères, j'ai trouvé que l'alcool distillé sur l'acide borique entraînait, à poids égal, une proportion beaucoup plus considérable de ce corps que l'eau pure. Ce fait, tout à fait inexplicable en admettant que l'acide borique n'est entraîné par les vapeurs d'eau et d'alcool qu'en vertu de la tension de sa vapeur aux températures d'ébullition de ces deux liquides, m'a conduit à rechercher si, dans la distillation de l'alcool sur l'acide borique, il ne se formait pas une combinaison entre les éléments de ces deux corps. J'ai reconnu, effectivement, qu'il était possible

de produire, dans ces circonstances, un véritable *éther borique*. Voici quelle a été la méthode suivie pour la préparation de ce composé

• Lorsqu'on mêle ensemble des poids égaux d'acide borique fondu et d'acide en poudre fine et d'alcool absolu, on obtient bientôt un dégagement considérable de chaleur. En cherchant à chasser l'alcool par la distillation, on trouve que la température peut s'élever, dans l'intérieur de la cornue, bien au delà du point d'ébullition de l'alcool, avant que tout le liquide ait disparu. En arrêtant la distillation vers 110 degrés, puis traitant la masse refroidie par l'éther anhydre, decantant la solution éthérée et la chauffant progressivement au bain d'huile jusqu'à 200 degrés, on obtient pour résidu de cette distillation, un liquide un peu visqueux, qui donne, à cette température, des fumées blanches assez abondantes à l'air, et qui se solidifie par le refroidissement.

Ce composé, que je considère comme l'éther borique se rapproche beaucoup, par ses propriétés physiques, de l'acide borique et des borates métalliques, qui prennent, comme on sait, l'état vitreux par la fusion. C'est un véritable verre transparent, mais un verre déjà un peu mou à la température ordinaire et qui peut s'étirer en fils très-déliés vers 40 ou 50 degrés. Il a une faible odeur éthérée, une saveur brûlante. Placé sur la peau, il y occasionne une impression très-sensible de chaleur, et se transforme bientôt en une poussière blanche d'acide borique. Il blanchit également à l'air, mais cette altération n'est que superficielle pour les fragments d'un certain volume.

Soumis à l'action de la chaleur, il se décompose vers 300 degrés en produisant un dégagement abondant d'un gaz qui présente tous les caractères du gaz oléfiant. Ce gaz brûle avec une flamme verte, ce qui tient à ce qu'il entraîne une certaine quantité d'éther borique non décomposé, mais l'addition d'un peu d'eau lui fait perdre cette propriété.

• Ce mode de décomposition de l'éther borique permet de préparer avec facilité le gaz oléfiant. En chauffant dans un ballon un mélange de 3 parties d'acide borique fondu, et de 1 partie d'alcool absolu, on obtient un dégagement abondant et régulier de gaz oléfiant sans que la masse se charbonne. L'acide borique monohydraté, qui se forme dans cette décomposition de l'alcool, n'abandonne son eau qu'à une température plus élevée.

Titré dans l'eau tiède, l'éther borique se décompose, avec un dégagement considérable de chaleur, en acide borique et en alcool. Il se dissout en toutes proportions dans l'alcool et dans l'éther, l'eau fait prendre en masse ces dissolutions. Quand on distille une solution alcoolique d'éther bo-

rique, l'alcool distillé entraîne une quantité très-notable de ce corps, qui lui donne la propriété de brûler avec une flamme verte et de se troubler par l'eau.

» Les résultats de l'analyse que j'ai faite de ce corps se rapprochent beaucoup de ceux qui correspondraient à la formule $\text{Bo}^{\circ} \text{C}^{\circ} \text{H}^{\circ} \text{O}$. La composition de ce corps permettra de fixer le véritable équivalent de l'acide borique, en montrant que le borax $\text{Bo}^{\circ} \text{Na O}$ est un sel neutre.

» L'action de l'acide borique sur l'esprit-de-bois est tout à fait comparable à celle qu'il exerce sur l'alcool; mais je n'ai pas encore isolé et examiné le produit qui se forme. J'ai commencé également des recherches dans le but de produire des borovates et des borométhylates; mais elles ne sont pas assez avancées pour que j'en communique les résultats à l'Académie. »

M. JAMES, à l'occasion des communications faites par M. Magendie et par M. Fiard, dans la séance du 27 mai, relativement à un cas de *cow-pox* et à l'inoculation, sur plusieurs enfants, de la matière des pustules de la vache, rappelle qu'il a lui-même, en 1837, obtenu, par les mêmes moyens, une régénération du vaccin, et annonce l'intention de communiquer dans une prochaine séance, à l'Académie, une Note dans laquelle il s'occupera comparativement du *renouvellement du vaccin* et de sa *régénération*.

M. SIEBER adresse quelques considérations sur les *chemins de fer* et des plans relatifs aux changements qu'il propose d'apporter dans diverses parties du système que l'on suit aujourd'hui. Ces plans sont adressés pour prendre date, en attendant que l'auteur ait pu présenter ses idées, avec tout le développement nécessaire, dans un Mémoire dont l'auteur annonce l'envoi comme prochain.

A 4 heures trois quarts, l'Académie se forme en comité secret.

COMITÉ SCIENT.

La Section de Minéralogie et de Géologie présente, par l'organe de M. ALEX. BRONGNIART, la liste suivante de candidats pour la place de correspondant vacante par suite du décès de M. le baron de Moll.

En première ligne,

M. Murchison, à Londres;

En deuxième ligne,

M. Hausmann, à Gœttingue;

En troisième ligne,

M. J. de Charpentier, à Bex (en Suisse);

En quatrième ligne, et ex æquo,

<i>en Allemagne,</i>	<i>en Amérique,</i>	<i>en Angleterre,</i>	<i>en Italie,</i>	<i>en Scandinavie,</i>
MM. Boué, de Dechen, Freiesleben, Naumann, Studer,	M. Hitchcock, .	MM. de la Bèche, Greenough, Lyell, Sedgwick,	M A Sismonda,	M Keilhau.

La Section a déclaré qu'elle ne présentait, dans cette circonstance, que des géologues et que des étrangers. Elle a averti, en second lieu, que, ne pouvant placer sur sa liste tous les géologues étrangers qui lui en paraissaient dignes par leurs travaux, elle a cru devoir se borner à y inscrire les noms des hommes les plus éminents dans chacun des pays où l'on se livre aujourd'hui, avec le plus d'ardeur, à la Géologie.

L'élection aura lieu dans la séance prochaine. MM. les membres en seront prévenus par lettres à domicile.

La séance est levée à 6 heures.

F

ERRATUM.

(Séance du 17 juin 1844.)

Page 1150, ligne 4, au lieu de 2 $\frac{3}{4}$ millimètres, lisez 1 $\frac{3}{4}$ millimètre.

BULLETIN BIBLIOGRAPHIQUE

L'Académie a reçu, dans cette séance, les ouvrages dont voici les titres

Comptes rendus hebdomadaires des séances de l'Académie royale des Sciences, 1^{er} semestre 1844, n° 25, in-4°.

Traité de Chimie appliquée aux Arts, par M. DUMAS; tome VII, in-8°

Annales des Sciences naturelles; mai 1844; in-8°.

Bulletin de l'Académie royale de Médecine; tome IX, n° 18; in-8°

Annales de la Chirurgie française et étrangère; juin 1844; in-8°.

Voyages en Scandinavie, en Laponie, au Spitzberg et aux Feroe, sous la direction de M. GAIMARD Géologie, Minéralogie et Métallurgie, par M. EUG ROBERT; in-8°.

Dictionnaire universel d'Histoire naturelle; tome V, 49^e livr.; in-8°.

Histoire naturelle des Coléoptères de France; par M. MULSANT. — *Palpicornes* Paris, 1844, in-8°. (Présenté, au nom de l'auteur, par M. CHEVREUL.)

Traité philosophique et clinique d'Ophthalmologie, basé sur les principes de la Thérapeutique dynamique; par M. ROGETTA; in-8°.

Traité élémentaire de Paléontologie, ou Histoire naturelle des Animaux fossiles, par M. PICTET, tome I^{er} Paris, in-8°.

Mémoires de Chirurgie pratique, comprenant la Cataracte, l'Iritis et les Fractures du col du fémur; par M. PAMARD; in-8°.

Mémoire sur la Kératoplastie; par M. FELDMANN; broch. in-8°

Essai sur l'Idiotie, par M. BELHOMME; broch. in-8.

Annales scientifiques, littéraires et industrielles de l'Auvergne, juillet et août 1843, in-8°.

Mémorial. — Revue encyclopédique; mai 1844; in-8°.

Journal des Usines et des Brevets d'Invention, mai 1844, in-8°.

Journal de Chirurgie, par M. MALGAIGNE; juin 1844; in-8°.

Astronomische... Nouvelles astronomiques de M. SCHUMACHER, n° 505; in-4°

Gazette médicale de Paris; n° 25; in-4°.

Gazette des Hôpitaux; n° 71 à 73; in-fol.

L'Echo du Monde savant; n° 47 à 49.

L'Expérience, n° 364, in-8°.

COMPTES RENDUS

DES SÉANCES DE L'ACADÉMIE DES SCIENCES.

TABLES ALPHABÉTIQUES.

JANVIER — JUIN 1844

TABLE DES MATIÈRES DU TOME XVIII

A

	Page		Pa
ARTIF DE PLOMB — Description d'un nouveau procédé pour la fabrication de cet acide par M. <i>Macle</i>	526	AL —	888
ACETIQUE (FERMENTATION) — Voir au mot <i>Fermentation</i>		ACIDES AMIDES — Note sur les acides amides et chlorés par M. <i>Lauent</i>	431
ACIDE AZOTÉ — Note concernant plusieurs nouveaux sels formés par la réaction des acides azotés et sulfureux sur les bases alcalines par M. <i>Fremy</i>	110	— Remarques de M. <i>Dumas</i> à l'occasion de cette Note	438
ACIDE BORIQUE — Action de cet acide sur l'alcool et sur l'asphalte de bois. Note de M. <i>Ebelmen</i>	1203	ACIDES MÉTALLIQUES — Recherches sur les acides métalliques par M. <i>Fremy</i> cinquième Mémoire <i>Quatrième</i>	114
ACIDE BUTYRIQUE — Sur la transformation de la fibrine en acide butyrique, Note de M. <i>Wurtz</i>	701	ACROSTIGES — Sur la manière dont se produisent les sons, et sur les phénomènes qui en résultent. Mémoire de M. <i>Fermont</i>	171
— Recherches sur quelques produits qui dérivent de cet acide par M. <i>Chancel</i>	1023	— Examen des phénomènes qui se produisent pendant la formation du son dans des tuyaux ouverts et dans des tuyaux fermés. Mémoire de M. <i>Fermont</i>	12
ACIDE CARBONIQUE — Observations simultanées faites à Paris et à Andilly, pour rechercher la proportion d'acide carbonique contenue dans l'air atmosphérique par MM. <i>Boussingault</i> et <i>Levy</i>	473	ASPIRINES (Voies) — MM. <i>Roussin</i> et <i>Serurier</i> demandent l'autorisation de reprendre un Mémoire sur les affections des voies aériennes présenté au concours de 1842 pour les prix de Médecine et de Chirurgie. Mémoire renfermant des recherches que la Commission a jugées intéressantes à poursuivre	38
ACIDE NITREUX Voir à <i>Acide azoté</i>		ASTROSTATS — Note sur les moyens de les diriger par M. <i>de Genne</i>	38
ACIDE SULFUREUX — De plusieurs nouveaux sels formés par la réaction des acides sulfureux et azotés sur les bases alcalines, Note de M. <i>Fremy</i>	1110	— Sur un ballon à enveloppe en cuivre lamé. Note de M. <i>Marcy Monge</i>	419
ACIDE SULFURIQUE — Rapport sur un Mémoire de M. <i>Jacquelin</i> relatif aux produits de l'action réciproque de l'acide sulfurique anhydre et de l'ammoniaque, Rapporteur M. <i>Dumas</i>	28	— Sur l'emploi de ce ballon pour décharger d'électricité les nuages orageux, Note de M. <i>Dupuis Delcourt</i>	527
— Sur la chaleur dégagée dans l'hydratation de l'acide sulfurique, Mémoire de M. <i>C. B.</i> , 1844, 1 ^{er} Semestre (T. XVIII)		— Nouvelle Note de M. <i>Dupuis Delcourt</i> sur quelques expériences dans lesquelles on ferait usage de ce ballon	1131
		— Note sur un acrostat dans l'intérieur du-	

quel on ferait le vide, Lettre de M. <i>Joly</i>	880
AIMANTATION. Voir au mot <i>Electricité</i>	
AIR ATMOSPHÉRIQUE. — Observations simultanées faites à Paris et à Andilly, près Montmorency, pour rechercher la proportion d'acide carbonique contenue dans l'air atmosphérique, par MM. <i>Bousingault</i> et <i>L. J.</i>	473
ALBUMINE. — Note sur l'albumine soluble, par M. <i>Wu</i>	700
ALLUMÉRIE. — Recherches sur les causes de cette maladie, par M. <i>Foucault</i>	857
ALCOOL. — Note sur un nouvel alcool végétal le <i>l'phyle</i> obtenu par M. <i>Lau</i> et en soumettant à l'action de la chaleur l'azotide benzoïque	1016
— Mémoire sur les combinaisons de deux nouvelles bases alcalines contenant du platine, par M. <i>Beset</i>	1100
— De plusieurs nouveaux sels formes par la réaction des acides sulfuriques et vortens sur les bases alcalines. Note de M. <i>L. J.</i>	111
ALCOOL. — Action de l'acide borique sur l'alcool et sur l'esprit de bois. Note de M. <i>Belmen</i>	1202
ALCOOLIQUE (FERMENTATION). Voir au mot <i>Fermentation</i>	
ALCOOLIQUE VÉGÉTALE. — Sur l'anatomie de cette plante. Note de M. <i>P. J. L.</i>	938
ALIMENTAIRES (SUBSTANCES). — Recherches physiologiques sur les substances alimentaires, par MM. <i>Bernard</i> et <i>B. J.</i>	763
ALIMENTATION. — Observations sur l'action du sucre dans l'alimentation des granivores, par M. <i>Liell</i>	658
AMALGAM. — Note sur l'emploi de la myotomie comme moyen de traitement dans les cas d'amaurose et de myopie, par M. <i>Guepin</i>	8
AMMONIAQUE. — Rapport sur un Mémoire de M. <i>Jacquelin</i> relatif aux produits de l'action réciproque de l'acide sulfurique sur l'hydrogène et de l'ammoniaque. Rapporteur M. <i>Dumas</i>	282
ANALYSE MATHÉMATIQUE. — Sur la convergence de la série qui exprime la fonction perturbatrice développée suivant les sinus et cosinus des multiples des longitudes moyennes des planètes que l'on considère, Mémoire de M. <i>Cauchy</i>	13
— Mémoire sur les fonctions continues, par M. <i>Cauchy</i>	116
— Rapport sur une Note de M. <i>Cellerier</i> relative à la théorie des imaginaires, Rapporteur M. <i>Cauchy</i>	168
— Sur la forme générale des équations aux différences partielles linéaires et à coefficients constants, propres à représenter	

les lois des mouvements infiniment petits d'un système de points matériels soumis à des forces d'attraction ou de répulsion mutuelle. Mémoire de M. <i>Laurent</i>	291
— Sur les formules relatives à l'attraction des polyèdres, Note de M. <i>d'Istocquois</i>	422
— A l'occasion d'un Mémoire de M. <i>Regnault</i> concernant des recherches sur la force élastique de la vapeur aqueuse. M. <i>B.</i> et moi sous les yeux de l'Académie un travail mathématique dans lequel il a eu de fréquentes occasions d'employer, comme exemples de calcul, des résultats obtenus par M. <i>Regnault</i> dans les expériences qui font l'objet de sa communication	54
— Mémoire sur les valeurs moyennes des fonctions, par M. <i>Cauchy</i>	108
— Nouveau Mémoire sur le calcul des infinitésimales des mouvements planétaires, par M. <i>Cauchy</i>	12
— Sur la généralisation de certains théorèmes de mécanique analytique données par <i>Legrange</i> et <i>Huygens</i> . Note de M. <i>Baquet</i>	1
— Formule pour la résolution de l'équation auxiliaire de degré m relative à l'équation $ax^m + 1 = 0$, en supposant $p = m + 1$ et premier. Note de M. <i>Lefebvre</i>	167
— Equations des mouvements infiniment petits d'un système de cycloïdes soumis à des forces d'attraction ou de répulsion mutuelle, Mémoire de M. <i>Laurent</i>	71
— Mémoire sur l'équilibre et le mouvement d'un système de molécules dont les dimensions ne sont pas supposées nulles, par M. <i>Cauchy</i>	74
— Addition à un précédent Mémoire sur la synthèse algébrique, par M. <i>Cauchy</i>	802
— Remarques sur des classes très étendues de quantités dont la valeur n'est ni rationnelle ni même réductible à des irrationnelles algébriques, Note de M. <i>Louville</i>	883
— Nouvelle démonstration du théorème sur les irrationnelles algébriques donné dans la Note précédente, par M. <i>Louville</i>	910
— Remarques relatives à un passage du livre des <i>Principes</i> , où Newton calcule l'action exercée par une sphère sur un point extérieur, par M. <i>Louville</i>	883
— Rapport sur un Mémoire de M. <i>Laurent</i> relatif au calcul des variations, Rapporteur M. <i>Cauchy</i>	920
— Sur la rotation des plans de polarisation dans les mouvements infiniment petits d'un système de sphéroïdes, Lettre et Mémoire de M. <i>Laurent</i>	936
— Remarques de M. <i>Cauchy</i> à l'occasion de cette communication	941

	Pages		Pages
— Sur les équations différentielles de la polarisation chromatique, par M. Caschky	961	transmet une Note de M. Planckon sur l'A pnoetou	1 22
— Mémoire sur la substitution des fonctions non périodiques aux fonctions périodiques dans les intégrales définies, par M. Caschky	1072	APPAREILS CHIRURGICAUX — Appareil pour les fractures du col du fémur, soumis par M. Baudein au jugement de l'Académie. L'auteur demande que la Commission qui doit faire le Rapport sur cet appareil veuille bien constater l'état d'un malade sur le quel on en va faire l'application	838
— De la variation des constantes arbitraires, comme l'ont établie, dans sa généralité, les Mémoires de Lagrange du 22 août 1808 et du 13 mars 1809, et celui de Poisson du 16 octobre suivant, Mémoire de M. Meunier	1021	APPAREILS DE SAUVETAGE Voir à <i>Sauvetage</i>	
— Mémoire sur l'intégration des équations de la courbe élastique à double courbure, par M. Binet	1115	APPAREILS DE SÉCURITÉ — M. Sorel demande qu'un Mémoire sur divers appareils proposés à prévenir les explosions des chaudières à vapeur, présenté par lui, n'ait pas été admis à concourir pour le prix concernant les Arts et Métiers, soit retiré de ce concours et renvoyé à l'examen d'une Commission	228
— Sur la théorie des transcendentes à différentielles algébriques, par M. Hermite	1133	APPAREILS DIVERS — Description d'un jeu de voiture hydraulique et portatif, par M. Galy, C. salat	224
— Note sur l'intégration des équations de la courbe élastique à double courbure, par M. Wantzel	1197	— Note sur un appareil destiné à permettre de travailler sous l'eau, par M. Genay	411
ANATOMIE — M. Lietaud présente un dessin en noir indiquant la disposition des divers organes, telle que la supposent les médecins chinois, avec une traduction de la légende qui accompagne ce dessin faite par M. Stanislas Julien	150	— Notice sur quelques perfectionnements apportés à un appareil électrique destiné à l'usage des médecins et précédemment soumis au jugement de l'Académie, par MM. Bricton frères	217
— Notes sur l'anatomie de la girafe, par MM. Joly et Jassot	265 et 493	— Description et modèle d'une nouvelle chaise d'arpenteur, par M. Cartier	527 et 733
— MM. Bourguery et Jacqz demandent que le grand ouvrage d'anatomie, dont ils contiennent la publication, soit admis à concourir pour le prix de Physiologie expérimentale de la fondation Montyon	592	— Note sur un appareil d'alarme sous le nom de <i>machine à air</i> , par M. Scipion	228
Rocherches anatomiques sur l'organe électrique de la torpille, par M. Robert de Lamalle	810	— Description et figure d'une machine à vapeur présentant des modifications nouvelles, par M. Cochaux	676
ASTRONOMIE — Voir au mot <i>Vents</i>		— Note sur un niveau à bulle d'air et à lunette, par M. Bodin	674
ANTHROPOLOGIE — M. d'Omalus d'Halloy, en présentant à l'Académie un opuscule qu'il vient de publier sur la classification des races humaines indique les principaux points par lesquels sa distribution diffère de celles qu'on a précédemment proposées	679	— Sur un flotteur au moyen duquel on obtient, dans des lampes d'une construction très simple, un niveau constant pour l'huile, Notes de M. Senay	864 et 1128
— Sur les caractères distinctifs des trois races du nord de l'Afrique, les Arabes, les Kabbyles et les Monabites, Note de M. Gayon	832	— Nouvelle disposition de sabot pour les roues des voitures, proposée par MM. Lejhr et Sautercaux	893 et 933
— Têtes humaines moulées sur nature vivante par M. Dumontier dans le cours de l'expédition de l'Asiatic et de la Zélande : images daguerriennes obtenues d'après ces moules, pour servir de modèles aux planches de l'Atlas de cette expédition, partie anthropologique	1032	— M. Brancourt adresse la figure, non accompagnée de description, d'une machine hydraulique sur laquelle il désirerait obtenir le jugement de l'Académie	1064
ANTHROPOLOGIE — Sur la non absorption du kermès minéral administré à l'intérieur, Note de M. Bonjean	262	— Description et figure d'une nouvelle pompe, par MM. Lebot, Robert et Douget	293 et 696
ARITHMÉTIQUE — M. Auguste de Saint-Hilaire		ARITHMÉTIQUE — Note de M. Becquerel sur cette opération	154
		ARITHMÉTIQUE — Rapport sur divers Mémoires de M. Henry relatifs à des expériences sur les nombres, Rapporteur M. Caschky	84
		ARMES À FEU — Expériences supportées par des canons de fusil des fabriques de MM. Renette et Gestave, et de M. Albert Bernard	

<p>Note de M. Segur</p> <p>— M. Arago rend compte des expériences qui ont été faites à Vincennes, en sa présence et celle de M. Séguier avec la carabine D 1^{re}</p> <p>APPRENTI (Instruments d) — M. Casteron présente une nouvelle chaîne d'apprenteur</p> <p>AIR — Observations faites à l'occasion d'un travail sur l'arsenic publié par M. Jacquelin. Note de M. Persoz</p> <p>— <i>Impostes à l'arsenic</i> considérés comme <i>poisons</i>. Voir à ce dernier mot</p> <p>ANTARES (Logis et des) — Sur un cas de l'attribution de l'artère iliaque externe, Note de M. Malgaigne</p> <p>ARTICULÉS (ANIMAUX) Voir à Entomologie</p> <p>ASSAINISSEMENT des amphithéâtres de Liège et de Liège</p> <p>M. Moreau de M. Suquet</p> <p>— Voir aussi aux mots Des affection Les des es</p> <p>ATMOSPHERIQUE (PRESSION) — Sur l'emploi du lustre de la pression atmosphérique, Note de M. Fleury Vallat</p>	<p>Pages</p> <p>723</p> <p>725</p> <p>527</p> <p>254</p> <p>1059</p> <p>534</p> <p>263</p>	<p> Voir aussi aux mots <i>Chemins de fer</i> et <i>Machines à vapeur</i> Aurores boréales — Sur une aurore boréale observée à Parme le 8 décembre 1843 Lettre de M. Colla — Observations de M. Hureau relatives à l'aurore boréale du 22 octobre 1839 — <i>Météo es lumineux qui paraissent se attacher à la même cause que les aurores boréales</i> — Sur une disposition des nuages qui produit celle qui affectent les rayons lumineux dans l'aurore boréale et qui présente aussi la même orientation observation faite, dans la soirée du 23 juillet 1844, par MM. Arago et Lang — Sur la présence de ce minéral dans une roche fossilifère des Vosges, Note de M. Daubrée AZOTE — Rapport sur un Mémoire de M. Laugier relatif à la détermination de la présence de l'azote dans des quantités minimales de substances organiques. Rapport de M. Payen </p> <p>54</p> <p>128</p> <p>1118</p> <p>8</p> <p>2</p>
--	--	---

B

<p>BAROMETRIQUE — Note ayant pour titre « Perfectionnement des baromètres et des thermomètres » par M. Desguignes</p> <p>BAROMETRIQUES (OBSERVATIONS) — Sur les causes probables des irrégularités de la surface de niveau du globe terrestre des anomalies observées dans la hauteur de la colonne barométrique ramenée à cette même surface, etc. Mémoire de M. Hossard et Hossard</p> <p>— Sur l'antagonisme entre les variations diurnes et les oscillations mensuelles dans la hauteur du baromètre en France, Note de M. Marius</p> <p>BATEAUX A VAPEUR — Nouveau propulseur destiné aux bateaux à vapeur (roues à aubes courbes substituées aux roues à palettes planes) Mémoire de M. Boulmer</p> <p>— Note de M. Male concernant la navigation par la vapeur</p> <p>— Considérations sur les bateaux à vapeur, par M. Deniau</p> <p>BELEMNITES — De l'action que les belemnites exercent sur la lumière polarisée, Note de M. Jamus</p> <p>BREVETS — Sur les produits de la distillation du sulfure, de l'azote et du sulfazote de benzoïne, Note de M. A. Laurent</p> <p>BIBLIOTHIQUE DE L'INSTITUT — M. Jomard au nom de la Commission centrale adminis-</p>	<p>1001</p> <p>292</p> <p>440</p> <p>131</p> <p>204</p> <p>1134</p> <p>680</p> <p>187</p>	<p> trative, transmet le résultat du scrutin ouvert dans les différentes Académies pour la nomination d'un bibliothécaire en remplacement de feu M. Feuillel. Sur 164 votants, M. Landresse a obtenu 156 suffrages — M. Bédant au nom de la Commission centrale administrative, fait connaître le résultat du scrutin ouvert dans les différentes Académies pour la nomination d'un bibliothécaire. Sur 151 votants M. Maury a obtenu 112 suffrages BLOCS BRUTAIQUES Voir à Géologie BOIS — Recherches sur la composition élémentaire des différentes espèces de bois et sur le rendement annuel d'un hectare de forêts, par M. Chevalier — Rapport sur ce Mémoire, Rapporteur M. Dumas — Nouvelle Note sur un moyen destiné à assurer la conservation des bois, par M. Magon — M. Arago met sous les yeux de l'Académie divers échantillons de bois de chêne vert préparés par M. Werner au moyen d'un procédé particulier qui prévient le fendillement de ce bois et permet de l'employer dans l'ébénisterie BOTANIQUE — Addition à un précédent Mémoire sur la Clandestine d'Europe, par M. Duchertre </p> <p>154</p> <p>140</p> <p>243</p> <p>3-8</p> <p>526</p> <p>93</p>
---	---	---

	Page		Page
— Note sur l'embryogénie du <i>Tarus baccata</i> par M. de M. <i>Rebel et Spach</i>	214	concernant la structure et la fructification des genres <i>Cienodus Delisea et Lemnoria</i> de la famille des Floridées, Rapport leur M. <i>Ad Brongniart</i>	11
— Note sur l'Aponogon, par M. <i>Planchon</i>	227		
— Note sur la géographie botanique des en- vironnements de <i>Beziens</i> par M. <i>Duchartre</i>	254	— Rapport sur un tableau des limites de la végétation de quelques plantes sur le ver- vant occidental du Canigou présenté par par M. <i>A. Massot</i> Rapporteur M. <i>Ad Brongniart</i>	64
— Notice sur une Rubiacée du genre <i>Condu-</i> <i>muna</i> et sur le vernis qu'elle produit, par M. <i>Goudot</i>	260	— Sur la tendance des racines à s'enfoncer dans la terre et sur leur force de pénétra- tion. Note de M. <i>Ley</i>	903
— M. <i>Alph. Candolle</i> en présentant le 8 ^e volume de l'ouvrage commencé par son pre sous le titre de <i>P. od. systematicus</i> <i>regni vegetal</i> : donne une idée de ce travail et cette nouvelle par	484	— Note sur la structure de l' <i>Aldrovanda ves-</i> <i>iculosa</i> par M. <i>Parlatore</i>	998
— Monographie des Orchidées du Mexique par MM. <i>Rebel et Spach</i>	497	— Sur les Cédres de l'Atlas et l'emploi de leur bois dans les constructions maritimes l'Alger. Mémoire de M. <i>Boyd</i> et M. <i>Vincet</i>	1007
— Examen de quelques monstruosités végé- tales propres à cette région et la structure de leur tissu originel. Les auteurs par M. <i>Ad</i> <i>Brongniart</i>	513	— Mémoire sur les Isotomes, et les nouvelles espèces de cette famille, découvertes à Alger par M. <i>Boyd</i> et M. <i>Vincet</i>	1103
— M. <i>Goudot</i> lit un Mémoire intitulé Trois Notes relatives à la rotation faite dans la séance du 12 juin 1843 à la suite de la lecture du Mémoire de M. le Barbié, ayant pour titre Recher- ches anatomiques et phytologiques sur quelques végétaux monocotyles	51	BULLETIN BIBLIOGRAPHIQUE — 10 60 101 164 194 230 267, 317, 383, 444 474 535 596 660 712 794 840, 882 896 958 1018 1065, 1112 1152 et	1204
— Quatrième Note relative à la même pro- position	899 et	BUTYRÉ — Recherches concernant quelques produits qui dérivent de l'acide butyrique par M. <i>Chancel</i>	949 et 103
— Rapport sur un Mémoire de M. <i>Montagne</i>	922	Voir aussi à l'Académie de butyre que	

C

CADAVRES — Nouveau procédé pour la dis- section et la conservation des cadavres. Mémoire de M. <i>Dupré</i>	241	CALCULS ALGÈBRE — Sur l'évacuation arti- ficielle des débris des calculs urinaires et de leur pulvérisation, Note de M. <i>Leroy d'E-</i> <i>tollés</i>	47
— Reclamation de priorité élevée à l'occasion de cette communication, par M. <i>Mathon</i>	895	CALORIQUE — Sur la théorie élémentaire du calorique. Note de M. <i>Maistré</i>	864
— Addition adressée par M. <i>Dupré</i> à son pré- cedent Mémoire sur l'embaumement	932	Voir aussi au mot <i>Chaleur</i>	
— M. <i>Gagnage</i> présente un supplément à sa Note sur un nouveau procédé pour la con- servation des corps	422	CANCER — Addition à un précédent Mémoire sur la diathèse cancéreuse et sur le degré d'utilité des opérations chirurgicales dans le traitement de ces maladies, par M. <i>Leroy d'Étollés</i>	48
— Sur l'assainissement des amphithéâtres de dissection, et la conservation des pièces anatomiques et des cadavres, au moyen du chlorure neutre de zinc, Note de M. <i>Sacquet</i>	481 et 534	— Recherches statistiques sur la fréquence croissante des cancers, par M. <i>Tanchou</i>	828
— Sur les inconvénients qui peuvent résulter de l'emploi des poisons minéraux dans l'embaumement des cadavres, Note de M. <i>Lorriès de Val</i>	644	CANDIDATURE — M. <i>L. monsignor Lamoignon</i> pro- pose à l'Académie de vouloir bien le comprendre dans le nombre des Candidats pour la place de Correspondant vacante, dans la Section d'Economie rurale, par suite du décès de M. <i>Mathieu de Dombasle</i>	1173
— Lettre de M. <i>Caennal</i> à l'occasion de cette communication	792	— M. <i>Ordinaire de la Colonne</i> adresse une sem- blable demande	1182
CALCUL ÉLÉMENTAIRE — Nouvelle méthode d'en- seignement pour le calcul élémentaire, par M. <i>Nouet</i>	933	— M. <i>Bellenger</i> demande à être compris dans	

	Page		Page
le nombre des Candidats pour une place de Correspondant de l'Académie Section d'Anatomie et de Zoologie		resques d'Alger, Memoire de M. Bory de Saint-Vincent	1067
— Candidats presentes par la Section de Médecine et de Chirurgie pour une place de Correspondant vacante par la mort de M. Aitier (Cooper) 1 ^o M. Brodie 2 ^o M. Mott 3 ^o M. Dieffenbach 4 ^o M. Chelius 5 ^o M. Niemeyer 6 ^o M. Ribes	381	CENDRES — Analyses comparées des cendres laissées par les engrais et par les récoltes, Memoire de M. Bousingault	218
— Candidats presentes par la Section d'Anatomie et de Zoologie pour la place de Correspondant vacante par la mort de M. Jaccard 1 ^o M. Ch. Bonafant 2 ^o M. Yilison 3 ^o MM. Kirby et Ma. Leay 4 ^o MM. Deslongel an pset Gold fust 5 ^o MM. Dujardin et Macquart — Anatomistes 1 ^o M. Muller 2 ^o M. Carus 3 ^o MM. de Baer et Rathke 4 ^o MM. Delle Ch. aje et Valentin	445	CEPHALOTRIPSE — Exposé des résultats obtenus dans quatorze opérations de céphalotripse. Note de M. Baudelocque	526
— Candidats presentes par la Section de Géométrie pour la place de Correspondant vacante par la mort de M. Ivory 1 ^o M. Hamilton 2 ^o par ordre alphabétique MM. Lebeque Ostrogadsky Richlet et Steiner	443	CRAMES — Substitution de la poudre d'Algaroth à la cendre dans la peinture à l'huile. Note de MM. Baresset et Vallée	84
— Candidats presentes par la Section de Médecine et de Zoologie pour la place de Correspondant vacante par la mort de M. de Moll 1 ^o M. Marchion 2 ^o M. Haismann 3 ^o M. de Ch. pnt e 4 ^o (ex æquo) MM. Bou de Dechen F. veler Naumann Studei H. tchock d la Beche Crenonagh Lyell Sedgwick Simonda de Uau	534	CERVEAU — Sur l'absence de circonvolution dans le cerveau d'un Oulisti, Lettre de M. Pierquin	131
CANNE A SUCRE — Sur la composition chimique du vesu et de la canne creole de l'île de Cuba, Memoire de M. Casarica	150	CHALEUR — A l'occasion d'une Note recente de M. Melloni M. Couche adresse quelques considérations sur les phénomènes de chaleur et de lumière	31
— Rapport sur de Memoire Rapporter M. Bousingault	349	— Sur la chaleur produite par les combinaisons chimiques. Memoire de MM. Favre et Thiermann	61
CANONS DE FUSIL VOIR au mot Armes à feu		— Sur la chaleur dégagée dans l'hydratation de l'acide sulfurique. Memoire de M. Allard	888
CANONISME — Sur l'emploi du carbonate dans le traitement des difformités et des maladies du système dentaire, Note de M. de la Barre fils	377	CHAMRE — Memoire sur l'histoire naturelle et les propriétés thérapeutiques du charvre indien par M. L. autaud	113
CARTES GÉOGRAPHIQUES — M. Arago présente au nom de M. Baue Keller des cartes en relief et en couleur obtenues par un procédé de gaufrage qui permet de les donner à des prix modiques	528	CHARRIS préparés par des pi. codes micanju presentes par M. Autier	528 et 84
CATACTE — Sur le moyen proposé par feu le professeur Senon pour distinguer la cataracte de l'amaurose et de la glaucose, Mémoire de M. Magne	147	CHIMIE DE FER — Sur les moyens de diminuer les dangers des chemins de fer, Note de M. Goutt	5
— M. Sokolowski annonce avoir pratiqué avec succès l'opération de la cataracte sur un homme âgé de 104 ans	1160	— M. Faulcon à l'occasion d'une Note recente de M. Seguret sur des moyens destinés à diminuer les dangers des chemins de fer, écrit qu'il a lui-même proposé, dans le même but, l'emploi de roues horizontales pour les locomotives	16 d
CENES — Sur les ossements de l'Atlas et l'emploi de leur bois dans les constructions mau-		— M. Faulcon écrit qu'après avoir lu la Note de M. Seguret dont il n'avait connaissance que par un extrait incomplet, il reconnaît que la ressemblance entre les deux moyens de sûreté consiste seulement dans l'emploi de roues horizontales	54
		— Note sur des moyens destinés à diminuer les dangers des chemins de fer, par M. Vander Pant	38
		— Sur les moyens destinés à diminuer les dangers des chemins de fer, Note de M. Delpech	304
		— Sur un moyen destiné à prévenir la rupture des caisses dans les locomotives employées sur les chemins de fer, Note de M. Boulmier	378
		— M. Garret prie l'Académie de hâter le travail de la Commission à l'examen de laquelle a été renvoyée une Note qu'il a adressée, en 1842, sur des caisses de sûreté	

	Page		Page
pour les voitures des chemins de fer	711	— M. <i>Sokolowski</i> annonce avoir pratiqué avec succès l'opération de la cataracte sur un homme âgé de 104 ans	1164
— Description et modèle d'un l'âti à essieux con vergents pour les locomotives et les wa gons des chemins de fer présentés par M. <i>Sorinet de Tournefort</i>	893 et 933	— Sections tendineuses et musculaires dans le traitement de certaines difformités. Voir au mot <i>Orthopédie</i>	
— Considérations sur les chemins de fer, les locomotives, les bateaux à vapeur par M. <i>Demaux</i>	1132	CHLORE — Action du chlore sur les éthers	
— Mémoire de M. <i>Chopineaux</i> sur diverses questions relatives aux chemins de fer	933 et 1108	— Note de M. <i>Malagut</i>	-
— Considérations sur les chemins de fer, et plans relatifs à des changements proposés pour diverses parties du système générale ment suivi aujourd'hui par M. <i>Siège</i>	124	— M. <i>Artus</i> adresse une Note ayant pour titre l'expli cation des résultats obtenus par M. <i>Pelouse</i> relativement aux actions de l'oxyde rouge de mercure sur le chlore	1063
M. <i>Hall</i> se présente l'emploi d'un nou veau système de fermeture pour le tube pneumatique des chemins de fer dits che mins atmosphériques	126	— Voir aussi au mot <i>Chlore</i>	
— Reclamations de priorité adressées à l'oc ca sion de cette présentation, par M. <i>Demaux</i>	382	CHLOROPH — Mémoire sur le <i>Chloroph</i> des c riales par M. <i>Gérard Meneville</i>	114
— Nomination d'une Commission chargée de l'examen des différentes pures relatives aux chemins de fer à pression atmosphé rique	481	CHLOROPH — Sur les fonctions de la putréfaction des substances animales	34
— M. <i>Dembinski</i> adresse les pures relatives à cette réclamation M. <i>Arago</i> à cette occa sion annonce qu'il a entre les mains des documents que M. <i>Hall</i> lui a remis à l'appui de ses prétentions à la priorité d'invention	1062	— Note de M. <i>Sacquet</i>	481 et 34
— Présentation des pièces justificatives de M. <i>Hall</i> à la séance du 17 juin	1132	CHLOROPH — Not sur le sulfate chromique par M. <i>Kopp</i>	114
— Sur un nouveau système de fermeture pour le tube pneumatique des chemins de fer à pression atmosphérique, par M. <i>Gamon</i>	422	CHYLE — Sur la coloration du chyle par la garance. Note de M. <i>Bousson</i>	834
— Nouveaux systèmes de locomotion sur les chemins de fer au moyen de l'air comprimé ou de l'air raréfié par MM. <i>Pecqueur-Lambaux</i> et <i>Bontemps</i>	1131	CHYLIFÈRES (VAISSEAUX) — Sur les fonctions des vaisseaux chylifères et des veines ex périmentées faites au moyen de l'introduc tion dans l'économie animale de com posés arsenicaux et antimoniaux. Mémoire de M. <i>Chatin</i>	3
— A l'occasion de cette communication, M. <i>Payerne</i> annonce qu'il est en mesure de présenter un moteur qui fonctionne à vo lonte par l'air comprimé ou par l'air ra réfié	1193	CHYLE — Sur l'ancien rôle de l'usage du cidre en Normandie, Lettre de M. <i>Gardner</i> à M. de Gasparin	1194
— Nouveau système de propulsion atmosphé rique pour les voitures des chemins de fer, proposé par M. <i>Fasicon</i>	754	CIRCULATION — De la formation des organes de la circulation et du sang chez les ani maux vertébrés. Mémoire de MM. <i>Poulet</i> et <i>Lebert</i>	88
CHIMIE ORGANIQUE — Rapport verbal sur le Précis de chimie organique de M. <i>Ghe rard</i> , Rapporteur M. <i>Dumas</i>	809	— Observations microscopiques sur le mou vement des globules du sang, chez une grenouille soumise à l'action d'un courant galvanique. Note de M. <i>Ducros</i>	1193
CHIRURGICALES (OPÉRATIONS) — Application d'un nouveau procédé opératoire pour l'ablation d'une partie de la base de la langue. Note de M. <i>Schliet</i>	302	CLANDESTINE à L'EUROPE — Addition à un pré cédent Mémoire sur cette plante, par M. <i>Duchartre</i>	93
— Sur un cas de ligature de l'artère iliaque externe, Note de M. <i>Malgaigne</i>	1053	CLASSIFICATIONS — Aperçu d'une nouvelle classification ornithologique fondée sur des considérations tirées de l'os palatin. Mémoire de M. <i>Cornay</i>	91
		— Application des faits de l'embryogénie à la classification des animaux, Mémoire de M. <i>Milne Edwards</i>	216
		— Essai d'une nouvelle classification des Pro celaridées, Mémoire de MM. <i>Jacquinet</i> et <i>Hembron</i>	353
		CLIMATS — Recherches sur le climat de la France, par M. <i>Fuster</i>	18
		— Remarques à l'occasion d'un passage de ce Mémoire, par M. <i>Raulin</i>	157
		— Réponse de M. <i>Fuster</i> aux remarques de M. <i>Raulin</i>	191

	Page		Page
— Nouvelle Lettre de M. Raulin sur le même sujet	381	COMMISSION ADMINISTRATIVE DE L'ACADEMIE DES SCIENCES — MM. Poncelet et Bréguet sont nommés membres de la Commission administrative pour l'année 1844	2
— Rapport sur le Mémoire de M. Fuster, Rapporteur M. de Gasparin	1087	COMMISSION CENTRALE ADMINISTRATIVE — M. Jomard au nom de cette Commission, transmet le résultat du scrutin ouvert dans les différentes Académies, pour la nomination d'un bibliothécaire au remplacement de feu M. Feuillel sur 164 votants, M. Lande a obtenu 156 suffrages	4
(CHIMIE) — Alcali végétal extrait du chardon — Note de M. Bouchardat, sur les propriétés optiques de cette substance et de quelques autres alcalis végétaux	298	— M. Bréguet au nom de la Commission centrale administrative, fait connaître le résultat du scrutin ouvert dans les différentes Académies pour la nomination d'un sous bibliothécaire. Sur 151 votants, M. Maury a obtenu 112 suffrages	12
(LAIS) — Recherches sur le Colaspis atrata par M. Joly	368	COMMISSION POUR LA REVISION DES COMPTES DE L'ANNEE 1843 Commissaires, MM. Poncelet, Thenard	111
(LANTES (MÉTALLIQUES)) — Sur un procédé au moyen duquel on obtient la matière colorante du test de l'écrevisse. Note de M. de Grote	414	COMMISSIONS DES PRIX pour le concours de 1843	
COLORATION des métaux par les procédés électriques. Voir au mot <i>Électricité</i>		— Grand prix de Mathématiques Commissaires MM. Liouville, Binet, Arago, Poncelet, Cauchy	313
(COMBINAISONS CHIMIQUES) — Sur la chaleur produite par les combinaisons chimiques, Mémoire de MM. Favre et Silbermann	695	— Grand prix de Sciences physiques (question concernant le développement des têtus chez les oiseaux et les reptiles) Commissaires, MM. Serres, de Blainville, Flourens, Velpéau, Dumeril	18-
— Sur la chaleur dégagee dans l'hydratation de l'acide sulfurique, Note de M. Arago	888	— Grand prix des Sciences physiques (question concernant le mécanisme de la production de la voix chez l'homme) Commissaires MM. Babinet, Magendie, Flourens, Pouillet, de Blainville	11 d
(COMÉTES) — Éléments de la comète découverte par M. Faye le 22 novembre 1843, Notes de M. Plantamour	56 et 309	— Grand prix des Sciences physiques (question concernant l'examen comparatif de l'organe de la voix chez l'homme et chez les animaux mammifères) Commissaires MM. de Blainville, Serres, Flourens, Magendie, Dumeril	16 d
— Éléments de la même comète calculés par M. Vals	57	— Prix de Médecine et Chirurgie (fondation Montyon) Commissaires, MM. Andral, Velpéau, Roux, Rayer, Dumeril, Serres, de Blainville, Breschet, Magendie	Ibid
— Communications faites par M. Arago dans la séance du 15 janvier relativement à la comète de M. Faye	96	— Prix de Mécanique Commissaires, MM. Probert, Poncelet, Morin, Gambois, Dupin	47
— Éléments elliptiques de cette comète orbitale calculée par M. Faye comparée à celle qu'avait donnée M. G. Goldschmidt	186	— Prix de Physiologie expérimentale MM. Flourens, de Blainville, Serres, Magendie, Dumeril	Ibid
— Éléments elliptiques de la comète de M. Faye par M. Goldschmidt	528	— Prix d'Astronomie (fondation Lalande) Commissaires, MM. Arago, Mathieu, Laguerre, Damoiseau, Mauvais	Ibid
— Lettre de M. Vals sur la comète de M. Faye	564	— Prix concernant les Arts insalubres Commissaires, MM. Payen, Dumas, Pelouze, Rayer, Thenard	679
— M. Cauchy annonce, à cette occasion, des recherches de M. Le Verrier sur la comète de 1770	517	— Prix de Statistique Commissaires, MM. Francœur, Mathieu, Dupin, de Gasparin, Pouillet	72-
— M. Arago revient sur ce qu'il avait dit dans une précédente séance relativement aux recherches de M. Faye sur les perturbations produites dans les orbites de certaines comètes par l'action de Jupiter	768		
— Sur la comète observée par M. Faye, et sur les motifs qui portent à la considérer comme étant la même que la comète de Lexell, Lettre de M. Le Verrier à M. Cauchy	826		
— Nouvelles recherches relatives à la comète de M. Faye. Lettre de M. Vals	942		
— M. Gauss annonce qu'il Pulkowa n'a pu observer cette comète jusqu'au 10 avril, et qu'on la a encore aperçue le 16 du même mois	943		
— Observations de la grande comète de 1843, faites à Buenos-Ayres, par M. Scutellon	532		
— Sur les perturbations dans le mouvement des comètes dues à la résistance de l'éther, Mémoire de M. Bessel Riset	262		

	Page		Page
COMMISSIONS NOMMÉES par l'adjonction ou le remplacement de quelques membres — D'après la demande des Commissaires chargés de l'examen d'un clepsydre présentée par M. Fyrlas M. Desprez est adjoint à la Commission	187	l'avancement des sciences s'ouvrira dans la ville d'York, le 26 septembre 1844	82
— M. Brochet est remplacé par M. Serres dans la Commission chargée de l'examen d'un Mémoire de M. Deleau sur les corps entroverts ou formés dans l'oreille moyenne	422	— Remarques de M. Dumas à l'occasion de cette communication	Ibid
— M. Morin remplace feu M. Corioli dans la Commission nommée pour un Mémoire de M. Reisch sur l'action de la vapeur	Ibid	COSMOLOGIE — M. Lobell annonce l'envoi prochain d'un travail qu'il désigne comme l'introduction à une « nouvelle cosmogonie basée uniquement sur l'attraction »	711
— M. Dutrochet est adjoint à la Commission de la gélatine	532	— Lettre sur le système du monde, par M. Jaffard	Ibid
— M. Magendie demande à être remplacé dans la Commission de la gélatine	564	COW POX — Communication relative à un cas de cow pox et à l'inoculation de la matière des pustules sur plusieurs enfants, Note de M. Magendie	986
— M. Roux remplace M. Brochet, absent, dans la Commission chargée de l'examen d'un lith truteur présenté par M. Guillon	934	— Cow pox naturel provenant d'une vache appartenant à M. Magendie, — développement de nombreuses pustules chez deux femmes variolées chargées de la traire, — inoculation de la matière des pustules de la vache à des enfants, et développement sur l'un d'eux d'une vraie vaccine, Mémoire de M. Faid	Ibid
— Et dans la Commission chargée de faire un Rapport sur l'appareil de M. Baudens pour les fractures du col du fémur	Ibid	CRYPTOCULLES — Observations cryptoculaires faites en Suisse à une élévation de 2680 mètres au dessus de la mer, Note de M. Bravais	727
COMMISSIONS SPÉCIALES — Commission chargée de déterminer la question à proposer pour le grand prix des Sciences physiques de 1845	218	CAUSTIQUES — Note sur des cristaux à surface creuse par M. Fournet	737
Commissaires, MM de Blainville le Mirbel, Dumas Flourens, Milne Edwards		CAVOUR — De la trachéotomie pratiquée dans la période extrême du croup, Mémoire de M. Scoutetten	21
Commission chargée de déterminer la question à proposer pour le grand prix des Sciences mathématiques de 1845	240	— M. Hatin annonce l'envoi prochain d'un Mémoire destiné à prouver que l'on peut s'affranchir de la nécessité de pratiquer, dans les cas de croup, l'opération de la trachéotomie, en recourant à temps à la cautérisation de l'arrière gorge par le nitrate d'argent	163
Commissaires MM Blot Arago Liouville Poinsot Sturm		CARYOPAGES — Recherches sur les cryptogames qui constituent la maladie contagieuse du cuir chevelu connue sous les noms de teigne tondante, Herpes tonsurans etc, par M. Gruby	583
Commission chargée de déterminer par des expériences, si le platine travaille par le procédé de M. Joannety ou subit pas quel que altération par suite d'une immersion dans l'eau	367	— Sur des plantes caryopagiques qui se développent en grande abondance dans l'estomac d'une malade atteinte de difficulté de la digestion, sans rétrécissement de l'oesophage, Note de M. Gruby	586
Commissaires, MM Blot Arago Liouville Poinsot Sturm	894	— Sur une coloration singulière observée dans la polenta de maïs et causée par le développement d'un cryptogame Note de M. Bizio	591
Commission chargée de déterminer par des expériences, si le platine travaille par le procédé de M. Joannety ou subit pas quel que altération par suite d'une immersion dans l'eau	537	CIVITAS — Sur la réduction partielle du biocryde de cuivre par la chaleur, et sur le nouvel oxyde qui en résulte, Mémoire de MM. Favre et Mauwaut	618
Commissaires, MM Blot Arago Liouville Poinsot Sturm	679	— Sur l'hydrure de cuivre, Note de M. Wurtz	72
CONCOURS SCIENTIFIQUES — MM. Murchison et Sabine annoncent que la quatorzième réunion de l'Association britannique pour			

D

	Pages		Pages
INCIDENTS — Mémoire sur les débordements du Rhône par M. de Gasparin	104	DÉSINFECTION — M. Gagnage prie l'Académie de se faire rendre compte d'un procédé qu'il a imaginé pour la désinfection des fosses d'aisances	381, 422 et 534
Voir aussi au mot Rhône		— M. le Préfet de police demande communication d'un Rapport qui a été fait à l'Académie sur un procédé de désinfection des fosses d'aisances proposé par M. Soret	1109
ŒUVRES DE MEMBRES ET DE CORRESPONDANTS DE L'ACADÉMIE DES SCIENCES — M. de Haldat annonce la mort de M. Mathieu de Dombasle Correspondant pour la Section d'Économie rurale décédé le 28 décembre 1843	4	DIABÈTE — Aperçu théorique sur la cause de la maladie désignée sous le nom de diabète par M. Miabie	707
— M. Libri annonce la mort de M. Fossombrou, Correspondant de l'Académie pour la Section de Mécanique	755	— M. Pelouze, à l'occasion de cette communication, fait remarquer que MM. Bernard et Berresmi ont déjà observé que le sucre injecté dans le sang passe sans modification dans les urines, tandis qu'on ne l'y retrouve plus quand il a été préalablement dissous dans le suc gastrique	Ibid
— M. Faisan, Fossombrou annonce officiellement à l'Académie la mort de M. Fossombrou, son beau père, décédé le 13 avril 1844	936	DIGESTION — De l'influence des nerfs de la huitième paire sur les phénomènes chimiques de la digestion, recherches expérimentales de M. Bernard	355
— M. C. Dupin en qualité de Président, annonce dans la séance du 24 juin la perte que vient de faire l'Académie dans la personne de M. E. Geoffroy Saint-Hilaire membre de la Section d'Anatomie et de Zoologie décédé le 19 juin 1844	1163	Voir aussi plus haut au mot Diabète	
DENTS — Sur les moyens de prévenir et de corriger les vices de la seconde dentition par MM. Désirade père et fils	152	DILUVIENS (PÉRIODES) Voir au mot Géologie	
— Sur l'emploi de caoutchouc dans le traitement des difformités et des maladies du système dentaire Note de M. de la Barre fils	377	DIOIRIQUES (ROCHES) — Mémoire minéralogique et géologique sur les roches dioritiques de la France occidentale, par M. R. vère	1184
— Note pour faire suite à un Mémoire sur les moyens de prévenir ou de corriger les défauts de la seconde dentition, par M. Lafousson	Ibid	DIPTÈRES — Note sur la composition chimique et sur les formes cristallines du diptère par M. Deless	944

E

EAU — Examen de quelques expériences sur la décomposition de l'eau par la pile, et sur les conséquences qui se déduisent des faits observés dans cette circonstance, Note de M. Paret	823	de Soult les Bains par M. Kopp	875
EAU à l'état de vapeur — Recherches sur la force élastique de la vapeur aqueuse, par M. Regnaud	537	ÉCLIPSES DE L'EAU Voir plus haut au mot Eau	
— Observations faites dans les Alpes sur la température d'abaissement de l'eau, par MM. Pelletier et Bravais	572	ÉCLIPSES — Observations relatives à l'éclipse totale de lune du 31 mai 1844, communication de M. Arago	119
— Sur la cause des différences existant entre les résultats de ces expériences et ceux des expériences de cabinet; Lettre de M. Pelletier	768	ÉCLIPSES — M. Jobard écrit que le musée de Bruxelles possède depuis longtemps le modèle d'une éclipse dont le principe est peu différent de celle qu'a proposée M. Fournayron et que des éclipses construites sur le même principe sont en usage en plusieurs parties de la Hollande	58
Eaux minérales — Analyse de l'eau minérale		— Remarques de M. Arago à l'occasion de cette Lettre	Ibid
		ÉCOLE POLYTECHNIQUE — M. le Ministre de la Guerre annonce que M. Duhamel, l'un des	

	Page		P
candidats présentés par l'Académie pour la place de directeur des études de l'École Polytechnique, vient d'être nommé à cette place	3-8	— Recherches sur la concentration de la force magnétique vers les surfaces des corps magnétisés par M. de Haldat	843
— MM. <i>Thémar Poncelet Poncelet</i> sont désignés pour faire partie du Conseil de perfectionnement de l'École Polytechnique pendant l'année scolaire 1844	523 et	— Mémoire sur les causes de l'altération de la force magnétique par le même	971
— M. le Ministre de la Guerre invite l'Académie à lui présenter une liste de candidats pour la place d'examineur permanent vacante à l'École Polytechnique par suite de la nomination de M. <i>Dukamel</i> à la place de directeur des études à cette École	537	— Sur la conductibilité de la terre pour le courant électrique Lettre de M. <i>Matiucci</i>	1032
ECONOMIE RURALE — Mémoire ayant pour titre : Institutions rurales pouvant être considérées comme une amélioration importante en Agriculture par M. <i>Lemoine Lamotte</i>	109	— Sur l'aimantat on obtenue au moyen d'une hélice de fil de cuivre parcourue par un courant voltaïque Note de M. <i>Du Jard</i>	1110
— Projet d'une école élémentaire d'Agriculture par M. <i>Carnigues Descombes</i>	823	— Observations microscopiques sur le mouvement des globules d'anguilles une greffe soumise à l'action d'un courant galvanique Note de M. <i>Ducros</i>	1193
ÉCRIVAIN — Sur le procédé par lequel on obtient la matière colorante d'indigo de la cravasse Note de M. de Grole	378	ELECTRICITÉ ANIMALE — Nouvelles expériences d'électricité animale par M. <i>Matiucci</i>	443
ELASTICITÉ — Rapport sur deux Mémoires de M. <i>Wertheim</i> ayant pour titre : « Recherches sur l'élasticité » Rapporteur M. <i>Babnet</i>	444	— MM. <i>Thilorier</i> et <i>Lafontaine</i> écrivent relativement à l'action que suivant eux le fluide nerveux de l'homme peut exercer sur le galvanomètre	1109 et 1112
ELECTRICITÉ — Sur la question de priorité d'invention relativement aux piles formées de zinc et de charbon Lettre de M. <i>Itte</i>	58	ÉLECTROCHIMIE (DECOMPOSITIONS) — Sur les lois qui président à la décomposition électrochimique des corps Mémoire de M. <i>Ed. Becquerel</i>	362
— Remarques de M. <i>Regnaud</i> à l'occasion de cette Note	59	ÉLÉPHANTIASIS — Mémoire sur l'éléphantiasis des Grecs affection qui depuis un demi-siècle régnait endémiquement dans une des parties littorales de la Norvège par M. <i>Daussen</i>	388
— Sur la coloration des métaux au moyen de dépôts successifs de peroxyde de plomb opérés par l'électricité voltaïque Mémoire de M. <i>Becquerel</i>	97	EMBALEMENT VOIR au mot <i>Cadavres</i>	
— De la précipitation des métaux sur d'autres métaux par M. <i>Becquerel</i>	449	EMBRYOGENE ANIMAL — Application des faits de l'embryogénie à la classification des animaux Mémoire de M. <i>M. les Edouards</i>	18
— Note sur l'argenteure électrochimique par M. <i>Becquerel</i>	534	— M. <i>Flourens</i> présente au nom de l'auteur M. <i>Coste</i> une nouvelle livraison de « Histoire générale et particulière du développement des corps organisés » et appelle l'attention sur quelques uns des faits que cette livraison est destinée à faire connaître	264
— Réclamation de priorité élevée relativement à quelques uns des faits mentionnés dans cette Note Lettre de M. <i>Levol</i>	708	— M. <i>Flourens</i> en présentent un opuscule de M. le professeur <i>Renaud</i> sur le développement du poulet, appelle l'attention sur quelques uns des faits nouveaux indiqués par l'auteur	823
— Note de M. <i>Becquerel</i> en réponse à cette réclamation	715	— Remarques de M. <i>Serres</i> à l'occasion de cette communication	164
— Réplique de M. <i>Levol</i>	837	— M. <i>Roux</i> annonce qu'il avait été chargé de présenter, pour le concours de Physiologie expérimentale, un Mémoire de M. <i>Bichat</i> sur l'embryogénie du chien, Mémoire terminée depuis longtemps, mais qui n'est arrivée à Paris qu'après la clôture du concours	1110
— Études de photométrie électrique par M. <i>Mason</i>	289	EMBRYOGENE VÉGÉTALE — Note sur l'embryogénie in <i>Tamus bacata</i> par MM. de <i>Murbei</i> et <i>Spach</i>	114
— Note sur un nouvel appareil galvanométrique, par M. <i>Dujardin</i>	469	EMPOISONNEMENTS — Mémoire sur l'empoisonnement	160
— Nouvelle communication de M. <i>Mellon</i> relative aux recherches de MM. <i>Palmieri</i> et <i>Santi Lini</i> sur les courants d'induction de la terre	762		
— Sur un nouvel appareil magnéto-électrique Note de M. <i>Dujardin</i>	837		

	Page
nement par le plomb, suivi de quelques considérations sur l'absorption et la localisation des poisons, par MM. <i>Danger et Flaudon</i>	177
-- M. <i>Bodichon</i> demande l'autorisation de reprendre un Mémoire sur l'empoisonnement par le bioxalate de potasse, Mémoire présenté par lui et sur lequel il n'a pas été fait de Rapport	192
ÉCHAUDÉ. — Analyses comparées des cendres laissées par les engrais et par les récoltes, Mémoire de M. <i>Bousungault</i>	218
ENGRAISSEMENT. — Expériences sur l'engraissement des oies, Mémoire de M. <i>Perce</i>	245
ENTOMOLOGIE. — Histoire des métamorphoses et de l'anatomie du <i>Phlebotomus</i> , par M. <i>Léon Dufour</i>	233
-- Recherches sur les mœurs, les métamorphoses, l'anatomie et l'embryogénie du <i>Colaspis atra</i> , petit Coléoptère qui ravage les luzernes du midi de la France, suivies de l'indication des procédés à employer pour sa destruction; par M. <i>Joly</i>	368
-- Histoire des Phrynides, Scorpionides, Solpugides, Phalangides et Acarides, par M. <i>Gervais</i>	422
-- Rapport sur ce travail, Rapporteur M. <i>Duméril</i>	649
-- Recherches sur les transformations des appendices dans les Articulés, Mémoire de	

	Page
M. <i>Brullé</i>	655
-- Histoire des genres <i>Pediculus</i> , <i>Ricinus</i> , <i>Pallex</i> , <i>Podura</i> , par M. <i>Gervais</i>	821
-- Sur les Tenthrédes de la vigne, sur un Hyménoptère dont la larve vit dans le canal médullaire du mûrier, etc.; Lettre de M. <i>Vallot</i>	1192
ÉRYTHÈME. — Sur la structure des deux épithéliums des membranes muqueuses du canal intestinal; Note de M. <i>Mandi</i>	889
-- Sur l'épithélium des Zoospermes; par le même	891
-- Remarques de M. <i>Pouchet</i> relativement à une réclamation qui le concerne dans la Note précédente	1016
ESSEUX. — Sur un moyen destiné à prévenir la rupture des cales des locomotives sur les chemins de fer; Note de M. <i>Boulmier</i>	378
ÉTHER. — Action du chlore sur les éthers; Note de M. <i>Malaguti</i>	7
-- Sur la décomposition de l'éther hydriodique par la chaleur, Note de M. <i>Kopp</i>	871
-- Action de l'ammoniaque sur l'éther butyrique; Note de M. <i>Chancel</i> sur la butyrene	949
ÉTOILES FILANTES. — Nouveau Mémoire sur la part qu'on peut tirer de l'observation des étoiles filantes pour prédire, quelques jours d'avance, les changements de temps, par M. <i>Coulvier-Gravier</i>	289

F

FALÈNE. — Sur la composition de la falène pour les potées et pannes de cheminée, Note de M. <i>Barral</i>	371
FÉCONDATION. — Nouvelles recherches concernant la théorie de la fécondation chez les Mammifères, par M. <i>Pouchet</i>	590
-- M. <i>Idore Geoffroy-Saint-Hilaire</i> , à l'occasion de cette présentation, déclare que M. <i>Pouchet</i> lui a communiqué, il y a près de deux ans, les faits et les idées qu'il a depuis exposés dans sa « Théorie positive de la fécondation des mammifères »	591
FÉCULE. — Sur les phénomènes de polarisation produits à travers les globules féculés; Note de M. <i>Biot</i>	795
FÉMENTATION. — Note sur la fermentation acétique, par M. <i>Blondeau de Carville</i>	695
-- Mémoire sur la composition des différents espèces de ferments alcooliques; par M. <i>Boucharde</i>	1120
FÉMENTS. Voir ci-dessus au mot Fermentation.	
FIBREUX (CORNE). — Mémoire sur la théorie des corps fibreux, par M. <i>Fabry</i>	1801

FIBRINE. — Sur la transformation de la fibrine en acide butyrique; Note de M. <i>Warts</i>	704
FIEVRES. — Sur l'hypertrophie de la rate dans les fièvres intermittentes, Mémoire de M. <i>Cornay</i>	95
-- Sur les sources des miasmes qui occasionnent les fièvres intermittentes à Rochefort (Charente-Inférieure); par le même. <i>Ibid</i>	
FLAIRES de sang des chiens. Voir au mot Sang.	
FILONS. — Sur l'état de surfusion du quartz dans les filons métallifères; Note de M. <i>Fournet</i>	1050
-- Sur quelques faits qui viennent à l'appui de la théorie des filons de M. <i>Fournet</i> ; Note de M. <i>A. Lacroix</i>	1201
FILTRES. — M. <i>Nagelm</i> met sous les yeux de l'Académie le modèle d'un filtre pour l'épuration des eaux, imaginé par M. <i>Boussem</i>	591
FLEXION. — Rapport sur une Note de M. <i>Le-marie</i> , relative à la flexion des pièces chargées debout; Rapporteur M. <i>Léonville</i>	82

	Page.	Page.
FLINT-GLASS. Voir au mot <i>Verres</i> .		
FLORENS. — Rapport sur un Mémoire de M. <i>Montagne</i> concernant la structure et la fructification des genres <i>Ctenodus</i> , <i>Delosia</i> et <i>Lenormandia</i> , de la famille des Floridées, Rapporteur M. <i>Ad. Brongniart</i> .	644	
FORÊTS. — Recherches sur la composition élémentaire des différents bois, et sur le rendement annuel d'un hectare de forêts, par M. <i>Chevandier</i> .	140	
— Rapport sur ce Mémoire, Rapporteur M. <i>Dumas</i> .	283	
FOSSES (OSSEMENTS). — Note sur des ossements fossiles de poissons qui se trouvent dans le département de la Gironde, par M. <i>Pedroni</i> .	594	
— Sur des ossements humains trouvés dans un bloc de calcaire marneux, aux environs d'Alais, et considérés comme fossiles, Lettre de M. <i>Robert</i> .	1059	
— Remarques de M. <i>Morreau de Jonès</i> à cette occasion prétendu fossile humain de la Guadeloupe.	1060	
FOSSES (POISSONS). — Lettre de M. <i>Chabrilas</i> sur un gisement de poissons fossiles dans la province de Ceará, au Brésil.	1007	
— Sur les poissons fossiles adressés du Brésil par M. <i>Chabrilas</i> ; Note de M. <i>Agassiz</i> .	1007	
— M. <i>Agassiz</i> demande que son ouvrage sur les poissons fossiles, dans lequel il a eu occasion de traiter plusieurs grandes questions de physiologie générale, en s'appuyant sur les faits d'observation qui font l'objet principal de ses recherches, soit admis au concours pour le prix de Physiologie expérimentale.	1109	
FOURNAUX. — M. <i>Arago</i> donne quelques détails sur un coup de foudre qui a frappé récemment le clocher de la cathédrale de León, et fait ressortir l'intérêt qu'il pourrait y avoir pour la science à obtenir sur ce fait des renseignements bien authentiques.	894	
— Lettre de M. <i>Van-Cleeputte</i> relative à cet événement.	1062	
— M. <i>Arago</i> communique, d'après un journal que lui a transmis M. <i>de la Pylas</i> , quelques détails sur un coup de foudre qui a frappé le clocher de l'église de Gracoe.	1062	
FRACTURES. — M. <i>Baudens</i> demande que la Commission à l'examen de laquelle a été renvoyé son nouvel appareil pour les fractures du témur veuille bien constater l'état d'un malade sur lequel il va faire l'application de cet appareil.	838	
G		
GALVANISME. Voir au mot <i>Électricité</i>		
GALVANOGRAPHIE et GALVANOPLASTIQUE. — M. <i>Flourens</i> met sous les yeux de l'Académie une gravure en taille-douce imprimée avec une planche qui avait été obtenue au moyen des procédés galvanographiques de M. <i>Kobell</i> .	97	
— MM. <i>Thayer et Weidelt</i> envoient de Vienne divers spécimens d'estampes en taille-douce imprimées avec des planches obtenues au moyen des procédés galvanoplastiques ou au moyen de la galvanographie.	311	
— Précipitation des métaux sur d'autres métaux, communications de M. <i>Bequerel</i> .	197, 449, 554	215
— Lettres de M. <i>Levy</i> concernant une réclamation de priorité pour quelques-unes des faits cités dans les communications de M. <i>Bequerel</i> .	708 et 837	
GALVANOMÈTRES. — M. <i>d'Hombres-Firmas</i> adresse la description d'un galvanomètre multiplicateur construit par M. <i>Majocchi</i> , de Milan.	163	
GARANCES. — Sur la coloration du styrac par la garance; Note de M. <i>Boulsson</i> .	835	
GAS DES HAUTS FOURNEAUX. — Recherches sur la composition des gaz produits dans les opérations métallurgiques, par M. <i>Ekémen</i> .	364	
GAS DÉTONANTS. — Détonation d'un mélange gazeux explosible substituée à l'action de la vapeur pour la propulsion des navires, Mémoire de M. <i>Selligues</i> .	1037	
— Sur la proposition de la Commission chargée d'examiner les pièces admises au concours pour le prix concernant les arts insalubres, une somme de deux mille francs est accordée, à titre d'encouragement, à M. <i>Chard</i> pour son appareil destiné à faire prévoir la formation de gaz détonants, soit dans les mines, soit dans les lieux où l'on emploie le gaz d'éclairage.	324	
GASOMÈTRES. — Détails sur les effets de l'explosion d'un grand gasomètre qui a eu lieu à Paris le 30 avril 1844.	880	
GÉLATINE. — Extrait du Rapport de la première classe de l'Institut royal des Physiques à M. le Ministre de l'Intérieur, sur les qualités nutritives de la gélatine; adressé par M. <i>Vreldt</i> .	423	
— Lettre de M. <i>d'Arès</i> à l'occasion de ce Rapport.	482	

- Lettre de M *Bagnas* à M *d'Arcet* touchant le même Rapport 53a
- M *Gay Lussac* à cette occasion, rappelle que la Commission nommée par l'Académie se propose d'occuper de cette question à la séance du 10 mai prochain 105
- M *Thenard* président de la Commission fait connaître les causes de ce retard — Sur la demande de M *Thenard* M *Dutrochet* est adjoint à la Commission 53a
- M *Nagende* demande à être remplacé dans cette Commission 564
- (GEOGRAPHIE) — Aperçu topographique sur les terres et les glaces australes, par M *Hombrohn* 2
- (GEOGRAPHIE BOTANIQUE) — Mémoire sur la géographie botanique des environs de Béziers, par M *Declarie* 254
- Rapport sur un tableau des limites de la végétation de quelques plantes sur le versant occidental de Canguo présenté par M *Mazot* Rapporteur M *Ad Brongniart* 647
- (GÉOLOGIE) — Vues et coupes du cap de la Hève avec indication des roches organiques qui se trouvent dans ce terrain, par M *Lesueur* 227
- Observations sur les parties arrondies que présentent en Suisse les flancs des montagnes déductions tirées de ces observations relativement au transport des blocs erratiques Note de M *Desor* 305
- De l'influence de la pression dans les phénomènes géologiques chimiques, Note de M *Fournet* 403
- Sur les terrains diluviens du revers méridional des Alpes, par M *de Colligny* 523
- Sur divers phénomènes diluviens observés dans le département de l'Ariège et quelques vallées voisines, par M *Dupont* 743
- Mémoire sur quelques faits minéralogiques et géologiques nouveaux, par M *Bertrand de Lom* 822
- Exploration géologique d'une partie très-peu connue de la Turquie d'Europe, par M *Chamcourtois* 827
- Sur la présence de l'axinite dans une roche fossilifère des Vosges, Note de M *Dauville* 870
- Lettre de M *Chabrilas* sur le gisement des poissons fossiles de la province de Caura, au Brésil 1007
- Rédaction d'une carte géologique de l'Italie, par M *de Colligny* 1029
- Sur l'état de surfusion du quartz dans les roches éruptives et dans les filons métallifères Note de M *Fournet* 1050
- Sur quelques faits qui viennent à l'appui de la théorie des filons de M *Fournet* Note de M *A. Laurent* 1201
- Sur des ossements humains trouvés dans un bloc marneux aux environs d'Alais Lettre de M *Robert* 1059
- M *Morvan de Jonnes* rappelle, à cette occasion, les fausses deductions que l'on avait tirées de la découverte faite à la Guadeloupe d'un squelette d'homme dans un conglomérat formé près de la mer 164
- Description géologique du Tigré et du Semen (Abyssinie), par MM *Galmeret* et *Ferret* 1151
- Mémoire minéralogique et géologique sur les roches dioritiques de la France occidentale, par M *Riviere* 1184
- (GÉOMÉTRIE) — Note sur la décomposition des polyèdres, par M *Anvil* 18
- Mémoire sur les polygones étoilés, par M *de Belleville* 412
- Aperçu de quelques propriétés des segments déterminés par les lignes et surfaces algébriques, sur les groupes de cordes ou sécantales menées symétriquement par un même point, Note de M *Breton* 863
- Voir aussi au mot *Analyse mathématique*
- GESTATION — Recherches sur la durée de la gestation chez la femme, par M *Berthold* 1003
- GIRAFES — Mémoire sur l'anatomie de la girafe par MM *Joly* et *Lavocat* 265 et 493
- GLACES POLAIRES — Aperçu topographique sur les terres et les glaces australes, par M *Hombrohn*
- (GLOBE TERRESTRE) — Sur les causes probables des irrégularités de la surface de niveau du globe terrestre, des anomalies observées dans la direction de la verticale la marche du pendule et la hauteur de la colonne barométrique ramené à cette même surface, Mémoire de MM *Houssin* et *Roget* 180 et 292
- GRAS (CORPS) — Des les granivores, le beurre, et probablement aussi les autres corps gras, ne sont pas mis en réserve par l'économie quand ils sont donnés comme unique aliment, Mémoire de M *Letellier* sur l'action du sucre dans l'alimentation des granivores 658
- GROSSESSE — Recherches sur la durée de la grossesse, par M *Berthold* 1003
- GYMNASTIQUE — M *Cliet* adresse le résumé d'ouvrages sur la gymnastique et sur l'éducation physique des enfants qu'il a présentés au concours pour le prix de Médecine et de Chirurgie 1193

H

- HALOS** — Sur un halo dont la figure semblait elliptique Lettre de M. *Hervé* 228
- HUILES VOLATILES** — Rapport sur un Mémoire de M. *Cabours* relatif à l'huile volatile de *Gaultheria procumbens* Rapporteur M. *Dumas* 287
- Recherches sur l'huile essentielle de sassafras par M. *Seignette* 305
- HYDRAULIQUES** — Aperçu général d'une théorie de la contraction des veines liquides lancées par des orifices en minces parois planes par M. *Bacquer* 345
- HYDRAULIQUES (Roues)** — M. *Passot* demande si sa turbine se trouve comprise dans le nombre des inventions qui a été examinée par la Commission qui a fait le Rapport sur le concours pour le prix de Mécanique de l'année 1842 59
- M. *Passot* demande si sa turbine, ayant été une fois examinée par une Commission chargée de juger les pièces présentées à un concours pour le prix de Mécanique, pourrait être admise à un concours postérieur L'admission ne pourrait avoir lieu qu'autant que l'appareil présente pour la seconde fois aurait subi, dans l'interval, quelque modification qui pût être considérée comme un perfectionnement 99
- HYDROPHONIE** — Mémoire sur l'hydrophobie et le plan par M. *Courchant* 606
- HYDRAURS** — Note sur un composé de cuivre et d'hydrogène par M. *Wurtz* 702
- HYGIÈNE** — Sur les sources des miasmes qui occasionnent le typhus et les fièvres intermittentes à Rochefort (Charente Inférieure) Mémoire de M. *Cornay* 7
- IBIS** — Sur la nature de l'alimentation de l'ibis Note de M. *Guyon* 83
- ICHTHYOLOGIE** — Observations pour servir à la connaissance du développement de la Poissie de Surinam, précédées d'une esquisse historique des principaux travaux sur le développement des poissons aux deux premières époques de la vie par M. *DuRoi* 687 et 720
- IDOTIS** — M. *Belhomme* adresse l'indication des parties qui sont considérées comme nouvelles dans ses « Recherches sur l'idiotie » qu'il a présentées au concours pour les prix de Médecine et de Chirurgie 1193
- IMAGES DE VÉNUS** — Observation déjà ancienne d'un phénomène qui rentre dans la classe de ceux sur lesquels M. *Moser* a appelé depuis l'attention, Note de M. *Bischoff* 951
- INCENDIE (Fochelles de)** Voir au mot *Sauvetage*
- INDIGO** — Sur de nouvelles combinaisons de l'indigo, Mémoire de M. *Laurent* 565
- INONDATIONS** — Mémoire sur les inondations du Rhône, par M. *de Gasparin* 104
- Voir aussi au mot *Rhône*
- INSECTES** Voir au mot *Entomologie*
- INSTRUC** — Sur l'état actuel de la science expérimentale des faits d'instinct et d'intelligence des animaux, Note de M. *Desmarest* 1108
- INSTRUMENTS DE PHYSIQUE** — M. *d'Hombres Frères* adresse la description d'un galvanomètre multiplicateur construit par M. *Majocchi* de Milan 163
- Nouveaux appareils pour la production des anneaux colorés à centre noir ou blanc présentés par M. *Solel* 417 et 783
- Notice sur quelques perfectionnements apportés à un appareil électrique destiné à l'usage des médecins, par MM. *Breton frères* 527
- Note sur l'électro-subtracteur appareil destiné à prévenir la formation des orages par M. *Dupuis Delcourt* Ibid
- M. *Nockemb* présente, par l'intermédiaire de M. *Lerebours* un appareil électrique destiné principalement à l'usage des médecins 82
- M. *Lerebours* présente un appareil électrique dans lequel l'élément à courant constant se trouve remplacé par un élément de Bunsen Ibid
- Appareil destiné à la démonstration des lois de la réflexion et de la réfraction, présenté par MM. *Silbermann et Soler* 1132
- M. *Bodet* présente des thermomètres dans lesquels la lecture de l'échelle est facilitée par l'addition d'une couche d'émail blanc ou coloré appliquée sur le tube 1133
- Lettre de M. *Mathiasen* sur les différences

	Page.		Page.
qui distinguent son microscope de celui de M. Amici.....	1158	sur les végétaux vivants; par M. Robt-Mascl.....	1168
INVENTAIRE (ANIMAUX). — Rapport sur une série de Mémoires de M. de Quatrefages relatif à l'organisation de divers animaux sans vertèbres des côtes de la Manche; Rapporteur M. Milne Edwards.....	67	LOCOM. — Son emploi dans le traitement des tremblements mercuriels et des maladies saturnines; Note de MM. N. Guillo et Molens.....	532
— Remarques à l'occasion d'un passage de ce Rapport, par M. Peltier.....	161	LAMPE. — Recherches sur les acides métalliques, cinquième partie: osmium, iodium; Mémoire de M. Prévay.....	144
— Réponse du Rapporteur, M. Milne Edwards. Voir aussi aux mots <i>Mollusques, Insectes, Hématosporus, Zoosporus, etc.</i>	162	LAIS — Note sur la musculation de l'iris, par M. Mannoit.....	293
LODE. — Nouvelles recherches sur l'Iode, par M. Milon.....	1041	LOQUES. — Sur les loques et les nouvelles espèces de cest. famille découvertes en Algérie; Mémoire de M. Bory de Saint-Vincent.....	163
— Expériences concernant l'action de l'Iode			

K

KERATOPLASTIS. — Nouvelles recherches sur cette opération, par M. Feldmann.....	372
---	-----

L

LAMPES — Mémoire sur un moyen simple et économique d'obtenir pour les lampes un niveau constant, par M. Samsy.....	864	1108
LARYNGOTOMIE. — Sur une opération de laryngotomie pratiquée dans un cas de polype du larynx, par M. Ehrmann.....	593	709
— Remarques de M. Roux à l'occasion de ces communications.....		709
LIMON DE NIL. — Nouvelles recherches sur la composition de ce limon, par M. Lassel-gue.....		787
LITHOTRITIE. — Sur l'évacuation artificielle des débris des calculs urinaires, et sur leur pulvérisation, Note de M. Leroy-d'Étollé.....		477
LITHOTYPOGRAPHIE. — M. Arago met sous les yeux de l'Académie la reproduction faite par M. A. Dupont, au moyen de la lithotypographie, d'un ouvrage imprimé en 1629, de plusieurs anciennes gravures, d'une carte manuscrite, etc.....		934
LOCOMOTION. — Mémoire ayant pour titre: « Aperçu de la réforme scientifique de la locomotion »; par M. Hédad Wrensch.....		1057
— Voir aussi aux mots <i>Chemins de fer, Machines à vapeur, etc.</i>		
LUMÈRE. — Nouvel alcali végétal obtenu par M. Laurent, en soumettant à l'action de la chaleur l'acétate benzoinique.....		1016
LOUPES. Voir au mot <i>Optique (Instruments d')</i> .		
LUMIÈRE. — Procédé pour mesurer l'intensité de la lumière des étincelles électriques; Mémoire de M. Maçon.....		289
— Recherches sur l'intensité de la lumière émise par le charbon dans l'expérience de Davy; Note de MM. Fizeau et L. Foucault.....		860
— M. Arago rappelle, à l'occasion de ces recherches, les expériences déjà très-anciennes à l'aide desquelles il compare, par des moyens photométriques directs, la lumière du Soleil et celle des charbons de la pile.....		754
— Recherches sur la température des différentes parties du spectre solaire, par M. Melloni.....		39
— M. Conché, à l'occasion de cette Note, présente quelques considérations sur les phénomènes de chaleur et de lumière.....		312
— Addition à un précédent Mémoire concernant l'action de la lumière colorée sur les végétaux; réponse de M. Payer à quelques remarques de M. Dutrochet.....		32
— Réponse à cette Note; par M. Dutrochet.....		63
— Nouvelle Lettre de M. Payer sur le même sujet.....		190
— Remarques de M. Dutrochet à l'occasion de la Lettre de M. Payer.....		191
— Rapport sur un Mémoire de M. Santodeschi, concernant l'influence qu'exerce, sur la végétation des plantes et la germination des graines, les rayons solaires transmis par des verres colorés; Rapporteur M. Dutrochet.....		849

	Page.		Page.
— Rapport sur un Mémoire de M. <i>Féjer</i> , intitulé : « Mémoire sur la tendance des vases à fuir la lumière »; Rapporteur M. <i>Dutrochet</i>	1169	LENETTES ASTRONOMIQUES. — M. <i>Arago</i> entretient l'Académie d'un projet relatif à la construction d'une grande lunette destinée à l'Observatoire. Une Commission, composée de MM. <i>Biot</i> , <i>Arago</i> , <i>Gambay</i> , <i>Ragnault</i> et <i>Babinet</i> , est chargée de préparer des instructions pour l'opticien à qui sera confiée l'exécution de cet instrument. ..	894
LUNE. — Nouvelle Note sur la part qu'en peut attribuer aux Arabes dans la découverte de la variation; par M. <i>Sécllet</i>	48	— M. <i>Arago</i> communique l'extrait d'une Lettre de M. <i>Sontemps</i> qui offre de donner à un prix très modique, c'est-à-dire au prix de revient, les disques de flint-glass et de crown-glass dont on aura besoin pour cette lunette.	955
— Remarques de M. <i>Biot</i> à l'occasion de cette Note.....	49	— M. <i>Bucon</i> offre le concours de son expérience pratique et de ses appareils pour le travail des objectifs de cette lunette	1060
— Note de M. <i>Biot</i> accompagnant la présentation de l'ensemble des Mémoires qu'il a publiés, dans le <i>Journal des Savants</i> , sur la part attribuée aux Arabes dans la découverte de la variation lunaire.....	103		
— Observations relatives à l'éclipse totale de lune du 31 mai 1844. Communication de M. <i>Arago</i>	1119		

M

MACHINES. — M. <i>Martelli</i> consulte l'Académie sur le mécanisme qu'il conviendrait d'employer pour faire arriver à la surface du sol l'eau d'un réservoir alimenté par une source située beaucoup plus bas que la ville que cette eau doit approvisionner	98	son invention	293
— Note sur une machine à élever l'eau; par M. <i>Quénard</i> 185 et	293	— Note sur l'emploi des chaudières à vapeur tubulaires, invention pour laquelle feu M. <i>Dallery</i> a pris un brevet en 1803 . .	527
MACHINES À VAPEUR. — M. <i>Chaussonnet</i> écrit relativement à l'efficacité des appareils de sûreté qu'il a imaginés pour les machines à vapeur.	54	— Note sur un manomètre destiné à mesurer la tension de la vapeur dans le cylindre par M. <i>Soranci</i>	528
— M. <i>Delpon</i> écrit relativement à deux Notes sur la cause des explosions des chaudières à vapeur, adressées par lui à M. le Ministre de l'Intérieur, et qu'il suppose avoir été renvoyées à l'examen de l'Académie .	59	— Note sur un moyen destiné à prévenir l'explosion des chaudières à vapeur, par M. <i>Delpon</i>	591
— M. <i>Arago</i> présente, au nom de M. <i>Collardeau</i> , un manomètre pour les machines à vapeur construit sur un principe entièrement nouveau.	97 et	— Note sur divers perfectionnements à introduire dans la disposition des machines à vapeur, des chaudières, des foyers, etc., par M. <i>Sorci</i>	861
— M. <i>Sorci</i> demande qu'un Mémoire sur divers appareils de sûreté pour les machines à vapeur, présentés par lui l'an passé au concours pour le prix concernant les Arts insalubres, soit retiré de ce concours et renvoyé à l'examen d'une Commission...	228	— Mémoire sur les causes des explosions des chaudières à vapeur, par M. <i>Borrow</i> .	932
— Rapport sur un Mémoire de M. <i>Clepyren</i> , relatif au règlement des tiroirs dans les machines locomotives et à l'emploi de la détente; Rapporteur M. <i>Lamd</i>	275	— M. <i>Chopin</i> prie l'Académie de renvoyer à l'examen d'une Commission le Mémoire qu'il a précédemment adressé sur une nouvelle locomotive et sur une nouvelle chaudière à vapeur	933 et 1108
— Note pour faire suite à ce Rapport, par M. <i>Lamd</i>	345	— Considérations sur les chemins de fer, les locomotives, les bateaux à vapeur, par M. <i>Deniau</i>	1132
— M. <i>Jeannet</i> adresse de nouveaux documents relatifs à l'emploi avantageux qu'on a fait d'une machine à vapeur rotative de		MAGNÉTIQUES (PHÉNOMÈNES). Voir au mot <i>Électricité</i>	
		MAGNÉTISME TERRESTRE. — Sur les variations diurnes de la déclinaison magnétique dans de hautes latitudes boréales; par MM. <i>Bravais</i> et <i>Lottin</i>	729
		— M. le Ministre de l'Instruction publique transmet une Note de M. <i>Schweich</i> sur le magnétisme terrestre, sur le mouvement apparent des cieux, etc.....	1194
		MÉTÉORES. — Catalogue raisonné des Météorites et des Oiseaux rapportés d'Abys-	

aidée par MM. <i>Galunier</i> et <i>Forret</i> , et description des espèces nouvelles qui font partie de cette collection; par M. <i>Andrieu-Méneville</i>	1190	tion exercée par une sphère sur un point extérieur; Note de M. <i>Louville</i>	883
MACHINES. — M. <i>Arago</i> présente, au nom de M. <i>Collardeau</i> , un manomètre construit sur un principe entièrement nouveau	151	MÉTAMORPHOSES. — Mémoire sur la convergence de la série qui exprime la fonction perturbatrice développée suivant les sinus et cosinus des longitudes moyennes des planètes que l'on considère; par M. <i>Cauchy</i>	13
— Note sur un manomètre destiné à mesurer la tension de la vapeur dans le cylindre, par M. <i>Sormani</i>	528	— Nouveau Mémoire sur le calcul des inégalités des mouvements planétaires, par le même	625
MARÉES. — Sur les variations de niveau de la Méditerranée dans le port d'Alger, Mémoire de M. <i>Aimé</i>	219	Voit aussi au mot <i>Comètes</i> .	
— Note de M. <i>Chassellon</i> sur les observations de marées faites à Alger et à Toulon, et Remarques sur le Mémoire précédent	438	MERCURE. — Doutes relativement à l'existence d'un gîte exploitable de mercure dans le département de l'Aveyron; Lettre de M. <i>Marcel de Serres</i>	51
— M. <i>Benoit</i> prie l'Académie de hâter le travail de la Commission chargée de l'examen de diverses Notes qu'il lui a présentées et qui ont rapport à des appareils destinés à enregistrer les hauteurs des marées sans l'intervention d'un observateur	533	— Remarques à l'occasion de cette Lettre; par M. <i>Raulin</i>	157
MÉCANIQUE. — Rapport sur une Note de M. <i>Lemarle</i> relative à la flexion des pièces chargées debout, Rapporteur M. <i>Louville</i>	82	— Lettre de M. <i>Marcel de Serres</i> en réponse à ces Remarques	310
— Mémoire sur la théorie des corps fibreux, par M. <i>Fabry</i>	1001	— Nouvelle Lettre de M. <i>Raulin</i> sur le même sujet	381
Voit aussi au mot <i>Machines</i> .		— Maladies produites par la vapeur du mercure, traitées avec succès par l'iodure de potasse, Note de MM. <i>Guillot</i> et <i>Maisons</i>	532
MÉCANIQUE ANALYTIQUE. — Sur la forme générale des équations aux différences partielles, linéaires et à coefficients constants, propres à représenter les lois de mouvements infiniment petits d'un système de points matériels soumis à des forces d'attraction et de répulsion mutuelle; Mémoire de M. <i>Laurent</i>	204	MÉTALLS. — Sur la coloration des métaux par le transport du peroxyde de plomb opéré au moyen de l'électricité voltaïque, Mémoire de M. <i>Bequerel</i>	197
— Sur les formules relatives à l'attraction des polyèdres, Note de M. <i>d'Estocquois</i>	422	— De la précipitation des métaux sur d'autres métaux, par le même	449
— Sur la généralisation de certains théorèmes de mécanique analytique donnés par Lagrange et Huygens, Note de M. <i>Binet</i>	695	— Note sur l'argenteure électro-chimique; par le même	554
— Équations des mouvements infiniment petits d'un système de sphéroïdes soumis à des forces d'attraction ou de répulsion mutuelle, Mémoire de M. <i>Laurent</i>	771	— Réclamation de priorité élevée relativement à quelques-uns des faits mentionnés dans cette Note; par M. <i>Lévy</i>	708
— Sur l'équilibre et le mouvement d'un système de molécules dont les dimensions ne sont pas supposées nulles; Mémoire de M. <i>Cauchy</i>	774	— Note de M. <i>Bequerel</i> en réponse à cette réclamation	715
— Sur les mouvements infiniment petits d'un système de sphéroïdes sollicités par des forces d'attraction ou de répulsion mutuelle; Mémoire de M. <i>Laurent</i>	863	— Nouvelle Lettre de M. <i>Lévy</i> relative à la même question de priorité	837
— Sur la nature répulsive des forces entre les molécules; par le même	865	MÉTALLS LUMINEUX. — Observations relatives à l'apparition de leurs électricités dans des circonstances insolites, Communication faite par M. <i>Arago</i> d'après un journal transmis par M. de la <i>Pyrale</i>	1062
— Remarque relative à un passage du livre intitulé « Principes », où Newton calcule l'ac-		— Observation par MM. <i>Arago</i> et <i>Langier</i> d'un phénomène atmosphérique qui s'est montré dans la soirée du 22 juin 1844, phénomène consistant dans une disposition des nuages qui reproduisaient celle qu'affectent les rayons lumineux dans l'aurore boréale, et présentait aussi la même orientation	1168
		MÉTÉOROLOGIE (OBSERVATIONS) faites à l'Observatoire de Paris pour décembre 1843	62
		— Janvier 1844	231
		— Février	289
		— Mars	662

	Page.		Page.
— Avril.....	898	MOLLUSQUES. — Mémoire sur les <i>Phalénostérés</i> ,	
— Mai.....	1113	ordre nouveau de la classe des <i>Gastéropodes</i> ,	
— Observations météorologiques faites à Nij-		et établi d'après l'examen anatomique	
né-Tagnillak pendant le deuxième semestre		et physiologique des genres <i>Zephyrine</i> ,	
de l'année 1843, par les soins de M. Dé-		<i>Acteon</i> , <i>Actéonie</i> , <i>Amphorine</i> , <i>Favos</i> et	
midoff.....	58, 312, 879 et 1063	<i>Chalide</i> ; par M. de <i>Quatrefoies</i>	13
— Observations météorologiques faites à Di-		— Rapport sur ce Mémoire et sur plusieurs	
jon, pendant les mois d'août, septembre		autres travaux du même auteur, concer-	
et octobre 1843, par M. Delarue.....	163	nant les animaux invertébrés; Rap- porteur M. <i>Milnes Edwards</i>	67
— Observations faites à Saint-Lô pendant le		— Remarques de M. <i>Peltier</i> à l'occasion d'un	
second semestre de 1843, par M. Delamar-		passage de ce Rapport... ..	161
che.....	218	— Réponse du Rapporteur, M. <i>Milnes Edwards</i> ,	
— M. Arago met sous les yeux de l'Académie		aux remarques de M. <i>Peltier</i>	162
un tableau publié par la Commission hy-		— M. <i>Souleyet</i> demande qu'en travail sur l'a-	
drométrique de Lyon, tableau qui donne,		natomie et la physiologie des Mollusques,	
jour par jour, pour le mois de mars 1844,		qu'il avait adressé l'année précédente, soit	
la quantité d'eau tombée sur différents		admise au concours pour le prix de Physio-	
points du bassin de la Saône, les hauteurs		logie expérimentale....	594
correspondantes des rivières et la direc-		— Description d'une Moule d'eau douce nou-	
tion des vents. — Remarques de M. de		velle ou imparfaitement décrite, par M.	
<i>Gaspard</i> à l'occasion de cette communica-		<i>Judas</i>	696
tion. — MM. Arago et de <i>Gaspard</i> sont		MONSTRUOSITÉS. — Examen de quelques cas de	
invités à s'adresser, au nom de l'Académie,		monstruosités végétales propres à éclairer	
à M. le Ministre de l'Agriculture et du Com-		la structure du pistil et l'origine des ovu-	
merce, à l'effet d'obtenir que le même		les, par M. Ad. <i>Brongniart</i>	713
plan d'observations soit étendu au bassin		— M. <i>Pierquin</i> écrit relativement à un cas de	
de l'Isère, de la Durance et du Rhône, et		monstruosité qu'il a observée chez un fœtus	
qu'on y joigne des observations thermo-		humain, et qu'il croit ne pas avoir été	
ométriques et barométriques.....	937	encore décrit....	1111
— Observations météorologiques faites à		MOLLES. Voir au mot <i>Mollusques</i>	
Christiania pendant douze mois consé-		MYOTOMIE. — Remarques sur l'emploi de la my-	
cutifs, adressées par M. <i>Crowe</i>	956	otomie comme moyen de traitement dans	
— Tableau des observations météorologiques		certaines cas d'amaurose et de myopie, par	
faites à Dijon pendant les mois de mars et		M. <i>Guepin</i>	8
d'avril 1844.....	957	MYOTOMIE. — Remarques sur l'emploi de la	
— Commission chargée par le grand-duc de		myotomie comme moyen de traitement	
Toscane de coordonner les observations		dans certains cas d'amaurose et de myo-	
météorologiques qui seront faites dans		pie, par M. <i>Guepin</i>	8
tous les points de l'Italie, Communication		— Sur l'abus et le danger des sections tendi-	
de M. Arago, d'après une Lettre de M.		neuses et musculaires dans le traitement	
<i>Antinori</i>	1063	de certaines difformités, Lettre de M. <i>Mal-</i>	
— Voir aussi au mot <i>Foudre</i> .		<i>gaigne</i>	307
MIASMES. — Sur les sources des miasmes qui		— Lettre de M. J. <i>Gadru</i> , à l'occasion des re-	
occasionnent les fièvres intermittentes à		marques de M. <i>Malgaigne</i>	380
Rochefort; par M. <i>Coras</i>	95	— Mémoires sur la valeur réelle de l'orthopédie,	
MICROSCOPE. — Appareil destiné aux démon-		et spécialement de la myotomie raché-	
strations microscopiques; présenté par		dienne dans le traitement des déviations	
MM. <i>Duval</i> et <i>Foucault</i>	698	latales de l'épine, par M. <i>Malgaigne</i>	695
— Lettre de M. <i>Matthiessen</i> sur les différences		— Sur les résultats de certains traitements	
qui distinguent son microscope de celui		orthopédiques dans lesquels on a eu re-	
de M. <i>Amici</i>	1158	cours aux sections musculaires; Note de	
MÉTÉOROLOGIE. — Mémoire sur quelques faits		M. <i>Lentary</i>	755
météorologiques et géologiques nouveaux,		— Réponse à cette Note et à quelques autres	
par M. <i>Bertrand de Laun</i>	812	attaques contre la myotomie raché-	
— Voir aussi aux mots <i>Géologie</i> , <i>Marécure</i> ,		par M. J. <i>Gadru</i>	818
<i>Asinie</i> , <i>Digpre</i> , etc.			

	Page		Page
NAVIGATION INTÉRIEURE — Sur l'emploi de machines fixes, mises en mouvement par le courant de l'eau, pour le remontage des bateaux, Note de M. Fleury	263	NIVEAU DE LA MER — Sur les causes probables des irrégularités de la surface de niveau du globe terrestre, des anomalies observées dans la hauteur de la colonne barométrique ramenée à cette même surface, etc, Mémoire de MM. Huard et Roset..	180
NAVIGATION PAR LA VAPEUR — Notes de M. Miall.....	204 et 281	— Mémoire sur les variations de niveau de la Méditerranée dans le port d'Alger; par M. Aimé.....	219
— Mémoire adressé au concours pour le prix concernant l'application de la vapeur à la navigation (Séance du 4 mars).....	378	Voir aussi au mot <i>Morées</i> .	
— Sur l'emploi des chaudières à vapeur tubulaires, de l'hélice employée comme propulseur des navires, des mâts creux renfermant les uns dans les autres, inventions pour lesquelles feu M. Dallery a pris un brevet en 1803.	527	NOMBRES. — Rapport sur divers Mémoires de M. Houry relatifs à des expériences sur les nombres; Rapporteur M. Cauchy....	84
— Un Anonyme demande que l'Académie recule de trois mois le terme du concours pour le prix concernant l'application de la vapeur à la navigation.....	792	NOMINATIONS de Candidats pour les places auxquelles l'Académie est appelée à présenter. — L'Académie présente, comme Candidats pour la place de directeur des études à l'École Polytechnique : en première ligne, M. Chevreul, en deuxième ligne, M. Duhamel, en troisième ligne, M. Lamé.	240
— Appareil mis en jeu par la détonation de gaz explosibles, destiné à être substitué aux machines à vapeur pour la propulsion des navires, invention de M. Seliguer.	1037	NOMINATIONS de membres et de Correspondants de l'Académie — M. Vilmoren est nommé Correspondant de l'Académie (Section d'Économie rurale), en remplacement de M. Mathieu de Dombasle.....	289
NERVEUX (FLUIDE). — MM. Thillier et Lafontaine écrivent relativement à des expériences qui démontrent, suivant eux, l'existence du fluide nerveux, et son action sur l'électromètre.....	1109 et 1132	— M. Brodie est nommé Correspondant (Section de Médecine et de Chirurgie), en remplacement de M. Astley Cooper.....	478
NERVEUX (SYSTÈME). — M. Flourens, en présentant, au nom de l'auteur, M. Pouille, le premier volume d'un ouvrage ayant pour titre : « Anatomie, physiologie et pathologie du système nerveux », donne une idée du contenu de ce volume.....	263	— M. Ch. Bonaparte est nommé Correspondant (Section d'Anatomie et de Zoologie), en remplacement de M. Jacobson	476
		— M. Hamilton est nommé Correspondant (Section de Géométrie), en remplacement de M. Ivory	564

OBÉLISQUES — Sur une obélisque de l'Inde qui a éclaté avec détonation au moment où on la sciait; Note de M. Damour	4	OISEAUX que MM. Gellner et Forret ont recueillis en Abyssinie, avec description des espèces nouvelles qui font partie de cette collection; par M. Guder-Mépeville.	1190
OLÉO. — Expériences sur l'engraissement des oies; Mémoire de M. Persoz.....	245	OSSEUX. — Rapport supplémentaire sur l'ospium d'Alger; Rapporteur M. Payen.....	233
OSSEUX. — Aperçu d'une nouvelle classification ornithologique fondée sur la coelération de l'os palatin; par M. Cornay....	94	— M. le Ministre de la Guerre annonce réception de ce second Rapport.....	482
— Remarques sur quelques points de l'anatomie et de la physiologie des <i>Procerallides</i> , et essai d'une nouvelle classification de ces oiseaux; par MM. Jacquinot et Hombron	353	OSSEUX (INSTRUMENTS). — Nouveaux appareils pour la production des anneaux colorés à centre noir ou blanc; présentés par M. Soleil.	472
— Catalogue raisonné des Mammifères et des		— Loupe composée, pouvant donner un grossissement de 15 fois avec une longueur fo-	

	Pages	Pages
valde 3a millimètres, en conservant l'achromatisme; présentée par M. Nachet...	592	
— Sur les anneaux colorés produits dans un solide transparent limité par une surface plane combinée avec une surface courbe; Note de M. Mathiessen.....	710	
— Appareil destiné à la démonstration des lois de la réflexion et de la réfraction, présenté par MM. Silbermann et Solmi ..	1132	
OR. — Mémoire sur les combinaisons oxygénées de l'or, suivi de recherches sur le pourpre de Cassius et sur l'or fulminant; par M. Figuer.....	813	
ORACLES. — M. de Rochemont écrit relativement aux expériences qui se faisaient autrefois au village de Vauxenard, en Beaujolais, dans le but de dissiper, au moyen de la detonation de boîtes à feu, les nuages orageux ..	1063	
ORCHIDÉES. — Monographie des Orchidées du Mexique, par MM. Richard et Galetti.....	497	
ORDONNANCE ROYALE confirmant la nomination de M. Morin comme membre de la Section de Mécanique, en remplacement de M. Coriolis.....	4	
ORGANES INTERNES. Voyez Ours (Organe de l').		
ORGANOGENÈSE ANIMALE. — De la formation des organes de la circulation et du sang chez les animaux vertébrés, Mémoire de MM. Proust et Lebert	78	
ORGANOGENÈSE VÉGÉTALE. — Sur l'organogénèse de la fleur des Malvacees; par M. Duchartre.	487	
— Observations sur l'organogénèse de la fleur, et particulièrement de l'ovaire chez les plantes à placenta central libre; par M. Duchartre.....	1105	
ORGANOGRAPHIE VÉGÉTALE. — Troisième et quatrième Notes relatives à la protestation faite dans la séance du 17 juin 1843, à la suite du Mémoire de M. de Mirbel ayant pour titre : « Recherches anatomiques et physiologiques sur quelques végétaux monocotylés »; Mémoires de M. Gaudichaud	597, 599 et 972	
ORNITHOLOGIE. — Aperçu d'une nouvelle classification ornithologique, fondée sur des considérations tirées de l'os palatin; par M. Cornay.....	94	
— Remarques sur quelques points de l'anatomie et de la physiologie des Procellariides, et essai d'une nouvelle classification de ces oiseaux; par MM. Jacquinot et Bismont.....	353	
— Catalogue raisonné des oiseaux rapportés d'Algérie par MM. Gallier et Ferret, avec description des espèces nouvelles; par M. Guérin-Ménerville.....	1190	
ORTHOPÉDIE. — Sur un nouveau mode de traitement des déviations de la taille, sans l'ité mécanique ni sections sous-cutanées des muscles, Mémoire de MM. Chauly et Godier.....	169	
— Réclamation de priorité émise à l'occasion de ce Mémoire, par M. Huard.....	381	
— Lettre de MM. Chauly et Godier à l'occasion de cette réclamation	494	
— M. Valerius demande à retirer un Mémoire qu'il avait précédemment présenté, et sur lequel il n'a pas encore été fait de Rapport Ce Mémoire est relatif à un appareil pour le redressement des déviations de la taille ..	192	
— Sur l'abus et le danger des sections tendineuses et musculaires dans le traitement de certaines difformités, Lettre de M. Malgaigne.....	307	
— Lettre de M. J. Guérin à l'occasion des Remarques de M. Malgaigne	380	
— Mémoire sur la valeur réelle de l'orthopédie, et spécialement de la myotomie rachidienne dans le traitement des déviations latérales de l'épine; par M. Malgaigne	695	
— Sur les résultats de certains traitements orthopédiques dans lesquels on a recouru aux sections musculaires, Note de M. Lantieri	755	
— Réponse à quelques attaques contre la myotomie rachidienne, par M. J. Guérin ..	818	
OSMUE. — Recherches sur les acides métalliques, cinquième partie. Osmium, Iridium, Mémoire de M. Frémy	144	
OSIS (Organe de l'). — Recherches sur quelques points d'anatomie pathologique de la trompe d'Eustache, et sur la surdité qui en peut résulter; par M. Bonafond.....	682	
— M. Deleau, à l'occasion de cette communication, rappelle qu'il a soumis précédemment au jugement de l'Académie divers travaux dans lesquels il a discuté les questions traitées par M. Bonafond, et propose d'autres méthodes de traitement ..	838	
— M. Bonafond demande, comme M. Deleau, que l'on essaye comparativement les deux méthodes de traitement proposées dans les cas de rétrécissement de la trompe d'Eustache, savoir, l'emploi des sondes élastiques, d'une part, et, de l'autre, l'emploi des injections séreuses ..	880	
OTOLGIE. — Supplément à un précédent travail sur l'ovulation spontanée et périodiques des mammifères, par M. Pouchet.....	820	
Voir aussi au mot Fécondation.		
OSTÉE. — Examen de quelques expériences		

sur la décomposition des oxydes et sur
celle des sels sur le transport des élé-

Page

ments, etc., conséquences qui se déduisent
de ces faits, Note de M. Faret 823

P

P. LEONTODON — M. Flourens en présentant au nom de l'auteur, M. F. J. Pictet le pre- mier volume d'un Traité élémentaire de Paléontologie, donne une idée du but et du plan de l'ouvrage 1194	
VOIR aussi à Fossiles (Ossements)	
PAQUETS CACHETÉS — L'Académie accepte le dépôt de paquets cachetés présentés par MM.	
— Chevalier et Molenaers Séance du 2 janvier 9	
— Fermond 8 janvier 50	
— Robert de Lamballe Même séance Ib d	
— Marguerite Même séance Ib d	
— Rousseau Lafarge 15 janvier 93	
— Av. l. Même séance Ib d	
— Boberre Même séance Ib d	
— Barse 22 janvier 163	
— Chozelet et Rastel Même séance Ib d	
— Durrac et Schuquet Même séance Ib d	
— Dumont Même séance Ib d	
— Dupré Même séance Ib d	
— Lamarle Même séance Ib d	
— Rousseau Lafarge Même séance Ib d	
— Molenaers 12 février 266	
— Canquo et Millardet 19 février 32	
— Geyssels Même séance Ibid	
— Bonnet Hignou 4 mars 38	
— Dupré Même séance Ib d	
— Gagnage Même séance Ib d	
— Vallet et Barreswil 11 mars 445	
— Nouette et Flahaut 25 mars 534	
— Dejard 1 ^{er} avril 595	
— Gautier de Claubert Même séance Ibid	
— Breton 8 avril 659	
— Chevallier 15 avril 711	
— Lecoq Même séance Ibid	
— Bouet 22 avril 793	
— Danger 29 avril 839	
— Hoffmann 20 mai 937	
— Chozelet et Rastel Même séance Ibid	
— Cornay 27 mai 1017	
— Milne Edwards 10 juin 1086	
— Leroy d'Étiolles 17 juin 1160	
— M. de Lapsse adresse une Note dont il de- mande la conservation dans les archives de l'Académie. Cette Note est cachetée séance tenante, et, sous cette forme, le dépôt en est accepté 1160	
PAQUETS CACHETÉS (Ouverture de) — Sur la demande de MM. Barreswil et Vallet on ouvre, dans la séance du 6 mai un pa-	

quet cacheté déposé par eux le 21 mars précédent. La Note qui y est contenue est relative au remplacement de la cendre par la poudre d'Algaroth, dans la peinture à l'huile 804	
PARALYSIE — Mémoire sur la paralysie géné- rale sur ses caractères anatomiques, ses différentes formes et son traitement par MM. Fabre et Se. Pinel 40	
LESINTURE — M. Cherot prie l'Académie de se faire rendre compte d'un nouveau procédé qu'il a imaginé pour l'impression des toiles destinées à la peinture à l'huile, et de diverses autres inventions également relatives à l'art de la peinture 512	
PESE-VOITURE — Description d'un pese-voiture hydraulique et portatif, par M. Galy Ca- ssat 224	
PESTE — Sur le mode de transmission de la peste et des maladies en général, par M. de Gemini 38	
— M. Pessonn demande à retirer un Mémoire sur la question de la contagion de la peste et sur celle des quarantaines, Mémoire précédemment présenté par lui, et sur le quel il n'a pas encore été fait de Rap- port 192	
— M. Serres présente une Note de M. Sturmer sur le mode de transmission de la peste 864	
PHARES — Note de M. Franco jeune sur l'ap- pareil catadioptrique exécuté par lui pour le phare écossais de Sherivore 25	
— Sur un nouveau système de tours en fer battu propres à placer des phares, des sémaphores, etc. Note de M. Jannard 220	
PHILISTEINIS, ordre nouveau de Mollusques gastropodes établi par M. de Quatrefages 13	
— Rapport sur le Mémoire dans lequel ce genre est établi, et sur plusieurs autres Mémoires du même auteur, concernant les animaux invertébrés. Rapporteur M. Milne Edwards 67	
PHYCOPHYTES, alcool végétal obtenu des écor- ces fraîches de racines de pommier, de poirier, de coirier et de prunier — Re- cherches de M. Bouchardat sur les proprié- tés optiques de cette substance 298	
PHYCOPHYTES — Mémoire sur les combinaisons du phosphore avec l'hydrogène, par M. P. Thomsen 652	
— Rapport sur ce Mémoire, Rapporteur M.	

	Page		Page
<i>Pelouse</i>	914	Notes de MM <i>Fuseau</i> et <i>Boucault</i>	746
PHOSPHORESCENCE DES SAUTS DE LA MER. — Sur une phosphorescence extraordinaire de la mer des environs de Madère pendant une partie du mois de mars 1844; Lettre de M ^{me} de <i>Cruze</i>	879	PHYSIQUE DU GLOBE. — Sur les causes probables de l'irrégularité dans la surface de niveau du globe terrestre, et des anomalies observées dans la direction de la verticale la marche du pendule et la hauteur de la colonne barométrique ramenée à cette même surface, Mémoire de MM <i>Hossard</i> et <i>Roset</i>	86c
PHOTOGRAPHIE. — M <i>Arago</i> présente un portrait en photographie exécuté par M <i>Daguerre</i> au moyen d'un procédé qui ne diffère du procédé primitif que par la composition de la couche sensible	152	— Note ayant pour titre « Mécanisme terrestre » adressée par M <i>Fleuss</i> mais attribuée d'abord en raison d'une ressemblance d'écriture, à M <i>Durand</i> 49; et	18c
— M <i>Arago</i> annonce que M <i>Daguerre</i> a en core besoin de faire quelques essais pour pouvoir formuler avec toute la précision desirable son nouveau procédé de préparation des plaques destinées à recevoir les images photographiques	187	PHYSIQUE EXPÉRIMENTALE. — Rapport sur deux Mémoires de M <i>Wertheim</i> intitulés « Recherches sur l'élasticité », Rapporteur M <i>Babnet</i>	533
— Sur un nouveau moyen de préparer la couche des plaques destinées à recevoir les images photographiques, Mémoire de M <i>Daguerre</i>	756	PHYSIQUE GÉNÉRALE. — Note relative à diverses questions de physique générale par M <i>Durand</i>	921
— Note sur l'emploi de l'acétate de potasse dans les opérations de la photographie comme moyen d'obtenir de belles épreuves par les temps les plus humides, Note de M <i>Desobry</i>	594	— M <i>Durand</i> prie l'Académie de hâter le travail de la Commission à l'examen de laquelle ont été renvoyées cette Note et celles auxquelles elle fait suite	115
— M <i>Lecchi</i> présente des images photographiques faites au moyen d'une chambre obscure dans laquelle la lentille est remplacée par un miroir périscopique en verre étamé	754	— Des phénomènes de mouvement, de repos et d'équilibre, considérés dans le monde réel et dans leurs rapports avec les règles de la statique, Mémoire de MM <i>Flahaut</i> et <i>Nouette</i>	1160
— Application des procédés daguerriens à la photométrie, Note de MM <i>Fleuss</i> et <i>Boucault</i>	746 et 860	PHYSIQUE MATHÉMATIQUE. — Sur la rotation des plans de polarisation dans les mouvements infimes et petits d'un système de sphéroïdes Lettre et Mémoire de M <i>Laurient</i>	864
— Sur une des causes qui peuvent nuire à la netteté des images obtenues par les procédés photographiques, Lettre de M <i>Claudet</i>	954	— Remarques de M <i>Caschy</i> à l'occasion de cette communication	93c
— M <i>Arago</i> met sous les yeux de l'Académie plusieurs des images daguerriennes d'après lesquelles ont été exécutées les planches de la partie anthropologique du voyage de l' <i>Astrolabe</i> et de la <i>Zélée</i> Ces planches sont la reproduction des têtes humaines moulées sur nature par M <i>Dumouster</i> dans le cours de l'expédition	1032	— Mémoire sur la théorie de la polarisation chromatique, par M <i>Caschy</i>	940
INÉVOLUTIONS. — Rapport sur une question de priorité débattue entre MM <i>Durn</i> et <i>Donnd</i> relativement au photomètre dont ce dernier s'est servi dans ses expériences sur le lait, Rapporteur M <i>Thenard</i>	643	— Mémoire sur l'intégration des équations de la courbe élastique à double courbure par M <i>Binet</i>	951
— A l'occasion de ce Rapport, M <i>Arago</i> communique l'extrait d'une nouvelle Lettre de M <i>Dien</i> sur la même question	644	— Notes sur la même question, par M <i>Wentzel</i>	1115
PHOTOMÉTRIE. — Recherches sur l'intensité de la lumière émise par le charbon dans l'expérience de Darc application des phénomènes daguerriens à la photométrie,		Voir aussi à <i>Analyses mathématiques</i>	1197
		PIÈCES GÉNÉRALES. Voir à <i>Electricité</i>	
		PROPHÉTIES. — Histoire des métamorphoses et de l'anatomie du <i>Prophète petasos</i> , par M <i>Leon Dufour</i>	233
		PLATINE. — Sur les combinaisons de deux nouvelles bases alcalines contenant du platine, Mémoire de M <i>Roset</i>	1100
		POISONS. — Recherches sur l'empoisonnement par le plomb, suivies de quelques considérations sur l'absorption et la localisation des poisons, Mémoire de MM <i>Daroger</i> et <i>Flandin</i>	177
		— Coloration des métaux par des dépôts successifs de peroxyde de plomb opérés au moyen de l'électricité voltaïque, Mémoire	

	Page.	Page.	
de M. Becquerel	197	POLYÈDRE TINCTOIRE. — M. Jaume-Saint-Hilaire, à l'occasion d'un passage du <i>Traité d'Economie rurale</i> , présenté par M. Bous-singault dans la séance du 12 février, écrit qu'il avait, avant M. Deville, tenté d'introduire en France la culture du <i>Polygonum tinctorium</i>	382
→ Maladies saturnines combattues avec succès par l'emploi de l'iodure de potassium; Note de MM. Guillois et Melsens	532	— Remarques de M. Bous-singault à l'occasion de cette réclamation.	Idem
Voir aussi au mot <i>Métaux</i> .		— Sur l'introduction en France de la culture du <i>Polygonum tinctorium</i> , Lettre de M. Deville à M. Bous-singault	707
PLUME. Voir à <i>Météorologiques (Observations)</i>		— Lettre de M. Jaume-Saint-Hilaire sur les premiers essais faits par lui pour introduire en France la culture du <i>Polygonum tinctorium</i>	716
POISSON. Voir au mot <i>Ichthyologie</i>		— Réplique à la Note précédente, par M. Deville	1134
POISSON. — Analyse d'un poison employé par les indigènes de la province de Caracas (Amérique du Sud), par M. Pedroni	153	POISSON. — Description et figure d'une nouvelle pompe, par MM. Lebot, Ropert et Douyet.	293 et 696
— Recherches sur l'empoisonnement par le plomb, suivies de quelques considérations sur l'absorption et la localisation des poisons; par MM. Danger et Flandin	177	POISSON. — M. Hugon adresse des duplicata de deux Mémoires qu'il avait précédemment soumis au jugement de l'Académie, l'un sur un nouveau système de construction des cales des ponts suspendus, l'autre sur un nouveau système de chaînes ou ponts en fer ou en bois, pour franchir de grands espaces d'eau.	8
— M. Bodichon demande à retirer un Mémoire sur l'empoisonnement par le bixalate de potasse, Mémoire qu'il avait précédemment présenté, et sur lequel il n'a pas encore été fait de Rapport	192	— Description et figure d'une nouvelle passerelle construite d'après le système de fermes en fer et en fonte précédemment soumis au jugement de l'Académie par M. Jomieu.	422
— M. Orfila adresse, dans la séance du 1 ^{er} avril, un opuscule dans lequel il combat le système de localisation des poisons, et demande que cette pièce soit renvoyée, comme document à consulter, à la Commission chargée d'examiner diverses communications relatives à la recherche des poisons minéraux dans les expertises médico-légales.	593	POISSON DE GUERRE. — Mémoire sur quelques expériences tentées dans le but de rendre le poudre de guerre inexplosible, pendant sa conservation, par M. Fudiff.	1138
— Note sur la localisation des poisons; par M. Orfila.	690	POISSONNAGE. — Conditions pour qu'une pous-solane artificielle convienne à l'aide mer; Note de M. Vient.	1110
— Nouvelles considérations sur la localisation des poisons, en réponse à l'opuscule adressé par M. Orfila, dans la séance du 1 ^{er} avril; Mémoire de MM. Danger et Flandin.	692	PRÉSENCE DE L'ACADÉMIE. — M. Élie de Beaumont est élu vice-président pour l'année 1844; M. Dupon, vice-président pendant l'année 1843, passe aux fonctions de président.	
— Sur les inconvénients qui peuvent résulter de l'emploi des poisons minéraux dans l'embaumement des cadavres, Note de M. Lorris du Val.	694	PRESSION. — M. Arago présente, au nom de M. Collardes, un thermomètre compensateur, c'est-à-dire dans lequel le verre et le métal sont combinés de manière à ce que, pour tous les changements de température, la pression restant constante, l'index reste stationnaire, et à ce que cet index, au contraire, se déplace dès que les parois du réservoir qui sont flexibles, éprouvent un changement de pression extérieure.	97
— Lettre de M. Gannal à l'occasion de cette communication.	792	— De l'influence de la pression dans les phé-	
— Note sur de nouveaux moyens de constater la nature des taches obtenues avec l'appareil de Marsh; par M. Durand.	694		
POISSON. Voir au mot <i>Ichthyologie</i> .			
POISSON FOSILES. Voir au mot <i>Fossiles</i> .			
POLARISATION CIRCULAIRE. — Sur les propriétés optiques de la saignée, de la phloridzine et du caïn; Recherches de M. Bouchar-dat.	295		
— De l'action qu'exercent les biolumines sur la lumière polarisée; Note de M. Famin.	680		
— Sur les phénomènes de polarisation produits à travers les globules bleus; Note de M. Biot.	795		
Voir aussi à <i>Analyse mathématique</i> .			
POLYÈDRE. — Note sur la décomposition des solides polyédriques; par M. Arcl.	185		

	Page
nomènes géologico-chimiques, Note de M. Fournet	403
— <i>Pression atmosphérique</i> — Sur l'emploi qu'en peut faire l'industrie, Note de M. Flourey-Vallat	463
Voir aussi au mot <i>Chemins de fer</i>	
Prémière (Questions de) — Rapport sur une question de priorité débattue entre MM. Dien et Donne relativement au photomètre dont ce dernier s'est servi dans ses expériences sur le lait, Rapporteur M. The nard	643
— A l'occasion de ce Rapport, M. Arago communique une nouvelle Lettre de M. Dien sur cette question	644
— Question de priorité débattue entre MM. Becquerel et Levol concernant certains faits de précipitation des métaux sur d'autres métaux	837
— Question de priorité débattue entre MM. Deminiski et Hallette concernant un mode particulier de fermeture pour le tube pneumatique dans les chemins de fer dit à pression atmosphérique	1132
382, 481, 1062 et	
— Reclamation de priorité élevée par M. Fasil com touchant l'emploi de roues horizontales comme appareil de sûreté pour les locomotives, réclamation que l'auteur retire après avoir pris connaissance d'un Mémoire de M. Segurier qui propose également l'emploi de roues horizontales, mais tout autrement disposées	54
Prix réservés par l'Académie pour l'année 1842 — <i>Prix de Statistique</i> — La Commission chargée de l'examen des pièces admises au concours pour ce prix est d'avis qu'il n'y a pas lieu à le décerner	317
— <i>Grand prix des Sciences mathématiques</i> — Le prix est décerné à M. Serres M. De launay obtient une mention honorable	315
— <i>Prix d'Astronomie</i> (fondation de Lalande) décerné à M. Langui	316
— <i>Prix de Mécanique</i> (fondation Montyon) Le prix n'est pas décerné	Ibid.
— <i>Prix fondé par M^{me} de Laplace</i> , décerné à M. Rivet élève de l'Ecole Polytechnique soit le premier de la promotion de 1842	319
— <i>Prix de Physiologie expérimentale</i> — Le prix est décerné à M. Laurens pour ses « Recherches expérimentales, anatomiques et physiologiques concernant les modes de reproduction et l'histoire du développement de l'hydro-commune » et ses « Recherches sur l'éponge fluviatile » — Une mention honorable est accordée à M. Robert Latour pour ses expériences physiologiques et pathologiques sur le mécanisme de l'inflammation	

	Page
et la pathologie des animaux vertébrés à sang froid — Relativement à un troisième travail présenté pour le concours, les « Recherches anatomiques et physiologiques sur les Diptères », par M. Léon Dufour, l'Académie, sur la proposition de la Commission, en a ordonné l'impression dans le <i>Recueil des Savants étrangers</i>	192 et 319
— <i>Prix concernant les Arts industriels</i> — Trois prix sont décernés, 1 ^o à M. Martin de Vervins, pour son procédé d'extraction de l'amidon des farines sans altération du gluten et sans fermentation putride. 2 ^o à M. Lamy pour son procédé d'épuration du sofre. 3 ^o à MM. Jassin et Longcote pour l'emploi qu'ils ont su faire, dans l'intérêt de l'agriculture et de l'hygiène publique des eaux provenant des écuries — Un encouragement est accordé à M. Chaud pour son appareil destiné à faire servir la formation des gaz détonants, soit dans les mines, soit dans les lieux où l'on emploie le gaz d'éclairage	311
— <i>Prix de Médecine et de Chirurgie</i> décernés, 1 ^o à M. Stromeyer et M. Dreffbach, à l'un pour avoir proposé, à l'autre pour avoir exécuté le premier sur l'homme, la vivisection de l'opération du strabisme, 2 ^o à MM. Rouget et Jacob pour leur monographie d'anatomie chirurgicale et de médecine opératoire, 3 ^o à M. Thibet pour ses pièces artistiques d'anatomie pathologique 4 ^o à M. Lange pour son Anatomie et physiologie du système nerveux, 5 ^o à M. Valleron pour son « Traité des névralgies » — Des mentions honorables sont accordées à M. Amussat pour ses recherches sur les lésions des vaisseaux sanguins, à MM. Serrurier et Rouzeau pour leur travail sur les maladies des voies urinaires, à M. Ph. Boyer pour son ouvrage concernant le traitement des ulcères par la compression à l'aide de bandelettes de diachylon gommé	327
Prix proposés par l'Académie — <i>Grand prix des Sciences mathématiques</i> pour l'année 1842	333
— <i>Prix extraordinaire sur l'application de la vapeur à la navigation</i> , pour 1844	334
— <i>Grand prix des Sciences mathématiques</i> concours de 1843	333
— <i>Prix d'Astronomie</i> (fondation de Lalande), pour 1843	334
— <i>Prix de Mécanique</i> (fondation Montyon), pour 1843	335
— <i>Prix de Statistique</i> (fondation Montyon), pour 1843	Ibid.
— <i>Grand prix des Sciences physiques</i> , pour	

	Pg	es	Page
1845	336	et 337	
— <i>Grand px des Sciences physiques</i> pour 1843	338	et 340	
— <i>Px de Physiologie expérimentale</i> (fondation Montyon) pour 1843	341		
— <i>Px de Médecine et de Chirurgie</i> (fondation Montyon), pour 1843	341	et 342	
— <i>Px concernant les moyens de rendre un art ou un metier moins insalubre</i> (fondation Montyon), pour 1843		<i>Ibid</i>	
— <i>Prix relatif à la vaccine</i> pour 1842 (concours clos, mais non encore jugé)	342		
— <i>Prix concernant les mois apparentes</i> (fondé par M. Menzi), pour 1846	193	et 343	
— <i>Grand prix des Sciences mathématiques</i> — Aucune des 4 pièces adressées au concours pour l'année 1843 n'ayant paru mériter le prix, la question est remise au concours pour l'année 1846	345		
	895		
PROCELLARIIDÆ — Remarques sur quelques points de l'anatomie et de la physiologie des Procellariidæ, et essai d'une nouvelle classification de ces oiseaux, par MM. Hombron et Jacquinot			353
PUITS ARTESIENS — Coïncidence entre les tremblements de terre ressentis en Bretagne et dans la haute Normandie, et l'alteration momentanée de la limpidité des eaux du puits de Grenelle, Lettre de M. Lefort			4)
— Sur la variation des eaux fournies par le puits artésien de Grenelle, Note de M. Lefort			388
— Anomalie dans la distribution de la température des couches terrestres traversées par la sonde dans le forage d'un puits artésien qui s'exécute maintenant à Naples			8)
			Communication de M. Arago

Q

- (1) QUARANTAINES — M. Aubert Roche écrit de nouveau pour prier l'Académie de hâter le travail de la Commission chargée de faire un Rapport sur les diverses communications relatives aux quarantaines
- M. Serres, membre de la Commission, fait connaître les causes qui ont jusqu'ici retardé le Rapport

Ibid

VOIR AINSI LE MOT Peste

- QUARTZ — Sur l'état de surfusion du quartz dans les roches éruptives et dans les filons métallifères, Note de M. Fournet
- Sur quelques faits de surfusion qui viennent à l'appui de la théorie des filons de M. Fournet

105)

1201

R

RACES HUMAINES. Voir au mot *Anthropologie*

RACINES DES VÉGÉTAUX — Sur la tendance des racines à s'enfoncer dans la terre, et sur leur force de pénétration, Note de M. Payer

903

RATE — Sur l'hypertrophie de la rate dans les fièvres intermittentes, Mémoire de M. Courty

95

— Expériences concernant les effets de l'ablation de la rate et du corps thyroïde, par M. Bardeleben

483

RÉCOLTES — Analyses comparées des cendres issues par les engrais et par les récoltes, Mémoire de M. Boussingault

218

RÉSINES — Recherches sur la résine de Maynas, par M. Lamy

242

RESPIRATION — Observations critiques sur la théorie des phénomènes chimiques de la respiration, par M. Gay Lussac

546

— Remarques de M. Magendie à l'occasion de cette communication

554

RHÔNE — Mémoire sur les débordements du Rhône, par M. de Gasparin

104

— A l'occasion de la présentation d'un tableau dans lequel sont enregistrées, jour par jour, les quantités d'eau tombées sur différents points de la Saône, les hauteurs correspondantes des rivières et la direction des vents, l'Académie charge MM. Arago et de Gasparin de s'adresser à M. le Ministre de l'Agriculture et du Commerce à l'effet d'obtenir que le même plan d'observations soit étendu au bassin de l'Isère, de la Durance et du Rhône, et qu'on y joigne des observations thermométriques et barométriques

93

ROUES HYDRAULIQUES — M. Pasot demande si sa turbine a été comprise dans le nombre des inventions examinées par la Commission du concours de Mécanique pour l'année 1842, inventions dont aucune n'a été jugée digne du prix

r

	Pages		Pages
— M. Passot demande si sa turbine, en sup- posant qu'elle ait été au nombre des inven- tions examinées par la Commission qui a fait un Rapport sur le concours de 1842, concours pour lequel il n'y a point eu de prix décerné, pourrait être admise à un concours ultérieur. Il sera répondu à M. Passot qu'à s'il présente, sans y faire au- cun de modifications, une invention déjà jugée dans un précédent concours elle ne pourra être admise.	99	— vapeur (roues à aubes courbes), Mémoire de M. Boulmer.	151
— Nouvelle Lettre de M. Passot au sujet de sa turbine.	382	— Note de M. Kachlin sur une turbine de son invention, dite turbine à double effet.	932
— Nouveau propulseur destiné aux bateaux à		ROELKE, COMPAGNIE — M. Schattmann prie l'Académie de hâter le travail de la Com- mission à l'examen de laquelle a été ren- voyé son Mémoire sur l'emploi du roulet à compresseur pour l'extrusion des chau- ssées en empierrement.	1063
		RUSSACE — Sur une Rubiacée du genre <i>Con-</i> <i>daminosa</i> et sur le vernis qu'elle produit, Note de M. Gondot.	260

S

SAINT-JOUR L'ÉTOILE — Nouvelle disposition proposée par MM. Lefé et Sautreaux.	893	933	thopédiques dans lesquels on a eu recours à des sections musculaires. Note de M. Lan- tey.	75
SALIN — Sur les propriétés optiques de la saliine, de la phloridzine et du cinain, Recherches de M. Bouchardat.	298		— Réponse à quel ques attaques contre la myo- tomie rachidienne par M. J. Guérin.	818
SANG — De la formation des organes de la cir- culation et du sang dans les animaux ver- tébrés par MM. P. et A. Ibert.	88		SECTIONS DE L'ACADÉMIE — Les Sections de Geo- métrie, d'Économie rurale, d'Astronomie et de Zoologie de Médecine et de Chirurgie sont invitées à préparer les listes de Can- didats pour les places de Correspondants vacantes dans leur sein.	130
— Mémoire sur la pile électrique du sang, par M. Du Rand de Lunel.	526	592	— La Section d'Économie rurale, dans la séance du 29 janvier déclare qu'elle est en me- sure de présenter, à la prochaine séance, une liste de Candidats pour la place de Correspondant vacante dans son sein.	16
SAUVETAGE (APPAREILS DE) — Addition à une précédente (communication sur un mat de sauvetage proposé pour les cas d'incendie, par M. Dittmar).	38		— La Section présente comme Candidats : 1° M. Vilmoir 2° et par ordre alphabéti- que MM. Grud, Rudolf, Rieffel, Schat- temann, Villeroy.	266
— Sur un appareil propre à préserver de l'as- phyxie par submersion. Note de M. Mar- fisi.	812		— La Section d'Anatomie et de Zoologie de- mande, à raison de l'état de santé d'un de ses membres et de l'absence momentanée d'un autre, d'ajourner de quelques semaines la présentation d'une liste de Candidats pour la place de Correspondant vacante dans son sein.	167
SCORPIONS — Remarques sur la famille des Scor- pions, et description de plusieurs espèces nouvelles de la collection du Muséum, par M. Gevaux.	36		— La Section présente une double liste de Candidats pour la place vacante : — Zoo- logistes, 1° M. Ch. Bonaparte 2° M. Nils- son 3° MM. Kirby et Mac Leay 4° MM. Deslongchamps et Goldfuss 5° MM. Du- jardin et Macquart — Anatomistes, 1° M. Muller 2° M. Carus 3° MM. de Baer et Rathke 4° MM. Delle Chaise et Valenti.	445
SECTION DES SOUS-CUTANÉES — Sur l'abus et le dan- ger des sections tendineuses et musculai- res dans le traitement de certaines diffor- mités, Lettre de M. Malgaigne.	307		— La Section de Médecine et de Chirurgie pré- sente la liste suivante de Candidats pour la place de Correspondant vacante par suite	
— Lettre de M. J. Guérin en réponse aux alé- gations de M. Malgaigne.	380			
— Mémoire sur la valeur réelle de l'orthopé- die, et spécialement de la myotomie ra- chidienne dans le traitement des dévi- ations latérales de l'épine, par M. Mal- gaigne.	695			
— Sur les résultats de certains traitements or-				

	Pages
du décès de M. <i>Ailey Cooper</i> 1 ^o M. <i>Brodie</i> 2 ^o M. <i>Mott</i> 3 ^o M. <i>Diefenbach</i> 4 ^o M. <i>Chelou</i> 5 ^o M. <i>Strömeyer</i> 6 ^o M. <i>Ruber</i> 445	
— La <i>Section de Géométrie</i> présente comme Cai <i>Infants</i> pour la place de Correspondant vacant par suite du décès de M. <i>Ivory</i> 1 ^{er} M. <i>Hamilton</i> 2 ^e et par ordre alphabétique, M. <i>Lebesgue</i> M. <i>Ostrogadsky</i> M. <i>Rochet</i> M. <i>Steiner</i> 534	
<i>SCIENCE ÉCARTÉE</i> — Sur les accidents causés par l'usage du pain dans lequel entre du sel gic <i>ergote</i> , Lettre de M. <i>Boujean</i> 98	
— Nouvelles recherches sur le mode de développement sur l'action et sur le principe actif de l'ergot des graminées, et particulièrement du seigle, par M. <i>Lerola</i> 131	
— Sur plusieurs nouveaux sels formés par la réaction des acides sulfuriques et azotés sur les bases alcalines, Note de M. <i>Franz</i> 1110	
— Dixième Mémoire sur la solubilité des sels par M. <i>Poggiale</i> 1191	
<i>SÉLÉMENTS</i> — Sur une nouvelle série de sels doubles, et sur quelques combinaisons éphémères qui compliquent parfois les essais par voie humide Mémoire de M. <i>Poussin</i> 854 et 892	
<i>SÉRIE</i> (Touteux de graines de) — Expériences de MM. <i>Payen</i> et de <i>Gaspard</i> sur la qualité nutritive de ces tourteaux 797	
<i>SÉRIE</i> — Alence de circonvolutions dans le cerveau d'un Oulisti, nouvel exemple de la reproduction de ces petits quadrumanes ou France, Lettre de M. <i>Perquin</i> 191	
<i>SOIE</i> — Mémoire sur la formation de la soie par M. <i>Robinet</i> 92	
<i>SOLÉIL</i> — Apparition de nouvelles taches sur le disque du soleil, Lettre de M. <i>Coulter</i> 880	
<i>SOLUBILITÉ DES SELS</i> — Recherches de M. <i>Poggiale</i> 2 ^e partie 1191	
<i>SOUFAGE EN MER</i> — Sur un jupon qui permet de sonder un mer pendant la marche du navire Note de M. <i>Laguel</i> 859	
<i>SUR</i> — Sur la manière dont se produisent les sons, et sur les phénomènes qui en résultent, Mémoire de M. <i>Fermond</i> 111	
— Examen des phénomènes qui se produisent pendant la formation du son dans des tuyaux ouverts et dans des tuyaux fermés, par M. <i>Fermond</i> 1125	
<i>SOUFRE</i> — M. <i>Simonin</i> écrit que le procédé d'épuration du soufre pour lequel M. <i>Lamy</i> a obtenu une récompense de l'Académie, est depuis longtemps en usage dans sa fabrique de produits chimiques, où M. <i>Lamy</i> était autrefois employé 533	
<i>SPECTRE SOLAIRE</i> — Sur la température des dif-	

	Page
férentes parties du spectre solaire, Mémoire de M. <i>Melloni</i> 39	
<i>SPERMATOZOAIRES</i> — Sur les spermatozoaires de l'homme et des animaux par M. <i>Pouchet</i> 821	
— Sur l'épithélium des Zoospermes, Note de M. <i>Mandl</i> 891	
— Remarques de M. <i>Pouchet</i> à l'occasion d'une réclamation de priorité contenue dans la Note de M. <i>Mandl</i> 106	
<i>STATISTIQUE</i> — Statistique du Metique par M. <i>L'Hôte</i> 185	
— Sur les rapports des crimes dans les diverses classes de la société et à différentes Ages remarques adressées par M. <i>Fayet</i> à l'occasion d'un passage qui le concerne dans le Rapport sur le dernier concours pour le prix de Statistique 131	
— M. <i>Francaux</i> en qualité de Rapporteur de la Commission du prix de Statistique présente quelques remarques sur la Lettre de M. <i>Fayet</i> 1112	
— M. <i>Fayet</i> adresse la seconde partie de son travail sur la Statistique intellectuelle et morale de la France, et y joint des Remarques relatives au Rapport de la Commission du concours de 1842 933	
<i>SUCRE</i> — Note sur la fabrication du sucre de betterave, par M. <i>Dumas</i> 61	
— Observations sur l'act du sucre dans l'alimentation des granivores, Mémoire de M. <i>Lelelier</i> 159	
— Note sur l'extraction du sucre de betterave, par M. <i>Payen</i> 663	
— Remarques de M. <i>Dumas</i> à l'occasion de cette communication 666	
— Réponse de M. <i>Payen</i> aux remarques de M. <i>Dumas</i> 667	
— Le sucre de raisin, la dextrine et autres substances alimentaires hydrocarbonées ne peuvent être assimilées qu'après avoir été transformées par les alcalis du sang en de nouveaux produits Note de M. <i>Mialhe</i> sur la cause du diabète 707	
— M. <i>Pelouze</i> fait remarquer, à l'occasion de cette communication, que MM. <i>Bernard</i> et <i>Barreswil</i> ont observé que le sucre injecté dans le sang passe, sans modification, dans les urines, tandis qu'on ne l'y retrouve plus quand il a été dissous dans le suc gastrique Ibid	
<i>SULFATES</i> — M. <i>Dumas</i> présente, au nom de M. <i>Malapert</i> des cristaux de sulfate de soude et de sulfate de magnésie remarquables par leur forme 691	
— Note sur le sulfate chromique, par M. <i>Kopp</i> 1156	
<i>SELF-COMBUSTION</i> — Produits de la distillation	

	Pages		Pages
sèche des sulfocyanures, Mémoire de M. <i>Gaihaud</i>	158	— Remarques de M. <i>Deleau</i> à l'occasion de ce Mémoire	838
SURDITÉ — Recherches sur quelques points d'anatomie pathologique de la trompe d'Eustache, et sur la surdité qui en peut résulter, par M. <i>Bonnefont</i>	682	— Lettre de M. <i>Bonnefont</i> en réponse aux Re- marques de M. <i>Deleau</i>	88
		SURSAISON Voir au mot <i>Quariz</i> et au mot <i>Filans</i>	
T			
TAXIA BACCATA — Recherches sur l'embryoge- nie de ce végétal, par M.M. <i>de Mirlot</i> et <i>Spach</i>	114	— Lettre de M. <i>Vais</i> <i>Clermonte</i> relative à ce coup de foudre	894
TELEGRAPHES — Description et figure d'un nouveau télégraphe de nuit par M. <i>Ticauter</i>	38 et 312	— M. <i>Arago</i> communique, d'après un journal que lui a transmis M. <i>de Li Pyle</i> et quel- ques détails sur un coup de foudre qui a frappé le clocher de l'église de Gracens	1062
— Mémoire sur un nouveau système telegra- phique pour le jour et la nuit, par M. <i>Gonon</i>	241	TOUTES PAYS — Sur la construction de tours en fer batti, très élevées destinées pour des phares, des sémaphores etc. Note de M. <i>Jannard</i>	1062
— Note sur les télégraphes électriques, par M. <i>Faidy</i>	792	TOLTEAUX DE GRAINE DE SEMENCE — Expe- riences sur la qualité nutritive de ces tourteaux par M.M. <i>Payen</i> et <i>de Gas</i> par	227
TEMPERATURE — Anomalies observées à Naples relativement à la distribution de la tempe- rature dans les couches terrestres traver- sées par la sonde durant le forage d'un puits artésien, (communication de M. <i>Arago</i>)	834	— M. <i>Hatin</i> écrit que dans les cas de croup la cautérisation de l'arrière gorge par le nitrate d'argent peut, si elle est prati- quée à temps, dispenser presque toujours de pratiquer la trachéotomie	79
— Voyez aussi p. 764, le dernier paragraphe d'une Lettre de M. <i>Melloni</i> à M. <i>Arago</i>		TRANSFORMATION des organes — Recherches sur les transformations des appendices dans les Articulés, par M. <i>Bailly</i>	161
TENTHÉDES — Sur les tenthréides de la vigne, et sur un Hyménoptère dont la larve vit dans le canal mi-lucidaire du mûrier Lettre de M. <i>Vallois</i>	1192	TREMBLEMENTS DE TERRE — Coincidence entre les tremblements de terre ressentis en Bretagne et dans la haute Normandie et l'altération momentanée de la limpidité des eaux du puits de Grenelle, Lettre de M. <i>Lefort</i>	49
TERRES ALTALES — Aperçu topographique sur les terres et les glaces australes par M. <i>Hombert</i>	2	— Liste des tremblements de terre ressentis en Europe, et dans les parties adjacentes de l'Afrique et de l'Asie pendant l'année 1843, par M. <i>Perrey</i>	363
TERMOGRAPHES — Appareils destinés à fixer avec précision le point d'ébullition de l'eau dans les thermomètres, Note de M. <i>Tavernier</i>	29	— Sur un tremblement de terre qui a été res- senti à la Corogne le 18 avril 1844, Note de M. <i>Marcy Monge</i>	67
— Note ayant pour titre Perfectionnement du baromètre et du thermomètre, par M. <i>Desguenais</i>	1001	TRIGONOMETRIE — M. <i>Mittler</i> propose l'emploi d'une nouvelle ligne trigonométrique	23
— M. <i>Arago</i> cite, d'après une Lettre de M. <i>Requien</i> , un passage d'une Lettre de <i>Legendre</i> d'après laquelle il semble que ce natura- liste aurait appliqué, avant <i>Celsius</i> l'é- chelle centigrade au thermomètre	1063	TRUSCULISATION — Recherches microscopiques et physiologiques sur la tuberculisation, par M. <i>Lebert</i>	356
— M. <i>Bodur</i> présente des thermomètres dans lesquels la lecture de l'échelle est faci- litée par l'addition d'une couche d'émail blanc ou coloré, appliquée sur le tube	1132		
TRACHÉOTOMIE — Expériences concernant les effets de l'ablation du corps thyroïde et de la tête, par M. <i>Bardet</i>	485		
TRONCHER — M. <i>Arago</i> donne quelques dé- tails sur un coup de foudre qui a frappé récemment le clocher de la cathédrale de			

	Page		Page
FINIERS BALANÇES — Mémoire sur les tu ils et sur le charbon de bois, par M. Lecomte	688	Emilion	187
FINIERS ENFUTES — Sur le traitement des tuils et des crevettes dites enries, Navet ma te etc., par M. Lafargue de Saint		TIRIENS — Voir à Roues hydrauliques	
		TYRO RAPRIE — Sur l'impression au type procédé qui doit permettre d'obtenir une grande réduction dans les frais d'impres sion et de papier, Note de M. Pantelouche	792

U

UANIUM — Recherches sur l'uranium deuxième partie, par M. Peligot	682
---	-----

V

VACCINE — Quelques uns des auteurs de pièces adressées pour le concours au prix con cernant la vaccine ayant fait connaître leur nom l'Académie, consultée par la Commission décide que ces pièces ne se ront point écartées du concours attendu que le programme n'a pas imposé formel lement aux concurrents la condition de faire leur nom	481	moire concernant l'action de la lumière colorée sur les végétaux, Réponse de M. Payer à quelques remarques de M. Du rochet	32
— Communication de M. Magendie relative à un cas de cow pox na urel et aux expé riences qui ont été faites à cette occasion	936	— Réponse à cette Note par M. Dutrochet	63
— Cow pox naturel trouvé sur une vache ap partenant à M. Magendie — développent les nombreuses pustules chez deux femmes varioloées chargées de la traire, — inocula tion de la matière des pustules de la vache à plusieurs enfants, — développement chez l'un d'eux d'une vraie vaccine, Mémoire de M. Piar	986	— Nouvelle Lettre de M. Payer sur le même sujet	190
— M. James annonce à cette occasion un tra vail concernant l'examen comparatif du renouellement du vaccin et de la régé neration	1201	— Remarques de M. Dutrochet à l'occasion de la Lettre de M. Payer	191
VAINES SANGUINES — M. Amussat demande la correction de reproduire pour le compléter, un Mémoire sur les blessures des vaisseaux sanguins qui il avait présenté au dernier concours pour les prix de Médecine et de Chirurgie, et qui a été mentionné fa vorablement dans le Rapport de la Com mission	491	— Rapport sur un travail de M. Zantedeschi concernant l'influence qu'exercent, sur la végétation des plantes et la germination des graines, les rayons solaires transmis par des verres colorés, Rapporteur M. Dutrochet	849
VAPÈUR D'EAU — Recherches sur la classe tique de la vapeur aqueuse, par M. Re gnault	531	— Note sur la tendance des racines à s'enfon cer dans la terre, et sur leur force de péné tration, par M. Payer	993
— Voir aussi au mot Eau		— Rapport sur un Mémoire de M. Payer in titulé Mémoire sur la tendance des ra cines à fuir la lumière Rapporteur M. Dutrochet	1169
VARIATION LUNAIRE — Voir au mot Lune		— M. Payer en présentant l'ensemble de ses Mémoires sur le développement des vé gétaux, fait connaître et résume les prin cipaux résultats de ses recherches	269
VARIOLÉ — De la variole confusée et de son traitement par la méthode de désinfecti on, Mémoire de M. Baillou	151	— Expériences concernant l'action de l'iode sur les végétaux vivants, par M. Robin Mand	1188
VEGETAUX — Additif à un précédent Mé		— Voir aussi au mot Botanique	
		VÈNES — Recherches sur les fonctions des vaisseaux et des veines, faites au moyen de l'introduction, dans l'économie ani male, de composés arsenicaux et antimo niaux, Mémoire de M. Chatin	379
		VÈNES LIQUIDES — Théorie de la contraction des veines liquides lancées par des orifices ou minces parois planes, Mémoire de M. Bacryer	85
		VENTS — Lettre de M. Durand sur un anémo graphe de son invention	52

	Page		
— M. <i>Maisnier</i> adresse une nouvelle Note imprimée sur sa théorie des vents aliés, et demande que cette théorie devienne l'objet d'un Rapport. Cette demande en raison d'une décision antérieure de l'Académie sur les travaux que leurs auteurs ont rendus publics par la voie de l'impression, ne peut être accordée. 191 et	119	Voyages scientifiques. — M. <i>Ruda</i> près de partir pour l'Amérique du Sud, se met à la disposition de l'Académie pour les observations relatives à la médecine et à la chirurgie qu'elle jugerait convenable de faire faire dans le pays qu'il va parcourir. 218	
VENUS — Notice sur une Rubiacée du genre <i>Condamna</i> et sur le vernis qu'elle produit par M. <i>Goudot</i> . 260		— M. <i>Arago</i> demande qu'une Commission chargée de faire un Rapport sur les résultats scientifiques de la dernière expédition en voye dans le nord de l'Europe, fasse savoir le plus promptement possible si il serait utile que les observations de <i>Bousséop</i> fussent reprises et continuées, M. le Ministre de la Marine désirant connaître sur ce point l'opinion de l'Académie. 483	
VERRES destinés aux usages de l'optique — Nouvelle Note sur le flint glass et le crown glass fabriqués à la verrerie de Choisy le Roi par M. <i>Bontemps</i> . 415		— M. <i>Lefebvre</i> présente un résumé des résultats obtenus par la Commission scientifique envoyée en Abyssinie sous sa direction. 731	
— M. <i>Arago</i> met sous les yeux de l'Académie deux plaques de flint glass fabriquées par M. <i>Guinant</i> . 526		— Exploration géologique d'une partie très peu connue de la Turquie d'Europe par M. <i>Chancelier</i> . 827	
— M. <i>Arago</i> communique l'extrait d'une Lettre de M. <i>Bontemps</i> qui offre de donner à des prix très modiques, c'est-à-dire au prix de revient, les disques de flint glass et de crown glass dont on aura besoin pour la grande lunette destinée à l'Observatoire. 953		— M. <i>Ackermann</i> près de partir pour l'île de Madagascar, ou il se propose de se livrer à des recherches d'histoire naturelle, prie l'Académie de vouloir bien lui indiquer les points aux lesquels il doit porter toute son attention. 838	
VERRAISON — Sur la formation du fil de soie produit par les larves de ces insectes, Mémoire de M. <i>Robinet</i> . 31		— M. le Ministre de l'Instruction publique adresse à l'Académie le résumé qui lui a été transmis par M. le Ministre de la Guerre d'un ouvrage manuscrit dans lequel MM. <i>Galmier</i> et <i>Ferret</i> ont consigné les observations qu'ils ont faites durant un séjour de plusieurs années en Abyssinie. Voir aussi au mot <i>Géologie</i> . 1151	
VIDE — Des applications du vide aux travaux industriels, Mémoire de M. <i>Kuhlmann</i> . 1046		— L'Académie reçoit un Catalogue raisonné des pièces zoologiques (mammifères et oiseaux) recueillies par MM. <i>Galmier</i> et <i>Ferret</i> dans le cours de leur voyage en Abyssinie, et une description des espèces nouvelles qui font partie de cette collection. Ce catalogue et ces descriptions ont été rédigés par M. <i>Guesin Menerville</i> . 1111	
VOITURES — Figure et description d'une voiture suspendue destinée au transport des objets portatifs, par M. <i>Fuss</i> . 152			
— Description d'un appareil portatif pour le pesage des voitures, par M. <i>Galy Casalat</i> . 224			
VOLCANS — Lettre sur la dernière éruption de l'Etna, par M. <i>Chevalley de Rivas</i> . 58			
— Rapport sur un Mémoire de M. <i>Roset</i> , concernant les volcans de l'Auvergne Rapporté par M. <i>Dufrenoy</i> . 130			
— Sur un volcan éteint du département de l'Hérault, Lettre de M. <i>Duchartre</i> . 150			
VOTES — Nouvelle théorie des votes, par M. <i>Fabre</i> . 421			

Z

ZINC (Chlorure de) Voir au mot *Chlorures*| ZOOSPERMES Voir au mot *Spermatozo*

TABLE DES AUTEURS

	Pages		Page
ABRIA — Sur la chaleur dégagée dans l'hydratation de l'acide sulfurique	288	MM	pour le prix concernant l'application de la navigation à la vapeur
ACKERMANN, prie de partir pour l'île de Madagascar, où il se propose de se livrer à des recherches d'histoire naturelle prise l'Académie de vouloir bien lui indiquer les points sur lesquels il doit porter son attention	838	—	Détails sur les effets de l'explosion d'un grand gazomètre qui a eu lieu à Paris, le 30 avril 1844. L'Académie ne peut, tant que l'auteur ne se sera pas fait connaître, donner de la publicité à ses renseignements qui paraissent d'ailleurs dignes d'intérêt
AGASSIZ — Note sur quelques poissons fossiles adresses de Pernambuco, par M. Chevrillat	1007	ARAGO —	Remarques à l'occasion d'une Lettre de M. Jobard relative à un modèle d'écluse existant au Musée de Bruxelles
— M. Agassiz demande que son ouvrage sur les poissons fossiles ouvrage dans lequel il a traité expérimentalement et d'une manière directe plusieurs questions importantes de physiologie générale, soit admis à concourir pour le prix de Physiologie expérimentale fondé par M. de Montyon	1109	—	Communications relatives à la comète de M. Faye
ALME — Mémoires sur les variations de niveau de la Méditerranée dans le port d'Alger	219	—	M. Arago lit, dans la séance publique du 26 février, des extraits d'une biographie de Bailly
AMUSAT — Une mention honorable lui est accordée à titre d'encouragement pour ses recherches expérimentales sur les blessures des vaisseaux sanguins	327	—	M. Arago rend compte des expériences qui ont été faites à Vincennes en sa présence et celle de M. Segnier, avec la carabine Deligne
— M. Amusat annonce l'intention de continuer ses recherches, et demande l'autorisation de reprendre le Mémoire qu'il a soumis au jugement de la Commission	493	—	A l'occasion d'un Mémoire de MM. Fizeau et L. Foucault sur l'intensité de la lumière émise par le charbon dans l'expérience de Davy, M. Arago rappelle les expériences, déjà très-anciennes, à l'aide desquelles il compare, par des moyens photométriques directs, la lumière du soleil et celle des charbons de la pile
ANDRAL présente, au nom de l'auteur, M. Etoc Demay des recherches statistiques sur le suicide, recherches relatives aux cas observés dans l'arrondissement du Mans pendant un espace de douze années	483	—	M. Arago entretient l'Académie d'un projet relatif à la construction d'une grande lunette destinée à l'Observatoire
— M. Andral est nommé membre de la Commission des prix de Médecine et de Chirurgie	387	—	M. Arago annonce l'accident arrivé pendant le forage d'un puits artésien que l'on creuse à Naples dans la cour du palais, et parle des anomalies que l'on croit avoir observées, en exécutant le forage, relativement à la distribution de la température dans les couches terrestres traversées par la sonde
ANONYMES — Mémoire adressé au concours pour le prix extraordinaire concernant l'application de la vapeur à la navigation (séance du 4 mars)	378	—	M. Arago donne quelques détails sur un coup de foudre qui a frappé récemment le

MM	Pages	MM	Pages
clocher de la cathédrale de Laon, et fait ressortir l'intérêt qu'il pourrait y avoir pour la science à obtenir des renseignements bien authentiques sur cet événement	894	des échantillons de bois de chêne vert préparés par M. Werner, au moyen d'un procédé de dessiccation particulière qui prévient le fendillement et permet d'employer ce bois en ébénisterie	726
— Observations relatives à l'éclipse totale de lune du 31 mai 1844	1119	— M. Arago met sous les yeux de l'Académie des cartes en relief et en couleur, fabriquées par M. Bauw-Heller au moyen d'un procédé de gaufrage qui permet de les donner à un prix très modique	526
— Sur une disposition des nuages qui répète celle qu'afficient les rayons lumineux dans l'aurore boréale et qui présente aussi la même orientation, observation faite dans la soirée du 23 juin 1844 (en commun avec M. Lequier)	1118	— M. Arago, à l'occasion d'un Rapport de M. Thenard, sur une question de priorité entre MM. Dica et Donne, communique l'extrait d'une nouvelle Lettre de M. Dica, qui fait partie de la correspondance de la séance	644
— M. Arago met sous les yeux de l'Académie un buste en marbre de James Watt exécuté d'après le marbre original de Chantrey, et dont le fils de l'illustre ingénieur fait hommage à l'Académie	66	— M. Arago présente, au nom de l'auteur M. le docteur Sturmer, trois volumes de Lettres sur différentes questions de médecine	657
— M. Arago présente au nom de M. Collardens un manomètre construit sur un principe entièrement nouveau	97	— M. Arago présente au nom de l'auteur, M. Hamme de Bell, les premières livraisons d'un ouvrage ayant pour titre <i>Les steppes de la mer Caspienne, le Caucase et la Russie méridionale</i>	864
— M. Arago présente un portrait photographique exécuté par M. Daguerre, au moyen d'un procédé qui ne diffère de l'ancien que par la composition de la couche sensible	152	— M. Arago présente, au nom de l'auteur, M. Moigno, le deuxième volume des <i>Leçons de calcul différentiel et de calcul intégral</i>	934
— M. Arago annonce que M. Daguerre, qui devait envoyer une Note sur son nouveau moyen de préparer la couche sensible des plaques destinées à recevoir les images photographiques, a encore besoin de quelques nouveaux essais pour donner à l'écriture de son procédé toute la précision nécessaire	187	— M. Arago met sous les yeux de l'Académie la reproduction faite par M. A. Dapont au moyen de la lithotypographie, d'un ouvrage imprimé en 1699, d'anciennes gravures d'une carte manuscrite et de plusieurs lettres autographes de dates diverses	934
— M. Arago met sous les yeux de l'Académie un modèle du nouveau système de fermeture imaginé par M. Hallett pour les tubes pneumatiques des chemins de fer à pression atmosphérique	226	— M. Arago met sous les yeux de l'Académie un tableau public par la Commission hydro-métrique de Lyon, tableau qui donne jour par jour, pour le mois de mars 1844, la quantité d'eau tombée sur différents points du bassin de la Saône, les hauteurs correspondantes des rivières et la direction des vents	935
— Sur la proposition de M. Arago, une Commission est chargée de l'examen de toutes les communications qui ont été déjà faites à l'Académie, ou qui le seront ultérieurement, relativement aux chemins de fer à pression atmosphérique	481	— M. Arago communique l'extrait d'une Lettre de M. Bostemps, qui offre de donner, à un prix très-modique, ce qui a été au prix de revient, les disques de flint glass et de crown glass dont on aura besoin pour la grande lunette destinée à l'Observatoire	955
— M. Arago demande que la Commission qui a été chargée de faire un Rapport sur les résultats scientifiques obtenus par la dernière expédition envoyée dans le nord de l'Europe examine le plus promptement possible si il serait utile que les observations de Bessels fussent reprises et continuées, M. le Ministre de la Marine désirent connaître, sur ce point spécial, l'opinion de l'Académie	483	— M. Arago met sous les yeux de l'Académie plusieurs images daguerriennes, d'après lesquelles ont été exécutées les planches de la partie anthropologique du voyage de l' <i>Astrolabe</i> et de la <i>Zélée</i> . Ces images sont la reproduction de têtes moules sur nature vivante, par M. le docteur Dumoulier, dans le cours de l'expédition	1032
— M. Arago met sous les yeux de l'Académie deux plaques de flint glass fabriquées par M. Guinand	526	— M. Arago communique, d'après un journal que lui a transmis M. de la Pylais, quelques détails sur un coup de foudre qui a	

MM.	Page
Rappé la Sicbe du clocher de Grasse	1063
— M. <i>Arago</i> entrelient l'Académie, d'après une communication qui lui a été faite par M. <i>Antoni</i> d'un travail qui doit s'effectuer à Florence sous les auspices du grand duc de Toscane, pour réunir et coordonner toutes les observations météorologiques qui se feront en diverses parties de l'Italie	1063
M. <i>Arago</i> cite d'après une Lettre de M. <i>Roquin</i> , un passage extrait de la correspondance de <i>Linné</i> d'après lequel il semblerait que ce naturaliste a le premier appliqué au thermomètre la division centigrade	1063
— M. <i>Arago</i> est nommé membre des Commissions suivantes	
— Commission chargée de déterminer la question à proposer comme sujet d'un concours pour le grand prix des Sciences mathématiques de l'année 1846	210
— Commission d'un concours pour le grand prix des Sciences mathématiques année 1843	353
— Commission chargée d'examiner si le platiné préparé par le procédé de M. <i>Jeanne</i> ne subit pas d'altération par suite d'une immersion prolongée dans l'eau	387
— Commission du prix d'Astronomie fondée	

MM.	Page
tion Lalande	477
— Commission chargée de préparer des instructions pour les artistes auxquels sera confiée l'exécution d'une grande lunette destinée pour l'Observatoire	894
— L'Académie ayant à désigner par la voie du scrutin trois de ses membres pour faire partie du conseil de perfectionnement de l'Ecole Polytechnique pendant l'année 1846, M. <i>Arago</i> qui était habituellement un des trois académiciens élus, prie, cette fois, ses confrères de reporter leurs suffrages sur un autre membre	523
ARTUR envoie une Note ayant pour titre « Explication des résultats obtenus par M. <i>Pelouse</i> relativement aux actions de l'oxyde rouge de mercure sur le chlorure »	1063
AUBERT-ROCHE écrit le nouveau pour prier l'Académie de hâter le travail de la Commission chargée de faire un rapport sur diverses communications relatives à la question des quarantaines	431
AUTIER présente des échantillons de chrysoprase préparée par un procédé mécanique	508 et 864
AVRIL. — Dépôt d'un paquet cacheté (séance du 15 janvier)	30
— Note sur la décomposition des polyèdres	185

B

BABINET — Rapport sur un Mémoire de M. <i>Wertheim</i> intitulé Recherches sur l'élasticité	921
— M. <i>Babinet</i> est nommé membre de la Commission du grand prix des Sciences physiques question concernant le mécanisme de la production de la voix chez l'homme	387
— Et de la Commission chargée de préparer des instructions pour les artistes auxquels sera confiée l'exécution d'une grande lunette destinée pour l'Observatoire	894
BÄYER — Aperçu général d'une théorie de la contraction des veines d'eau lancées par des orifices en minces parois planes	85
BAILLEUL — De la variabilité continue et de son traitement par la désinfection	151
BANET — Sur la généralisation de certains théorèmes de mécanique analytique donnés par Lagrange et Huygens	695
— Sur les perturbations dans le mouvement des comètes dues à la résistance de l'éther	262
BARDELEBEN — Expériences concernant les effets de l'ablation de la rate et du corps thyroïde chez les mammifères	485
BARRAL — Sur la composition de la latérite	

pour les potées et panneaux de cheminée	71
BARRESVILL — Recherches physiologiques sur les substances alimentaires (en commun avec M. <i>C. Bernard</i>)	281
— MM. <i>Barresvil</i> et <i>Valleé</i> déposent un paquet cacheté (séance du 1 mars)	445
— MM. <i>Barresvil</i> et <i>Valleé</i> demandent dans la séance du 6 mai l'ouverture de ce paquet qui se trouve contre l'une Note sur la substitution de la poudre d'Algaroth à la céruse dans la peinture à l'huile	864
BARRET, écrit par erreur pour <i>Banet</i> Voyez ce nom	
BARSE. — Dépôt d'un paquet cacheté séance du 22 janvier	163
BAUDELOQUE — Exposé des résultats obtenus dans quatorze opérations de céphalotripsie	526
BAUDENS, qui avait soumis précédemment au jugement de l'Académie un appareil pour le traitement des fractures du corps et du col du fémur, demande que MM. les Commissaires chargés de faire le Rapport sur son invention veillent bien	

MM	Page	MM	Page
constater l'état de plusieurs individus qu'il traite en ce moment au Val-de-Grâce, au moyen de son appareil . . .	838	BERNARD (C) — Recherches physiologiques sur les substances alimentaires (en commun avec M. Barrowell) . . .	783
BEAUTEUPS-BEAUPRE présente, au nom de M. le Ministre de la Marine, le dernier volume du « Voyage autour du monde » de M. de Freycinet volume qui contient les observations de magnétisme terrestre faites dans le cours du voyage de l' <i>Uranie</i>	38	BERTHER est nommé membre de la Commission chargée d'examiner si le platine travaillé par le procédé de M. Jeannety peut souffrir sans altération l'immersion dans l'eau	387
BEQUEREL fait hommage à l'Académie du second et dernier volume de son « Traité de physique appliquée à la chimie et aux sciences naturelles »	187	BERTHOLD — Recherches sur la durée de la grossesse	1003
— Deuxième Mémoire sur la coloration des métaux au moyen de dépôts successifs de peroxyde de plomb opérés par l'électricité voltaïque	197	BERTRAND DE LOM — Mémoire sur quelques faits minéralogiques et géologiques nouveaux	821
— De la précipitation des métaux par d'autres métaux	419	BEUDANT , au nom de la Commission centrale administrative, annonce la nomination de M. Maury à la place de sous bibliothécaire	152
— Sur l'argenteur électro chimique, Note faisant suite à de précédentes communications concernant la déposition des métaux sur les métaux	554	— M. Beudant est nommé membre de la Commission administrative pour l'année 1844	2
— Note concernant la réclamation faite par M. Leval dans la séance du 15 avril, relativement à quelques faits de précipitation des métaux sur les métaux	715	BINET (J) — Mémoire sur l'intégration des équations de la courbe élastique à double courbure	1115
BECCOUPLU (E) — Sur des lois qui président à la décomposition électro chimique des corps	361	— M. Binet est nommé membre de la Commission chargée d'examiner les pubes adressées au concours pour le grand prix des Sciences mathématiques, année 1843	353
BFI HOMME et voit le résumé de ce qu'il considère comme neuf dans les Recherches sur l'idiotie qu'il a adressées pour le concours aux prix de Médecine et de Chirurgie	1193	BIOT — Remarques sur une Note de M. Sédillot relative à la part qu'on peut attribuer aux Arabes dans la découverte de la variation lunaire	49
BI I LEVILLE — Mémoires sur les polygones étoilés	422	— M. Biot fait hommage à l'Académie de l'ensemble des Mémoires qu'il a publiés dans le Journal des Savants, sur la part qu'on a attribuée aux Arabes dans la découverte de la variation lunaire	103
BILLINGLRI demande à être compris dans le nombre des Candidats pour la place de correspondant vacante dans la Section d'Anatomie et de Physiologie	381	— A l'occasion d'une communication faite par M. Regnault sur la force élastique de la vapeur aqueuse M. Biot met sous les yeux de l'Académie un travail mathématique dans lequel il a eu des occasions fréquentes d'employer, comme exemples de calcul, des résultats obtenus par M. Regnault dans la série d'expériences qui fait l'objet de sa communication	545
BI NOIT prie l'Académie de hâter le travail de la Commission à l'examen de laquelle ont été renvoyées plusieurs Notes qu'il a adressées sur un appareil destiné à faire connaître la hauteur des marées pendant l'absence des observateurs	531	— Sur les phénomènes de polarisation produits à travers les globules féculacés	795
BLRGSM — Lettre de M. d'Arcet sur les expériences faites par une Commission de l'Institut des Pays Bas, relativement aux propriétés nutritives de la gelatine	532	— M. Biot est nommé membre de la Commission chargée de déterminer la question à proposer comme sujet du concours pour le grand prix des Sciences mathématiques, année 1846	240
BERNARD — Y preuves supportées par des canons de fusil sortis de la fabrique de M. Alb. Bernard, Note de M. Segnier	723	— Et de la Commission chargée de préparer des instructions pour les artistes auxquels sera confiée l'exécution d'une grande lunette destinée pour l'Observatoire	891
BERNARD, DE VILSEFRANCE — Expériences concertées sur l'influence des nerfs de la huitième paire sur les phénomènes chimiques de la digestion	995	BIZIO (B) — Lettre sur une coloration singulière observée dans la polenta de maïs, et causée par le développement d'un Crisp	163

MM	Page	MM	Page
log me observation faite, il y a très longtemps d'un phénomène qui rentre dans la classe de ceux sur lesquels M Moyer a depuis appelé l'attention	951	le désir que l'on essaye comparativement les résultats de deux méthodes de traitement proposées dans les cas de retrecissement de la trompe d'Eustache, l'emploi des sondes élastiques, d'une part et celui des injections sériennes, de l'autre	880
BLAINVILLE (de) — Rapport sur les pièces adressées au concours pour le prix de Physiologie expérimentale concours de 1842	192	BONNET HIGNOU — Dépôt d'un paquet cacheté (sance du 4 mars)	382
— M de Bla n ille est nommé membre des Commissions suivantes		BONTEMPS — Nouvelle Note sur le Saint glass et le crown glass fabriqués à la verrerie de Choisy-le-Roi	415 et 955
— Commission chargée de déterminer la question à proposer pour le grand prix des Sciences physiques de 1845	218	BONTEMPS, Pécqueret et Zambaux — Nouveau système de locomotion sur les chemins de fer au moyen de l'air comprimé	1131
— Commission du grand prix des Sciences physiques question concernant le développement du fœtus chez les Oiseaux et les Reptiles	387	BORROW — Mémoire sur les causes des explosions des chaudières à vapeur	932
— Commission du grand prix des Sciences physiques, question concernant le mécanisme de la production de la voix chez l'homme	16 d	BORY DE SAINT VINCENT — Sur les osdres de l'Atlas et l'emploi de leur bois dans les constructions maritimes d'Algérie	1067
— Commission du grand prix des Sciences physiques, question concernant l'examen comparatif de l'organe de la voix chez l'homme et chez les animaux mammifères	16 d	— Mémoire sur les Isoetes et les nouvelles espèces de cette famille découvertes en Algérie	1163
— Commission des prix de Médecine et de Chirurgie	16 d	BOUCHARDAT — Sur le mouvement moléculaire rotatoire de la salicine, de la phloridaine et du cinchon	298
— Commission du prix de Physiologie expérimentale	477	— Mémoire sur les ferments alcooliques	1130
BLONDEAU DE CAROLLES — Note sur la fermentation acétique	695	BOUET — Dépôt d'un paquet cacheté (sance du 22 avril)	793
BOBILIERE — Dépôt d'un paquet cacheté (sance du 15 janvier)	99	BOUISSON — Sur la coloration du chyle par la garance	835
BODEUR présente des thermomètres dans lesquels la lecture de l'échelle est facilitée par l'addition d'une couche d'émail blanc ou coloré appliquée sur le tube	1132	BOULMIFR — Sur un nouveau propulseur destiné aux bateaux à vapeur (roues à aubes courbes)	151
BODICHON demande l'autorisation de reprendre une Note qu'il avait précédemment adressée sur un cas d'empoisonnement par le bioxalate de potasse	192	— Sur un moyen destiné à prévenir la rupture des essieux dans les locomotives employées sur les chemins de fer	378
BODIN — Note sur un niveau à bulle d'air et à lunette	864	BOURGERY et JACOB — Une somme de 5000 fr leur est accordée, à titre de récompense, pour leur Iconographie d'anatomie chirurgicale et de médecine opératoire	99 et 327
BONAPARTE (Ca) est nommé correspondant de l'Académie Section d'Anatomie et de Zoologie	476	— MM Bourgery et Jacob demandent que l'ouvrage dont ils continuent la publication soit admis au concours pour les prix de Physiologie expérimentale et considéré cette fois sous le point de vue de l'utilité qu'il peut avoir pour l'étude de la physiologie, de l'anatomie pathologique et de la thérapeutique	592
— M Ca Bonaparte adresse des remerciements à l'Académie pour sa nomination	894	BOUSSINGAULT — Analyses comparées des cendres laissées par les engrais et par les récoltes	218
BONJEAN — Sur les accidents causés par l'usage du pain dans lequel entre du seigle ergoté	98	— M Boussingault fait hommage à l'Académie du deuxième et dernier volume d'un ouvrage qu'il vient de publier sous le titre de « Economie rurale considérée dans	
— Sur la non-absorption du kermès minéral administré à l'intérieur	262		
BONNAFONT — Recherches sur quelques points d'anatomie pathologique de la trompe d'Eustache, et sur la surdité qui en peut résulter	682		
— M Bonnafont à l'occasion d'une Lettre de M Delcay exprime comme médecin,			

MM	Pages	MM	Pages
ses rapports avec la chimie, la physique et la météorologie »	238	électrique destiné à l'usage des médecins et soumis précédemment au jugement de l'Académie	527
— Rapport sur un Mémoire de M. Casaseca concernant la composition de la canne créole cultivée à la Havane	349	BRETON DE CHAMP — Aperçu de quelques propriétés des segments déterminés par les lignes et surfaces algébriques sur les groupes des cordes ou : entes menées symétriquement par un même point	863
— Remarques à l'occasion d'une Note de M. Jasson Saint-Hilaire	382	BRODIE est nommé Correspondant de l'Académie, Section de Médecine et de Chirurgie	476
— Observations simultanées faites à Paris et à Andilly, près Montmorency, pour rechercher la proportion d'acide carbonique contenue dans l'air atmosphérique (en commun avec M. Leay)	473	— M. Brodie adresse ses remerciements à l'Académie	825
BOYER (Pa.) — Une mention honorable lui est accordée pour son ouvrage sur le traitement des ulcères par la compression à l'aide de bandeslettes	93 et 327	BRONGNIART (Ad.) — Examen de quelques cas de monstruosité végétale propres à éclairer la structure du pistil et l'origine des ovules	513
BRANCOURT adresse la figure d'une machine hydraulique qu'il desire soumettre au jugement de l'Académie. M. Brancoirt sera invité à présenter la description de sa machine dont la figure ne donne pas une idée suffisamment claire	1064	— Rapport sur un Mémoire de M. Montagne intitulé : Quelques observations touchant la structure et la fructification des <i>penic. Genodius D 1</i> : a et <i>Lenormandia</i> de la famille des Floridées	644
BRAY (V.) — Observations faites dans les Alpes sur la température d'ébullition de l'eau (en commun avec M. Peltier)	572	— Rapport sur un tableau des limites de la végétation de quelques plantes sur le versant occidental du Canigou ; présenté par M. A. Massot	647
— Observations crepusculaires faites en Suisse à une élévation de 2680 mètres au dessus de la mer	727	BRONGNIART (Alex.) présente, au nom de la Section de Minéralogie et de Géologie une liste de Candidats pour la place de Correspondant vacante par suite du décès de M. le baron de Moll	1203
— Sur les variations diurnes de la déclinaison magnétique dans de hautes latitudes boréales (en commun avec M. Lottin)	729	BRULLE — Recherches sur les transformations des appendices dans les Articulés	615
BRECHET est nommé membre de la Commission de Médecine et de Chirurgie	387	DURON offre le concours de son expérience pratique et de ses appareils pour le travail des objectifs de la grande lunette destinée à l'Observatoire de Paris	1064
BRETON — Dépôt d'un paquet cacheté (séance du 8 avril)	659		
BRETON (Yvonne) — Notice sur quelques perfectionnements apportés à un appareil			

C

CAHOUS — Mémoire relatif à l'huile volatile de <i>Gaultheria procumbens</i> (Rapport sur ce Mémoire)	237	de Cuba	150
CANDOLLE (Alex.) — En présentant le VIII ^e volume de l'ouvrage commencé par son père sous le titre de <i>Prodromus systematis regni vegetabilis</i> donne une idée de ce que renferme cette nouvelle partie	484	— Rapport sur ce Mémoire	349
CANQUOIN et MILLARBY — Dépôt d'un paquet cacheté (séance du 19 février)	312	CAUCHY — Mémoire sur la convergence de la série qui exprime la fonction perturbatrice développée suivant les sinus et cosinus des multiples des longitudes moyennes des planètes que l'on considère	13
CARWIG-NAC DESCOMBES — Projet d'une École élémentaire d'agriculture	823	— Rapport sur divers Mémoires de M. Henry relatifs à des expériences sur les nombres	84
CARTERON — Description et modèle d'une chaîne d'arpenteur	52 et 933	— Mémoire sur les fonctions continues	116
CASASECA — Sur la composition chimique du verrou et de la canne créole de l'île		— Rapport sur une Note de M. Cellier relative à la théorie des imaginaires	168
		— M. Cauchy présente à l'Académie la 25 ^e li	
		raison de ses « Exercices d'analyse et de physique mathématique », et un opuscule ayant pour titre « Considérations sur les	

MM	Page	MM	Page
ordres religieux adressées aux amis des sciences »	476	antimoniaux	379
— Mémoire sur les valeurs moyennes des fonctions	358	(HAUSSENOT écrit relativement à des appareils de sûreté qu'il a imaginés pour prévenir l'explosion des chaudières à vapeur, et pour lesquels trois années d'expériences ont confirmé, dit-il, toutes les espérances qu'il en avait conçues)	58
— Nouveau Mémoire sur le calcul des intégrales des mouvements planétaires	625	(HAZALLON — Sur les observations de marées faites à Alger et à Toulon)	438
— A l'occasion d'une Note de M. Vais sur la comète découverte par M. Faye, M. Cauchy annonce des recherches de M. Le Verrier sur la comète de 1770	767	(HEROT prie l'Académie de vouloir bien désigner une Commission à l'examen de la quelle il a soumis un nouveau procédé d'impression pour les toiles destinées à la peinture à l'huile et d'autres inventions également relatives à l'art de la peinture)	591
— Mémoire sur l'équilibre et le mouvement d'un système de molécules dont les dimensions ne sont pas supposées nulles	774	(HEVALIER — Dépôt d'un paquet cacheté (en commun avec M. Molénard), séance du 2 janvier)	9
— Addition à un précédent Mémoire sur la synthèse algébrique	803	(HEVALIER DE RIVAZ — Lettre sur la dernière éruption de l'Etna)	58
— M. Cauchy fait à l'Académie de deux opuscules qu'il veut de faire paraître	885	(HEVALIER — Dépôt d'un paquet cacheté (seul ce du 15 avril))	711
— Rapport sur un Mémoire de M. Laurent relatif au calcul des variations	120	(CHEVALIER — Recherches sur la composition élémentaire des différents bois, et sur leur rendement annuel d'un hectare de forêts)	14
— Remarques à l'occasion d'un Mémoire de M. Laurent sur la rotation des plans de polarisation dans les mouvements inhérents petits d'un système de sphères	940	— Rapport sur ce Mémoire	283
— Mémoire sur la théorie de la polarisation chromatique	961	(CHEVREUIL est désigné comme l'un des candidats pour la place de directeur des études à l'Ecole Polytechnique)	240
— Mémoire sur la substitution des fonctions non périodiques aux fonctions périodiques dans les intégrales définies	1072	— M. Chevreuil est nommé membre de la Commission chargée d'examiner si le platine préparé par le procédé de M. Jeannet peut supporter sans altération une immersion prolongée dans l'eau	38
— M. Cauchy est nommé membre de la Commission du grand prix de Sciences mathématiques pour l'année 1843	353	(CHOISELAT et RAY — Dépôt d'un paquet cacheté (séance du 22 janvier))	163
(FILLIER — Note relative à la théorie des imaginaires (Rapport sur cette Note Rapporteur M. Cauchy))	118	— Dépôt d'un paquet cacheté (séance du 20 mai))	97
(HABRILLAC — Lettre à M. Elie de Beaumont sur un gisement de poisons fossiles dans la province de Coëre)	1007	(HOPINEAUX — Note sur une nouvelle locomotive et sur une nouvelle disposition des chaudières à vapeur)	595 933 et 1180
(HAILLY et GONZA — Sur un nouveau mode de traitement des deviations de la taille, sans lits mécaniques ni sections sous-cutanées des muscles)	169	(HUARD — Une somme de 2000 fr. lui est accordée à titre d'encouragement pour son appareil destiné à faire prévoir la formation des mélanges détonants, soit dans les mines, soit dans les lieux habités où il fait usage du gaz d'éclairage (Rapport sur le concours pour le prix concernant les Arts insalubres))	324
— MM. Chailly et Godier en réponse à une réclamation de M. Hissard écrivant que leur mode de traitement des deviations de la taille ne repose point sur le même principe que celui de ce chirurgien, et que, par suite, leur appareil diffère du sien en plusieurs points importants	491	(LAPEYRON — Mémoire relatif au règlement des tiroirs dans les machines locomotives, et à l'emploi de la détente Rapport sur ce Mémoire, Rapporteur M. Lamé)	275
(HANCEL — Recherches concernant l'action de l'ammoniaque sur l'éther butyrique)	919	(LAUDET — Note sur une des causes qui peuvent nuire à la netteté des images obtenues par les procédés photographiques)	951
— Mémoire sur la butyrene	1021	(LIAS adresse, conformément à une décision	
(HANCOURTOIS — Exploration géologique d'une partie très peu connue de la Turquie d'Asie)	827		
(HATIN — Sur les fonctions des vaisseaux chylifères et des veines, expériences faites au moyen de l'introduction, dans l'économie animale, de composés arsenicaux et			

MM	Pages	MM	Pages
prise par l'Académie, l'indication de ce qu'il considère comme nouveau dans les ouvrages qu'il a présentés pour concourir aux prix de Médecine et de Chirurgie de la fondation Montyon	93	maff	1017
COCHEAUX — Description et figure d'une machine à drager présentant des modifications nouvelles	696	COUCHE présente, à l'occasion d'une Note récente de M. Melloni des considérations sur les phénomènes de chaleur et de lumière	312
COLLA — Sur une aurore boréale observée le 8 décembre 1843 à Parme	54	COULIER — Apparition de nouvelles taches sur le disque du soleil	880
COLLARDEAU — Manomètre construit sur un principe entièrement nouveau	151	COULVIER GRAVIER — Nouveau Mémoire sur le parti qu'on peut tirer de l'observation des étoiles filantes pour prédire quelques jours d'avance les changements de temps	289
COLLEGNO (H. de) — Mémoire sur les terrains diluviens du revers méridional des Alpes	523	LOURHAUT — Mémoire sur l'hydrophobie et le puau	696
— Essai d'une carte géologique de l'Italie	1029	CROWE — Observations météorologiques faites à Christiania pendant douze mois consécutifs	956
CORNAY — Aperçu d'une nouvelle classification des osseaux, fondée sur des considérations tirées de la paléontologie	94	CRUD est présenté par la Section d'Economie rurale comme un des candidats pour la place de correspondant vacante par suite du décès de M. Mathieu de Dombasle	266
— Sur l'hypertrophie de la rate dans la fièvre intermittente	95	CRUISE (M ^{me} de) — Sur une phosphorescence extraordinaire de la mer dans les environs de Madère au commencement du mois de mars 1844	89
— Sur les sources des miasmes qui occasionnent les typhus et les fièvres intermittentes à Rochefort (Charente Inférieure)	95		
— Dépôt d'un paquet cacheté (séance du 27			

D

DAQUERRE — M. Arago met sous les yeux de l'Académie un portrait photographique exécuté par M. Daquerre au moyen d'un procédé qui ne diffère de l'ancien que par la composition de la couche sensible	152	— Nouvelles considérations sur la localisation des poisons, en réponse à un opuscule adressé à l'Académie par M. Orfila dans la séance du 1 ^{er} avril (en commun avec M. Flandin)	692
— Sur un nouveau moyen de préparer la couche sensible des plaques destinées à recevoir les images photographiques	756	— Dépôt d'un paquet cacheté (séance du 29 avril)	839
DALLERY (vno) — Sur l'emploi des chaudières à vapeur tubulaires, sur l'hélice employée comme propulseur dans la navigation, sur des mâts creux retirant les uns dans les autres, inventions pour les quelles l'auteur avait pris un brevet en 1803. Pièces adressées par sa famille à l'appui d'une réclamation de priorité	527	DANIELSEN — Mémoire sur l'éléphantiasis des Grecs, régnant depuis un demi-siècle endémiquement dans une des parties littorales de la Norvège	588
DAMOISEAU est nommé membre de la Commission chargée de déterminer le prix d'Assonologie, fondation Lalande	477	DARCET — Lettre à l'occasion des expériences faites en Hollande sur les propriétés nutritives de la gélatine	482
DAVOUR — Note sur une obésité de l'inde qui a décelé avec détonation au moment où on la saut	4	DAUBRE (A.) — Notices sur la présence de l'axinite dans une roche fossilifère des Vosges	570
DANGER — Note sur l'empoisonnement par le plomb, suivie de quelques considérations sur l'absorption et la localisation des poisons (en commun avec M. Flandin)	17	DAURIAU — Dépôt d'un paquet cacheté (en commun avec M. Sakaguchi), séance du 22 janvier	163
		DÉJARDIN — Dépôt d'un paquet cacheté (séance du 1 ^{er} avril)	565
		DE LA BARRE (vno) — Sur l'emploi du caoutchouc dans le traitement des difformités et des maladies du système dentaire	377
		DELAJOND — Deuxième Note sur l'altération vermineuse du sang des chiens par	

MM	Page	MM	Page
un hématozoaire du genre <i>Filæira</i> (en commun avec M. Gruby)	687	tion de priorité	1069
DELAHUE — Observations météorologiques faites à Dijon pendant les mois d'août, septembre et octobre 1843	103	DÉVIDOFF — Observations météorologiques faites à Nijni Taguilsk pendant les six derniers mois de 1843	58, 312, 879 et 1063
— Tableaux des observations météorologiques faites à Dijon pendant les mois de mars et avril 1844	957	DENIAU — Considérations sur les chemins de fer, les locomotives, les bateaux à vapeur, etc	1132
DELAUNAY — Une mention honorable est accordée à M. Delauray, l'un des concurrents pour le grand prix de Mathématiques de l'année 1842	315	DESAGNEAUX — Note ayant pour titre « l' perfectionnement du baromètre et du thermomètre »	100
DELEAU prie l'Académie de vouloir bien compléter la Commission chargée de l'examen de son Mémoire sur les corps introductifs ou formes dans l'oreille moyenne, en nommant un nouveau Commissaire à la place de M. Breschet dont l'absence paraît devoir se prolonger. M. Serres est désigné à cet effet	422	DESBORDEAUX — Sur l'emploi de l'acétate de potasse dans les opérations de la photographie, comme moyen d'obtenir par les temps les plus humides, des épreuves bien pures	591
— A l'occasion d'un Mémoire dans lequel M. Bonafant a nié l'efficacité des injections de l'air pour opérer la dilatation de la trompe d'Eustache, M. Deleau envoie un exemplaire de son Traité des maladies de l'oreille moyenne, dans lequel il a discuté cette question, et prie que ce travail soit renvoyé comme pièce à consulter à la Commission chargée de l'examen du Mémoire de M. Bonafant	838	DESIRABODE (père et fils) — Sur les moyens de prévenir et de corriger les vices de la seconde dentition	152
DELESE — Note sur le Dypyrre	944	DESMARAIS — Note statistique sur l'état actuel de la science expérimentale des faits d'instinct et d'intelligence chez les animaux	1108
DELLILLE — Sur les premiers essais faits pour introduire en France la culture du <i>Polygonum tectorium</i>	707	DESOR — Observations sur les parties arrondies que présentent en Suisse les flancs des montagnes déductions tirées de ces faits relativement à l'origine des blocs erratiques	305
— Réplique à la Note de M. Jaume Saint-Hilaire sur le <i>Polygonum tinctorum</i> insérée aux Comptes rendus des séances de l'Académie des Sciences, séance du 22 avril 1844	1132	DESPRETZ est adjoint à la Commission chargée de l'examen d'un clepsydre présenté par M. Pyralis	16
DELPEL H — Sur des moyens destinés à diminuer les dangers des chemins de fer	204	D'ESTOUQUOIS Voir Estocquer (d)	
DELPOH écrit relativement à deux Notes qu'il a adressées à M. le Ministre de l'Intérieur sur la cause des explosions des chaudières à vapeur, Notes qu'il suppose avoir été renvoyées à l'examen de l'Académie	59	DIEFFENBACH — Sur la proposition de la Commission des prix de Médecine et de Chirurgie, l'Académie accorde un prix de 6000 fr. à MM. Dieffenbach et Stromeyer à l'un pour avoir le premier pratiqué avec succès l'opération du strabisme sur l'homme vivant, et à l'autre pour avoir le premier institué et exécuté cette opération sur des cadavres	99 et 327
— Note sur un moyen destiné à prévenir l'explosion des chaudières à vapeur	5, 32	DIEN — Rapport sur la question de priorité soulevée entre MM. Dien et Doussard relativement à un pneumomètre, Rapporteur M. Thénard	643
DELVIGNE — M. Arago rend compte des expériences qui ont été faites à Vincennes en sa présence et celle de M. Seguer avec la carabine Delvigne	725	— M. Arago à l'occasion de ce Rapport, communique l'extrait d'une Lettre de M. Dien relative à la même discussion	641
DEMBINSKI adresse une réclamation de priorité relative au moyen d'occlusion employé par M. Halleto pour le tube pneumatique des chemins de fer à pression atmosphérique	382	DIRECTEUR DES DOUANES (le) — Lettre relative à un buste de Watt envoyé d'Angleterre à l'Académie des Sciences de Paris	39
— Envoi des pièces relatives à cette réclamation		— M. le Directeur des douanes transmet le Tableau du mouvement du cabotage pendant l'année 1842	94
		— M. le Directeur des douanes adresse le tarif officiel des douanes de France, qui a été approuvé le 22 mars 1844, par M. le Ministre des Finances	696

MM.	Page.	MM.	Page.
DIRECTEUR GÉNÉRAL DE LA NAVIGATION DE LA SEINE (12) adresse un Tableau des hauteurs de la Seine pendant l'année 1843...	423	galvanométrique.....	492
DITTMAR. — Addition à une précédente communication sur un mât de sauvetage pour les cas d'incendie.	38	— Sur une nouvelle machine magnéto-électrique.	837
DONNE. — Rapport sur une question de priorité débattue entre MM. Dien et Donne relativement à un photomètre, Rapporteur M. Thenard.	643	— Sur l'alimentation obtenue au moyen d'une hélice de fil de cuivre parcourue par un courant voltaïque.	1160
— M. Donne soumet au jugement de l'Académie un appareil destiné aux démonstrations microscopiques, appareil dont l'invention lui est commune avec M. Foucault.	656	DUMAS est nommé membre de la Commission chargée de déterminer la question à proposer pour le grand prix des Sciences physiques de 1845	218
DOUJET, Lenoir et Rorser. — Description et figure d'une nouvelle pompe . 293 et 656		— Rapport sur un Mémoire de M. Jacquelin, relatif aux produits de l'action réciproque de l'acide sulfurique anhydre et de l'ammoniaque	282
DUBOIS (D'AMENS) demande qu'un ouvrage sur la pathologie, qu'il avait présenté au concours pour les prix de Médecine et de Chirurgie, et qui avait été écarté comme rentrant dans le domaine d'un autre concours, soit admis cette année au concours de Physiologie expérimentale	266	— Rapport sur un Mémoire de M. Eugène Chevreul, relatif à la composition des différents bois et au rendement annuel d'un hectare de forêts	283
DUCHARTRE. — Addition à un précédent Mémoire sur la Claustrine d'Europe . .	93	— Rapport sur un Mémoire de M. Cahours, relatif à l'huile volatile de <i>Gaultheria procumbens</i>	287
— Note sur un volcan éteint du département de l'Hérault	155	— Remarques à l'occasion d'une Lettre de M. A. Leucler, sur les acides amides et chloramides	438
— Sur la géographie botanique des environs de Beziers.	254	— Note sur la fabrication du sucre de betteraves	622
— Sur l'organogénie de la fleur des Malvacées	487	— Remarques à l'occasion d'un Note de M. Payen sur l'extraction du sucre de betteraves.	661
— Observations sur l'organogénie de la fleur et particulièrement de l'ovaire chez les plantes à placenta central libre. . .	1105	— M. Dumas présente, au nom de M. Melapert, des cristaux de sulfate de soude et de sulfate de magnésie, remarquables par leur forme	699
DUCROS. — Résultats d'observations microscopiques faites sur le mouvement des globules du sang chez une grenouille soumise à l'action d'un courant galvanique . .	1193	— Rapport verbal sur le « Précis de Chimie organique » de M. Gehardt	809
DUFOUR (L.) — L'Académie décide que ses « Recherches anatomiques et physiologiques sur les Diptères » seront imprimées dans le <i>Recueil des Savants étrangers</i> . .	192	— Remarques à l'occasion d'une communication de MM. Murchison et Sabine, concernant un changement dans l'époque des réunions de l'association britannique pour l'avancement des sciences . .	811
— Histoire des métamorphoses et de l'anatomie de <i>Triphala petiolatus</i>	433	— M. Dumas fait hommage à l'Académie du tome VII de son « Traité de Chimie appliquée aux arts. »	169
DUFRENOY. — Rapport sur un Mémoire de M. Roset, ayant pour titre « Sur les volcans de l'Auvergne »	130	— M. Dumas est nommé membre de la Commission chargée d'examiner si le platine préparé par le procédé de M. Joannet peut supporter sans altération l'immersion dans l'eau	387
DUHAMEL est désigné comme l'un des Candidats pour la place de directeur des études à l'École Polytechnique	240	— Et de la Commission du prix concernant les Arts insalubres.	679
— M. le Ministre de la Guerre annonce qu'il vient de nommer à cette place M. Duhamel .	378	DUMÉRIEL annonce que la Section d'Anatomie et de Zoologie, se trouvant momentanément incomplète par l'état de santé de l'un de ses membres et l'absence d'un autre membre, demande à ajourner d'une ou deux semaines la présentation qu'elle doit faire d'une liste de Candidats pour la place vacante de Correspondant.	167
DUJARDIN. — Note sur un nouvel appareil	679		

NUM.	Page
— Rapport sur un travail de M. Gervais concernant l'histoire des Phrynéides, Scopionides, Solpugides, Phalangides et Acarides	649
— M. Duméril est nommé membre des Commissions suivantes	
— Commission du grand prix des Sciences physiques, question concernant le développement des testis chez les Oiseaux et les Reptiles	387
— Commission du grand prix des Sciences physiques, question concernant l'examen comparatif de l'organe de la voix chez l'homme et chez les animaux mammifères	bid
— Commission des prix de Médecine et de Chirurgie	bid
— Commission du prix de Physiologie expérimentale	47
DUMONT — Dépôt d'un paquet cacheté (séance du 22 janvier)	63
DUMOUTIER — M. Arago met sous les yeux de l'Académie plusieurs images daguerriennes, d'après lesquelles ont été exécutées les planches de la partie anthropologique du voyage de l' <i>Atalabe</i> et de la <i>Zélee</i> . Ces images sont la reproduction des têtes moulées sur nature vivante par M. Dumoulier dans le cours de l'expédition	103a
DUPIN (C ^r) — Remarques à l'occasion d'une Lettre dans laquelle M. Payer demande si un Mémoire qu'il avait adressé au concours pour le prix de Mécanique de 1842, et dont il n'est point fait mention dans le Rapport de la Commission pour être admis de nouveau au concours de 1843	99
— M. Dupin, en sa qualité de président, rappelle que, dans le cours de l'année 1843, l'Académie a perdu plusieurs de ses Correspondants; en conséquence, il invite les Sections de Géométrie, d'Economie rurale, d'Anatomie et de Zoologie, de Médecine et de Chirurgie, à se réunir le plus promptement possible pour préparer des listes de candidats aux places vacantes	130
— M. Dupin, en sa qualité de président, annonce la perte que l'Académie vient de faire dans la personne de M. E. Geoffroy Saint-Hilaire, membre de la Section d'Anatomie et de Zoologie	1163
— M. Dupin est désigné, par la voie du scrutin, comme l'un des trois membres de l'Académie qui devront faire partie du conseil de perfectionnement de l'École Polytechnique pendant l'année 1844	523 et 537
— M. Dupin est nommé membre de la Com-	

NUM.	Page.
mission du prix de Mécanique.	477
— Et de la Commission du prix de Statistique	727
DUPONT — Sur divers phénomènes d'illusions observés dans le département de l'Ariège et quelques vallées voisines	743
DUPONT — M. Arago présente plusieurs spécimens de reproductions d'anciennes impressions obtenues, au moyen de la lithographie, par M. Dupont	934
DUPRE — Dépôt d'un paquet cacheté (séance du 22 janvier)	163
— Nouveau procédé pour la désinfection et la conservation des cadavres	241 et 532
— Dépôt d'un paquet cacheté (séance du 2 mars)	382
DUPUIS-DELCOURT — Note sur l'électro-ducteur, appareil destiné à prévenir la formation des orages	7
— Note sur quelques expériences dans lesquelles on ferait usage du ballon en cuivre mentionné dans la précédente Note	132
DURAND — Note sur un anémographe de son invention	39
— M. Durand prie l'Académie de vouloir bien hâter le travail de la Commission à l'effet de laquelle ont été renvoyées ses dernières communications relatives à diverses questions de physique générale	192 et 1160
— Nouvelle Note relative à diverses questions de physique générale	445
— Une Note ayant pour titre « Mécanisme terrestre », parvenue à l'Académie sans nom d'auteur, et attribuée, à cause d'une ressemblance d'écriture, à M. Durand est reconnue comme provenant de M. Fleureau	494
DURAND — Note sur de nouveaux moyens de constater la nature des taches obtenues avec l'appareil de Marsh	693
DURAND, ex-luxu. — Mémoire sur la qualité électrique du sang	523 et 592
DUTROCHET — Réplique à la Note que M. Payer a communiquée à l'Académie dans la séance du 8 janvier	63
— Remarques sur une Note de M. Payer, additionnelle à son Mémoire concernant l'influence de la lumière colorée sur la végétation	191
— Rapport sur un Mémoire de M. Zante Deschi, intitulé « De l'influence des rayons solaires transmis par des verres colorés sur la végétation des plantes et la germination des graines »	849
— Rapport sur un Mémoire de M. Payer, intitulé « Mémoire sur la tendance des racines à fuir la lumière »	1169

MM.	Page.	MM.	Page.
— M. Desroches est adjoint à la Commission de la gelatine	532	au Val), précédées d'une explication historique des principaux travaux sur le développement des poissons aux deux premières époques de la vie . . .	720
DUVERNOY — Observations pour servir à la connaissance du développement de la Poëille de Surinam (<i>Poëilla Surinamensis</i>)			

E

EBELMEN — Sur la composition des gaz produits dans les opérations métallurgiques	364	— Application des faits d'embryogenie à la classification des animaux	218
— De l'action de l'ac de borique sur l'alcool et sur l'esprit de bala	1202	— M. Mlle Edwards est nommé membre de la Commission chargée de déterminer la question à proposer pour le grand prix des Sciences physiques année 1845	218
EHRMANN — Sur une opération de larynx pratiquée dans un cas de polype du larynx	593	— M. Mlle Edwards adresse de Sicile un paquet cacheté (10 juin)	1086
— M. F. Mann fait connaître l'état actuel de la maladie qu'il a opérée de ce polype	709	ELIE DE BEAUMONT est élu vice président de l'Académie pour l'année 1844	1
EDWARDS (Mlle) — Rapport sur divers Mémoires de M. de Quatrefages concernant les animaux invertébrés	67	ESTOCQUOIS (N.) — Note sur les formules relatives à l'attraction des polyèdres	422
— Réponse à des remarques faites par M. Prieur à l'occasion de ce Rapport		ETOC DEMAZY — Recherches statistiques sur le suicide	483

F

FABRE et M. PIREL adressent pour le concours aux prix de Médecine et de Chirurgie un Mémoire sur la paralysie générale sur ses caractères anatomiques ses différents formes et son traitement	480	compte d'un ouvrage qu'il vient de faire paraître sur l'analyse chimique des vins du département de la Gironde	595
FABRE — Nouvelle théorie des voûtes	42	FAVRE — Sur la réduction partielle du bioxyde de carbone par la chaleur et sur le nouvel oxyde qui en résulte (en commun avec M. M. M. M.)	68
— Mémoire sur la théorie des corps fibreux	1001	— Sur la chaleur produite par les combinaisons chimiques 1 ^{er} Mémoire (en commun avec M. S. Hermann)	695
FADEIEFF — Mémoire sur quelques expériences tentées dans le but de rendre la poudre de guerre inextinguible pendant sa conservation	1148	FAYI donne, dans la séance du 29 janvier 1844 les éléments elliptiques de la comète qu'il a découverte le 22 novembre 1843	186
FALCIAI FOSSOMBRONI annonce à l'Académie la mort de son beau père M. Fossombroni correspondant de la Section de Mécanique	936	FAYET — Sur les rapports des crimes dans les diverses classes de la société et à différents âges Remarques adressées à l'occasion d'un passage du Rapport sur le dernier concours pour le prix de Statistique	490
FARDELY — Sur les télégraphes électriques	792	— M. Fayet adresse la seconde partie de son travail sur la statistique intellectuelle et morale de la France, et y joint des Remarques relatives au Rapport des Commissions à l'examen desquels a été soumise la première partie de son travail	933
FAULCON, à l'occasion d'une Note récente de M. Segues sur un moyen destiné à diminuer les dangers des chemins de fer écrit qu'il a lui-même proposé, dans le même but, l'emploi de roues horizontales pour les locomotives	8	FELDMANN — Nouvelles recherches sur la karyoplastie	32
— M. Faulcon retire sa réclamation	54	FERMOND — Dépôt d'un paquet cacheté	
— Nouveau système de propulsion atmosphérique pour les voitures des chemins de fer	754		
FAURE prie l'Académie de se faire rendre			

MM	Page.
(séance du 8 janvier)	59
— Sur la manière dont se produisent les sons et sur les phénomènes qui en résultent.	171
— Examen des phénomènes qui se produisent pendant la formation des sons, dans les tuyaux ouverts et les tuyaux fermés	1125
PERRRET et GALINIER. — Description géologique du Tigré et du Semen (Abyssinie).	1131
FIARD — Note sur le cow pox naturel trouvé sur une vache appartenant à M. Magendie, — développement de nombreuses pustules chez deux femmes variolées, chargées de la traire, — inoculation de la matière des pustules de la vache à des enfants, et développement d'une vraie vaccine	986
FIGUIER — Mémoire sur les combinaisons oxygénées de l'or, suivi de recherches sur le pourpre de Cassius et sur l'or fulminant.	813
FIZEAU — Recherches sur l'intensité de la lumière émise par le charbon dans l'expérience de Davy (en commun avec M. L. Foucault)	746 et 860
FLAHAUT et NOUETTE — Mémoire ayant pour titre « Des phénomènes de mouvement, de repos et d'équilibre, considérés dans le monde réel, et dans leurs rapports avec les règles de la Statique. »	864
— MM. Flahaut et Nouette adressent un paquet cacheté (séance du 25 mars).	534
FLANDIN. — De l'empoisonnement par le plomb, suivi de quelques considérations sur l'absorption et la localisation des poisons (en commun avec M. Danger).	177
— Nouvelles considérations sur la localisation des poisons, en réponse à un opuscule adressé à l'Académie par M. Orfila, dans la séance du 1 ^{er} avril (en commun avec M. Danger)	692
FLEURAU — Sur l'emploi de machines fixes, mises en mouvement par le courant de l'eau pour le remontage des bateaux.	263
FLEUREAU — Mémoire ayant pour titre : « Mécanisme terrestre. »	494
— M. Fleureau se fait connaître comme auteur de ce Mémoire qui, ne portant point de nom, avait été d'abord, par suite d'une ressemblance d'écriture, attribué à M. Durand, de Bordeaux	533
FLEURY-VALLAT. — Sur l'emploi industriel de la pression atmosphérique.	263
FLOURENS met sous les yeux de l'Académie une gravure en taille-douce donnée par une planche qui a été obtenue du cuivre original, sur lequel des procédés galvanoplastiques de M. Kébel.	97
— En présentant, au nom de l'auteur, M. Fortelle, le premier volume d'un ouvrage	

MM	Page.
ayant pour titre : « Anatomie, physiologie et pathologie du système nerveux », M. Flourens donne une idée du contenu de ce volume.	263
— M. Flourens présente, au nom de l'auteur, M. Coste, une nouvelle livraison de « l'Histoire générale et particulière du développement des corps organisés », et appelle l'attention sur quelques-uns des faits que cette livraison est destinée à faire connaître.	264
— M. Flourens présente, au nom des auteurs, MM. Bekler et Hardy, le premier volume d'un « Traité élémentaire de pathologie interne. »	483
— En présentant un opuscule de M. le professeur Remak, sur le développement du poulet, M. Flourens appelle l'attention sur quelques-uns des faits nouveaux indiqués par l'auteur	823
— M. Flourens présente, au nom des auteurs MM. Cornu et Otto, la sixième livraison de leur « Atlas d'anatomie comparée »	893
— M. Flourens présente, au nom de l'auteur, M. Gerdy, un opuscule sur les retractions des tissus blancs.	894
— En présentant, au nom de M. Hofer, le deuxième volume de « l'Histoire de la Chimie depuis les temps les plus reculés jusqu'à notre époque », M. Flourens donne quelques détails sur le but et le mode d'exécution de cet ouvrage.	1002
— M. Flourens présente, au nom de l'auteur absent, M. Dumas, le septième volume du « Traité de Chimie appliquée aux arts. »	1169
— M. Flourens, en présentant, au nom de l'auteur, M. Pictet, le premier volume d'un « Traité élémentaire de Paléontologie », donne une idée du but et du plan de cet ouvrage.	1194
— M. Flourens est nommé membre des Commissions suivantes : — Commission chargée de déterminer la question à proposer pour le grand prix des Sciences physiques de 1845.	218
— Commission du grand prix des Sciences physiques, question concernant le développement des fœtus chez les Oiseaux et les Reptiles.	387
— Commission du grand prix des Sciences physiques, question concernant le mécanisme de la production de la voix chez l'homme.	ibid.
— Commission du grand prix des Sciences physiques, question concernant l'homme comparatif de l'organe de la voix chez l'homme et chez les animaux mammifères.	ibid.

MM	Pages	MM	Pages
— Commission du prix de Physiologie expérimentale	477	roches éruptives et dans les filons métallifères	1050
FOSSOMBRONI — M. Libri annonce la mort de M. Fossombroni Correspondant de l'Académie pour la Section de Mécanique	755	FRANCŒUR — Rapport sur les pièces adressées au concours pour le prix de Statistique de l'année 1842. La Commission est d'avis qu'il n'y a pas lieu à décerner le prix	9
M. Falcet Fossombroni annonce officiellement la mort du même savant	936	— En qualité de Rapporteur de la Commission du prix de Statistique M. Francœur présente quelques remarques sur une réclamation de M. Foyet relative à un passage du Rapport de la Commission sur le concours de 1842	490
FOUCAULT soumet au jugement de l'Académie un appareil de son invention destiné aux démonstrations microscopiques (en commun avec M. Donad)	696	— M. Francœur est nommé membre de la Commission du prix de Statistique, concours de 1843	727
— Recherches sur l'intensité de la lumière émise par le charbon dans l'expérience de Davy en commun avec M. Fesau	746	FRANÇOIS jeune — Note sur l'appareil catoptrique qu'exécute par lui pour le phare occasion de Sherbrooke	15
— Addition à la précédente Note concernant l'application des procédés daguerriens à la photométrie (en commun avec M. Fesau)	860	FREMY — Recherches sur les acides métalliques, cinquième Mémoire. Onium et dium	44
FOUCAULT demande que des Mémoires qu'il avait adressés au concours pour les prix de Médecine et de Chirurgie (année 1842) et qu'il croit n'avoir pas été examinés soient admis au concours pour l'année 1843	594	— Note concernant plusieurs nouveaux sels formés par la réaction des acides sulfuriques et azotés sur les bases alcalines	111
— Recherches sur les causes de l'albuminurie	857	FUSTER — Recherches sur le climat de la France	18 et 191
FOURNET — De l'influence de la pression dans les phénomènes géologiques chimiques	403	— Rapport sur ce Mémoire, Rapporteur M. de Gasparis	1087
— Sur des cristaux à faces creuses	737	FUSZ — Voiture suspendue destinée au charroi d'objets pesants	51
— Sur l'état de surfusion du quartz dans les			
G			
GAGNAGE prie l'Académie de vouloir bien désigner une Commission pour examiner un procédé qu'il a imaginé pour la désinfection des fosses d'aisance	381	GALINIER et Farnet — Résultats scientifiques d'un voyage en Abyssinie description géologique du Tigré et du Semen	1131
— Dépôt d'un paquet cacheté (séance du 4 mars)	382	GALY-CAZALAT — Description d'un nouveau véhicule hydraulique portatif	224
— Nouvelle Note sur un procédé pour la conservation des corps destinés aux études anatomiques, et sur les modifications qui permettent d'appliquer ce procédé à l'embaumement	422	GAMBARD (M ^{me} veuve) demande l'autorisation de reprendre un Mémoire sur des questions de Mécanique soumis autrefois par son mari au jugement de l'Académie. Ce Mémoire, sur lequel il avait été fait un Rapport, se trouvant par hasard en double dans les archives de l'Académie, un des deux manuscrits sera rendu à la veuve de l'auteur	8
— M. Gagnage demande que le procédé de désinfection qu'il a soumis au jugement de l'Académie soit admis à concourir pour le prix concernant les Arts impropres	554	GAMBREY est nommé membre de la Commission du prix de Mécanique	477
GALEOTTI (B.) et Baccaro — Monographie des Orchidées mexicaines, précédée de considérations générales sur la végétation du Mexique et sur les diverses stations où croissent les espèces d'Orchidées mexicaines	497	— Et de la Commission chargée de préparer des instructions pour les artistes auxquels sera confiée l'exécution d'une grande lunette destinée pour l'Observatoire	894
		GAMON — Sur un nouveau système de sur	

MM	Page	MM	Page
maturation pour le tube pneumatique des chemins de fer à pression atmosphérique	422	— M Gay Lussac qui reparait pour la première fois depuis l'accident qui il a éprouvé remercie l'Académie des marques d'intérêt qu'elle lui a données	437
GANNAL — Sur la question de l'emploi des poisons marins dans les embaumements	792	— A l'occasion d'une Lettre de M. Bergsma, sur les expériences concernant les propriétés nutritives de la gélatine M. Gay-Lussac expose les résultats de voir la Commission nommée par l'Académie compléter le travail qu'elle a commencé sur ce sujet, et dont elle a déjà dans un précédent Rapport fait connaître les premiers résultats	532
GAROT par l'Académie de hâter le travail de la Commission à l'examen de laquelle a été annexé une Note qu'il a adressée en 1842 sur des essais de sûreté pour les voitures sur les chemins de fer	71	— Observations critiques sur la théorie des phénomènes chimiques de la respiration	545
GASPARIN (un) — Mémoire sur les débordements du Rhône	104	GEMINI (un) — Sur le mode de transmission de la peste et sur la génération des maulades en général	38
M. de Gasparin fait hommage à l'Académie au nom de l'auteur M. E. Jacquemin d'un ouvrage ayant pour titre De l'agriculture de l'Allemagne et des moyens d'améliorer celle de la France	528	— Sur la direction des aérostats	4 d
— Expériences sur la qualité nutritive des tourteaux de la graine de sésame (en commun avec M. Payen)	797	GEOFFROY-SAINT HILAIRE (Étienne) — M. Dumas en sa qualité de président annonce la perte que l'Académie vient de faire dans la personne de M. E. Geoffroy Saint Hilaire membre de la Section d'Anatomie et de Zoologie	1 63
— M. de Gasparin fait hommage au nom de ses auteurs MM. B. x. o. et Isabeau d'un ouvrage et d'un volume de la Nouvelle Maçonnerie	825	GEOFFROY-SAINT HILAIRE (Isidore) — A l'occasion d'une communication de M. Pouchet sur la théorie de la fécondation chez les mammifères, rappelle que son témoignage a été précédemment invoqué par M. Pouchet comme pouvant constater l'époque à laquelle ce physiologiste avait émis certaines idées relatives à la génération M. Geoffroy qui n'était pas présent à la séance dans laquelle cette Lettre fut lue, déclare que l'auteur à la date indiquée, lui avait exposé les opinions qu'il a depuis développées et appuyées par des observations	59
— Remarques à l'occasion d'un tableau publié par la Commission hydrométrique de Lyon et communiqué par M. Arago	935	GERHARDT — Produits de la distillation sèche des sulfocyanures	138
— M. de Gasparin présente de la part de M. Guérin-Meneville un Mémoire d'entomologie appliquée	935	— Précis de Chimie organique (Rapport verbal fait sur cet ouvrage par M. Dumas)	809
Rapport sur le Mémoire de M. Fuster avant pour titre « Recherches sur le climat de la France »	1087	GERVAIS — Remarques sur la famille des Scorpions et description de plusieurs espèces nouvelles de la collection du Muséum	36
— M. de Gasparin est nommé membre de la Commission du prix de Statistique	797	— Histoire des Phrynides, Scorpionides, Solpugides, Phalangides et Acarides	422
(ANTINE) — Note de M. Seguer sur les épreuves supportées par des canons de fusil sortis de la fabrique de MM. Renette et Cail	723	— Rapport sur ce Mémoire	649
GAUDICHAUD — Troisième Note relative à la protestation faite dans la séance du 12 juin 1843 à la suite de la lecture du Mémoire de M. de Mirbel ayant pour titre « Recherches anatomiques et physiologiques sur quelques végétaux monocotyles »	597	— Histoire des genres <i>Pedicularis Ricinus</i> , <i>Pedicularis</i> ou <i>Forficula</i>	821
— Quatrième Note relative à la même protestation	899 et 972	GIRARDIN — Sur l'ancienneté de l'usage du sel en Normandie	1194
(AULTIER DE CLAUDE) — Dépôt d'un paquet cacheté (séance du 1 ^{er} avril)	595	GODIER et CHAILLY — Sur un nouveau mode de traitement des déviations de la taille sans l'usage des machines ni sections complètes des muscles	169
(AUSSE) annonce qu'à Falkenstein on a pu observer la comète de M. Faye, jusqu'au 10 avril et qu'on la voit encore après le 18 du même mois	943	— MM. Godier et Chailly écrivent, en réponse	
GAY LUSAC — L'Académie apprend avec bonheur que l'accident qui lui est survenu n'aura aucune suite fâcheuse	269		

MM	Pages	MM	
à une réclamation de M. <i>Hossard</i> , que leur mode de traitement des <i>déviation</i> s de la taille ne repose point sur le même principe que celui de ce chirurgien et que par suite leur appareil diffère du sien en plusieurs points importants	434	soire du genre <i>Gilaire</i> (en commun avec M. <i>Delefond</i>)	6
GOLDSCHMIDT — Eléments elliptiques de la comète de M. Faye	528	GRYNFELT — Dépôt d'un paquet cacheté (séance du 19 février)	112
GONON — Mémoire sur un nouveau système télégraphique pour le jour et pour la nuit	241	GUPPIN — Remarque sur l'emploi de la myotomie comme moyen de traitement dans des cas d'amaurose et de myopie	8
GOUDOT (J) — Notice sur une Rubiacée du genre <i>Condamnaea</i> et sur le vernis qu'elle produit	260	GUERIN (J) adresse à l'occasion d'une Note récente sur les inconvénients les sections tendineuses et musculaires une Lettre destinée à repousser des accusations qui paraissent avoir été dirigées contre lui	380
GOUTT adresse une Note imprimée sur les moyens qu'il a imaginés pour diminuer les dangers des chemins de fer, et demande que sa Note soit renvoyée comme pièce à consulter, à la Commission chargée de s'occuper de cette question	8	— Réponse à quelques attaques contre la myotomie rachidienne	818
GROTE (de) — Sur un procédé par lequel on obtient la matière colorante du test de l'acroléine	444	GUFRIN MENEVILLE — Sur le Chlorops des céréales	103
GRUBY — Recherches sur les Cryptogames qui constituent la maladie contagieuse du cuir chevelu décrite sous les noms de teigne tondante (Mahon) <i>Herpes tonsurans</i> (Cazenave)	583	— Catalogue raisonné des Mammifères et des Oiseaux rapportés d'Abyssinie par MM. Galinier et Perret et description des ossements nouvelles qui font partie de cette collection	1130
— Note sur des plantes cryptogamiques se développant en grande masse dans l'estomac d'une malade atteinte, depuis huit ans, d'une difficulté de la déglutition, sans rétrécissement de l'œsophage	586	GUILLON demande que dans la Commission chargée de l'examen d'un lithotriteur qu'il a présenté, M. <i>Breschet</i> ait sent, soit remplacé par un nouveau membre. M. Roux est désigné à cet effet	914
— Deuxième Note sur l'altération vermineuse du sang des chiens par un hémato-		GUILLOT (N) et MEXMER — Sur l'emploi de l'iodure de potasse dans le traitement des tremblements mercuriels et des maladies saturnines	332
		GUYON — Sur les caractères distinctifs de trois races du nord de l'Afrique les Arabes, les Kabyles et les Morabites	832
		— Sur la nature de l'alimentation de l'ibis	834

H

HALDAT (de) annonce la perte que vient de faire l'Académie dans la personne de M. <i>Machet de Dombaulé</i> correspondant pour la Section d'Economie rurale, décédé le 28 décembre 1845	4	l'Académie pour la Section de Géométrie	564
— Recherches sur la concentration de la force magnétique vers les surfaces des corps magnétisés	843	— M. <i>Hamilton</i> adresse ses remerciements à l'Académie	936
— Mémoire sur les causes de l'altération de la force magnétique	911	HATTIN annonce l'envoi prochain d'un Mémoire sur le croup	163
HALLETT présente le modèle d'un nouveau système de fermeture pour le tube pneumatique des chemins de fer dits chemins atmosphériques	726	HERMITE — Sur la théorie des transcendentes à différentielles algébriques	1133
— Procès relatifs à la discussion de priorité débaite entre lui et M. <i>Dombaulé</i> touchant cette invention	1132	HOFMANN — Dépôt d'un paquet cacheté (séance du 20 mai)	957
HAMILTON est nommé Correspondant de		HOMBRES-FRIMAS (D') adresse une description d'un galvanomètre multiplicateur construit par M. <i>Majocchi</i> , de Milan	163
		HOMERON — Aperçu topographique sur les terres et les glaces australes	4
		— Remarque sur quelques points de l'anatomie et de la physiologie des Procellariidées, et essai d'une nouvelle classification de ces oiseaux (en commun avec M. <i>Jar</i>	

MM	Pages
quinot) ...	353
HOSSARD — A l'occasion d'un Mémoire lu à l'Académie, par MM Chailly et Godier, dans la séance du 20 janvier 1844, M. Hossard réclame sur les deux auteurs la priorité d'invention pour un appareil destiné au redressement des courbures anormales de l'épine dorsale	381
HOSSARD et ROZET — Mémoire sur les causes probables des irrégularités de la surface de niveau du globe terrestre, des anomalies observées dans la direction de la verticale, la marche du pendule et la hauteur de la colonne barométrique, ramencée à cette même surface	180 et 322

MM	Pages
HOURY. — Mémoires relatifs à des expériences sur les nombres. (Rapport sur ces Mémoires, Rapporteur M. Cauchy.)	84
HUGON adresse des duplicata de deux Mémoires qu'il avait précédemment soumis au jugement de l'Académie, l'un sur un nouveau système de construction des culées des ponts suspendus, l'autre sur un nouveau système de chemins ou ponts en fer ou en bois, pour franchir de grands espaces d'eau	8
HURAULT — Sur un halo dont la figure semblait elliptique — Observations relatives à l'aurore boréale du 22 octobre 1839	228

I

RIER — Doutes relatifs à la question de priorité dans le système de piles galvan-

ques communément désignées sous le nom de piles de Bunsen 58

J

JACOB et BOURGAT. — Une somme de 5 000 fr leur est accordée, à titre de récompense, pour leur « Iconographie d'anatomie chirurgicale et de médecine opératoire. »	99 et 327
— MM. Jacob et Bourgery demandent que le grand ouvrage d'anatomie dont ils continuent la publication soit admis au concours pour les prix de Physiologie expérimentale, et considèrent cette fois sous le point de vue de l'utilité qu'il peut avoir pour l'étude de la physiologie, de l'anatomie pathologique et de la thérapeutique	592
JACQUELAIN — Mémoire sur les produits de l'action rétrograde de l'acide sulfurique anhydre et de l'ammoniaque (Rapport sur ce Mémoire, Rapporteur M. Dumas)	282
JACQUEMIN (E.). — De l'agriculture de l'Allemagne, et des moyens d'améliorer celle de la France	528
JACQUINOT et HOUSSON — Remarques sur quelques points de l'anatomie et de la physiologie des Procellariidés, et essai d'une nouvelle classification de ces oiseaux	353
JAFFARD. — Lettres sur le système du Monde	711
JAMES annonce l'envoi prochain d'un travail sur la régénération de la vaccine	1204
JAMIN — De l'action que les bifonctes exercent sur la lumière polarisée	680

JANNIARD. — Note sur un nouveau système de tours en fer battu pour l'établissement de phares, télégraphes, etc	217
JARRIN et LONCOTTE. — Un prix de 2 000 francs leur est accordé (concours des prix relatifs aux Arts insalubres pour 1842) pour leur moyen d'utiliser les eaux provenant des féculeries	322
JAUME-SAINT-HILAIRE — A l'occasion d'un passage du Traité d'Économie rurale présenté récemment par M. Boussingault, M. Jaume Saint-Hilaire écrit qu'il avait, avant M. Delile, tenté d'introduire en France la culture du <i>Polygonum tinctorium</i>	382
— Sur les premiers efforts faits par lui pour introduire en France la culture du <i>Polygonum tinctorium</i>	786
JEANMAIRE adresse des documents relatifs à l'emploi avantageux qu'on a fait d'une machine à vapeur rotative inventée par lui	293
JOBARD écrit qu'il existe depuis longtemps, dans le Musée de Bruxelles, le modèle d'une porte d'écluse qui s'ouvre et se ferme par un moyen analogue à celui qu'a proposé M. Fourcroyen	58
JONERT, de LANNALE — Dépôt d'un paquet cacheté (séance du 8 janvier)	59
— Recherches anatomiques sur l'organe électrique de la torpille	810
JOLY. — Anatomie de la girafe (en commun	

MM		
avec M. Lavocat)	265 et	
— Recherches sur les mœurs, les métamorphoses, l'anatomie et l'embryogénie d'un petit insecte coleoptère, le Négrin (<i>Colaspis atra</i>), qui ravage les luzernes du midi de la France suivies de l'indication des procédés à employer pour les détruire	493	3 8
— JOMARD, au nom de la Commission administrative, transmet le résultat du scrutin ouvert dans les différentes Académies pour la nomination d'un bibliothécaire en remplacement de feu M. Feuillel. Sur 14 votants, M. Landresse a obtenu 156 suffrages		4
— JOMARD adresse la description et la figure d'une nouvelle passerelle construite d'après le système de formes en fer et en		

MM		
lonté qu'il avait précédemment eue au jugement de l'Académie	422	
JUDAS — Description d'un moule d'au douce, nouvelle ou décrite jusqu'à présent d'une manière imparfaite	696	
JUSSIEU (de fait hommage à l'Académie de la seconde et dernière partie de son Traité élémentaire de Botanique)	348	
— M. de Jussieu fait hommage à l'Académie de la deuxième et dernière partie de sa Monographie des Malgaches	423	
— M. de Jussieu présente, au nom de l'auteur, M. Moiré le deuxième volume de la Flore de Surinam	1002	
JYLO — Note sur un rostat d'huile pour du papier formé de vitre	88	

K

KOLCHILIN — Note sur une turbine dite à double effet	932	
KOPF — Note sur la décomposition du chlorure hydrique par la chaleur	871	
— Analyse de l'eau minérale de Boultz-la-		

Bains	8 5
— Note sur l'alliage chromique	176
KUHLMANN — Des applications du vide aux travaux industriels	1046

L

LABUS, secrétaire de l'Institut impérial et royal de Lombardie, transmet la collection complète des Mémoires de cet Institut	4
— LAFARGUE, DE SAINT-ÉMILION — Sur le traitement des tumeurs cutanées congéniales connues sous le nom de <i>navus maternus</i>	187
— LAFONTAINE et THILLONNES corrépondent relativement à des expériences qui démontrent, suivant eux, l'existence du fluide nerveux et son action sur l'électromètre	1132
— LAIGNÉ — Sur un procédé qui permet de sonder en mer pendant la marche du navire	859
— LAMARCHE — Observations météorologiques faites à Saint-Lô pendant le deuxième semestre de l'année 1843	228
— LAMARLE — Note relative à la flexion des pièces chargées de bout (Rapport sur cette Note, Rapporteur M. Lecomte)	82
— Dépôt d'un paquet cacheté (séance du 22 janvier)	163
— LAMÉ est désigné comme l'un des Candidats pour la place de directeur des Etudes à l'École Polytechnique	240

— Rapport sur un Mémoire de M. Clapart relatif au règlement des travaux dans les machines locomotives et à l'emploi de la détente	275
— Note additionnelle au Mémoire précédent	345
LAMY — Son procédé d'épuration du soufre est l'objet d'un des prix relatifs aux Arts insalubres décernés au concours de 1842	322
— LANDRESSE — M. Jomard transmet, au nom de la Commission administrative, le résultat du scrutin ouvert dans les différentes Académies pour la nomination d'un bibliothécaire en remplacement de feu M. Feuillel. Sur 161 votants, M. Landresse a obtenu 156 suffrages	4
— LANTEY — Sur les résultats de certains traitements orthopédiques dans lesquels on a eu recours aux sections musculaires	755
— LAPASSE (de) adresse une Note à laquelle il ne veut pas donner, pour le présent, de publicité, et dont il demande le dépôt dans les archives de l'Académie. Cette Note est cachetée séance tenante, et sous cette forme le dépôt en est accepté	1160
— LASSAIGNE — Mémoire sur la détermi-	

MM	Page
nation de la présence de l'azote dans des quantités minimes de substances organiques. Rapporteur M. Mémoi	725
JASSAIE (VEJ L.) — Nouvelles recherches sur la composition du limon du Nil	787
JACQUET (ROBERT) — Ses recherches et expériences physiologiques et pathologiques sur le mécanisme de l'inflammation, présentées au concours pour le prix de Physiologie expérimentale de 1892, sont l'objet d'une mention honorable	319
JAUSSIER — La médaille de Lalande est octroyée à M. Langier pour avoir découvert une comète et en avoir calculé l'orbite. (concours de 1892)	316
— Sur une disposition des images qui reproduit celle qui affectent les rayons lumineux dans l'auréole réelle, et qui présente aussi la même orientation, observation faite dans la soirée du 23 juin (en commun avec M. Auago)	1168
— M. Langier est nommé membre de la Commission chargée de décerner le prix d'Astronomie fondation Lalande	477
JALRENT — Mémoire sur la forme générale des équations aux différences partielles linéaires et à coefficients constants propres à représenter les lois des mouvements infiniment petits d'un système de points matériels soumis à des forces d'attraction ou de répulsion mutuelle	294
Recherches sur les mouvements infiniment petits d'un système de sphériques soumis à des forces d'attraction ou de répulsion mutuelle	771 et 863
— Sur la nature des forces repulsives entre les molécules	865
— Mémoire relatif au calcul des variations. Rapport sur ce Mémoire. Rapporteur M. Cauchy	927
— Lire et Mémoire sur la rotation des plans de polarisation dans les mouvements infiniment petits d'un système de sphériques	936
JALRENT (A.) — Sur les produits de la distillation du sulfure, de l'azote et du sulfazote de bismuth	187
— Sur les acides amidés et chloramidés	436
— Sur de nouvelles combinaisons de l'indigo	567
— Sur un nouvel alcali	1016
— Sur quelques faits qui viennent à l'appui de la théorie des filons de M. J. Fournet	120
JALRENT (L.) — Ses recherches expérimentales, anatomiques et physiologiques sur l'hydre verte et sur l'éponge fluviatile sont l'objet du prix de Physiologie expérimentale, décerné au concours de 1892, en outre, une somme de 2000 fr. lui est accordée pour l'indemniser et l'engager à	

MM	Page
poursuivre son travail	192 et 321
LAVOCHAT — Anatomie de la girafe (en commun avec M. Joby)	265 et 491
LEBERT — De la formation des organes de la circulation et du sang dans les animaux vertébrés (en commun avec M. Prevost)	87
— Recherches microscopiques et physiologiques sur la tuberculisation	358
LERESGUE (V.-A.) — Formule pour la résolution d'une équation auxiliaire de degré m	606
LEBOT, DOLLET et ROBERT — Description et figure d'une nouvelle pompe	291 et 656
LECHIE présente des images photographiques faites au moyen d'une chambre obscurité dans laquelle la lentille est remplacée par un miroir periscopique en verre étamé	714
LECOQ — Dépôt d'un jacket en chène (séance du 15 avril)	711
LICHNER — Résumé de son voyage en Abyssinie	731
LLIEBERT et SALTERBAUX — Note sur une nouvelle disposition de sabot pour les roues des voitures	893 et 933
LLFORT — Coincidences entre les tremblements de terre ressentis en Bretagne et dans la haute Normandie, et l'altération momentanée de la limpidité des eaux du puits de Grenelle	41
— Sur la variation des eaux fournies par le puits artésien de l'abattoir de Grenelle	388
LEFOULON — Note pour faire suite à un précédent Mémoire sur les moyens de corriger les défauts de la seconde dentition	377
LIMARLE — Note sur la flexion des pièces chargées debout (Rapport sur cette Note, Rapporteur M. L. ouville)	82
LEREBOURS présente un appareil dans lequel l'élément à courants constants se trouve remplacé par un élément de Bunsen	782
LEROY DIETIOLLES — Sur l'évacuation artificielle des débris des calculs urinaux et sur leur pulvérisation	477
— Addition à un précédent Mémoire sur la diathèse cancéreuse, et sur l'utilité des opérations chirurgicales dans le traitement de ces maladies	480
— Dépôt d'un paquet cacheté (séance du 17 juin)	1160
LESAUVAGE — Mémoire sur les tumeurs éburnées du sein	688
LESUEUR — Vues et coupes du cap de la Hève avec indication des roches organiques fossilifères qui se trouvent dans ce terrain	247
LETELLIER — Observations sur l'action du	

MM	Pages
sucre dans l'alimentation des granivores	658
LE VERRIER — Lettre à M. Cauchy sur la comète observée par M. Faye, et sur les motifs qui portent à la considérer comme étant la même que la comète de Lexell	826
I EVOL rappelle les expériences qu'il a faites touchant la précipitation des métaux, et revendique pour quelques uns de ces métaux, la priorité sur M. Becquerel	708
Nouvelle Lettre relative à la question de priorité débattue entre lui et M. Becquerel	837
I FWY — Recherches sur la réaie de Meynas	242
— Observations sur l'atmosphère faites à Paris et à Andilly pres Montmorency, pour rechercher la proportion d'acide carbonique contenue dans l'air atmosphérique (en commun avec M. Boussingault)	473
L ROSTE — Statistique du Mexique	185
I LAUTAUD — Mémoires sur l'histoire naturelle et les propriétés médicales du chanvre indien	149
— M. Lautaud présente un dessin chinois représentant les diverses parties du corps humain, avec la légende en chinois et la traduction en français faite en français M. Stantiles Julien	150
I BRRI annonce la mort de M. Fossonbon correspondant de l'Académie, pour la Section de Mécanique	75
I MOU/IN JAMOTHE prie l'Académie de vouloir bien le comprendre dans le nombre des Candidats pour la place de correspondant vacante, dans la Section d'Economie rurale, par suite du décès de M. Mathieu de Dombasle	153
Mémoire ayant pour titre Institutions rurales pouvant être considérées comme une amélioration importante en agriculture	378
LIOUVILLE — Rapport sur une Note de M. F. Lemaire relative à la flexion des pièces chargées debout	82
— Remarques sur des classes très étendues de quantités dont la valeur n'est ni rationnelle ni même réductible à des irrationsnelles algébriques — Remarques relatives	

1 in passage de l'ère des Principes ou Newton calcule l'action exercée par une sphère sur un point extérieur	381
— M. Louville au nom de la Commission pour le grand prix de Mathématiques année 1841, annonce qu'aucune des pièces envoyées jusqu'ici à l'Académie n'a pu mériter le prix. La Commission remet la même question à concours pour l'année 1846, en l'enonçant dans les termes suivants : l'irradiation dans quelque point essentiel la théorie des perturbations planétaires	630
— Nouvelle démonstration d'un théorème sur les irrationsnelles algébriques insérées dans le <i>Compte rendu</i> de la séance du 13 mai	11
— M. Lenoir est nommé membre des Commissions suivantes	
— Commission chargée de proposer la question pour le grand prix des Sciences mathématiques — concours de 1846	24
— Commission chargée de l'examen des pièces envoyées au concours pour le grand prix des Sciences mathématiques — année 1843	35
— Commission chargée d'examiner les pièces de concours présentées par MM. les élèves des Ponts et Chaussées	17
LOBELI annonce l'envoi par chemin de l'Introduction à l'œuvre nouvelle cosmogonie — unquement bas sur l'attraction	11
LONG (OTL et JAMIN — Un prix de 2000 francs est accordé (concours des prix relatifs aux arts insalubres, pour leur moyen d'utiliser les eaux provenant des feux rurs	34
LONGET — Une somme de 3000 francs est accordée (concours concernant les prix de Médecine et de Chirurgie de l'année 1842 pour la partie pathologique de son ouvrage sur l'anatomie et la physiologie du système nerveux	99 et 327
LORRIS DU VAL — Sur les inconvénients auxquels expose l'emploi des substances vénéneuses dont on fait usage dans divers procédés d'embaumement	193
LOTTIN — Sur les variations diurnes de la déclinaison magnétique dans les hautes latitudes boréales en commun avec M. Bravais	724

M

MAGENDIE, au nom de la Commission du prix de Vaccine, fait part à l'Académie d'une difficulté qui s'est élevée par suite de cette circonstance, que quelques-uns

des concurrents ont mis leur nom sous pli cacheté, tandis que d'autres l'ont fait connaître

— Remarques à l'occasion d'une communication

MM	Page	MM	Page
tion de M. Gay l'année sur la théorie des phénomènes chimiques de la respiration	563	— Sur un cas de ligature de l'artère iliaque externe	1059
— M. Magré présente, au nom de M. Roux, le modèle d'un filtre pour l'épuration des eaux	591	MANDL — Sur la structure des deux épithéliums des membranes muqueuses du canal intestinal	889 891
— Communication relative au cas de cow-pox et à l'inoculation de la matière des pustules à plusieurs enfants	986	— Sur l'épithélium des Zoospermies	
— M. Magendie est nommé membre des Commissions suivantes		MARCEL DE SERRES — Doutes relativement à l'existence d'un gisement important de mercure dans le département de l'Aveyron	51
— Commission du grand prix des Sciences physiques, questions concernant la production de la voix chez l'homme	387	— Note en réponse aux remarques de M. Roux concernant un gisement de mercure annoncé dans le département de l'Aveyron	310
— Commission du grand prix des Sciences physiques, question concernant l'examen comparatif de l'organe de la voix chez l'homme et chez les animaux mammifères	1614	MARLY MONGE — Sur un ballon à enveloppe en cuivre laminé	419
— Commission des prix de Médecine et de Chirurgie	1614	— Sur un tremblement de terre qui a été ressenté à la Corogne le 18 avril 1844	879
— Commission du prix de Physiologie expérimentale	471	MARGOTON — Nouvelle Note sur un procédé destiné à assurer la conservation des bois	378
— M. Magendie demande à être remplacé dans la Commission de la gélatine	563	MARGUERITE — Dépôt d'un paquet en chété séance du 8 jan 1847	59
MAGNE — Sur l'efficacité du moyen proposé par feu M. Sanson pour distinguer la cataracte de l'amaurose et de la glauque	151	MARIE — Expériences sur le degré d'ébullition de l'eau sous diverses pressions barométriques (Recherches de M. Regnaud sur la force élastique de la vapeur aqueuse)	513
MAIRE — Description d'un nouveau procédé pour la fabrication de l'acétate de plomb	526	MARFIN — Son procédé d'extraction de l'amidon des farines sans altération du gluten et sans fermentation putride et l'objets d'un des prix relatifs aux Arts insulaires, décernés au concours de 1842	321
MALFIRE adresse un nouveau Mémoire sur sa théorie des vents alisés, et demande que l'Académie, se départant de ses usages, renvoie à l'examen une Commission l'en sembler d'un travail qui a déjà été rendu public par la voie de l'impression	191	MARFINELLI écrit relativement à un projet qu'il a conçu pour amener de l'eau potable dans la ville d'Anagni	98
— M. Masière insiste pour obtenir un Rapport sur ses Mémoires imprimés concernant la théorie des vents	229	MARTINS — Sur l'antagonisme entre les variations diurnes et les oscillations mensuelles dans la hauteur du baromètre en France	440
— Note sur la théorie élémentaire du calorique	863	MASON — Étude de photométrie électrique	281
MALAGUTI — Action du chlorure sur les éthers	7	MASOY — Tableau des limites de la végétation de quelques plantes sur le versant occidental du Canigou, Rapport sur ce tableau	647
MALAPERT — Cristaux de sulfate de soude et de sulfate de magnésie, remarquables par leur forme	699	MAIRIEU est nommé membre de la Commission chargée de décerner le prix d'Astronomie, fondation Lalande	477
MALE — Note concernant la navigation par la vapeur	291	— Et de la Commission du prix de Statistique	
— M. Male prie l'Académie de hâter le travail de la Commission à l'examen de laquelle a été renvoyé sa Note sur la navigation par la vapeur	881	MATHON adresse une réclamation de priorité relative à une Note sur un procédé particulier d'embaumement lue par M. Dupré dans la séance du 12 février 1844	895
MALGAIGNE — Sur l'abus et le danger des sections tendineuses et musculaires dans le traitement de certaines difformités	307	MATTEUCCI — Nouvelles expériences d'électricité animale	443
— Mémoire sur la valeur réelle de l'orthopédie, spécialement de la myotomie rachidienne dans le traitement des déviations latérales de l'épine	466	— Sur la conductibilité de la terre pour le courant électrique	1032
		MATTHIESSEN — Sur les anneaux colorés produits dans un solide transparent limité	

MM	Pages	MM	Pages
par une surface plane combinée avec une surface courbe	710	— M le Ministre de la Guerre invite l'Académie à lui présenter une liste de Candidats pour une place d'examineur permanent vacante à l'Ecole Polytechnique	1103
— Sur les différences qui distinguent son microscope de celui de M. Amici	1158	MINISTRE DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE	
MAUMENÉ et FAVET — Sur la réduction partielle du bioxyde de cuivre par la chaleur, et sur le nouvel oxyde qui en résulte	658	QUI transmet ampliation de l'Ordonnance royale qui confirme la nomination de M. Morin à la place vacante dans la Section de Mécanique, par suite du décès de M. Coriolis	4
MAUNOIR — Note sur la muscularité de l'iris	293	— M le Ministre de l'Instruction publique adresse à l'Académie le résumé qui lui a été transmis par M le Ministre de la Guerre d'un travail rédigé par MM. Galmier et Fizeau, à la suite d'un voyage de plusieurs années en Abyssinie	1131
MAURICE (F) — De la variation des constantes arbitraires, comme l'ont établie, dans sa généralité, les Mémoires de Lagrange du 22 août 1808 et du 13 mars 1809, et de lui de Poisson du 16 octobre suivant	1021	— M le Ministre de l'Instruction publique transmet une Note de M. Schweser sur les mouvements apparents des cieux, le magnétisme terrestre, etc	1104
MAURY — La Commission centrale administrative fait connaître les résultats du scrutin ouvert dans les différentes Académies pour la nomination d'un sous bibliothécaire sur 151 votants, M. Maury a réuni 112 suffrages	152	MIRBEL (DE) — Note sur l'embryogénie du <i>Taxus inccata</i> (en commun avec M. Spach)	114
MAUVAIS est nommé membre de la Commission chargée de décider le projet d'Astronomie, fondation Lalande	47	— M de Mirbel est nommé membre de la Commission chargée de déterminer la question à proposer pour le grand prix des Sciences physiques de 1875	118
MAYOR (RUS) — Sur un appareil propre à préserver de l'asphyxie par submersion	822	MOLENAARS — Dépot d'un paquet cacheté (en commun avec M. Chénier), séance du 2 janvier	9
MILLON — Sur la température des différentes parties du spectre solaire	39	— Dépot d'un paquet cacheté (séance du 12 février)	266
— Suite des expériences électroscopiques de MM. Palmieri et Sestini	762	MONTAGNI — Observations touchant la structure et la fructification des genres <i>Ctenodus Delisei</i> et <i>Lenormandia</i> de la famille des Floridées (Rapport sur ce Mémoire)	1144
MEISLERS et GUILLOT — Sur l'emploi de l'indure de potasse dans le traitement des tremblements nerveux et des maladies saturnines	512	MORI AU DE JONNÈS rappelle, à l'occasion d'une communication de M. Robert sur des ossements humains trouvés dans un bloc de calcaire marneux, les recherches qu'il a faites autrefois relativement au prétendu fossile humain de la Gade loupe	1060
MIALLEL — Aprouve la théorie sur la cause de la maladie désignée sous le nom de diabète ou de glucosurie	707	MORIN — Ordonnance royale qui confirme sa nomination à la place devenue vacante, dans la Section de Mécanique par suite du décès de M. Coriolis	4
MILLARDET et CANQUOY — Dépot d'un paquet cacheté (séance du 19 février)	712	— M. Morin remplacera M. Coriolis dans la Commission chargée d'examiner un Mémoire de M. Fleury sur l'action de la vapeur	422
MILLER propose l'emploi d'une nouvelle ligne trigonométrique	59	— M. Morin est nommé membre de la Commission du prix de Mécanique	477
MILLON — Nouvelles recherches sur l'iodo	1041	MORIS — M. de Jussieu présente le deuxième volume de sa « Flore de Sardaigne »	1002
MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DU COMMERCE adresse le cinquantième volume des « Brevets d'invention expirés »	204	MURCHISON et SAUNDERS annoncent que la quatorzième réunion de l'Association bri	
MINISTRE DE LA GUERRE annonce la nomination de M. Duhamel à la place de directeur des Etudes à l'Ecole Polytechnique	378		
— M le Ministre de la Guerre accuse réception du Supplément au Rapport des Commissaires de l'Académie sur l'opium récolté en Algérie	482		
— M le Ministre de la Guerre invite l'Académie à désigner trois de ses membres pour faire partie du conseil de perfectionnement de l'Ecole Polytechnique	523		

MM	Page	MM	Page
Annuaire pour l'avancement des sciences juridiques dans la ville de York à dater du	825	26 septembre 1844	

N

NATRET soumet au jugement de l'Académie un ouvrage composé qu'il annonce comme pouvant donner un grossissement de quatre fois avec une longueur focale de 32 millimètres et en conservant l'achroma- tisme	592	pour titre « Des phénomènes de mou- vement de repos et d'équilibre conai- dérés dans le monde réel et dans leurs rap- ports avec les règles de la statique »	864
NOIRET — Note sur une nouvelle méthode d'enseignement pour le calcul élémentaire	933	— MM. Noiret et Flehault adressent un pa- quet cacheté (avant du 25 mars)	534
NOISETTE et FLAMANT — Mémoire ayant		NOTHOMB (as) présente, par l'intermédiaire de M. Leblond, un appareil électrique destiné principalement à l'usage des mé- decins	782

O

OMAIUS D'HALLOY (D) fait hommage à l'Académie un opuscule qu'il vient de pu- blier sur la classification des races hu- maines et indique les points principaux par lesquels sa classification se distingue de celles qu'on a précédemment données	679	Section d'économie rurale	153
ORDINAIRE DE LA COLONGE prie l'Aca- démie de vouloir bien le comprendre dans le nombre des Candidats pour la place de Correspondant vacante par suite de la césure de M. Mathieu de Dombasle dans la		ORFILA adresse à l'Académie un opuscule qu'il vient de publier sur un point de mé- decine légale et demande que cette pièce soit renvoyée, comme document à consu- lter à la Commission chargée de l'exa- men de diverses communications rela- tives à la rectification des poisons minéraux dans les investigations médico-légales	593
		— Nouvelle Note sur la question de localisa- tion des poisons	690

P

PALMIERI — Lettre de M. Melloni sur les expériences électriques de MM. Palmieri et Santi-Linari	762	fait le Rapport sur le concours de Méca- nique pour l'année 1842 à compris, dans les pièces sur lesquelles porte ce Rapport les diverses communications qu'il a faites relativement à sa tâche	59
PANCKOUKE — Note sur l'impression mi- type, procédé qui doit permettre d'obtenir une grande réduction dans les frais d'im- pression et de papier	792	— Nouvelle Lettre relative au Rapport de la Commission du prix de Mécanique	99
PARET — Examen de quelques expériences sur la décomposition des oxydes et sur celle des sels, sur le transport des élé- ments, sur la décomposition de l'eau par la pile — conséquences qui se déduisent des faits observés dans cette dernière ex- périence	823	— M. Passot rappelle l'envoi qu'il avait fait, dans une précédente séance, du Rapport de M. Lamé sur sa turbine, et demande que cette pièce soit envoyée à la Commis- sion du concours pour le prix de Méca- nique	382
PARLATORE — Note sur l'anatomie de l'Al- doanda venenosa	998	PAYEN — Rapport supplémentaire sur l'o- pium d'Alger	238
PABOLA — Nouvelles recherches sur le mode de développement, sur l'action et sur le principe actif de l'ergot des graminées	151	— M. Payen en présentant l'ensemble de ses Mémoires sur les développements des vé- gétaux, donne un résumé des principaux résultats de ses recherches.	469
PASSOT demande si la Commission qui a		— Comme Rapporteur d'une Commission som-	

MM	Page	MM	Page
moë par la Société d'Encouragement pour l'industrie nationale, M. Payen fait hommage à l'Académie d'un exemplaire des Observations sur le projet de loi relatif aux brevets d'invention, observations rédigées par cette Commission et adressées, au nom de la Société, à MM. les membres de la Chambre des Députés	564	peut subir sans altération une immersion prolongée dans l'eau	18
— Note sur l'extraction du sucre de betteraves	663	— Et de la Commission du concours pour le prix concernant les Arts insalubres	679
— Réplique à des remarques de M. Dumas faites à l'occasion de la précédente communication	667	PELIER — Remarques à l'occasion d'un passage du Rapport sur divers travaux de M. de Quatrefages concernant les animaux invertébrés, passage dans lequel il est question de la séparation spontanée d'un même animal en plusieurs individus ayant chacun une vie propre	161
— Rapport sur un Mémoire de M. Lassaigue relatif à la détermination de la présence de l'acide dans des quantités minimes de substances organiques	725	— Observations faites dans les Alpes sur la température d'ébullition de l'eau (en commun avec M. Bravais)	572
— Expériences sur la qualité nutritive des tourteaux de la graine de sésame (en commun avec M. de Gasparin)	797	— Sur la cause des différences existant entre les résultats des expériences qui l'a faites en commun avec M. Bravais, en descendant le Faulhorn, relativement au point d'ébullition de l'eau sous différentes pressions, et les résultats d'expériences du cabinet	768
— M. Payen est nommé membre de la Commission du concours pour le prix concernant les Arts insalubres	679	PFRAIRE demande à reprendre plusieurs Mémoires qu'il avait adressés à 2 concours pour les prix de Médecine et de Chirurgie et qui n'ont pas été mentionnés dans le Rapport de la Commission	1002
PAYR — Addition à son Mémoire concernant l'influence de la lumière colorée sur la végétation	32 et 190	PERREY — Liste des tremblements de terre ressentis en Europe et dans les parties adjacentes de l'Afrique et de l'Asie, pendant l'année 1813	361
— Note sur l'étendue des racines à s'enfoncer dans la terre, et sur leur force de pénétration	993	PERSOZ — Expériences sur l'engraissement des oies	247
— Rapport sur ce Mémoire	1169	— Observations faites à l'occasion d'un travail sur l'arsenic publié par M. Jacquelin	24
PAYLRNE, à l'occasion d'un Mémoire présenté par MM. Pecqueur, Bontemps et Lambeau sur l'emploi de l'air comprimé pour la propulsion des voitures sur les chemins de fer, annonce qu'il est en mesure de présenter un moteur qui fonctionne à volonté par l'air comprimé ou par l'air rarefié	1193	PEZ/ONT demande l'autorisation de reproduire un Mémoire sur la question de la contagion de la peste et des quarantaines. Mémoire qui a pas encore été l'objet d'un Rapport	192
PELQUEUR, BONTemps et ZAMBAUX — Nouveau système de locomotion sur les chemins de fer, au moyen de l'air comprimé	1131	PITRQUIN — Sur l'absence de circonvolutions dans le cerveau d'un Oustiti	191
PÉDRONI — Analyse d'un poison employé par les indigènes de la province de Caracas (Amérique du Sud)	158	— M. P. écrit relativement à un cas de monstruosité chez un fœtus humain, cas qu'il croit ne pas avoir été encore décrit	1111
— Note sur des ossements fossiles de poissons qui se trouvent dans le département de la Gironde	594	PINEL (Sc.) et FARRAS adressent, pour le concours aux prix de Médecine et de Chirurgie, un Mémoire sur la paralysie générale sur ses caractères anatomiques, ses différentes formes et son traitement	48
PEIGOT — Recherches sur l'uranium, 2 ^e Mémoire	682	PIOBERT est nommé membre de la Commission pour le prix de Mécanique	47
PELOUZE — Remarques à l'occasion d'une communication de M. Miéville sur la cause de la maladie désignée sous le nom de diabète ou de glucosurie	707	PLANCHON — Note sur l'Apogoneton	22
— Rapport sur un Mémoire de M. Paul Thénard relatif aux combinaisons du phosphore avec l'hydrogène	914	PLANTAMOUR — Éléments paraboliques de la comète découverte par M. Faye, le 22 novembre 1813	4
— M. Pelouze est nommé membre de la Commission chargée d'examiner si le platine travaillé par le procédé de M. Jonnuty		— Éléments elliptiques de cette comète	309
		POGGIALE — Deuxième Mémoire sur la solubilité des sels	1141

MM	Page	MM	Page
POINSOT est nommé membre des Commissions suivantes		— Supplément à son travail sur l'ovulation spontanée et périodique des mammifères	
— Commission administrative pour l'année 1844	2	— Observations concernant les spermatozoaires de l'homme et des animaux	820
— Commission chargée de déterminer la question à proposer comme sujet du concours pour le grand prix des sciences mathématiques de l'année 1846	210	— Réponse à une réclamation élevée par M. Mandl au sujet des observations précédentes	1016
— Commission chargée de l'examen des pièces admises au concours pour le grand prix des sciences mathématiques année 1843	363	POUILLET est nommé membre de la Commission du grand prix des sciences physiques, question concernant le mécanisme de la production de la voix chez l'homme	387
— M. Poinsot est désigné comme l'un des trois membres de l'Académie qui feront partie du conseil de perfectionnement de l'École Polytechnique pendant l'année scolaire 1844	523	— L'et de la Commission du prix de Statistique	727
PONCELET est désigné pour faire partie du Conseil de perfectionnement de l'École Polytechnique pendant l'année scolaire 1844	523 et 537	POUNAREDL (J. A.) — Mémoire sur une nouvelle série de sels doubles, et sur quelques combinaisons éphémères qui compliquent parfois les essais par voie humide	854 et 892
— M. Poncelet est nommé membre des Commissions suivantes		PREFET DE POLICE demande communication du Rapport qui a été fait à l'Académie sur un procédé de désinfection des fosses d'aisance proposé par M. Soret	1109
— Commission chargée d'examiner les pièces de concours présentées par MM. les élèves des Ponts et Chaussées	679	PREFET DE LA SEINE annonce que l'inauguration de la statue de Molière aura lieu le 15 janvier 1844, et que MM. les Membres de l'Institut recevront chacun une invitation pour assister à cette cérémonie	31
— Commission pour la révision des comptes de l'année 1843	1120	PREVOST et LEXAT — De la formation des organes de la circulation et du sang dans les animaux vertébrés	88
POUCHET — Suite de ses précédentes recherches concernant la théorie de la fécondation chez les mammifères	509		

Q

QUATREFAGES (de) — Mémoire sur les Phlébenteries ou les nouveaux de la classe des gastéropodes établi d'après l'examen anatomique et physiologique des genres <i>Zephyrine</i> , <i>Actéon</i> , <i>Actéon</i> , <i>Amphorine</i> , <i>Pavoi</i> , <i>Chalide</i>	13	vers animaux sans vertèbres des côtes de la Manche (Rapport sur ces Mémoires et sur le précédent, Rapporteur M. Milne Edwards)	67
— Mémoires relatifs à l'organisation de divers animaux sans vertèbres des côtes de la Manche (Rapport sur ces Mémoires et sur le précédent, Rapporteur M. Milne Edwards)		QULNARD — Note sur une machine à élever l'eau	185 et 293

R

RACIBORSKI prie l'Académie de vouloir bien comprendre son « Traité de la puberté et de l'âge critique chez la femme » parmi les ouvrages admis à concourir pour le prix de Médecine et de Chirurgie	98	de M. Fuster, concernant le climat de la France	159
RATEL et CROISLEY — Dépôt d'un paquet cacheté (séance du 22 janvier)	163	— Remarques à l'occasion d'une communication récente de M. Marcel de Serres, concernant la constitution géologique de cette partie du département de l'Aveyron où l'on a signalé la présence du marbre	157
— Dépôt d'un paquet cacheté (séance du 20 mai)	957	— M. Raulin présente quelques réflexions à l'appui des remarques qu'il avait faites dans les deux communications précédentes	
RAULIN — Note sur un passage du Mémoire			

MM.	Pages
dentés.....	381
RAYER — Rapport sur le prix fondé par M. <i>Menni</i> , concernant les morts apparentes.....	193
— M. <i>Rayer</i> est nommé membre de la Commission des prix de Médecine et de Chirurgie.....	387
— Et de la Commission du prix concernant les Arts insalubres.....	679
REGNAULT . — Remarques à l'occasion d'une Note de M. <i>Itier</i> , relative à la question de priorité concernant le système de piles galvaniques désignées sous le nom de piles de Bunsen.....	59
— Recherches sur la force élastique de la vapeur aqueuse.....	537
— M. <i>Regnault</i> est nommé membre de la Commission chargée d'examiner si le platine travaillé par le procédé de M. <i>Jeannety</i> peut subir sans altération une immersion prolongée dans l'eau.....	387
— Et de la Commission chargée de préparer des instructions pour les artistes auxquelles sera confiée l'exécution d'une grande lunette destinée pour l'Observatoire.....	891
REIBET (J.) . — Mémoire sur les combinaisons de deux nouvelles bases alcalines contenant du platine.....	1100
RENDU , près de partir pour l'Amérique du Sud, se met à la disposition de l'Académie pour les observations, relatives à la médecine ou la chirurgie, qu'elle jugerait utile de faire faire dans les pays qu'il va parcourir.....	228
RENETTE . — Note de M. <i>Segner</i> sur les épreuves supportées par des canons de fusil sortis de la fabrique de MM. <i>Gastine</i> et <i>Renette</i>	723
RICHARD adresse quelques détails sur la disposition des Tables qu'il a publiées pour la réduction des distances lunaires.....	8
RICHARD (A.) et GALZOTTI . — Monographie des Orchidées mexicaines, précédée de considérations générales sur la végétation du Mexique et sur les diverses stations où croissent les espèces d'Orchidées mexicaines.....	497
RIDOLFI est présenté par la Section d'Économie rurale, comme un des Candidats pour la place de Correspondant vacante par suite du décès de M. <i>Mathieu de Donbaz</i>	266
RIEFEL est présenté, par la Section d'Économie rurale, comme un des Candidats pour la place de Correspondant vacante par suite du décès de M. <i>Mathieu de Donbaz</i>	266
RIVIÈRE . — Mémoire minéralogique et géologique sur les roches éruptives de la	

MM.	Pages
France occidentale.....	1148
RIVOT (L.-E.) — Le prix fondé par madame la marquise de Laplace est décerné à M. <i>Rivot</i> , premier élève sortant de l'École Polytechnique, promotion de 1842.....	319
ROBERT (F.) . — Sur des ossements humains trouvés dans un bloc de calcaire marneux des environs d'Alais.....	1050
ROBIN-MASSÉ . — Expériences concernant l'action de l'iode sur les végétaux vivants.....	1188
ROBINET — Mémoire sur la formation de la soie.....	92
ROCHEMONT (en) écrit relativement aux expériences qui se faisaient autrefois dans le village de Vaurenard en Beaujolais, dans le but de dissiper, au moyen de détonations de boîtes à feu, les nuages orageux.....	1063
ROPERT, DOUTET et LEMOR . — Description et figure d'une nouvelle pompe.....	293 et 696
ROSSI (V.-A.) adresse un ouvrage qu'il vient de publier à Naples sur les travaux hydrauliques à exécuter pour l'assainissement et la fertilisation des environs de Vico.....	187
ROUGET DE LISLE demande l'autorisation de reprendre des échantillons de laines teintes à la cochenille qu'il avait adressées en même temps qu'un Mémoire sur la teinture, qui n'a pas encore été l'objet d'un Rapport.....	595
ROUSSEAU — M. <i>Magnée</i> met sous les yeux de l'Académie le modèle d'un filtre inventé par M. <i>Rousseau</i> pour les eaux destinées aux usages économiques.....	591
ROUSSEAU et SARRAZIN — Une mention honorable leur est accordée pour leur ouvrage sur les maladies des voies aériennes de l'homme et de certains animaux (concours pour les prix de Médecine et de Chirurgie de l'année 1842).....	99 et 327
— MM. <i>Rousseau</i> et <i>Sarrazin</i> demandent à reprendre le Mémoire qui a été soumis au jugement de la Commission, afin d'y pouvoir ajouter les résultats de leurs recherches ultérieures sur le même sujet.....	381
ROUSSEAU-LAFARGE — Dépôt d'un paquet cacheté (séance du 15 janvier).....	99
— Dépôt d'un paquet cacheté (séance du 22 janvier).....	163
ROUX . — Remarques à l'occasion d'une communication de M. <i>Ehrmann</i> , sur une opération du polype au larynx.....	709
— M. <i>Roux</i> annonce qu'il a reçu de M. <i>Bischoff</i> un Mémoire sur le développement de l'embryon dans le chien, Mémoire que l'auteur destinait à concourir pour le prix de Physiologie expérimentale, mais qui n'est	

MM.	Pages
arrivé à Paris qu'après la clôture de concours. — Le règlement ne permettant d'admettre ce travail autrement que pour un futur concours, M. Roux décide qu'il le renverra à l'auteur, qui, s'il se décide à le présenter plus tard, aura probablement de nouvelles observations à y ajouter.	1110
— M. Roux est nommé membre de la Commission des prix de Médecine et de Chirurgie.....	387
— M. Roux remplacera M. Brecher, absent, dans la Commission chargée de l'examen	

MM.	Pages.
d'un lithotriteur présenté par M. Gutilles.	934
ROZET. — Sur les volcans de l'Auvergne. (Rapport sur ce Mémoire; Rapporteur M. Dufénoy.)	130
— Mémoire sur les causes probables des irrégularités de la surface de niveau du globe terrestre, des anomalies observées dans la direction de la verticale, la marche du pendule et la hauteur de la colonne barométrique ramené à cette même surface (en commun avec M. Hassard),	292

S

SABINE et MENCISON annoncent que la quarantième réunion de l'association britannique pour l'avancement des sciences aura lieu dans la ville d'York, à dater du 26 septembre 1864	825
SAHUQUE et DAUJAC. — Dépôt d'un paquet cacheté (séance du 22 janvier).	163
SAINT-ÈVRE. — Recherches sur l'huile essentielle de masséas	705
SANTI-LINARI. — Lettre de M. Melloni sur les expériences électriques de MM. Palmieri et Saint-Louis	762
SARRUS — Le grand prix des Sciences mathématiques est décerné à M. Sarrus (concours de 1862)	315
SAUTEREAUX et LARIVAS. — Notes sur une nouvelle disposition de sabot pour les roues des voitures	893
SAUVEUR, secrétaire perpétuel de l'Académie royale de médecine de Belgique, adresse à l'Académie des Sciences plusieurs livraisons du Bulletin des travaux de cette Académie.	839
SAUZAY — Mémoire sur un moyen simple et économique d'obtenir pour les lampes un niveau constant	864
— M. Sauzay écrit relativement à une Note qu'il avait précédemment adressée sur un flotteur à niveau constant	1108
SCHATTENMANN est présenté par la Section d'Economie rurale, comme un des Candidats pour la place de Correspondant vacante par suite du décès de M. Mathieu de Dombasle.	206
— M. Schattenmann prie l'Académie de hâter le Rapport de la Commission à l'examen de laquelle ont été renvoyées les diverses communications qu'il a faites sur l'emploi du rouleau compresseur pour le cylindrage des chaussées en empierrement.	1053
SCHWEICH. — Note sur les mouvements	

appareils des éteux, le magnétisme terrestre, etc.	1194
SCIPION. — Note sur un appareil désigné sous le nom de machines à air.	528
SCOUTETTEN — De la trachéotomie dans la période extrême du croup.	23
SÉDILLOT. — Nouvelle Note sur la part qu'on peut attribuer aux Arabes dans la découverte de la variation lunaire.	48
— Notes sur l'application d'un nouveau procédé opératoire pour l'ablation d'une partie de la base de la langue.	302
SEGUIER — Épreuves supportées par des canons de fusil sortis des fabriques de MM. Renetz et Gustin, et de M. Albert Bernard.	723
— M. Seguer est désigné pour faire partie, avec divers membres de l'Académie des Beaux-Arts, d'une Commission chargée d'examiner un piano présenté par M. Hers	823
SELLIGUES. — Sur un nouveau procédé pour la propulsion des vaisseaux.	1037
SENILLOSA adresse les observations de la grande comète de 1843, qu'il a faites à Buenos-Ayres, de concert avec M. Lopez.	532
SERMET DE TOURNEFORT. — Note sur un bûti à axes convergents	893
— M. Sermet de Tournefort présente un modèle de son bûti à axes convergents pour les locomotives et les wagons des chemins de fer, et demande que cette invention soit renvoyée à l'examen d'une Commission spéciale.	913
SERRES. — Sur l'invitation de M. le Président, M. Serres donne des nouvelles de la santé de M. Gay-Lussac.	269
— M. Serres, comme membre de la Commission relative à la question des quarantaines, fait connaître les causes qui ont retardé jusqu'ici le Rapport demandé par M. Aubert-Rochet.	493

MM	Page	MM	Page
— Remarques à l'occasion d'une communication de M. Remak, sur le développement du poulet.....	823	quel M. Lamy a obtenu une récompense aurait été, d'après ce que dit M. Stenon, depuis longtemps en usage dans sa fabrication de produits chimiques où M. Lamy a été employé.	533
— M. Serres présente, au nom de l'auteur, M. le docteur Stürmer, une Note sur le mode de transmission de la peste ...	864	SOLEIL. — Nouveaux appareils pour la production des anneaux colorés à centre noir ou blanc	417 et 782
— Sur la demande de M. Serres, un Mémoire de M. Mandl concernant l'épithélium des zoospermes est renvoyé au concours pour le prix de Physiologie expérimentale ...	891	— MM. Solari et Silbermann soumettent au jugement de l'Académie un appareil destiné à la démonstration, dans les cours publics, des lois de la réfraction et de la réflexion	1132
— Commission du grand prix des Sciences physiques, question concernant le développement des fœtus chez les Oiseaux et les Reptiles.	387	SOREL demande qu'un Mémoire sur divers appareils de stérilité, qu'il avait présenté l'an passé, et qui avait été renvoyé à la Commission des prix Montyon, soit retiré de ce concours et soumis à l'examen d'une Commission ordinaire.	228
— Commission du grand prix des Sciences physiques, question concernant l'examen comparatif de l'organe de la voix chez l'homme et chez les animaux mammifères.....	ibid.	— Note sur divers perfectionnements dans les machines à vapeur, les chaudières, les foyers, etc.	862
— Commission des prix de Médecine et de Chirurgie.....	ibid.	SORMANI. — Note sur un manomètre supposé propre à déterminer la tension de la vapeur dans le cylindre	528
— Commission du prix de Physiologie expérimentale.....	477	SOULEYET demande qu'un travail sur l'anatomie et la physiologie des Mollusques, qu'il avait adressé, en 1833, à l'Académie, soit admis à concourir pour le prix de Physiologie expérimentale	594
— M. Serres remplacera M. Breschet, absent, dans la Commission chargée de l'examen d'un Mémoire de M. Deleau sur les corps étrangers introduits ou formés dans l'oreille moyenne.....	422	SPA'N — Note sur l'embryogénie du <i>Taxus baccata</i> (en commun avec M. de Mirbel)	114
SERRURIER et ROUSSEAU — Une mention honorable leur est accordée pour leur ouvrage sur les maladies des voies séreuses de l'homme et de certains animaux. 99 et 327		STROMEYER — Sur la proposition de la Commission des prix de Médecine et de Chirurgie, l'Académie accorde un prix de 6000 francs à MM. Stromeyer et Dieffenbach, à l'un, pour avoir, le premier, institué et exécuté sur des cadavres l'opération du strabisme, et à l'autre, pour avoir, le premier, pratiqué avec succès cette opération sur l'homme vivant 99 et 327	
SIEBER adresse quelques considérations sur les chemins de fer, et des plans relatifs aux changements qu'il propose d'apporter dans diverses parties du système que l'on suit aujourd'hui.	1204	STURM est nommé membre de la Commission chargée de déterminer la question à proposer comme sujet de concours pour le grand prix de Mathématiques de l'année 1846.....	240
SILBERMANN. — Sur la chaleur produite par les combinaisons chimiques; premier Mémoire (en commun avec M. Favre) ..	695	STURMER — Note sur le mode de transmission de la peste	864
— MM. Silbermann et Solari soumettent au jugement de l'Académie un appareil destiné à la démonstration, dans les cours publics, des lois de la réfraction et de la réflexion	1132	SUCQUET soumet au jugement de l'Académie un Mémoire sur l'assainissement des amphithéâtres de dissection, sur la conservation des pièces anatomiques, et sur un nouveau procédé d'embaumement ..	481
SILVESTRE, au nom de la Section d'Economie rurale, annonce que la Section est en mesure de présenter, dans la prochaine séance, une liste de Candidats pour la place de Correspondant vacante dans son sein.	167	SZOKALISKI annonce avoir pratiqué avec succès l'opération de la cataracte sur le homme âgé de 104 ans.	1160
SIMONIN adresse une réclamation relative à un passage du dernier Rapport sur le concours concernant les Arts insalubres un procédé d'épuration du sucre pour le			

MM.	Page	MM.	Page
TANCHOU. — Recherches statistiques sur la fréquence croissante des cancers....	878	révision des comptes de l'année 1843....	1120
TAVERNIER. — Appareils destinés à fixer avec précision le point de l'ébullition de l'eau dans la graduation d'un thermomètre	29	THENARD (Pam.). — Mémoire sur les combinaisons du phosphore avec l'hydrogène.	652
THENARD. — A l'occasion d'une question adressée par M. Gay-Lussac relativement aux travaux de la Commission de la gélatine, M. Thenard fait connaître les causes qui retardent la seconde partie du Rapport qui doit faire cette Commission	532	— Rapport sur ce Mémoire; Rapporteur M. Pelouze.....	914
— Rapport sur une question de priorité débattue entre MM. Dren et Donné	643	THEYER et WAMAZZ envoient de Vienne divers spécimens d'estampes imprimées en taille-douce avec des planches obtenues au moyen des procédés galvanoplastiques et galvanographiques....	311
— M. Thenard est nommé membre de la Commission chargée d'examiner si le platine travaillé par le procédé de M. Jeannet peut supporter sans altération une immersion prolongée dans l'eau.	387	THIBERT. — Une somme de 4 000 fr. lui est accordée pour ses pièces artificielles d'anatomie pathologique. (Rapport sur le concours pour les prix de Médecine et de Chirurgie de l'année 1843).....	327
— Et de la Commission des concours pour le prix concernant les Arts insalubres.....	679	THILLORIER et LARONNAZ envoient relativement à des expériences qui, suivant eux, démontrent l'existence du fluide nerveux et son action sur l'électromètre.	1109 et 1132
— M. Thenard est délégué comme l'un des trois membres de l'Académie qui feront partie du conseil de perfectionnement de l'École Polytechnique pendant l'année scolaire 1844.....	523	TREUTLER. — Description et figure d'un nouveau télégraphe de nuit.....	38
— M. Thenard est nommé Commissaire pour la		— M. Treutler prie l'Académie de vouloir bien hâter le travail des Commissaires à l'examen desquels a été renvoyé son Mémoire sur la télégraphie.....	312
VALERIUS demande l'autorisation de reprendre deux Mémoires qu'il a précédemment présentés et qui sont relatifs à un appareil pour le redressement des déviations de la colonne vertébrale.	198	découverte par M. Faye, le 22 novembre 1843.....	57
VALLÉE et BAZZARIN. — Dépôt d'un paquet cacheté (séance du 11 mars)	445	— Nouvelles recherches sur cette comète....	764 et 942
— MM. Vallée et Barrowell demandent, dans la séance du 6 mai, l'ouverture de ce paquet cacheté qui se trouve contenir une Note sur la substitution de la poudre d'Algarotti à la céruse dans la peinture à l'huile.....	824	VAN CLEEMPUTTE. — Renseignements relatifs au coup de foudre qui a occasionné l'incendie de la tour de l'horloge de Liège.	1062
VALLÉIX. — Une somme de 2 000 fr. lui est accordée pour son « Traité des névralgies ». (Rapport sur le concours pour les prix de Médecine et de Chirurgie de l'année 1843.).....	327	VANDER-PANT. — Sur un moyen destiné à diminuer les dangers des chimies de feu.	38
VALLÔT. — Sur les Tentacules de la vigne, et sur un Hyménoptère dont la larve vit dans le canal médullaire du tronc.....	1192	VELPEAU présente, au nom de l'auteur, M. Burggraeve, un ouvrage ayant pour titre : « Histologie ou anatomie de la denture. »	378
VALZ. — Éléments calculés de la comète		— M. Velpeau présente, au nom de l'auteur, M. Ghers, un ouvrage intitulé : « Traité d'obstétrique. ».....	379
		— M. Velpeau est nommé membre de la Commission du grand prix des Sciences physiques, question concernant le développement des fustes chez les Océaux et les Rapetous.....	387
		— Et de la Commission des prix de Médecine	

MM	Page ibid	MM	Pages
et de Chirurgie .		pour la place de Correspondant vacante par suite du décès de M. <i>Mathieu de Dom- basle</i>	226
VICAT — Conditions pour qu'une pouzzo- lane artificielle convienne à l'eau de la mer	1119	— M. <i>Vilmorin</i> est élu à la place vacante	284
VILLEROY est présenté, par la Section d'É- conomie rurale, comme un des Candidats pour la place de Correspondant vacante par suite du décès de M. <i>Mathieu de Dom- basle</i>	226	— M. <i>Vilmorin</i> adresse ses remerciements à l'Académie	378
VILMORIN est présenté, par la Section d'E- conomie rurale, comme un des Candidats		VROLICK — Extrait du Rapport de la pre- mière classe de l'Institut royal des Pays Bas, sur les qualités nutritives de la géla- tine présenté le 22 avril 1843 à M. le Ministre de l'Intérieur des Pays Bas	423

W

WAIDELE et THEYER adressent, de Vienne, des épreuves d'estampes tirées avec des planches obtenues par les procédés gal- vanoplastiques	511	WERTHEIM — Recherches sur l'élasticité Rapport sur ce Mémoire, Rapporteur « M. <i>Baëmet</i> »	921
WANT/EL — Note sur l'intégration des équations de la courbe élastique à double courbure	1197	WRONSKI (H) — Mémoire ayant pour titre « Aperçu de la réforme scientifique de la locomotion terrestre »	1057
WERNER, inventeur d'un procédé, pour pré- venir le fendillement qui se produit d'or- dinaire dans le bois de chêne vert, par suite de la dessiccation	526	WURTZ (An) — Sur l'alumine soluble — Sur l'hydrure de cuivre — Sur la transformation de la fibrine en acide butyrique	00 702 704

Z

ZAMBAUX, BONTemps et PACQUEN — Nou- veau système de locomotion sur les che- mins de fer, au moyen de l'air comprimé	1131	solaires transmis par des verres colorés sur la végétation des plantes et la germi- nation des graines (Rapport sur ce Mé- moire, Rapporteur M. <i>Dutrochet</i>)	849
ZANTEDESCHI — De l'influence des rayons			

Errata. (Tome XVIII.)

- Page 46, ligne 37, *ajoutez la phrase suivante :*
 Je prie donc l'Académie de vouloir bien suspendre son opinion définitive sur la question qui déjà s'est agitée si souvent devant elle, jusqu'à ce que toutes les pièces de la discussion aient été mises sous les yeux du public.
- 85, 23, *au lieu de* M. BARTER, colonel d'état-major, *lisez :* M. BARTER, chef d'escadron d'état-major
- 141, 3 et 4, *au lieu de* le poids moyen du bois sec produit par hectare dans ces forêts est de 230 000 kilogrammes par année, *lisez* le poids moyen du bois sec produit par hectare dans ces forêts a été de 230 000 kilogrammes en soixante-trois années, soit 3650 kilogrammes par an
- 164, 19, *après ces mots :* *Types de chaque famille et des principaux genres de plantes croissant spontanément en France ; par M. PLÉZ ; 2^e livr., au lieu de* in-8°, *lisez :* in-4°.
- 183, 17, *après ces mots :* « qu'une masse de 1000 kilogrammes cubes », *ajoutez* d'une densité telle que l'excès de cette densité soit égal à la densité moyenne du globe.
- 240, 17, « sujet du concours pour le grand prix des Sciences mathématiques de l'année 1846 », *lisez* de l'année 1844.
- 240, 24 et suivantes, *lisez :*
 Le nombre des votants étant de 50,
 M. Chevreul obtient. 30 suffrages,
 M. Duhamel 12
 M. Lamé. 1
 M. Poncelet. 1
 Il y a six billets blancs.
- 262, 20, *au lieu de* BARRET-RIVET, *lisez :* BARRET-RIVET.
- 265, 29 et suivantes, *lisez :*
 La longueur du canal digestif non compris l'œsophage et l'estomac, elle était de 62^m,45. La longueur de cette partie dans le chameau à deux bosses est de 42^m,13 ; dans le bœuf, de 48^m,86 ; dans le cheval, de 25^m,18.
- 353, 20 : « Commission qui sera chargée de l'examen des pièces adressées au concours pour le grand prix des Sciences mathématiques, année 1844 », *lisez* année 1843.
- 371, 23, *ajoutez* le nom de M. AL. BRONGNIART à celui des membres de la Commission chargée de l'examen du Mémoire de M. Barral sur la faïence pour poêles et pour cheminées.

- Page 392, ligne 4, au lieu de $+ 2 \frac{u_z^2}{u_x^2 - u_y^2}$, lisez $+ 2 \frac{u_x^2 - u_y^2}{2g}$.
- 481, 10, au lieu de sulfate neutre de zinc, lisez : chlorure neutre de zinc.
- Ibid., 16 et suivantes, au lieu de « quelques essais d'embaumement, sans injection des vaisseaux et sans ouverture des cavités splanchniques, au moyen de la seule macération du cadavre dans la solution saline, » lisez. en entourant le corps de bandes imbibées de chlorure de zinc et en versant dans la bouche la quantité suffisante de ce liquide.
- 518, 11, après nervures latérales, ajoutées et parcourues.
- 523, 10, au lieu de myrtinées, lisez myrsinées.
- 523, 27, dans le cas où M. Poncelet, qui n'est pas présent à la séance, ferait déjà... etc., lisez dans le cas où M. Poncelet, qui n'est pas présent à la séance, appartiendrait déjà, à un autre titre, au Conseil de perfectionnement, M. Dupin serait le troisième des Commissaires désignés par l'Académie, puisque M. Lœuille a été nommé par le Conseil d'administration de l'École.
- 526, 17, au lieu de « Opérations de lithotripsie; par M. BAUDRLOQUE, » lisez Opérations de céphalotripsie; par M. BAUDRLOQUE.
- 564, 8, au lieu de de l'anomale excentrique, lisez de l'exponentielle trigonométrique qui a pour argument l'anomalie excentrique
- Ibid., 9, au lieu de même de, lisez même.
- 575, 6, (0), lisez (2).
- 576, 15, 18, lisez 19.
- Ibid., 31, 9(1— etc., lisez g(1— etc.
- 577, 18, $\frac{1}{1+1+1}$ de millimètre, effacez de millimètre.
- 590, 13, au lieu de Commission des prix de Médecine et de Chirurgie, lisez Commission des prix de Physiologie expérimentale.
- 592, 13, M. DUPONT, de Lunel, lisez M. DUBAND, de Lunel.
- 630, 5, au lieu de $\frac{A}{1-a^2}$, lisez $\frac{A}{1+a^2}$
- 633, 5, au lieu de $cd + bc$, lisez $ab + bc$
- Ibid., 11, au lieu de λ^2 , lisez $3\lambda^2$
- 635, 17 et 25, au lieu de r^2 , lisez v^2
- 636, 2, au lieu de $\frac{ab}{1+a^2}$, lisez $\frac{A}{1+a^2}$
- Ibid., 16, au lieu de b , lisez b
- Ibid., 17, au lieu de $\frac{a}{r} + \frac{r'}{a}$, lisez $\frac{a}{r'} + \frac{r'}{a}$
- 641, 13, au lieu de un certain facteur, lisez une certaine fonction
- Ibid., 14, au lieu de continu, lisez continue
- 673, le renvoi (1) pour la note doit être reporté à la fin de la vingt-septième ligne, et remplacé par le renvoi (2) qui se rapportera à la note suivante, qui a été oubliée.

(2) Archives d'Histoire naturelle d'Erichson, pour 1842.

- Page 674, ligne 16, *blicca*, lisez *blicca*.
 676, 3 de la note, interne, lisez continue.
 695, 27, au lieu de *BARRT*, lisez *BARRT*.
 710, 16 et 17, au lieu de *apoplexie*, lisez *asphyxie*.
 768, 7, au lieu de *faites sur le Faulhorn*, lisez *faites en descendant du Faulhorn*.
 814, 2, au lieu de *en réagissant sur le protoxyde d'or*, lisez *en réagissant sur le tritoxyle d'or*.
 814, 5, au lieu de *produisent à l'ébullition un dépôt*, lisez *produisent à l'ébullition avec le chlorure d'or un dépôt*.
 816, 31, au lieu de *protoxyde d'or*, lisez *tritoxyle d'or*.
 971, 6, au lieu de $3 \frac{ma + ma}{2}$, lisez $3 (ma + ma)$.
Ibid., 15, au lieu de $\frac{5}{2}$, lisez 4.
Ibid., ligne dernière, supprimez la note
 1062, 18, au lieu de 17 juin, lisez 17 mai.
 1067, 5, au lieu de *présidence de M Élie de Beaumont*, lisez *présidence de M Charles Dupin*.
 1109, 28, au lieu de (Renvoi à la Section de Géométrie), lisez (Renvoi aux Sections de Géométrie et de Mécanique).
 1159, 4, au lieu de $2 \frac{1}{2}$ millimètres, lisez $1 \frac{1}{2}$ millimètre.



IMPERIAL AGRICULTURAL RESEARCH
INSTITUTE LIBRARY
NEW DELHI

[illegible]